

**JOHANNIS  
DOLÆI ...  
OPERA OMNIA,  
EXHIBENTIA  
NON MODÒ...**

---

Johann Doläus



~~HL 2~~

1. K. 1. 154



UV

(1000) 5

1000 1000 1000 1000



JOHANNIS DOLÆI, M.D.

*Potentissimi Hassiæ Principis Consilarii ac Archiatri  
Primarii, Collegii Medici Decani perpetui, Academia Leopoldina  
Naturæ Curiosorum Collegæ, & Regiæ Anglicæ  
Societatis Sodalis.*

ENCYCLOPÆDIA  
CHIRURGICA  
RATIONALIS,

*in quâ*

OMNES AFFECTUS EXTERNI,  
Corpus humanum unquam invasisse observati, tam Veterum,  
quàm Recentiorum; in Specie verò Galenicorum, Paracelsi, Helmontii, Willifii,  
Sylvii, & Cartesiorum ex Fundamentis, quoad Causas & curandi Methodum solidè pertra-  
ctantur; addito non modò de Causis & Curatione, sed Nominibus etiam Morborum, sede  
Affectû, accuratâ Diagnosi & Prognosi, nec non Dietâ servandâ, Authoris libero ubiqs  
Judicio, unâ cum selectis & experientia multiplici confirmatis ad  
eosdem abigendos Remediis;

QUA OCCASIONE ETIAM PLURES DIFFICULTATES  
Anatomicæ, Chymicæ & Chirurgicæ,  
*resolvuntur,*

Res Medico-Chirurgica illustratur, & omnia secundum rectam Rationem, &  
sanioris experimentalisquæ Philosophiæ principia dilucidè  
demonstrantur.

*Opus ab Eruditis diu jam desideratum, pluribus utile & jucundum, Medicinæ  
ac Chirurgiæ tyronibus pernecessarium, & ad multorum sollicitationes bono  
publico nunc denuò communicatum.*

Editio nova, prioribus ut auctior ita correctior.



FRANCOFURTI ad MOENUM,  
Sumptibus, FRIDERICI KNOCHII,

ANNO M. DCC. III.



# CARMINA GRATULATORIA

*æque*  
THEOLOGORUM, QUAM JURISCONSULTORUM, AC  
PRÆCIPUE MEDICORUM CELEBERRIMORUM,  
IN ENCYCLOPÆDIAM CHIRURGICAM DOLÆANAM.



Llustris quamvis, *Celebris Dolæ*, Tuarum  
Virtutum torum volitavit fama per orbem,  
Illa Tagum quamvis percubuit, ipsa Padumque  
Ultra Præoniam Tu quamvis omnibus audis  
Præ cunctis Artem doctus, medicamine pollens,  
Quantus apud Dapnos Podalirius arte medendi,  
Nobilis, & famâ multis memoratus in oris:  
Non tamen in lucem prius hanc prodire volebas  
*Encyclopadiam*, quæ sit *Chirurgia* dicta,  
Quam commendet eam, de signo ceu meliore,  
Qui *Tibi* percharos non ultimus inter amicos,  
Nec non constanti longo junctissimus usu,  
Quid valeas nôrit, nôrit quid ritè labores  
Atque *Tui* valeant: dubiam sententia mentem  
Nec trahit hæc mihi, quin sit *lucubratio* præfens  
Hæcce recens primis æquanda; sed anteferenda  
Quod veniat cunctis, hoc ausim dicere verè:  
Artificem commendat opus, quam clarus in arte  
Sis que Machaonia, quam doctus ferre medelas  
Vulneribus diris, lethalibus & violentis,  
Providus in morbo quam sis, & lynceus Ipse,  
Nec non qui post Te parafangis mille relinquo  
Hippocratem, Galenum, etiam Chirona peritum,  
Et quos fama vetus Medicos jactatque probatque,  
*Encyclopadia* hæc doctis demonstrat abundè.  
Suspicient igitur Te germina chara Minervæ,  
Hactenus ut, semper sic Te etuacibus usui  
Morborum cuncti deposcent. Ipse Serenus  
Delicium rarum Te Princeps Vester habebit.  
Perpendas igitur quod dicunt ritè Periti:  
*Principibus placuisse virum non infima laus est:*  
Et quæ cœpisti, si sic pertexeris ire,  
Sub tunulo tacitum Te propria scripta loquentur,  
*Dolæique* Sui remanebunt buccina clangens.

*Etiusibon.*

DoLLxVs Mag<sup>us</sup> Vs Vireat, SanVsque freqVentat  
FLoreat, & solpes! rata sInt rogItantla Verba!

*Viro Nobilissimo, Experientissimo Domino Dolæ, Medico  
non i multis applausis*

ANTONIUS KLINGLERUS, SS. Theol. Doct.  
atque Ecclesiæ Tigurin. Antistes.

In Encyclopædiam Chirurgicam

*Viri Excellentissimi & Celeberrimi*

D. JOHANNIS DOLÆI,

*Sereniss. Hassia Landgraviæ Archiatri & Consilarii Amplissimi.*

**C**hirurgi felice manu væ-saucia ritè  
Corpora fœciti qua ratione queant,  
Magni docta manus docuit calamusque DOLÆI,  
Cujus fama Viri pulsât utramque domum.  
Ma<sup>gn</sup>e DOLÆE, animo, metitis, virtuteque prægnans,  
Atque Machaonii gloria magna chori!  
Aureolis porro ser ptis, calamoque diserto  
Orbem disculis irradiat tenebris!

Tiguri d. 29. Jan. 1689.

*Autori Operis Inclito singularem Observantiam  
testabatur*

JOH. HENRICUS HEIDEGGERUS, SS. Theol. Doct.  
& in Academia Tigurina Professor.

( 2

Ad

*Ad Nobilissimum, Amplissimum, Doctissimum*

**DOMINUM JOHANNEM DOLÆUM,**

Medic. Doctorem Experimentissimum, Consiliarium & Archiatrum Hassiacum Celeberrimum,  
Amicum suum optimum.

**Q**ua patet Orbis, eris *Medicorum* gloria prima,  
Et *Chirurgorum*, tandem quoque *Philosophorum*.

JOHANNES à LENT, SS. Theol. & Ling. Orient. Prof.  
Acad. Herborn. Pro-Rector.

~~~~~  
Viro Celeberrimo

*Medicinæ æquæ ac Chirurgiæ Restauratori Indlyto,*

**DOMINO JOHANNI DOLÆO,**

Med. Doct. Serenissimi Hassiæ Principis Consiliario ac Archiatro meritissimo,  
Fautori ac Collegæ suo perquam colendo,  
S. D.

**JOHANNES GEORGIUS VOLKAMERUS, M. D.**  
S. Cæs. Majestatis Archiater, ejusque Personæ Imperialis Medicus, S. R. I. Nobilis, nec non S. Cæteran. Palatii  
Aulæque Cæsareæ & Imperialis Consistorii Comes, Acad. Leopold. Imperial. Nat. Curios.  
PRÆSES, atque Reipubl. Norimberg. Collegii Medici Senior

Primarius ac Perpetuus,

**B**Alnea, *constrinaque levandi vulnera curam*  
Esse sibi propriam jam sine jure putant:  
Applicetque manu que sunt plura: Reclamat

Fortiter hinc Coi natio tota Patris:

Reclamat Medicina, & Vocti vere DOLÆI,

Incluti gyro se brevior dolat.

Cognitione salutaris conjungere partes,

Qui-solidum Capitu-cunque parare Deum

Unicuique suum.

~~~~~  
EPISOLA GRATULATORIA,

*Ad Virum Celeberrimum,*

**DOMINUM JOHANNEM DOLÆUM,**

Medicinæ Doctorem, Consiliarium & Archiatrum Hassiacum.

**S**icuti omnium oculi in præsentem rerum afflictarum dchxi sunt statum, postquam effusus Mars Germaniæ nostræ pacem denuo excussit; ita universis literatorum chorus in novum ab Artis Medicæ Reformatioribus cæptum opus obtrutum vertit, omnesque scire cupiunt, utrum certiorum inde expectare possimus salutem. Tu, Vir Celeberrime, qui in reformando & emendando paucos habes pares, superiorem neminem, usque adco juvandi flagras conanime, ut fama tua etiam ad externos iverit, nullique ferè amplius in lucem prodeant libri Medici, in quibus honorifica Tui non fiat mentio: & ex quo Encyclopædia tua Medica lucem aspexit, dici vix potest, quantum splendoris arti Medicæ accesserit. Nunc ubi Encyclopædiam Chirurgicam Rationalem publici quoque facis juris, fortuna æque aspirat laboribus tuis; nam famam extendere factis, hoc virtutis opus. Applaudunt meritò omnes fauciatris de novo Machaone, & Tibi, Amice magnæ de gloria & honoribus gratulantur. Votis his pondus addunt Magni Theologi, quibus non displicet sana philosophandi ratio. Calculum adjuiciunt Justitiæ Sacerdotes. Medici Solennia gaudia certatim jungunt. Prudentiores Philosophi gaudent, quod Junior Philosophia Scholasticos limites supergressa, Arti Medicæ auxiliatrices præbeat manus, ut ipsis ope hæc certiore in posterum niti possit medendi methodo. Ego secundo lætor Amici successu, atque Tibi, Vir amplissime, torò pectore grator. Deus Te multos servet in annos!

Marpurgi Cætorum die 15. Febr. Anno 1689.

Quod ex animo vove t

**JOHANN JACOB WALDSCHMIDT,**  
Archiater ac Professor.

~~~~~  
*Viro Nobilissimo, Amplissimo & Experimentissimo, DOMINO*

**DN. JOHANNI DOLÆO,** Medic. Doctori,  
Consiliario & Archiatro Hassiaco Celeberrimo,

*Encyclopædiam edenti alteram Chirurgicam, acclamat feliciter!*

**JOH. DANIEL DORSTENIUS.** Med. Doctör, Anatom. Chirurg. & Botan. Professor Ordin. Facult. Med. Decanus  
nec non h. t. Academiæ Marburgensis Rector.

**H**ippocrati longam didicisse fideliter artem,  
Hæc ipsa celebrem volitare per ora virorum,  
Principibus placuisse Viris, ipsique medelam  
Cunctorum plausu facile & consulsisse,

Propterea & digito monstrari & dicier: Hic est!

Laudis non imæ sed summæ credidit esse.

Tante DOLÆUM decorant encomia laudis:

Nuper Apollinæ fundamina tradidit artis,

Quæ pater hæc, avide doctis, Europæ, recepta:

Nunc vero in *auxiliæ* & *audia* promit is idem,

Chirurgis pariter multum prodesse laborans.

Plaudimus ergo Tibi, Fautor, DOLÆE, colende,

Faxit propiorò Numen, mortalibus ægris

Ut prosis, placeas, & vivas Nestoris annos!

Ω ○ Ω

In Effigiem

Viri Nobilissimi, Excellentissimi,

**Dn. JOHANNIS DOLÆI,**

Med. Doct. Celeberrimi, Serenissimi ac Potentissimi Hassiæ Principis Consilarii ac Medici  
Cubicularis, S. R. I. Curiosorum Collegæ Famigeratissimi.

**DOLÆUS**

Per anagramma purum

**LAUS DEO.**

**E**N celebris faciem Medici! quæ cuius origo  
Omne mysterium nominis hocce docet,  
*Laus* tribuenda Deo, Magnum donare DOLÆUM  
Dignato Nobis, donaque tanta Viro.  
Artificis dextrâ Vultus nitet, Ipse DOLÆUS  
Ingenii formam per sua scripta dedit.

*Orestis Pylades.*

O. Z. P. P.

**C**Oelo penna beat: calamis extendimus annos:  
Scripta virent, quamvis corpora crypta regat.  
Ne metuas igitur: pepulit tua funera Virtus,  
Hanc libertatem candida crena dedit.  
Ingratus Medicus, Chirurgus & iste, salutem  
Qui non perpetuum dixerit *Andromacho*.  
Qui Gallos meruit *Francorum* vallis, Amice?  
At gallum & quercum Te meruisse scio.  
Felix auspiciū! Medicorum Hodogeta fidelis,  
Et Chirurgorum *Graculus Hassus* erit.

Scriptit **ANDROMÆTTO**

Suo

**ARION.**

**Per-Illustres & Excellentissime**

Domine,

**Patrone, Fautor & Collega jugiter Observande!**

**H**Oæ adhuc restare videbatur, INCLYTE DOLÆE, ut, quæ publicum remuneras, *Encyclopædia Medico-Chirurgica* ultimum Arti complementum adderes. Equidem discussa dudum erant barbara Scholarum carinomata, quibus pretiosam mundi aspeatabilis Scientiam, quam Physicam nominamus, miserè quondam deturparant, postquam Magni seculi Heroes **CARTESII**, **VERULAMII**, **BOYLEI** Augiæ hocce stabulum junctis q̃ viribus expurgarunt. Discussæ prorsus erant Artis nostræ Medicæ caligines, cum multis Ethnicorum fabulis, cultioris Philosophiæ regulis Praxin superstruerent **HELMONTII**, **SYLVII**, **WILLISII**. Sola verò Chirurgia (à quâ omnis Medicina tanquam capite dependet) infimis Vulgi idiotis demandata & tot retro seculis à Medicis detestata stetit. Hinc demum illa lachrymæ: hinc Pseudo-Chirurgorum eccentricitates & errores fontici, morte sæpe expiandi, quos egregiè detexit Celebris **WALDSCHMIDIUS** in *Chirurgo Cartesiano* nuper ventilatō. Olim autem non erat sic, cum vel Artis Medicæ Parentem **HIPPOCRATEM** Chirurgiæ non puduerit, ut egregiè de *fracturis* libri attestantur. Quin Personatus ille Monachus **B. VALENTINI** eandem antiquissimam temporibus à Medicis exultantem esse retet in *Curru Triumph.* § pag. 305. his quidem verbis: Lange vor mir und vor alten Zeiten haben die Meister der Medicin die Sachen selbst angegriffen / sonderlich was die äusseren Schäden belanget: Jeso aber haben sie Knechte und Diener angenommen / und ist also die eine hohe Kunst zu einem schlimmen Handwerk worden. Et quamvis postmodum se traserint, qui velut aliud agendo, artem in præcepta miserint nil tamen egregiè præstitisse poterant, quamdiu Opera illorum falsis nitentur fundamentis de Naturæ & Facultatibus animæ attractricibus, reternticibus, expultricibus &c. quibus totam sæpe curam otiosi relinquebant. Quid enim aliud hinc sperari posset, quam extrema Attis nobilissimæ barbaries; quæ si eadem, qua hodie docetur methodo fuisset exulta, quanta nunc ejus forent incrementa? Postquam verò Medici quidam Generosiores, **BONTEKOE**, **MUYS**, **WALDSCHMIDIUS** & alii Artem hanc Chirurgicam altioribus Philosophiæ Corporcularis radiis illustrarunt, nonnulli quoque ad *teygensteyn* penetrantes, ea quæ pharmaca non curabant, igne ferroque subigebant, dici non potest, quante statim accessiones illic obervatæ sint. Loquuntur id Scripta Elegantissimi **MUYSII**, quem cum admiratione de speratis Arnhemii affectus indies aggressum vidi. Loquuntur id observationes Celeberrimi Embryulci **D. D. van SOLINGEN**, quem tot puerperarum infeliciū myriades selectissimo instrumentorum apparatu liberasse novi. Non dicam de Medicis Luteriæ Parisiorum (quæ frequens Chirurgorum Schola est), Chirurgiam exercentibus, eū, quicquid egregiū unquam actum est, in Tua, **VIR CELEBERRIME**, *Encyclopædiâ* tanquam Panoplia quadam annotatum sit. Sic tandem explevisti diutina Eruditorum desideria, explevisti Votum in *Epimeridibus Germanorum Curiosis* à me nuncupatum, quo Reipublicæ Literariæ Proceribus Operis selectissimi

( 3



olim spem, injeceram. Hinc dici non potest, quanto super gaudio sim perfusus, ultimam illi manum jam impositam perciperem, ne quod ab indole nostra alienum, magno promissor hiatu aliis verba dedisse videar. Repeto igitur votum ante factum, & *Amplissima Tua Excellentia* congratulor de felicissimo absoluto scripto hactenus desideratissimo. Tuba illud erit, quæ per orbem jactandum volitans celebritas Nominisque Tui Fama undique resonabit, neque fera Te posteritas venerari desinet, donec eum, quem Æsculapius cum serpente in Olympo tenet, locum occupaveris. *Ita piè vovet & præfaga mente auguratur*

*Dabam Giffa: Musæ d. 10. Febr. An. 89.*

MICHAEL BERNARDUS VALENTINI,  
Med. D. Philos. Nat. Prof. Ord. atque S. R. I.  
Acad. Nat. Cur. Collega d. THESSALUS.



Clarissimo Medicorum Lumini,  
Labascentis & infinitis erroribus hactenus obruta Chirurgia  
in Germaniâ Restauratori,  
*Atque Medicæ*

*Reformatori hactenus industrio,*  
Viro Excellentissimo, Nobilissimo ac Amplissimo

*Dn. JOHANNI DOLÆO,*


Med. Doct. Famigeratissimo, Consiliario & Archiatro Potentissimi Principis Hassiæ, Patrono,  
Fautori ac Cognato suo colendo.

**S**Cande Triumphales victrix Hygiæ quadrigas,  
Altaque Parnassi culmina montis adi.  
Strata jacet tandem morborum tristis Erynnis:  
Discit atrox sensum mors quoque fræna pati.  
Sæpe quidem non parva Tibi Victoria parta est,  
Et cecidit forti multa caterva manu.  
At, velut Antræus, surrexit alacrior hostis,  
Civit & in miseros mox nova bella viros.  
Donec incandescens dignam DOLÆUS in iram  
Hostiles acies Victor ubique ruit.  
Hic intestinum stravit feliciter hostem,  
Multorum capitum qui velut hydra fuit.  
Hic simul externum debellat fortiter ægmea  
Ne capiat vires mox rediviva lues.  
Encyclopædia duplex intelligo scutum,  
Quo mala ceu geminâ Gorgone monstra rigent.  
Hæroos Hygiæ Viri deprædicat ausus,  
Huncque tibi præfert, Coë, Galenæ, Tibi.  
Nec Tibi pro tantis meritis, DOLÆE, negabit  
Orbis in excelso digna trophæa loco.

*Dabam Marpurgi Castorum Calendis Martii 1689.*

*Sic aggratulantur*

*Christianus Kürsnertus, Med. Lic. & Sereniss.*  
*Principis Hassiæ Exercitus Medicum Ord.*



*A*  
**MONSIEUR D'OLÆUS,**

Conseiller & Medecin ordinaire de S. A. S. Monseig. le Landgrave de Hesse, &c.  
*Rondeau*

*Sur*  
*Son Encyclopedie Chirurgique.*

**C**'Est un bonheur fort extraordinaire  
Aux Medecins, d'être en vogue & de plaire:  
La difficulté de guerir le mal  
Rend tres-souvent le fort assez fatal.  
Du plus expert, chez quelque imaginaire.  
Mau de Dolæus la perlonne & chere  
Aux plus grands Princes, mêmele vulgaire  
Connoit que son merite est sans égal.  
C'est un bonheur.  
De son profond sçavoir je veux me taire,  
Ce livre en est une preuve assez claire:  
\* La Charité, l'Hôtel Dieu, l'Hôpital  
Croiroient commettre un crime capital  
S'ils ne l'avoient pour leur règle ordinaire.  
C'est un bonheur.

\* Vous sçavez Mon<sup>r</sup>. que ce sont les trois plus celebres hôpitaux qu'il y ait non seulement à Paris, mais même dans l'Europe.

*C'est pour monstrer à toute la terre l'estime que je fais de votre merite, & pour vous assurer Monsieur. que je suis avec tout le respect possible*  
Vôtre tres-humble & tres obeissant serviteur

P. T. Le Cerf, D. en Medecine  
INDEX.



# INDEX CAPITUM ENCYCLOPÆDIÆ CHIRURGICÆ.

## LIBRI I.

### *De Morbis Capitis Externis.*

- CAP. I.
- D**E Hydrocephalo pag. 1  
 II. De Pilorum affectibus. v. gr. De Alopecia, Area, Ophiali, Tinea, Calvitie, Canitie, Plica, Porrigine, inconcinna pilorum excrefcentia, & eorundem Filfuris & Scilfuris. p. 8  
 III. De Contusione Capitis, & Pericranii Vulneribus. p. 22.  
 IV. De Cranii Depreffione, Fractura simplici & cum meningum & cerebri læfione. p. 29  
 V. De Calvariz Gümma & Exoftofi, Cerebri Fungo & Siriafi. p. 37  
 VI. De Morbis Oculorum in genere, & eorum globum infestantibus, Atrophia nempe, Procidencia, Strabismo, Ficu cancrofo, Ficu fcirrholo & Perforatione. p. 42  
 VII. De Morbis Palpebrarum, Trachomate Emphysemate & Oedemate, Coalitu, Cancro, & Ectropico feu Inverfione, & Lagophthalmo, de Hydatide, Callo & Calculis. p. 54  
 VIII. De Morbis Ciliorum, Hordeolo fcil. Grandine, Madarofi, Trichiafi, Phalangofi & Pthiriafi. p. 63  
 IX. De Vitiis Carnis Oculi Angularis, Rhynade, Encanthide, Ægylope, & Fiftula lachrymali. p. 65  
 X. De Tunicz adnatæ Vitiis, Ophthalmia, Pterygio, Panno, & Hyppophagmate feu Sugillatione Oculorum. p. 71  
 XI. De Tunicz Cornez Vitiis, Crallitie Nebula, Albugine, Pustulis, Hypopyo, vulneribus, & Ulceribus. p. 85  
 XII. De Uvæ Tunicz Morbis, Procidencia, Papillæ dilatatione, Anguftia & Suffufione feu Cataracta. p. 96  
 XIII. De Vifus debilitate, Gutta ferena, totali Cæcitate, & Humorum Oculorum amiffione. p. 103  
 XIV. De aurium Morbis, dolore fcil. inflammatione, ulcere, vermibus, Rebus externis auribus immiffis, Caruncula aurem obftruente & Parotide. p. 109  
 XV. De Sonitu & Tinnitu Aurium, Obau-ditione & furditate. p. 124  
 XVI. De Nafi Morbis, & quidem de Nafi Sarcomate, Polypo, Verrucofitate, ulcere, Ozæna, Inflammatione, Macula rubra, Maculis feu punctis nigris, Nafæ deperdito & ejufdem figuræ depravatione. p. 131  
 XVII. De Hæmorrhagia Narium, Coryzæ, Sternutatione nimia, Odore depravato & abolito. p. 142  
 XVIII. De Linguz Morbis, Freno, Tumore

- feu Crallitie, Ranula, Nigritie, & Fifturis, Pustulis, Verrucis, ejus substantiæ portionis ablatione, Aphonia, Blætitate, item de Gustus læfionibus. p. 157  
 XIX. De Labiorum Morbis, Tumore, Tremore, Perversione feu Spafmo Cynico, Fiffuris, Labiis Leporinis & Ulcere. p. 173  
 XX. De Faciei Morbis, Gutta Rosacea cum & sine pustulis, Inflammatione ejus fcil. Phlogofi, Varis & Maculis. p. 184  
 XXI. De Oris Vitiis, Ejus Apertione, Coalitu, Scirrho, Tortura, male affectis du-ctibus falivalibus, Ptyalifmo & Fortore. p. 194  
 XXII. De Dentium Morbis, Odontalgia, Corrofione vel Carie, Fiftulis, Mobilitate, Cafu, Nigredine, Lapide dentali, Sorditie, Stridore, Hæmodia & Vermibus. p. 205  
 XXIII. De Gingivarum Morbis, Excrefcentia, Parulide, Erofione & Fiftula. p. 221  
 XXIV. De Maxillarum Morbis, Immobilitate, Luxatione & Fiftula. p. 226  
 XXV. De Morbis Uvulæ & Tonsillarum, de Uvulæ Luxatione, ejufdem & Tonsillarum inflammatione, ulceribus & Palati offis Erofione. p. 231

## LIBRI II.

### *De Morbis Thoracis.*

- Cap. I. De Faucium Morbis, Angina & Glandularum Colli Tumoribus. p. 238  
 II. De Strumis & Bronchocele. p. 250  
 III. De Glottidis Contractione, & Epiglottidis Induratione. p. 261  
 IV. De Afperæ Arteriz Anguftia, Afperitate, Ulceribus & Vulneribus. p. 269  
 V. De Gulæ, feu Oefophagi Tumore, Anguftia, Ulcere & Vulnere. p. 275  
 VI. De Thoracis Vulneribus & Fiftulis. p. 281  
 VII. De Vertebrarum Luxatione, Gibbofitate & Spina nodofa. p. 289  
 VIII. De Costarum Luxatione & Fractura, item Mucronatæ Cartilaginis Prolapfu & Incurvatione. p. 295  
 IX. De Mamillarum Tumore, Inflammatione, Oedemate, Scirrho, Emphysemate, Cancro, Magnitudine indecora, Foveæ & Ulceribus. p. 298  
 X. De Papillarum Fiffuris, Foveæ, Defectu & Imperforatione. p. 313

## LIBRI III.

### *De Morbis Externis Abdominis.*

- Cap. I. De Ventriculi Tumore, Ulcere & Vulnere. p. 317  
 Cap. II.



ΣΥΝ ΤΩ ΘΕΩ.

# JOH. DOLÆI ENCYCLOPÆDIÆ CHIRURGICÆ RATIONALIS

LIBER I.  
DE MORBIS CAPITIS EXTERNIS.

CAPUT I.  
*De Hydrocephalo.*

Præfatio  
nm.



Unctis illa morborum soboles, quæ etiam aliquis viventium corporibus humanum sepiusculæ ab ortu ad occasum in modum divexari, defecdari, & nonnunquam in totum destrui atque consumi observatur, tota tamenque diver-

sis abundat sui speciebus, ut non modo, dum eam in moleles singulatim investigantur, & certa contra easdem explorantur remedia, brevi sub vite spatio artem faciant longissimam, sed præter multitudine, etiam generosissima, intus & foris adhibita medicamenta, ipsam quoque manualementem, eamque sedulam exigant operam, illis præsertim impendendam, quæ aut externæ inhaerent superficier, aut non procul ab ea distant, ita ut junctum oculorum aciem, manus & instrumenta ad locum ipsius affectum pertingant, & causæ foventes ab eodem superari, dimoveri, partesque laborantes ad integritatis statum felicissimè disponant ac deduci valeant.

Quapropter pars illa Therapeutices nobilissima, ab antiquis ista penes Græcos nomen quoddam peculiare *χειρουργία*, sive *τῆς χειρουργικῆς* sibi committitur, non tantum vetustatis, & auctoritate pollentium Virorum ea quondam ad multorum, quos Charontis cymba jam manere putabatur, conservacionem laudatissimè usorum, Podalici nempe, Machaonis, Jastidis, qui ipsius illius omnis Medicinæ bonæ parentis, Hippocratis, exercitum ferme assiduè splendore clara, sed eam maxime ob causam magnis condecoranda laudibus, quod, ut excelsus ille *Celsus* de eadem laus honorifice commemorat, effectus illius inter omnes Medicinæ partes sit evidentissimus, ipsosque ad oculos tum morbos eorumque causas, tum medicamentorum vim & efficaciam, tum quid manus ipse saluaret & instrumenta com-

moda præstiterint, demonstrat, nec opus habeat tardum ac dubium eventus medicamentorum solorum operationem anxie expectare, quæ tamen & ipsa cum victus ratione non omittat, sed manu plurimum præstet, ut sæpe simul & semel ipsa spina eumbro egroto evellatur, & inductus ab ea dolor in momento sedetur.

Non ergo falli nos putandum est, existimantes, in ipsos non modo Medicorum filios, sed totum humanum genus ingens inde redundaturum esse commodum, si affectus illos omnes, qui præter explicatos jam in *Medicæ* nostræ *Encyclopædiæ* examinandi restant, & ipsam manuum, quandoque instrumentis variis armatarum, quin ferro & igne nonnunquam terribilium, effugiant operationem, secundum recte *Rationis* lumen & *Experientia* plenariam confirmationem ita clarè & distincte demus expositos, ut neque de ipsorum morborum, illisque supervenientium symptomatum causis aliquid dubium, neque de salutaribus adhibendis remediis quidpiam magnopere restet desiderandum. Ut verò nostrum hoc propositum eo cedat feliciter, eidem inistemus viæ ac methodo, quam in superiori nostræ *Encyclopædiæ* *Medicæ* antea calcavimus, certi, quod Lectori in priori illa jam versato ea magis sit placitura, atque si eandem nunc mutavimus & ad aliam nos deflectivimus.

Ordinemur proinde & hic de *Capite*, minime solliciti de apparituræ quadam monstruositate, quod ponderosum aliquid caput reliquis præmutamus, non enim

*Humano capiti cervicem pilior equinam  
jungere nunc vult;*

sed continuatâ quadam serie sequuntur humana, quamvis morbida, membra, à summo vertice capitis ad ipsam pedis plantam, uno extremitum ejus digitum. Primum igitur nobis impetum sustineat, non magni illius *Alexandri Bucephalus*, de quo *A. Gell. Noct. Att. lib. 5. cap. 2. p. m. 129.*

A

sed

*Hydrocephalus  
quid?*

sed parvuli cuiusdam infantis Hydrocephalus, vel *Υδροκεφαλος*, *υδρ κεφαλ*, scil. *ὑδρ* τῆ *κεφαλῆ*, Latinis Hydrops capitis, seu tumor capitis aquosus dictus; Germanis audiens *die Wasserucht des Haupts*: colligitur enim interdum tanta humoris copia, ut ea caput in magnam intumescat molem. Describi autem potest, quod sit tumor p. n. capitis, ab humorum vitioforum, inprimis seroforum inundatione dependens, & per violentam ut plurimum solutionem continui productus.

*Est morbus  
infantum.*

Morbus hic infantibus magis sollemnis est, quam adultis, quia infantibus tunica arteriarum & lymphæ ductuum sunt molliores, atque pori tubulique angustiores, nec motus sanguinis ad feri tam fortis, interim pori arteriarum & vasorum lymphaticorum facilius dilatantur, & particulae crassiores in cerebrum deponuntur, qui infantes in utero materno sæpe morbum hunc acquirunt, cum situ inverso diutius detinentur, neque capite nimis declivi, quare cum caput infantis in aquis, quæ in utero sunt, diu manet, facile hæ cerebrum refrigerantes hunc generant affectum.

*Pars af-  
fecta.*

§. 2. Pars affecta est caput, & quidem quoad nervos ac vasa lymphatica in eo perreptantia, serum enim, sive aqua vellymphæ in ventriculis cerebri extravasata & cadaveri a latet, aut aliquando intra cerebrum & meninges continetur, in aliis intra meningem crassam & tenuem, & in nonnullis intrameningem crassam & craniû aqua hæccolligitur, quin extra cranium quoque detinetur, unde vasa necessario debilitantur, quæ debilitas duntaxat in inconstantiâ pororum consistit, ita ut facile mutentur, & improporionatas particulas liberius transmittant. Sic vilcerum etiam debilitas consistit in ejusmodi pororum tubulorumque inconstantiâ & obstructione.

*Diagnosi.*

§. 3. Si uno remedio omnis tollerentur affectus, cuj Universali illæ putant nullis carere possent difficultatibus, nec enim causarum cognitio tantum temporis sibi vendicaret, neque ad bene medendum quicquam prodesset *Signorum* doctrina. At quam vana hæc sit expectatio, jam cuilibet notum est; firmo proinde stat talo tritum illud: Tantum quisque curat, quantum cognoscit. Imminentis Hydrocephali signa in Democriti puce latent sepulta, nec nisi *sexagesimo* artificiali erui queunt. Desuntur hic à rebus naturalibus, non-naturalibus & præternaturalibus, vulgo sic dictis, quo enim hæc diligentius considerantur, eo certius de adventu hostis ferri potest iudicium, si verò jam præfens fuerit hic affectus, tum facile in sensus incurrat. Affectus hic infantibus puerisque Trachitide simul laborantibus familiaris & sollemnis est.

Tumor si adelt mollis, ad digitorum contactum cedens, materia latet inter pericranium & eutem, sin inter cranium & cerebri membranam continetur aqua, tumor ad tactum non est mollis, nisi valida hæc compressio, tum enim impulsus cedit, cum cranium infantum adhuc sit tenerius, & maxime futuris dilatatis. Dolor quoque in iis major, & totum caput tumidius, & frons ipsius prominens est, oculis videtur intentis, & frequentius lachrymantur, sensus ferè hebetantur ac sopore laborant, vixque caput sustentare queunt. Causarum ratione, illum, qui à sero extravasato ortum habet, ut plerumque fit, facili Marte conjicies casus, ob quas contrahitur, & præsertim in pueris, qui humidiores sunt, præterea ex effectis, quod ubi præmatur ejusmodi tumor, sentitur veluti aqua fluitans. A con-

tusione, plagâ aut compressione qui oritur, certa cruoris præbet vestigia. Hoc ergo fateor, inquit *Fallopini*, mihi ipsi evenisse, & factum esse in meratione & causâ matris, dum scil. uterum gerens, abdomen aliquo in loco percussit.

§. 4. Quoad Causas hujus affectus, *Galenici Causa* h. ratiocinantur eam esse humorem aquosum, & *cundum Galenico* veluti serum sanguinis, modò purum, interdum tamen scæcilentum & sanguine dilutum, vel ab aliis partibus eo transmissum, vel, quod frequentius accidere volunt, ibi paulatim collectum ob debilitatem expultricis & cava, unde exire debet, interclusa.

§. 5. *Paracelsi* est inundatio aquæ resolutæ, vel toris humidi, inflat pluvie à stellis in celo microcosmi interiore invisibilis, quibus Luna præsidet, nimium profusi & densi, & in cerebro, ab hisve capitis cavitatibus flagrantis.

§. 6. *Helmontii* est latex ex cruore extravasato & corrupto productus, extra vitæ consortium rejeclus, & per occasionem quandam valide ita dirigentem, cum aliis proprio gravatus pondere deorsum properet, in ipsam capitis cavitatem impulsus, vel proprio quodam errore partis in cerebro pronatus; cruor enim extra carnem in locolibero statim grumescit, mox dein aridior factus induratur, fermentumque virulentum concipit, unde *Archeus* hydropem capitis suscitatur.

§. 7. *Willisus* eam in hoc affectu potissimum

statuit serum sub propria formâ ex vasis, scil. lymphæ ductibus, exsudans, ob cacochymicam quandam corporis constitutionem sanguis aquosus & debilis serum superfluum è compage suâ passim dimittit, & ab arteriarum osculis laxis & patentibus ejiciens circulationis filo excludit, à quo ob specialem quandam ejus diathesin, cerebrum præ aliis cavitatibus tum occupatur, nonnunquam etiam ipsis ejus penetrabilibus intactis partes capitis exteriores, interstitia videlicet inter cranium & pericranium, aut pericranium & cutem ab illuvie istâ serosâ inundatur.

§. 8. *Sylvius* hujus affectus causam assignat va-

forum lymphaticorum obstructionem, ab humore quodam viscido variis de causis in ea illato, unde in iisdem stagnans lymphæ vitatur, vasa distendit & mox rumpit, sicque liberam viam inveniens intra cavitatem capitis, tanquam loci, in teneris infantulis propter peculiare quoddam vitium tum præ aliis magis apti, præsertim ob vicinitatem vasorum ruptorum, effunditur, & quod major ejus copia extra cranium pervenit, eo etiam cutis & pericranium fortius distenduntur & moles capitis augetur.

§. 9. *Cartesii* sententia de causis hujus

affectus à priori ista non multum albidit, existimant enim fieri posse, ut humores serosi seu lymphatici propter obstructionem vasorum capitis, per quos in statu sano aliis commode affluere, loco verò & tempore id postulantibus, etiam absque ullo impedimento & morâ iterum effluere debent, modò in ventriculis cerebri majori copia colligantur, modò extra illud in aliquam aliam capitis partem rejiciantur & cumulentur. cum fibræ omnes in infantibus adhuc teneræ & molles existant, atque corpori fluido copiosius & impetuosiùs occurrenti facile cedant, & ab eo seduci & flecti permittant, unde caput in ejusmodi tumorem attollitur, præsertim cum ipsa etiam cranii ossa in recens natis infantibus videantur membra-

membranosa, ut ita facile à copiâ humorum validius affluentium extendantur. Lympha verò ob defectum spirituum in sanguine augetur, tota enim illa sanguinis pars, quæ vividis & subtilioribus istis partibus est privata, facile crassescit & in phlegma huiusmodi facessit, quod ob matris debilitatem in ipso etiam utero milero infanthulo quandoque solet obtingere.

§. 10. Optimam, ut ego arbitror, opinionem fovent, qui ejus generationem tum ab obstructione nervorum & lymphæ ductuum, tum à lymphæ extravasatæ & lymphaticis valis ruptis deducunt, ceu in hydrope abdominis, affectus enim hi dumtaxat loco differunt, si enim in exteriore parte capitis oritur obstructio, tum serum stagnans in tubulis partium externarum, ibi tumorem & leucophlegmiam excitat; quando verò in cavitatibus cerebri oritur, lymphæ ibi deposita tubulos cerebri & nervorum extrinsecus quæ latentius compingunt, & sic aliquando angustabit nervos, quare senium torpor & macilentia corporis inferioris oritur: ruptis autem valis lymphaticis in cerebro, quibus id abundat, contingit lymphaticum liquorem effundi in locum sibi vicinum, hoc est, in cerebrum, vel intra membranas, vel etiam intra cutem & cranium; lymphæ ductus enim diutius obstructi, quia valde fragiles sunt, facile rumpuntur & aquas suas expiunt, prout in pueri secundum annum nondum egressi cadavere Lugdundi Batav. vidi 4. libras extractas aquæ subfalsæ & limpide, quod & annotavit D. I. van Horne P. P. Leidenis. Confer. Ephem. Ann. 1. Observ. 47. S. plura exempla capis, adeas Dn. Stalpart, Obs. rarior. p. poster. Obs. 14.

Extra omnem dubitationis aleam positum est, affectum hunc, ut hydroper, plerumque causam agnosceat violentam solutionem continui ex ipso humore, vel plagâ, vel contusione, hinc & pueruli maxime familiaris, quando ab obitetrice in puerperio caput rudius contrectatur & quasi compingitur, quod tamen aliâ Hydrocephali referri nolunt, quia tumor ille non est à sero, sed à sanguine extravasato, vel ob partus difficultatem, vel ab obitetricis infelici manu. In particulari hoc capitis hydrope serum, seu commune recrementi & alimenti vehiculum peccare certum est, utur id pro contentorum seu miltorum ratione nunc chylosum, nunc mucosum, nunc cruentum, nunc lutosum, nunc alio modo affectum deprehendatur. Lymphæ hæc ut plurimum colligitur in capite ob deficientem insensibilem transpirationem, nonnunquam ob impeditam urinæ excretionem, quale exemplum non ita pridem in filia anni observavi, quæ etiam diutius feliciter pristinæ restituebatur sanitati. Vitium etiam hoc primordia sua habet ex vitiosa hæmatosi, ubi chylus seu lac non rite assimilatur massæ sanguineæ, & sic extravasatur in capite, circulante enim sanguine attentata certis in locis lymphæ extravasatur, & extra vasa cum vehiculo seroso subsistens sanguis tumorem talem aquosum infert; lymphæ enim quandoque in suis valis ab acido vel frigido inspicitur, non aliter ac brodium carnis acri frigido expositum.

Nunquid id serum tantum ex valis lacteis seu lymphaticis, an vero etiam ex arteriosis extravasetur, non meretur meditationem; existimamus cum ex utrisque fieri posse extravasationem & stagnationem hujus lymphæ aquæ. Non dubitamus etiam in his digestione in primis vas esse lacum,

utpote quæ aliis innumerorum morborum faber existit.

A flatibus posse caput in molem extendi patet ex Obs. 18. Cent. 3. *Hildani*, de artificioso scil. hydrocephalo, dum nefarius quidam nequam cutem capitis infanthuli sui circa verticem ad musculi usque incidit foramine parvo, per quod ore fistula inflavit cutem capitis, & formacem cerâ artificiosè obturavit, unde caput in maximam extendebatur molem, quod cunctis hinc inde per Galliam quæstus ergo visendum exhibuere isti parentes, explorato autem scelere Parisiis ambo morte multati fuere: sed hoc rarum est.

Ut plurimum verò tumor hic aquosus eandem agnoscit causam, quam habent reliqui tumores aquosi, si enim aqua colligitur in abdomine, Ascites; si in pectore, Hydrops pulmonis, in umbilico Hydromphalos, in seroto Hydrocele à Medicorum filiis nominari solet; differunt enim hi affectus tantummodo loco, & eandem communiter obtineant originem. Sæpe etiam nervi quodammodo sunt obstructi, hinc spiritus animales non satis promptè per nervos ad partes nutriendas deferuntur, ad humores circulates requisito modo propellendos.

Quod hæc aqua in ventriculis cerebri sæpe contenta non efficiat apoplexiam, ratio hæc est, quod respectu aliarum aquarum aliquomodo sit spiritiosa, neque subitò, sed sensim in cerebro colligatur. Hydrocephalis ergo nostro iudicio abortitur, quando serum cum sanguine ad caput delatum sub cranio, vel extra illud subsistit, & expansio coeretur, cerebri tubuli obstruuntur, in dies majori copia colligitur, quæ spirituum animalium capitis integumentum valde distenduntur.

§. 11. Quo quis certior est de futuro ægri statu. *Pregnus.* tunc circumspiciendi curam aggredi rectè præsumitur. Affectus noster in genere perperis, certe periculo non caret, quia ætas tenella, quam ut plurimum occupat, huic oneri ferendo impar, communiter succumbit, hinc omnes infantes hoc affectu laborantes mortuos esse vidisse ingenuè fateatur Medicus *Ingraffius* dicitur *trist.* 1. c. 1. *Conm.* in *Avicenn.* de *Tumor.* Confer. *Senneri* l. 1. *Prax.* p. 1. c. 18. *Paracelsi* operat. *Chirurg.* c. 1.

Tumor quotidie increfcens, pro malo habendus est signo: Vidi puerum, inquit *Rhesus* 1. de morbo. pueror. cuius caput non cessavit augmentari, quousque mortuus est.

Si lymphæ in ipsa cerebri penetralia decumbat, de restitutione conclamationum esse omnium Medicorum fert sententia.

Si circa nucham lymphæ hæc sibi rapuit imperium, metus est obstructionis spinalis medullæ.

Affectus hic totam capitis peripheriam occupans, multa in recessu habet vitæ discrimina. Dimidium capitis laborasse vidi; cuius rei bina exempla proferet *N. Tulpus* *Obs. Med.* l. 1. c. 25. Quod si epilepsia, apoplexia aut lethargus huic se associet morbo, non fallaces mortis sunt prodromi.

Sanguis è naribus stillans de feri testatur acrimonia. Breviter aliquando hic affectus terminatur, sed & nonnunquam per longum durat tempus.

§. 12. Quod viatoribus statim mercuriales, id nobis in præsent negotio erit incedendi methodus, quæ consistit æque in Diætâ ac Pharmaceuticâ & Chirurgicâ: Res enim non-naturales cou-

*Cura Dietetice.*



# 4    *ENCYCLOP. CHIRURG. RATIONAL. LIB. I.*

stitutionem corporis immutare, & labefactam iterum restituere possunt. Aërem agrotis nostris commendandum calidum & siccum vulgò ita dictum, quòd si naturà non talis, arte alterandus. Intemperantiæ, in pueris adeò solenni, nisi frenum impiciatur, inanis erit curatio. Ante omnia frigidus vitetur potus, exulent cerevisia tenuis, decocta hordei, Julepi, &c. Cibus sit talis, qui non multum aquosi humoris nec salis suppediat, ideoque boni & utilis succi, ut sunt carnes gallinæ, hœdinx, vitulina, perdicum, &c. Liquidorum visus sit moderatus. Vinum assuetis parca manu exhibitum nihil fac esset negotii. Motus & quies, somnus ac vigiliæ mutus se excipiant amplexibus. Animi affectus ne tyrannidem exerceant, maturè prospiciendum. Debitum lunare in adultis iusto solvatur tempore, fervorem enim sanguini concitare solet consuetudo eæ uatio suppressa, unde impetuosior feri effluxus.

*Curatio Pharmaceutica & Chirurgica secundum Galenicum.*

§. 13. De instituenda curatione, tum Pharmaceuticâ tum Chirurgica, primi sententiam proferant veterum follicite adeò prementes vestigia, ut propter famosum illum Antesignanum, à quo vel latum unguem secedere iis sapè putatur religio, titulum *Galenicorum* vulgò promeriti fuerint, quæ eò potissimum vergit, ut removeatur causa, qua detracta & morbum & symptomata finiri dicunt, quapropter humorem aquosum, à quo tumor ille pronatus, exhaustiendum volunt, hæc tamen adhibita circumspectione, ut ratio habeatur totius corporis, prohibeatur, quæ ne aquosi istius humoris copia ulterius in corpore contrahatur, & pani contracta, vel per hydragoga, vel diuretica evacuetur. Inter hydragoga laudant brassicam marinam, succum iridis, lambicis, elaterium, parca tamen manu pueris data. Diuretica illis sunt radices apii, alparagi, corniculi, petroselinii, alari, anisi, ex quibus vel decoctum vel insulum parant in aqua communi, eamque bibendam exhibent, addita portione quædam syrupi de 2, vel 5, radicibus. Habitâ deinde corporis ratione ad exhaustiendum aquosum humorem in capite contentum progrediuntur, & quidem si paucus est, obscurè per medicamenta digerentia, oleum nempe chamomelinum, anethinum, rutaceum, lauræum, cataplasma ex farina hordei, fabarum, lupinorum, iridis, sulphure ac melle. Exempli gr.

℞. Ol. Chamomill.

Aneth. aa. ʒij.

Qui ʒj.

M. & calide innigatur locus bis in die.

vel:

℞. Pulv. absinth.

Camomill.

melilot. aa. ʒij.

butyr. recent.

Ol. Chamomill. aa. ʒiiij.

Ceræ parum, & ad ignem f. Unguentum.

℞. Alab. lbß.

sals ʒß.

Pulv. origan. ʒiij.

M. & tepide innigatur locus affectus.

Alii:

℞. Pulv. absinth.

Camomill.

origan. aa. ʒiij.

myrtillor.

ros. rub.

melilot. aa. ʒj.

Ol. Chamomill. q. s. ad incorporacionem,

cum pauco butyro & adjecta cerâ f. unguentum.

Post inunctionem inspergunt pulverem ex myrtillis, ros. cinnamom. caryophylli. Camomill. Aquosus autem humor li adeo multus est, ut medicamentis absumi nequeat, per Chirurgiam eum educere docent, & quidem si inter cutem & peritæranium continetur, vel cauteriis cutem aperiunt, & stillando humorem exhaustiunt, vel scalpello, lineâ transversâ per medium tumorem ductâ; si verò inter peritæranium & cranium seu calvariam residet, vel duas lineas ducunt instar literæ X. vel tres in figuram literæ H. Intra calvariam autem & meninges si subsistat, non modò calvariam nudant, sed etiam de ea aliquid excidunt, ut humor exitum invenire possit. Eductio sic humore locum jubet exprimere, & sanguinis fluxum cohibere, perfundendo eum vino & oleo, ut, si quid influat, itid repellatur, hinc sacroticis carniæ restitunt & tandem cicatrice claudunt.

§. 14. Sequitur magnus ille hydropiscus dominitor putatus *Bombasius* ab *Hobentium*, live *Paracelsus*, alto supercilio præcipiens specifica adhibere purgationis, & specifica tumoris. Laudat ergo Essentiam suam ex alahandal cum aqua præcipitata, ut morbi abeat origo. Purgatione evacundum saltem vult superfluum, ut postmodum facilius perveniat ad curam, idque in primis per Helleborum. Hinc indes Essentiam ʒi, ʒii & diacubebæ administrat. Cataplasma parat ex Rebis columbarum in † rosaceo. Summum postea addit specificum nempe Spiritum vitæ ex auto extractum, data similî operâ, ut id, quod laxum est, restitueretur.

§. 15. Arduum erit ex arcanonum illo custode diligentiſſimo *Dn. van Helmont*, pro abigendo hoc morbo aliquid nunc elicere, tantum enim ab illo vix impetrare licet, unde hariolari possimus, ejus scopum curatorium esse, latere extravasatum, & cruorem reſolutum ad convenientes vias reducere, Archeumque placare, ut eundem absque impedimento dimittat, præcavendo simul, ne ulterius aliquid cruoris extra venas inter partem illam influat, ibique contrumpatur. Inter remedia hæc præstantia, tanquam læto quodam sidere ad eorum manifestationem permotus, commendat bryonium albam, abs qua vitæ solutivum ablatum fuerit, cum illa rala contusio- nis, in qua cruor subter pellem uigilat, inposita, paucis horis cruorem illum reſolvat in aquam, eundemque pariter per cutem exeat. Antimonium etiam primo in liquorem versum, & postmodum in pulverem solimmodo per sudorem purgantem, uti omnem hydropem, ita & hanc ejus speciem extramectum recidivæ modeste tollere ex propria observatione promittit. Magnis insuper laudibus extollit Præceptum diaphoreticum Paracelsi, variis morbis depellendis unicè aptum atque sufficiens.

§. 16. Londinensium decus & Practicus ille *Curandis* felicissimus *Thomas Willis* affectui huic consulturus, juxta communem medendi methodum tres ponit indicationes præparatas, curatorium nempe,

*Curatio secundum Helmontium.*

*Curatio secundum Helmontium.*

*Curatio secundum Willisium.*

# CAP. I. DE HYDROCEPHALO.

5

venipe præservatoriæ & vitalem. Prima aquas in capitis cavitate collectas debito modo evacuandas respicit. Secunda ne nova ibidem colligatur illuvies præcavet. Tertia vires instaurandas, & symptomata eas lædētia collit. Primæ indicationi ut satisfiat, duos agnosce evacuandi modos. quibus aquarum illuvies educi potest. scil. ut vel vasa & humorum ductus inaniti lympham rarefactam resorbeant, & dein foras convehant, vel ut per sectionem aquæ istæ in propria specie educantur. Prior modus obtinetur per purgantia, diuretica & diaphoretica inethodice & per vices exhibita, quibus adjungi, vel interponi debent cephalica attentantia & calefacientia, quo humorum superflui ad evaporationem disponuntur. Sint formæ purgantes.

℞. Rad. arifol. ror.

Imperat.

Calam. arom.

rufci aa. ʒiʒ.

sol. beion.

rorismarin.

lantri.

majoran. aa. mʒ.

flor. stachad. Arab.

sem. ebul. ʒv.

bacc. ʒump. ʒiij.

M. & debite apparatus coq. in aq. font. lbijj. ad tertiam ferme partis consumptionem, Colaturæ add.

sol. fen. ʒiʒ.

Acar. ʒij.

Mecboac.

Turbid. aa. ʒiij.

santal. citr. ʒiʒ.

galang. ʒi.

ebulliant clausæ per horas ij. dein coentur

& add. Mel. opt. ʒij.

Clarificetur cum albumine ovi, f. Hydromel purgans, de quo dentur aliquot uncia pro ratione ætatis bis vel ter in septimana.

In ætate provectionibus adhiberi possunt pilule, & imprimis sequentes:

℞. Calamelanos ʒj.

Resin. jalapp. ʒiʒ.

Cum f. q. Gummi. Ammon. ✱ solat.

f. Pilule iijj. Sumantur mane.

Inter Diuretica sequens Pulvis reliquis præfertur:

℞. Salis succini.

Sal. nitri puriss. aa. ʒiʒ.

f. Pulvis Dos. ʒj.

Laudatur quoque Tinctura Salis ʒi.

Diaphoretica præstant ex huius, vel pulvere viperarum & bufonum. Vel:

℞. Spir. Ceras. nigr. ʒiʒiʒ.

bacc. ebul. ʒiʒ.

Dos. ʒi. 20. vel 30. vel plures pro ratione ætatis & habitus corporis.

M.

De modo sectionis nihil peculiare docet, illaque pro more aliorum, necessitate id exigente, institui solet. Nova illuvies optime præcavetur ictu idoneo, calefaciente videlicet & siccare. Vires reitaurantur salibus volatilibus & spirituosissimis, ex cornu cervino & cranio humano parata.

§. 17. Querendus jam Lugdunensis Apollo nobilissimus ille de Bœ Silvius, cujus responsum postulat, ut ruptio vasorum, ex quibus aqua illa in partem influxit, consolidetur, sicque ulce-

rior affluxus præcaveatur; deinde ut lymphæ in capitis cavitatem ipsa evacuetur, vel per medicamenta diuretica & diaphoretica, vel per sectionem; denique ut referetur vasorum obstructio. Rupta igitur vasa optime uniuntur & consolidantur ad tringentibus ex radic. tormen-  
till. biffor. caryophyllat. fol. myrti. equiseti flor. rosar. balanst. nuc. cupress. myrtill. capul. gland. &c. Educitur lymphæ potissimum diaphoreticis, tum internis, tum externis. Inter ista præ aliis conducunt quæ actiora sunt, & vi aromatica, prædita ut sunt ligna & cortices Guajaci, Sassafras, Juniperi, &c. Item radices apii, fœniculi, imperatorie, angelicæ, &c. quæ quacunque formâ maxime tamen liquida parata, sedulo adsumi debent, ut perpetuo quodam insudore sint ægroti, ita enim corporis pori servantur aperti, & via expellendis aquis patet; sin sudores intermittuntur, pori clauduntur & aqua iterum augetur, huic maiore labore & molestia novus exitus postmodum parandus. Quò facilius autem alliciatur sudor, prioribus addenda spirituosissima penetrantia & sale volatili abundantia. Formula quædam est talis:

℞. Rad. sanic. ʒj.

Imperat. ʒv.

angelic. ʒiij.

ligni sassafr.

junio aa. ʒvj.

Cort. Guajac. ʒiʒ.

sem. Card. ened. ʒij.

Coq. in f. q. aq. comm.

In Colatur. lbij. dissolv.

mell. anthos. ʒiʒ.

add. Spir. ʒump. ʒiʒ.

Sal. armon. ʒiʒ.

M.

Detur singulis diebus mane quantum sufficit pro ætate & a positione ægroti.

Externæ etiam fotus institui possunt, vel facculi & emplastra capiti imponi, imprimis facculi ex floribus, seminibus, foliis, radicibus & similibus aromaticis in pulverem redactis, & cum sale tincto aut cineribus multo parati & calide applicati. Sal tostum enim potentissimè aquas ad se trahit, quia omni humiditate privatum est, in cuius locum venit aqua in capite contenta. Sectio si instituitur, ne aqua majori copia educatur, cavendum ne subito illa evacuetur, sed per vices, ne æger de vita periclitetur. Obstructionis vasorum referatio perficitur solvendo pituitam in vasis coagulatum, eandemque inde removendo. Pituita coagulata solvitur medicamentis incidentibus & attenuantibus dictis, partim sale lixivio, tum fixo, tum volatili, & imprimis oleo seu aromatico præditis, partim acidis, partim spirituosissimis, partim ex variis hisce mixtis. Talia sunt ex salibus fixis Sal Card. benedict. absinth. rorismar. &c. ex volatilibus ea, quæ ex urina, Sale armoniaco, Cornu Cervi, Cranio humano, lucino & similibus parantur. Ex salibus volatilibus oleosis, olea itilactia, imprimis ex aromatatis, seminibus, baccis, lignis, radicibus parati. Ex acidis, Spir. Salis, nitri, &c. Ex spirituosissimis, ipse Spiritus vini, tum ex quibusvis plantarum partibus fermentatione elicitis. Ex mixtis tartari vitriolat. Sal armon. Aquæ theriacales, antinephriticæ, &c. ut & compositiones ex prædictis, nunc Mixture, nunc Apozematibus, nunc alterius potioris formæ instituat. Pituita, vel ex ea resoluta serum redundans diminuitur evacuatione, & quidem in hoc morbo potissimum.

A 3

potissi-

potissimum vel per fecesum, vel per urinas. Ex illis, quæ per fecesum educunt, præferuntur & us dulcis cum gummosis formâ pilulari adhibetur. Per urinas egerunt dicta diuretica ex rad. apii, asparagi, petroselin. fœnic. eryng. rusci, valerian. pimpinell. urtic. &c. fol. urticæ, chæresol. absinth. beton. chamæpith. rutæ, &c. sem. anis. fœnic. dauci, fœlic. &c. Bacc. junip. ribel. nigr. amygd. amar. nucl. persic. & terebinth. Ex Chymicis Spir. Salis, tartari, vitriolati. Sal. volat. ☿, Ol. still. bacc. junip. succini. His prudenter adhibitis, semper blandè & lentè procedendo affectum hunc domari posse confidit.

*Caricæ  
norum de  
curatone  
Hydroce-  
phali sin-  
tensis.*

§. 18. Restant nunc acutissimi & subtilissimi Caricæ præmentes vestigia paucis interpellandi, ut in commune ægrotorum bonum aliquid de suo conferatur huic affectui depellendo commodum, sive sit consilium, sive auxilium quoddam præfinitissimum. Pro faciliiori quæ præstandâ in edela, tria hi proponunt in affectus hujus curatio maxime observanda axiomata. Primum est, ut lymphæ copiosius in partem illapâ, etiamque in tumorem distendens, commodè evacuetur. Secundum, ut obstructio ductuum & valvulorum lymphaticorum tollatur, quo liquorem extravasatum libere resorbere, & quo decet, valeant deducere. Tertium, ut copiosior, quàm œconomia animalis exposcit, lymphæ proventus inhibeatur, promovendo sanguinis suppressionem aut impediam spirituscentiam, ipsorumque spirituum deflagrationem aut exhalationem excedentem interceptando, ne massa sanguinea iisdem nimis depauperata fasciatur in phlegma, sed servatis spiritibus ipsa pars affecta corroboretur. Evacuatio humoris est vel sensibilis, vel insensibilis, utraque vel per internam, vel externam instituta. Sensibilis interna fit per alvi egestionem & per urinam. Egestio per alvum instituitur per gummosa & mercurium dulcem in infantibus, per elaterium verò, succum iridis, ebuli, aliaque in robustioribus. Dant formulam in infantibus adhibendam sequentem:

℞. *Sil. dulc. gr. viij. ad 3℔.*  
*Sal. cent. min. gr. iij.*  
*Syr. ros. solut. l. de Spir. i. cervin. 3iij. l. 3℔.*  
*M. Exhibeatur una vice.*

In robustioribus.

℞. *Extract. Elater. 3℔.*  
*trochisc. albandal. gr. ij. l. iij.*  
*Cum s. q. Essent. rosiformar.*  
*f. Pilula vi. l. plures una vice sumenda.*

Suadent etiam Glysmata ex rad. aristol. apii, Ireos nostr. herb. gratiol. sudanell. fol. ebull. asari, flor. genist. sambuci, cort. inter. frangul. & pulp. colocynth. Per urinam excretio promovetur lixiviosis, item Tinctura ebuli & ʒi. Insensibilis excretio interne instituitur diaphoreticis & poros cutis aperientibus, ut exhalatio promoveatur, ex lignis, sambuco, junipero, bezoardicis, &c. Exempl. gr.

℞. *Aq. rosiformar. 3j.*  
*Essent. lignor. 3j.*  
*Sp. flor. sambuc. 3ij.*  
*Tinctur. ʒi ʒj.*  
*Syr. Card. bened. 3iij.*  
*f. Mixtura. Sumatur coelestatum, corpus ad sudorem disponendo.*

Laudatur etiam Tinctura diaphoretica *Mynsichi.*

Ut facilius sequatur cura junguntur his externa. Sic insensibilis evacuatio per externa fit discutienti bus formâ fortis, vel cataplasmatibus, vel emplastr. adhibitis, ex camomill. majoran. origan. melilot. roremarin. stœchad. Arab. farin. fabar. lupinor. sterc. columbin. sem. anis. cumini, &c. Commendantur Fotus ex lixivio calcis vivæ, & illitis spirituosorum, ut Essent. saly. roremarin. majoran. puleg. Olei Balsamici *Mynsichi.* Emplastrâ de baccis lauri & de beton. cum oleo succini minimè contemunt. Sensibilis evacuatio externe instituitur sectione, quæ facilius & felicius peragitur aqua intra cutem & pericranium aut pericranium & cranium subsistente, eâ autem intracranium & cerebrum, vel in ejusdem ventriculis commorante cautè admodum administranda, cum vix absque periculo peragi possit. 2. Obstructio valvulorum corrigitur reolventibus tenacem & glutinosum succum in iis contentum, aliisque deobstruentibus, ut magisterio ʒi ☿ lat. Zvvelff. ʒio ☿ Oari, Sale ʒij, Sp. ʒij, &c. 3. Lymphæ ulterior proventus inhibetur & spiritus augetur variis salibus volatilibus & spirituosus ex roremarino, melissâ, Sp. ʒci. C. C. Sale succini volat. Sit formula una, vel altera:

℞. *Aq. beton. 3j.*  
*meliss. cum vin. 3℔.*  
*vite Matthiol. 3ij.*  
*Essent. rosiformar. 3℔.*  
*Spir. ʒci cinamomiat. 3j.*  
*C. C. essentificat. 3℔.*  
*Syr. flor. Hyperic. 3vj.*  
*f. Mixtura. Datur coelestatum.*

℞. *Tinctur. flor. Tunic. 3℔.*  
*Essent. Xylæolæ 3j.*  
*Liq. C. C. succinar. 3℔.*

*M.D. gr. 20. vel 30. in jusculo pulli gallinæ cum roremarin. majoran. & macu decocto, vel alio quodam vehiculo convenienti.*

§. 19. Cura Hydrocephali nostre judicio consistit in obstructionum solutione, ubi observandum, *nostra.* ut cautè & lentè procedatur, si enim velis subito curare, ac aquam unâ vice evacuare, hominem in maximum vitæ periculum proterdes, quia limpidi aqua evacuat & crassa instar gelatæ amuræ intus latens conglutinat fibras partis ita, ut oriuntur incurabiles obstructiones. Præmittamus ergo prius medicamenta, antequam ad ferrum & ignem accedamus. Impossibile autem est affectum hunc tollere materiâ relicta, quæ ipsum fovet. Ab evacuandis faciemus ergo initium, inter quæ palmarum præcipit salappa. in infantibus purgans tutum ac jucundum, quæ maritari potest pulv. cinab. nativ. hic & multum præstat syr. de lpin. cervin.

Ritè ergo exploranda est ipsorum natura, si enim purgantia bene ferunt ægri, sæpius ea exhibenda sunt, iisque semper admisceatur aliquid ʒi dnl. qui potenter incidit, concedendo enim inducias morbo, nunquam pacem sperare licebit, & quo major est collectio aquæ in particulari hoc hydrope, eo fortior poterit esse purgatio: præstat enim semel & fortius purgare, quàm sæpius & leniter. Verùm si cancerolam, hoc est, acrem suspicis sanguinis diathesin, ab his abstinere, præsertim in sexu feminæ, quæ purgantia ratione usui non bene ferunt. In pueris & infantibus sæpe sufficiunt clysters.

*Præ-*



Præmissis purgantibus totius rei cardo vertitur in incidentibus & diaphoreticis, inter quæ reliquis præferuntur amara, ad quamcumque ergo intentionem obtinendam conducunt ab-synthiaca, sambucina, ebulina, Juniperina, Gratiola, centaur. min. cerevisia absynthites, vel enulata, vel faliata, item agrimonia, Ruta muraria altera maxime conducunt. Hic & convenit Effentia rad. vincetox. & Essentia lignorum quæ talis esse potest.

*Ras. lign. Sassafras, infund. Sp. lit. convall. & Spir. vin. f. Sp. serpent. Stet in digestionem per septimanam, postea filtra.*  
*Ras. lign. Sassafr. lbj.*  
*Santal. lbij.*

*Rad. Chin.*

*Sarsaparill. aa. lbj.*

*Herb. fumar.*

*ft. Sambuc. aa. miß.*

*Trerentur spir. vini q. sat. & infund. cum spir. vin. rectificat. Stet in digestionem, ex-primo, filtra & servetur.*

Abstinendum à frigidis & aquosis, Jurepis, aliisque acidis & incassantibus, è contra conducunt blandiora diætetica, salina & lixiviosa. Omnia quæ recentur inter cephalica, hic pos-sunt usurpari, ex. gr. liq. C. C. succin. Elixir Ce-phalicum D. M. Essent. Castor. bals. Nervin. n. Cinabarina, &c. hic & salia volatilia, item oleo-sa salina conveniunt. Ol. tartari per deliq. in potu ordinario ad aliquot guttulas instillarum egregiam asserit opera. Pro specifice habent Lapid. Ceraun. ziv. Spol. serpent. ʒss. pulverif. & M.

Præmissis his simul adiciamus Externa; præ aliis autem commendandum forem ex discutiendis, vel in formâ sicca vel in vino coctis. In formâ sicca capiti raso applicata conducunt, sabina, rosmarin. sal. sambuc. ruta, lavendul. beton. sem. cumini, vel sabina sæpe sufficit, vel coq. sac-culo prædictis repletus in vino, addito tantillo Spiritus vini, vel linteum in aquâ Regine Hun-gariz, hoc est, Spiritu flor. rosinar. tribus cohobationibus parato, tinctum, & repide applicatum, vel lixivium sarmentorum, vel ʒ. alb. ʒ. r. ʒ. ʒ. addas decoctis una cum Sale mixt. ʒviij. Sulph. vivi Calida enim maxime hic conducunt, & contra frigida capiti ini-mica existunt. Alii sudent fasciam Guidoni-s, in formam cucuphe concinnatam, quâ totum caput obvolvi debet, & quotidie nova fascia repetenda. Alii utuntur aliis exsiccantibus ex Mastiche, Gummi Junip. N. M. Caryophyl-ladan. pir. c. ol. mastich. in massam redigunt pro-ut, vel in formâ Cerati, vel Emplastri. Pro Cu-cupha sit sequens:

*R. Flor. Chamomill.*  
*sol. beton.*  
*ras.*  
*absynth.*  
*sem. nigell.*  
*coriand.*  
*sumini aa. ʒß.*

*M.*

Tinctus sequenti cataplasmate impolito cu-ravit puellam binetrem.

*R. Pul. rad. cinem. ʒss. rad. aa. ʒß.*  
*sem. cumini. ʒi.*

*farin. faber. ʒij.*

*mell. anthes. q. s. f. cataplasma capis*  
*raso applicandum.*

Cochlex contusa in hoc affectu profunt, im-prime si iis contusis inspergatur pulvis fimi ca-prilli, & addatur aliquid seminis carvi, & ap-plicetur instar cataplasmatum. Vel sequens quod optimum:

*R. Ras. rad. bryon. ʒij.*  
*pulp. colocynth. ʒij.*  
*Herb. absynth. ruta aa. miß.*  
*sem. fœnic.*

*Sinap. aa. ʒi.*

*piper. long. ʒß.*

*Θ □ ʒi.*

*\*ci ʒvj.*

in viii. coq. vel urina. & fiat adjecta farina fabar. cataplasma, cui add.

*Spir. urin.*

*rosimar.*

*matric.*

*Sal. \*ci aa. ʒij.*

*M.*

*calide applicand.*

Erthina etiam suum usum hic inveniunt in adultis. Verum enim verò Hydrocephalus cum Trachitide combinatus in pueris raro purganti-bus, diureticis & aliis ad hydropem laudatis in-ternis, externisque, cucuphis discutiendis & vesicatoriis Capiti admotis cedit, sæpe verò in Apoplexiâ transit.

Nunc paulò consideratius ad Chirurgica acce-damus: quæcumque enim non sanant medica-menta, ea ferrum sanat; quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat: quæ ignis non sanat, ea incu-rabilia putare oportet. Tria nempe sunt, quibus Medicus agrotis auxilium potest ferre, Diætâ, Pharmaciâ & Chirurgiâ. Multi morbi interni solâ curantur diætâ, multi etiam curantur medicamentis, sæpe autem hæc duo non suffici-unt, hinc Chirurgia in auxilium vocanda est. Illa verò varios modos, diversaque instrumenta ha-bet, quorum operâ finem suum assequi intendit, qui itidem non unus est. Mihi in præsentiarum reliquis missis lubet pluribus considerare illam medendi rationem, quâ Chirurgicâ manu hydro-cephalo laboranti aqua subducitur, quam opera-tionem paracenthesin nuncupare licet, quia per punctiorem fit; per sectionem etiam fieri potest, cum citra periculum hæmorrhagiæ majoris aut doloris in hisce locis stupidiorebus operationem Chirurgicam intituere liceat: sive ergo scal-pello sectio faciendâ, sive cannulâ ex argento paratâ & ad acumen perforatâ à Barbette & van Mekeren delineatâ, pungendâ, ea ut à perito Chirurgo peragatur, prospiciendum est, qui studiosè attendere debet, ubinam continetur aqua, & quo loco melius efflere possit, ea enim sæpius instar gelatinæ viscida est, ut per cannulam effluere haud possit. Vultus latius sit necesse est; & asterisco hic notandum, quod semper faciendâ sectio in loco decliviori, ipse humor autem seu aqua non est simul & semel omnis e-ducenda, sed per intervalla, non horarum tan-tum, sed & dierum; habitâ in primis virum ra-tione. Interim æger corroborantibus ex conf. ros. absynth. diatr. Abb. aq. cinamom. mirabil. &c. restaurandus. Aquæ emittendæ quantita-tem neque diebus, neque vicibus metiri possu-mus,



mus, sed pro cuiusque ætatis & virium ratione humor educendus, si vero aqua intrâ cranium detineatur, cautè vel nunquam instituitur.

Quoad V. S. scarificationes, cauteriatum actus alia, tum potentialia, cucurbitulas, synapismos, &c. ea ut in Alcite, ita etiam hic mihi suspecta sunt, hinc omittenda potius censeo, quàm a grum talibus excruciare. Circa curationem hydroce-

phali optimum esse putamus, ut externè ab injuriis caput præservetur, & valde calidum servetur, & infantes in cuius decumbant, calidus lapis vel arena calida circa caput egri ponatur, ut obstructions iterum referantur, & lymphâ liberum acquirat cursum ac transitum. Sudorifera ergo volatilia, liq. C. C. succ. & Sal volat. C. C. omnem, ceu diximus, implent paginam.

## CAPUT II.

## De Pilorum Affectibus,

v. gr.

De Alopecia, Areâ, Ophiasî, Tinea, Calvitie, Canitie, Plica, Porriginè, inconcinna pilorum excresecntia, & eorundem Fissuris & Scissuris.

§. 1.

**P**ervulgatum & πολυδύναμον illud proverbium, quod dere contentibili & nullius semine pretin cottigie penè proferri percipimus, dum ne *Pili quidem* eam faciendam esse perhibent, nobis tamen tanti non erit valoris, ut ipsos Pilos, de quibus ne unus quidem absque singulari divina voluntatè capite nostro in terram de-aidit, id propter consideratione nostrâ indignos & sicco pede putemus transeundus, quin antequam ad alios progredimur, *Pilorum Affectus* examinandos & corrigendos suscipimus, nec veniunt nos adeo in illis intricatum iri, ut ex iisdem nos demùm non valeamus exsolvere, quamvis ob affinitatem, quam inter se habent, omnes simul junctos uno hoc in capite sumus pertractaturi, ita enim uno intuitu plures nobis eorundem apparebunt idèa. Describemus ergo istos ordine, quamvis fatemur, eos à veteribus esse præter necessitatem multiplicatos.

*Alopecia  
descriptio.*

1. *Alopecia* est Capilorum desluvium cum suis radicibus, à particulis acris salinis glandulas subcutaneas erodentibus obortit. Dicitur Alopecia à vulpe, quæ vocatur *Γραειάλοπος*, eò quod brutis hinc malum hoc æstivo tempore accidere soleat. Potest etiam fieri, ut in barba pili inordinatè decidunt, sicuti idem contingit in superciliis, aliisquelocis pilosis.

*Areâ  
descriptio.*

2. *Areâ* vocatur is affectus, in quo capilli areatim decidunt, à salinis particulis ad glandulas cutaneas pilosas delatis, easque cortodontibus exortus.

*Ophiasî.*

3. In *Ophiasî* ab occipite dux areæ pilis destitutæ per tempora utrinque ad frontem deductæ conspiciuntur, ab initio quasi serpendo progrediuntur, tandem verò in fronte uniuntur. Huic morbo infantes præ aliis observantur obnoxii.

*Tinea  
quid  
Germanis  
dicunt  
Grunder.  
Ejus species.*

4. *Tinea* est scabies capitis cum squamis & crustis, pilorumque evulsione, colore cinericio, odore fetido, ab humoribus acris & salinis oborta.

*Achor.  
Calvities.  
quid?*

Ejus aliquot species advertere licet, quarum alta dicitur *squmosa* seu *furfuracea* cum squamulæ scalpide decidunt; altera *fissosa*, in qua vivæ rubræque carnis quædam grana apparent, sicutum interioribus granis haud absimilia, tertia *Achor* dicitur, ubi ulcera manantia adiunt.

5. *Calvities* dicitur, quando pili potissimum in incipiente decidunt, atque à salinis & acris humoribus producitur.

6. *Canities* est consueti pilorum coloris in al-

bum commutatio, quæ vel ordinaria est in senectute, vel extraordinaria ante legitimam ætatem, vel à morbo animique affectu producta. Huc & referimus ubi pili etiam in alios mutantur colores.

7. *Plica* dicitur à plicare, quia hoc affectu *plica descriptio.* correptis pili quasi plicantur; vocatur quoque *Plica Polonica*, quia Polonis affectus hic familiaris est aliis Trichoma, Trice incuborum, Morbus circorum, capilli enim intricati circos repræsentant; Germanicè vocantur *Wichelspisse / Judenspisse* quia Judæi frequenter obveniunt & ab incubo Judæi specie fieri existimantur, nilque sunt aliud, quam capilli, (vel pili) ita in circos vel tricas contorti, ut extricari nullo modo possint. Describi ergo potest hic affectus, quod sit capilorum involuta contortio, cum gravissima totius corporis, artuumque capitisque litione, & antequam capilli complerentur, magno sudore plerumque concomitante, à lymphâ n. glutinosa oborta: non raro & alias partes occupat plica, cœn exemplum habemus in Ephræ. Germ. de plica pudendorum muliebrium, ubi crines in tantam excrevere longitudinem, ut sequeleteram ulnam excederent, & terram attingerent, tale quid & hoc die conspiciuntur Leidæ in theatro Anatom. Celeberr. D. L. Jacobus Augustinus Hönervvolfius mihi per litteras significabat, quod miles veteranus Sileius supem colligens ostiatim, prolixam & ferocem alebat barbam, & præter plicas ab occipite dependentes tres in mento gerebat unam spithamâ longiorem quam line noimento poterat amputare, reliquis vero plicas ob metum sublecutum doloris capitis, alijsve symptomatis, non audebat demere, quodammodo ablationem aliquot longiorum ejusmodi pilosorum in pagano Bergensi hic meminere innocuum.

Distinguunt eam in malignam & benignam, *Ejus species.* in plicam quæ est ex neglectu peccationis, vel arte factam, & plicam morbosam multis symptomatibus constipatam: quæ distinctio non videtur esse necessaria; Plica enim est plica.

8. *Porrigo*, aliis *furfuratio* dicta, est scabies furfuracea cutis, & præsertim capitis. Hinc dicuntur furfurosi, quibus assidue squamulæ veluti fursures pedendo capite decidunt.

9. *Inconcinna pilorum excresecntia* hæc est, *Inconcinna pilorum excresecntia quid?* quando pili in locis insolitis, & ubi eorum proventus minus decoris est, excresecunt.

10. *Fissura*

## CAP. II. DE PILORUM AFFECTIBUS, 9

*Figura  
quid?*

10. *Fissura* dicuntur, quando pili sunt fissi, id est, secundum longitudinem divisi, indeque deformitatem quandam præ se ferunt, in eorum potissimum extrinitate, quæ cum unita esse deberet, aliquando bifurcata, vel tricuspidata, vel in plures ramulos dispersa est: in mediis eorum, vel aliâ etiam parte nonnunquam contingere solet, ut findantur & asperi fiant.

*Pari affe-  
ctâ horum  
morborum*

§. 2. *Parti affectu* horum affectuum externorum ut plurimum sunt glandulæ istæ cutanæ, pilosæ à nobis dictæ, ab his enim male se habentibus & ab acerbis quibusdam humoribus seu lincis variè alteratis & corruptis, vel calvities oritur, vel alopecia, vel area, vel plica, vel porrigo, & totius rei cardo consistit in earum conformatione & pororum constitutione, seu ipsorum ductuum obstructione.

*Diagnosi,*

§. 3. Affectus hi plerumque in sensu incurunt, & desitium pilorum, vel scabies, vel phthirius, vel luem Veneream, vel Elephantiasin aliosque affectus malignos insequi solet; sic & Area, Ophiasis, Tinea, Calvities & Canities cognoscuntur ex ipso aspectu, iis saltem adhibitis signis, quæ in eorum descriptione jam memorata sunt. Plica etiam ex superioris dactyl descriptione facile cognoscitur, præterea plura eam comitantur symptomata & potissimum inorbosam, ab initio enim corpus evertatur, color faciei in pallidum mutatur, artus omnes dolore infestantur, nec non convulsionibus, caput inmunditie conspurcatur & fetore, furfures quoque generantur, & ungues simul infestantur, inungi, nonnullis tunc decidunt, & postea renascuntur; pili ab his si sanguinem & serum fundunt. In Polonia hæc species frequentior est, hiæ in locis eam nunquam prædictis Symptomatibus supratam observare licuit, furci cæcique redduntur ab obstruktionem nervorum à materia ista viciatâ pilos istos conglutinante, quæ materiam facile per metastasin genus nervosum occupare potest est. Sed hæc & alia Symptomata atrociora non omnibus accidunt, sed us, qui hoc affectu graiter laborant, nam à multis hinc ullo in incommodo ad ultimum vitæ halitum gestant.

*Tinea* horrendum visu sæpè niale est, & de se virulentum & morticinum aliquid effundit, cutem enim capitis & musculorum substantiam adeo infestat, ut sæpè rubra caro appareat, cæc ex descriptione superius illucis. Insuper instat vermis capillos rodit & cutem depascitur tam obstinate, ut à tenendo & inharendo quasi non in adepta videatur.

*nam  
statim  
val.*

§. 4. Priusquam autem affectuum horum causas describere tentemus, placet nobis paucis quibusdam in pilorum constitutionem ordinariam inquirere, dein & horum statum morbosum contemplari. Communis veterum fæc opinio, pilos ex fuliginibus oriri, quæ tamen hodie falsitatis arguitur, aut ita eam interpretantur, ut materia pilorum non sit fuligo, sed condensatus ex fuliginibus liquor. Nos credimus in glandulis subcutaneis pilosus latere certum viscidum humorem, non absumum ei, qui in typhis cervi invenitur, quod ad oculum patet, si liquor circa radices pilorum hærens ritè examinetur: pili enim modo generantur, ceu alix partes, humores semini per poros glandularum propulsi ab extremo ætæ aliquando condensantur, quod enim suas habent canales ceu alix partes, quod exinde apparet, quia sanguinem & serum fundunt. Si enim ope microscopii crines, & im-

primis eorum radices inspiciantur, filamentis cornu, imò gelatiæ simile quid repræsentatur, cum suis canalibus, qui liquor ab ære ambiente aliquando magis induratur, clauduntur enim pori cutis ob æris frigidioris accessum, reseranturque eo existente & occurrente calidior. Hinc in animalibus fit pili mutatio. Stat ergo sententia, liquorem istum viscidum in glandulis contentum & à spiritibus animalibus vigoratum, ope fermenti sui per poros cutis, per suos ductus in pilos transire, eosque successivè affluente dicto liquore sensim ac sensum crescere. Quo verò pori solidiores sunt eo pili hispidiores efflorescere solent; certum enim est, tægora animalium circa dorsum, ubi majores enascuntur pili, esse densiora ac firmiora, & è contra, ubi cutis enervata & glandulæ flaccidæ sunt, pili eisdem innati pauciores, minores & flaccidiores sunt. Quidam volunt pilos esse solidos & nulla gaudere cavitate, sed esse meros globulos, ceu testatur Læwenhoek, qui ope accuratissimorum microscopiorum eos cavitate carentes observasse se dicit: prior autem sententia mihi probabilior, quia alias eorum accretio non facile percipi potest.

§. 5. Perpensâ ordinario crinum statu, ad morbosum propius accedamus, ipsasque antecedentium morborum rimorur causas. Sed præcedat *Galenici* tribuentes *Capillorum deslucis* causam vel laxitatem pororum seu foraminum cutis, vel defectum alimentis, vel acerbis humoribus radices pilorum erodentibus. Laxitas pororum illis oboritur à caloris aut humoris excessu, ubi vel calor humorem glutinantem abluunt, & radices pilorum minus firmæ manent, vel humor nimius eosdem relaxat. Alimenti defectus fit, dum vel à morbis consumuntur est sanguis, vel humoribus corruptis in alimentum non mutabilibus infectus, qui si biliales, aut atrabillarii, aut ichorosi fuerint sunt, ipsas radices exedunt, unde pili radicibus destituti decidunt.

*Area* causa iis eadem est, sed magis unita, & *Area* ad certum spatium directâ, unde uno in loco plures decidunt, cum in simplici deslucio, pili hinc inde sparsum saltem deslucant.

*Ophiasis* causam statuunt materiam æream & *Ophiasis*, tenuem, non tamen undique æqualem, sed aliam tenuiorem, aliam crassiores, unde rectam viam servare nequit, impeditur enim tenuior à crassiori, ut in cursu suo moram patiat & oblique deflectat.

*Tinea* causam ponunt humorem pravam & *Tinea*, falsum inter crassam capitis cutem & calvariam congestum, qui diutius ibi retentus putrefcit, & non modo malignitatem quandam induit, sed interdum quoque vermes producit, circa radices autem capillorum impactus cutem quibusdam in locis rodit & perforat.

*Calvitiem* oriri volunt ex defectu succi nutritis, unde eo non adfluente, radices pilorum in tantum exsiccantur, ut unâ cum pilis excidant, quare cum per senium tanta istius succi non amplius fiat copia, ut ad partes illas carne destitutas pertingere valeat, fit, ut et ætate homines facile calvescant. Hujus etiam succi consumtionem ab aliis causis, tum internis, tum externis dependere posse concedunt.

*Canitiem* veteres fieri existimant à solâ siccitate, quemadmodum arborum folia ex siccitate albescent; alii, uti *Aristoteles*, canitiei causam dicunt putredinem. Fit ergo, juxta ipsos, canities

ob inopiam caloris nativi, quando non ita humores coquere potest, ut in juventute, & quod ex putredine humor albus oritur, ridiculam hanc allegant causam, quia magna pars in aërem vertitur, qui terrenæ & aquæ substantiæ permixtus facit albedinem.

*Plica.* *Plica* illis oritur à nimia copiâ & luxurie succi nutrientis in sanguine, unde pori dilatantur & multi in unum quoddam foramen secedunt, quare pili loco, quo copiosius ille exsudat & confunditur, conglutinantur, & conglutinati tandem in complicatas hujusmodi tricas concreverunt.

*Porriginis.* *Porriginis* causam nonnulli statuunt succum tenuem acrem erodentem, ex cute ad summam pelliculam penetrantem, eamque afficientem, partim ex visceribus in capitis cutim cum succo nutriente pilorum delatam, partim in eâ demum genitum. Alii humoribus serosis, biliosis & ichorosis eam adscribunt, quorum parte tenuiore consumta, crassior circa radices pilorum hæreat, & in squamulas abeat. At item istam nullo modo nunc aggredimur dirimendam, inferius, cum nos tegerit ordo, sententiam nostram subiuncturi.

*Inconcinna pilorum excresecientia* adscribunt materiæ excrementitiæ copiæ & crassitie, atque facultatis expultricis robori majori, excrementum illud fuliginosum, crassum & terrenum fortius ad cutem protrudenti, unde præter fordes etiam pili absque ullo instituto naturæ necessitate saltem materiæ sequuntur, uti herbe quædam non tantum absque omni diligentia, sed contra voluntatem quoque hortulanæ sponte nascuntur, materia nempe à facultate expultrice vehementius detrusa, sibi viam faciente, & cutem perforante, quod modo hoc, niòd in illo corporis loco contingit, cute ibidem ad perforationem habiliore, id est, mediocriter sicca existente, aut materiæ excrementitiæ inibi copiosius hærente.

*Figura.* *Fissuram* pilis obvenire volunt à materiæ eorum debili, tenui & glutinis experte, parvoque momento dissolubili, orta à temperamento corporis frigido, eoque vel humido vel secco.

*Paracelsi deductio causarum in Alopecia & Ophiasis.* §. 6. *Paracelsus* *Alopecia* ejusque specierum, tum *Area*, tum *Ophiasis* causam tribuit spiritui Jovis à naturalibus humoribus separato, & in mineram propriam transcurrenti, qui si in metallis operabitur, in cachinam; si in arboribus, in spongiam; & in humano corpore mutatur in *Alopecia*, materia nempe aliquantum dispersa, ea verò magis unita *Area*, & majores radices adepta, variosque succos sibi implicante *Ophiasis* producit.

*In Thesa.* *Tineam* statuit ex salibus provenire mineralibus, cum humore carnis & cutis liquore permixtis, postmodum expulsionem transcurrentibus in cristas; humor enim mineralis cum à proprio fale separatus in carnem se recipit, si hunc elementum ignem attripiat, eo per poros agit in cristas, quas sequitur fluxus capillorum, nec libenter emittunt sudorem. Quidam ex ejus affectis, quod affectus hic in cute capitis similis fiat, nec tamen in ulcus definit, à fale occidit, quod à glutinosa visciditate sulphuris reoluti cohibetur.

*In Calvitie.* *Calvitie* causa illi est resolutio summi illius, sive liquoris sulphurei, ex quo per calorem solis microscopici leviter siccantem convenienter coagulato, ut totum corpus compositum est, ita

etiam idem illud cum partibus sustentatur, & pili nutrimentum accipiunt, quod à frigore hyemis vel senectutis, vel ex nimia prodigialitate præcedentem coitum ducti, resolvitur & evaporat, vel aliorum defluit, ex cuius postea defectu ipsi pilarescunt & radicibus exsiccat decidunt; Jupiter enim benignus capitis hilari Solis in corde, radios contrahentis, ad speciem destitutus, tantum influxum spiritus vigorantis ad extremitates capitis ulterius concedere nequit, quare distributio debiti succi aut vaporum pilos alimentum plane cessat.

*Canitie.* *Canitie* causa est sal quoddam asperum, destitutum corpore suo sulphureo benigno, & spiritibus mercurialibus, à quo ipsi pilarescunt, accedente quadam constellatione ipsius Jovis, quod reliquorum planetarum microscopi, imprimis Solis lato & vivido aspectu, ut antea, non amplius exhilaretur, unde missis aliis coloribus, proprio & consueti suo colore, qui albus est, eosdem obvestit, in signum fatigati & deficientis *Archei*, colores aliis variè unientis, & pro placito suo in diversis subjectis distribuentis.

*Plicam* sequaces *Paracelsi* deducunt à succo quoddam sulphureo crasso conglutinante, nullo modo autem coagulante, quare interstitia quædam manent in venas postmodum secedentia, per quas ipse sanguis transitum quendam in illos invenit, & post incisionem earum exstillat. Cæterum verò in locis quibusdam certis cutem ita excoquere potest, ut hujusmodi gluten exudet, accedente imprimis aquæ dispositione, ex quo potus & cibi coquantur, iisque mediantibus hujusmodi succus viscosus in corpus ingeritur. Aquæ verò tales viscosæ ex luto putrefacto ortæ per se quidem tanta copia à terra non egrediuntur, ut fontes salientes ex iis oriantur, fortetamen portio ejus vividæ fontium aquæ immisceri potest, ut cum illatum simul hauriatur.

*Porriginis* causam *Chymici* dicunt esse resolutionem sulphuris in succo sanguineo, cum salis reverberant à mordacitate dispositi separatione, & modum determinatum esse ab originalis aëris inquinamento, quod in minutis particulis inverlam proportionem efficiens, resolutionem & separationem eam præstat.

*Inconcinna pilorum excresecientia* causa illis est in pilorum superfluitas succi sulphurei fumosi, quam *Ania*, inconcinna excresecientia hominis, in distributione materiæ pro carne & cute occupatus, partibus quibusdam inspergit, unde pili egrediuntur, eo quod sulphur istud naturam talen pilosam in se continuerit.

*Fissura* secundum *Paracelsum* etiam provenit à fale alopecia, seu *Oto*, dum alopecia degeneratio deviat in alias quam proprias locustas.

§. 7. *Helmontius* quod attinet, pauca nobis ille reliquit vestigia, ex quibus horum morborum causas eruere liceat, netamen in hoc fenatu præ aliis sit ærvisus, paucos, quos de pilis formavit, conceptus in commune bonum hic proferet. Quamvis igitur ad *Decidentiam Calvitiei*, pilorum, sive in *Alopecia* sit, sive in *Area*, sive in *Ophiasis*, sive in ipsa etiam *Calvitie*, eam is à nutrimenti quodam defectu oriri statuit, novit enim pilorum in statu sano veram esse accretionem & nutritionem, non autem eos innasci per appositionem, à retro expellentem, unde deficientem vel corrupto isto nutrimento excidunt, quod sponte sæpe contingere permittit, uti



eti cervus certo anni tempore deponit cornua, quin renovari solent, ut vere, novo adveniente fucco, arbores frondes & folia denuo proferunt, & cervus dum novo surculorum germine pascitur, cornua recipit. In senibus verò *Calvities* nullis novis pilis ornatu, quod renovatio istiusmodi sit effectus vegetioris vitæ, quæ senes sunt destituti, propter senumtorum aliquot penuriam, pauperiem aut extinctionem, unde totius corporis siccitas, & nutrimenti pilorum totalis defectus.

*Tinea.* *Tineam* oriri vult à peculiari quod. m. fermento, sæpe per contagium con munito, unicolorum enim pilos tincas peperisse n. tavit, interdum etiam intus genito, & cruorem alenda isti parti distributum corrumpente, à quo cutis ipsa p. stimulo pari modo afficitur.

*Canities.* *Canities* pilorum senium eorumdem arguit, etiam aliquando præter hominis senectutem unusque pilorum interdum ante aliam canescit. Sæpe imaginando canescunt pilis, dum conceptum ideæ ex præcordis ad cerebrum transmittuntur, quod in viris æquæ ac mulieribus contingit, viri tamen ad cor & cerebrum ideas istas liberius mittunt, ut mulieres exorbitationes suas ad uterum. Ita enim vir quidam expectans manè præteritum in suam sup. electilem transmissum iri, tota nocte sedens inertus, capite in palmam manus inclinato, manè satis capitis canum habuit, quæ parte manum tetigerant tempora, hinc notat, colorum signaturam non esse unam.

*Plica.* *Plica* caulam agnoscat mucilaginem semini connubio inspulatam, & è capite resolutam pilis sese implicantem, eosdem sibi invicem conglutinantem, ut nullo in unam quandam strigam postea conrescant.

*Porriginis.* *Porrigio* oritur ab excremento quodam ultima digestionis periodo exhalato, eo enim fuligine tenuis foris proferente, capitis pelli huiusmodi adnascuntur furcures, qui pectine vel digitorum ungibus separantur & deiciuntur.

*Inconcinna excresecientia pilorum.* *Pilorum inconcinna excresecientia* nutrimentum abundantiam inquit, quæ ab externis certæ parti obvenerit, nonnunquam allicitur.

*Effusura.* *Effusura* oriuntur à sale acido, vel cum nutrimento pilis communicato, vel extrinsecè illabente, eosque discindente.

*Tinea.* *Tinea* non ab stimulatione à latice isto diuturniore mora in glandulis cutaneis corrupto, & maiorem corticositatem adepto inducitur, sicuti idem iste ab externo quodam mialitate seu fermento facile inficitur.

*Calvitiei.* *Calvitiei* ut plurimum nutritii succi penuriam indigunt, quæ in senio frequentior obvenerit, in huc autem Venereâ à fermento corruptivo destruitur, & ad alimentum redditur ineptus.

*Canities.* *Canities* ab arido succo vividitate pristina destituito in pilis depingitur.

*Plica & Porriginis.* *Plica* ex succo nutritio glutinosus viscidis particulis abundante oritur, ut *Porrigio* ex eodem acido - salinis & sanguine haustis participante.

*Pilorum inconcinna excresecientia.* *Pilorum inconcinna excresecientia* succum istum nutritium acquit abundantem, porosque illius partis parulos eundem facile recipientes.

*Effusura.* *Effusura* pilis funditur à particulis acido salinis obtingit, cum succo nutritio altius usdem illatis.

*Serendum hystroium.* §. 9. *Sy. vius Alopecia, Aram, Ophiasin & Tineam* ab humore acri ex sanguine ad superficiem illam corporis & capitis delato, & à putri-

ta glutinosa ab excretionem impedito deducit, qui pro majori vel minori suâ acrimoniâ gradus illos constituit, & ubi à majori copia pituitæ glutinosæ diutius detinetur, ibi plures capillos exedit, *Tinea.* præ reliquis tamen in *Tinea* ferocior est, utpote cutem valde erodens, incurulans, & pilis maxime infestus.

*Calvitiei.* à sanguinis nutrientis defectu vel alio quodam vitio oritur, quatenus per minimas arteriolas ad radices pilorum non satis deferretur, aut circa cutem corrumpitur & ad pilorum sustentationem inidoneus redditur.

*Canities.* causam adscribit corruptæ & volatilitate suâ privatæ bili, unprimis à succo pancreatico, qui per senium austerior & spissior similiter bilem afficit, vel momentanee interdum ab affectibus animi gravioribus, merore potissimum & terrore ita corrumpitur, ut ad statum naturalem tam cito redire nequeat, sed in statu præternaturali persistens, vitiosè in intestino efferveat, & pituitam simul & sanguinem inficit, mutationemque colorum in pilis semel factam conservat.

*Plica.* *Plica* exurgit ex singulari quadam glutinosa pituita sanguini nutrimenti sese immiscente, accedente peculiari quadam austeritate sæpe in aere latente, vel per cibos & potus humoribus intra corpus illata, quæ pili postmodum cognuntur & complicantur, sanguinis quoque nutrientis abundantia symbolum illum adjuvante, qui in affectu hoc ex relictis pilis exstallat.

*Porriginis.* *Porrigio* manat ex acido subtili, quo torridus ille sanguis, nutritionem præbens cuticulæ, infectus est, à quo ipsa cuticula non modo non nutritur, sed exeditur, & in squamulis diffingitur, pectinatione facile separabiles.

*Inconcinna excresecientia pilorum.* *Inconcinna excresecientia* pilorum nutrimentum in huius vel illius partis carnosam adiposam membranam, ob laxitatem quandam præ aliis ad ejus receptionem habilem, copiose & inconvenienter illatam causam agnoscit, quare in eâ ipsi pili propullulant, quorum tamen abentia decori servando magis conveniret.

*Effusura.* In *Effusura* pili discinduntur ab acido quodam acri, cuius natura nondum satis est cognita aut perspecta.

§. 10. Juxta *Cartesianos* causa *Alopecia* sunt particulae salinae rigide, quibus lacteus succus nutritius plus minus intermixtus est, quæ ut alix benigniores partibus rite apponi nequeunt, sed ræ imperfecta discendant, atque ita pili non satis insuccati flaccescunt & ex amplioribus poris elabuntur.

*Aræ.* Et quidem quando particularum istarum copia quadam unita ad unum aliquem locum quam ad alium major advenit, pili ubi omnes excidunt & fit *Aræ*.

*Ophiasin.* Si verò quidpiam ramosi seu oleosi nanciscuntur, illud se fibrillis cutis insinuat, ad vicina serpit, & salinas istas particulas circumfert, unde succus laudabilis per totam illam regionem, quam obambulant, devastatur & destruitur, sique inducitur *Ophiasin*.

*Tinea.* *Tinea* generatur à fermento quodam singulari in poris cutaneis latente, & salinas particulas fortius præcipitante, hinc poris cutanei omnimodè pervertuntur, & sic non modo pili decidunt, sed ipsa cutis dissolvitur à fermento illo peregrino, sæpe per contactum alterius corporis eo detati communicato.



neum, fuscum, vel nigrum. Etenim hi colores, ceu dictum, ex materia hac alba oriuntur, prout intensius vel remissius inspissatur vel percoquitur; scilicet si induratio vel coctio debilior sit, albedo manet; sin paulo intensior, pallor vel flavedo superinducuntur; sin adhuc intensior, rufus vel ruber; denique si adustio quasi concutatur, castaneus, fuscus, aut etiam niger emergit, juxta superficiem corporis lumen modificatur.

Canitie.

Canities ergo nostro judicio oritur à defectu spirituum animalium, glandularum pilosarum succi inopia, & seminis in eis contenti defectu, sicut in arboribus ubi deficit succus nutritius, ibi arbores albescere incipiunt. Inde etiam est, quod una nocte omnes possint canescere ab apprehensione gravis mali imminentes vel presentis; unde vitam eis inesse quidam contendunt, quasi alantur per succi sibi appropriati intus succptionem; huc faciunt animi passiones, quæ canitiem inferunt, ut cura, tristitia, timor, invidia, malitia, &c. quæ succos corporis exhauriunt, quæ acedine, aciditate, asperitate inficiunt, quæ dulcedine, pinguedine, spirituum copiam privant. Sic juvenis nobilis 24. annorum à metu imminens mortis, quam Barbari minati fuerant, unius noctis pervigilio canis factus est, vid. Decur. Ephem. Ann. 4. obs. 60. Canitie etiam causæ admodum diversæ sunt ab illis albedinis pilorum puerorum, nam in infantibus & pueris omnes fucci mites ac dulces, & spiritibusurgiduli sunt; è contra succi, quibus aluntur pili canis, macri sunt, acidi, acres, asperi, insuaves, spiritibus dulcibus destituti, hinc acetum, imò omnia acra & valde secca, ut & As per camp. Oculi, capiti & capillis sæpe admoda à canitie disponunt, pingua verò à canitie præservant, albumina ovorum frequenter capiti applicata indurant glandulas pinguedinem pilorum absorbent, adeoque calvitie accelerant. Quod verò pili hunc & alium nascuntur colorem, hoc scrutandum ex peculiari superficie, texturâ & figuratone pilorum radios solares diversimodè suscipiunt & remittunt; sic vidimus Londini hominem, qui crines habuit omnium colorum instar iridis, cujus rei non aliam causam agnoscere possumus, quanquod pili fuerint figurati instar prismatis, inde & radii ita incidebant & talem colorum diversitatem repræsentabant. Sic & alium vidimus, qui crines instar laneæ nigra gestabat.

Plica.

Causa Plicæ sententia consistit in eo, quando in cute vel glandulis capitis plures ductus & pori conjuncti sunt, & obliqui, ex quibus dein pilos copiosiores angustiore in loco positi, & acedente simul succo glandularum nimis viscido & glutinoso intrinquantur, sive in tricas conglutinantur. Ad hoc confirmandum elegantem habet observationem D. Febr. Præses noster, ubi hic affectus ex vulnere capitis obortus fuit. Huc facit multum vitium lymphæ in glandulis contentæ, hincque apparet pilos poris non destitui. Causa antecedens est sæpe morbosus apparatus in primis viis. Causa præcatarrhica morbum hunc apparatus in actum deducere valens, è triplici serie constituitur, sed ut intelligantur proprio nomine, proferendarum, hic quoque perit potest. Inter res naturales dispositio hæreditaria multum facit, & immediata sæpe seminarii morbi exiti causa, quando cum generationum principiis in ipsum factum

transfunditur. Præter experientiam Sennertii lib. 5. Med. Pract. P. 3. f. 2. alii plures testantur Practici. Quoad res non-naturales ita à Medicis dictas, credimus cum Polonis peculiare quiddam aquis ejus loci, quarum quotidianus usus hominibus usus est, ad Plicam producendam inesse: in Polonia enim in loco quodam scaturit aqua, si quis huius mensuram hauriat, id sibi acquirit plicam maximam, prout id mihi recensuit Cl. Dn. à Gehema, Amicus noster sincerus. Quod concernit res præternaturales, observatum est, eos, qui in lucem Veneream propendunt, vel ea jam infecti sunt, facilius Plica affici, sicut & Scorbuto laborantes. Sanguinem aliquando fundunt, quia pili sunt & suis vasibus sanguiferis minutissimis prædicti, & suas habent protuberantias.

Porriginis causa est in liquore glandularum Porriginis nimis falso & induratus; extra omnium dubitationis aleam ponimus, quod multe particule salinæ à sanguinea massa præcipitantur, verus supericiem harum glandularum cutanearum, & quidem ob pororum amplitudinem & laxitatem, quæ dein in superficie capitis hærentes, acrimonia sua fibrillas commovendo, non dimittunt Porriginem excitant, sed & partes vicinas corrodunt.

Inconscia illa pilorum excrecentia ut plurimum fit in locis incongruis, sæpe in verrucis in facie ejusmodi pili excrecant, quando ejusmodi glandulæ pilosæ repetantur, vel earum liquor sit instali loco detentus, unde non potest non fieri, quin crescant pili, modo adsit talium pororum constitutio; ita juxta magnum quoque nostrum Hippocratem πῆξι δερ. ἢ σαρκ. ἀπὸ τὴν γὰρ τὴν σαρκὶ τὸ πῆξι δερ. ἢ, ἢ τὰ αὐτὰ ἀπὸ τῆς γλάντης, ἢ τὸ πῆξι δερ. id est, ubicumque in corpore glutinosum est, ibi pili à colore hauri, quam sententiam pristino suo linquimus valori, si per glutinosum istud intelligitur liquor illæ glandularis, & apta pororum dispositio in cuticula non excluditur, quam ipse Hippocrates alibi per τὴν ὁμοιοτητα ἀσκαμῶν indigantem videtur.

Scinduntur aut scinduntur crines à liquore viscosa glandularum nimis aspero, filamenta pilorum se scissura leparant & sejungente.

§. 12. Prognostica quod attinet signa, ex his affectibus nullum periculum timendum, nisi quod deformitatem quandam inferant, si verò Alopecia sit ex Phthisi, vel Tabæ, vel Lucæ Venerea, malum est. Calvities & Ophiasis rarò curationem admittunt, quia glandulæ pilosæ non facillè restitui possunt. Propter eam & illa Calvities, quæ nulla pilorum vestigia post se relinquunt, ut plurimum incurabilis est, quia in his vel glandulæ pilosæ planè deficiunt, vel pori, per quos erumpere solent, planè coacti & obliterati sunt.

Tinea tam levi brachio non est versanda, sumit enim vires eundè, imprimis quanto manantior est & magis fera, hinc in pueris & juvenibus contagiosa est, mitior autem non reculat curationem, si rectè tractetur, & nonneglectis interioribus talia adhiuantur topica, quæ poros minime occludunt. Recens difficultatè sanatur, sed inveterata longè difficilior; recidiva hic resurgit, quæ restituta credebatur, quæ etiam sæpe sanata superstitem inducit alopecia, Chirurgorum turpe opprobrium.

In Plicâ atrociori pessimis stipata symptomati-



matibus adest vitæ periculum, apud nos verò Plica longè mitior est, plurimi enim sunt, qui ejusmodi tricas sibi servant incultas, citraque noxam quoad vivunt circumferunt, quanquam non sine deformitate, sibi persuadentes, gravissimorum capitis affectuum materiam ab illis absorberi & amoveri, at illis relictis de vita actum esse. Si morbus hæreditarius est, & inveteratus, nullam admittit curationem; facilius verò curatur recens. Maxima tamen pars usque ad finem vitæ hoc affectu detenta permanet. Si convulsiones & alia atrociora exurgant symptomata, malum est.

*Porrigio* superficialia, & non ita copiosos surculos mittens, parvi est momenti, abundans autem ita, ut post facilem corporis motum in vestes quasi ningat, non contemnenda, sed medicamentis corrigenda.

*Inconcinna pilorum excrecentia* nil quidem corpori adest damni, ornatu tamen adeò sollicitè studentibus, maxime delicatis femellis, & mulierosis juvenibus admittendum est molesta, & plane intolerabilis, ut pro eorundem extirpatione quicquid etiam perferat, que ipsa in aliis locis, quam in facie, minori cum periculo instituitur.

*Sic Fissura* soli incremento pilorum aliquantum est impedimento, quæ tamen hand ita difficultè corrigi potest.

Accidit sæpe pilis vel crispari, vel rectè exportari, & hæc crispatio pilorum dependet à pororum, quos transeunt gressi, & angustia hæc est à siccitate, ariditate & fibrositate cutis, quapropter pilis crispis, emper fibrosam & vigorolam cutem demonstrant, quæ parum quoque nervorum ac fibrolarum partium constitutionem arguunt, & sic per consequens pilis crispis robur corporis, activitatem in rebus gerendis, nec non promptitudinem ad Venerem denotant. E contra recti ob laxitatem & molliem nervosarum partium, imbecillitatem, ignaviam ac timiditatem arguunt.

*Cura Diastasis.*

§. 13. *Diastasis* in *Alopecia* eligatur ætæ ægroto & morbi naturæ conveniens, imprimis temperatus, vitetur crassus, nebulosus & frigidus.

Cibus sit boni succi, fugiatur angue pejus copiosus, crassus, salinus ac viscidus, una cum nimis acerbis & aromaticis.

Potus sit regioni & ætati conveniens, exulet cerevisia crassa, valde lupulata, & non bene fermentata; sic etiam nocent varia acida, imprimis spiritus vini & frumenti, id quod apud Polonos iisque finitimis solenne esse percipio.

Motus & quies, somnus & vigilia moderatæ sint; Ita tristitia, cum aliis fortioribus pathematibus vitetur, & imprimis in calvitie & canitie, exulet Venus, spirituum animalium hostis intensissima.

Alvus sit libera, vel naturæ, vel arte, reliqua omnia sint mediocria, & cum sana fiant ratione.

*Cura Pharmaceutica, & 1. Galenicorum in Alopecia, Area & Ophiopsia.*

§. 14. Præmissis his, de curatione Therapeutica & Chirurgica agendum restat. Esti verò de his affectibus rarissime consulatur Medicus, sunt tamen, qui pulchritudini nimium studentes, Medicorum pro malis his abigendis satis sæpe sollicitè expertum consilia, quale genus hominum in aulis maxime reperitur, quibus Medicus operam suam denegare non audeat; cum verò affectus hi difficultissimi sint curati, & in pluribus plane

incurabiles, hinc operæ pretium duxi, de eorum curatione paulo distinctius agere. Quandoquidem ergo in ætiologia nobis præcesserunt venustiores, iidem & nunc in curatione denuò incipiant, & quidem agmen ducentes ipsi *Galenici*, quorum in *Alopecia*, *Area* & *Ophiopsia* cura instituitur omnium primò removendo morbos & causas delivium istud inducentes, & reddendo liberos motus naturæ, ut ipsa capillos reficiat; posthæc si foramina cutis fuerint laxiora, ea adstringunt siccantibus, obliari tamen precipientes, ne nimis adstringentia adhibeantur, quæ alimento accessum prohiberent ad partem affectam: quare eligenda volunt non modo adstringentia, sed nonnihil calefaciendi alimentum quoque ad cutem evocantia, & ut eadem eò celerius ad radices pilorum penetrant, ipsum caput suadent abradendum, ne relictis capilli novorum proventum retardent. Inter medicamentaria talia recensent adianthum, abrotaianum, abstinthium, baccas Juniperi, myrrh, semen lini, flores Anemones, Gummi Ladanum, Ol. abrotani, euphorbii, &c. Ex his composita illis sunt vel in forma sicca, vel liquida. In forma sicca sunt pulveres, quibus caput frequentius & fortius est fricandum. In forma liquida humimenta parant & unguenta. Exemp. gr.

*R. Absinth.  
Cort. pin.  
fol. myrrh.  
adanth. aa. mj.  
Combustantur omnia, & cineri add.  
Ladani triti,  
Myrrh. aa. ʒij.  
Ol. sem. raphani,  
Vini vet. q. f. ad prædicta excipienda.  
F. Liximenium.*

Ex siccitate si oritur affectus & defectus alimentis, pro sanguine ad cutem alliciendi instituant frictionem, caput perfundunt aqua calida, usque dum rubor appareat, tum desistere jubent, ne quod attractum est, iterum ablinantur. Si verò humores pravi sanguini immixti sint, radices pilorum erodentes, eos volunt evacuandos, præmissis præparantibus humori peccanti convenientibus; & si ex lue Veneræ oriatur malum, sudorifera adhibent per habitum corporis exterminantia, postea prædicta aliaque topica denuò subjungentes.

*Intra* curationem peragunt similiter removendo ipsam causam sive materiam tumefacientem & exulcerantem, ea enim abacta & morbum & symptoma cessant promittunt habitum prius ratione totius corporis, ne pravi succos ad locum affectum transmittat, præparantibus adhibitis ex sumaria, epithymo, lupul. polyposd. hinc subjunctis purgantibus ex sena rhubarb. turpetho, &c. In pueris laudant Symp. flor. Perficor. de simar. compos. rosar. solutivum. Ne verò pars affecta pravi illos succos facile suscipiat, eam roborant applicatis nonnunquam, necessitate ea exigente, repellentibus, neque humor vitiosus simul exhaustur, digerentibus, & si crassior illem sit, incidentibus. Fovent ergo cutem decocto fennigraei & betæ in aqua simplicij, postea adstringentia & exsiccantia adhibent ex adiantho, parietar. blito, tol. lalicio, myrrh. rad. anchui. ʒij. on. lilij, cneum, agreit. sales, chalcitide,

tide, chartæ combustæ, &c. oleo exceptis & linimenti forinâ explicatis. Ex.gr.

- ℞. Sulph. ignem non experti,  
fol. parietar. contus. aa. ʒv.  
Sapon. Gallic. ʒi.

Misc. & succo parietar. excepta redigantur in formam linimenti, quo innungatur caput.

Vel:

- ℞. Chalcant. ʒj.  
ʒ Staphid. agr. ʒiiss.  
Lithargyr. ʒvj.

Misc. & cum aceto, & oleo Myrthino in mortario durius agitentur, donec ad Linimenti crassitudinem redigantur.

Si dolor urgeat, ac multa effluat sanies, laudant cataplasma ex lente cocta & melle, item ex panace, plantagine, solano, polygonio & coriandro.

*In Calvitie.* In Calvitie ex senio, & ubi radices pilorum planè consumptæ sunt, impossibile iudicant pilorum novum quendam proventum introducere, ubi verò aliquid restat spei de novo aut meliori alliciendo nutrimento, curatio nihil distat à superiore in Alopecia jam manifestata.

*In Canitie.* Canities in senibus curatio vix desideratur, cum reverentiam sibi inde penes juniores conciliant, à junioribus tamen ante tempus canescentibus queruntur aliquando remedia decolorantia, quæ, nisi assiduo adhibeantur, parum operæ præstatura censent. Interne mixis laudibus ad canitiem retardandam extollit Galenus Eletharium suum de aromatibus, quod tale est:

- ℞. Ligni Aloe crudi,  
Rosæ. aa. Aur. xij.  
Calami aromatici Aur. iv.  
Gall. Moschat.  
Macis.  
Dorenic.  
Nuc. Moschat.  
Pip. long.  
Meniba sicca,  
Spica Nardis,  
Cassia,  
Masticia,  
Cinamomi,  
Caryophyllor.  
Asari aa. Aur. iij.  
Croci,  
Cardamom. maj.  
min.  
Trium Santalor.  
Rhabarb.  
Costi,  
Cubebar.  
Zingib.  
Sm. fanis.  
anisi,  
ligustici aa. aur. ij.  
Sacchari ʒvj.  
Mivæ aromar. ʒxij.  
Mellis depurati. q. s.  
Fiat Eletharium.  
Dof. à ʒij. ad Aur. vj.

Externe varia lixivium decolorantia adhibent, frequentius repetenda, cum color iste suppositus æstimetur instabilis. Sic Joh. Baptist. Porta ad capillos nigros reddendos tale instituit lixivium:

- ℞. Cort. sic.  
Gallur.  
Elacæ,  
Rubi,  
Cupressi, aa. q. s.  
M. F. Lixivium, quo capilli laventur.

Alii:

- ℞. Lixiv. commun. q. s.  
fol. bet. nij.  
salv. m iij.  
Myrrh.  
fol. lauri,  
Cort. Nuc. virid. aa. q. s.  
M. & Coq. eoque laventur caput.

Capillos hujusmodi lixiviiis ablutos innungunt linimento quodam. Exempl. gr.

- ℞. Plumbi combust. q. v.  
Cum succo betæ redigatur ad mellis consistentiam,  
F. Linimentum, quo innungantur capilli & barba.

Plicam curaturi suadent omnia ea, quæ abundantiam nutrimenti in sanguine imminuunt, venæ-sectionem, purgationem, & balnea insituentia, & icas verò ipsas vix attingunt, cum abique periculo nequeant refecari, neque plebeji singulare quoddam fortunæ aut virilitatis signum in iis consistere sibi persuadentes, earum exstirpationem facile permittant.

Porriginis curam aggrediuntur succum prævum ex cute capitis detrahendo, & viscerum temperiem ad justam mediocritatem redigendo, hinc genitos jam pravos humores corpore educunt vel sanguinis missione vel purgatione. Tandem accedunt ad confirmationem cutis, ne admittat illa succos istos pravos, quod adstringentibus perfici credunt moderatis, inter multos detergentibus & digentibus, ut simul causa continens, sive succus pravus ex cute capitis detrahatur. Ad repellendum ac digerendum commendant folia falcis cum aceto, vel ladanum cum oleo myrthino, farinam ciceris & fabarum cum oleo lentis-scino. Illinunt cutem felle bubulo, succo betæ, piceliquida, & denuo abluunt aqua sulphurea, aut aluminosa, aut in qualupinus amarus, malva sylvestris & fenugræcum ebullierit, nec non muria aut aqua marina. Post abluitionem & frictionem cutis panis asperis, eam seq. innungunt linimento.

- ℞. Pulp. Colecynt. ʒiij.  
Ossipi ʒi.  
Ladani,  
Gummi,  
Ruta sylv. aa. ʒj.  
Ol. Cheirini q. s. ad priora contrita suscipiendum.

F. Linimentum.

Inconcinnam pilorum excrescentiam, curari cre-  
dunt, si necessitas ita postulet, succi nutrimenti  
abundantiam detrahentibus, in plethoricis venæ-  
sectione, in cacochymicis variis purgantibus,  
pro humorum diversitate, sed raro admodum id  
desideratur, frequentius igitur externis pilos  
eradicantibus utuntur, quale sequens est unguen-  
tum, seu pilothrum ipsius Galeni:

- ℞. Auripigmenti aurei coloris ʒvij. aut x.  
Calc. vivi ʒx.  
Amyli sextantem,  
Terra Selinusæ ʒj.

Omnia



*Omnia trita & per angustissimum cribrum expressa reponuntur; illis verò tempore ex Pharmaco isto quod sufficit acceptum aqua conqualfare, dein de illinere jubet, ac animadvertere, ne exuratur.*

*Vel sequens Criteris, aut Heraclida Tarentini:*

*℞. Calc. viv. sextar. j.*

*Terr. Cimolia,*

*Pumicis usti aa. sext. j.*

*Auripigmenti part. iiii.*

*Trita hac & levigata usus tempore diluuntur aqua, & loca pilosis inlinuntur.*

*In Fissura.* *Fissuram pilorum vix aliter curant, quam forfice removendo partes scissas aut filas, extremitatesque illinendo felle quodam animalium, si verò vitium in sanguine nutriente nimium sit, illud quoque corrigunt, aut plane tollunt, remediis superius denominatis.*

*§. 15. Paracelsa cura in Alopecia ejusque speciebus peragi debet reduendo spiritum Jovis in pristinas semitas, reliquisque humoribus intermiscendo, ne adeo sciat in propriam minueram, sed ab aliis humoribus mitigetur. Remedia autem nulla habet peculiaria, sed præter ea, quæ ex §io parantur, idem hic adhiberi potest, quod commendat in*

*In Tinea.* *Tinea, nempe: ℞. Cichor. Gamandrea. Capillor. Qis aa. ʒi. Cassia extractæ ʒß. Mannæ electæ ʒiß Reduc in haustum cum aqua artemisifia: omni anno menseque Majo jubet administrari, quia revertitur. In externis minimè certus est, nec secum ipsemet semper consentit, quare & nos ea nunc misa facimus.*

*In Calvitie.* *Calvitiei Curatio secundum Autorem hunc instituenda illis quæ resolutionem fumi sulphurei prohibent, eumque ad sustentationem & nutrimentum partium corporis conservant, simulque Jovem benignum exhalant, ut succum viduum ad capitis extremitates mittat, quod Elixirio suo Essentiarum quarantum tentari, & aliquando obtineri posse promittit.*

*In Canitie.* *Canitiem corrigendam esse cognoscimus secundum illius principia, alterando & mitigando sal illud asperum, & sulphureo suo corpore destitutum per balsamica ipsum Jovem apprimè consolantia & exhilarantia, ut sunt Elixir suum proprietatis, & Elixir Salis, quæ tamen efficaciam suam potissimum præstant præservando & conservando, ipsam autem canitiem ex senio semel inductam ex fundamento vix immutare valent, cum Jupiter ille coloris sui admodum tenax sit. neque eum tam citò mutet, in opprobrium ipsius Archei adeo defatigati, ut nequeat colorem istum deponere, aliisque vividioribus denud investire.*

*In Plica.* *Plica cura instituenda est resolutis succum illum sulphureum, crassum & glutinosum; deinde ejus copiam minuentibus, ne ulterius ad pilos influat. Optime hæc præstat, secundum Paracelsistam, ipsa Essentia quinta ʒii, utpote non solum resolvens istud glutinosum, sed vitiosos pilos plane ejiciens & novos restituens. Insuper ipsi cibis etiam potusque sunt corrigendi, & ær mutandus. Singulare contra hunc morbum remedium quaerunt in ipso illo cibo & potu, ex quo generatus fuit, si enim exiis arte sedula proliscitur Essentia quinta, eaque frequentius usurpetur, non ita difficulter glutinitas resolvetur, & melior succus ad illos perve-*

niet, cum excrementa omnia fuerint separata, ut nihil nisi purum manserit superstes, quæ Essentia reliquum potum & cibum corrigent, & impuritates ab illis segregabunt.

*Porriginis cura consistit in correctione mor- In Porri-*  
daci illius salis cum sulphure resoluti separati, *ginis*  
& succum sanguineum inficientis, tum ipsam cutem deradentis & separantis, quod fieri posse sibi aliisque persuadere conantur sequenti remedio extrinsecus applicando.

*℞. Alcali de Aluminibus,*

*Salis fusæ.*

*F. Mixtura.*

*Pili copiosius & incontinè exescentes prius In Pilorum*  
extirpandi sunt, deinde ulterior accessus dene- *incuracum*  
gandus est funio illi sulphureo piloso, ne transi- *exercitum*  
tum inveniat per ipsam cutem, sed intra illam destruat. Utrumque efficiunt sequenti vel simili limento.

*℞. Gummi. Hedera.*

*Oz or formicar.*

*Auripigmenti,*

*Colophonie aa. ʒi.*

*Hirudinum, seu Sanguisugar, ustrar. ʒß.*

*Tritamiscantur cum Kanarum sanguine,*

*F. Unguentum.*

*Fissura* corrigitur ablutione pilorum ex de- *In Fissura.*  
cocto radice urticæ & consolidat in aqua facta, frequentius usurpata.

*§. 16. Helmontii ex sententiâ cura Alopecia, Helmontii*  
*Aræ, Ophiassi, & Calvitiei* consistit in restitu- *sententiâ*  
tione nutrimenti, ut nutritio debita redeat, *de Cura-*  
quod in vegetioribus quidem sponte contingit, *tione Alo-*  
novo illo lucco ad locum pilorum redeunte, in *piæ, Ophi-*  
senibus autem renovatio illa neque sponte, ne- *assi &*  
que medicamentis adhibitis expedanda, quon- *Calvitiei.*  
iam totalem corporis siccitatem inluit, fer-  
menta que semel deperdita ulterius reparari ne-  
queunt.

*Tinea* cura eò vergere debet, ut fermentum *Tinea,*  
illud peculiare vel planè non suscipiatur, cavendo  
conversationem illorum, qui ea jam sunt in-  
fecti, neque attingendo aliquid eorum vestimen-  
torum, maxime pilei, ne ille capiti imponatur;  
vel semel susceptum corrigatur & eliminetur,  
nec non cruor alimonie partis illius destinatus  
depuretur, ne à fermento vitioso corruptus  
partem illam simili malignitate inficiat, cui voto  
ut plurimum externa sufficere posse existimat.

*Canities* veram curationem non admittit, *Canities.*  
quia in senibus fermentorum penuria denud re-  
farciri nequit, imaginatione verò cum facultas  
qualitativa etiam succumbat, ab ea inducta canities  
in statum meliorem vix redigetur, obforti-  
orem illam ab imaginatione inductam alimen-  
torum perturbationem.

*Plica* curatio postulat resolutionem mucila- *Plica.*  
ginis istius arctè satis inspissatæ, ut pili glucine  
isto liberati sese iterum valeant explicare, dehinc  
studiosius quandam præcautionem, ne in prior-  
em concretionem relabatur.

*Porrigo* ut curetur, opus est absterfione fu- *Porriginis.*  
liginis istius excrementitiae, & roboratione pel-  
lis, ne tam faciliè eam suscipiat, multo minus ab  
ea laxetur.

*Inconcinna* in quibusdam corporis locis pi- *Inconcin-*  
lorum *lorum*

*capilorum latum excrescentia tollitur eorundem exstirpatione, & ne renascantur, inhibitione, ne nutrimentum abundans ad loca illa ulterius transcant.*

*Figura.* *Figura* corrigitur sublacione aut mitigatione talis illius acidī, pilis sive internè per nutrimentum, sive externè per aërem communicati.

Et hac quidem instructio fuit *Helmontiana*, qua se infuendura ratione morborum illorum curatio; remedia verò, quibus scopi isti obtinebantur, qui hac vice expectat, moram suam frustra locabit omnem. sunt enim arcana, quae si communicatione nos vult vilesce, quare in tacurnitate ista sibi non parum placens, cum *Horatio Serm. lib. 1. Sat. 4.* arcanorum infirma manifestationem urgenti recedere videtur:

*Di bene fecerunt, inopis me quodque pusilli  
Finxerunt animi, raro & perpaucalloquentis.*

methodus  
in curando  
capillorum  
defectum.

*In Tinea.* In *Tinea* similiter latici & rosi vitia corrigenda, & cutis lesa ad statum sanum reducenda quod præter antedicta extendere obtineat, illinendo, vel alio modo applicando remedia in se continentia sulphur & oleum & per deliquium, observare enim sulphur præ aliis quavis humorum, & imprimis ichoris acidi asperitates exoticas & corruptiones destituere, atque latici cutaneo naturam plane cancellare balsamicam.

*Calcium* ex lenio, ubi omne pilorum con-  
sumtum est nutrimentum, denovo investire velle  
capillis, irritum ille retur esse conatum; ex lue  
autem Venerea oriundam adhibitis illis, que  
primario morbo resistunt, & succos ad natura-  
lem statum redeunt, depelli posse concedit, &  
tamen in Desfluvio capillorum notata sufficiunt.

**In Cavita** Cap. ut in alium muretur colorem, succi  
ardi pofitular vel eductionem, vel in vividiorē  
transpofitionem, cum vero hoc in exluccis fen-  
fibus planē fit impoffibile, in aliis autē admo-  
dos difficili hunc etiam corvus videbitur al-  
bus, quāvis iter ad viridis colorē, neque externā

capillorum tincturæ suis diu stant promissis,  
cum prius sæpe dispareant, quàm nix à Sole li-  
quescat.

*Plicatus* si quis curatam velit, ex Autoris hu-  
jus principis ea adhibebit remedia, quæ succum  
nutritum abundantem immuere, & viscidi-  
tatem ejus attenuare valent, cathartica & sudori-  
fera usurpando, non omittis illis, quæ specificè  
huic affectui conducere à Polonis sunt obser-  
vata.

In *Porrigine* Linguis depurandus, & partes *in Porrigi-*  
acido falſe educendæ ſunt remedijs purganti-  
bus & cathartico, turbiti, polypod. &c.  
Externe conveniunt linimenta ex rad. lapath. ariſ-  
tol. rotund. herb. falv. in butyro & vino albo  
coctis, ad vini cum ſumotione, cui per linteum  
colato, dum refrigerare incipit, addi poſſunt  
tantillum ſulphuris & ol. Si per deliquium.

*Inconcinna pilorum excreſcentia* eſt à ſucci nutri-  
titi abundantia, & pororum cutis inter glandu-  
larum dilatatione proveniat, vix tamen interna ejus  
cura inſtituitur, ſed externa pilos extenuantia  
vulgariter applicatur, quæ nulla habuit pecu-  
liaria, ſed eadem, quæ reliqui Autores, ſi ſi-  
dem quandoque opus habuit, in ultimum adduxit.

*Fixata* similiter externe solummodo corrigi-  
tur, vel fornice partes suas adinendo, vel digitis  
& unguibus easdem discerpendo & detrahen-  
do, adhibito interdum lixivio ex anaris, capil-  
laribus mibis.

§. 18. *Sylvius* ad obtinendam curationem in *Alopecia*, *Azie*, *Ophtia* & *Linea* ulcudanda finet ea, quæ cutis poros aperiant, eosque aper-  
tius levant, si ab eorumdem obstruendo de-  
clivum dependeat, subadstringentia vero, si ab  
eorum laxitate nimia fuerit obortum, in *Linea* po-  
tissimum illa, quæ humorem acidum temperant,  
glutinoſiusque incidunt & abſtegeunt, si que  
partem affectam reſtituunt, & conſolidationem  
promovunt, quæ omnia præſtari promittit  
ſoliſſimis volatilibus, quibus ſenſim cedat.

*Calvus* curanda ea poſcit remedia, quæ ſan- *Calvium*  
guinis nutrientis defectum reſarciunt, alimenta  
videlicet multum nutritiva; vel vitium ejuſ  
corrigant, quòd cum diverſum ſit, varia etiam  
remedia requiruntur, imprimis aromaticæ & vo-  
latiliffimæ, ex C. C. majorana, roſmarino, machi,  
&c. Nec omittenda externa, ſanguinis boni  
& optimè nutrientis acceſſum ad pilorum ra-  
dices allicientia, frictions videlicet frequen-  
tiores, abluſiones, aut ſotus conſtantes me-  
dicamentis ſpirituofis & capillaribus. In ſenibus  
autem vix adeò largus expectandus rivus ſanguis  
boni, ut eam corporis regionem alluere,  
humectare, & pilis ferulioſiorem reddere valeat,  
unde tam ſæpe irritus eſt allein iſdem pilos  
reſtituendi conatus.

*Cannabis etiam vix corrigibilis pronuntiatur, Causam.*  
 cum indecrepitis acidores & aulteriores succi  
 collecti tam copiose per succum pancreaticum  
 illos junctim continentem ipsam bilem adeo  
 obruant, ut ea pristinā suā volatiliter ulterius  
 ornari nequeat; si quid tamen est tentandum,  
 illud omne per eadem ipsā aromatica & salia fi-  
 ri debet volatilia, prae aliis ibi in prillimum vo-  
 latilioris statum reducenda perquam idonea.

*Plica* ne contingat, vitandi sunt aër, cibus *plicam*  
 & potus, quorum ulu eam excrefcere observâ-  
 runt, *Poloniam* prætereundo, aut nunquam  
 adeundo, vel non diu in ea commorando,

omneque glutinosum à cibo potuque arcendo, frequentibus adhibitis pectinationibus, frictionibus & absterisionibus pilorum, ne immunditiam contrahant, semel autem enatam difficillimè credit auferendam, absque enim periculo vitæ vix eradicabitur; conglutinatos verò pilos extricare velle, neque manibus, neque medicamentis est possibile, hinc Judæi plica est sollemnis, quia in munditiæ & diætæ peccant sæpe. Sudores frequentius prolectos, quibus nutrimentum detrahatur, & sanguis à glutinositate liberetur, nullatenus contemnit.

*Porriginem.*

*Porrigo* corrigitur destruentibus acidum illud subtile, quo sanguis ille nutriendi rotidus inquinatur, ne ulterius cuticulam erodat, squamulæ autem, seu partes erossæ cuticulæ abstergendæ sunt, & cuticula ab his liberanda volatilibus balsamicis intus & excus adhibitis.

*Inconcinna pilorum excrecentia tollitur per extirpantia pilos ab aliis jam satis cognita reddita, & adstringentia poros cuticulæ, ne eosdem ulterius transmittat.*

*Inconcinna pilorum excrecentia* tollitur per extirpantia pilos ab aliis jam satis cognita reddita, & adstringentia poros cuticulæ, ne eosdem ulterius transmittat.

*Cariciflanorum Consilium de curando Alopecia & Alopecia.*

*§. 19. Cariciflanorum* de curandis hisce affectibus consilium est, ut in *Alopecia*, ejusque specie *Aræ* dictæ particulæ illæ rigidæ in succo nutritio corrigantur & flexiles reddantur, sique uccus ille reducatur ad pristinam suam dispositionem benignam, pilique sufficiens capiant alimentum, ut concessos suos loculos in poris cutaneis expleant, sique debitâ sitâ occupent crassitie. Obtinetur hoc tum alimentis, tum medicamentis. Alimenta constare debent multis particulis dulcibus, benignis, & aliquantum spirituosis, ut copiosum præbeant chylum, non tam solidiorum partium alimoniarum sufficiens, sed ex abundantia quâdam ad efflorescentiam illam pilorum in supremâ corporis parte necessarii portionem contribuens. Medicamenta interna sunt spirituosâ, penetrantia & valde subtilia, benigna tamen, ut partes illas rigidas inflectere & mobiles reddere valeant, ita enim ulterius non resistunt, sed succo nutritiâ facilem permittunt ingressum. Et quando ille laus infuit copiose, pilorum filamenta ita distenduntur & interstitia opplebuntur, ut ambitu suo poros facile expleant, neque ulteriori quâdam opus sit adstrictione. Sæpius itaque in usum vocari volunt Elixirum sequens hoc in casu apprime conveniens:

*℞. Rad. Galang.*  
*Calam. Aromat.* aa. *℥iij.*  
*Sanic.* *℥vj.*  
*sol. rosmarin.*  
*majoran.*  
*salv.*  
*capill. Qis* aa. *m℥.*  
*flor. salv.*  
*tunic.*  
*meliss.* aa. *pj.*  
*Croc. Oriental.* *℥j.*  
*Cinam.* *℥ib.*  
*Macis.* *℥b.*  
*M. F. Pulvis.*

*℞. Succus unius mali auranti. dulc.*  
*spiritus C. C.* *℥ij.*

*Cort. recent. auranti.* *℥iij.*

Conquassentur invicem & consundantur ad comminutionem corticum, postmodum per linteum coletur & fortiter exprimantur; Succo illi immisceantur pulvis & f. *Massa, seu Pasta.* Siet per no: em in loco tepido, manè superinf. spir. vin. generosi ad digitos. 3. vel. 4. eminentiam, agitentur & ponantur ad digestionem in Cin. vel alio quodam loco calidus/cnio ad spatium duarum septimanarum, postea sicutentur:

*Liquori filtrato add.*

*Qu majoran.*

*rosmarin.* ex ligno aa. *℥ib.*

*volat. viperar.* *℥b.*

*Ol. d. cinamon. gt. vj.*

*macis.* *℥b.*

*rosmarin.* *gt. xiv.*

*Circulentur per d. & n. 4 & tandem serventur ad usum.*

De hoc Elixirio aliquoties dentur *gt. xx.* vel *xxx.* in cochleari uno vel altero sequentis Destillati:

*℞. Rad. peuced.* *℥j.*

*liquir.* *℥b.*

*Herb. Capill. Qis.*

*adanth.*

*summit. Cent. min.* aa. *viib.*

*stym.*

*flor. lori purp.*

*Cocyri* aa. *pj.*

*Incis. mixtiss. superinf. Aq. oselli destill.*

*alb. libij. l. iij.*

*Sient per p bene obiecta in sepe, tunc in*

*MB. F. Destillatum.*

*Servetur ad usum.*

Externè instituunt frequentes frictiones, pectinationes, abluiones & inunctiones, ut nutrimentum allietur ad pilos, & pori cutanei ad ejus susceptionem commodè disponantur, particulæ rigidiores agitentur & ad leccellum incitentur, aut planè in alium convenientiorem statum transferantur. Pro ablutione sequens laudatur Decoctum:

*℞. Rad. bardan.*

*laparb.*

*peuced.* aa. *℥vj.*

*urtic. maj.* *℥b.*

*Herb. Avroian. mar.*

*majoran.*

*Capill. Qis* aa. *mj.*

*Flor. rosmarin.*

*lavan dul.*

*camomill.* aa. *p. ij.*

*sim. fanigr.* *℥b.*

*Ladan.* *℥ij.*

*Incis. superinf. lixivis ex cineribus betula &*

*rad. arund. fact. q. f.*

*Sient per dies 2. vel 3. deinde parum ebulliant, coletur & exprimantur.*

Hoc Decocto abluatur aliquoties, & linteis tepidis abstergetur, postmodum innugatur vel oleo abrotani, vel Unguento sequenti Plasteri:

*℞. Ol.*



N. Ol. Myrr.

*Amygd. dulc. aa. ʒi.*

Cori. rad. Cannar. nst. vcrar.

Сарил. ♀ нст.

*Polytrich.* aa. ʒij.

Сар. мит. и ст.

Arum combustar. &

*Canthar. rubrar. macul. nig.* 22. 3j

Isid. 311.

Mell. 51.

Cum cerâ F. Linimentum.

Utatur hoc xger alternis noctibus, & si spissius  
adhareat, ablatur caput vel lixivio, vel vino  
in quo Abrotanum fuerit decoctum. Ablui etiam  
volunt partes depiles frequentius aquâ mellis ru-  
brâ in pilorum educatione perquam famosâ.

Orbis.

In *Opheis* particula illæ ramulæ sunt abigenda & saluti corrigenda, quod luxuriosis maxime impetratur, istas facile imbibentibus & absorbentibus, sapone etiam odorato ex specificis composito sæpius caput est abluendum.

Total.

*Inna* ut curetur, omne studium eo potissimum tendat, ut fermentum illud peregrinum, confans particulis maximè acris & duriculis, eliminetur, & particule falsæ à priori fuerit præcipitate iterum dissolvantur & sustilificent, ut aut tenues evadant in auras, aut mitigentur & blandiores fiant, ne cutem ulterius erodant. Hoc inter præstantissimos sudoriferos, imprimis ex rad. scabios. lapath. peuced. ligno Juniperito, Salsafraz, Herb. fumar. fol. rorismar. &c. Ex his enim varia componi possunt remedia, sive sint Decocta, sive Essentie, sive aliz ceterorum species, quibus addocienda sunt Oia volatilia viperar. C.C. lumboric. &c. Externe locis affectus aliquoties abluatur Decocto blandiori, ex urina humana, cui radix lapathinalv. tota cum rad. & herb. item piscinocœla sint. Vel hui pisorum addatur aliquod lixivii & caput ablatur. Pro illusione sufficere potest Ol. Çi. per deliq. cum ol. myrrill. aut amygd. dulc. commixtum & apertum. Oleum etiam lancimam cum Aë non rejiciunt. Interdum convesationem ardorem vitandam volunt ut, qui ob eadde depunct immunes.

**Calvitie.**

In Calyce ipsius seminis sequitur pilos den-  
no vel arte vel Marte producti pilos, vis induci  
se permittit ut credant, putant enim decepti-  
tis istis agram ulterius non esse ferre paratam,  
fer arandum, et convenienti succo irriguum,  
fermentaque, non acidia, sed spirituosas & lau-  
dabilia, semel perditura fore irreparabilia,  
*Virgilio lib. 2. Aeneid. Virg. 646, 647. adjuven-*  
*tes --- Sed enim aliud: rari dante levada*

*Sanguis hebet, frigentque effata in corpore vires.*

Proinde in velâz frigidior nudo capiti sit mo-  
lestia, ut curiosiores ornati ad alium fludeant,  
sudentis, ut vel nutra, vel galericulo seu o-  
pillitio artificiali caput obtegan, cum sic alio-  
rum plumis hoc tempore honestas superbie  
liceat. A lue autem venetâ vel phthili indu-  
tam calvitien, post abactos istos morbos &  
correctos succos in sanguine, tandem novis pi-  
bis caput vel sponte vel arte iterum ornari cum te-  
liquis experti prouincunt, adhibitis medicamen-  
tis superiâs iam in Alopecia prolatis, quibus ali-  
quando adijungi possunt liquores limacum &  
linguisugarum, sale in vitro us inspersio pro-  
cedat.

*Cantius* repositit fermentorum spirituosorum  
tum reparationem, tum ad statum debitum  
reductionem, ut succum nutrientem conveni-  
enter disponant, & majori copia ad pilos propel-  
lant, illeque tum spiritibus turgidulis tubulis  
pilorum amplifiet, impleat, filamenta diffen-  
dat, radios luminis circa superficiem pilorum  
aliquantum detineat & variè modifiet, nec tam  
cito dimittat, ut innutriti repercutiantur, quum  
verò in exilucis senibus id tam fit difficile,  
quàm gramen aridum in sœnum jam abiens,  
pristino ornare virore, hinc ab Arte Medica po-  
stulari tentur, quod in ejus non est potestate, &  
quamvis ab adhibitis quibusdam externis colo-  
rantibus aliquando quibus obducatur capillis, ille  
tamen brevi detegitur, fucus autem volupe est,  
huiusmodi aliis facere impossitum, & oculos in-  
tuentium minus acutos ità illudere, illis licet va-  
riis colorantibus pilos suos oppingere, quorum  
species aliquæ inter nostra brevi nunc sumus  
recensuri.

*Pilea* curatiorum tentandam volunt reſol-  
ventibus & attenuantibus particulis viſcoſis,  
quibus ſuccus nactriſ ſcatet, plexus nervulo-  
rum in cute agglutinati & plures conſtitit, ut non  
juxta diſtendunt, ſed manu quaſi prodigè ad  
cuticulæ poros perſeniat, eoſque dilatat, & inter-  
ſticia eorum diſſumpat: quare, ut evaporationi ne-  
ceſſaria ſuſcitetur, corpus, exerceri, & ſudoribus  
frequenteribus alimentum copioſius & ex-  
tendendum eſſe jubent, quod inſpecie per Aſiaticis ſi-  
ſimum, ſeu curatiorum huius, quo tranſitus ul-  
terior ſucco glutinoſo denegetur, fieri poſſet,  
ſucceſſivè diebus ſingulis juxta cutem illud ar-  
didiſ conſtringendo. In *Polonia* & probant re-  
media, quorum virtutes Poloni per experien-  
tiam cognitam habent, & à nobis poſtmodum  
manifeſtabuntur.

In *Perrigine* particulæ illæ acres corrigendæ *Perrigine*  
sunt, ut cuticula non amplius detradatur, unpuritates autem & squamulæ abstergendæ externis decoctis lixiviosis benignis, imprimis malvæ decocto, & pilorum in urina factis, & superius in Tinea iam notato.

Ut *Pila* in locis minus convenientibus incon-  
cinnè exarscent et abigantur, opus est eorū evul-  
sione, quod iisdem cum reliquis præstat, ex  
auripigmento nuntium, calce vivâ & lixivio pa-  
ratū, ne verò revertantur, glandule pilares &  
plexus nervi destruenti sunt, porique cuticulæ  
planè occidendi, & eorum figura transmutan-  
da, cui scôpo adquirendo nonnulli sequentem  
præscribunt aquam destillatam:

R. Cornu vacca,

*Alumin. Rochei,*

*Papaver, nigri añ. tritor, q. f.*

*Sanguinis vaccini recent. ℥ij.*

*Macerentur & destillentur.*

Adhibeat ut omni sero.

Efficacius illud obrinetur, si locus lamina aut ignita uratur, ita enim cuticula plane condensabitur, pori constrigentur, ut nulli pili eam ulterius perforare valeant, simulque succus nutritiens confumitur & exsiccat, quo medio virgines Italice levitatem quibusdam in locis sibi conciliare dicuntur.

In *Fissuris* corrigendis nihil proferunt singu-  
lare, sed media adhibent eadem, quæ ab aliis sa-  
tis jam sunt indicata.

§. 26. Restat jam *nostra* de ratione affectus *Nostri ra-*  
C 2 hoice

no curand  
Alopeciam

hosce curandi sententia, quam pluribus in sequentibus sumus manifestaturi. Quod proinde attinet Alopeciam, Ophiasin, Calvitiem, si pili in iis radicibus extirpati sunt, eos denuo producere velle, esset Aethiopicum & tigrimacolas mutare, uti & ille defectus, quo pori pilorum inter se coalescunt, corrigi amplius minime potest. Quando verò pili quidem depluunt, ita ut nihil de illis, qui deciderunt; reliqui amplius appareat, radicibus tamen ipsorum succoque permanentibus, tunc vel sponte, vel arte adhibita renasci possunt, cum alioquin per totam vitam crescere non desinant. In feminis autem & eunuchis pilos barbae producere impossibile putatur, interim ex catameniorum diutina emissionem quandoque conspiciuntur vultu præter voluntatem barbatae, instar virorum, ne in aliarum coronâ horridiores appareant, fornice aut novacula instructa speculum salutis operis habentes. Ipsam ergo defectum horum curationem prognostico semper præmissio, & desperatum malum relinquentes, pro ratione causæ, quæ primum auferenda, instituiamus. Si ab externa quadam causâ hic oritur defectus, illa prius amovenda. si verò ab interna fiat desilium, ea corrigenda; & cum sæpe fiat ab acrimonia, ante omnia ea exhibenda, quæ hanc emendant, in quem finem conducunt varia absorbentia, tum fixa, tum volatilia. Quando verò affectus hic, ut plerumque contingit, Luem Veneræam comitatur, in hoc casu conducit Galia & ex iisdem præparata sudorifera, ut salix particula ad poros cutis delata, & pilorum radices exedentes prius eliminentur, sic unâ fidelitâ plures dealbabis parietes, curabisque ipsam Luem, & per consequentiam Alopeciam. Sudorifera ex viperis parata hic quoque magni facio, item decocta lignorum cum herbis capillaribus parata, sal. volat. C. Cusis hic egregius est.

Per adnota loco affecto præcipue efficitur, ut pili tum capitis, tum barbae, superciliorum & palpebrarum, qui defluerunt, renascantur, vel etiam illi, qui barbâ constituti debent, copiose producantur, in quem finem plura ab auctoribus nescio quâ proprietate occultâ id facere debeant, commendantur, at quæ rarissime nobis facis faciunt: hinc tantum optima & nostra duntaxat experientiâ approbata hic apponamus. Si oritur hic affectus ab obstructione pororum, frictions & punctiones instituantur sæpius. Prosumt decocta roris marini, abrotani, cum vino facta, vel ex ipsorum cineribus paratum lixivium; vel caput inungatur aquâ Regine Hungaricæ; vel hinc inde illinatur axungia viperarum, vel ex viperis parata Essentia viperina Zorvelf. Laudatur à multis succus raphani & malva parti affecta illitus. Oleum pilorum loco calvo illitum tanquam eporistum remedium laudatur. Job. Crato commendat spumam carnis bubulæ, non valde pinguis, ut locus depilis eo inungatur, sed me semper deseruit id remedium; alii commendant pinguedinem talpæ & serpentum in  $\nabla$  mellis destill. solutam & illitam. Aqua nostra ad Alopeciam Castellana digna est sua laude. Linimentum quoque illud quod ex ladano oleoque lentiscino constat, non contemnendi usus erit. Si verò affectus hic sit ex acerbis salis particulis glandulas pilosas corrodentibus, in principio focus lactis conducet, vel lotio cum decocto malvæ & lapathi: re-

liqua millies quamvis ab auctoribus commendata specifica, famam tamen non sistent, cum hæc non semper satisfaciunt.

In Area præmissis generalibus absorbentibus educantur particulae salæ, per diaphoretica, quibus semper additur aliquid sibi dulcis; hinc conveniunt præ aliis superius iam dictis  $\nabla$  carpatum cum  $\nabla$  mellis, muscarum: item sequens unguentum, quod à pluribus pro secreto habetur.

*n. fol. abrotan. mar.*

*Capill. Quis aa. mj.*

*flav. mellis 3j.*

*Gummi ladan. 3ß.*

*myrtillor. 3j.*

*Sem. fenier.*

*Sem. lin. aa. 3ij.*

*Ol. amygdal. dulc.*

*Vini albi generos. aa. 3ij.*

*Falla infusione per hor. 24. bulliant ad humiditatis consumptionem, F. Expressio.*

In Ophiasin præter universalia commendamus verbasum, Unguent. medicamentos. *Mys.* item oleum papyr. item Linimentum Fontani *Analeit. Observ. p. 36.*

In Tinea conveniunt absorbentia & sudorifera baheaque, & cura ejus potissimum absolvetur abstergentibus & amaris, v. g. absinthio, abrotano, fumar. cent. min. in lixivio decoctis, & pro lavamento usurpatis, item interna omnia in scabie aliis adhiberi solita volatilia. Inter topica sequens conducet, præmissis Antimoniatibus & Cinnabarinis.

*n. Ol. nuc. 3ij.*

*Vini alb. 3ij.*

*Ac. 3ß.*

*Ran. virent. No. v.*

*Tinc. flav. No. j.*

*Serpent. vel*

*Viper. No. j.*

*Coq. omnia ad consumm. vin. & serv. quo linimento tinea bis vel ter de die inungatur calide, capillis prius derasis.*

Si simul scabies adsit fetida, convenit sequens, vel simile Linimentum.

*n. Unguent. rosat.*

*enul. aa. 3j.*

*pulv. saphid. agr.*

*Qui v. v. saliva extint. 3ß.*

*M.*

Qui verò à Urto abhorret, facile enim inde salivatio oboriri potest, sequente uti potest:

*n. Summitat. absinth. Sal. v. v.*

*Flor. centaur. min. aa. mj.*

*Colocynth.*

*Sem. Coriandr.*

*saphid. agr. aa. 3ij.*

*Coq. pro Lixivio, vel F. e cineribus betulae Lixivium. Vel e ciner. sarment. v. v. addito sapone Hippoc. Vel*

*n.  $\Psi$  Ol.*

*Eruginis 3j.*

*Th. xeriaz 3ij.*

*Myrrh. aloes.*

*Camph. picis.*

*M. ad f.*

*F. Linimentum.*

Vetula hic degit, quæ sequente Emplastro Tineas feliciter curat.

*n. Picis nigr. 3vij.*

*Resin. 3ß.*

*pulv.*



pulo. virid. eris

¶ li. Rom. aa. ʒj.

¶ viv. ʒʒ.

coq. i. x.

in massam

extend. super alut: relinq. per 3. dies.

Oleum ¶ per deliquium cum spongiola cru-

stus applicatum raro me sefellit. Vel

ʒ. Ol. Amygd. dulc. q. l.

C. el. ¶ terendo f. Linimentum, addito, si

pediculi urgant, oleo spica.

Si Vermes erodant capillos. Aqua Aloëtica nostra egregii erit usus, cum oleo Colocynth. vel felle tauri matitati huiusmodi item myrrhata, &c.

Vermes.

Calvi-

tiem.

Calvities verò, ubi simul glandula pilosæ deficiunt, reparari nullo modo potest, cum partem corporis omnino ablatam, de novo progignere sit impossibile; sic & ille affectus, quo pori pilorum inter se coalescunt, corrigi amplius minime potest. In calvitie ergo verà, seu cicatrice cutis, vel in eà Alopecia, ubi pilii radicitus erosi sunt, eos restituere velle, esset Tigridis cutem mutare. Prognostico ergo præmissio, curam aggrediamur sequenti ratione. Præmittantur ante omnia, si necesse videtur, unguenta, præparanda & absorbentia. Ad præcavendam & retardandam calvitiam, profunt frequentes frictions moderatæ. Mynsichtus ad Calvitias præservationem commendat Tincuram suam proprietatis, item rotulas imperiales: quo pertinent omniacephalica ambata, moschata, spirit. vin. stomachicus Mynsicht. Inter externa profunt cucuphæ ex cephalicis paratæ, & inunctiones ex ladano, aliisque modicè additingeriis. Hæc omnia ea conducunt, quæ superius de Alopecia diximus.

Canitum.

In Canitie, ubi senes rejuvenescere avertit, & juniores quoque, si in certis locis trica quardam pilorum alba observatur, eam reliquis pilis similem reddere cupiunt, quod sanè arte contortia potius, quàm alius color, instabilis tamen, imprimatur, efficitur, uti videmus in equis, quorum pilis sæpe appinguntur vari colorēs. In senibus ergo varia spiritusola profunt, & spiritus effocillantiæ, Cephalica dicta, hinc prodesset possunt internæ Aqua Cephal. c. V. Aq. Regin. Hung. spir. Cephal. quæ & externæ præ aliis conducunt.

Ad pilos nigros reddendos commendant plures pectinationem cum pectine plumbeo, vel argenteo, aliaque laudant decocta pro ablutione, in lixivio, vel aqua pluviz, aut cisternæ, aut extinctionis ferri, ex gallis, nuc. jugland. parata.

Ad crines flavos reddendos, in quo maxime laborant Gallæ & Venetæ mulieres, commendamus lixivium tingens Mynsichti; abluantur etiam aqua aluminosa & nitrosa, addita ¶ portione, vel paretur oleum in quo rasura buxi, radix chelidon. cureum, croci, aliaque coxerint, addita myrrha. Lixivia possunt parari ex cineribus sarmentorum vitis, paleæ avenæ.

Ad odoratos pilos reddendos herbe odoratæ quævis conveniunt, ut sunt folia majoranæ, flor. lavendulæ, N. M. Molch. Ambr. &c. sapoque odoratus Italicus.

Thiam.

Cum de Pilicæ Germanicæ, ceu longè mitiori, raro consultatur Medicus, adeoque perdifficile sit aliquam exinde habere experientiam, hinc affectus iste in pluribus æstimatur ferè incurabi-

lis. Sanè morbus est contumacissimus, & optimæ etiam eludens remedia, pororum enim conformationem semel à naturâ factam corrigere medicamentis difficile est, uti & gluten istud ex glandulis continuè exsudans, & pilos conglutinans tollere & corrigere summæ artis est. Ante omnia de hoc morbo consulatur Poloni, ubi morbus hic endemius est; genium ergo & incollas, imò aquas aliaque huc pertinentia bene cognoscat Medicus aut equam curam aggrediat. Poloni verò ad cutis capitis poros aperiendos suadent lotionem capitis per decocta ex aperientibus & emollientibus parata, inprimis ex branca ursina & lupulo, quibus betonica & lycopodium adijci possunt. Maxime verò tum externè, tum internè commendant muscum terrestrem, ipsi plicariam dictam. Muscum illum terrestrem cum branca ursina aquæ fluvialit, q. f. ad flavedinem coquunt, hocque decoctum aut sumunt perse, aut cum ovis in forma juculi quotidie bibunt & comedunt. Externè verò cum decocto hoc instat lixivii parato caput bis per septimanam lavant, nullo amplius adhibito pectine, donec capilli sese explicare incipiant, unde necessariò progressu temporis ita sese extricare solent. Decoctum etiam vitis, hederæ, bryoniæ, falsaparili, commendant. Nos existimamus hunc morbum curari debere instar huius Quæ, quare quæ in Plica certissimum existeret potest remedium, qui optimus lymphæ domitor existit, interpositus variis aperientibus, præsertim Elessentia viperina, alexiph. liq. C. C. succ. quæ remedia maxime corrigunt vitia lymphæ quæcunque. Ad primarium vitium vitium corrigendum, conducere possunt Emedica vitiora, dein ad lympham glutinosam corrigendam, & fluxiorem reddendam, porosque confirmandos conducunt alexij harnica & sudorifica. Inter Topica sequens Linimentum Cæphali pro arcano censendum.

ʒ. Herb. Maje. terr. ʒr. & repent.

Rad. bryon. aa. p. ʒq.

Adip. Erinacei q. l.

In vase vitreo coq. in B. M. per horam, & f.

l. a. Unguentum,

cum quo radices pilorum complicatorum & loca affecta, maxime articuli dolentes bis in die inungenda sunt. Hic & proderit Axungia vel Elessentia Viperarum. Abicissio cirrorum horum non temerè tenenda est. Vide de his elegantem observationem Dni Præsidis nostri De cur. 2. ann. 2. Obs.

In Porrigine omnia conducunt, quæ lymphæ falsedinem & acrimoniam corrigunt, ut sunt præter gualia, jam dicti liquores viperinæ & volatiles succinati, Salia volatilia oleola, Elessentia Finnar. lignor. Rad. saponar. bryon. possunt cerevisiæ indi, vel ex his parari Tincturæ & Elessentiz, inprimis pulvis noster spasmoticus Cinabarinus.

Topica hic adhibenda sunt absque adstrictione. Abstergentia ita dicta præ aliis conveniunt, qualia sunt sors ex decoct. sænigr. cent. min. Item conveniunt ol. amygd. amar. Ex nitro, ¶ & Quod quidam variapant linimenta.

Ubi Pilii in locis non convenientibus crescunt, Inconveniam pilorum excrescentiam.

conducunt omnia pilosiora dicta medicamenta. In hoc casu linguis ab ichoribus & serositatibus prius purgantibus hydragogis pluribus munde-

tur, & sudores in balneo præmittantur. Pilosiora

C 3

thra dicuntur illa medicamenta, quæ caustica sua vi potissimum agunt, qua urendo ut abscedant, efficiunt, & si validius agant, vehementer adurunt, ut etiam radicibus absument cicatriceque inducta pili non amplius renascantur, efficiunt. Optimum pilothrum paratur ex calce viva & auripigmento, beneficio olei cuiuspiam, vel lixivii; hinc adeo præstans est Unguentum de Calce viva *Mysabit*. Tutæ suum habent rustina, quod paratur ex calce viva & Sale alcali dicto cum argilla ingobos reducta & sic locis pilosis applicat. Lac suillum illitum à nostris mulierculis laudatur. Unguentum aurei coloris, quod, ceu superius, paratur ex p. 2. calc. viv. & auripigment. p. j. Succum thymalorum, Hyosciami, cicuta, bryonia, fumariz, betæ, semperviv. alii comendant, & sanguinem vespertilionis calide illitum; quæ omnia poros cutis circumfodiunt quasi & destruunt, viscidum pilorum nutrimentum fundunt, liquant, sufficiantur. Inuncto felle anguilla pilorum proventum inhiberi narratur, sed monum mihi persuadere possum, dari constans ac infallibile pilothrum, quod præstet ut nunquam iterum pili crescant, quale quidem *Helmantius* sibi notum fuisse gloriatur, liquorem scil. quoleniter intincta nianus & exsiccata si mentum viri attingeret, paulo post excidere pilos barba,

superciliorum ac totius capitis; lib. *Penier* inscrip. Destituti hoc remedio, lamina aurea locus urendus est. Et sequens Dropax pilos elevans Plateri.

*R. Resin. laric. vulg. circiter 4. cochlear. add. mastichi subtiliss. trita instar avellane, dissolv. ad ignem & parum coq. postea effunde in lebetem in quo aqua sit frigidissima dein manib. malaxeat & in magdaleonem rotundum formetur, qui in aqua ut adbareat servetur. Hujus portione dilata supra cutem pilosum applicata, ubi adhaeserit, iterum detrahatur, pilique in emplastro evulsi habebunt, & si quid de emplastro remaneat, ol. amygd. perfricatione recedet.*

Pilorum *Fistula* à pluribus negliguntur, si *fissuram*. tamen huic malo quoque emendationem quispiam desideret, fissi pili pars tenuior erit ulterius detrahendi, singulos pilos dividendo, atque ea, quæ remanet, circa extremitates felle, vel aqua nostra aloëtica inungenda, eaque postea decocto quodam pilos regenerante, ex abrotano, rad. cinnar. facta, eluenda.

Nonnulli nimis curiosè mucilage aliquâ, visco aut collâ divilos pilos rursus conglutinati tempus inutiliter perdunt, quod he de nobis similiter dicatur, à prolixiore leviculi hujus affectus designanda curatione merito abstinemus.

### CAPUT III.

#### *De Contusione Capitis, & Pericranii Vulneribus.*

##### §. 1.

**A**B affectibus Capitis internam causam potissimum agnoscendis nunc progredimur ad illos, quorum origo extrinsecus à re violentâ fortius illapsâ, & continuum solvente provenit, quicquid vehementioribus doloribus & gravioribus stipati sint aliquando symptomatis, citius etiam Chirurgi manum expolcent. Tractabimus autem in præsentiarum de Contusione capitis, & Pericranii Vulneribus.

*Contusio*, Græcis *Θλάσις*, dicitur de morbo & specie solutionis continui, cum grave vel durum aliquid supra corpus incidit, ac id ipsum collidit, & sic continuitatem solvit, citra deperditionem manifestam substantiæ, aut externam rupturam, ubi plerumque in parte carnea cruor ex venulis vel arterioli evasatus sub cute colligitur, hinc & aliis fuffusio, nonnullis fuffillatio dicitur, quia venæ & arteriæ exiguæ, imò & vasâ lymphatica sub cute rumpuntur; Contusio in specie dicitur cranii vel calvariæ recessus & incurvatio à violentâ illusione absque fracturâ.

*Descriptio.* Describi ergo potest Contusio capitis, quod sit evasatio & stagnatio sanguinis sub cute capitis à solutione & ruptione vasorum sanguiferorum.

Vulnus verò Pericranii describi potest, quod sit continui solutio in partibus mollibus & carnosus, cum pericranio & periostio ab instrumento aliquo externo pungente vel secante facta.

§. 2. Cum verò Vulnera capitis nunc ma-

jora; nunc minora sint, atque casim vel punctum infligantur, nec ad eandem inferantur mensuram, sique mille modis variant, variæ à Autoribus recensentur differentiæ, quas communiter in essentialia & accidentalia dividere solent; illas desumunt à vulneris essentia, partes vulneratæ conditione & causa, has verò à fendi modo, situ & tempore. Vulnus sæpe cum contusione conjunctum est; sed hæ differentiæ tantum confundunt Chirurgos, & nil ad curationem faciunt.

§. 3. *Contusio* capitis subiectum sunt omnia *Part. aff.* capitis velamenta, & in iis existentia vasâ sanguifera & lymphatica; sic nuper vidi contusionem, in qua nihil præter serum sub cute evasatum fuit.

In *Vulneribus* capitis pro parte affectâ eadem vasâ cum cute & reliquis carnosus & membranosis partibus agnoscimus, nominatim pericranium & periostium.

§. 4. Quoniam Contusiones & ipsa vulnera *Diagnosi.* Capitis, quoad externam nempe faciem, insensu incurrant, inanem ludere operam, si recensendis signis diagnosticis diutius immorari vellem, quod verò ipsorum interiore attinet statum, situm, & magnitudinem, ea non nisi sagaci conjecturâ & accurato Medici judicio sciri poterunt, siquidem non semper facile indicari sit, quæ partes internæ vulneratæ sint, & quousque vulnus penetraverit, cum tale scrutinium scientiâ Anatomica, & diligenti partium actionum læsarum, nec non excretorum exami-

*Descriptio.*



# CAP. III. DE CAPIT. CONT. & PERIC. VULN. 23

nunc nitatur; sed hæc Contusionibus capitis facile accidere possunt varia pessima signa, præsertim si ex violenta contusione simul cerebrum fuerit concussum, unde accedunt vertigines, Cephalalgia, auditus difficultates, splendores ante oculos, visus debilitas, omnium artuum lassitudo, memoriæ abolitio, Epilepsia, Convulsiones, Apoplexia, Lethargus & Mania; ex ejusmodi violenta contusione noviquendam cœcum factum, alium surdum, alium apoplecticum, alium planè deuentem redditum observavi. Sic etiam si pericranium fuerit læsum, per plura id indicatur signa, ac eadem præbet, quæ videmus in nervis læsis, vomitus enormis follet ægros infestare, quare in vulnere capitis imprimis videndum, an æger post ictum in animi deliquium incidat, an vomuerit, an mens ipsi conlitterit, nam si hæc symptomata apparent, denotant, sanguinem aut in cerebro aut in meningibus esse extravasatum. Si absint delicta & febris, signum est nullam adesse inflammationem, nec extravasatum esse sanguinem in cerebro, sed potius serum.

*Ætiologia Contusionis juxta Galenum.*

§. 5. Contusionis capitis causa juxta veteres Galenicis est res externa gravis, ponderosa & obusa; quæ caput vel percutitur, vel alia quadam ratione offenditur, ut dum casu aliditur caput parieti, vel alii cuidam rei dura, ita ut cute externa permanente integra, subjacentia vasa sanguifera rumpantur, & sanguinem effundant, qui cuti subjectis eandem diffendit, doloremque & tumorem suscitatur, & ulsi in tempore discutitur, tandem ablit in putredinem.

*Vulnere.*

Vulnere Pericranii causam agnoscunt rem externam acutam vel punctum, vel casum, vel casu super cutem ad pericranium penetrantem, ejusque continuitatem se, jungentem & dissolventem.

*Iuxta Paracelsum.*

§. 6. Paracelsus similiter Contusionis causam admittit vel casum vel percussione, à quibus sanguis in ea capitis parte, in qua istæ contingunt, congelatur & corripuitur.

Vulnere Capitis cum Pericranii læsione causam existere vult instrumentum quodcumque ita acutum, ut non modo cutem, sed etiam subjacent pericranium possit dissolvere, ex quoque deum fabricatum fuerit materia, lapidea nempe, ferrea, lignea, vel alia, sive casu, jactu, aut percussione caput offendens & continuitatem se, iungens.

*Iuxta Helmontium, Walsley, Sylvio & Carlesianum.*

§. 7. Eadem Helmontio, Walsley, Sylvio & Carlesianis de morborum istorum causis cum prioribus stat sententia, statuentibus nempe, Contusionem vel ictu, vel casu à re quadam externa dura & obusa excitari, unde cute non solum venula vel arteriola conuulsione dilacerata sanguinem profundunt, qui extravasatus, nec in debitas vias regrediens cutem extollit, & pro majori vel minori sui corruptione filamenta membranæ & cutis nervulos plus minus exagitant, vel vehementiorem, vel remissiorem causat dolorem; Vulnus etiam Pericranii à re quacumque externa acuta & continuitatem dissolvente fortius capiti illato fieri, unanimiter fatentur.

*Iuxta Helmontium, Sylvium & Carlesianum.*

§. 8. Nostra ex sententia Contusiones capitis aliarumque partium, & inde subsequentes suffusiones sanguinis oriuntur ex causa externa, à contundendo, & fere eandem cum inflammationibus genuinis habent naturam, in his enim

Contusionibus obervatum sanguinem vel lympham, vasque & poros compressa vel lacerata, adeoque sanguinis & lymphæ motum impeditum, oritur tumor & livor partium contusarum. In Contusionibus levioribus & fere superficialibus non multum effunditur sanguinis, nec fit cum laceratione plurimum partium carnosarum & nervosarum, & hæc Contusiones insensibiliter discuti possunt. In gravioribus verò plures contunduntur partes, hinc necesse est, ut suppuratio subsequatur, suppuratio enim nihil aliud est, quam partium contusarum mortificatio; in gravissimis verò cum maxima laceratione carnosarum & nervosarum conjunctis Contusionibus gangræna oboriri potest, cum sanguis ibidem hærens, cum reliquis succis circumstantibus, facile partibus jam laceratis, & spiritibus animalibus destitutis mortificationem inferre possit. Ipsi verò Contusiones causa immediata assignanda venit nostro iudicio contusioni & acrimoniæ spirituum animalium, à qua aliquando vasa rumpuntur. Causa proximior videtur statuenda ipsa Contusio ab instrumento duro, gravi atque obtuso, ipsi cranio & pericranio illata.

Concinnè summus Philosophorum Caput *Causa Vulnere* vocat membrum divinissimum, & reliquorum *Primum Causam* omnium in nobis princeps. Regimen ibi san-

ctus est Anima, & ipsius Vice-Regis Microcosmetoris, h. e. spirituum seu succi nervi in minutissimis tubulis in cerebro existentium; statuti ibidem duo illi Animæ divini circuitus, seu ut Tullius dicit, motus animorum duplices, alter cogitationis, alter appetitus; quorum illi sensus, huic motus ancillatur, ut ad omnem intuitum præsto sint. At etiam hic omne vitium morbosum tantò conspectus in se crimen habet, quanto majus quod peccat habetur. Verissimum est & alterum avertum, hanc licet sensus & prudentiæ sedem, præ reliquis tamen esse imbecilliores. Vilitudine tum aliàs, affectibus capitis hic conspicuus, tum si externis impetatur injuriis. Jam paucis de hujus Microcosmetoris Metropolis vulneribus agamus.

Itaque omnia quæ sunt acuta, quæ admodum dura ac rigida sunt, quæque vini habent uicidendi, contundendi, perforandi, meritò sub causarum medietatum nomine veniunt, qualia sunt sagittæ, gladius, acus, hasta, dentes animalium, globi sclopetorum, aliaque innumera, quibus cutis capitis dilacerari ac dividi potest. Rarò verò vulnus capitis absque aliqua contusione fieri solet, & cum ictus vel solutio contingit, fit ut & separetur sensibilis illa membrana pericranii, cranio scil. impolita, orta à dura matre per cranii futuras exeunte. Quidam eam distinguere solent à periostio cranii, cum separari possint à perito Anatomico, alii unam & eandem esse membranam contendunt. Causa ergo immediata vulnere ipsius est soluta unitas recens ac cruenta; Intumescentiæ causa est humorum circulantium stagnatio, indicat enim obstructionem circa vulnus adesse.

§. 9. Conspectus hucusque satis quæ ad Prognosticam faciunt, nunc dicenda restat Prognosis Contusionis salutis & mortis. Hoc ab initio notandum, quod Contusiones capitis omnium sint pessimæ; delirant aliquando, & minacibus verbis ac gestibus adstantes invadunt, nec eos agnoscunt, & delirium ad plures durat dies, cœu exemplo *VVideliis*



*VV*ideli obf. 7. Dec. Ann. 5. Eph. Germ. conftat. Contufio eft etiam morbus magnus ratione effentia. Contufio graviffima prae cæteris eoquejor, quod majorem contuffione corpori factam notat; magnus etiam intuitu remotioris à ftatu naturali difpofitionis & fymptomatum; magnus præfertim ratione nobiliffimæ fedis animæ & Microcefimetoris. Juxta *Hippocr.* lib. 6. aph. 18. non tantum illa contufio & vulnus eft letale feu lethale, quod ad cerebrum ipfum pertingit, fed & quod concutere nimis ipfum, & incolas vitæ autores pellundare poteft. Si febris & vomitus adiunt, peffimum eft. Sic in puero Hanovienfi furoris filio, qui à folâ contuffione capitis incidebat poft mentem in vomitum, quem comitantur deliria, tandem accellere convulfiones, & fic Creatori fuo animam reddidit; in cerebro poft mortem repertum fuit cochleare plenum feri limpidi acris evalati.

*Prognofis  
vuln. Pericranii*

Vulnera pericranii, ut & omnium partium membranofarum gravioribus ftipata funt fymptomatibus, hinc periculofiffima, & ideo prudentem Medicum & appropriatæ expofcunt remedia. Contufio feu fpalmus in vulnere capitis fupervenienti periculofa eft, docio *Hipp.* S. 5. aph. 2. Si, juxta *Eundem*, in magnis vulneribus & pravis tumores non apparent, ingens malum. Vulnus cum febre inflammatoria, dolore ac convulfivis motibus, monftri quid alit. Si Pericranium aut Perioftium in totum fuerit recifum ufque ad calvariam, minus intendit periculum, quàm fi fit ex parte tantum laceratum. Sic & vulnus capitis punctum inftictum plus habet periculi, quàm quod cefum factum. In iis, qui Gallico vel feorbutico laborant morbo, diffidilius fanantur vulnera, quàm in aliis, quia in his peccat ut plurimum humor acido-corroſivus, vulnereum fanationi apportans impedimentum. Sic & vulnus capitis magis aut minus periculofum eft, prout huic vel illi loco capitis parti infligitur. Sic vulnus occipitis ubi craſtitiem offis minus periculofum æſtimatur, quàm in offe bregmatico, quia officulum tenerum & vicinum futuris eft. Sic & vulnus temporum, ubi muſculus temporalis contectus eft pericranio, maxime periculofum eft, & quia in his locis arteria & nervus laefus fpafmum facile inducere poteft, hinc & fæpe ob hunc muſculi oppoſiti contractionem oritur oritur turtura. Vulnera capitis quò diutius fuere aëri expofita, eo facilius ſphacellantur, quale exemplum habui in milite Hanovienſi, & ruſtico Hallo. In ſubjecto caecoſymico, & æſtivo tempore, vulnera hæc capitis denotant anguem latere in herba. Vulnera venenata ſub pelle vulpinâ ex inſidiis ſuam exercent tyrannidem, quæ ergo ſegnes Melicos & lenta remedia non expetunt, quare hic momentum temporis eft obervandum. Pus verò laudabile & maturum mox apparens, tanquam teſtis materiæ bene temperatæ Medicum conſolat. Reliqua peti poſſunt ex capite de Vulneribus in genere.

*Cura Diſtincta*

§. 10. Ordinis vult ratio, ut ad curam, & quidem primò *D. Medicum* nos accingamus. Aër ergo fit temperatus ad calidum vergens, reliquus omnis vitæ ad ſurgens pejus, & quocumque modo à vulnere arcendus, imprimis acidofitroſus, utpote qui ſolus ita deſtrudere poteſt poros, & ſuccos coagulare, ut gangræna apereantur ſenſitæ, ſi enim recens vulnus in mo-

mento concludi poſſet, ut nec aër externus irrueret, nec amplius quid à vulnere efflueret, à naturâ ſolâ vulgo ſic dictâ brevi conſolidaretur vulnus; ſedulo ergo mox tegendum vulnus, inter deligandum lintamine calefacto prius, ut ab aëre ſic magis defendatur.

Victus ſit tenuis, cibis eligatur optimus & talis, qui particulas nutritivas & ſuaves admodum ſectum vehat. Potus fit calidus mediocriter, cerevilia fecibus orbata, herbis cephalicis maritata, & pro re natâ decoctum cephalicum ac traumaticum prodeſſe poteſt. Vini ulus nimis interdicatur, conceditur verò in modica quantitate cum oculis Cancræ.

Somnus paucus vitetur, quies cordi habeatur.

Animi affectus ſint pacati, exilent præ aliis ira, terror, triftitia, ſpiritus nociva ſingula. Hinc adverſarii quocumque adventus aut præſentia caveatur, ne ſucci circulant periculum creent reliquis ſpiritus animalibus.

Venus ceu ipſa peſtis fugienda, quia cerebrum nimis commovet, & humores ſtagnare facit: vitetur imprimis in vulneribus capitis uris, cuius noxam vide apud *Hildanum. Cent. 1. Obf. 23.* Juxta *Galienum* Curæ Contraſentis.

Exercenda promoveantur.

§. 11. Nunc hiſ præmiſiſis ad curam *Pharmaceuticam* nos conferamus: aliorum de ea ſententiam prius præcepturi, quàm noſtram aliis obtrudamus. *Galenus* ergo in *Contuſionibus* capitis levioribus imponunt medicamenta, uti dicunt, exſiccantia, quæ ſua vi eſſe emplaftrum Iſis, de heronica, & matreſylva & Græcia Dei; quando verò partes illæ valde ſunt trite & laceratæ, ut reſtuum nequeant, ſed plantæ emoriatur, nec eſſe ſtatui eſſe, ut ſuppurentur, quare ad promovendam ſuppuratorem adhibent unguentum ex reſina terebinthina, vitello ovi & oleo roſaceo; Suppuratis iſtis partibus accedunt ad detergentia, luccum videl. apii, farinam erivi, fabaram, hordei, lupinorum, quibus admixcent mel roſaceum & loco affecto imponunt. Si verò ulcera appareant ſub contuſione eava, incidunt cayum iſtud tranſverſum, & deterſo ulcere ea tandem adhibent, quæ carne ulcus adimplent, quæ ſunt pulvis ex thure, iride, aſtillochia, panace, farina hordei, fabæ & Emplaftrum nigrum Aſiæ, aut quod ex Gummi elemi paratur.

In *Vulneribus* capitis cum Pericranii læſione rite curandis reſpiciunt tum ad ſanguinis aliorumque humorum affluxum, tum ad dolorem, tum ad ipſum morbum ſeu vulnus. Sanguinis, vel aliorum humorum affluxus, qui cauſa interitæ rationem habet, ſi inflammationem ſuſcitât, eam propulſandam vel ſubmovendam volunt, omni ſtudio adhibito, ne ſanguis in corpore vel contrahatur, vel jam contractus ad locum affectum affluat, quod impetrare conantur tenuiſſima victus ratione, ægro ſolùm concedentes panem ex aquâ madefactum, aut elixum, vel cremorem hordei, aut pulſicalem ex panetrito cum ſucco anygdal. dulc. loco potius verò decoctum hordei cum glycyrrhizâ, & in tali dieta ad diem 14. perſiſtere ſuadent. Pro majori averſione ſanguinem vena ſecta emittunt, & quidem in cubito & regione iplius vulneris. Purgationem quoque præſcribunt, maxime ad evacuantium bilem, quam tantopere in vulneribus credunt noxiam. In tenerioribus clyſteres exhibent paulum accriores, ſanguifugas ano, & cucur-

*i. h. ut ut  
curatus  
rei ventis  
tempeſta.  
mur parti-  
culis ſan-  
guinis  
maſſa chy-  
loſa balia-  
mici &  
glutinan-  
tibus reſer-  
vatur.*

*Juxta Ga-  
lienum Cu-  
ræ Contra-  
ſentis.*

*Vulnera.*

# CAP. III. DE CAPIT. CONT. & PERIC. VULN. 25

ne pars affecta sanguinem & humores suscipiat, ei adhibent repellentia, interdum, si opus sit, cum fasciis, quæ tamen ubivis in capitis vulneribus non requiruntur. Inter repellentia ista præ aliis laudant vinum nigrum austertum, cui quidpiam de oleo rosaceo sit immixtum, vel medicamentum ex thur. part. ij. aloës part. j. cum albumine ovi subactis, admixtis pilis leporinis. Dolor in locis incisis, imprimis teneriori illa membrana pericranio, ut sedetur, instillant oleum rosaceum tepidum, vel sanguinem turturis aut columbæ adhuc calidum, cuti verò vulneratæ applicant vitellum ovi cum oleo rosaceo subactum. Vulneris tandem ipsium, si simplex sit & sine contusione à sola sectione illatum, solam unitatem desiderat, quæ sæpe à sola natura sive à succo nutritio balsamico agglutinando perficitur, & quidem in pericranio, interveniente procreatione carnis, ita ut Medico eo solum sit adlaborandum, ut oræ parvis vulneratæ distantes iterum adducantur, sordes detergantur, & humor carnis procreationi aliàs exilens impedimento exsiccetur. Oræ ipsius plagæ non tantum semel debent adduci, sed adductæ etiam servari usque dum penè sint agglutinatæ, ad quod acu & filo interdum opus est, ut ita alligari possint. His peractis ad medicamenta sarcotica pervenitur, quæ componuntur ex iride, aristolochiâ, thure, farina hordei, fabar. &c. vel forma pulveris inspergenda, vel emplastri imponenda; quibus subiungunt emplastracatagnatica, & potissimum cephalica, ut sunt Emplastrum de Betonicâ, de Gratia Dei, Conciliatoris. Denique cicatricem inducunt medicamentis siccantibus & adstringentibus ex malicorio, gallis, cadmiâ, plumbo usto, squamâ æris, & similibus.

**Paracelsi** §. 12. *Paracelsus* in *Contusionibus* istis capitis externis perungit locum affectum oleo laterino, & postea ligat cum aceto rosaceo. Laudat etiam tanquam præstantissimum Oleum Hypericonis, ut eo aliquoties illinatur, ita enim sanguinem coagulatum faciliè resolutum iri promittit, cui usui & olea vulneraria, balsama, & ex fodicationum emplastris tracta commoda fore testatur.

**Vulneris pericranii.** In *Vulneris* istiusmodi capitis & pericranii durandis omnem rejicit suturam, & quicquid ex ovorum pulvis & resinis illis inmittitur, eaque per solum nutrimentum vult curanda, ita tamen, ut si jam depravata sint, à fœtore & corruptione repurgentur. In principio mitissimè cum vulneribus istis agere suadet, impositis medicamentis ex vero fundamento compositis, & ab intrinsecis inimicis defendentibus. Linteum igitur tenne, vel byssinum velum, oleo vel unguento vulnerali & calido madidum superponit vulneri, sic ut fundum ejus tangat, intacta & illæsa piam matre. Olea verò & Unguenta talia sequenti modo parantur.

- ❧. *Ophiogloss.*
- Pitol. min.*
- Agrimon.*
- Diapens. aa. Mj.*
- Flor. Hypericon. Mij.*
- Consolid. maj. coct. Mß.*
- Lumbric. purgat. No. C.*

*Affundatur corpus, seu oleum, & in sole digerantur omnia suo determinato tempore.*

- ❧. *Butyr. majal. lb. iij.*
- Rad. Consolid. maj. virid. lbj.*
- Lumbricor. purgator. lb. ss.*
- Aristol. rotund. virid. 3ij.*

*Terantur omnia simul in pulvis, & postea repantur in locum frigidum, & si pinguedinem emittant, eam abijcere licet. Poterit etiam soli exponi, vel in fimo dgeri, & postea ad usum servari.*

Vel

- ❧. *Resin. laric. lbj.*
- Ovor. vitell. No. xx.*
- Continuè simul omnia, fiet inde statum unguentum, huic impone*
- Consolid. maj. optimè trita 3ß.*
- Aristol. rotund. coctus 3j.*
- Farin. hord. 3vj.*
- Conterantur simul omnia, &*
- F. Unguentum.*

Postmodum sulcum implet medicamento ex herbis & floribus in oleo vulnerali contentis, & prius expressis, postremo fodicationum unguentum superponit, ligatque, donec patiens melius habuerit, & roboratus fuerit, quod in octo vel novem diebus plerumque fieri confidit. Hinc cum patienti feliciter res succedere videatur, oleo balsamino cum curat, quod pluriâ leniter illinit, & unguentum superponit, tandem fodicationum unguentum sequenti modo paratum adhibet ad finem usque curationis, & omnimodam vulneris curationem.

- ❧. *Cera Virgin. lbj.*
- Picis Græc. lbj.*
- Terebinth. 3ij.*

*Liquefiant igne lento, quibus impone triacmasfic. 3ij.*

- Curab. flav. 3ß.*

*Maneant in igne lentissimo quartam hora partem.*

- Postmodum accipe*
- Mum. 3j.*
- Thur.*
- Myrrb. aa. 3ß.*
- Aloepat. 3ß.*

*Triamisce percolis, & agita semper statula donec frigeant. Postremo in emplastrum agitentur oleo seu axung. pisc. Alchia, addendo camphora tria 3ß. Serv. ad usum.*

In levioribus autem vulneribus uno solummodo medicamento sine illo metu procedit. Remedia etiam interna non omittit, potiones videl. vulnerarias, inter quas sequens aliis præferenda:

- ❧. *Diapens. velsanica,*
- Pitol.*
- Centaur.*
- Beton. aa. Mj.*
- Consolid. regal. Mß.*
- Argimon. Mij.*

*Herba hæ omnes indantur cantharo clauso, & pulvis bene munito, & aqua serventi imposito: Coquantur octo horis per se, vel addita pauca aqua, Liquor excolli servetur pro usu:*

qui commodior est, quàm si in vino fuerint coctæ, quod in capitis vulneribus potissimum noxiū habetur. Ita etiam cibos pro vulneratis hisce parare docet, ut nempe illud, quod pro cibo patienti adhiberi debet, carnes aut gallinæ, in cantharum ponantur, cum aquæ tanta quantitate,

D

tute, quantum juris habere quis velit, additis herbis vulnerabilibus, atque in cantharo obturato coquantur in cacabo fervente aqua pleno, suo tempore conveniente, quem cibum vulneratis hinc retur utilissimum. Si quoque æger tertio die aut paulo diutius à vulneratione de obstructione conqueratur, concedit illi laxantia, suppositoria nempe. & si ista non satis juverint, cascariam fistulam exhibet, aut electuarium ex succo rosarum, aut benedictam laxativam, vel portiones ex decocto folliculor. senæ, polypodii, &c.

*Helmontii* §. 13. *Helmontius Contusioni* superponit bryoniam albam rasam, & paucis horis cruorem illum resolvi ait in aquam, quam pariter per cutem exigit.

*In vulneribus capitis.* In *Vulneribus* commendat alkalica & herbas vulnerarias operari docet virtute cujusdam innati alkali, lapidem itaque cancorum præcellentem existimat, quatenus omnem vulnerum acetositatem corrigit, si cum vino potetur, cum lapidis iste in vino facillime vim atque saporem laxivum inducat, proinde Medicis persuadet, ut vini usum minime horreant in vulneribus, siquidem eo ipso, ut sapit alkali, vini vires quæ proprietatem amittat. Simili modo & alkali è tiliâ feliciter propinari credit, imprimis colcotar laudat, quod omnem vulnere corruptorem enecat, uti & sal Q per spiritum vini rectificatum, donec adstringentem gustum nanciscatur. Solutionem continui mox conglutinari promittit per collam è corio hominis violenta morte & integris viribus perempti. Interdum ab omni influxu lunæ cavere præcipit, cum istæ vulneribus maximopere noceat, putredinem inducat & Archeum valde irritet.

§. 14. *Vulnus* in *Contusione* simplici adhibet discutientia externa, vel formâ totus ex decocto rad. aristol. rotund. polygonar. fol. beton. verben. sal. char. fol. flor. Camomill. Hyperic. sem. fenic. lini, lumbric. &c. in vino coctis, vel linimenti ex ol. Camomill. Hyperic. mucilag. sem. lini, gummi tragacanth. In gravioribus, ubi sanguis extravasatus discuti nequit, venæsectionem instituit, revulsione gratiâ, & pro attenuatione & pororum aperture sudorifera medicamenta propinat. Quando verò sanguis ob sui copiam vel crassitatem neque attenuari & discuti, neque in venas resorberi potest, eundem vel suppurari permittit, vel ante suppurationem per scarificationem elicit, adhibitis, si opus est, illis, quæ à gangrenâ præservant, tandem locum affectum ad sanitatem perducit emplastro de betonica cum succino & mastiche.

*Vulnera* ut ritè curentur, sedulo vult observandum, ne quid extrinsecum admittatur, quod partem corrumpere, & genus nervosum cum incolis ejus spiritibus animalibus irritare possit, quare omnis aer & imprimis frigidus arcendus, vulnus studiosè obtegendum, & spiritus ad sua munia revocandi sunt, ne nimia copiâ ad partem affectam influant, & sanationem non modò impediunt, sed graviora inducant symptomata; proinde venæsectionem instituit, & si obstructio urgeat, laxantia adhibet, ne pravi humores cumulentur, subiungit deinde corroborantia & vulneraria, v. g.

Rad. bardan.

Aristol. rotund.

Caryophyllat. aa. ʒj.

Iris Florent. ʒb.

Galang. min. ʒij.

fol. beton.

verben.

salv.

veron. aa. Mj.

flor. Hyperic.

ros. aa. pij.

Ebor. ras. ʒi.

Cog. in ag. font. ʒiiij. ad tert. part. confirm. edule. Syr. de Pæon. & de beton. aa. ʒib. Detur ʒiiij. vel vj. pro dosi.

ʒ. Conseru. flor. beton.

salv. aa. ʒij.

Nuc. jugland. condit. ʒb.

Rad. Pæon. mar. pulv. ʒij.

ligni aloës,

sancti citrin. aa. ʒj.

Corall. rub. pp.

Margar. pp.

Ebor. aa. ʒib.

Sal. verben. ʒj.

Syrup. veron. q. f.

F. Opiata; de quâ nucis moschata quantitas aliquoties assumenda.

ʒ. Ag. Ceras. nigr. ʒij.

verben.

ulmar. aa. ʒj.

Spir. C. C. ʒij.

Syr. flor. Paralyf. ʒj.

M. Detur cohibeat.

Externè non omittit promoventia suppurationem eorum, quæ partim vulneratarum unionem impedirent, nec non vulnus mundantia, agglutinantia & consolidantia, qualia sunt Balsamus de Capivâ, de Peru, Ceratum de Betonica, Diadictamnium, Emplastum Oppotel-doch Paracelsi.

§. 15. *Sylvius* ad resolvendum sanguinem coagulatum in *Contusionibus* potissimum utitur salibus volatilibus, tam externè, quàm internè; si verò resolvî nequeat, suppurationem promovet, inuncto parti tumentis Unguento Agrippæ, vel de Althæâ, cum oleo lil. alb. & impolito emplastro diachylon simpl. deinde loco aperto pus genitum educit, eoque educto ulcus mundat & consolidat Balsamo ʒis terebinthinato, vel anisato.

*Vulnera*, si omnia prius remota fuerint obstacula, & labia invicem adducta, non ita difficulter externis balsamicis & conglutinantibus sanatum iri confidit; pericranio verò læso, ne spasmus contrahat, ab initio statim aliquid olei destillati ceræ, vel balsami terebinthinæ præcipit instillandum.

§. 16. *Carsenius* ut rectam administrant *Contusionum* capitis curationem, seduli sunt in observandis earum gradibus, aliter tractantes leviores & superficicias, aliter graviori, aliter adhuc gravissimas. In *leviori*, ubi ex venulâ vel arteriola ruptâ parum sanguinis effusum leviculum tumorem & dolorem suscitât, discutientia solum adhibent externa, poros aperientia, & sanguinem ita resolventia, ut facile exhalât. Forum ergo applicant ex spiritu vini, in quo rad. polygonat. Symphyr. fol. beton. salv. char. resol. flor. Camomillæ Roman. Hyperici, seminumini, anisi, &c. macerata sunt, vel spiritum lumbricor. calidè illinunt, à quo brevissimo spatio omnes suffusiones à quacunque contusione aut verberatione inductas disparuissè observant, imprimis si parum camphoræ in eo dissolutum fuerit, vel sequens inungunt Linimentum.

ʒ. Ung. ʒ.

# CAP. III. DE CAPIT. CONT. & PERIC. VULN. 27

¶ *Ung. de Cynogloss.* ʒij.

*alabastr.* ʒj

*Ol. Hyperic.* ʒiib.

*d. Camomill. smaragd.* ii. ʒb.

M.

In *graviore*, ubi plures veniæ vel arteriæ laceratæ ma oeni sanguinis effuderint copiam, qui stagnando coagulatus attenuari nequit, ad promovendam resolutionem internè aliquoties exhibent sudorifera dissolventia, attenuantia & poros ulterius dilatantia, ut sic exhalationem fortius instigetur, qualia sunt oculi canc. Gum diaphoret. *Volat. C. C.* humbricor. decoctum bardanæ & Sanæmundæ, Tinctura muniæ, spir. æci succinat. Sin nullo modo resolvi & attenuari possit, sanguisque aliis liquoribus mixtus corrumpi incipiat, eum ad suppurationem disponit medicamentis ex terebinthina, gum. elem. &c. paratis; suppuratum verò quantocyus loco aperto emittunt, ulcus mundant, abstergunt & consolidant emplastro diachyl & cerato de betonica. In *gravissima*, in qua cutis & muscoli varè conqualati, sanguis etiam & reliqui ei iunxisti liquores corrupti partes subiacentes, pericranium nempe & cranium invadunt & gangrenam minantur, omni studio malignitati eorum resistunt, acrimoniam mitigant & partes ulterius defendunt, internè Bezoardicis & sanguinem depurantibus, Eleonario v. g. Bezoardico *Ang. Sal. Dialcord. Fracas.* &c. externè eluendo partem affectam Spiritu vini theriacali & camphorato, applicando cataplasmata ex farin. orobi, lupinor. herb. absmth. scord. rut. cum spir. vin. parata, vel inungendo aut imponendo Unguentum aliquod digestivum mixtum Unguento Bezoardico *Ang. Sal. &c.*

In Vulneris Capitis & Pericranii.

In *Vulneribus capitis & pericranii* curandis cum aliis se maximè præbent occupatos, ut aëris accessus impediatur, extraneum quodcumque & vulnere eximatur, symptomata præcaveantur & avertantur, labia adducantur & consolidentur. Aëris accessus inhibetur, si vulnus ab infestatione statim obtegatur, & aëri ambiens siigidiusculus vel humidus arte corrigatur, accensio igne in fornace vel camino, & fumo ex succino, mastice, gummi animæ, juniperino. & similibus suscitato, quo linæum aliquoties complicatum etiam imbutur & vulnere imponitur. Extraneum quodvis removetur vel instrumentis, vel emplastris ejus; aculationem promoventibus ex melle, visco quercino, ocul. canc. succino. &c. Symptomata hic potissimum timenda sunt hæmorrhagia & convulsiones. Hæmorrhagiam sistunt pulveres inspersi ex aloë, thure, mastice, farinâ volatili, &c. vel per se inditi, vel cum albumine ovi agitati illiti. Convulsiones præcaveantur antispasmodicis intus & extus adhibitis. Internè dantur Essentia Hyperici & salviæ, cum sp. C. C. succinat. Vulnere instillatur oleum terebinth. sp. humbricor. & camphoræ. Labiorum adductio vel sponte fit, vel manibus & emplastris agglutinatoriis. Consolidatio perficitur internè decoctis & potionibus vulnerariis ex radic. aristol. rotund. caryophyllat. pæon. visc. querc. vel pyror. Herb. betonic. veron. salv. sanic. alchimill. flor. bugul. consolid. regal. anth. cancris fluviatil. humbric. in aquâ communî & vino, addito Syrup. de Symphyt. Fern. Hyperic. flor. tunic. &c. externè ballanis & emplastris aliis sananti-

bus, ex quibus sequens frequentius habent probatum:

¶ *Cerat. de beton.* ʒij.

*Empl. Oppoteldoch. Patac.* ʒij.

*Bals. Pernuv. alb.* ʒiib.

*Gumm. lacamahac.* ʒij.

*Cum s. q. d. Ovor. & Hyperic.*

*Melax. F. Emplastrum.*

Emplastrum Diachylon simplex sæpe varia capitis vulnera ad sanitatem diduxisse sunt observatum.

¶ 17. Nos denique, ne illorum manibus curam auspicemur, & periculosam subeamus aleam re- *N. fra ma- thodis me- dendi Con- tusioni Ca- pit.* tis & velis delituti, operæ pretium erit, ut indicationes emanus, quæ intentioni nostræ velsi- centur; sufficientes autem tres indicationes, quibus *Contusiones* absque vulneribus curandi metho- dus ininitur: prima ubet, ut sanguis congruam- tus resolvatur & discuiatur, quod semper annitendum; secunda, si nequeat discuti suffusio, & sanguis ad suppurationem tendat. Medico nimis sero accessio, necesse est ut suppuretur, & abces- sus apertus consolidetur eadem ratione ac in- flammatio. Tertia graviorum symptomatum medelam urget.

Jam expediri erit via ad curam auspicandam. In *Contusionibus* itaque sanguis vel serum eva- satum & congruatum resolvatur, quod ob- tinere possumus per sudorifera cor. g. unatum san- guinem resolvablem, observando simul, ut si sus- picio sit partis. præsertim internæ, per Contu- sionem læsæ, nunc blandè dissolventia, nunc blanda diuretica ad ungantur, sanguinem gmu- nosum per dicta loca optime evacuantia. Sin saltem in externis partibus hæreat sanguis, suffi- ciunt diaphoretica, sanguinis circulum resis- tuentia & factam Contusionem corrigentia; præ aliis hic conducit lap. scissilis Anglicus, seu Ir- landiæ, Ocul. canc. allumit. item carbonem tilæ in vino propinati, pulvis contra calum, mumia, sperm. ceti. Sic & conducunt omnia salia vola- tilia, imprimis liquor C. C. succin. e. Essent. viperin. epositorum nobis remedium Salicium hæc volatilia sunt genuina præstidia pro circulo lymphæ & sanguinis re integrando, pro vigore conservando, diaphoretica enim hæc serum ichoreasens eliminant, ut viscosum, torpidum, stagnans volatilisetur & rarefiat, per poros hinc quæ nervorum ipsorum, quæ glandularum sub- cutanearum quasi sitretur, facto recto servato cursu succorum. Hæc dico non affluxum ad par- tem affectam abarcent, ut vulgò dicunt, sed aci- dum coagulatore corrigitur, in quem finem exhibemus pulverem ad casum, cum Bezoardico & Cinnabarinis, ne cerebri alveos gravet amplius lymphæ, sed magis explicita ni- tore suo splendet, spiritusque hinc antea sopiti, corriganter & relurgant. Laudamus & in eum finem spiritum Qi compositum. spiritum theriacalem camph. Liqorem eborsifuccinat. &c. Essentiam traumaticam cum bezoardica mixtam.

Secundæ indicationi ut satisficiamus, diu- retica usurpanda sunt, ex quorum classe eligamus illa, quæ lympham corrigitur, ejusque ichoreascentiam prohibent, & cæteris ad urina- rias vias divertendo sic accrent magis, ne febri- accendatur vel foveatur. in quem scopum succi- nata, acidula nitrola & temperata huc faciunt. Sequens pulvis non erit contemnendus.

D 2

¶ *Ocul.*



p. Ocul. Cancer. pp.

Succin. alb. pp. 22. 3j.

*Arcan. duplicat. Myncl. 36*

*M. F. Pulvis*, qui exhibetur in aquâ char-  
refolij, vel betonica.

Explorata egressu suffusione, & capillis suo loco abralis fuccurrat V S que tanen cautē & cum timida circumspectione celebranda in pede, & eo incumbendum, ut resolvatur sanguis & discutiatu externis, ubi pars laesa diligenter for-  
fonda faeculis confitis ex speciebus cephalicis inferius dicendis, praefertim ex beton. rosmar. salv. fl. thil. lil. convall. rof. &c. parat fasciā super-  
positā, conducit etiam spir. vin. camphoratus, vel Sctus, vel crocatus. Nos pra aliis com-  
mendamus Aq. Reginae Hungariae externē libo-  
ribus illanti. Geranium, betonica & ferpillum  
in vino cocta egregie sunt usui. Alii lixivium  
ex ejusmodi herbis cum vino parant & exter-  
cum successu applicant. Spirit. xci c. spirit.  
vin. Scto paratus discutit inflammationes, &  
praefertim in membrorum & nervosorum  
partium contusionibus egregie usui. Fotum se-  
quentem applicare iubeo istis contusionibus fau-  
lorum semper cum emolumento.

*Rad. irid. Flor.*

*aristol.* Oaa. 5ij.

*sol. rerismar.*

salv.

verben.

origan. 22 Mi.

beion, c. flor. Mij.

flor. sambuc.

*lil. alb.*

rosar.

chamomill. aa. ʒij.

Croci. 31ß.

Rafur, succin. ʒiij.

*Dentur incisa & contusa grosso modo, quæ coq. in vino, & formâ fotûs vel Cataplasmati applicentur Contusionibus. Vel sequens imponatur Emplastrum.*

*Herb. Calaminth*

beton.

origan. 22. Mj.

flor. chamomill.

fol. asari.

Majoran.

*Sacbad. Arab.*

Asymmetria ad. Miß.

Croci ℥iij.

Cum  $\nabla$  & ol. ros. chamamil, add. cera, q. s.

*F. l. a. Emplastrum.*

Huc facit etiam emplastrum contra livorem faciei *Myrsi* vel de betonica & sticticum. Balsamu Peruvianu in vitello ovi & spiritu vini dissolutu crebrius applicatus nobilis est, si imprimis partes nervæ contra se fuerint. Oleo anisi iungantur suffusiones; sic & sola bryonia, ad mentem Helmoniti, in vino cocta, pro fortu loco Contusionis, ubi sanguis hæret, applicata praestans est. Inter specifica quoque referuntur radices lymphitæ & Sigill. Salom. si vel sub forma flosculi, vel Cataplasmatinæ applicentur, per hæc enim pori cutis aperiuntur, & sanguis evasat ita volatilifatur, ut iterum aptus reddatur vasa sua ingredi, vel potius per poros egredi: aëtherico hic notandum, quod hæc omnia calide tepide uti applicanda, aliis diabolus per Beelzebub eiecere frustra tentabis.

Quod si verò dictis nequeat discuti tumor  
Contusionis, seu suffusio dicta, & est gravior,  
ut ab acido & fibrillæ fuerint ruptæ, & ad sup-  
purationem tendant, tunc suppurantibus matur-  
re promoveatur, hinc abfcessus aperiat,  
mundificetur & consolidetur.

Sin tandem adhuc gravior suffusio adit, & periculum imminet, ne ante diffusionem vel suppurationem gangraena superveniat, tunc mox scarificationibus profundis suffusio vulnenda, & sanguis partium grumulosus, partim grumescere incipiens eliciendus, postmodum unguentum digestivum cum paucis Unguentis Aegyptiaco applicandum, illud quidem ad promovendam suppurationem, hoc verò ad arcendam ulteriorem corruptionem, & occurrendum gangraenae; sumatur Unguenti Aegyptiaci plus utriusque, prout major vel minor metus gangraenae adest, & his remediis suppurata confusio facile curatur, & per balsamum Aëis, vel Peruvianum ad cicatricem perducitur.

In *Vulneribus* capitis, ubi simul pericranium *vulneribus*  
læditur sequenti modo procedendum esse dicunt *Capitis &*  
Chirurgi nostri. Inter communia præsidia *Pericranii.*

memorari dignissimum censent Venæsectionem, quæ, ut loquuntur, præ laudanda revulsione necessaria est, ut parte demta exundans sanguis invitetur promptius in vasa, & à natura etiam fugi ac dissipli possit magis, neque turbatio sanguinis tam facile fiat. Sed mea experientia fallitum id est, quia semel evaluatus sanguis nunquam per V. S. relorberi vel revelli potest. Si quis vero præ iudicium occupatus, educi potest tantum sanguis per aristas & morbi (statu ad 3j), vel paulo plus, ad usum ætheris, & saphanâ pedis.

Sin urgeat feri ~~æthere~~ & debilitas organi sensuum, successu temporis pro re nata alia quoque remedia fruenda erunt, imprimis deobstruentia, quæ sero eliminando & cohercendo in specie vacant, ut sunt vesicantia. Sed ut propius ad rem accedamus, omnium primò ab ære extrinseco, à frigido scilicet, probè defendendum est vulnus, & statim fovendum, ut Microcosmorum vigorem suum recuperet sine ulteriore plegmone, hoc est, ut circulatio humorum promoveatur. In quem finem quidam commendant pellem arietinam calentem à maceratione, capiti calide applicatam; alii derasiss capillis vulnus lineis carptis ficis implent ad sanguinis fluxum sistendum, æreâ ambientem hoc pacto à cranio arcendum, qui alia vulnibus capitis valde inimicus existit ob acidum nitrosum suum, quod patet in sanguine per V. S. extracto, & ab ære statim coagulato, & ad labia vulneris alique tenus à se invicem diducenda, ut ita cranium tantò melius pateat; cò ergo post factam capitis vulnus incumbendum, ut acidum in vulnere temperetur, ac humorum circulatio restitatur, in quem finem emplastrum sequens vel simile imponi potest.

℞. Emplastr. de beton. ʒij.

pulv. vitri. antimoni. 3j.

Camphor. ʒj

*Ol. laurin.* Zij.

*M. F. l. a. Emplastrum.*

Labiis verò vulneris, olle & perioſtio conſectio  
lintheis carptis balfamo Peruviano parùm mae-  
factis imponatur digeſtivum. Magna enim ſe-  
culitate puris generatio promovenda; quem in  
finem digeſtiva dicta untiſſimis glutinantiſſimis  
tempe-

## CAP. III. DE CAPIT. CONT. & PERIC. VULN. 29

temperata vulneri imponenda, qualia sunt terebinthina, mel. ros. gummi elemi, thus, mastix, aloës, myrrha, vitell. ovi, cera. Balsamus de Peru, Ol. ovor. Hyperici. Per alius conducet sequens balsamus, qui valde acidum temperat.

℞. Terebinth. Cyp. ʒj.  
Ol. Hyperic.  
Mell. com. aa. ʒʒ.  
Myrrh. ʒʒ.

*Liquefiant simul, interim Gummi elemi liquefcat seorsum, & add. pro justa consistentia ol. cera parum*: dein fascia noui more veterum, sed tantummodò sudarium continne applicetur vulneri. Cavendum ab omnibus pinguibus, quia ea particulis suis ramosis poros cranii tubulos obstruant, atque efficiunt, ut humores stagnent ac acefcent, & cranii saltem volatilen corrumpant, sicque caviem cranii inducant; sic & ab adstringentibus abstinendum, ne sanguinis aliorumque humorum circulatio impediatur, quæ in inflammatione potius promoveri, quam liti debet. Hoc enim asterisco notandum, quod capitis vulnera non nimis cito sunt consolidanda, sed prius variis sanguis optimè exsauriendus est, & dein vulnus implendum optimo digestivo, & dum vulnus reseligit, admoveatur semper vas aliquod Capiti carbonibus vivis impletum, cuius scil. in finem, ut frigus ambientis aeris aliquatenus temperaret, acidum sc. illud aeris nitrosum.

Sepe etiam necessitas effligat, ut vulnus à Chirurgo dilataretur, hinc videndum, num cruciaticarnis incisio aut alia melior sit.

Ad succorum stagnationem gangrænam comminantem impediendam, & ad circulationem partis vulneratæ naturam conservandam sequens cataplasma applicari potest.

℞. Herb. beton.

scord.

rut.

absinth. aa. Mj.

farin. sem. lini,

fabar.

flor. Camomill. aa. ʒʒ.

*Coq. parum in vino & applic. tepide*; quo cataplasmate gravissima vulnera curari poterunt. Hic & conveniunt olea balsamica, salia volatilia oleosa temperata, talia enim acidum pericranio molestum corrigunt, & naturalem cursum succorum conservant, & ulteriorem corruptionem præservando sanationem vulnerum promovent, talia sunt jam dicta, bals. Peruv. &c. cave tamen, cui dictum, ab oleis pinguibus, quæ in se habent acidum satis potens, & quæ sunt inimica vulneribus ob unctuositatem poros oblinentem; nec applicentur acria volatilia, detergentia aut mundificantia dicta, ea enim consumunt nutrimentum balsamicum, & dolorem inferunt maximum, præsertim ubi funis peticiarium, membrana illa nervæ, sit læsa, in quibus partibus semper deprehenditur acor magis intensus, subtilior & penetrantior, quam in sanguineis; major enim sordium copia in vulneribus membranosarum partium solet observari. Notandum hic quoque Chirurgis, ne sapius mutent medicamina, ne sanguis & humores circulares plus turbentur.

Interne ad acidum vulneris contemperandum conducunt omnia, quæ acali oculo temperato constant, & acida quacunque aut in stomacho & primis viis, aut in ipso vulnere corrigunt, præprimis in capitis vulneribus oculi canc. cum cinnab. nat. maritati, & sapius exhibiti, nec negligantur potiones vulnerariæ dictæ, de quibus omnibus & symptomatum curatione, vide in capite de Vulneribus in genere.

## CAPUT IV.

### De Cranii Depressione, Fracturâ simplici, & cum meningum & cerebri læsione.

§. 1.

IN præcedenti capite egimus de Vulneribus Capitis, ad quæ pertinet Cranii depressio & fractura, de quibus pauca hic tractaturi sumus. *Definiuntur* Fracturæ Cranii, solutiones continui ossium calvariæ. Quoniam verò fracturæ hæ non eodem modo insiguntur, differunt, cum ratione instrumenti lædantis, tum respectu solutæ partis. Cranium quasi parva galea dicitur, aliis Calva, nonnullis Calvaria, & est os capitis crassum, rarum, duabus lamellis vel tabellis adornatum, ossibus septem compactum, futurisque veris tribus, Coronali, Lambdoide & Sagittali distinctum, cerebrum contingens, atque utramque meningem continens. Hujus Cranii fracturarum nonnulli Auctores quinque referunt species, prima ipsi dicitur Contusio Cranii, 2. Rima, 3. Sedes teli, 4. Inpressio, seu Introcessio, seu Depressio, 5. Contrassitura. Ex illis prioribus dicuntur simplices. Hic notandum, quod omnes Scri-

ptores Chirurgici in describendis his affectibus nimis liberales sint, & quod unico folio comprehendere possunt, eo sæpe viginti commaculant: ad quid enim inserviunt ejusmodi imposita nomina?

*Contusio Cranii* describi potest, quod sit solutio continui ossium Cranii, juxta minimas particulas solutas, per ossæ compressionem quid? substantiæ, quæ vix ad sensum patet. Hæc contusio potest esse vel in superficie, vel per primam vel utramque tabellam, tum ratione loci in ossæ frontis, occipitis, parietalibus atque petrosis, in planitie ossis vel suturæ.

*Rima* dicitur vulgò, cum percutitur os cranii & ob duritiem non cedit, sicque rimam contrahit, fiuntque hæ rimæ vel rectæ, vel parum curvæ, vel latæ, vel angustæ & stellæ instar, longæ vel breves, uno in ossæ, vel ab uno in aliud per suturam transeuntes, vel sunt in unâ, vel in utraque lamella, quædam verò manifestæ in si-

D 3

perio-

Tractatus  
quid?

Capitulum  
quid?

Contusio  
Cranii  
quid?

Rima quid?

onineque glutinosum à cibo potuque accendo, frequentibus adhibitis pectinationibus, frictionibus & absterisionibus pilorum, ne immunditiam contrahant, semel autem enatam difficilimè credit auferendam, abique enim periculo vitæ vix eradicabitur; conglutinatos verò pilos extricare velle. neque manibus, neque medicamentis est possibile, hinc Judæis plica est solennis, quia in immunditie & diæta peccant sæpe. Sudores frequentius proleptos, quibus nutrimentum detrahatur, & sanguis à glutinositate liberetur, nullatenus contemnit.

*Porrigi-  
nem.*

*Porrigi* corrigitur destruentibus acidum illud subtile, quo sanguis ille nutritis torridus inquinatur, ne ulterius cuticulam erodat, squamulæ autem, seu partes erosæ cuticulæ abstergendæ sunt, & cuticula ab iis liberanda volatilibus balsamicius intus & extus adhibitis.

*Inconcin-  
nam Colo-  
rum ex-  
crescen-  
tiam.*  
*Fissuram.*

*Inconcinna* pilorum *excresecntia* tollitur per extirpantia pilos ab aliis jam satis cognita reddita, & adstringentia poros cuticulæ, ne eosdem ulterius transmittant.

*Fissura* pilorum tollitur refectione partis fissæ & ablutione aut illinitione extremitatem illis, quæ acido ei corrosivo resistere, idque corrigere per experientiam sunt observata, amaris videlicet ex felle animalium, & absinthio, abo-

*Cassia-  
norum*  
*Consilium*  
*deseruan-  
do Alopec-  
cia & A-  
lopec-*

tano, &c.  
§. 19. *Cassianorum* de curandis hisce affectibus consilium est, ut in *Alopecia*, ejusque specie *Areæ* dictæ particula illæ rigide in succo nutritio corrigantur & flexiles reddantur, sicque uccus ille reducat ad pristinam suam dispositionem benignam, pilique sufficiens capiant alimentum, ut concessos suos loculos in poris cutaneis expleant, sicque debita sua occupent crassitie. Obcinetur hoc tum alimentis, tum medicamentis. Alimenta constare debent multis particulis dulcibus, benignis, & aliquantum spirituosis, ut copiosum præbeant chylum, non tam solidiorum partium alimoniz sufficiens, sed ex abundantia quâdam ad efflorescentiam illam pilorum in supremâ corporis parte necessariam portionem contribuens. Medicamenta interna sint spiritiosa, penetrantia & valde subtilia, benigna tamen, ut partes illas rigidas inflectere & mobiles reddere valeant, ita enim ulterius non resistunt, sed succo nutriti facili permittunt ingressum. Et quando ille satis infuit copiosè, pilorum filamenta ita distenduntur & interstitia opplebuntur, ut ambitu suo poros facili expleant, neque ulteriori quâdam opus sit adstrictione. Sæpius itaque in usum vocari volunt Elixirium sequens hoc in casu apprime conveniens:

℞. *Rad. Galang.*  
*Calam. Aromat.* 22. ʒij.  
    *fenic.* ʒvj.  
*sol. vorismar.*  
    *majoran.*  
    *salv.*  
    *capill. Qis* aa mʒ  
*flor. salv.*  
    *tunic.*  
    *meliss.* aa. pj.  
*Croc. Oriental.* ʒj.  
    *Cinam.* ʒiʒ.  
    *Macis* ʒʒ.  
M. F. Pulv.

℞. *Succini* mali *aurant.* dulc.  
    *spiritus C. C.* ʒij.

*Cori. recent.* aurant. ʒij.

Conquassentur invicem & contundantur ad comminutionem corticum, postmodum per linteum colentur & fortiter exprimantur: Succo illi immisceantur pulvis & f. Massa, seu Pasta. Stet per noctem in locotepido, manè superinf. spir. vin. generosi ad digitos. 3. vel. 4. eminentiam, agitentur & ponantur ad digestionem in Cin. vel alio quodam loco calidissimo ad spatium duarum septimanarum, postea furentur: Liquori filtrato add.

℞. *Majoran.*

*vorismar.* ex ligno aa. ʒiʒ.

*volat. viperar.* ʒʒ.

Ol. *Cinamon.* gt. vj.

*macis* ʒʒ.

*vorismar.* gt. xiv.

Circulentur per d. & n. 4. & tandem serventur ad usum.

De hoc Elixirio aliquoties dentur gt. xx. vel xxx. in cochleari uno vel alicro sequentis Decoctati:

℞. *Rad. penced.* ʒj.

*liquir.* ʒʒ.

*Herb. Capill. Qis*

*adanth.*

*summis.* Ceni. min. aa. mʒ.

*thymi.*

*flor. loti purp.*

*Choyri* aa. pj.

*Incisi* minuss. *superinf. Aq. bullis destill.*

*alb. lbi.* l. ij.

Stent per ʒ bene obiecta in seipore, manè in MB. F. Destillatum.

Servetur ad usum.

Externè instituantur frequentes frictiones, pectinationes, ablutiones & inunctiones, ut nutrimentum alliciatur ad pilos, & pori cutanei ad ejus susceptionem commodè disponantur, particula rigidiore agitentur & ad cecellam inctentur, aut planè in alium convenientiorem statum transferantur. Pro ablutione sequens laudatur Decoctum:

℞. *Rad. bardan.*

*lapis.*

*penced.* aa. ʒvj.

*urric. maj.* ʒʒ.

*Herb. Abrotan. mar.*

*majoran.*

*Capill. Qis* aa mʒ

*Flor. vorismar.*

*lavandul.*

*camomill.* aa. p. ij.

*fem. fanigr.* ʒʒ.

*Ladan.* ʒij.

*Incis. superinf. lixivii ex cineribus betula &*

*rad. arund. salit.* q. ʒ.

Stent per dies 2. vel 3. deinde parum ebulliant, colentur & exprimantur.

Hoc Decocto abluatur aliquoties, & linteis tepidis abstergatur, postmodum inungatur vel oleo abrotani, vel Unguento sequenti Placens:

℞. Ol.



W. Ol. Myrt.

*Amigd. dulc. aa. ʒi.*

Cori. rad. Cannar. ust. ucrar.

Capit. ♀ mst.

*Polytrich.* aa. ʒij.

Сар. тит. и ст

Arms combustat. &

Canthar. rubrar. macul. nigr. aa. ʒj.

Ladan. zij.

Mell. 51.

Cum cerâ F. Linimentum.

Utatur hoc ager alternis noctibus, & si spissius  
adhareat, abluitur caput vel lixivio, vel vino  
in quo Abrotanum fuerit decoctum. Ablui etiam  
volunt partes depiles frequentius aquâ mellis ru-  
brâ in pilorum educatione perquam famosâ.

In *Ophiaci* particula illa ramolæ sunt abigen-  
dæ & falsæ corrigendæ, quod luxuriosius maxime  
impetratur, istas facile umbilicibus & absor-  
bentibus, sapone etiam odorato ex specificis  
composito sæpius caput est abluendum.

*Tinea* ut curetur. omne studium cō potissimum tendat, ut fermentum illud peregrinum, confans particulis maximè acutis acerbis & durissculis, eliminetur, & particule falsæ à prioribus præcipitate iterum dissolvantur & subsistentur, ut aut tenues evadant in auras, aut mitigentur & blandiores fiant, ne eutem ulterius erodant. Hocinem præstant sudorifica, imprints ex rad. scabiosi. lapath. peuced. ligno Juniperino, Sassafras, Herb. fumar. fol. roris-mar &c. Ex his enim varia componi possunt remedia, five sint Decocta, five Elentia; five aliz eorum species, quibus adlocianda sunt. Si volatilia viperæ. C. C. lumbicor. &c. Extremè locus affectus aliquoties ablatur Decoq. blandiori, ex urina humanâ, cui radix Lapath. malv. tota cum rad. & herb. item piscinocœda sunt. Vel utriusq. piforum adlociatur aliquid lixivii & caput ablatur. Pro illinitione sufficere potest Ol. Si. per deliq. cum ol. myrrill. aut anygd. dulc. comminuat & agitur. Oleum etiam laurinum cum ☿ non rejiciunt. Infectorum conversationem arctorem vitandam volunt illi, qui ☿ adhuc degunt immunes.

*Calveit.* In Calveit ipsium senium sequuta pilos de-  
nuo vel arte vel marte producti posse, vix induci  
se permittunt ut credant, putant enim decepti-  
tis istis agrum ultevius non esse ferre paratum,  
ferd aridum, nec convenienti succo irriguum,  
semitaque, non acida, sed spirituiosa & lau-  
dabilia, semel perdecita fore irreparabilia,  
*Virgilio lib. 2. Æneid. vers. 646. 647. adjuvenses*  
- - - Sed enim pilos: tardante senectē

Sanguis bebet, frigenisque effata in corpore  
vires.

Proinde si vel ætæ frigidior nudo capiti sit molle-  
leus, aut curiosiores ornatus adhuc fludeant,  
fluendius, ut vel nutrit, vel galericulo seu de  
pillitio artificiali caput obtegant, cum se alo-  
rum plumis hoc tempore honestius splendore  
liceat. A luc autem venetæ vel phthiri indu-  
dam calvitium, post abactos istos morbos &  
correctos succos in sanguine, tandem novis pi-  
lis caput vel sponte vel arte iterum ornari cum re-  
liquis experti promittunt, adhibitis medicamen-  
tis superius jam in Alopecia prolatiis, quibus ali-  
quando adungi possunt liquores linæum &  
angelicæ, sale in vitro us inaspero pro-  
fectos.

*Canis*is repolcit fermentorum spirituosorum  
tuum reparationem, tum ad statum debitum  
reductionem, ut succum nutritientem conueni  
enter disponant, & majori copia adipos propellant,  
Illeque tum spiritibus turgidulus tubulos  
pilorum amplifcet, implet, filamenta disten  
dat, radios luminis circa superficiem pilorum  
aliquantum detineat & variè modifcet, nec tam  
citò dimittat, ut inuicem repercutiantur, quum  
verò in exsuccis senibus id tam fit difficile,  
quàm gramen aridum in fœnum jam ambiens,  
pristino ornare virore, hinc ab Arte Medicâ  
postulatur, quod in ejus non est potestas, &  
quâvis ab adhibitis quibudam externis colo  
rantibus aliquando succus obducatur capillis, ille  
tamen brevi detegitur, quibus autem volupe est,  
hujusmodi alii facere imposturam, & oculos in  
tumentium minus acutos illudere, illis licet vari  
is colorantibus pilos suos oppingere, quorum  
species aliquas inter nostra brevi nunc sumus  
recensuri.

*Plica* curationem tentandam voluit reſol-*Plica*.  
ventibus & attenuantibus particulis viſcoſas,  
quibus ſuccus nutriendi ſciet, plexus nervulorum  
in cute agglutinati & plures conſiti, ut non  
juxta diſtinentur, ſed manu quaſi prodigā ad  
cuticulā poros per veniat, eoſque dilacet, & interſi-  
cilia eorum diſumpat: quare, ut evaporationi ne-  
ceſſaria ſuſcitetur, corpus exerceri, & ſudoribus  
frequentiſſimis alimentum copioſius de-  
hendum eſſe jubent, quod in ſpecie per Anabrochi-  
ſimum, ſeu conſtrictionem illi, quo tranſitus ul-  
terior ſucco glutinoſo denegetur, fieri poſſet,  
ſucceſſivè diebus ſingulis juxta cutem illud ar-  
dens conſtringendo. In *Polonia* ꝑa probant re-  
media, quorum virtutem Poloni per experien-  
tiam cognitant habent, & à nobis poſtmodum  
manifeſtabuntur.

in *Perigine* particulæ illæ acres corrigendæ *Perigine*.  
sunt, ut cuticula non amplius eradatur, unpuritates autem & squanulæ abstergendæ externis decoctis lixiviosis benignis, imprimis malvæ decocto, & pilorum in urinâ facto, & superius in Tinea jam notato.

Ut *Pili* in locis minus convenientibus in-  
cinnæ excrecent abigantur, opus est eorū evul-  
sione, quod iisdem cum reliquis præstat, ex  
autripigmento nimirum, calce vivâ & lixivio pa-  
rat, ne verò revertantur, glandule pilares &  
plexus nervi destruenti sunt, porique cuticulâ  
planè occludendi, & eorū figura transmutan-  
da, cui scopo adquirendo nonnulli sequentem  
prescribunt aquam destillatam:

℞. Cornu vacca,  
Alumin. Rochai,  
Papaver. nigri aa. tritor. q. s.  
Sanguinis vaccini recent. lbij.  
Macerentur & destillentur.  
Adhibeatur omni sero.

Efficacius illud obrinetur, si locus laminā auri ignia uratur, ita enim cuticula planē condensabitur, pori constringantur, ut nulli pili eam ulterius perforare valeant, simulque succus nutritiens consumitur & exsiccat, quo media virgines Italice Levitatem quibuscūdam in locis sibi conciliare dicuntur.

In *Fissuris* corrigendis nihil proferunt singu- *Fissura.*  
lare, sed media adhibent eadem, quæ ab aliis sa-  
tis iam sunt indicata.

§. 20. Restat jam *nostra* de ratione affectus *nostra ra-*  
C 2 holic



ita curandi  
Alopeciam

hosc curandi sententia, quam pluribus in sequentibus lunus manifestatur. Quod proinde attinet Alopeciam, Ophiassm, Calviciem, si pili in iis radicibus exstirpati sunt, eos denuo producere velle, esset Aethiopi cutim & tigridi maculas mutare, uti & ille defectus, quo pori pilorum inter se coalescunt, corrigi amplius minime potest. Quando verò pili quidem depluunt, ita ut nihil de illis, qui deciderunt, reliqui amplius appareat, radicibus tamen ipsorum succoque permanentibus, tunc vel sponte, vel arte adhibita renasci possunt, cum alioquin per totam vitam crescere non desinant. In feminis autem & eunuchis pilos barbæ producere impossibile putatur, interim ex catameniorum diutina emissionem quandoque conspiciuntur vetula præter voluntatem barbæ, instar virorum, ne in aliarum coronâ horridiores appareant, fornice aut novacula instructæ speculum salutare opus habentes. Ipsam ergo defectum horum curationem prognostico semper præmissis, & desperatum malum relinquentes, pro ratione causæ, quæ primum auferenda, instituiamus. Si ab externâ quadam causâ hic oritur defectus, illa prius amovenda. si verò ab interna fiat defluvium, ea corrigenda; & cum sæpe fiat ab acrimonia, ante omnia ea exhibenda, quæ hanc emendant, in quem finem conducunt varia absorbentia, tum fixa, tum alcalia. Quando verò affectus hic, ut plerumque contingit, Luem Veneream comitatur, in hoc casu conducunt gualia & ex iisdem præparata sudorifera, ut salzæ particula ad poros cutis delata, & pilorum radices exedentes prius eliminentur, sic una fidelitâ plures dealbabis parietes, curabisque ipsum Luem, & per consequens etiam Alopeciam. Sudorifera ex viperis parata hic quoque magni facio, item decocta lignorum cum herbis capillaribus parata, sal. Cusius hic egregius est.

Per admodum loco affecto præcipue efficitur, ut pili tum capitis, tum barbæ, superciliorum & palpebrarum, qui desinuerunt, renascantur, vel etiam illi, qui barbam constituere debent, copiose producantur, in quem finem plura ab auctoribus nescio quâ proprietate occulta id facere debeant, commendantur, at quæ rarissime nobis satisfaciunt: hinc tantum optima & nostra duntaxat experientia approbata hic apponamus. Si oritur hic affectus ab obstructione potiorum, strictiones & pectinationes instituuntur sæpius. Profunt decocta torismarini, abrotani, cum vino facta, vel ex ipsorum cineribus paratum lixivium; vel caput inungatur aqua Reginz Hungariz; vel hinc inde illinatur axungia viperarum, vel ex viperis parata Essentia viperina Zveroff. Laudatur à multis succus thaphani & malvæ parti affectæ illitus. Oleum pilorum loco calvo illitum tanquam euporistum remedium laudatur. Job. Crato commendat spumam carnis bubulæ, non valde pinguis, ut locus depilis eo inungatur, sed me semper deseruit id remedium; alii commendant pinguedinem talpæ & serpentum in  $\nabla$  mellis destill. solutam & illitam. Aqua nostra ad Alopeciam Castellana digna est sua laude. Linimentum quoque illud quod ex ladano oleoque lentiscino constat, non contemnendi usus erit. Si verò affectus hic sit ex actibus salis particulis glandulas pilosas corrodentibus, in principio fatus lactis conducet, vel lotio cum decocto malvæ & lapathi: re-

liqua millies quamvis ab auctoribus commendata specifica, tamam tamen non sustinent, cum hæc non semper satisfaciunt.

In Area præmissis generalibus absorbentibus educantur particula salzæ, per diaphoretica, quibus semper additur aliquid  $\Psi$ ii dulcis; hinc conveniunt præ aliis superius jam dictis  $\nabla$  capiatum cum  $\nabla$  mellis, mulcarum: item sequens unguentum, quod à pluribus pro secreto habetur.

$\mathcal{R}$ . fol. abrotan. mar.

Capill.  $\mathcal{Q}$ us aa. mj.

flav. mellis  $\mathcal{Z}$ j.

Gummi ladan.  $\mathcal{Z}$ lb.

myrtillor.  $\mathcal{Z}$ j.

Sem. fenigr.

Sem. lin. aa.  $\mathcal{Z}$ ij.

Ol. amygdal. dulc.

Vini albi generos. aa.  $\mathcal{Z}$ ij.

Fasta in fusione per hor. 24. bulliam ad humiditatis consumptionem, F. Expressio.

In Ophiassi præter universalia commendamus verbasicum, Unguent. medicamentos.  $\mathcal{M}$ nsf. item oleum papyr. item Linimentum Fontani Analeiti. Observ. p. 36.

In Tinea conveniunt absorbentia & sudorifera balneaque, & cura ejus potissimum absolvitur abstergentibus & amaris, v. g. absinthio, abrotano, fumar. cent. ninn. in lixivio decoctis, & pro lavamento usurpatis, item interna omnia in scabie aliis adhiberi solita volatilia. Inter topica sequens conducit, præmissis Antimoniatibus & Cinnabarinis.

$\mathcal{R}$ . Ol. nuc.  $\mathcal{Z}$ ij.

Vini alb.  $\mathcal{Z}$ ij.

$\Theta$   $\Psi$ ci  $\mathcal{Z}$ lb.

Ran. virent. No. v.

Tinc. flav. No. j.

Serpent. vel

Viper. No. j.

Cog. omnia ad consumm. vin. & serv. quo linimento tinea bis vel ter de die inungatur calide, capillis prius deralis.

Si simul scabies adsit fortida, convenit sequens, vel simile Linimentum.

$\mathcal{R}$ . Unguent. rosar.

enul. aa.  $\mathcal{Z}$ j.

pulv. staphid. agr.

$\mathcal{Q}$ us vrv. saliva extill.  $\mathcal{Z}$ lb.

$\mathcal{M}$ .

Qui verò à  $\mathcal{Q}$ rio abhorret, staphid. enim inde salivatio oboriri potest, sequente uti potest:

$\mathcal{R}$ . Summitas. absinth. Salv. rus.

Flor. centaur. min. aa. m).

Colocynth.

Sem. Coriandr.

staphid. agr. aa.  $\mathcal{Z}$ ij.

Cog. pro Lixivio, vel F. è cineribus betulae Lixivium. Vel è ciner. sament. vii. addito sapone Hispan. Vel

$\mathcal{R}$ .  $\Psi$  Ol.

Argemone  $\mathcal{Z}$ j.

$\Theta$   $\Psi$ ci aa.  $\mathcal{Z}$ ij.

Myrrb. aloes.

Camph. picis.

$\mathcal{M}$ . ad f.

F. Linimentum.

Vetula hic degit, quæ sequente Emplastro Tineas feliciter curat.

$\mathcal{R}$ . Picis nigr.  $\mathcal{Z}$ ij.

Resin.  $\mathcal{Z}$ lb.

pulv.

*pilo. virid. aris*  
*Q. Rom. aa. 5j.*

*Q. viv. 3℔.*

*coq. l. x. in massam*

*extend. super alut: velinq. per 3. dies.*

Oleum *Qi* per deliquium cum spongiola crustis applicatum raro me fecellit. Vel

*℞. Ol. Amygd. dulc. q. s.*

*C. ol. Qi terendo f. Linimentum, addito, si pediculus ingeat, oleo spica.*

Si *Vermes* erodant capillos, Aqua Aloëtica nostra egregii erit usus, cum oleo Colocynth. vel felle tauri matitatis liquores item myrrhata, &c.

*Calvitium.*

*Calvitium* verò, ubi simul glandula pilosæ deficiunt, reparari nullo modo potest, cum pars corporis omnino ablata, de novo progignere sit impossibile; sic & ille affectus, quo pori pilorum inter se coalescunt, corrigi amplius minime potest. In calvitie ergo verà, seu cicatrice cutis, vel in eà Alopecia, ubi pilis radicitus erosi sunt, eos restituere velle, esset Tigridis cutem mutare. Prognostico ergo præmissio, curam aggrediamur sequenti ratione. Præmittantur ante omnia, si necesse videatur, universalia, præparantia & absorbentia. Ad præcavendam & retardandam calvitiam, profunt frequentes frictions moderatæ. *Mynsichtus* ad *Calvitium* præservationem commendat Tincturam suam proprietatis, item rotulas impertales: quo pertinent omnia cephalica ambrata, moschata, spirit. vin. stomachicus *Mynsichtus*. Inter externa profunt cucupharæ ex cephalicis paratæ, & inunctiones ex ladano, aliisque modicè adstringentibus. Hic omnia ea conducunt, quæ superius de Alopecia diximus.

*Canities.*

In *Canitie*, ubi senes rejuvenescere avert, & juniores quoque, si in certis locis trica quædam pilorum alba observatur, cum reliquis pilis similem reddere cupiunt, quod sanè arte contorior potius, quàm alius color, instabilis tamen, imprimatur, efficitur, uti videmus in equis, quorum pilis sæpe appinguntur varii colores. In senibus ergo varia spirituosâ profunt, & spiritus effocillantis, Cephalica dicta, hinc prodeles sunt internæ Aqua Cephal. c. V. Aq. Regin. Hung. spir. Cephal. quæ & externæ præ aliis conducunt.

Ad pilos *nigros* reddendos commendantur plures pectinationem cum pectine plumbeo, vel argenteo, aliaque laudant decocta pro ablutione, in lixivio, vel aqua pluvie, aut cisternæ, aut extinctionionis ferri, ex gallis, nuc. jugland. parata.

Ad crines *flavos* reddendos, in quo maxime laborant Galæ & Venetæ mulieres, commendamus lixivium tingens *Mynsichtus*; abluantur etiam aqua aluminosâ & nitrolâ, addita *Qi* portione. vel paratur oleum in quo rasurabuxi, radix chelidon. curcum, crocus, aliaque coxerint, addita myrrha. Lixivia possunt parari ex cineribus samentorum vitis, paleæ avenæ.

Ad odoratos pilos reddendos herbe odoratæ quævis conveniunt, ut sunt folia niajoranæ, flor. lavendulæ, N. M. Mosch. Amb. &c. sapo-que odoratus Italicus.

*Throm.*

Cum de *Plicâ Germanicâ*, seu longè mitiori, raro consulatur Medicus, adeoque perdifficile sit aliquam exinde habere experientiam, hinc affectus iste in pluribus æstimatur ferè incurabi-

lis. Sanè morbus est contumacissimus, & optimè etiam eludens remedia, pororum enim conformationem semel à naturâ factam corrigere medicamentis difficile est, uti & gluten istud ex glandulis continuè exsudans, & pilos conglutinans tollere & corrigere summa artis est. Ante omnia de hoc morbo consulantur Poloni, ubi morbus hic endemius est; genium ergo & incolæ, imò aquas aliaque huc pertinentia bene cognoscat Medicus antequam curam aggrediatur. Poloni verò ad cutis capitis poros aperiendo suadent lotionem capitis per decocta ex aperientibus & emollientibus parata, inprimis ex branca ursina & lupulo, quibus betonica & lycopodium adjici possunt. Maxime verò tum externè, tum internè commendant muscum terrestrem, ipsi plicariam dictam. Muscum illum terrestrem cum branca ursina aquæ fluvialis, q. s. ad flavedinem coquunt, hocque decoctum aut sumunt per se, aut cum ovis in forma jusculi quotidie bibunt & comedunt. Externè verò cum decocto hoc instil lixivio parato caput bis per septimanam lavant, nullo amplius adhibito pectine, donec capilli sese explicare incipiant, unde necessarii progressu temporis ita sese extricare solent. Decoctum etiam vitis, hederæ, bryoniæ, salsaparill. commendant. Nos existimamus hunc morbum curari debere instil luis *Qæ*, quare prius in Plicæ certissimum existere potest remedium, qui optimus lymphæ donitor existit, interpositis variis aperientibus, præsertim Essentia viperina, alexiph. liq. C. C. succ. quæ remedia maxime corrigunt vitia lymphæ quæcumque. Ad primarium vitium vitium corrigendum, conducere possunt Emetica tutiora, dein ad lympham glutinosam corrigendam, & fluxiorem reddendam, porosque confirmandos conducunt alexipharmaca & sudorifica. Inter Topica sequens Linimentum *Cinabaris* pio arcano censendum.

*℞. Herb. Mnsc. terr. str. & repent.*

*Rad. bryon. aa. p. æq.*

*Adipis Erinacei q. l.*

*In vase vitreo coq. in B. M. per horam, & f.*

*l. a. Unguentum,*

cum quo radices pilorum complicatorum & loca affecta, maxime articuli dolentes bis in die inungenda sunt. Hic & proderit Axungia vel Essentia Viperarum. Abscissio cirrurum horum non temerè tentanda est. Vide de his elegantem observationem *Dni Præsidis nostri Decur. 2. ann. 2. Obs.*

In *Porrigine* omnia conducunt, quæ lymphæ *Porriginem* falsedinem & acrimoniam corrigunt, ut sunt præter gualia, jam dicti liquores viperini & volatiles succinati, Salia volatilia oleosa, Essentia Fumar. lignor. Rad. saponar. bryon. possunt cerevisiæ ind. vel ex his parari Tincturæ & Essentia, inprimis pulvis noster spasmodicus Cinabarinus.

Topica hic adhibenda sunt absque adstrictione. Abstergentia ita dicta præ aliis conveniunt, qualia sunt focus ex decoct. fœnigr. cent. min. Item conveniunt. anygd. amar. Ex nitro,  $\Delta$ , &  $\Theta$  o quidam varia parant linimenta.

Ubi *Pili* in locis non convenientibus crescunt, *Inconveniens* nam pilorum excessum sentiam. conducunt omnia pilothra dicta medicamenta. In hoc casu sanguis ab ichoribus & terotitibus prius purgantibus hydragogis pluribus munde-  
 tur, & sudores in balneo præmittantur. Pilothra



thra dicuntur illa medicamenta, quæ caustica sua vi potissimum agunt, quaerendo ut abscedant, efficiunt, & si validius agant, vehementer adurunt, ut etiam radicibus absumtis cicatriceque inducta pili non amplius renascantur, efficiunt. Optimum pilothrum paratur ex calce viva & auripigmento, beneficio olei cutispiæ, vel lixivii; hinc adeo præstans est Unguentum de Calce viva *Mynschi*. Turca suum habent rufina, quod paratur ex calce viva & Sale alcali dicto cum argilla ingobos reducta & sic locis pilosis applicat. Lac suillum illitum à nostris inulierculus laudatur. Unguentum autem coloris, quod, ceu superius, paratur ex p. 2. calc. viv. & auripigment. p. j. Succum thymalorum, *Hyosiam*, cicuta, bryonia, funaria, betæ, semperviv. alii commendant, & sanguinem vesperilionis calidè illitum; quæ omnia poros cutis circumfodiunt quasi & destruant, viscidum pilorum nutrimentum fundunt, liquant, suffurantur. Inuncto felle anguillæ pilorum proventum inhiberi narratur, sed nondum mihi persuadere possum, dari constans ac infallibile pilothrum, quod præterit nuncquam iterum pili crescant, quale quidem *Helmantius* sibi notum fuisse gloriatur, liquorem scil. quo leniter intincta manus & exsiccata si mentum viri attingeret, paulo post excidere pilos barbæ,

superciliorum ac totius capitis; *lib. Entler inferio.* Destituti hoc remedio, lanuna aurea locus utendus est. Et sequens Dropax pilos evellens Plateri.

*Resin. laric. vulg. circiter 4. cochlear. add. massicli subtiliss. tria instar avellane, dissolv. ad ignem & parum coq. postea effunde in lebecem in quo aqua sit frigidissima. dein manib. mala acetur & in magdaleonem rotundum formetur, qui in aqua ne adhaereat servetur. Huius porciuncula dilatata supra cutem pilosam applicata, ubi adhaeserit, iterum detrahatur, pilique in emplastro evulsi habebunt, & si quid de emplastro remaneat, ol. amygd. perfricatione recedet.*

Pilorum *Fissura* à pluribus negliguntur, si *passarum.* tamen huic malo quoque emendationem quampiam desideret, fissi pili pars tenuior erit ulterius detrahendi, singulos pilos dividen. so, atque ea, quæ remanet, circa extremitates felle, vel aqua nostra aloësica inungenda, eaque postea decocto quodam pilos regerente, ex abrotano, rad. cannar. facta, eluenda.

Nonnulli nimis curiosè mucilage aliquâ, visco aut collâ divisos pilos rursus conglutinaturi tempus inutiliter perdunt, quod he de nobis similiter dicatur, à prolixiori leviculi lujus affectus designanda curatione merito abstinemus.

### CAPUT III.

#### *De Contusione Capitis, & Pericranii Vulneribus.*

§. 1.

**A**ffectibus Capitis internam causam potissimum agnoscentibus nunc progredimur ad illos, quorum origo extrinsecus à re violenta fortius illapsa, & continuum solvente provenit, quicquid vehementioribus doloribus & gravioribus stupati sunt aliquando symptomatis, citius etiam Chirurgi manum exposcunt. Tractabimus autem in præsentiarum de Contusione capitis, & Pericranii Vulneribus.

*Contusio*, Græcis *Θλάσις*, dicitur de morbo & specie solutionis continui, cum grave vel durum aliquid supra corpus incidit, ac id ipsum collidit, & sic continuitatem solvit, citra deperditionem manifestam substantiæ, aut externam rupturam, ubi plerumque in parte carnea cruor ex venulis vel arteriis effusus sub cute colligitur, hinc & aliis suffusio, nonnullis sugillatio dicitur, quia venæ & arteriæ exiguæ, imò & vasa lymphatica sub cute rumpuntur; Contusio in specie dicitur cranii vel calvarie recessus & incurvatio à violentâ illusione absque fracturâ. Describi ergo potest Contusio capitis, quod sit evaluatio & stagnatio sanguinis sub cute capitis à solutione & ruptione vasorum sanguiferorum.

*Descripsi.*

*Differen-*  
*tia.*

Vulnus verò Pericranii describi potest, quod sit continuum solutio in partibus mollioribus & carnosius, cum pericranio & periostio ab instrumento aliquo externo pungente vel secante facta.

§. 2. Cum verò Vulnera capitis nunc ma-

jora; nunc minora sint, atque casum vel punctum infligantur, nec ad eandem inferantur mensuram, sicque mille modis varient, variæ ab Autoribus recensentur differentie, quas committere in essentielles & accidentales dividere solent; illas desumunt à vulneris essentiâ, partis vulneratæ conditione & causâ, has verò à fiendi modo, situ & tempore. Vulnus sæpe cum contusione conjunctum est; sed hæ differentie tantum confundunt Chirurgos, & nil ad curationem faciunt.

§. 3. *Contusionis* capitis subiectum sunt omnia *Parti affe-* capitis velamenta, & in iis existentia vasa sanguifera & lymphatica; sic nuper vid contusionem, in qua nihil præter serum sub cute evaluatum fuit.

In *Vulneribus* capitis pro parte affectâ eadem vasa cum cute & reliquis carnosius & membranosis partibus agnoscimus, nominatim pericranium & periostrum.

§. 4. Quoniam Contusiones & ipsa vulnera Capitis, quoad externam nempe faciem, in sensus incurrunt, inanem lidetem operam, si recensendis signis diagnosticis diutius immorari vellem, quod verò ipsorum interiorum attinet statum, situm, & magnitudinem, ea non nisi sagaci conjecturâ & accurato Medici iudicio sciri poterunt, siquidem non semper facile iudicari sit, quæ partes internæ vulneratæ sint, & quousque vulnus penetraverit, cum tale sequitum scientiâ Anatomicâ, & diligenti partium actionum læsarum, nec non excretorum exami-

*Diagnos.*

miue

mine nitatur, sed hisce Contusionibus capitis facile accidere possunt varia pessima signa, præsertim si ex violenta contusione simul cerebrum fuerit concussum, unde accedunt vertigines, Cephalalgia, audiendi difficultates, splendores ante oculos, visus debilitas, omnium artuum lassitudo, memoria abolitio, Epilepsia, Convulsiones, Apoplexia, Lethargus & Mania; ex ejusmodi violenta contusione novi quendam cecum factum, alium surdum, alium apoplecticum, alium plane dementem redditum observavi. Sic etiam si pericranium fuerit læsum, per plura id indicatur signa, ac eadem præbet, quæ videmus in nervis laxis, vomitus enormis solet ægros infestare, quare in vulnere capitis imprimis videndum, an æger post ictum in animi deliquium incidat, an vomuerit, an niens ipsi coniterit, nam si hæc symptomata apparent, denotant, sanguinem aut in cerebro aut in meningibus esse extravasatum. Si absunt deliria & febris, signum est nullam adesse inflammationem, nec extravasatum esse sanguinem in cerebro, sed potius serum.

**Ætiologia**  
**Contusio**  
**ni juxta**  
**Galenic.**  
§. 5. Contusionis capitis causa juxta veteres Galenicæ est res externa gravis, ponderosa & obtusa; quæ caput vel percussit, vel alia quadam ratione offenditur, ut dum casu allicitur caput parieti, vel alii cuidam rei duræ, ita ut cute externa permanente integra, subjacentia vasa sanguifera rumpantur, & sanguinem effundant, qui cuti subjectus eandem distendit, doloremque & tumorem suscitatur, & usi in tempore discutiatur, tandem abit in putredinem.

**Vulneris.**

**Iuxta Pa-**  
**racelsium.**

§. 6. Paracelsus similiter Contusionis causam admittit vel casum vel percussioneam, à quibus sanguis in ea capitis parte, in qua ictus contingit, congelatur & corrumpitur.

**Vulneris**  
**capitis**  
**causa**  
**secundum**  
**Helmontium, Willisum, Sylvium & Cartesii.**  
Vulneris Capitis cum Pericranii laxatione causam existere vult instrumentum quodcumque ita acutum, ut non modo cutem, sed etiam quæcumque demum fabricatum fuerit materia, lapidea nempe, ferrea, lignea, vel alia, sive calu, jactu, aut percussione caput offendens & continuitatem leuens.

**Secundum**  
**Helmontium, Willisum,**  
**Sylvium & Cartesii.**

§. 7. Eadem Helmontius, Willisus, Sylvius & Cartesius de morborum istorum causis cum prioribus stat sententia, statuentibus nempe, Contusionem vel ictu, vel casu à re quadam externa dura & obtusa excitari, unde cute non soluta venula vel arteriola conqussatione dilacerata sanguinem profundunt, qui extravasatus, nec in debitas vias regrediens cutem extollit, & pro majori vel minori illi corruptione filamenta menibranea & cutis nervulos plus minus exagitant, vel vehementiorem, vel remissiorem causat dolorem; **Vulnus** etiam Pericranii à re quacumque externa acuta & continuitatem dissolvente fortius capiti illato fieri, unanimiter fatentur.

**Iuxta**  
**no-**  
**stram sen-**  
**tentiam**  
**causa**  
**Contusio-**

§. 8. Nostra ex sententia Contusiones capitis aliarumque partium, & inde subsequentes infusiones sanguinis oriuntur ex causa externa, à contundendo, & sæpe eandem cum inflammationibus genuinis habent naturam, in his enim

Contusionibus obefasatum sanguinem vel lympham, vasque & poros compressa vel lacerata, adeoque sanguinis & lymphæ motum impeditum, oritur tumor & livor partium contusarum. In Contusionibus levioribus & sæpe superficialibus non multum effunditur sanguinis, nec fit cum laceratione plurium partium carnosarum & nervosarum, & hæc Contusiones insensibiliter discuti possunt. In gravioribus verò plures contunduntur partes, hinc necesse est, ut suppuratio subsequatur, suppuratio enim nihil aliud est, quam partium contusarum mortificatio; in gravissimis verò cum maxima laceratione carnosarum & nervosarum conunctis Contusionibus gangrena oboriri potest, cum sanguis ibidem hærens, cum reliquis succis circulantibus, facile partibus jam laceratis, & spiritibus animalibus destituit mortificationem inferre possit. Ipsi verò Contusiones causa immediata assignanda venit nostro judicio confusio & acrimonie spirituum animalium, à qua aliquando vasa rumpuntur. Causa proximior videtur stauenda ipsa Contusio ab instrumento duro, gravi atque obtuso, ipsi cranio & pericranio illata.

**Causa Vah-**  
**nerum Ca-**  
**pituli.**  
Concurre summus Philosophorum Caput vocat membrum divinissimum, & reliquorum omnium in nobis princeps. Regimen ibi sanctius est Animæ, & ipsius Vice-Regis Microcosmetoris, h. e. spirituum seu succi nervi in minutissimis tubulis in cerebro existentium; statim ibidem duo illi Animæ divini circuitus, seu ut Tullius dicit, motus animorum duplices, alter cogitationis, alter appetitus; quorum illi sensus, huic motus ancillatur, ut ad omnem nutum præsto sint. Ast etiam hic omne vitium morbosum tantò conspectus in se crimen habet, quanto majus quod peccat habetur. Verissimum est & alterum assertum, hanc licet sensus & prudentia sedem, præ reliquis tamen esse imbecillitatem. Visitur id tum aliis, affectibus capitis hic conspicuis, tum si externis imperatur injuriis. Jam paucis de hujus Microcosmetoris Metropolis vulneribus agamus.

Itaque omnia quæ sunt acuta, quæ admodum dura ac rigida sunt, quæque vim habent uicidendi, contundendi, perforandi, merito sub causarum mediarum nomine veniunt, qualia sunt sagitta, gladius, acus, hasta, dentes animalium, globi sclopetorum, aliaque innumera, quibus cutis capitis dilacerari ac dividi potest. Raro verò vulnus capitis absque aliqua contusione fieri solet, & cum ictus vel solutio contingit, fit ut & separetur sensibilis illa membrana pericranii, cranio scil. impolita, orta à duramatre per cranii futuras exeunte. Quidam eam distinguere solent à peritorio cranii, cum separari possint à perito Anatomico, alii unam & eandem esse membranam contendunt. Causa ergo immediata vulnus ipsius est soluta unitas recens ac cruenta; Intumescentia causa est humorum circulantium stagnatio, indicat enim obstructionem circa vulnus adelle.

§. 9. Conspectus hucusque satis quæ ad prognosin theoricam faciunt, nunc dicenda restat **Prognosis** Contusionis & mortis. Hoc ab initio notandum, quod Contusiones capitis omnium sint pessimæ; delirant aliquando, & minacibus verbis ac gestibus adstantes invadunt, nec eos agnoscunt, & delirium ad plures durat dies, cetero exemplo

**Willisii**



*V*ideli obf. 7. Dec. Ann. 5. Eph. Germ. conftat. Contufio eft etiam morbus magnus ratione ellentiz. Contufio graviffima præ cæteris eò pejor, quò maiorem contuffionem corpori factam notat; magnus etiam intuitu remotiõis à ftatu naturali difpofitionis & fymptomatum; magnus præfertim ratione nobiliffima fedis animæ & Microfmetoris. Juxta *Hippocr. fcl. 6. aph. 18.* non tantum illa contufio & vulnus eft *maxis* feu lethale, quod ad cerebrum ipfium pertingit, fed & quod concutere nimis ipfum, & incolas vitæ auctores pelfundare poteft. Si febris & vomitus adiunt, poffimum eft. Sic in pætro Hanovienfi futoris filio, quò à folâ contufione capitis incidebat poff mentem in vomitum, quem comitabantur deliria, tandem accellere convulfiones, & fic Creatori fuo animam reddidit; in cerebro poff mortem repertum fuit cochleare plenum feri limpidi acris evafati.

*Pericranii  
vulnere  
Pericranii*

Vulnera pericranii, ut & omnium partium membranofarum gravioribus ftipata funt fymptomatibus, hinc periculofiffima, & ideo prudentem Medicum & appropriata expofcunt remedia. Convulfio feu fpafmus in vulnere capitis fupervenientes perniciofa eft, *dogio Hipp. S. 5. aph. 2.* Si, juxta *eandem*, in magnis vulneribus & pravis tumores non appareant, ingens malum. Vulnus cum febre inflammatoria, dolore ac convulfivis motibus, monftri quid alit. Si Pericranium aut Perioftium in totum fuerit reftitum ufque ad calvariam, minus intendit periculum, quàm fi fit ex parte tantum laceratum. Sic & vulnus capitis punctum inflictum plus habet periculi, quàm quod cæcum factum. In iis, qui Gallico vel feorbutico laborant morbo, difficilis fanantur vulnera, quim in aliis, quia in his peccat ut plurimum humor acido-corrufivus, vulnerum fanationi apportans impedimentum. Sic & vulnus capitis magis aut minus periculofum eft, prout huic vel illi loco capitis parti infligitur. Sic vulnus occipitis ob craffitatem offis minus periculofum æftimatur, quàm in offe bregmatico, quia officulum tenerum & vicinum futuris eft. Sic & vulnus temporum, ubi mufculus temporalis contectus eft pericranio, maxime periculofum eft, & quia in his locis arteria & nervus læfus fpafmum facile inducere poteft, hinc & fæpe ob hunc mufculi oppofiti contractionem oritur oriftortura. Vulnera capitis quò diutius fuere ætri expofita, eò facilius fphacellantur, quale exemplum habui in milite Hanovienfi, & ruftico Hailo. In fubjecto cacoehymico, & æftivo tempore, vulnera hæc capitis denotant anguem latere in herba. Vulnera venenata fub pelle vulpine ex infidiis fuam exercent tyrannidem, quæ ergo legnes Medicos & lenta remedia non expetit, quare hic momentum temporis eft obtinendum. Pus verò laudabile & maturum mox apparens, tanquam telluris materiz bene temperata Medicum confolat. Reliqua peti poffunt ex capite de Vulneribus in genere.

*Cura Dis-  
cretæ,*

§. 10. Ordinis vult ratio, ut ad curam, & quidem primo *Discretam* nos accingamus. Aër ergo fit temperatus ad calidum vergens, reliquus omnis vitandus angue pejus, & quocumque modo à vulnere arcendus, imprimis acidofitrofus, ut pote qui folus ita delinere poteft poros, & fuccos coagulare, ut gangræna aperiantur feneftræ, fi enim recens vulnus in mo-

mento concludi poffet, ut nec aër externus irrueret, nec amplius quid è vulnere efflueret, à natura folâ vulgò fic dicta brevi consolidaretur; vulnus; fedulo ergò mox tegendum vulnus, inter deligandum lintamine calefacto prius, ut ad aërẽ fic magis defendatur.

Victus fit tenuis, cibis eligatur optimus & talis, qui particulas nutritivas & fuaves admodum fecum vehat. Potus fit calidus mediocriſ cereviſia fecibus orbata, herbis cephalicis maritata, & pro re natâ decoctum cephalicum ac traumaticum prodeffe poteft: Vini uſus nimis interdicitur, conceditur verò in modica quantitate cum oculis Cancris.

Somnus paucus vitetur, quies cordi habeatur. Animi affectus ſint pacati, exilent præ aliis ira, terror, triflitia, ſpiritus nociva ſingula. Hinc adverſarii quoque adventus aut præſentia caveatur, ne ſucci circulantes periculum creent reliquis ſpiritus animalibus.

Venus ceu ipſa peſtis ſugienda, quia cerebrum minus commovet, & humores ſtagnare facit: vitetur imprimitis in vulneribus capitis uſus, cui uſus noxam vide apud *Hildanum Cent. 1. Obf. 13.*

Excetenda promoveantur.

§. 11. Nunc his præmiſiſ ad curam *Pharmaceuticam* nos conferamus, aliorum de ea ſententiam prius percepturi, quàm noſtram aliis obtrudamus. *Galenus* ergò in *Convulſionibus* capitis levioribus imponunt medicamenta, uti dicunt, exſiccantia, qualia volunt eſſe emplaſtrum Iſis, de heconica, & matreſylva & Gracia Dei; quando verò partes illæ valde ſunt tritæ & laceratæ, ut reſtitui nequeant, ſed planè emoriuntur, neceſſe ſtatuunt eſſe, ut ſuppurentur, quare ad promovendam ſuppurationem adhibent unguentum ex reſina terebintina, viello ovi & oleo roſaceo; Suppuratis iſtis partibus accedit ad detergentia, Incum videl. apii, farinam ervi, fabarum, hordei, lupinorum, quibus admiſcent mel roſaceum & loco affecto imponunt. Si verò ulcera appareant ſub contuſione cava, incidunt cavum illud tranſverſum, & deterſo ulcere ea tandem adhibent, quæ carne ulcus adimplent, qualia ſunt pulvis ex thure, iris, aſtilochia, panace, farina hordei, fabar &c. & Emplaſtrum nigrum Aſtilæ, aut quod ex Gunni elemi paratur.

*Pulveris.*

In *Vulneribus* capitis cum Pericranii læſione citè curandis reſpicitur tum ad ſanguinis aliorumque humorum affluxum, tum ad dolorem, tum ad ipſum morbum ſeu vulnus. Sanguinis, vel aliorum humorum affluxus, qui cauſa interne rationem habet, ſi inflammationem ſuſcitat, eam propullandam vel ſubmovendam volunt, omni ſtudio adhibito, ne ſanguis in corpore vel contrahatur, vel jam contractus ad locum affectum aſſuat, quod inſperare conantur remiſſa ſuſtenta victus ratione, ægro ſolùm concedentes panem ex aqua madafactum, aut elixum, vel cremorem hordei, aut pulcillum ex panetito cum ſucco amygdal. dulc. loco potus verò decoctum hordei cum glycyrrhizâ, & in tali dicta ad diem 14. perſiſtere luadent. Pro majori averſione ſanguinem vena ſecta emittunt, & quidem in cubito regione ipſius vulneris. Purgationem quoque præſcribunt, maxime ad evacuantium bilem, quam tantopere in vulneribus credunt noxiam. In tenacioribus clyſteres ex-  
habet paulum aciores, ſanguis ſugas ano, & cu-  
citur.

*l. 4. ut dicitur  
curatus  
rei dicitur  
tempeſte.  
mur parti-  
culis d'ſano  
guinis  
maſſa chy-  
leſi balia.  
muci &  
glutinan-  
tibus reſer-  
ctur.*

*Incus Ca-  
ſentis Cu-  
ra Contu-  
ſionis.*

ne pars affecta sanguinem & humores fuscipiat, ei adhibent repellentia, interdum, si opus sit, cum fuscis, quæ tamen ubivis in capitis vulneribus non requiruntur. Inter repellentia ista præ aliis laudant vinum nigrum austetum, cui quidpiam de oleo rosaceo sit immixtum, vel medicamentum ex thur. part. ij, aloës part. j. cum albumine ovi subactis, admixtis pilis leporinis. Dolor in locis incis, imprimis tenetiori illa membrana pericranio, ut sedetur, instillant oleum rosaceum tepidum, vel sanguinem turturis aut columbæ adhuc calidum, cuti verò vulneratæ applicant vitellum ovi cum oleo rosaceo subactum. Vultus tandem ipsum, si simplex sit & sine contusione à sola sectione illatum, solam unitatem desiderat, quæ sæpe à sola natura live à succo nutritio balsamico agglutinando perficitur, & quidem in pericranio, interveniente procreatione carnis, ita ut Medico eò solum sit adlaborandum, ut oræ parvis vulneratæ distantes iterum adducantur, sordes detergantur, & humor carnis procreationi aliis exilens impedimento exsiccetur. Oræ ipsius plagæ non tantum semel debent adduci, sed adductæ etiam servari usque dum penè sint agglutinatæ, ad quod acu & filo interdum opus est, ut ita alligari possint. His peractis ad medicamenta sarcotica perveniunt, quæ componuntur ex iride, aristolochiâ, thure, farinâ hordei, fabar. &c. vel formâ pulveris inspersenda, vel emplastri imponenda; quibus subiungunt emplastra catagnatica, & potissimum cephalica, ut sunt Emplastrum de Betonicâ, de Gratia Dei, Conciliatoris. Denique cicatricem inducunt medicamentis siccantibus & adstringentibus ex malicorio, gallis, cadmiâ, plumbo usto, squamâ ætis, & similibus.

**Paracelsi** §. 12. *Paracelsus* in *Contusionibus* istis capitis externis perungit locum affectum oleo laterino, & postea ligat cum aceto rosaceo. Laudat etiam tanquam præstantissimum Oleum Hypericonis, ut eo aliquoties illinatur, ita enim sanguinem coagulatum facile resolutum iri promittit, cui usui & olea vulneraria, balsama, & ex fodicacione emplastri tracta commodiore testatur.

**Vulnera pericranii.** In *Vulneribus* istiusmodi capitis & pericranii durandis omnem rejicit suturam, & quicquid ex ovorum pultribus & resinis illis immittitur, eaque per solum nutrimentum vult curanda, ita tamen, ut si jam depravata sint, à fetore & corruptione repurgentur. In principio mitissimè cum vulneribus istis agere suadet, impositis medicamentis ex vero fundamento compositis, & ab intrinsecis inimicis defendentibus. Linteolum igitur tenue, vel byssinum velum, oleo vel unguento vulnerali & calido madidum superponit vulnere, sic ut fundum ejus tangat, intacta & illæsa pia matre. Olea verò & Unguenta talia sequenti modo parantur.

℞. *Ophiogloss.*  
*Pirol. min.*  
*Agrimon.*  
*Diapens.* aa. Mj.  
*Flor. Hypericon.* Mij.  
*Consolid. maj. cost.* Mß.  
*Lumbric. purgat.* No. C.

*Affundatur corpus, seu oleum, & in sole digerantur omnia suo determinato tempore.*

℞. *Butyr. majal.* lb. iij.  
*Rad. Consolid. maj. virid.* lbj.  
*Lumbricor. purgator.* lbß.  
*Aristol. rotund. virid.* ʒij.

*Terantur omnia simul in pulvis, & postea repantur in locum frigidum, & si pinguedinem emittant, eam abijcere licet. Poteri etiam soli exponi, vel in fimo dgeri, & postea ad usum servari.*

Vel

℞. *Resin. Laric.* lbj.  
*Ovor. vitell.* No. xx.  
*Contund. simul omnia, fiet inde statum unguentum, huic impone*  
*Consolid. maj. optimè trita* ʒß.  
*Aristol. rotund. contus.* ʒi.  
*Farin. hord.* ʒvj.  
*Conteantur simul omnia, &*  
*F. Unguentum.*

Postmodum sulcum implet medicamento ex herbis & floribus in oleo vulnerali contentis, & prius expressis, postremò fodicacionum unguentum superponit, ligatque, donec patiens melius habuerit, & roboratus fuerit, quod in octo vel novem diebus plerumque fieri confidit. Hinc cum patienti feliciter res succedere videtur, oleo balsamino eum curat, quod plurimè leniter illinit, & unguentum superponit, tandem fodicacionum unguentum sequenti modo paratum adhibet ad finem usque curationis, & omnimodam vulneris curationem.

℞. *Cera Virgin.* lbj.  
*Piceis Grac.* lbj.  
*Terebinth.* ʒij.

*Liquefiant igne lento, quibus impone tria mastic.* ʒij.

*Carabis flav.* ʒiß.  
*Maneant in igne lentissimo quartam hora partem.*

*Postmodum accipe*  
*Mum.* ʒij.  
*Thur.*  
*Myrrh. aa.* ʒß.  
*Aloepat.* ʒiß.

*Tria misce prædictis, & agita semper spatula donec frigescant. Postremo in emplastrum agitentur oleo seu axung. pisc. Alchid, addendo camphora trita ʒß. Serv. ad usum.*

In levioribus autem vulneribus uno solummodo medicamento sine ullo metu procedit. Remedia etiam interna non omittit, potiones videl. vulnerarias, inter quas sequens aliis præferenda:

℞. *Diapens. vel sanicul.*  
*Pirol.*  
*Centaur.*  
*Beton. aa.* Mj.  
*Consolid. regal.* Mß.  
*Argimon.* Mij.

*Herba hæ omnes indantur cantharo clauso, & pulvis bene munito, & aqua ferventi impositio: Coquantur oïo horis per se, vel addita pauca aqua, Lignor excoctus servetur pro usu:*

qui commodior est, quàm si in vino fuerint coctæ, quod in capitis vulneribus potissimum noxium habetur. Ita etiam cibos pro vulneratis hæc parare docet, ut nempe illud, quod pro cibo patienti adhiberi debet, carnes aut gallinæ, in cantharum ponantur, cum aquæ tanta quantitate,

D

titate,

tute, quantum juris habere quis velit, additis herbis vulnerabilibus, atque in cantharo obturato coquantur in cacabo fervente aqua pleno, suo tempore conveniente, quem cibum vulneratis hinc reitur utilissimum. Si quoque æger tertio die aut paulo diutius à vulneratione deobstru- ctione conqueratur, concedit illi laxantia, sup- positoria nempe, & si ista non satis juverint, cas- tiam fistulam exhibet, aut electuarium ex succo rosarum, aut benedictam laxativam, vel portio- nes ex decocto folliculor. senæ, polypodii, &c.

*Helmontius  
enim ad  
Contusionem*

§. 13. *Helmontius* Contusioni superponit bryo- niam albam rasam, & paucis horis cruorem il- lum resolvit ait in aquam, quam pariter per cu- tem exigit.

*In vulneri-  
bus capitis.*

In *Vulneribus* commendat alkalica & herbas vulnerarias operari docet virtute cuiusdam im- nati alkali, lapidem itaque cancrorum præcel- lentem existimat, quatenus omnem vulnerum acetositatem corrigit, si cum vino potetur, cum lapis iste in vino facillimè vim atque saporem li- xivii inducat, proinde Medicis persuadet, ut vi- ni usum minimè horreant in vulneribus, liqui- dem eo ipso, ut sapit alkali, vini vires atque proprietatem amittat. Simili modo & alkali è rilia feliciter propinari credit, imprimis collocat laudar, quod omnem vulnerum corru- ptorem enecat, uti & sal Qi per spiritum vini rectificatum, donec adstringentem gustum nan- ciscatur. Solutionem continui mox congruti- nari promittit per collam è cortio hominis vio- lentà morte & integris viribus perempti. Interea ab omni influxu lunæ cavere præcipit, cum iste vulneribus maximopere noceat, putredinem inducat & Archeon valde irritet.

*Ursus mo-  
dus curan-  
di Contu-  
sionem ca-  
pitis.*

§. 14. *VVilfusus* in *Contusione* simplici adhi- bet discutientia externa, vel formà foliis ex de- cocto rad. aristol. rotund. polygonar. fol. beton. verben. salv. charrefol. flor. Camomill. Hyperic. sem. fenic. lini, lumbric. &c. in vino coctis; vel linimenti ex ol. Camomill. Hyperic. mucilag. sem. lini, gummi tragacanth. In gravioribus, ubi sanguis extravasatus discuti nequit, venæse- ctionem instituit, revulsionis gratiâ, & pro at- tenuatione & pororum apertione sudorifera medicamenta propinat. Quando verò sanguis ob sui copiam vel crassitatem neque attenuari & discuti, neque in venas resorberi potest, eun- dem vel suppurari permittit, vel ante suppura- tionem per scarificationem elicit, adhibitis, si opus est, illis, quæ à gangrenâ præservant, tan- dem locum affectum ad sanitatem perducit em- plastro de betonica cum succino & masticæ.

*Vulnera  
cap.*

*Vulnera* ut ritè curentur, sedulo vult obser- vandum, ne quid extrinsecum admittatur, quod partem corrumpere, & genus nervosum cum in- colis ejus spiritibus animalibus irritare possit, quare omnis aer & imprimis frigidus ardens, vulnus studiosè obtegendum, & spiritus ad sua munia revocandi sunt, ne nimia copiâ ad par- tem affectam influant, & sanationem non modo impediunt, sed graviora inducant symptomata; proinde venæsectionem instituit, & si obstru- ctio urgeat, laxantia adhibet, ne pravi humo- res cumulentur; subjungit deinde corroboran- tia & vulneraria, v. g.

Rad. bardan.

Aristol. rotund.

Caryophyllat. aa. ʒi.

Ireos Florent. ʒb.

Galang. min. ʒi.

fol. beton.

verben.

salv.

veron. aa. Mj.

flor. Hyperic.

ros. aa. ʒij.

Ebor. ras. ʒi.

Coq. in aq. font. lbijj. ad tert. part. consumt. edule. Syr. de Pæon. & de beton. aa. ʒib. Dentur ʒiij. vel vj. pro dosi.

Rad. Pæon. pulv. ʒiij.

Confero. flor. beton.

salv. aa. ʒij.

Nuc. jugland. condit. ʒb.

Rad. Pæon. pulv. ʒiij.

ligni aloei,

semali citrin. aa. ʒi.

Corall. pub. pp.

Margar. pp.

Ebor. aa. ʒib.

Sal. verben. ʒj.

Syrup. veron. q. s.

F. Opjata; de quâ nucis moschata quantitas aliquoties assumenda.

Rad. Ceras. nigr. ʒij.

verben.

ulmar. aa. ʒj.

Spir. C. C. ʒij.

Syr. flor. Paralyt. ʒj.

M. Detur cohibitum.

Externè non omittit promomentia suppurationem eorum, quæ partium vulneratarum unio- nem impedirent, nec non vulnus mundantia, agglutinantia & consolidantia, qualia sunt Bal- samus de Capaivâ, de Peru, Ceratum de Beto- nica, Diadematannum, Emplastrum Oppotel- doch Paracelsi.

§. 15. *Sylvius* ad resolvendum sanguinem coa- gulatum in *Contusionibus* potissimum utitur sali- bus volatilibus, cum externè, quàm internè; si verò resoluti nequeat, suppurationem promovet, inuncto partium tumentium Unguento Agrippæ, vel de Althæâ, cum oleo lil. alb. & imposito em- plastro diachylon simpli. deinde loco aperto pus genitum educit, coque ducto ulcus mundat & consolidat Balsamo Quis terebinthinato, vel anisato.

*Vulnera*, si omnia prius remota fuerint obsta- cula, & labia invicem adducta, non ita difficul- ter externis balsamicis & conglutinantibus sana- tum iri confidit; petricranio verò læso, ne spas- mum contrahat, ab initio statim aliquid olei destillati ceræ, vel balsami terebinthinæ præci- pit instillandum.

§. 16. *Carresianus* ut rectam administrent *Con- tusionum* capitis curacionem, seduli sunt in ob- servandis earum gradibus, aliter tractantes le- viores & superficiei, aliter graviorem, ali- ter adhuc gravissimam. In *leviori*, ubi exvulnâ vel arteriola ruptâ parum sanguinis effusum le- viculum tumorem & dolorem suscitât, discuti- entia solum adhibent externa, poros aperien- tia, & sanguinem ita resolvantia, ut facile exha- let. Fotum ergo applicat ex spiritu vini, in quo rad. polygonat. Symphyt. fol. beton. salv. char- refol. flor. Camomillæ Roman. Hyperici, sem. cumini, anisi, &c. macerata sint, vel spiritum lumbricor. calidè illinunt, à quo brevissimo spatio omnes suffusiones à quacunque contusio- ne aut verberatione inductas disparuisse observa- runt, imprimis si parum camphoræ in eo dissolu- tum fuerit, vel sequens inungunt Linimentum.

Rad. Urtic.

# CAP. III. DE CAPIT. CONT. & PERIC. VULN. 27

¶ *Ung. de Gynoglossi.* 3ij.

*alabastr.* 3j

*Ol. Hyperic.* 3ib.

*d. Camomill. smaragdini.* 3lb.

M.

In *graviore*, ubi plures veniæ vel arteriola dilacerata majorem sanguinis effuderunt copiam, qui stagnando coagulatus attenuari nequit, ad promovendam resolutionem internè aliquoties exhibent sudorifera dissolventia, attenuantia & poros ulterius dilatantia, ut sic ad exhalationem fortius instigetur, qualia sunt oculi can. Gum diaphoret. *Svolat.* C. C. lumbricor. decoctum bardanæ & Sanemundæ, Tinctura munia, spir. ❖ succinat. Sin nullo modo resolvi & attenuari possit, sanguisque aliis liquoribus mixtus corrumpi incipiat, cum ad suppurationem disponunt medicamentis ex terebinthina, gumm. elemi &c. paratis; suppuratum verò quantocyus loco aperto emittant, ulcus mundant, abstergunt & consolidant emplastro diachyl & cerato de betonica. In *gravissima*, in qua cutis & muscoli variè conculcati, sanguis etiam & reliqui ei immixti liquores corrupti partes subiacentes, pericranium nempe & cranium invadunt & gangrænam minantur, omni studio malignitati eorum resistunt, acrimoniam mitigant & partes ulterius defendunt, internè Bezoardicis & sanguinem depurantibus, Eleazario v. g. Bezoardico *Ang. Sal. Dialcord. Fracast.* &c. externè eluendo partem affectam Spiritu vini theriacali & camphorato, applicando emplastrum ex fariu. orobi, lupinor. herb. absinth. scord. rut. cum spir. vin. parata, vel inungendo aut imponendo Unguentum aliquod digestivum mixtum Unguento Bezoardico *Ang. Sal.* &c.

In *Vulnere Capiti & Pericranii.*

In *Vulnere* capitis & pericranii curandis cum aliis se maximè præbent occupatos, ut aëris accessus impediatur, extraneum quodcumque & vulnere eximatur, symptomata præcaveantur & avertantur, labia adducantur & consolidentur. Aëris accessus inhibetur, si vulnus ab infestatione statim obtegatur, & aërambiens frigidiusculus vel humidus arte corrigatur, accensio igne in fornace vel cantino, & fumo ex succino, mastice, gummi animæ, juniperino. & similibus suscitato, quo linteam aliquoties complicatum etiam imbutur & vulnere imponitur. Extraneum quodvis remouetur vel instrumentis, vel emplastris ejus & aculationem promoventibus ex melle, visco quercino, ocul. cane succino, &c. Symptomata hic potissimum timentenda sunt hæmorrhagia & convulsiones. Hæmorrhagiam sistunt pulveres inspersorii ex aloë, thure, mastice, farina volatili, &c. vel perse inditi, vel cum albumine ovi agitati illiti. Convulsiones præcaveantur antispasmodicis intus & extus adhibitis. Internè dantur Essentia Hyperici & salviæ, cum sp. C. C. succinat. Vulnere instillantur oleum terebinth. sp. lumbricor. & camphoræ. Labiorum adductio vel sponte fit, vel manibus & emplastris agglutinatoriis. Consolidatio perficitur internè decoctis & potionibus vulnerariis ex radic. aristol. rotund. caryophyllat. pæon. visc. querc. vel pyror. Herb. betonic. veron. salv. sanic. alchimill. flor bugul. consolid. regal. anth. cancris fluvial. lumbric. in aquâ comuni & vino, addito Syrup. de Symphyt. *Fern. Hyperic. flor tunic.* &c. externè ballanus & emplastris aliis sananti-

bus, ex quibus sequens frequentius habent probatum:

¶ *Cerat. de beton.* 3j.

*Empl. Opposeldach. Parac.* 5. j.

*Bals. Peruv. alb.* 3ib.

*Gumm. lacamahac.* 3ij.

*Cum l. q. d. Ovor. & Hyperic.*

*Melax. F. Emplastrum.*

Emplastrum Diachylon simplex sæpe varia capitis vulnera ad sanitatem diducit sicut observatum.

§. 17. Nos denique, ne illius viribus curam auspicemur, & periculosa subeamus aleam remissis & velis desistit, operæ pretium erit, ut indicationes eruamus, quæ intentioni nostræ veliscentur; sufficientem autem tres indicationes, quibus *Contusiones* absque vulneribus curandi methodus innititur: prima, ut sanguis congruenter resolvatur & discutiat, quod tempore amittendum; secunda, si nequeat discuti sufflatio, & sanguis ad suppurationem tendat. Medico nimis sero accersito, necesse est ut suppuretur, & abcessus apertus consolidetur eadem ratione ac inflammatione. Tertia graviorum symptomatum medelam urget.

Jam expedita erit via ad curam auspicandam. In *Contusionibus* itaque sanguis vel serum evacuat & congruenter resolvatur. quod obtemperare possumus per sudorifera cor. unatum sanguinem resolvantia, observando simul, ut si suspicio sit partis, præsertim intertæ, per Contusionem læsæ, nunc blandè dissolventia, rursus blanda diuretica ad unguant, sanguinem enormiolum per dicta loca optimè evacuantia. Sin saltem in externis partibus hæreat sanguis, sufficiunt diaphoretica, sanguinis circulum retinentia & factam Contusionem corrigentia: præ aliis hic conducit lap. scissilis Anglicus, seu Irlandæ, Ocul cane assumti, item carbonones tilia in vino propinati, pulvis contra casum, mumia, sperm ceti. Sic & conducunt omnia saliva volatilia, imprimis liquor C. C. succin. c. Essent. viperin. euporistum nobis remedium Salicium hæc volatilia sunt genuina præstidia pro circulo lymphæ & sanguinis redintegrando, pro vigore conservando, diaphoretica enim hæc serum ichorefcens eliminant, ut viscosum, torpidum, stagnans volacilestetur & rarefiat, per poros hinc quæ nervorum ipsorum, quæ glandularum subcutaneorum quasi filtretur, facto recto servato cursu succorum. Hæc dico non assilum ad partem affectam abacerent, ut vulgò dicunt, sed acidum coagulatorem corrigunt, in quem finem exhibemus pulverem ad casum, cum Bezoardico & Cinnabarinis, ne crebri alveos gravet amplius lymphæ, sed magis explicita nitore suo splendeat, spiritusque hinc antea sopiti, corrigantur & resurgant. Laudamus & in eum finem spiritum Qi compositum, spiritum theriacalem camph. Liqoreum eboris succinat, &c. Essentiam traumaticam cum bezoardica mixtam.

Secundæ indicationi ut satisficiamus, diuretica usurpanda sunt, ex quorum classe eligamus illa, quæ lympham corrigunt, ejusque ichorefcientiam prohibent, & sariæ ad urinarias vias divertendo ac arcent magis, ne febris accendatur vel foveatur. in quem scopum succinata, acidula nitrola & temperata huc faciunt. Sequens pulvis non erit contemnendus.

D 2

¶ *Ocul.*



## CAP. III. DE CAPIT. CONT. & PERIC. VULN. 29

temperata vulneri imponenda, qualia sunt terebinthina, mel. ros. gummi elemi, thus, mastic, aloës, myrrha, vitell. ovi, cera, Balsamus de Peru, Ol. ovor. Hyperici. Per alios conducet sequens balsamus, qui valde acidum temperat.

℞. Terebinth. Cyp. ʒj.  
Ol. Hyperic.  
Mell. comm. aa. ʒß.  
Myrrh. ʒß.

Liquefiant simul, interim Gummi elemi liquefat seorsum, & add. pro justa consistentia ol. cera parum: dein fascia non more veterum, sed tantummodo sudarium concinne applicetur vulneri. Cavendum ab omnibus pinguibus, quia ea particulis suis ramosis poros cranii tubulos obstruunt, atque efficiunt, ut humores stagnent ac acefiant, & cranii salem volatilem corrumpant, sicque cariem cranii inducant; sic & ab adstringentibus abstinendum, ne sanguinis aliorumque humorum circulatio impediatur, quæ in inflammatione potius promoveri, quam liti debet. Hoc enim asterisco notandum, quod capitis vulnera non nimis cito sunt consolidanda, sed prius variis sanguis optime exhauriendus est, & dein vulnus implendum optimo digestivo, & dum vulnus reliquetur, admoveatur semper vas aliquod Capiti carbonibus vivis impletum, eum scilicet in finem, ut frigus ambientis aeris aliquatenus temperaret, acidum scilicet illud aeris nitrosi.

Sepe etiam necessitas efflagitat, ut vulnus à Chirurgo dilaretur, hinc videndum, num crucialis carnis incisio aut alia melior sit.

Ad succorum resorptionem gangrænam comminantes impediendam, & ad circulationem partis vulneratæ naturam conservandam sequens cataplasma applicari potest.

℞. Herb. beton.

seord.

rut.

absinth. aa. Mj.

farin. sem. lini,

fabar.

flor. Camomill. aa. ʒiß.

Cog. parum in vino & applic. tepide; quo cataplasmate gravissima vulnera curari poterunt. Hic & conveniunt olea balsamica, salia volatilia oleosa temperata, talia enim acidum pericranio molestum corrigunt, & naturalem cursum succorum conservant, & ulteriorem corruptionem præservando sanationem vulnere promovent, talia sunt jam dicta, bals. Peruv. &c. cave tamen, ceu dictum, ab oleis pinguibus, quæ in se habent acidum satis potens, & quæ sunt inimica vulneribus ob unctuositatem poros oblinentem; nec applicentur acria volatilia, detergentia aut mundificantia dicta, ea enim consumunt nutrimentum balsamicum, & dolorem inferunt maximum, præsertim ubi simul pericranium, membrana illa nervea, sit læsa, in quibus partibus semperprehenditur acor magis intensus, subitior & penetrantior, quam in sanguineis, major enim sordium copia in vulneribus membranarum partium solet observari. Notandum hic quoque Chirurgis, ne sæpius mutant medicamina, ne sanguis & humores circulares plus turbentur.

Interne ad acidum vulneris contemperandum conducunt omnia, quæ alkali occulto temperato constant, & acida quæcumque aut in stomacho & primis viis, aut in ipso vulnere corrigunt, præprimis in capitis vulneribus oculi canc. cumcinnab. nat. mariati, & sæpius exhibiti, nec negligantur potiones vulneratæ dictæ, de quibus omnibus & symptomatum curatione, vide in capite de Vulneribus in genere.

## CAPUT IV.

### De Cranii Depressione, Fracturâ simplici, & cum meningum & cerebri læsione.

§. 1.

IN præcedenti capite egimus de Vulneribus Capitis, ad quæ pertinet Cranii depressio & fractura, de quibus pauca hic tractaturi sumus. Describuntur Fracturæ Cranii, solutiones continui ossium calvarie. Quoniam verò fracturæ hæ non eodem modo insiguntur, differunt, cum ratione instrumenti lædentis, tum respectu solutæ partis. Cranium quasi parva galea dicitur, aliis Calva, nonnullis Calvaria, & est os capitis crassum, rarum, duabus lamellis vel tabellis adornatum, ossibus septem compactum, suturisque veris tribus, Coronali, Lambdoide & Sagittali distinctum, cerebrum contingens, atque utramque meningem continens. Huius Cranii fracturarum nonnulli Auctores quinque referunt species, prima ipsi dicitur Contusio Cranii. 2. Rima, 3. Sedes teli, 4. Impressio, seu Introcessio, seu Depressio, 5. Contrahisura. Ex illis prioribus dicuntur simplices. Hic notandum, quod omnes Scri-

ptores Chirurgici in describendis his affectibus nimis liberales sint, & quod unico folio comprehendere possunt, eo sæpe viginti commaculant: ad quid enim inserviunt ejusmodi imposita nomina?

Contusio Cranii describi potest, quod sit solutio continui ossium Cranii, juxta minimas particulas solutæ, per ossæ compressionem substantiæ, quæ vix ad sensum patet. Hæc contusio potest esse vel in superficie, vel per primam vel utramque tabellam, tum ratione loci in ossæ frontis, occipitis, parietalibus atque petrosi, in plantis ossis vel suturæ.

Rima dicitur vulgò, cum percutitur os cranii & ob duritiem non cedit, sicque rimam contrahit, sicutque hæ rimæ vel rectæ, vel partim curvæ, vel latæ, vel angustæ & stellatæ instar, longæ vel breves, uno in ossæ, vel ab uno in aliud per suturam transeuntes, vel sunt in unâ, vel in utraque lamella, quædam verò manifestæ in su-

Contusio  
Cranii  
quid?

Rima quid

periotæ, aliæ occultæ in inferiore, quædam vero inconspicue sunt & manifestantur arte.

*Sedes telæ.*

*Sedes telæ* est cranii solutio continui secundum longitudinem, latitudinem & profunditatem telæ vel instrumenti lædentis, ossibus in suâ ipsorum naturâ manentibus. Ad hanc speciem

*Succisio.*

refertur *Succisio* ita dicta, cum succisum ita sit os, ut adhuc hæreat aliqua parte ossi sano; item dicitur *Refectio*, cum penitus ossis fragmentum decidit.

*Depressio.*

*Depressio* vel *Impressio* propriè est instrumenti ferientis ergò depressio versus inferiora; & cranii depressio non aliter se habet quam flamma aut plumbea vasa, quæ casu vel concussione intus cedunt deprimenturque. In senioribus ferè semper fit cum fissurâ & contusione, quia in ipsis cranium durum, facillè scissile & aridum est, in junioribus ferè absque his fieri potest, fit tamen sæpe cum fragmento pungente membranam de qua depressione cranii vide Du Stalpart. p. m. 25.

*Elevatio  
& Con-  
comeratio.*

Quidam & aliam speciem addunt, *Elevationem* scilicet quæ & aliis *Concomeratio* dicitur, fitque extrahendo instrumentum feriens, quolacumque fuerat ager, quæ species tamen admodum rara est.

*Contrafissura.*

*Contrafissura* verò ea dicitur, cum cranium aliâ parte rumpitur, quam ubi percussum est, de qua & Auctores tres numerant differentias. Prima est, quando fit in oppositâ parte, videlicet cum os occipitale percutitur, & frontale rumpitur; aut cum dextrum bregmaticis os læditur, sinistrumque frangitur. 2. Cum dextra pars afficitur, & sinistra ejusdem ossis rimam accipit. 3. Cum superior lamina affligitur & inferior rimasgit: quam contrafissuram adhuc in dubium vocant Auctores. Sed miror veterum industriam in excogitandis inutilibus nominibus, qui ipsam rem neglexerunt, cum de contrafissura non amplius sit dubitandum, quod non ita pridem in milite observavi, sed & Collega meus D. D. Angelocrator vidit in aliis, qui sequens mihi communicavit exemplum: militi cuidam ex ictu frustibus cranii in summa capitis parte separabatur instar vasis, (German. eine Schaal) quo valedicim miles restitutus utebatur pro ordinario suo vase ad bibendum. Contrafissuram etiam indicat C. Blankardus in Anat. Pract. Obs. 53.

*Diagnosi.*

§. 2. Quoniam Medicus curam non aggreditur, priusquam cognoverit quæ curanda sint, de Signis ergò agendum est. Signa verò solutionis continui in nostro subjecto latent sæpe in profundo puteo denieris, & non aliter, quam nientis acumine sunt eruenda. Ante omnia ergò scrutandum est, an & quando perpessum est cranium. An passum sit, patet ex eo, si in vulnere capilli repertiuntur relecti, signum enim est, solutionem pervenisse usque ad os. 2. Si os conspicui possit. 3. Si specillo durities ossis percipiatur, ac ionus audiatur, quæ tamen accurate observari nequeunt.

Ossis non detecto, & instrumento obtuso sauciato, si digitis prematur cutis, & inæqualitas denotetur, signum est, os injuriam passum esse. Hæcæ perpenis paucis videamus, quomodo certiores fieri possimus, ubi neque capilli sunt relecti, aut inæqualitas animadvertitur; hic interrogandus ager, an oculi caligant, aut num vertiginem patiatur, num quoque valde

doleat caput? Si omnia hæc affirmat, & accessit injuria illa externa, h. e. si percussus fuerit instrumento contundente, magnâ vi & impetu nudo capite, de Contusione ossis suspicatur; postmodum si in agro cranium percussum videatur, & is dolorem sentiat magis versus interiora, id est, cerebrum, signum esse potest, fragmentum aliquod de interiori lamellâ abruptum esse pungens duram ac piam matrem, quod adhuc magis apparet, si stupor & apoplexia postea superveniunt, imò Epilepsia, quâ defunctus est civis Limburgensis, festucam talem post mortem cerebrum inhaerentem relinquens. Sic hoc in affectu sæpe adesse solet sopor, & lædatur sapius ratio & loquela.

In Depressione detegatur os per factam crucialem sectionem, quo detecto facillimè cognoscitur impressio, tam ad inferiora, quam ad superiora.

Porro reliqua signa probabilia ac rationalia fracti cranii à patiente desumuntur, si ab ictu, aut ex alto in durum præceps deciderit, & per temporis aliquod intervallum ab ictu, casu vel occurru sine voce, visu, auditu permanferit, qualia symptomata nuper observavi in milite, cui os cranium gladii ictu ita fuerat percussum, ut non tantum meninges, sed & ipsum cerebrum conspicui potuerit, quare observavi in hoc milite non tantum motum in arteriis, sed tota substantia cerebri videbatur se commovere, qui optimè tractabatur à Chirurgo Hanoviensi *Wedding* dicto, ipsum in decimum diem etiam conservante, adierat vomitus, nec de capitis sed ventriculi dolore conquerebatur; decimo die manè visitabamus hunc agrum, & reperiebamus ipsum in terrâ, & horribili adpectu cænebamur substantiam ipsius cerebri hinc inde ad parietes hærentem, cerebri enim substantiam nobis presentibus & invitis sibi ipsi ex capite depromebat & projiciebat. Soporosi demum undecimo defunctus est die, & quod mirum est, miles hic post acceptum vulnus iniliare pedibus emensit, non deliquit nisi linteo, (*Schnupstuch*) & nunquam deliravit, quod alias signum verum est fracturæ cranii, ubi simul meninges læsæ fuerint. Alium novi, auriacum Hanoviensem, qui de curru in terram decidit absque vulnere vel insigni contusione, sed statim delirare incipiebat, ob ætatem nimis provecitam, aunum enim sexagesimum excurtebat, nullum trepanum admisit, & sexto die mortuus est, post operationem invenimus cerebrum totum sphacelatum cum fissurâ cranii.

Medici etiam inquirere instrumenta, num fuerint magna, dura, mollia, gravia acuta, rotunda aut obtusa. Si magna & vires vulnerrant multæ, læsionem magnam indicant; cum dura sunt, quibus læditur, aut incidit magno impetu, fracturam cranii esse magnam denotant; si sunt gravia, rotunda, obtusa, significant simul adellè magnam contusionem, fracturam vel impressionem. Sic etiam Medici est perscrutari, num instrumenta lædencia recto tramite in caput impulsâ, vel ex obliquo. Si recto ductu, magna vi, signum est fracturæ. Ex arte sequens sumatur signum: ponatur ferula sibi utraque parte maxillæ, manducando eo loci, quo ruptura latet, dolorem & quasi strepitum percipiet patiens; ratio est, quia cranium globi simile formatum, dum musculi temporales huic firmis-

## CAP. IV. DE CRANII DEPRESS. & FRACTURA. 31

fimilissimè adherent, & in manducatione abbreviantur, distractionem patitur; quo fractura illis propior muscularis, eo certius experimentum. Vel detur patienti clavis, ut eum dentibus fortiter admordet, vel dentes cum eo parùm pulsenter, si inde dolor oritur in parte, in qua ictus accidit, denotat fissuram cranii adesse. *Parvus* & *Hoferus* dant ægro extremitatem chordæ musicæ vel filii sericeis dentibus apprehendendam, cujus alteram extremitatem capit Chirurgus, illudque extendit instar chordæ, & tunc filum illud vibrat, ut fiat motus tremulus in illo filo, ut sonum edat, ab eà vibratione si sentiatur dolor, significat hoc cranii fissuram adesse, quæ omnia signa sæpius fallacia reperi. Ante omnia ergò in vulneribus capitis perpendendum, an post ictum, vel plagam, vel lapsum patiens animi deliquimus incidat, an vomuerit, an mens ipsi constiterit, quæ symptomata denotant sanguinem aut in cerebro, aut in meningibus esse evasatum. Si quoque febris & deliria abfunt, significat sanguinem nondum esse turbatum nec inflammatum cerebrum.

Tandem de Contrahisura lis inter Medicos & Chirugos est; nonnulli negant talem dari rimam, alii verò affirmant, nos experientiâ instructi eam statuiamus, ceu superius diximus, existimamus tamen illam facilius posse in adultioribus fieri, ubi ossa fuerint sicca & dura, & inter sese firmissimè compacta & connexa, hanc tamen certè non cognosci posse credimus, nisi hariolari velimus ex responsione ægri percussus, dicentis, ipsi visum esse, quòd alio loco rumpebatur cranium, quàm ubi percutiebatur; deinde ex dolore, mollietate, tumore in loco contrahisuræ, & manducatione, si ibidem dolorem sentiat; nullum tamen horum certum esse cum *Hippocrate* statuimus.

Causa secundum Galenicum.

§. 3. Causa secundum Galenicum sunt telum durum & ictus vehemens, tum ipsa habilitas ossis, ratione cuius alterum altero facilius disfringi aut retrocedere potest, crassius enim majorem præbet renisum, quam tenuius, durum quàm molle, solidum quàm duplicatum, aut futuris dotatum, multa carne obiectum, quàm pauca; ita os illud à calvarie, quod frontem inter & verticem est, tenuissimum & infirmissimum, paucâ admodum & tenui carne obiectum, præ aliis obnoxium videtur fracturis, fissuris aut retrocessionibus, & homo eà in parte calvarie læsus majoribus subiacet periculis, & difficilius curatur. Post hoc, os temporum quoque infirmissimum est, tum ob commissuram maxillæ cum eo, tum quatenus & majori venâ & arteriâ concomitatur. Os sincipitis aliis robustius tamen facile ab ictu, casu aut vulnere non læditur, & homo citius eà parte vulneratus mortem evadit. Ratione etiam ætatis & temperamenti ossa variant, in infantibus, junioribus & femellistenuiora sunt quàm in vicis & senibus, in humidioribus, quàm in siccis. Proinde tenuiora facilius lædi possunt, concludunt, etiam à re non adeò durâ, aut vehemènti percussione; dura autem non nisi à re valida vehemèntiori inpetu illatâ.

Secundum Paracelsum.

§. 4. Paracelsus similiter casum vel ictum agnoscit fracturarum harum causam, à quibus sæpe contingat, ut pelle, nervis & cerebro illæsis, sola ossa capitis rumpantur, quæ tamen per vulnera instrumento acuto facta, simul discindi possent nullatenus abnuiti.

§. 5. *Helmontius* easdem morborum horum causas admittit cum prioribus; uti & *W. Hillius* & *Sylvius* iisdem sine tergiversatione illa adsentiantur.

§. 6. *Cartesiani* non minus causam remotiorem ponunt rem quandam externam durum, ictu vel casu capiti vehementius illatam, in mollioribus & junioribus citius depressionem, in senioribus autem & fortioribus fracturam inferentem, adeo ut ipsa ossis dispositio causæ proximioris vicem hic obeat, quæ ob filamenta, & quibus ossa cum reliquis corporis membris sunt composita, facilius modo uno findi volunt, quàm alio, aut oblique etiam frangi, cum eadem adhuc fibras retineant, postquam induruerunt, quas habuerunt sub formâ membranarum & cartilaginuarum.

§. 7. Ex nostra sententiâ causæ sunt omnes externæ ad infortium pertinentes, uti sunt ictus, casus, occursus, & quæcumque ad hæc tria referri possunt solventia Cranii continuum; hinc vel oritur apertio valorum tum sanguineorum, tum lymphaticorum, & per consequens, sanguinis & lymphæ evasatio, quæ evalatæ portiones statim Microscopio reuo destituta putrescere incipiunt, quare paucæ guttæ puris vel sanguinis sub cranio quàm celeriter hominem necare possunt; sic & varia externa ibidem per ictum vel plagam sub cranio inflicta, varia illa in fissuris cranii excitare possunt symptumata atrociora. In contrahisura ab illusione vehemènti in cranium aer internus ita concutitur & adaugetur, ut aer cerebrum pervadens, nullibique exitum habens, vi per oppositam partem erumpat, & fissuram concitet.

§. 8. De Prognosi nunc aliquid addamus: ante omnia asterisco hic notandum, nullum capitis vulnus esse negligendum aut parvificandum, quia ex minimo vulnere maxima prodeunt symptomata. & sæpe per longum tempus sopitalent, prout sæpius observavi. Deinde, Fracturæ cranii sunt periculosissimæ, non tamen illas pronunciamus per se lethales. Symptomata accedentia, uti febris, delirium, vertigo, stupor, &c. periculum majus reddunt, imprimis si post aliquot dies denum accedunt, maxime cum horrore & frigore, exinde enim patet, cerebrum ac meninges aut cranium esse corruptum. Certiores reddimur, cum labia vulnecis pallescent, depressa fiunt, nigricant, flavescent, generatio puris suppressa aliquid si prodit, sæcundum olet, & aqueum & nigrum ichorem fundit vulnus. Ubi os denudatum nigrum conspicitur, pessimum est, & si delirium & vigilie ob inflammationem magnam & humorum stagnationem in cerebro accedant, lethale, imprimis si patiens cacochymicus sit, si sensus externi abolentur, & motus peristalticus sistat, ut nulla excrementa, tam crassa, quàm tenuia, excernantur aut sponte effluant, mors instat, uti in iis, quibus in lingua pustulæ oriuntur, & qui desipientes fiunt, & motus accedunt convulsivi, de ipsorum salute actum esse absolute pronunciamus.

Salutaria verò sunt signa, ubi hæc symptomata non accedunt, & in curatione pus laudabile prodit, & tandem incarnatio siccæ cernitur.

§. 8. Cura Diætetica consistit in legitimo usu sex rerum non-naturalium, in foro Medico hæcenus receptatur; aer ergo sit bene temperatus, si non ex se, fiat arte, illud præprimis dum vulnus

*Helmontius, W. Hillius & Sylvius.*

*Cartesiani.*

*Ætiologia nostra.*

*Prognosis.*

*Cura Diætetica.*

vulnus est detectum, notandum, ne subito mutetur mutationem, præsertim ab aurâ frigidiore, ostiorum aut fenestrarum apertione. Deinde cavendum, ne lumen radiis suis recto tramite in ægrum incurrat.

Quod cibum attinet, victus sit tenuis primis diebus, postea sit laetior & liberalior.

Dein ægrum quamvis mente sanum & competentem, quietum esse convenit. Quod somnum & vigilias concernit, patiens dormiat 7. aut 9. horarum spatio de nocte, si fieri potest. Sic & conducet semel aut bis de die alvum habere laxam.

Tranquillum esse animo, & sanationem exoptare patientis est, hæc si ordinaria dispositio negat, arte procuranda. tristitia & moror absint, aliquæ animi affectus vehementiores, præter reliquis autem ira & excaecescencia quævis.

*Cura hæmorrhagica & Chirurgica*  
§. 8. Jam ad ipsam *Curam Pharmacenticam & Chirurgicam* transeamus, unde ægri plurimum sentiunt. *Galenici* in *Depressione Crani* ad os tollendum utuntur lamina quadam æneæ, aliquantum resina, & ea parte, qua membranam cerebri spectare debet, admodum lævi, ut illam lædat, sed potius defendat, quare & *φύλλα* eam vocant, quæ ut ossi depressio commode submittatur, ei aditum faciunt scalpro quodam acuto, adeo follicitè & circumspecte adhibito, ut solummodo os loco convenienti discindatur, intacta & integra permanente membrana. Interdum cucurbitulam applicant loco depressio cum magna flamma & scarificatione, quæ frequentius adhibita os depressum similiter attolli fuerunt experti.

Ut autem partium Cranii *fracturam* coalescentiam in infantibus, & accretionem per calum in ætate provecioribus promoveant, naturæ suæ succurrunt: cum cibus lucis iactis, boni tamen & glutinantis, tum amovendo impedimenta agglutinationem ipsam irritant reddentia, adhibitis medicamentis siccantibus & detergentibus, pulvere nempe ex radicibus Iridis, Aristolochiæ, far. hord. fabar. thure, &c. vel emplastro quodam catagnatico, & Gratia Dei, Iliis, vel simili. Si verò vel pars aliqua ossis fracti acuta membranam cerebri puugat, vel in osse filio plurimum sanguinis hæreat, ea per trepanationem eximenda præcipiunt, de cuius administratione inferius, ubi nostram curandi rationem aperientes, prolixius sumus discursuri.

§. 10. *Paracelsus* etli serraamenta & quævis instrumenta aliis parvi faciat, cum verè Mumie permittat quodcumque naturæ contrarium elidere, ut natura ipsa filluris & fracturas per se curet, in *Depressione* tamen Cranii concedit aliquando instrumentum aliquod concavum, quo os subsidens erigatur, maxime si cum fractura jam sit conjunctum; de novo autem instrumento fracturam in osse adhuc integro curationis gratia instituire tam facile nemini suavis. Quin ipsis in *Fracturis* tractandis præcipit, ne nimia Chirurgus se oneret cura, cum vulnerabilibus medicamentis ritè adhibitis, & parte debite ligatâ, postmodum quilibet viscus vel consolidatæ nigra, vel aristolochiæ rotundæ, vel serpentina rupturas optime curet, nam & vesperi non adeo strictè superligatus, singulisque vicibus apertis ligaturis recens & calidus appositus. Accidentia, & inter illa inflammationem præcaveri posse statuit, si rupturæ istæ singulis die-

bus bis ligentur pannis mundissimis, & optimum instituat regimen, admixtis, si sanguis intus fuerit coagulatus, purgantibus cibo & potui, parata decoctione hordei cum thabarbaro, vel radicibus hiru dinariæ & folliculis senæ, aut medicâ terebinthina, in cibis autem decocta mumia vel resuponica. Unguentum vulnerale hoc in casu valde conducens sequenti modo proponit:

*℞. Axung.*

*Buty. aa. ℥ij.*

*Liquor. parthenionis,*

*Consolida. anrea*

*ma. j. vertonem j.*

*Serpentaria,*

*Plantag. aa. vertonem f.*

*Omnia commixta simul decoq. ad Unguenti formam. Huic adde*

*Visci lumbricor. ʒv.*

*Medull. bovis ʒij.*

*Mumia nestrat. ʒi.*

*Cera q. f.*

*Reduc in Unguenti formam.*  
Vel

*℞. Cera nova ℥ij.*

*Sal parthenionis,*

*Mumia medulle aa. ʒij.*

*Liquor. ignis, F. Emplastrum.*

§. 11. *H. Imenius* meditationibus suis hac vice alio distractus, & circa irrationes & excursiones Archæi in ordinem componendas nimium occupatus, de operationibus Chirurgicis debite administrandis non adeo est sollicitus, cum arcanis suis tantum fidat, ut omnes morbos superare valeant, nulla hujusmodi crudeli adhibita medicina, quare in quavis etiam fractura radicem symphyti & lapidem osteocolam omnibus istis præfert chirurgiis, cum Archæus isdem placatus & ad officium vocatus, ipsemet sanationem istarum fracturarum quovis artifice melius & accuratius perficiat.

§. 12. *V. Valsius* in *Depressione* curanda iis sententiâ suâ accedit, qui cucurbitulâ eandem restituere tentant, in graviore tamen trepanationem instituendam permittit illis, qui per experientiam necessariam sibi in ea conciliantur encheirelin; sicuti & *Fracturam* curandam vult ossium fractorum ad invicem repositione, & particularum agglutinationem eorum impediendum remotione per eandem, si opus sit, trepanationem, & ne sanguis extravasatus inflammationem pariat, instituita insuper venæsectione; postmodum quæ fracturam consolidare valeant, externa imponit emplastra vulneraria, ab aliis Autoribus jam indicata.

§. 13. *Sylvius* præter istiusmodi præcedentibus jam notata remedia, sua etiam in huic affectibus adhibet salia volatilia, sanguinis conglutinationem resolventia, & inde facile exurgentem inflammationem impediendâ & corrigentia, in sananda tamen fractura à superiorum methodo observanda, ne passum quidem itaum vel alterum socedere videtur.

§. 14. *Cartesius* in *Depressionis* curatione debite instituenda advertunt differentiam inter simplicem in infantibus frequentius contingentem; & eam, quæ cum fractura conjungitur. Depressio simplex juxta illos, desiderat craniæ partis recedentis elevationem, & sanguinis evasati & conglutinati resolutionem.

Eleva.

*Curatio secundum Paracelsum.*

*Sylvius.*

*Cartesius. notum modum curandi Depressione.*



# CAP. IV. DE CRANII DEPRESS. & FRACTURA. 33

Elevatur & restituitur os depressum tum emolliendo locum affectum externis fortibus aliquantum spirituosis, ut lamella vel pars depressa flexilis reddatur, ex herb. beton. majoran. chartefol. verben. fol. rosmarin. summit. absinth. flor. caromill. sal. hyperic. sem. anisi. carvi. pulv. lumbric. far. sem. fenigr. fabur. & siml. in vino, vel lacte decoctis; tum alliciendo spiritus, ut si fortius inducendo cranium mollius repellant, & in formam pristinam reponant, vel inspergendo pulverem ex rad. aristol. rotund. valer. visc. quern. tacamahac. succin. vel imponendo emplastrum ex Gum. elemi & heder. vel etiam sequens:

℞. Lap. hamatit. in pulv. redacti ℥ss.

pumici.

sem. cumini.

summit. absynth.

sursur. commun. aa. ʒij.

Cera novæ adnc. jordan. de.

mell. commun. aa. ʒij.

M. ad ignem. F. s. a. Emplastrum.

Si ista inbecilliora reperiantur, applicent loco rato cucurbitulam cum stannina, ut ita non modo alliciantur spiritus, sed eternæ etiam particule secundæ elementi ex cucurbitula per flammam expulsi, cumque ambientes cranii partem circa depressionem intus premant, & ita elevationem partis depressæ promoveant. Sanguis congruatur ut resolvatur, reposcit spirituosus, volatilis & poros aperientia, superius in Contusione jam notata, vel si discuti nequeat, per aperturam cranii est eximendus, & si succus lacteus nutritius ei immittitur suppurationem minuitur, illa per debita medicamenta. ex superiorem partem cognita, est promovenda.

Fractura

In Fractura operam adhibent, ut rectè dignoscatur, vel dilascando integram cutem. vel vulnus angustius dilatando. Quando verò nondum certi fieri possunt, attamen suspicio de fractura adeo, emplastrum ex cera citrina recent. thure. santalo. farinæ fabar. & terebinth. capiti tui rato imponunt, quod trani diuturno spatio super fracturam, si qua adeo, fissus & diminutus magis erit, quam locis aliis. Fissuram, si opus sit, aperiant, ut noxia ejiciantur, & si ex fractura particule ossæ abruptæ meningi periculum moliantur, nec sponte ejiciantur, & si ex fractura particule ossæ abruptæ meningi periculum moliantur, nec sponte ejiciantur, quod tamen sæpe fieri nocuit, ea per trepanationem studiosè eximunt. Postea balsamicis suppurationem promovent, symptomata gravia per commodam remedia mitigant & avertunt. Si membrana cerebri, vel ipsum etiam cerebrum corrumpti appareat, foramina induunt mel rosaceum cum Bals. Peruv. & guttul. aliquot. ol. cere & terebinth. illudque implent filamentis eadem balsamo intinctis. Confecto pure & vulnere sufficienter mundato, ad fracturæ consolidationem progrediuntur, imposito sequente vel alio emplastro conveniente.

℞. Herb. beton. succ. & pulv. ʒv.

Rad. Aristol. rotund. ʒij.

Gum. elemi. ʒvj.

Tacamahac. ʒss.

Mastic. ʒj.

Ol. Hyperic. ʒss.

Succ. beton. ʒj.

Cera citr. ʒij.

M. F. super. igne f. a. Emplastrum.

§. 15. Nos, ut curatio bene instituitur, recordemur similiter differentias nostrarum solutionum, nam aliter Contusio, & dissecta cutis, aliter si latio ad pericranium & ad os ipsum pervenit, sanatur. De Contusione jam diximus priori capite. Ubi verò os passum est, quod ex signis precedentibus ritè examinatus patet, capilli abradendi sunt, vulnus si adit, lege artis curetur. Explorato ergò probe vulnere, quum simplex sit citra ullam cranii fracturam, cum Contusione tamen insigni, duplici solet succurrere modo, vel Suppa cannabina albumine ovorum imbuta replendo hiarum, ad hujusmodi deductionem, sistendam hæmorrhagiam, & arcedum humorum effluxum, quem in finem pulvis stegnotico-cephalicus stupæ jam dictæ inspergi potest, & quidem sequens:

℞. Pulv. fl. balsam.

spec. Indic. aa. ʒij.

Succin.

Mastic. aa. ʒss.

Amyl. ʒj.

M. Dentur profusa.

Vel deterio prius sanguine Empl. de Beton Stict. Croll de Gummi. Heder. vel Opoteldoch imponi potest. partes etiam vicinæ ad defensionem majorem illini possunt ol. rosæ. Myrtin. Castor. &c. Pars quoque læsa assidue fovenda ob membranosas partes & spiritus resocillandos, imprimis verò ad humores extravafactos discutandos, ut sibi vias inveniente recipientur in vasa, mittantur in loca excretioni dicata, atque sic exhalent, adeoque in ichorem paululentum non facessant; ad acidum imprimis temperandam, fomenta parari possunt ex herbis cephalicis c. vino coctis & sacculo inclutis, lingulis horis alternandis, facia desuper posita, ut ritè hæc contineantur, imprimis ille focus hic conducit, cuius mentionem in precedenti cecimus capite. Cumque in vulneribus cum Contusione sanguis extravasetur, qui non in prius abijt, sed secum è poris ichoreicis, una cum disruptis fibrillis in pos tranjit, hinc etiam ad consolidationem vulnere aptandum est digestivum, quantum quidem parvis constitutio admittit, quo nomine Unguentum digestivum ordinarium ex terebinth. & beton. lora, & vitello ovi tanquam basi, parari potest, additis pro tenata thuris, masticæ, ac myrrhæ portionibus pauculis, cum gr. j. vel altero Camphoræ, luteis conceptis cranio subistratis applicandum. quod mirifice acidum temperat, hinc Chirurgis solenne esse solet.

Tecemushic splenia pro fæsmatione sublevanda, neque opus est seorsim mundato ulcere adhibere *sa. cotina*, satis est debite succum nervorum flammibus fibrosis circulationi succorum succurrere, intervento liquoris nutritii partem divullam reunire, ut ita, fibris coarctatis, coallitus perfectus fiat, & cicatrizatione demum vulnus sigilletur tempore legitimo Cerato vel Emplastro nostro Divino, ob vires egregias ita dicto.

Occasio si præsens esset, & vires ægri permitterent, secundam esse venam dicunt, sed quo, quæso, successu? dein enema exhibendum precipiunt; nam sæpe oboritur motus peristalticus inversus à vomitu, (qui etiam recensetur inter signa si non fracti cranii. saltem concussionis cerebri) & sic alvus redditur adstrictior, pessimum

E

est.

Nistra  
mo-  
ba-  
lura  
mo-  
den-  
di  
mo-  
lura.

est, hoc in affectu habere alvum adstrictam, exinde enim sæpe inflammationes cerebri aliaque mala exsurgere solent; admonent autem alvum lenientia Gasterriacem, hoc est, spiritus in intestinis existentes, sui officii; possunt ergo in robustioribus ea exhiberi, & in delicatioribus Enemata optime exequuntur idem, meatus lavigando; scybala stagnantia provocando. Horum effectum citiorem, præter levamen capitis, non modo alvus, sed & vesica exigit, ob vicinitatis, & texturæ consensum stimulanda; ut glandes & suppositoria cum officinalia, cum ulualia domestica non tangamus.

Effusione humorum sedata & prohibita, sequenti die incidere cutim & detergere os convenit. Inciditur cutis trigona vel tetragona sectione. Sectio trigona sive triangularis est, cum ab uno puncto tres exeunt striz. Tetragona, cum duæ scissuræ sese mutuò intersecant; ita ut ex trigonatriâ, ex tetragona quatuor prodeant labia: sed lex hæc non accuratè observanda, sed Chirurgi industriæ committatur sectio. In sectione verò ritè animadvertendum est, quòd semper incipiendum sit à parte inferiori, nam à superiore parte incidatur, sæpe hæmorrhagia chirurgicæ est impedimento: incisio fiat novacula mucrone, circa manubrium & aciem lintheo ita convoluta, ut nil nisi mucro appareat, premente manu, si una cum cute inciditur pericranium, diligens & attentus Chirurgus esse debet, ne secando & premendo, si os fortè valde ruptum, duram lædam meningem.

Si malum verò intensus est, & ex omnibus symptomatibus perspicui potest, ægrum absque aperture cranii curari non posse, imprimis si fissura jam innoverit, quæ etiam cognosci solet ex imposito cataplasmate, ex farina fabar. capite raso, hoc ubi non fuit fracturæ, exsiccatur, secundum ductum verò fissuræ non exsiccatur; similiter ex dolore, quando æger nucleum cerarum dentibus frangat.

*Trepanatio quando influmenda.* Igitur ad Trepanationem accedendum esse existimo, haud inficius, esse anceps & periculosum remedium, sæpiusque mortem comitem sibi adscribere, attamen salutarem effectum quandoque præstare potest, si tempestivè & causâ bene cognitâ, viribus ægri suis dentibus, celebratur. Non verò hic audaces imitandos censeo Medicos seu Chirurgos, qui statim ad hoc anceps confugiunt remedium, absque notitiâ causæ, cum sanguinis congruati portunculam educere volunt, quod tamen fomentis prius diebus calidè sæpe applicatis obtinere possint. Illam proinde non nimis cito adhibendam suademus, nisi certissimum addit indicium de magnâ evasati sanguinis vel puris quantitate, sub cranio latente, & nullo alio modo, nisi per hoc remedium eximenda, nec hanc toties repetendam esse ac narrant de Philippo Nassavio, qui trepanationem à Chirurgo Chaldorn vigehes septies sustinuit: vid. histor. apud Dn. Stalpart. Observ. var. 8. aut quando instrumentum feriens, aut aliqua ejus portio sub eo remanserit; sic nuper culpidem hæstæ in cranium ad duram matrem inunissam L. mburgi ope trepani extractam oblectavi; sic & Viennæ globulum plumbeum cum restitutione ægri exitum vidi ope hujus Trepanationis remedi; fragmentum de interiori tabula ab-

ruptum cerebrum pungens exemit *VVedling* Chirurgus ille Hanoviensis. Hæc & alia non aliter possunt discuti nec eximi, quam ope hujus remedi: quapropter Trepanatio hæc minime aut contemnenda, aut proflis negligenda, & è foro Chirurgico releganda, cum juxta *Celsi* præceptum, *anceps præstet, quam plane nullum experiri remedium.* Trepanatio hæc in quibusdam locis maritinis, v. gr. in Bretagne prope Vitry, in locis maritimis Gallia, adeo vulgaris est, ut levi de momento illum insituant, ex. gr. in diuturno capitis dolore, hemiplegia, &c. & quacunque plaga levi, & ex centum quicquam hanc sustinere, ne unus moriatur, hinc rusticæ ibidem malunt capite vulnerari, quam aliis in locis, quia facilis possunt curari, circa alias partes vulnera facta non adeo facile curari solent. Contra Parisiis, vel locis proximioribus Champagne, &c. non feliciter insituntur Trepanatio, nam omnes ferè moriuntur, hinc mihi persuasum, quòd non in ætècardo hujus rei veritatem, sed quòd Parisiis cautius mercentur, & in ferè desperatis insituant, illi verò in robustioribus leviter afflictiis. Sæpe tamen ipsam frustra applicari, ex sequenti patebit casu. Filiæ 20. annorum equitis Casselani de scâla in tetram ruinam occipit, nulla apparebat convulsio, nullus tumor, tertio die delirare incipit, dein sopor succedit: Chirurgus noster calrensis expertissimus *D. Christianus Hoffmann* de pressionem calvaria suspicatus est, & omni ope ipsam elevare annititur, sed frustra, sexto die moritur, cranium aperiebatur & circa suturam lambdoi eadem inveniebatur fissura, & infra duram & piam matrem intra falcem reperiebatur 3. vel 4. cochlearia plena evasati sanguinis, quod impossibile erat penetrare, & sanguinem tunc evasatum eximere. Sic & nuper aliam aperiebamus, ubi in cerebro circa ossa temporum maxima sanguinis evasati copia inveniebatur; quid ergo in his casibus profuisset Trepanatio? Hinc nager æstimarem præter foras externos, injectiones in cerebrum per nates, in quem finem sæpe felici cum successu & absque Trepanatione sequenti liquore plures restitui possunt.

*Sp. Ar. Veron.*

*Spir. vin. parum,*

*Tinzi. Castor.*

*M. pro injectione.*

Sic &, quod notandum, si in venam cruralem animalis cum syphone infles halitum, statim animal morietur, & si post mortem aperias abdomen, spectabis interna jucundo cum spectaculo sanguine rubicundissimo distenta minima vasa sanguifera capillaria. Infuso certo liquore acido in hanc venam, omnis sanguis in vasis erit instar sanguinis cocti duri, quod in secundis cadaveribus ubi certè erit arcanum, nec facile propalandum.

Finis trepanationis est, ut sanguis extravasatus, nec exitum inveniens, educatur, sanies & pus collectum evocetur, & consequenter utrobique putrefactio meningum, ipsiusque cerebri substantia futura præcaveatur, dura meninx à dolore inteso, ac inflammatione ex super incumbentis ossis vel alius instrumenti ferientis particulâ distractâ & pungente metuendâ vindicetur: & præprimis considerandum est antequam ad hanc accedamus trepanationem, quomodo os læsum sit.

*Quare Trepanatio influmenda.*

# CAP. IV. DE CRANII DEPRESS. & FRACTURA. 35

fit, si nihil passum videatur, instilletur atramentum tenue, & tegaturque linteo triangulari vel quadrangulari, prout incilio est, oleo parum madefacto, maneat 3. vel. 6. horis tectum, postea denudetur & leviter detergatur, si rima aut confusio adsit, tepetius atramentum imbibitum ab illis, abradatur donec nigredo deleatur, aut ad secundam laminam pervenerit, tuncque perforandum est. Ubi vero fissura cranii ampla & dehiscens apparet, atque materia purulenta in qualitate requisita effluit, trepanatione non opus est. Jam vero si in fractura cranii rima non addit patens, nec abunde detur exitus saniei, quæ cotidie magis magisque congeritur & accumulatur, periculumissimum secum ducit symptomata mortem subsecuturam minantia, tunc omnino os excidere & perforare oportet, nisi siphone exiungi possit, quo & plures Chirurgi uti solent.

Sed difficile est cognoscere, adesse timam cranii, in his casibus, ubi læso cranio integumenta exteriora confusa, non verò disruipta aut dilacerata sunt, adeoque ad ipsam fissuram oculis penetrare non licet, quod tamen aliquatenus conficitur ex tinnitu aurium, vomitu, vertigine, oculorum caligine & febre, quæ si quarto die, uti ut plurimum tempore æstivo evenit, ingravescant & exacerbentur, fissuram penetrantem adesse indicant, de quibus in lignis superius egimus.

Trepanum quibus partibus conficitur.

Instrumentum Trepanum dictum constat ex duabus partibus, *ima*, quæ vertitur, & *superiore*, quæ vertit. Ima quæ vertitur, *modiolus*, est ferramentum cavum teres, imis oris serratum, quatuor lateretenus exhibens prominentias aliquoties acutas, inferius depressas, mox diductas; illi si intus per trochleam adaptatus fuerit clavus tenuis ferreus in acumem desinens, trepanum *mas*, si hoc catenit, *femina*, clarioris distinctionis ergo dicitur. Superior illa pars, quæ vertit, est teretebæ manubrium in modum vulgaris formatum, in quod modiolus intruditur; quare in istius confectione non aliud evitandum, nisi nimia moles, pondere modiolum aliis fortius depressura. Chirurbergenfes hodie hoc instrumentum assabre norunt fabricare. Figuras qui desiderat, illas in *Ephem. Germ.* apud *Fabr. ab Aquapend.* & *Sculiet. Chir.* elegantè expressas cernit.

Trepanatio quomodo perficiatur.

Ipsa operatio hodie sequenti modo celebratur. & quidem hæc in oris, cui operationi sæpe adliti: Removetur primum omnium ab osse cerebrando pericranium, ne id dolore cum infectione inflammatione afficiatur; mox si necessitas jussit, labia vulneris dilatantur, ne ab instrumento tacta sanguinem fundant, aut doleant, sed modiolus commodè in gyrum circumducatur ac volvi possit. Operiendæ autem sunt, abjectæ omni cunctatione, labia illa vulneris diducta linteolis calidis vel siccis, vel in vino rubro expressis, quæ Galli siccis præferunt, ad æris frigus ambiens arcendum, aliaque symptomata præcavenda. Postea in manus sumitur modiolus major vel minor, pro usus necessitate urgente, isque primò *mas* loco convenienti, h. e. decliviori, ut viam paratam sanguis evalatus vel materia purulenta promptius sequatur, apponitur, & sinistra manu leniter in situ firmatur, dextrâ manubrium tenente circumducitur, eoque, donec vestigium manubrii in osse levitet exca-

vatum sit; tunc remoto clavo medio, nempe trepano mare, femina sola cursu vestigio impresso inferitur & circumvolvitur. Interim pro scobis ossæ abscedentis copia modiolus quandoque attollitur, itemque planè exferitur, & vel oleo rosaceo ungitur, quo expeditius circumgyretur & scobes decidunt, sic enim qui fabrilis opera tractant, ferras suas lardo vel alio unguine illinere solent. Inter agendum & aquæ rosacæ quidam immergendum esse statuunt modiolum, ne vel attritu nimis incalcescat, dura enim & solida omnia si rapidius circumferantur, incallescunt; aquosa verò & frigida, tanquam in omnibus affectibus ossium & nervorum inimica, potius omittenda esse putamus. Sic & os, quod modiolus attigerit, vel ær afflavit, squamas semper renittit, ad quam desquamationem celerius promovendam adaspergi solent pulveres ex bryonia, Ir. Illyr. aristoloch. &c. nec vi squamæ hæc detrahendæ sunt.

Quamprimò ita perforata fuerit lamina cranii prima, & ad medullam perventum, statim sanguinæ exstillabunt guttulæ, quibus spectatis cautè mercandum est, ac leniter adigendus modiolus, nam post medullam scilicet offert altera lamina vitrea tenuis, magnâ ergo cum circumspeditione modiolus circumrotari debet. donec ossæ portionem, quia vacillare incipit, vel non renittitur, sed excitam persentiamus, tunc enim vecte exiguo inter labia exciti ossis immisso, & aliquantulum illo dimoto, frustulum ossium vosselli arreptum autitur, ac asperius orarum ossæum instrumento lenticulari levigatur, & quæ subsint asperitates, quæ meningæ, dum ad cerebri motum attolluntur, ledere & pungere possunt, accuratè detrahendæ sunt. Operatio hæc cum trepano nunquam supra ipsas futuras instituitur, ob imminens lethale periculum, quod duræ meningi ibidem cranio adharenti, inducitur. Quod si verò accidat, ut fissura ex ictu vehementiori facta, per mediam suturam sagittalem tendat; hinc non in uno, sed utroque latere cranium excavandum esse Itali docent. Chirurgi, ut ex utroque latere pus vel sanguis corruptus melius effluere possit; quod verò, meo iudicio, periculo non vacat.

Exemta itaque ope Vossellæ portunculæ ossæ trepanum separata, orisque foraminis facti circumrasis & instrumento lenticulari levigatis, cum cautione id quod intus latet eximendum, sanies vel sanguis purulentus aliquantulum effluere permittitur, nisi is sponte egrediatur. patiens, ubi vires & sensus hoc permiserint, jubetur naribus labiisque compressis buccæ; fortiter inflare, hoc enim conatu meninx dura nonnihil elevatur, & sic puri exitus magis patet. Postmodum duræ meningi prospicere debemus, impediendo scilicet æris exterioris ambientis accessum, & eam ab acrimonia purulenta ac inflammatione vindicando per medicamenta acidum absorbentia: quare post factam Trepanationem admoventi dum plumaceoli subtilissimi cultro ex linteo derasi, (gossypium enim partes rigidiores habet,) ad imbuendum & siccandum saniem & ichores: dura meninx si aliquam ostendit materiam collectam, ut pus aut cruorem, instilletur gutta una aut altera sequentis liquoris, ut acidum illud corrosivum temperetur.

*℞. Aq. Hungar. ℥i.  
Mell. rosar. ℥℥.  
Theriac. ℥℥.  
Myrrh.  
Alcis aa. ℥j.  
M.*

In os cranii pulvis aspergitur, qui vim habet acidum acre corrigendi, ut myrrh. aloës, mastich. sarcocoll. herb. fabin. rad. irid. &c. olea enim ob acrimoniam potius omittenda esse existimo. Ubi labia & os conjunguntur, applicandæ sunt turundæ leviter sequente digestivo illinendæ, & ex lana confectæ.

*℞. Viell. ov. No. 3.  
Croci ℥℥.  
M.*

In nulla præsentæ aut sequente inflammatione, Emplastrum de betonica convenit. Porro omnia comprehenduntur ista ligatura à Sculteto descripta, habente octo labia, duo ligantur in nucha, sub mento reliqua. His tamdiu utendum, donec pure absorto periculum inflammationis cessaverit, & omnia ad unguem sint sicca, quod in aliis citius, in aliis tardius contingit. Tandem ad Sarcotica & Epulotica transimus, & ut sæpius monitum, non nimis citò hæc capitis vulnera consolidentur, sed prius omnis sanguis bene exhauriendus est. Inter sarcotica & epulotica laudatissima habentur Ungu. Basil. de beton. Ungu. desiccatum rubr. Ungu. aureum, quæ additis pulv. rad. lymphit. irid. aristoloch. mastich. myrrh. supra duram matrem imponi debent: ad cicatricem verò exterius inducendam soli hi pulveres inspergi, & filamenta sicca applicari possunt, quia hæc omnia acidum acre demulcent, & ita accedente succo nutritio dulci, vulnera ipsamet sponte coeunt.

Duræ meningis ruptæ succurrere soleo seq. vel simili pulvere.

*℞. Myrrh.  
Aloës.  
Mastich.  
Sangu. dracon. aa. ℥j.  
Croci opt. ℥℥.  
Sarcocoll. ℥℥.  
Terebinth. ℥℥.  
M.*

In membrana denigratâ frigore externo vel contusione, cum jam gangræna laboret, omnia medicamenta volatilia conducunt, spirit. vin. camphorat. cum Dialcord. vel  $\Delta$  calc. viv. cum caniph. Si nigredo adit, nec ullis aliis superari potest medicamentis, uti possumus Ungu. Ægyptiaco. Si ad summum pervenerit, parum spei superest.

*Curatio  
Sedis.*

Hilce bene perspectis, nunc paucis videntium, quomodo *Sedis* curanda. Sedes si adeo ampla, ut materia in duram meningem collecta, aut quid simile methodicè purgari possit, perforatione seu trepanatione minime opus est; oræ tamen abradantur, ut Contusio aut Fissura, si inconfispica, manifestetur. Contusio modo jam dicto curetur, ubi tamen, seu superius diximus, probe notandum, ne nimis citò curare conentur: nam si aliâs fragmentum aut squama discederet, superincrescens caro erit spongiosa, os ab acido corrodetur & inflammatio orietur, si non, geminante carne sicca obtegatur os, fissura cum sede conjuncta, quæ per sedem ejicitur, abradatur, & curetur cum sede; ubi ri-

ma verò occupat decliviorē sedis locum, ut exonerare se neget, aut eò medicamentis non liceat pervenire, in fissuræ inferiori parte perforatione opus est.

In *Impressione*, quarta Fracturæ speciei cuius dum hæc scribimus exemplum habemus in puella, 3. annorum de scalis in terram ruente, nullo præseate aut urgente symptomate, ne quidem sectio cutis requiritur, contingitque sæpe in pueris, hinc ter vidi hunc affectum curatum, dum Chirurgus solis pilis cum cute in alio non tolerabat ægrum, & sic elevabatur cranium, quod similiter succedit, si applicentur vitra vel cucurbitulæ calefactæ cuti, & sic elevare sæpius possumus cutem cum cranio depresso. Si cranium ita depressum est, ut inde cerebrum patiatur & sopor superveniat, & jam dictis cranium elevari non potest, ea pernici potest vel Emplastro ab *Hildano* Cent. 2. Obs. 5. pueris utili depicto, & senioribus *elevatorio* Cent. 2. Obs. 4. & in *Ephemerid. Decur. secund. Ann. 1. Observ. 91.* demonstrato. Tales enim Depressiones, præsertim in infantibus in partu vel ob transitus angustiam, vel ob capitis insolitam magnitudinem, vel obstetricis incuriam factæ facile curantur, ceu dictum, opposito statim emplatro temaciter adhærente, sicque attolli debent, vel per cucurbitulam vel instrumentum corneum elevari. Elevato cranio, & naribus excitantibus, aceto scil. laven. dul. ruth. &c. subditis, sopor si non minuitur, de fissura inferioris laminæ & congregata in duram meningem materia suspicamus, solo tamen meo judicio ad perforationem non devenire, quoniam hæc est Contrafracturæ species, de qua *Hippocr.* testatur, quòd nulla re eam juvare queas.

*Depressione conjuncta cum fissura vel Sede.* Curatio Depressione conjuncta cum fissura vel Sede. osse dentato intueri conamur, num cerebrum passum sit, aut à fragmento pungente adhuc patiantur. Fragmentum pungens si inveniat, omni opera membranam juvare tentes, si non lædat, separetur ut nature: deinde num fissura aut solutio instrumento lædente facta, trepanatione indigeat; si requiritur, l. a. instituenda, oræ solutionis abradendæ, & si cerebrum premit, instrumento elevatorio in *Ephemerid.* jam dictis descripto, elevandæ.

*Sinu lafo*, qui vix sine fissuræ vulneratur læsione, quia sub sagittali & lambdoidea latent, *Curatio in Sinu lafo*, sine patientis habita ratione aut loci, futuram aperire licet, nam læsi sinibus hæmorrhagia adeo est vehemens, ut susti nequeat, nisi medicamentis deobstruentibus sequenti modo.

*℞. Pulv. aloës  
myrrh.  
thur.  
Pil. lepor.  
Amyl. aa. ℥j.  
℞-li Ungar. ℥j.  
M.*

Inspergatur vulnere, & plumaceo in albumine ovor. imbutum, & per pulverem tractum imponatur, ut defendatur ab inflammatione & dolore.

Quod *Contrafracturam* attinet, cum nihil certi ex signis habere possimus, & illam plures Chirurgi & Medici contra experientiam negent, hinc & in cura nulla alia observanda quam ea quæ diximus de Fractura cranii: si quis tamen hoc in casu quidpiam tentare velit, ei cautè cum incisione



in cisione incedendum esse iudicamus, & cavendam membranae detectionem, ne sanæ suæ maculam inuratur.

In Inflammatione.

Inflammationi meningum succurritur spirituosus & volatilibus, ut humoribus liber motus iterum concedatur, & stagnatio tollatur, sicut tandem sanguis per sudorem dissipetur. Cum verò sanguis aliquo modo est incrassatus

stagnando, conducunt medicamenta incidentia, & deobstruentia, simulque ejus acrimoniam temperantia; internè & externè æger assumere potest omnia, quæ diximus in Contusione, aliarumque partium inflammationibus: sic & reliquorum symptomatum hic sæpe accidentium curationes peti possunt ex his capitibus.

## CAPUT V.

## De Calvaria Gumma &amp; Exostosi, Cerebri Fungo &amp; Siriasis.

§. 1.

**R**estant aliquot Capitis affectus, quorum pars adhuc Calvariam, pars autem ipsum Cerebrum & Meninges occupare fuerunt observati, atque tum evitandæ nimis prolixitatis ergo, tum quòd, ut priores, non solum externas violentas, sed potissimum internas sui agnoscant causas, in priori Capite commodè tractari recusaverunt, quare peculiare hoc ipsis tribuere opus habuimus.

Gumma Calvaria quid?

Gumma igitur, vel Gumma, aliis *Gummofia*, nonnullis *Gummi*, notat tumorem vel tuberculum durum, plerumque indolens. *Gummi Calvarie* describi potest, quòd sit tumor Calvarie pericranio adhærens ex alimenti partis propriæ alteratione & corruptione, vel & feri, vel succi nervi p. n. evasatione, vel humorum stagnatione, abortus. *Helmontius* vocat Luis Venetæ Tubera ossibus vel æqualia

Exostosis quid?

*Exostosis*, vel *Nodus*, vel *Callus ossis*, Germ. *Überlein* dicitur Calvarie ossis eminentia & extuberatio, à materia crassa & spissâ glandulosa oborta; & potest dici nodus vel callus osseus, si in cranii fracturis denuò conglutinati genitus, in nodis illis sedibus extra ossium superficiem extuberet & foris promineat. Tumores hi omnes Luis Venetæ affectus solennes esse solent.

Fungus Cerebri quid?

*Fungus Cerebri* est excrecentia tuberosa carnea mollis & albicans, ex dilatatione aut laceratione membranarum cranii, vel violenta luxatione post vulnerationem producta.

Siriasis quid?

*Siriasis* dicitur à Sirio Astro, quòd ægros instar caniculæ urat, & tempore hoc potissimum hic affectus oboriri solet. Dicitur & *Avicenna* Erysipelas cerebri, aliis *Kaûm*, *Foresto* Aduktio infantum, *Deustio*, Utulationes infantum, *Distillationes* infantum, *Ardor capitis*; *Fébrilein* capitis infantum fervorem alii nominant, alii *Apothema* sibiundum, tam ob febrem, quam licim comitem: Germanis *das Blatfallen schiefen* / melius *eine Entzündung am Hirn und Hirnhäutlein der kleinen Kinder* / quia affectus hic infantibus & pueris familiarior, quam adultis est: annon hæc nomina magis confundunt Tyrones potest docere?

Pars affectus.

Describi potest, quòd sit inflammatio cerebri & membranarum, quam insequi solet febris ardens, pallor totius corporis, siccitas & inappetentia, à particulis sanguinis & feri acris & acidis stagnantibus membranas rodentibus, scindentibus & pungentibus oborta. Hic affectus oritur ut alius partis inflammatio.

§. 2. *Pars affectus* horum affectuum est Calvaria & Cerebrum cum partibus his adjacentibus.

*Siriasis* in specie locus affectus, ubi malum hæret, dicitur à Medicis *Fontanella*, atque infantibus pars ea est, quæ ad commissuram coronalis & sagittalis est, quæ membranosa reperitur & mollis, locus hic membranosisus ab Anatomis *Fontanella*, seu dictum, vocatur.

Diagnosis.

§. 3. *Gummatosa Calvaria* ex eo cognoscitur, quòd sint tumores duri, tactui renitentes, interdum dolentes, maxime verò indolentes in ossium cranii medio enati, & incumbunt immediate perioftio. Hic affectus solet noctu præsertim in lue Gallicâ laborantibus, dolorem osteocopi gravissimum inducere, imò sæpe ossa subiecta erodunt & cariola reddunt.

*Fungus cognoscitur* ex mollitie, rariore textura & albedine pedetentim incrementum capiente, & membranis ferè semper adhærescere solet, & hic sæpe in membranis cranii radices habet suas.

*Cognoscitur Siriasis*, quando in scynipite appareat fovea, propter quòd ob ardorem inflammationis membranæ in Fontanellâ subsident, & talem foveam efformant; adeit etiam in hoc affectu cavitas oculorum, febris quoque ardens & continua affectum hunc comitari solet, pallor quoque & sæpe cum rubedine faciei ab inflammatione dependens conspicitur. Ventriculus etiam in consensum rapitur, hinc deficit appetitus, quem insequi solet diarrhœa cum doloribus & vigiliis.

Causa secundum veteres Gummatum.

§. 4. *Ætiologia* horum morborum quod attinet, *Veterum* sententia est, *Gummatosa* oriri ex succo nutritivo calvarie à sanguine communicato nimis glutinoso & abundante, & membranâ pericranii læsâ, unde in parte nutriendâ ob membranæ istius defectum non satis detinetur, sed extra illam protuberat, & affectum hunc tumidum producit.

Exostosis.

*Exostosis* oriri statuant post fracturam cranii à materie callum producente superabundante, quapropter ille non modò succrescat, sed etiam ultra cranii amplitudinem excreseat, & nodum hujusmodi prominentem exhibeat.

Fungus Cerebri.

*Fungus Cerebri* causam derivat tum à materiâ stultenti, tum ab humoribus cerebri corruptis, atque post fractam & extentam aliquam portionem calvarie circa plagam affluentibus, & instar fungi concrecentibus, tantâ aliquando magnitudine, ut etiam extra cranium emineant, limilique modo propullulare dicunt, quo in stirpibus arborum humores semiputridi per corticem extuberantes in fungos coalescant.

Siriasis.

*Siriasis* seu inflammationem oriri existimant

runt à pituità vel à pituitoso sanguine putrescente, sicuti *Sennertus* scribit; causam huius mali proximam alii pituitam, alii bilem esse statuunt, verum cum inflammatio sit, à pituitosa simpliciter materià esse non potest. neque etiam bilis sola in infantibus facili, præcipue in cerebro, colligitur, veram consentaneum est esse sanguinem pituitosum putrescentem, qui dum putredine incalcescit, biliosus quodammodo evadit. Consentiant & alii. Inter causas remotiores referunt res Naturales, & potissimum temperamentum infantum calidum & siccum, ætatem tenellam ejusmodi inflammationibus facili obnoxiam; inter Nonnaturales culpant aërem calidiorem & æstuantem, & ideo hoc problema habet *Alex. Aphr.* Cur infantes ætate fiderantur? quod vulgus æstu laborare eos dicit. Inter Præternaturales omnes acculant febres, vigilias nimias, dolores, dentitionem, convulsionem, achores, favos, scabiem capitis subito exlicatam vel retropulsam, percussiones & casus.

*Secundum Paracelsum causa Gummatum & Exostosi.*

§. 5. Pergimus ad *Paracelsum*, qui *Gummatum* & *Exostoses* hæc *Glandulas* & *Naptas* appellat, easque ex nutritio crani liquoribus originem capere docet, dum digestionem eius separatio præcessit, hinc in formæ suæ substantiæ separationem etiam transit, ex qua postmodum naptæ proprius locus oritur & generatio. quæ cum in aliis membris iisdem similis sit, ita & hic liquorum, à quibus proveuit, similitudinem recipit, & in cranio ossæam substantiam monstrat.

*Causa Fungum Cerebri* similiter excrecere statuit ex nutritivo humore à reliquâ cerebri substantiâ separato, & ob cranium perforatum in cerebri substantiâ similitudinem extra illud abeunte.

*Causa Siriasis.*

*Siriasis* modò à sulphure exalato, modò à sublimatione mercurii oriri putat, & quidem dum hic in infantibus potissimum, ab ætris exagitur, & vel solus, vel cum sulphure unâ accenditur, & membranas cerebri pungit, urit & vellicat.

*Helmontii sententia de causa Gummatum.*

§. 6. A *Paracelso* proximus gradus est ad *Helmontium*, qui de morborum horum causis interrogatus respondet, *Gummatum* produci à mucilagine ossis cranii, cui pro alimento destinabatur, inspissatâ, è corpore suo resolutâ & denudò coagulatâ.

*Exostosi.*

*Exostosi* autem oboriri à liquore alimentari ex ossæ calvariæ injuriatâ depluente, ideoque ossis duritiem eam mentiri, quamvis in lue veneret ut plurimum cum carie. nihilominus de ossali coagulo participantem.

*Fungi.*

*Fungum* excrecere vult à fuligine quâdam ex humido natali spermatico per tracdinem sui resolutionem meditante, unde vapor & exhalatio. & tandem Gas excitatur & calor, qui fungosam illam fuliginem extrudit, sicque protuberantia illa cerebri quandoque ultra cranium foraminatum enascitur.

*Siriasis.*

*Siriasis* ab Archo impetum faciente & propriâ quâdam thymoli se accendente deicit, dum vel à calore externo, vel à spinâ quâdam internâ exagitatus, & hostem illum expellere nitens, huiusmodi in membranis cerebri excitat incendia, teneros infatulos non modò ad extremam salutis lineam, sed ipsam etiam in mortem sæpè conjicientia.

*Wilsisii.*

§. 7. *Wilsisii* omnes hosce morbos à liquore

nerveo nutriente copiosiore & ichori tenaci impleto, nec non partium eundem fuscipientium peculiari quâdam dispositione produci statuit, & quidem *Gummatum* à succo isto viscidiorie ichoroso, & pororum cranii in loco isto dilatatione, ut per illos facili transire possit, unde fit, ut cum portione nutrimento cranii destinatâ crassiores & viscidiores partes simul eò ferantur & cranio agglutinentur, sicque sui aggregatione cumulum aut tuberculum gummosum eformant.

*Exostosi* ab eodem succo & sanguine nutritiente, atque à natura illa circulante pro calli generatione ad cranium vulneratum missio deducitur, quatenus foramen illud ma'usculum majorem copiam recipit, & succi illi faciliorem fluxum nacti auctiore quantitate allabuntur, quare spiritus animales copiam obtinent, nutrimentum commodè distribuire & adaptare nequeunt, sed calum in majorem molem excrecere permittunt.

*Fungi Cerebri* causam statuit eundem liquorem nutritivum ob læsam aut dilaceratam meningem liberioris spatium adeptum, atque ob hoc cerebri substantiam non modò expandentem, sed etiam per accretionem quandam ultra membranam spongiosam istam protuberantiam aut excrecentiam constituentem.

*Siriasis* oritur ex ejus opinione, dum sanguis *Siriasis* circa partem aliquam membranæ collectus, in circuitu suo præditus & stagnans, phlogosin quandam excitat, unde membrana illa valde pungitur & vellicatur, potissimum quando ferum minis dilutum ei immisceatur, à quo sanguis ille valde effervesceat.

§. 8. Juxta *Sylvium* causa horum morborum hæret in sanguine nutriente, qui dum plures partes tenaces ad cranium per minimas arteriolas transmittit, quàm opus fuisset, istud protuberare facit & *Gummatum* sunt; quando verò post fracturam sanguis nutiens copiosior callum ma orem reddit, quàm fieri deberet, & ille minimum ultra cranii superficiem prominens, ita *Exostosi* oritur; denique si per vulneratam membranam duram idem sanguis nutiens halitus cerebri aliquando propellit & auget, tumor ille pronascitur, quem *Fungum* appellant.

*Siriasis* deducit à bile acriori cum sanguine evaluato & circa meningem cerebri crassiores stagnante effervescente, cui se & acidum aliquod volatile acre aliquando immiscere solet.

§. 9. *Cartesianorum* sententia est, *Gummatum* produci à particulis nutrientibus chylosis aliquantum spissioribus viscidis, per Calvariam antea ab acido quodam acriori nonnihil corrosam, adeoque brevioribus, rectoribus & patentioribus poris præditam, exudantibus, & mediante quiete ejusdem extremitati adherentibus, & prominentiam illam gummean referentibus.

*Exostosi* ab iisdem particulis crassioribus terrestribus commissis oriri dicunt, quæ calore intus agitate ad fracturam cranii pro callo generando appellantur, & solâ quiete tanquam glutino fortissimo compactæ, sibi invicem adherent, dum verò adhuc in motu sunt, & fortiores particule ad priores impetuosis irruunt, hæ ab illis protruduntur, aut si jam quiescunt, nec aliis cedunt, aliquod tamen adhuc adest spatium, per quod aliæ transire possint, nec à duriore corpore impediuntur, illæ altius assurgunt, donec tandem & ipsæ moveri desinant, subique per quietem.

quieteni connectantur, sicque exoritur protuberantia illa ossea.

Fungi.

*Fungus* in succo nutriente cerebri excrefcere statuit, dum dura meninx lacerata enim detine- re nequit, sed intra illam, vel etiam fupra illam protuberat, qui exhalantibus fpiribus laxum hunc tumorem producit, & fi quando alia par- ticular peregrina ab aere se eidem intermifceant, vel æther fubtilis magis hoftiles inferat, fit ut fæpe corumpatur, & in cancerum aliove morbos abeat malignos.

Siriasis.

*Siriasis* fecundum illos oritur à particulis aci- diis acerbis membranas cerebri pungentibus, & ab evafato fanguine divitis circa easdem com- morante, & per diuturniorem illam moram cor- rupto productis. unde ob vellicationem iftam in- gens dolor, & ob turbatam miffionem in fuccis & fanguine febres excitantur, quæ caufæ proxi- miores à remotioribus alius, errore videlicet nutri- tum, aliquando citius deduci poffunt in ætium

Neftia fens  
fentia de  
caufa Gum-  
matum.

§. 10. *Nos* existimamus, Tubercula calvaria- rum folum habere ex alimentis partis propriæ alteratione & corruptione coagulando in talia guminata indurata, & ex ichore putrido vifeofo, & acido ex glandulis & nervis evafato, & fic ob- ftructionem patiente coacervato; acidum enim in lymphâ, ut & in alimentari depravato fucco hofpitari folet, quod partes indurat, vafaque & fibrillæ nervæ tunc à vifcido hoc ichore ob- ftruntur, hinc fpiritus denegatur aditus ad hanc partes, & propter hunc fpirituum defectum lymphæ & fanguis minus fluxilis, craffior minus- que temperatus exiftit: & cum fpiritus ubique lymphæ & fanguini permifceri debeant, & pro- videtur aritæ Deuster O. M. plures nervos deduxerit, ut copiofos advehant fpiritus, non nurum, fi illis parçiori copia accedentibus hu- mor quivis adhuc craffior evadat, & partes fub- fiftentes acefcant, & cum quotidie acidiores eva- dent, ferum, cui laus motus ordinarius eft, in- craffant, quo poros glandularum vel aliarum par- tum offendentia ac diffidente, ftagnatione diu- tiori induratiorem & fcartholim tumorem oboriri necesse eft.

Causa Exo-  
stos.

*Exostosis* caufa eft ferè eadem & oritur hoc tuberculum offis ex fui propini alimentis altera- tione & corruptione, indeque paulatim factâ coacervatione & ftagnatione, quod ut in carne à cute & tunicis denudata accidit, ita hinc offi- bus ob perofiffimum abrafum ab ipfis aliqua in parte vel exefum, evenit, fi quidem fuccus nutrien- s offium expulffionis, quem perioffos quoque cohi- bere intra offa folet, forisque illis affigens, us- que adnafcens, & ab acido in duritiem hanc of- feam coagulans, nodos illos quali offeos parit, fic fractis & abrupfis offibus, ex ipforum fracturis fucco luxuriante, callus, quia ex rurfum jungit & conglutinat, natus, fi ultra offium fuper- ficiei excrefcit & nodi inftar præmineat, ex- oftofin talem efficit: quod vero accidere folet in lue Gea ex alia caufa offi ita deformante.

Causa Fun-  
gorum.

Causâ *Fungorum* membranas crani vi- olenta dilatatio aut laceratio membranarum, vel lætio, ex his enim lætionibus humor ille nutri- tivus, vel chyli, vel lymphæ nomine veniens, ela- biuit, dein retinetur & ftagnat, exinde generatur talis caro mollis, rara & luxurians, fimul tamen corruptionem & aliquam coagulativam acefcen- tiam concepit, hinc & funt ejusmodi fungi

aliquando cancerofi, aliquando ob vim acidam corrofivam.

Causa Si-  
rias.

Causâ *Siriasis* ut & aliarum inflammationum exiftit, fed non ita intensa aliâs vera effer phre- nitis, fanguinis vel aliarum acrimiarum particuliarum circa membranas cerebri ftagnatio: fanguis e- nim ita fubfiftens denum non vegetatur, hinc fpiritus, utpote agilliffimæ particulae, vinculis fuis liberata inque libertatem afciter tenies ex- halant in auras, & dum amicæ membranas partes afficiunt, accedentibus verò heterogeneis jam recentius craffis particulis, funt peti ma- ximè inæquales, ita ut huic poro heterogenea particula, huic viciffim porus alius minime re- fpondeat; per hos æther rapidiffimus dum agi- tur, aliter fieri nequit, quin per poros viam fibi faciendo materiam fubagitet, & concitatus la- tus affum excitet. De quibus fufius vide *caput de inflammatione in genere*.

§. 11. Tubercula illa *Gummatâ* dicta maximè periculofa funt, quia membranaceis partibus in- hærent, & faciliè ab illis non tantum membrano- fic hæ partes iphacelari poffunt, fed & fubjecta offa cariola redduntur. Pefsimum fignum eft, quando à lue venereâ hic affectus obortus eft, indicat enim acidum luis venereæ acce circa hæ partes fibi imperium rapuille, quod itæpe in fpec- cie offa excedere folet, & nervatum alimentum corrumpt, & coagulando non folum in gumma- ta induit, fed partes vicinas erodendo faciliè ad ulcera perducit.

Fungus  
Gumma-  
tum.

Si callus offis nondum eft confirmatus, bo- num eft, fi verò eft firmatus, line fracturâ non potest curari. *Exostosis* funt difficillimæ curari, Sic & *Fungi* membranas crani poft vulnera- tionem nare occultum in finu gerunt acidum, quare faciliè degenerant in cancerum, ob corrup- tam etiam nutritivum humorem ægri in tabem labuntur, prout in textore Spangenbergii ob- fervare licuit. Quo firmius hi fungi partibus membranaceis inhærent, eo difficiliores funt cu- rari, & quo majores & ampliores illi funt, eo periculofiores. Videe his *Hildan. Centur. 1. obf. 13. & Scultet. obf. 22.*

*Siriasis* gravis & acutus eft affectus, interque peracutus refertur, raròque ac difficulter cura- tur, intra triduum plerumque interimit, teftè *Hipp. A. 50. S. 7.* quibus cerebrum fideratum, intra tres dies intereunt, fi verò hos fupera- verint, fani funt. Cui enim nobiliffima cor- poris pars Cerebrum cum membranis afficiantur, quæ plures alias nobiliores partes in confenfum ra, ut, medianibus fcil. fpiribus animalibus; præterea cum in tenella ætate tanti vigoris non fint fpiritus, qui violento hofti poffint refiftere, fimulque alia concurrant fymptomata & multa gravia, v.g. convulfiones, gangrana & fphace- lus, phrenitis, non mirum, fpen in angulo effer. Si tamen in tempore huic affectui fuccurratur aptis remediis, in paulo adultioribus & robuftio- ribus malum hoc poffe profigari non dubita- mus.

Cura Diæ-  
tetica.

§. 12. Cura *Dietetica* confiftit in legitimo ce- rum illarum in foro medico hæcenus tolerata- rum non-naturalium ufu: Aer hic fit tempera- tus, victus tenuis, corporis & animi motus ni- mos, imprimis iram, aliasque caveat animi pa- fiones; reliqua peti poffunt ex priori capite.

§. 13. Curatiorem *Pharmacenicam* & *Chyr- gicam* in *Gummatibus* Veteres ita aggrediuntur.

Veterum  
Curatio  
Gumma-  
tum.

ne ulcerius capiant incrementum; victum institu-  
tione tenuem, venam fecant aliquando medi-  
camentis purgantibus humores superfluos eva-  
cuant, externè locum affectum aqua modicè ca-  
lida in minima quantitate perfundunt, ut emol-  
liantur, & enollita tubercula postmodum fa-  
cilis expellantur, quam expulsionem modicà  
frictione promovere student. Si verò tenaciora  
sint, ea adhibent, quæ in *Excofiosi* ulcerius con-  
ferre putant, videlicet si recens illa, per con-  
modam deligationem & compressionem excre-  
scentiam istam reprimere & minuire tentant  
induratum verò humento ex oleo, sale & nitro  
perfricant, & malagina aliquot digerens impo-  
nunt, vel semen liniapi cum sicu, & stridiùs li-  
gant. Si nec ita superari & minui valeat, apertà  
cute scalpri eam deradunt, aut etiam terebris  
excidunt.

*Excofiosi.*

*Fun.*

In *Fungo* cerebri curando similiter pro aver-  
tendo humorum influxu laxantia adhibent, ali-  
quoties injectis enematis, deinde forum insti-  
tuunt ex herb. & flor. beton. sal. rorismar. ma-  
joran. flor. camomill. nelilot. ros. sem. fanigr.  
anil. sacculo inclusis. & vino & aquæ communi  
incoctis, post forum caput diligenter linteis ab-  
stergunt calidis, & fungo pulverem inspergunt  
ex rad. aristol. rotund. Irid. Florent. angel. ca-  
ryophyllat. lign. Guaiac. flor. sal. rorismar. sim-  
mitat. majoran. &c. tandem emplastrum impo-  
nunt de bet. cum Gum. elem. add. pulv. rosar.  
myrtullor. malthic &c.

*Siriasi.*

In *Siriasi* curandà primò omnium instituunt  
evacuacionem humoris calidi cerebrum accen-  
dantis & inflammantis, vel medicamentis laxan-  
tibus, vel clysteribus aut sanguinis detractioni-  
bus per V. S. vel in tenellis infantibus per cucur-  
bitularum applicationem in humeris, scapulis &  
brachiis. Evacuata medicamenta illis in hac  
ætatè sunt Syr. rosar. solut. violar. solut. decichor.  
cum theoi. in aq. violar. lactue. bugloss. endiv. &c.  
soluti. Enematis formula sequens esse poterit.

*R. Decollum emollient. ʒi.ß.*

*Succ. bet. ʒß.*

*Sacchar. Thom. ʒij.*

*Cassie rec. extir. ʒi.ß.*

*Ol. violac. ʒij.*

*M. F. Euema, applic. tepide.*

Humore commode evacuato alterantia propi-  
nant, Julepos imprimis refrigerantes ex aq. acet.  
endiv. lactue. bugloss. rosar. cum Julepo rosar.  
Syr. granat. de Limon. paratos. Externè capiti  
applicant refrigerantia & humectantia, inun-  
gendo vel oleum rosar. vel unguent. popul. &  
postea pulverem inspergunt ex flor. rosar. viol.  
ocul. populi, sem. lactue. papav. coriand. & san-  
talo citr. nec pediluvia omittunt.

*Paracelsi*

*Curatu*

*Gum. Ex.*

*off. &*

*Fung.*

*Siriasi.*

§. 14. *Paracelsus* in curationibus horum mor-  
borum admodum pauca adhibet remedia, *Glan-  
dulas enim & Napras*, seu *Gummata & Excofiosi*,  
nec non ipsos *Fungos* abscondit, & postmodum  
emplastro de manua iterum sanat.

In *Siriasi* ad domandam & tollendam subli-  
mentationem mercurii, ut ipse morbus, & non ho-  
mo obdormiat, laudat præ aliis specificum suum  
anodynum parva dosi, infantibus potissimum,  
propinatum.

*Helmontii*

*Cura.*

§. 15. *Helmontii* cura *Gummatum, Excofiosum*  
& *Fungorum* consistit in correctione alimenti &

excitatione Atchei ad officium, ne ille plus ad  
partes nutriendas transire permittat, quam op-  
tus sit; in *Siriasi* autem Archeus nimium im-  
petuosus in viam reducendus & sedandus est:  
quæ cuncta efficiunt arcanæ suæ universaliæ non-  
nisi Adeptis communicanda.

§. 16. *VVilfianus* affectibus hisce medendi  
ratio postulat ichorum tenacium in sanguine  
correctionem, & liquoris nutrientis abundantiam  
moderationem; adhibenda igitur purificantia  
sanguinem, imprimis diaphoretica aliquoties  
repetita, ex rad. Sarsaparill. Chyn. Caryophyllat.  
Imperat. Valerian. Cort. & lign. Gua. ac. Sallafr.  
Santal. fol. rorismar. Herb. Card. Bened. Rutz.  
Resinâ Guajaci & ejus. Tincturâ Externè adhi-  
benda sunt emollientia ex Gum. Ammon. Gal-  
ban. Elem. Carann. cum Sale Armoniac. Cerussâ  
ʒij. *Fungo* inspergi possunt pulveres consumen-  
tes & adstringentes ex rad. Ireos. punice & alum.  
ulf. Cort. thur. lap. calain. pp. &c.

In *Siriasi* ad sanguinem stagnantem fluxilem  
reddendum instituit aliquando V. S. Enemata  
frequentiùs applicat, ne materia febrilis è viscè-  
ribus ad caput impetum faciat, & ad sedandam  
effervescentiam aut Spirituum exandescientiam  
Jalapia, Apoz. amata, Pulveres aliaque remedia  
suadet intus adiuvenda:

*R. Aq. Lujula ʒi.ß.*

*Cerafor. nig. ʒj.*

*Marg. pp. ʒß.*

*Syr. ex succ. citr. ʒi.ß.*

*M. D. Cochlearum.*

Pedibus Cataplasmata adhibet ex Verben Rut.  
Chamamel rad. bryon. flor. Papav. err. Fronti  
Oxyrrhodina, & Syncipiti sedum majus c. nu-  
tium & cum lacte muliebri mixtum applicare  
consuevit.

§. 17. Ex *Sylvi* fundamentis curatio *Gumma-Secundum*  
*tum & Excofiosum* instituitur auferendo nutri-  
mentum nimium, & consumendo illud, quod  
jam appositum est, quod et si difficulter obtineri  
posse agnoscat, Salibus tamen volatilibus cen-  
tandum esse suadet, remediisque ex Guajaco pa-  
ratis. Externè etiam Gummata aromatica ali-  
quoties applicari vult, & aliquæ tum potentialia,  
tum actualia remedia visciditatem consumantia,  
quæ itidem in *Fungo* utilis fore confidit.

In *Siriasi* maxime occupatus est, ut Bilisacri-  
monia corrigatur & temperetur vel per aci-  
da blanda, vel subpinguia & aquea, vel et-  
iam spirituosâ. Inter priora laudat Spiritum  
Salis aut nitri dulcem, pap. prunella,  
&c. Inter secunda, Emulsionem ex hordeo,  
amygdal. sem. papav. alb. 4. frig. in aq. Inter po-  
strema Spiritum xci, & alia salia volatilia, quæ  
tamen cautè adhiberi vult, & in inflammabile  
ejus omnino omittenda. Si verò inflammatio ad-  
sit ex sanguine citi meninges corrupto, ejus  
fluxilitatem restituendam esse jubet, usurpatis  
diaphoreticis, ex rad. taraxac. herb. scabios. Card.  
bened. flor. papav. thrad. oc. canc. ʒio diapho-  
ret. alisque salibus volatilibus temperatis coagu-  
lationem ejus resolvantibus. Externè caput ali-  
quando inungit ol. Chamæz elino hl. alb. aneth.  
ungu. de Alth. Popul. & similibus.

§. 18. *Cartesius* quod concernet, ii curatio-  
nem *Gummatum* aggrediuntur remedia parti-  
culas illas spissiores in succo nutritio corrigentibus, matu-

*Willfianus*  
*curandi*  
*Gumma-*  
*ta, Excofio-*  
*sium.*

*Siriasi.*

*Siriasi.*

*Cartesius*  
*remedia*  
*ad curan-*  
*di Gum-*  
*matum.*



# CAP. V DE CALV. GUM. & EXOST CEREB. &c. 41

tibus, incidentibus, videlicet, attenuantibus & volatilisantibus, Essentia rad. Valerian. ligni Guaiaci, Tinctura Resin. ejusdem, Spir. ❄ci. Externe ad emolliendum & resolvendum nodos istos itidem ex Gummi applicant composita emplastra, additis alcalicis & abstergentibus, sale ablinth. rorismar. salvia, &c.

Exostof.

In *Exostofi* incipiente eadem adhibent remedia, impositis aliquando durioribus deprimentibus & excrecentiam illam prohibentibus, si vero nec inhiberi, nec emolliiri potest, scalpro eum cum aliis abraderet canitur.

Fungum.

Non absimili modo cum *Fungo* curando procedentes fatigant, ut succi nutrientis nimia copia per diaphoretica spiritiosa minuatur, & quantum potest, ulterior excrecentia prohibeatur, insuper is ei pulveribus humiditatem abundantem imbibentibus, & fibras constringentibus ex rad. Ireos, aristol. rot. lap. calamin. ebore ust. alum. ust. &c. ut ita non modo minuatur succus superfluous, sed ulterior quoque deiegetur transitus, & via crescendi occludatur, qua de causa & emplastra imponunt vulneribus cranii dicata, quibus huiusmodi exsiccantia & consummentia fuerint intermissa.

Siriasia.

In *Siriasia* diligentes se præbent, ut acrimonia particularum acidarum ex sanguine corrupto, aliisve succis degenerantibus corrigantur, non contemnunt igitur aut negligunt Clysteres ex Decocto emollientium & leviter alterantium, interne vero laudant Aq. plantag. rosat. anagallid. endiv. quibus præcipitania quardam ex lap. app. Corall. pp. CC. ust. mansib. luc. pp. sacch. hi, Camphor. addita sunt, adulcorata vel saccharo Canthio albo, vel syrup. Papav. errat. de Nymph. simpl. &c. Laudant etiam Tinctur. Rosar. & flor. borag. Externe Cataplasmata adhibent capiti ex flor. Chamomull. lil. alb. summit. aneth. fol. malv. &c. in lacte coctis & tepide applicatis.

Notra. f. s. tendin de Curatione Gummatis

§ 19. *Nep. a* ex sententia Curatio *Gummatis* Calvarie consistit in eo, ut acidum & viscidum obstruens corrigatur, in quem finem conducunt tum interna, tum externa. Interna sunt volatilia, præsertim succinata, & viperina, liq. C. C. succinat. cum essent. viperin. *Zorooff.* ad 20. guttas exhibenda in aq. ligni. aperit, &c. optimum est remedium, & interponenda sunt Decocta ex lignis. Sic & conducunt Essentia lignor. spir. sal. ❄ci, succin. fumar. &c. In graviore malo ad *Glia* confugiendum, imprimis ubi simul Lues Gallica coniuncta est, quæ totam implent paginam, & detur *Gius* dulcis à gr. x. ad xx. singulis diebus, usque salivatio procedat, os & fauces gargari sine quotidiè eluantur, & procedatur ut in curanda lue *Q*æ.

Inter externa applicanda sunt *Gummatis* hisce emollientia & resolventia, antequam scil. hæc cariem ossis & ulcera partium mollium inferant, inter quæ præ aliis omnibus Emplastrum nostrum polychrestum eminet, quod sequens est:

- ❄. Minis 3b.
- Salis ❄ci 3ij.
- Camphor. 3b.
- Vetri 8ij. 3ib.
- Cera 3iij.
- M. F. l. n. Emplastrum.

Conveniunt etiam Gummi, quæ fortiter

penetrant, ut Emplastrum de Gummi Crocat. *Mys.* & iisdem *Glia* addi possunt, & hic non contemnendi usus erit Empl. de Ran. cum *Glio Vigen.* quod in omnibus tumoribus indolentibus & pertinacibus egregium est. Possunt & illiniri ejusmodi tumores cum oleo quod prodit in destillatione ~ūs althmar. *Michaelis*, vel oleo *Qi* per deliq. præsertim verò oleum ligni Guaiaci, quod convenientissimum est, & lui appropriatum, & cariem ossium curat & præservat. *Galia* sunt specifica alexipharmaca, hinc convenit lamina plumbi *Q*o vivo illita, item *Gus* funio *hi* coagulatus, cujus modum vide apud *Poterium*. Asterisco verò notandum est hic, ne ossa *G*alibus attingantur, aliis ab his facile corroduntur ac nigrescunt. Fumus ex succino non contemnendi usus erit, vel paretur sequens linimentum.

- ❄. Ol. Terebinth. 3b.
- Guaia. 3ij.
- Opii 3b.
- Cinab. nat. 3j.
- M. F. Linimentum.

Si plura cupis, videas *caput inferius* de *Tumoribus*.

Exostof.

In *Exostofi* serè eadem remedia, nec non blanda exedentia conveniunt, Excrecentia enim hæc ossæ curantur ceu Topli ossium, de quibus vide *caput 22. lib. 5.*

Nodi hi callosi dicti per se, non ex morbo alio, ob rosionem periostii succo nutritio ossium luxuriante nascuntur, ac calli vel ossis novi instar ossi adnascuntur, vel à fracti ossis glutinati rursus callo, nodi instar protuberantes, proficiuntur, difficile quoque tolluntur, & indurati omnino ad dies vitæ durare solent. Ab initio ergo eo annitendum, ut opicis adhibitis eos emollire & resolvare possimus. De callo ossium emolliendo videatur *Hildanus* Cent. 1. Obs. 91. Si osse enim denuo coalito, callus nimis magnus genitus sit, corrigendus & imminuendus est. Applicari hic possunt vatia, & quæ in *Nodis* ac *Scrophulis* dicemus: imprimis interne aq. hepat. vitriol. cum salvia aliisque aromatib. destillatam commendamus. Narcotica externe multum faciunt, ut imponantur rad. mandrag. cum spir. pro cataplasmate. In lue *Q*æ applicentur *Galia*. Si callus non est firmatus, abigi potest Empl. *Zacharia* filii dicto, vel imponantur varia Emplasta ex Gummi parata. Tentabis etiam eos acuto ferro ab osse continuato actu absciccare, vel limâ abraderet, imprimis si os primo certo liquore emolliatur, & dein abscindatur superfluum, posthac etiam vulnus ossi & cuti adhiectum ut decet curetur. Alii utione id, sed minus rectè, perficere tentant. Plura videre poteris *lib. 5. cap. 22. de Callo.*

Fung.

*Fungi* Cerebri præmissis universalibus & acidum absorbentibus cephalicis permixtis & quidem ciuarrinis, externis blandis exedentibus tollendi, ut sunt Elix. vitæ m. d. quod egregium est. CC. ust. pulv. cum myrrh. & tur. permixtum, vel Sal. ❄cum solvatur in aqua simplicij, & addatur pro renata parum calc. viv. hac solutione crebrius tangantur fungi. Item conducit Emplastr. de Galbano *Mys.* de Ran. *Vigen.* Aliis aqua plantag. cum alumine optima est. Pulveres

P

hic

hic etiam conducunt exsiccantes & acidum absorbentes imbibentesque, ad majus incrementum præcavendum. Pulveres hi parati possunt ex tutia, Creta albâ, myrrh. lap. calam. sacchar. calc. viv. aristol. O. Si hæc non sufficiunt ad præcavendum cum cautione tamen accedendum, si hic non suffecerit, incurabile habetur malum; plures tamen sunt, cum videant fungum ad cancerum transire, qui eum abscindunt; sed cum hisce membranosis partibus in capite adhæreat, dubia res aliter est.

*Siriasi.*

In Infantibus *Siriasi* laborantibus conducunt evacuantia, imprimis si est à lactis vitio, vomitorium lenie propediem exhibendum, ex Symplicio diaphoreticos, vel raphani, vel nicotianæ. Sic & Emata erunt proficua. Ad sanguinem parum alterandum, & stagnationem aliorum humorum impediendam conducunt varia diaphoretica; ad particulas acres leniendas conveniet Mixture sequens:

*℞. Aq. Card. bened.*

*Utric. aa. ʒij.*

*ʒi diaphor. ʒj.*

*Ocul. cancr. pp. ʒ℥.*

*Syr. flor. Papav. Errat. ʒ℥.*  
*M. D. Coelebatim.*

Vel detur pulvis absorbens cum arcano duplicato per vices, & curetur internè ut alius partis inflammatio.

Externè laudatur à pluribus cucurbita domestica capiti applicata; vel alii utricas contusas addito  $\Theta$  volatili syncipiti applicari suadent. Nos vidimus cum successu applicatum succum raparum expressum, cum sale volatili succini, discutientia conducunt, ut sunt chamomill. aneth. flor. sambuc. Pæon. Nutrici quoque exhibenda sunt blandiora minorativa, & sæpe dentur pulveres præcipitantes. V. S. arteriotomix, ulsiones Florentinorum, quæ in Convulsionibus & Epilepsia adhibentur, in tenella hæc ætate potius omittenda esse censemus, quàm iis faciendis arti pessimam conciliare sanam. Possunt vesicatoria mitiora applicari, caro bubula nichæ imponi potest. Sic convenientia Epithemata plantis pedum applicata ex farinae malsæ cum

$\dagger$ to &  $\Theta$ e parata, vel halesci saliti & exsiccati, conferunt,

## CAPUT V.

### *De morbis Oculorum in genere, & eorum globum instantibus, Atrophia nempe, Procidencia, Strabismo, Ficu cancroso, Ficu*

*scirrhoso & Perforatione.*

#### §. I.

*Oculi distincti.*

**O**culus sanè, splendidissima illa fabrica humane lux, Soli, lucidissimæ structurae mundanae faci, os humerosque similis est. Nunquam enim ille Sol macrocosmicus, Universi oculus, suos excellenti claritate expargit radios, quin oculus, Sol microcosmicus, excellentiori modo non illuminetur, & suum illuminet mundum: propter oculum enim Sol, & propter hominem oculus, & cætera omnia condita sunt, ut inde immensam Creatoris sapientiam & bonitatem contemplari, admirari & celebrare possimus. Oculus certe pretiosissima hominis gemma, inter humani corporis partes principes merito recensenda. Unde quidam fuerint, qui in oculis animæ sedem ponere voluerit.

Næ! Oculi amoris, odii, audaciæ, reverentia, gaudii, trillux, ira, furoris, misericordix, ultionis & cogitationis indices sunt. In amore blandiuntur, in odio effrauentur, in audacia profluant, in reverentia subsident, gaudent animo hilares subrident, eodem tristante languescunt, in iracundiâ exasperantur, in furore flagrant, in commiseratione submittuntur, in ultione distortentur, in cogitatione ac curâ quiescunt, quasi cum mente simul intenti, unde ex vario & multiformi intuitu varie nuncupantur, torvi, truces, flagrant, graves, transversi, limi, submissi, blandi. Sed relictis moralibus discursibus, magis ad Medicam accedamus: primarius enim noster scopus est humana corporis aut conservanda aut restituenda salus.

Cum verò cognoscere aut depellere partis alicujus morbum ludeamus, ante omnia constitutionem & fabricam illius, communioneque cum aliis, sive vicinioribus, sive remotioribus, nosse oportet; idè in secando intuitum humano corpore indes magisque sumus curiosi. Iaprofecto earum partium agendi patientique rationem nunquam rectè ac par est explicabit Medicus, qui singulorum organorum structuram & partes, partiumque singularem usum circumspicere ac sollicitè non perlustraverit.

Ac præsens quidem institutum nostrum quod concernit, illud est, non tantum oculi structuram, sed & simul visionis modum explicatè proponere, antequam ad morbosum accedamus statum.

Onniam igitur primò pellucidæ illius ac du- *Oculi exterioris tunicæ, quam Corneam expropter ducunt, statim notabilis circa reliquum oculi globum protuberantia, & mox relectæ, non absque profectione aquei cujusdam humoris circa posteriorem bulbum continuatione æque solida, at non amplius translucidâ, (hæc & Sclerotica à duritie appellatur, ) obviam statim indicamus molliculam teneramque pelliculam in medio perforatam, & circa foramen illud, quod à pupula, inibi tantquam in speculo visa, pupillam vulgo vocant, denuo colore instat nix pictam, indeque Uveam dictam, quâ parte Sclerotica pellucere incipit, ipsi undiquaque firmiter adhæret; tem, à postica verò, quâ nigricat ut plurimum, non nisi fibrillis quibusdam, arteriis, venulisque eidem hunc*

inde connexam, de cætero valdè separabilem. Remota dein huiusveræ à foramine centrali veris ambitum reflexâ & manifestò duplicatâ tunica, humor *crystallinus* in anteriore parte conspicitur, qui continetur propriâ membranâ, quâ disruptâ tenax ichor ac viscosa valdè substantia reperitur. Eius autem postica convexitas anteriore globosior est, ambiens eam vitreus humor multo copiosior at pellucidissimus existit, suâ quoque concinns pelliculâ, sinuâ comprehenditur, ut notabilis utriusque nexus manifestè conspicitur. Insimul autem memoratæ prius ævæ, quæ in parte postica *Choroides* dicitur, mediante *septo ciliari* scalligatus cerni potest, ut horum una móto, moveri unæ reliqua, totumque adeò oculi bulbum, necesse sit.

*Choroides* musculosus est & albicantior, rupturæque valdè obnoxia; & *Reticularis* sive Retinâ à transverso vasorum complurium plexu dicta, quam nil nisi cerebri, Choroidem autem pia, quam appellant; naris, & Scleroticam duræ meningis propagines esse in optico nervo, has omnes quippe in quendam quasi funiculum colligant, manifestum est; quæ omnia melius ante oculos demonstrari quam describi possunt, imprimis si oculum exentum ex animalis gelu fuerit concretum, ubi omnia distinctius apparent; sic etiam ex ebores singulas tunicas oculum investientes unâ cum pupilla arte factas curiofo demonstrare possum.

Tandem illustratis ita interioribus oculi partibus, externas etiam oculò muniendo movendoque destinatas paulò consideremus: Musculos puta, qui circa nervi optici intersectionem orti, ac circa corneam, junctis tendinibus suis tenuissimis terminati sex recensentur. His addere potes, si libet, Ciliâ, Glandulas lachrymales seu rigatitas, ductusque varios, quæ cuncta apud Anatomicos videas, imprimis *Histo. Anat. Corp. Hum.*

§. 2. Nunc modum visionis paucis perlustremus. Uti Medicorum laudabilis industria Philosophos quoque tandem è somno quasi excitatos ad Naturæ corporumque naturalium, ac speciatim Oculi anatomiam invitavit, ita vicissim sagaciores huius ævi Philosophi genuinum *Oculi usum* videndæ quæ modum ipso longè vetiorem, quem eouique à *Galeno* suo didicerunt, feliciter demonstrarunt.

Quidem Oculum esset, & quo pacto diversæ adeò ejus partes visionis actum juvarent, ex unius *Obscura Camera* tenebris tandem emicuit, postquam in tenebris ignorantia diu satis palpasset in varias partes & sectas divisi Philosophi; etiamnum quid sit videre non visuri, nisi vitrearum crystallinarumque lentium effectus videre tandem ipsi, & scin unam eandemque sententiam, cunctis hodie certam, pedibus ire consignisset. Dicitur ergo Oculum, non inconnitè aliis conspicio leu tebo optico comparandum, si demas tunicam Retinam dictam, esse parvulam Camera obscuram, & omnibus numeris absolutam, non hominis artificio, sed ejus Opificis nutu & consilio inventam ac fabricatam. Cuncta nempe obscuræ Camera requisita adiunt, foramen scilicet pupillæ, ac cessant retum externarum speciebus concedens per Corneæ pellucidissimam substantiam liberatum. Lens crystallina post foramen constituta, & ea globola valdè, prout angustia spatii

expositulat. Spacium de cætero undique clausum, ac præterea Choroidis nativâ nigredine haud parum obscuratum. Expensa per oculi fundum humoris vitrei auxilio, qui æris vicem subit, et præter hoc & aliud munus habet, subalbicans Retinæ membrana, quæ transmissas per crystallinum humorem species externarum rerum excipiat. Opinioni huic maxime favet experimentum, si oculi animalis cuiusdam parte suâ posticâ Scleroide & Choroidæ exutus, ut Retina tantum super vitreum humorem expansa relinquantur, foraminis Camera obscuræ aut tubi convenienti aptetur, species in eadem Retinâ pariter ac in charta alba, post vitrum lenticulare suspensa conspiciuntur.

Ex hisce ita demonstratis, per se cadit *Platonis* & *Pythagoræ* effatum, qui lucis radios pro objecto illustrando ab oculo emitti, hosque ab eodem opaco ad idem organum reflexos, species huic simul adducere volunt, quam opinionem amplexi sunt *Galenus*, *Vallesius*, *Casseri* aliique hos secuti Medici ac Philosophi.

*Epicuri* autem sententia planè ridicula est, dum veras rerum imagines & quasidolâ à visibilibus transportari dicit.

Sed nos relictis aliorum opinionibus, nobis persuademus, visionem fieri per radiorum impressionem, quem modum optinè describit Celeberrimus Vir & Fautor noster Colendissimus, *D. J. Bohm in Circulo suo Anatomico, libro certè Apollineâ bibl. obsecrâ digno*, dicens: Adeoque dum fibrarum Retinæ ex nervo optico emanantium apices à radiorum visivorum impulsu percelluntur, spiritus his inextinctis determinato modo exagitati, alios sibi vicinos commovent, usque dum hic eorum motus, ab extra inchoatus, beneficio continuitatis systoleos spirituum illorum ad cerebri interiora devolvatur: ubi demum portio sensationis activæ & potissima supervenit, quam, quia cum passiva, & quæ in oculo ac nervo fit, ratione temporis sensibilibus, coincidit, organo externo vulgus tribuit. A cuius nihilominus commotione ipsam visionem quàm maxime differre, id est, speciem impressam equidem adesse, deficere autem expressam, oculis apertis dormientes aut aliis rebus maxime attentis evincunt, quatenus ambo hi ab objectis quidem visibilibus percelluntur, illa tamen ne utique vident, aut eadem oculum ferire, percipiunt. Atque per ejusmodi particularum oculi subtilium ab hoc versis cerebrum undulationem retrogradam dum visio continuatur atque absolvitur, fit, ut non raro à corpore lucido potentiore, aut valde illuminato notabiliter lædatur visus: dum postquam tale quid attentius atque diutius spectavimus, alia objecta aut diffculter, aut depravatè conspiciamus, quatenus major radiorum, concentratorum magis, quantitas fibras quasdam, si non omnes, Retinæ (in hac enim fit visus) sensibiles valde prætermodum alterat & quasi adurit, seu spiritus impetuosius exagitando adeò rigidas, aut eosdem præter modum repellendo adeò torpidas reddit, ut ab objectis minus luminosis facile commoveri nequeant, donec redeuntibus, aut motui suo pristino restituti spiritibus pristinum flexibilitatem ac sentiendi potentiam repetant fibrillæ eadem. Imò ideo contingit, ut per illam oculi partem, cujus fibra una vel altera tantum impetûs à lumine majore sustinuit in altero, ad



quod repente convertimus oculum, obiecto, macula quædam prioris impressionis æmula compareat diversicoloris, donec successivè priusno tenori nervi cum spiritibus restituantur. Et ut brevis sim, visus fit, quando ab obiecto visibili radii luminaræ reflexi incidunt in oculum, ejusque tunicam in fundo oculi sitam, quæ Retina vocatur, estque expansio nervæ, certo afficiunt pulsû, contactu vel motu, quæ impressio ope nervorum opticorum & spirituum animalium illos irradiantium delata ad sensorium commune ab anima percipitur, eaque nunc de objecti conditione judicium fert, & sic videre dicitur, prout loquitur celeberrimus *Waldschmidius in fund. Med.*

§. 3. Demonstrato sic, juxta naturalem seu sanam oculorum constitutionem, ipso quoque visionis modo, præstitutus nos monet ordo, ut rectè nunc aggrediamur statim oculorum morbosum recensendo, examinando, & convenientibus remediis abigendo varia illorum vitia, à quibus ipse visus vel planè tollitur, vel diversimodè impeditur ac depravatur.

Ordinem autem ab oculorum morbis generalibus, eorum videlicet globum instaurandis, ut sunt: *Atrophia, Procidencia, Strabismus, Ficus canerosus, Ficus scirrhusus, & Perforatio.*

Oculi  
Atrophia  
quid?

*Atrophia oculi* dicitur, cum ex diuturnâ pororum obstructione, vel ab internâ vel externâ causâ abortit, oculus paululum quasi propullus, dein cavatus ad radicem cum dolore minor evadit, obscurèque aut nihil omnino videt. Aliis non oculi *Atrophia* aut *Tabes*, sed ipsius subsidentia vocatur, cum sit angustatio pupillæ.

Oculi pro-  
cidencia  
quid?

*Procidencia oculi* Hildano *Exophthalmia* dicta, est ejusdem prolapsus à relaxatione oculi cum suâ orbitâ abortus; quando scilicet oculus ex suâ orbitâ præter modum eminet.

Strabismus

*Strabismus* est, quando pupilla à medio declinat, ita ut in una oculi parte plus appareat, quam in alia; estque reverà totius oculi intra orbitam in dextrum sinistramve latus morbosa inclinatio, à certâ & inordinatâ dispositione & imprimis resolutione musculorum.

Ficus can-  
erosus.

*Ficus canerosus*, seu *Carcinoma oculorum*, nihil aliud est, quam tumor rubens, quandoque exulceratus, quandoque non, ab acido volatili insigniter corrosivo artemicali circa has partes nobiles sibi imperium rapiente, & via rumpente.

Ficus scir-  
rhosus.

*Ficus scirrhusus*, est tumor durus renitens tactui, sæpe indolens, à conglutatione sanguinis atrocisque humorum ab acido factâ productus.

Perforatio.

*Perforatio* five fit in tunica annatâ, five in cornea, in qua potissimum contingit, five in uvea, modo cum, modo sine aquei humoris effusione, à re externa acuta & pungente excitata, aliquando ab humoribus acerbis corrosivis producta.

Parti affe-  
cta.

§. 4. *Parti affecta* hic est oculi globus cum musculis sibi adjacentibus, quorum sex sunt, quatuor recti, & duo obliqui, sicut omnes intra calvarie cavitatem, & nervus opticus comitantes; primus musculus opticus & superior dicitur *Atollens* & *superbus*; alter ei oppositus minor dicitur *Deprimens* & *humilis*, quia oculum deorsum malas versus trahit; tertius in majori angulo positus *Adducens* vocatur; quartus *Abducens* nuncupatur; quintus dicitur *Obligatus*, & sextus *Trochlearis*, quia quasi per trochleam circumrotatur.

§. 5. *Signis*, pro dignoscendis his affectibus, *Diagnosis.* adeo multis opus non est, sunt enim per se satis noti, suæque deformitate civis se intuitu de facili manifestant, quare pauca tantum hic addidisse sufficiat.

In *Atrophia* ipsa oculi substantia flaccescit & marcet, ut moles longè appareat naturalis minor, tunc pupilla multò sit angustior, ejusque foramen seu nigrum constringitur; quod ultimum si solum contigerit, Græci veteres peculiari *Phibiosis* nomine indignantur.

In *Procidencia* solent oculi protuberare, & ob maiorem sui molem extra orbitam prominere, ita ut priori affectui hic planè videatur contrarius.

In *Strabismo*, affecti non possunt sibi directè opposita rectè intuitu adpicere, sed obliquo & limbo, ita ut sitalis aliquem velis aspicere, pupillam vel sursum, vel ad alterum latus convertere cogatur.

*Ficus canerosus* facile cognoscitur ex constitutione cancri, adeo simul effluxus humoris acris & tenuis, comite rubore partium oculi, ulcuscula semper adsunt in nigro oculi dorso, & venas infestas habentia varicosa, pariter canerosa vocantur, quæ cicatricem non admittunt: eiusmodi ulcera canerosa semper conjunctum habent dolorem capitis ingentem, color faciei ut in cancro, oculique est plumbeus, nec non fuscus.

*Ficus scirrhusus* itidem facile cognoscitur ex tumore duro, pertinace, & tactui resistente, sed non adeo doloroso, cum sensus in eo hebes sit, adeo color fuscus aut lividus, in principio exiguis apparere solet, tractu tamen temporis paulatim augetur, venas non habet tumentes aut exaltatas, ut canerosus, non raro tamen in ipsum cancerum degenerare solet.

*Perforatio* tum ex relatione ipsius ægri, tum ex adpectu adsistantium aut Chirurgi, absque ulla difficultate percipi potest.

§. 6. *Ætiologia* prædictorum morborum nunc instituitur, aliorum sententiam, promerito consilio, nosse præmittimus. Agmen autem ducent *Galenici* in *Atrophia* oculorum causam adscribentes privationi alimenti, dum hoc vel non gignitur ob hepatis, ventriculi & cordis facultatem concoctricem debilitatam, sanguinem minus debite conscientem, uti in phthisicis & tabidis evenire censent; vel non attrahitur ob propriam partis facultatem attrahicem debilem aut impeditam, ob vias (arterias hic indiguit & venas: (clausas, compressas aut variè distortas. Retentrix facultas alimentum adductum non retinet, concoctrix autem propria imbecilla sanguinem, quem nutritionis materiam proximam ponitur, non satis debite elaborat, unde variè illi immiscetur impuritates, quæ distributionem sui tam facile non permittunt, cum imprimis hic subtile requiritur nutrimentum. Maxime verò omnium *Venus* immoderata hic magnam partem damnum, quatenus non modo subtiliores in sanguine partes, spiritus nimirum cum femine volantes, nimium profundit, qui præ reliquis in hoc sensus principis organo admodum debent esse puri atque facile mobiles, quibus tamen deperditis, quod restat, crassum nimis est aque ad distributionem valde ineptum, sed ipsam etiam exsiccat oculorum substantiam. Nec minus culpant ichores aut

Iuxta Ga-  
lenicos  
causa  
Atrophia.



# CAP. VI. DE MORB. OCULOR. IN GEN. 45

aut ferocitates acres venas erodentes, ipsamque partem debilitantes. Res quoque extrinsecus illas faciliorem expultricem irritantes, lacrymasque alliciendo acrimoniâ iis conciliantes, oculum ad contabescentiam disponunt, quia rorida nutritiva substantia simul effluit.

Causa Pro-  
cidens.

Procidens causas distinguunt in externas & internas. Externas enumerant tussim vehementem, vomitum, contumaximum in durioribus facibus detrudendis, aut etiam in excludendo partu, in praefocationibus à laqueo & in tormentis. Internas volunt nimiam ligamentorum ab humorum influxu relaxationem, ut in catarrho, dolorem capitis ingentem, & hinc frontistemporumque pro levando isto dolore arctiorem constrictionem, aut musculorum paralyfin. Aliquando & primordiale hoc vitium annotant.

Causa Strabismi.

Strabismo, ut speciei, easdem adscribunt causas, quas Spasmo in genere, ut plurimum enim aut à paralyfi, aut nervorum distensione, vel musculorum oculos moventium, non tam omnium, quam aliquorum, convulsione, sive à repletionem, sive ab inanitione fulcitâ, eum ortum duxisse notârunt. cui alias malam consuetudinem anam præbuisse non negant.

Causa Fic-  
cis can-  
crosi.

Ficuum cancrisum ortundum volunt ab humore melancholico, & bile atra adultâ in oculo congestâ, productaque ob splenis imbecillitatem, quâ sanguinis portionem farulentam debile non allicit ex hepate. Ipsum quoque hepatis constitutionem hoc contribuere statuunt, quatenus natura sua vel proclive sit ad bilis atræ copiam generandam, vel nimis calidum & biliosum, unde sanguis alique humores plus debito coquantur & adurantur. Ex solitis quoque evacuationibus suppressis, ut mensium & haemorrhoidum, namque congestionem humoris melancholici fieri non dubitant. Ex vulneribus denum, contusionibus & fracturis, maxime autem erysipelate & inflammationibus male curatis eum obiculis fuerunt experti, & hoc propterea, quia frigidiorum applicatione materia eorum in duritiem concretit, aut solis calidis, non additis enollentibus, subsistente portione crassiore tenuiori dissolvitur.

Causa Fic-  
cis scir-  
rhosi.

Ficuum scirrhusum penè ab eadem causa derivant, nisi quod succus melancholicus hic aliquantum differat in qualitate, utpote minus acris, quam in priore, sed glutinosior, unde & pituita crassa glutinosa eundem producere possit censetur. Reliquæ causæ cum prioribus in Ficuum cancrisum plane coincidunt, cum Ficuum scirrhusum male tractatus in cancrisum facile abire solet.

Causa Per-  
forationis.

Perforatio oculorum ut plurimum contingit à re externa violenta & acutâ.

Intus Pa-  
raresim  
Causa A-  
trophica.

§. 7. Paracelsus in oculorum his affectibus admodum pareus est & brevis, ideoque valde obsecutus. Uti verò naturalem oculorum compositionem ex tribus constare asserit, Substantiâ videlicet, quæ illi nihil est aliud, quam totum integrum; Materiâ, quâ Mercurium indigat, & Sulphur, itemque Sal, & denique Formâ, quæ res viva est & rotunditas; ita & illorum morbos ex trium istorum à statu suo integro recessu derivat, & qui dem in specie Atrophiam ex forma, dum transpositum quoddam fit in oculis, usque valis annexis & meatibus conjunctis, ut denegat

tur illis per venas & poros consuetos cursus necessarius muniæ naturalis, quo fit, ut oculis iniuria fiat ac damnum in debito illorum nutrimento.

Procidens iudem ex forma oriri vult, quia Causa Protenus non una, sed diversimoda ex occasione incidens, oculus ex centro suo excidit.

Strabismus ad convulsiones vel paralyfes recti potest.

In Ficuum cancrisum humorem putat nutritivum separatim à substantia sanguinis per porum emunctorialem penetrare extra materiam propriam, transireque in huiusmodi excrementiam: accusat etiam affluxum falsi corrosivi duplicis, plumosi, vel arienicalis, rodendo maxime intrinsecus fodieritis.

Ficuum scirrhusum causam deducit ex coagulatione falsi sive Si, supapte natura ad coagulationem & indurationem vergentis. Sed de his plura reperies lib 3 cap 4. huius Encyclop. Chirurg. de Epatis & Lienis scirrhus, similis enim & penè eadem horum tumorum causa est, differencia saltem in loco affecto spectanda.

§. 8. Helmontius Atrophiam causam potissimum adscribit fermento lientari, in quo ut diversamunia latent, ita & proprietatum dissolutiones, quod si fuerit inutritum per aciem, aut progressas inorborum difficultates, alimntia, quantumvis bona, vitiantur; ex errore igitur diuiviratus primò oritur, dein etiam proprio oculi vitio, pars enim propria vivit culina, ita & oculus, quæ tamen in stomacho irrurriti assumto subiecta facillimè turbatur, cum stomachus duplici calamitati manifestè subiacet, at, propriæ nempe digesti nis & sextæ, quare & duplex habet fermentum. Anum pro prima digestionem, quod ex Liene affluit, aliud proprium pro sexta, quod sibi ex insito spiritu vernaculum Exor- bitante autem fellis fermento deficiente, vel alioqui viciato per exoticam virulentiam, mox prodeunt producta illius radicibus conformia, atque hinc etiam huiusmodi Atrophia, quæ non minus à liquoris alimentari defectu procedit, causato particulari spiritus oculorum insiti errore, lalcivientis idem spontanea deturpatione, ab humanis vel A.chealibus passionibus producatæ.

Ficuum cancrisum causam rejicit in Archeum aberrantem & (et) transplantantem in furores, quibus carnem topicè infestet, dum prius à lumine quodam virulento interno irritatus, per indignationem quandam illud depellere conatur, quod tamen in lumen penetrans vitale, commutatur propter venenum occasionale in huiusmodi morbum.

Ficuum scirrhusum causam derivat ex sextæ digestionis mucilage excrementitia adherente intra harundines, id est, venas & canales, hic oculi, primùm quidem insonte, sed hospitii jus mox violante, unde oculus hospitem illum subigere non valens, eum dem expellere nititur, sed quia jam nimium est delassatus, Archei vires in auxilium convocantur, à quibus robor morbi imminuitur, quia tamen per debitam crisin nequit omnimode proscribi, hinc materia illa morbolâ vi agendi orbata efficit oppilationes & scirrhusos.

§. 9. VVissum nunc accedamus, qui Atrophiam huius causam adscribit vitii & anomaliis duorum liquorum, sanguinei videlicet & nervosi,

voli, quatenus sanguis ob varias causas remotas corruptus non nisi alimentum vitiosum suppetat, liquor autem nervosus in eo actuando assimilandoque delinquit.

*Procidencia.*

*Procidencia* illius, quæ non ab externis violentis fuit producta, causam imputat majori liquorum, imprimis laticis serosi influxui, quatenus nemum occasione allecto.

*Sirabismus.*

*Sirabismus* oriundum vult, ut reliquas spasmodum species, à particulis heterogeneis valde explosivis, pulveris nitrati æmulis, & spiritibus oculorum nervulos & musculos agitantes sese immiscentibus, eosque in hanc vel illam partem magis pelleutibus, atque ob iniquam istam combinationem, hincque contingentes irregularem materiam hujus & spirituum collisionem musculos oculorum huc magis quam illuc distorquentibus, quo fit ut spiritus in hoc lato violentius quam in illud influere consuevant.

*Ficus can-  
croso.*

*Ficium cancriformum* ex sanguine & succo nervoso propullulare censet, dum succis atrabilaris sanguis irritatur, & extra arteriolas circa glandulas oculares seu lactyinales expellitur, ibidemque colligitur & coagulatur, disponente eum in hujusmodi excrescentiam cancriformi succo nervoso, itidem acris atrabilaris particulis scatente.

*Ficus scir-  
rhosa.*

*Ficus scirrhusus* ortum trahit secundum huius Autoris nobiliss. principia ex succo nutritio multo crassius terrestribus particulis è sanguine impuro illas alimente, adque partes molles glandulares in oculis deponente, ubi ob superfluitatem à succo nervoso in talem excrescentiam formantur.

*Sylvius opi-  
nio de can-  
sa Atro-  
phia.*

§. 10. *Sylvius* uti aliis omnem, ita & hanc oculorum *Atrophiam* vel à sanguinis, vel ipsius partis vitio oriri statuit. Sanguis quidem, dum vel deficit aut propter insufficiens ejus generationem, aut effusionem qualemcumque notabilem, aut impeditum ejus influxum, arteriarumque ad ipsos oculos tendentium compressionem, vel ineptus est his partibus contabescitibus reparandis, tum propter qualitatem vitiosam post affectus & morbos graves prægressos aut adhuc præterites retentam, tum ob commixtos ei humores vitiosos, falsos nimirum, viscosos & purulentos; Partis autem vitio, dum ex infortunio quodam externo vasa imprimis alimentum deferentia dissecantur, vel alio modo rumpuntur.

*Procidencia.*

*Procidencia* causam tribuit plurimum venientiori vel conatui, vel externo illi ipsi rei violentæ, nec non copiosiori humorum influxui, musculos oculorum nimium humectando relaxantium.

*Sirabismus.*

*Sirabismus* etiam, juxta hunc Autorem, vel ad paralytin, vel ad spasmus musculorum hujus vel illius lateris oculorum referri potest.

*Ficus can-  
croso.*

In *Ficium cancriformi* acculat in eum acidum acrem in oculis à sanguine leparatum, nec à spiritibus animalibus per nervos opticos eo delatis contemperatum, unde ob redundantiam sui in talem excrescentiam dolorosam convertitur.

*Ficus scir-  
rhosa.*

*Ficus scirrhusus* gradu tantum differt à priori, eundem enim succum acidum sui causam agnoscit, nondum talem acrimoniam adeptum, quamvis & hanc male tractatus facile nasci solet.

*Carrefusio-  
num æ-*

§. 11. *Carrefusio* prementes vestigia nunc adeamus, ut quam de prænominationum affectuum

causis statuunt sententiam, paucis percipiamus. *Procidencia* *Atrophiam* oculorum induci volunt propter qualemcumque alimenti necessarij ac debite dispositi penuriam, sive illa pendeat ab ipso benigni, mitis atque ovi colliquamento persimilis illius succi defectu proprio, dum in glandulis, præsertim mefaricis, haud sufficienti copia fuit preparatus, sive ab impuris aliis particulis, iisque valde acutis, & speculis quibusdam præditis ei intermixtis minis idoneis redditus, quam partibus oculi alendis ad sociari possit; sive à viis interclusis, tubulis videlicet musculorum, quatenus isti obstruuntur à mucilagine quadam sordida, à succis prioribus transluentibus ibi relicta, & particulis illorum artius adhærente, atque fibras contiguas simul premendo, eorum interstitia angustante; tum etiam quatenus à spiritibus influentibus per nervos paucioribus non satis actuantur, ut per minimas arteriolas à sanguine separatus oculi partes ingrediantur, ibidemque assimiletur, unde potius circa extremitates illarum stagnat & cum tempore corrumpitur, quam ut pro nutritione commode distribuat. Et his quidem propioribus causis variz magis remotæ ansam præbere solent, quales sunt morbi præcedanei succum illum depauperantes, Febres causticæ, malignæ, phthisis, exulcerationes viscerum aliz, continuatæ lucubrations, nimis intentus aut acutus aspectus rerum minimarum in quibusdam artificibus, imprimis calatoribus, aurifabris & phrygionibus, &c. unde ob consumtos spiritus non modò vilis fit hebes, sed & nutritio imminuitur. Frequentius denique exercitium Venereum pinguiorem non modò succum, & quasi florem sanguinis debito largius profundens, totam sanguineam massam turbat, sed ipsius quoque spiritus depauperat & nervos conculcit. Cum enim præ reliquis spiritus visivi & oculorum partes inhabitantes admodum sint subtiles & proinde faciliè mobiles, idèò & levi de causa citius avolant in auras, quare etiam præ cæteris membris ex Venereo hoc excellit in nutritione sua partes hæ durioribus & immobilibus terminis obducit singulare sentiant damnum, deque commisso illo errore aliis intuentibus sufficiens præbent indicium.

*Procidencia.*

*Procidencia* causam unà cum aliis duplicem agnoscunt, vel externam violentam, percussionem videlicet, causam ab alto; item conatum magnum, &c. vel copiosioris feri à sanguine secreti majorem influxum, quem nonnunquam intueri licet in fœminis aut puerulis frequentius & diutius illacrymantibus, imprimis quando lymphæ nondum ita acris existit, allicient enim ex mala ista consuetudine in pusillanimitas major lymphæ copia, & debito facili ejusdem affluxus, unde glandulæ lactyinales nimium repletae oculos non tam humectant, quam planè inundant, & hinc musculorum, & interdum ipsorum quoque nervorum opticorum mollietis & relaxatio ipsum oculi prolapsum permittentes.

*Sirabismus.*

*Sirabismus* à convulsione aut paralyti hujus vel alterius lateris musculorum orti itidem statuunt, unde tubuli spirituum animalium influxui minis apti redduntur, propterea eo in latere, in quo influxus ille spirituum adhuc liber est, protior quoque viro peragitur, quam in altero, influxu isto destituito.

*Ficus can-  
croso.*

*Uti can-  
crofi.*

*Ficium cancrorum* originem ducere credunt ab impuro succo nutritio, mulcis particulis glandiatis, seu acerbis repleto, per occasionem quandam externam ad oculos influxum majorem, quam ad reliquas partes adeptum, quare spiritus animales à copia obruti eundem succum rite dispensare non valentes, cum in huiusmodi excrementum facillime permittunt, cujus particulae acutae vicinas partes indies magis magisque rodunt, corrumpunt & in sui similitudinem redigunt.

*Ficium scir-  
rhosi.*

*Ficium scirrhosum* illis oboritur, quando particulae istae acutae à crassioribus obtusiusculis, quibus succus nutritius simul scatet, adhuc detinentur & opprimuntur, quae tamen temporis tractu ab acutioribus arrodi, attentari, sicque vinei & pari modo acui possunt, ut seigniori aut inepti imprimis Chirurghi manu male tractatae, scirrhosum hunc ficum in cancrorum convertant.

*Medicinu  
nostrum de  
causa A-  
trophiae.*

§. 12. Perceptis ita sufficienter aliorum opinionibus, jam demum & nostrum de affectuum horum causis liberum dabimus iudicium. *Atrophia* igitur oculorum oritur ipsissime ob nutrimenti defectum, si corpus emacietur vel contabescat, quod singulis diebus in phthisicis & hecticis observare licet. Variis verò de causis nutrimenti hic defectus accedit, imprimis quia vel non generatur, vel depravatur, vel impeditur. 1. Non generatur hic succus nutritius ob quodcumque vitium in primis viis. 2. Depravatur ille succus, quando loco ballamitarum & oleosarum particularum acidae & acres salinae voraces vel in succo nutritio, vel in sanguine continuo circa has nobiles partes imperitum sibi rapiunt, & sic nihil vel parum in partium deperditatum locum reponitur, hinc potest non fieri, quin pars talis corporis sensum atque sensum decreseat acque consumatur. Particulae enim hae acidae & acres oculi partes oleosas seu pingues facillime absorbent. 3. Impeditur haec nutritio ob potiorum huius in partibus obstructionem factam, quae ut plurimum obstruuntur à spirituum animalium influxu denegato, si enim hi non semper partes membranosas irradiant, & humectant, necessarii alia pororum facies oboriri debet, pars enim spiritibus destituta labascere incipit; hinc affectum istum ut plurimum videre est in iis, qui à morbo iam convalescere, & adhuc laborant inopia spirituum, vel in iis, qui morbo magno detinentur & spiritus animales deficient, hique ergo *atrophia* spirituum in nervis & membranis partibus oculorum, in quibus hoc in casu pauci exstant spiritus, & si eos ponderare poteris, habebis tantum granatitunc in tali systemate, cum ordinario & in statu integritatis reperias granatim decem, semper ergo & ii, qui hoc affectu laborant, sunt imbecilles, deque visu imbecilli conqueuntur ob defectum spirituum; quare Deus non frustra oculum, nobilissimam illam partem, tot nervis & membranis partibus, tunicis scilicet instruxit, sed ut inibi plures possint inhabitare spiritus ad officium suum obeundum, scilicet ad lucem afferendam, imprimis nervus ille opticus, qui certe est via quali regia spirituum. Oritur ergo haec atrophia vel ex nutritii humoris defectu vel ab humectatione debita intermissa, vel nimia spirituum iactura.

*Procidencia oculi* à relaxatione oculi conne-

xus cum sua orbita procedit, quae à casta ut plurimum violenta proficiscitur, cum membranis suis & musculis adeo firmiter sit connexus, ut etiam vix & non nisi magno labore in mensa appositi in capite vitulino vel vervecino evelli possint. Nuper à contusione magna capitis alapa inflicta ab homine forti vidi ex sua sede prolapsum; contingit quoque ut malum hoc ab impura lue venerea originem habeat. Per conatum magnum in excretionem alvi, difficili partu, aut vociferatione oculi non nihil extrorsum vertere solent; in Consiliario etiam non ita pridem vidi ob tussim violentam cum vomitu coortam hanc prominentiam, non tamen totalem prolapsum observavi; sic quoque ipsam procidenciam annotavi in buccinatores ab inflatione vehementi tubarum: quod malum etiam aliquando fieri solet in iis, qui isthuc laborant: hinc facillè oculi sive pupilla, sive uvula tunica à propria sede commoventur ac foras protuberant, in qua procidencia plerumque cornea tunica rupta vel erosa est, vel ejus ligamenta laxata. A tumore, scirrho, inflammatione & ulcere interno hic affectus oritur, unde vascula lymphatica premuntur ita, ut per eorundem canales circulatio humorum rite peragi nequeat, sed ad novos oculares meatus à D. Nuckio detectos uberior exeritur humorum secretio, quapropter continuo ad oculum affluxu, impedito refluxu, oculus intumescit. Sic quoque in moribundis ob spirituum singularem *atrophiam* & vehementiorem impulsum, ac quasi dispositioni suae similes, lucidas scilicet sibi quaerere vias velint, ultimum ita conatum in partibus huius exercere solent. Similiter nervum opticum cum reliquis partibus tendinosis & musculosis à serosis & nimis humidis relaxari posse, quis est, qui dubitat? exemplum admirandum est in civitate huius civitatis, cujus oculus fuisset in totum à catarrho propulsus est ita, ut pupillae & omnes humores ablati, & tantum carnis portio in instar pugni prominentem aspicias, quam & feliciter excindebat Chirurgus.

*Strabismus* est distortio & ut plurimum musculorum ocularium relaxatio, vel convulsio nervorum musculis ocularibus insertorum, vel nimia musculorum ocularium relaxatio, cui saepe accedit consuetudo oculos contorquendi indebita & diutina, unde spiritus animales consuescunt insuere in musculos, hinc tale malum manet semper, quare infantibus matrum nimis blandientium aut de educatione eorum minus sollicitarum hoc solenne esse solet, quoniam ab incuria & negligentia seu incititia nutrimentum oritur, dum in decubitu infantum peccant, ponendo cunas tali positione, ut lateraliter vel lucidas fenestras, vel ardentem candellam continuo aspiciant, quo aspectu fit distortio pororum, atque hinc distorquentur muscoli, vel eorum fibrae per spiritus animales tali modo irradiantur, ut possint semper aspectus eorum contortus maneat; aliquando hunc affectum ab occurrere subito alicujus rei terrificae, vel flammæ ignis, vel fulguris accidisse observavi. Saepe tamen oritur hic affectus post convulsiones infantum, sic bis post variolas Epilepsia stipatas, & post plures insultus epilepticos hunc annotavi Strabismum.

Uti *Ficium cancrorum* plures afficit partes, ita *Ficium can-  
crofi.* etiam non parci nobilissimae parti, oculo scilicet, acido enim volatili insigniter corrosivo



circa uobilem hanc partem sibi imperium rapiente. senioribus melancholicis ut plurimum post diuturnam ophthalmiam, nec non mulieribus demenstruatis acido corrosivo abundantibus hoc malum accideri solet.

*Picus scirr-  
hosi.*

Caula *scirrhusi Ficus* est ferè eadem, nisi quod in scirrho acidum non adeò sit corrosivum. sed magis viscidum ac coagulans, & sæpè sanguine coagulato, vel succo nutritio non bene assimilato exoriri solet, faciliè tamen scirrhusus hic *Ficus* in cancrum degenerare potest, hinc tantum hi affectus differunt secundum magis & minus quoad causam.

*Perfora-  
nonu.*

*Perforationis* oculorum causam unà cum reliquis adscribimus rei externæ acutæ & puerilis, vel ex improviso oculis illapæ, vel violentiæ inimica manu plus minus altè in illos intrusæ, vel humoribus acribus.

*Prognosis  
Atrophie  
Co Proci-  
dentia*

§. 13. Et hæc de causis sufficiant, haurienda jam prælagia. *Atrophie* & *Procidencia* oculorum semper involvunt difficilem curationem, & quo causâ intensior; eo malum difficilius curatur.

*Strabismus.*

*Strabismus* in adultis vix emendabilis est, vel arti audentat, quemadmodum & ille, qui ex Epilepsiâ productus diuturnâ, ubi jam spiritus afflicti sunt influere, raro curatur. In infantibus tamen facilius curationem recipit.

*Ficus can-  
crofi.*

*Ficus cancrus* pro incurabili & deplorato relinquitur, ac tantum cura palliativa à Practicis adhiberi solet. spectans solummodo ad mitigationem symptomatum, per evacuantia & topica remedia, de quibus in curâ.

*Picus scirr-  
hosi.*

Sic *scirrhusus Ficus* faciliè ob acidum, quod haud raro nimis corrosivum ob stagnationem reddi solet, in cancrum transit.

*Perforatio-  
nis.*

*Perforatio* si vulnus dederit angustum, in solâ cornæ sublitens, nec nimis altè transiens, non ita difficulter curari potest, si verò altè penetret, ut magna subsequenta fuerit humoris aquei effusio, aut ita latum existat, ut ipsam uream attingat vel etiam lædat, parva spes restat de omnimodo consolidatione, à qua visus perfectè restituitur.

*Dieta.*

§. 14. Dietam quod attinet, in oculorum hiæ affectibus ac si calido-temperans; Viæ sit optimus, vitentur carnes & pisces minus bonæ notæ, omnia nimis salia, acrida, dulcia, acida. Omnes fructus horatii, legumina quæque, fugienda. Cerevisia junior & minus defæcata noxia. Somnus & vigiliæ sint moderatæ, alvus consueto ordini respondeat, animi affectus immoerati omnes abigendi.

*Cura  
Pharma-  
ceutica  
& Chirur-  
gica Ga-  
nierum in  
Fice tractandi rationem aperitur.*

§. 15. Hiæ præmissis ipsam nunc aggredimur curam pharmaceuticam, quæ methodo medendi & præliorum materiis absolvitur. Prodeant autem primò *Galenicis*, suam nobis affectus huius tractandi rationem aperitur. Hi in oculorum *Atrophie* curam instituunt primùm victu optimo, qui corpus maxime alere & implere bonis succis valeat, hinc vitandam præcipiunt quamcumque causam lacrymæ excitantem, uti quoque omnem tam corporis quàm animi agitationem; posthæc focus adhibent calidos & attractantes ex lacte muliebri, decocto fernigraci, malvæ aut seminis lini, cum molliori spongiâ oculis applicandos, quin frictions parant in partibus vicinis, nihilque intermitunt eorum, quæ ad sanguinem spiritusque in partes has alliciendos innoxie applicari possunt.

*Procidencia* restituere conantur amovendo in Proci-  
dentia, quascumque causas externas, instituta sanguinis missione ex cubito, vel purgatione per scammonium aut veratrum, aliisque adhibitis prædiis convenientibus, ut humores ad oculum confluentes avertantur. Et si præ nimio humore tendines & ligamenta sint relaxata, victum præcipiunt siccantem, oculosque spongiâ aquâ frigida seu rosacèa aut plantaginis imbutâ, item lanâ succidâ succo cichorii ac plantaginis, aut linteolis duplicatis, & Decocto rosarum, pillularum cupressi, acaciæ, hypocistidis, vel myrtillorum conspersis in super comprimunt, atque in pristinum ac nativum locum restitunt, ut melius ibidem contineantur, fasciâ tenuiori eos aliquamdiu deligant Cucurbitulas quoque cum magnâ flammâ cervici affixas collaudant.

*Strabismus* ex Paraly si aut nervorum disten-  
sione ortum iisdem remediis, quæ in his affectibus tanquam proficua proponunt, depellendum suadent, qualia sunt forus ex camomilla, anetho, salvia, betonica, calamentâ, hyperico, ruta, stachade, herbæ & flor. paraly. serpyll. flor. & bacc. lauri, &c. Olea tamen ut oculis noxia vitare docent. Hiæc sine fructu adhibitis, vix alia remedia quicquam prodesse videntur. In ætate tamen adhuc tenera eum curari posse concedunt, quando nuper nati infantuli ob consuetudinem intuenti lucernam noctu in aliquo ex thalami angulis collocatam, in illum incidunt, si lucerna è regione collocetur, vel persona ita ponatur, ut eam à fronte rectè inspiciant; quando verò versus nares detorquentur oculi, floccos rubro colore suffusos externo oculorum angulo agglutinant, ut ad hos fixis luminibus respiciendo, depravatus oculorum situs corrigatur.

*Ficus cancrus* curationem distinguunt in palliativam & veram seu legitimam. Palliativam præter indictam dietam convenientem perficiunt præparando primùm humorem melancholicum & adustum biliosum apozematibus aperientibus & splenicis, simul hepar calidius temperantibus. Ex. gr.

*xy. Rad. sanic.*

*cappar.*

*cichor. aa. 3ij.*

*polypod. qu. 3ij.*

*caryophyllat. 3j.*

*Herb. beton.*

*Chamad.*

*euphras.*

*scolopendr.*

*epithym.*

*ruæ. mixtar.*

*sumar. aa. iij.*

*flor. beton.*

*borag.*

*bugloss.*

*epat. nob. aa. pß.*

*Cort. iamarisc. 3ij.*

*Sem. 4. frig. maj. aa. 3ij.*

*sanic. 3ij.*

*vitæ. 3j.*

*Incisa & confusa coq. in s. q. aq. commun. F.*

*Decoctio clara, cyru 3ij. vel 3xxij. add.*

*Syr. de pom. Reg. Sapor.*

*lupul. aa. 3ij.*



# CAP. VI. DE MORB. OCULOR. IN GEN. 49

de Scolopend. Fernel. 3j.  
M.

*Bibat ager de hoc Apozemate singulis diebus 3iij.*

Temperant eundem humorem atrabilarium juleculis carnis vitulinae & pullorum gallinaceorum, alteratis foliis boraginis, buglossae, sonchi, pomis dulcibus, & ratione oculorum tanquam partis affectae, euphrasia, & summitatibus aut radice feniculi. Humorem præparatum evacuant syrupo rosato composito cum senâ, agarico & rhabarb. Electuar. diacathol. confect. Hamech, dissoluto uno aut altero in Decocto convenienti, qualia sunt ex beton. agrimon. fumar. euphras. fenic. &c. vel in decocto cortic. Helleb. nigri. in sero lactis caprini, vel etiam in Decocto de epithymo Meluz. Venesectionem quoque instituunt secundo venam brachii ad latus partis affectae, cucurbitulas scapulis & clunibus, hirudines autem modo sub aures ad jugulares venas, modo ad hæmorrhoidas ano applicant, sensim emittendo sanguinem, ne importuna phlebotomia ob hepar debilitatum nimium noceat. Topica etiam adhibent loco affecto, inter quæ Aquam suam stillatitiam contra cancerum non immerito magni æstimavit Hildanus, cujus descriptio hæc est:

*Rad. Scrophular. maj.*

*Herb. Geran. Robert. aa. Mij.*

*Arnogloss. maj.*

*Solan.*

*Bugloss. sylvestr.*

*Herb. Borag.*

*Portulac.*

*Euphras.*

*Beton. aa. Mj.*

*Ranar. aquat. &*

*Album. ovor. diu agitat. aa. No. xij.*

*Sem. Cydon. &*

*fenic. græcæ aliquantulum conquassat. aa. 3j.*

*His seminibus off. and. q. rosar. & euphr. ss. aa. tñj.*

*Incidantur omnia & conquassentur, & destillenturque in alembico plumbeo.*

*Gossypio aquâ hac imbuto oculus seu pars affecta aliquoties abluatur.*

Ad interceptiendum humorum affluxum fronti admovent defensivum ex farin. hord. pulv. ros. rubr. myrtill. balauit. nuc. cupress. flor. beton. acac. cum oleo rosac. cerâ & aceto in unguentum redactis. Legitimam curationem non medicamentis, sed ferro potius peragendam suadet idem Hildanus, ut simul & semel extirpetur, quidquid viciosum est. Pharmaca enim parum judicat proficua, quia eadem vel resolventia erunt, vel erodentia. Resolventibus tumor hic durissimus non auferatur, sed verendum potius, ne ex iisdem summiâ contrahat malignitatem. Erodentia autem valde sunt periculosa, cum ratione duritiei tumoris non mediocriter, sed valida esse deberent, quæ tamen, cum ad nervum opticum illis penetrandum sit, ob viciniam cerebri, membranis ejusdem facile causarent inflammationem, quare ab iisdem est abstinendum.

*Scirrhusum Ficum* penè eodem modo curandum tractant, quo priorem, purgato enim ægro, remediis in priori affectu prænomatis, venam

secant cephalicam in brachio lateris affecti, optimaque instituta victus ratione forcipe oculari palpebram, cui scirrhus ille magis adhæret, attrahunt & invertunt, tum cunctello separatorio tumorem auferunt; hoc peracto, albumen ovi aqua rosacea mistum imponunt, tandem collyriis anodynis ex mucilag. sem. cidon. & plantag. aq. rosac. extract. lacte muliebri, additis camphora & croco, nec non exsiccanribus ex aq. plantag. & rosar. cum tutia pp. C.C. p. & celsi. lota oculum ad sanitatem perducunt.

*Perforationem* oculi curant imponendo ei albumen ovi cum aquâ rosacâ & nonnihil croci, fronti verò ad humorum influxum interceptiendum defensivum ex bolo armeno, terra sigillata cum oleo rosac. & pauca cera & aceto in formam unguenti redactum. Ut alvus maneat aperta, injiciunt enema, & postera die exhibent catharticum. Hinc anodynus tractant ad aliquot spatium dierum, & tandem cicatricem inducunt collyrio ex aq. euphras. saccharo & tut. ppt. ita sanari dicunt, etiam visu post aliquod tempus redeunte.

*§. 16. Paracelsistarum cura Atrophie* in eo consistit, ut affluxus mumiæ naturalis omni studio promoveatur, aperiendo omnes poros, & adiuvando omnia obstacula eodem oculudentia, deinde restituendo succum vindem vegetantem, quod præstari possentur quinta essentia 3ii & Qi, quæ ut totum corpus, ita & membrum ejus hoc nobilissimum acuumt, & mirum in modum renovant.

*Prolapsum* oculum dentis prius causis & impedimentis quibuscumque, in debitum locum, live orbitam suam reponunt, & ut repositis ibidem maneat & obfirmetur, inspergunt ei pulverem subtilissimum ex mumia, olibis dactylorum combustis & tutia ppt. & c.

*Strabismus* si à convulsione vel paralyti ortum habeat, ejus remedia ex Medicâ nostrâ Encyclopædia, titulo de convulsione vel paralyti, secundum *Paracelsistarum* sententiam hic repeti possunt; qui verò ex mala consuetudine obvenit, eum simili modo per larvam, ut reliqui Autores, corrigendum iudant.

In *Ficu cancroso*, ut ulterior humoris nutritivi à sanguine separati prohibeatur affluxus, & corrosivitas salis plumosi vel arsenicalis beheatur & corrigatur, laudat *Paracelsus* Lithargyrium modo sequenti præparatum. *ss. Lithargyr. triti tñss. aquæ salis, Ois aa. tñj. + albi tñ iij.* reduc super carbones usque in consumptionem aquarum istarum; Cujus Lithargyrii cum aq. fontis aa. reduc ad calorem per P & exsicca. De hoc minutissimè pulverisatissimo oculis cancris aliquid inspergi potest, vel alis addi collyriis oculis commodè applicandis.

In *Ficu scirrhuso* curam omnem ad resolutionem tartari istius, vel salis coagulati dirigunt, optimè eam obtineri persuasi pulverisatissimo oculis vitæ & tincturam alcahest, externè verò non adeò multa oculis applicari aut immitti vult *Paracelsus*, suum tamen farinæ fabarum in aceto humectatæ, ut in aliis tumoribus oculorum, ita & in hoc affectu permittit.

*§. 17. Helmontii* juxta sententiam *Atrophie* oculorum curatio obtinebitur, si fermenta lenare & sellis modo depito restituantur, corrigentur & resiciuntur, nec non spiritus oculorum insiti

*In Perforatione.*

*Paracelsistarum modus curandi Atrophiam.*

*Prolapsum.*

*Strabismus.*

*Ficu cancrosum.*

*Nervus scirrhus.*

*Cura Helmontiana Atrophie.*

institi ita detinebuntur, ut ab Archealibus passionibus minimè deturpantur, hisce rectè ratione & remediis conformibus frenum injiciendo. In describendis autem & aperiendis hujusmodi & talis virtutis medicaminibus, plus debito parvus & planè mutus est, tanquam in perpetuum permansura sint arcana, ne sui communicatione vilescerent.

*Ficus can-*  
*aresc.*

*Ficus canerossi* curatio peragitur reducendo Artheum suuissimum in debitam viam, qua exorbitaverat, insinuat corrigendo & abigendo venenum illud irritativum occasionale, à quo remanente aliàs Archeo non permittitur esse tranquillo & quieto. Huic autem negotio præ reliquis conferunt cancri fluviatiles, cum ranis & metallo Saturno dicato, quæ triplicatà & fortissimà ligà Archeo furioso multum facillime laboris, inque opere cepto insigniter impediunt.

*Ficus scir-*  
*rhus.*

*Ficus scirrhosus* ut tollatur, opus est resolutione mucilaginis excrementitiæ, à digestionis sextà relictæ, in illa canalibus oculi nimis arctè adhaerens, ab accurrentibus Archeis itati & in auxilium vocati manipulis, in ejusmodi duram & remitentem excrementam adigatur, & tanquam in Marsepam cautem convertatur. Hoc præstari posse non dubitat Autor hic nobiliss. à lixiviosis sive alcalibus tam internis, quam externis, utpote non parva potentia resolutivà à Naturà dotatis.

*Willisii*  
*methodus*  
*medendi*  
*Atrophie.*

§. 18. *Willisii* affectus hosce tractandi ratio modò venit consideranda, cujus intentio curatoria in *Atrophia* istà eò potissimum vergit, ut primò succus nutritius debitè ex copia elaboretur, quò pars quoque hæc corporis nobilissima illius affluxuatque irrigatione necessaria gaudere possit; deinde liquor nervosus, seu spiritus animales ad officium suum excitentur, quod præstare tenentur in succi istius nutritii commoda distributione, & in partibus aridis ad insulationem. Prius obtinere satagimus succurrendo chylo, ne ille primarum culpa viarum pervertatur, sed potius laudabilis ac copia sufficienti sanguini inferatur, tum sanguinem corrigendo & depurando, ne ejus vitio chylus in ipsius massa corrumpatur, sed citè potius rectèque in sanguinem & succum nutritium commutetur. Huic scopo Decocta parat, Aquasque destillatas. sanguinem restaurantia ac purificantia. Sint paradigmata quædam:

*Rad. fœnic. 3ß.*

*Imperat. 3iijß.*

*Levistic. 3iijß.*

*Rafin. Ebor. 3iij.*

*Herb. beton.*

*rus.*

*hepatic. aa. Mj.*

*Flor. salic.*

*borag.*

*bugloss. aa. pj.*

*passular. 3j.*

*Coq. in Aq. font. 3iij. ad tert.*

*In colatura clarè dissolv. Q. S. Qi. puriss. 3j.*

*add. Syr. de pomis 3j. Sumantur 3iij. bis vel ter in die.*

*Rad. Chærefol. rec. 3j.*

*Herb. fen. fol. potentill.*

*enphraf.*

*sumant. aa. Mj.*

*Flor. anth. 3j.*

*Cand. 3ß. 3iij. No. xv.*

*Limac. mundat. No. xii.*

*Cori. Aurant. 3vj.*

*Concis. & contris. effund. lat. recent. 3iij.*

*Succi fœnic. ex herb. rec. 3iij.*

*borag. 3j.*

*Destillantur per Alembicum.*

*Ager de hoc Destillato assumat in idem 3iij. vel 3iij. mane à meridie & vespere.*

Spiritus animales ut ad officium redeant, siuecunque nutritium debitè excipiant, & partibus oculorum alendis rectè adsimilent, excitantur à variis spiritibus & volatilibus, sale videl. volatili sanguinis humani, floribus salis ammoniaci, Spir. C. C. lil. convallium, Essentia rorismar. Valerian. Ambræ, Tinctura succini, &c. Capiatis exemplar:

*Ag. fl. lil. convall. 3iijß.*

*Rorismar. 3ß.*

*Essent. valerian. 3iijß.*

*Spir. C. C. cinamomif. 3ß.*

*3 volat. succin. gr. vj.*

*Syr. de Pæon. 3vj.*

*M. Dos. Cochlear. j. vel ij. aliquoties in die, in primis tempore matutino.*

*Rad. Tinsl. flor. Tunic. 3iijß.*

*cinam. 3j.*

*Essent. Ambr. 3ß.*

*M. Dos. gr. 20. vel. 30. in vino generoso.*

*Procedentiam oculorum à causis externis violentis productam eadem ratione, qua reliqui* *Procedentiam* *Autores* curandam permittit, debita videl. repositione, & impolitis externis vulnerariis & adstringentibus, vel formâ pulverum inspergendorum, vel sacculorum applicandorum, vel aliorum colleriorum; quæ verò nimio humorum, imprimis laticis serosi influxui natales suos debet, ejus cura instituitur evacuantibus & exsiccantibus tum internis, tum externis, catharticis maxime, & diaphoreticis. Inter cathartica sequentes pilulæ conveniunt:

*Rad. Extrakt. Diacaribam. 3j.*

*Resin. Gialapp. gr. vj.*

*Salu Qi. gr. iij.*

*M. cum s. q. Tinsl. Qi. F. Pilulæ vj. pro una dosi.*

Inter diaphoretica laudantur Decocta lignorum, Gum diaphoret Sal Card. benedict. rorismar. &c. Esto formula:

*Rad. bardan.*

*Saraparigl. aa. 3ß.*

*Rafin. lign. Junip. 3vj.*

*Sassafr. 3ß.*

*fol. Card. bened.*

*rorismar. aa. Mß.*

*Coq. in s. q. Aq. simpl.*

*Colatur. 3iij. add.*

*Julep. Sambuc. 3j.*

*D. una, vice & corporis disponatur ad sudorem.*

*Externè vesicatoria nucha & brachii appli-*

*cat.*

In *Strabismo* ut inordinatus idemque violentus Spirituum animalium corrigatur motus, illicque non ad unam tantummodo, sed quamlibet oculorum partem faciliè & æqualiter influere de-

nue

mo adfueſcent, varia adhibet antipſmodica, ſpiritus à copulâ illâ exploſiva eos huc magis quam illuc rapti quodam ſubitaneo & fulminari impellente liberantia, tubulosque muſculorum affecto lateri oſverſos ſufficienter dilatantia, qualia ſunt Spir. & Sal volat. C.C. caſtoſeata, ſuccinata. Externè quoque, præprimis ſi mala accedat conſuetudo, infans per varia in medium prolata objecta luminofa ita diſponatur, ut ad omnelatus oculos movere & flectere conetur, cui voto & cortices nucum, vel larvæ quædam aliorum latero eo, quo intuitus alias eſt diſſicilis, perforatæ oculis apponuntur, ut ad lumen diei, vel candelæ cujuſdam per foramen illud attendat.

*Ficni can-  
croſi.*

In *Ficni cancroſo*, ne nihil agere videatur, curam eo dirigat, ut ſanguis à particulis illis acerbis acerbis purificetur, inſimul ſuccus nervoſus ab iſdem liberetur, quod præſtari non dubitat ſequenti vel ſimili Decocto purgante:

℞. Rad. Oxylapath.

polypod. qu. aa. ʒß.

Helleb. nigr. ʒiij.

Sem. Caribam. ʒij.

Herb. rut. murar.

ſumar.

beton.

veron. aa. Mß.

Santal. alb.

citrin. aa. ʒiß.

Sulph. alb. ʒiij.

Sem. ſævic. ʒj.

Coq. in aq. font. lbij. ad mediet. add. vin.

Rhen. lbj.

Colatura tepida impon. ſol. ſen. ſelect. ʒß.

Cori. aurant. ʒij.

Fiat Infuſio per noctem.

Colaturæ hinc ſervetur ad uſum, exjus doſi ʒvj. quibus pro edulcoratione addi & immiſceri poſſunt Syr. de ſumar. compoſ. vel de Euphym. ʒij. Affu-  
matior his veltet ad ſummum in hebdomade.

Topica ſunt ſaccharum Saturni, & Balaſmus lithargyri.

Ad reſolvendum *Ficnem ſcirrhofum*, quod in principio fieri debet, ne ullum capiat incrementum, topica uſurpat ex gumini, imprimis Ammoniaci, ut reliqui Autores.

§. 19. Sed *Sylvis* & *ſylva* nunc eamus collectum, quæ pro morbiſiſce abigendis aut leviuſ ſerendis alicuius erunt emolumentum, nobisque impetrare & erueri licet. In *Atrophia* hac oculorum, ut in ipſa univerſali, tria ille proponit maxime obſervanda axiomata curatoria. 1. Sanguinis defectus eſt reparandus. 2. Eiuſdem vitium qualecumque corrigendum. 3. Partium alendarum noxa, per infortunium facta reparanda. Primum obicitur uſurpando alimenta optima, quantitate moderatâ; deinde amovendo emendandove ſingulas defectus iſtiuſ cauſas. Secundum fit vel amovendo à ſanguine humores vicioſos ſingulos ipſi admiſſos per evacuantia commoda, vel adhibendo corrigentia tum univerſalia, tum unienicia ejus vitio maxime apta. Tertium ipſam requirit manum Chirurgi.

In *Procidencia* curandâ nihil à reliquis Auto-ribus ſtatuit peculiare, uti & in *Sirabiſmo*, cujuſ emendatio pro diverſitate cauſarum variè erit inſtituenda, atque una cum materiâ medicâ ex *Encyclopædiâ* noſtra *Medicâ*, vel capite de Paralyſi vel de Convulſione repetenda.

In *Ficni cancroſo* ſi non planè depellendo, ta-  
men leniendo, laudat alcalica fixa vel fixantia, acidumque illud acre concentrantia & corrigentia, ut ſunt: Creta, ſanguis draconis, Tutia, Lithargyrium, ſaccharum Hy, Oculi ʒ, Coral-  
lia, Margarithæ, &c.

Ad *Ficnem ſcirrhofum* diſcutiendum itidem laudat gummi, Bdellium, Galbanum, Ammoniacum, nec non thus, myrrham, &c. Emplaſtri formâ applicata.

§. 20. Jam ſores *Cartefianorum* pulſandæ nobis reſtant, ut eorum quoque conſiliis, pro conſuetiſſis liberalitate ditemur. Sudent verò hi, in ipſa Oculorum *Atrophia*, ut omne locetur ſtudio in reparando ſucco nutritio piro & futuræ alimonie commodo, tum promovendo ejus præparationem in glandulis, præſertim meſaricis, quò ſufficienti copia laudabilis chyli Cyſternam vel Receptaculum illud chylo dictum inſuat, atque ex eodem maſſæ ſanguineæ communicetur; tum depurando illum à recrementis & impuritatibus quibuſcumque à ſanguine infecto ſibi admiſtus, omnemque admiſſionem aliâ irritam reddentibus; Deinde aperiendo meatuſ ſeu tubulos illos muſculorum, quò abſque ullo obſtaculo ad partes oculi alendas permeet; poſtremò, ſi ſpiritus animales deficient, ſaut craſſiores exiſtant, quam ut nutritium ſuccum actuare & partibus apponere nati ſunt, illos etiam ipſos repaunt & ſubtiliores reddunt. Chyli præparatio prærequirit debitam ciborum in ventriculo digeſtionem, quare ſtomachus confortandus, & ſeramentum ejus excitandum aut itâ corrigendum, ut ſuccus ex digeſtis cibis inteſtinum ingrediens, inibi facile in chylum abeat, quare Digeffiva & Aromatica in uſum ducenda ſunt, ex cryſtallis ʒi, Ebore ſi. ʒi. Triad. ari. liquor terræ ſol ʒi, Eſſent. Zedoar. rutæ, meliſſæ, Elixir Menthe, Tinctura baccar. Junip. cum cardamom. mac. & cochoill. ſpirit. vin. ʒſat. extracta, &c. Ne peregrinas & noxias, acutas videl. & acres particulas in ſanguine aſſumat, ſanguis ab iſdem depurandus per alcalica, humores iſtos acres imbibentia, & diaphoretica varia, medicamenta ex lignis. Tubuli muſculorum reſerandi, dilatandi & ſpirituum animalium in eodem influxuſ promovendus per ſpirituofa & volatilia, v. gr. ſpiritu Euphrat. Eſſent. Ambr. Meliſſi. Elixirium illumina-  
nans, Liq. C. ſuccinat. Venus immoderata interdicens, & noxa ab ei inducâ corrigenda, quare fibræ nimium exſiccate, durisſe circumſcriptæ terminis emolliendæ, inſtillatâ partibus illis oculi ex conſumtione excavatis guttâ unâ vel alterâ lactis calidiſculi, inprimis humani recens ex ubere, ægro ſupino in lecto jacenti, ut itâ per diuturniorem moram partes ſufficienter emolliat, cui remedio ſubſtitui po-  
teſt Aqua Ophthalmica de cancriſ. Lucubrationes & acutus rerum intuitus moderanda, & aſſumenda ſuperiora ſpiritus augentia & recreantia.

*Procidencia* à cauſa externa violenta inducâ *Procidencia*

curationem obeunt, oculum prolapium intra orbitam ſuam commode intrudendo, quod manu aptiſque inſtrumentis, aut linteo tenero peragitur, oculum intumefactum & partes vicinas prius emolliendo ſacculis flor. Camomill. Melilot. Roſar. Herb. Euphrag. ſem. ſenigr. fœnic. &c. repletis, & aqua roſar. incoctis repoſituo inſpergunt vel pulveres vel applicant

Collyria adstringentia ex alcali C. C. Tut. pp. amydo, acac. oilano, &c. Laudantur Trochisci Ophthalmici *Mynsichti*; Aq. plantag. rosar. pecul. ear. verben. flor. Ligustri polygani. Ager autem supinus decumbat, usque quo oculus sicciter adhareat. A nimio lymphæ aut feri influxu citatam auferunt medicamentis siccitatibus vel educitibus catharticis, vel absumentibus, diaphoreticis nim. antel dictis, applicatis nuchæ, scapulis aut brachiis etiam vesicatoriis, topica adhibent exsiccantia, nec continentur sumum tabaci oculis nimium humidis modicè insufflatum, inprimis quando species convenientes eidem immixtæ sunt, ex rosis videlicet Cortic. myrobol. Nucistâ, sem. fœnic. Gum. Junip. animæ, masticis, luccini: cum de succellu optato non pauca habeant experientia.

*Strabismus.*

*Strabismus* difficilissimè ac penè nullius existimant curationis, si altiores temporis tractu fixerit radices, pro diversitate tamen causarum remedia variant, modò antyparalytica, modò antipalmodica adhibentes; quæ verò in infantibus ab aliis per larvam tentatur instatim convenientem reductio, & illi, ne præ aliis videantur otiosiores, placidè permittunt.

*Ficula cancerosa.*

*Ficula cancerosa* prudenter & sollicitè tractandum esse jubent, ne incantè tractatus, exulcerationi subijciatur, omnem postea rejicienti medelam, quin morti ipsam præbenti, quare principio ejus etiamnum occurrendum, interne adhibitis sanguinem & cum illo succum nutritium purificantibus, aut succos vitiosos plantæ eliminantibus per Extractum helleb. nigri, Trochiscos alhandali, Lapidem Lazuli pp. &c. Pilulas melanagogas *Mynsichti*. Sanguis optimè purificatur diaphoreticis, in specie Sale fuliginis, & Mixtura de fumaria *Ang. Sal. Bezoard. Qari*. Externe illa adhibentur, quæ excrecentiæ huic ulterius impediunt incrementum, & particulas acutas gladiolas obtundunt, hebetant, & ne ad vicinam serpent decinent, ut sunt Crystalli ʒiis, saccharum ʒi, cinis testar. ʒss. Liqueor mellis ad ʒio abstractus.

*Picus scirrhus.*

Dum verò adhuc est *Scirrhus* atque indolens, resolutionem & discussionem duri crassique illius succi instituunt adhibitis topicis gummosis, ex Ammoniaci videl. paratis, & Galbano cocto, ita tamen, ut circumspicte cum eo agatur, ne imprudenter immisitis nimium emollientibus suppuratio promoveatur, quam ipse Cancer excipit, nulla postmodum arte domabilis.

*Iuxta Auctorem Cuius Atrophie.*

§. 21. Nos in curatione horum affectuum tali ordine progredimur. *Atrophie* oculi si oriatur ab aliis morbis, eò incumbendum, ut illi prius curentur, si verò à succi proprii acidis & acerbis particulis oculi partes devorantibus, tunc præmittantur varia sudorifera ex lignis, posthæc demulcentia & balsamicum succum restituentia, inter quæ eminent omnia salia balsamica volatilia, balsamus meus nervinus per mensem & ultra ad gutt. 20. in ʒi euphras. meliss. &c. allunxus. Huc pertinent liq. C. C. succinatus, &c. item Sal volat. C. C. usus per tempus continuatur. Interponenda quoque sunt varia absorbentia, inter quæ palmam habent Cinnabarina cum oculis ʒss sæpius per septimanam exhibenda Gum diaphoret. & Bezoart. mineral. ad sudorem excitandum non sunt contemnenda. Topica sunt blandè demulcentia, ut mucilag. ex

sem. cydon. cum ʒi fœnic. euphras. addito momento Aq. Regin. Hungar. quæ sæpe sola sufficit oculis imposita ad spiritus iterum allicandos, & obstructionem tollendam, præsertim ubi spirituum inopia percipitur. Aquam *Lan-gii* ita impositam hoc in affectu præstantem observavi. Ad acres etiam has particulas repellendas & quasi retrahendas, conducunt varia vesicatoria nuchæ vel auribus applicata.

In *Procidencia* Oculi Curatio instituitur cum causarum suarum ablatione. Si ergo evenit à causa violenta, varia sunt imponenda demulcentia & inflammationem impediencia: sacculi proinde ejusmodi herbis, ex. gr. veron. euphras. pentaphyll. fl. balauft. chamomill. melilot. &c. repleti, & lacte incocti parentur, & imponantur loco affecto, manu verò in locum debitum reponatur oculus; vel asser quercinus applicetur sæpe oculo per diem si affectus fuerit inveteratus: Si verò affectus est recens, statim ad inflammationem arcendam imponatur seq. cataplasma,

*ʒi. Mice panis ab. ʒss.**Lact. dulc. q. f.**Coq. ad consst. pulv. dein**add. vitell. ov. No. 2.**Ol. rosar. ʒi.**Pulv. croci ʒss.**Cataplasm.*

Infundatur oculo lac muliebre, vel applicetur seq. linimentum.

*ʒi. Mucilag. sem. cydon.**P. f. h.**Aq. plant. extract. q. f.**Ung. Rosar. ʒss.**M.*

*Hartmannus* commendat pulverem scarabæorum in stercore equino natorum, ad solem in vitro clauso excicatorum mollificatis partibus inspersum. Partibus relaxatis inspergatur pulvis terræ Japonicæ, & linteo calido fiat dextra repositio & applicentur in occipitio vesicativa. Si verò *Procidencia* oculi fiat ab humoribus serosis, ligamenta oculorum ita relaxantibus, tunc conveniunt serum eductoria, & purgetur corpus radice laxativa.

*ʒi. Rad. laxativ. ʒi.**Sali euphras. ʒss.**Ol. fœnic. gt. j.**M. D.*

Joseph Burch. Epist. ad Thom. Barth. Oculi prominentiam collyrio quodam adstringente, emplastroque densensivo Vigonis collo applicito, se sustulisse scribit. Confer D. Scalpart. Obs. rar. lect. poster. Obs. 9.

Postmodum dentur sudorifera: hoc in casu proderit Decoctum lignorum per tempus aliquod in dosi convenienti usurpatum, quæ simul adstringunt.

Inter topica conveniet Aqua plantag. cum saccharo ʒi & lapide scissili Angli. Terra Japon. sæpius applicanda, aliaque modicè adstringentia.

Varia Vesicatoria applicantur: sequens sæpius applicimus nuchæ cum effectu:

*ʒi. Sem. Cannab. Mss.**Rad. pyrethr. ʒi.*

*Coq. cum vino rub. & f. instar emulsionis. Lintea madefacta hoc liquore imponuntur nuchæ, ad Procidentiam plures auctores commendant cucurbitulam magnam sine scarificatione posteriori*



# CAP. VI. DE MORB. OCULOR. IN GEN. 53

riori capitis parti applicitam. Sic omnia ea hic conducunt quæ in aliarum partium Procidentiis.

*Strabismi.*

*Strabismus* jam confirmatus & in adultis nullam, ceu diximus, admittit curationem. In *convulsis* raro curatur. Si proinde affectus hic fuerit obortus post epilepsiam convulsionisque, tunc omnia conveniunt antispasmodica, internè pulv. spasm. & illinantur muscoli Balsamo Spasmod. *Mysf.*  $\nabla$  Regin. Hungar. *Lang.* Li-quere nervino meo externo, axungia viperinà, Essentià viperinà, &c. imprimis sequenti:

$\mathfrak{R}$ .  $\Delta$  *Fœnic.*

*Euphras.*

*Regin. Hungar.* aa.  $\mathfrak{z}$ j.

$\sim$  *His*  $\times$  ci gr. iv.

*Camph.* gr. j. *F. Collyr.*

*Quo tangendi sunt oculi, & portio ipsius infundenda.*

Dentur & hæc aliaque internè, & eodem modo cures hunc affectum uti Spasium vel Epilepsiam. In infantibus aliquando ex objecto splendente in loco Strabismo opposito collocato curatur hic affectus, aut ex larva, in quâ foramina visioni contraria respondentia, facili impo-sita, qua aliquot curatos vidimus; nec negligenda superius dicta antispasmodica tum externa, tum interna.

*Ficus can-crofi.*

*Ficus Cancerosa* raro, vel, ceu dixi, nunquam curatur, & si quid tentandum, semper Medicus se munit prognostico, ne famam imprudenter plebi exponat; melius enim est, eum non attin-gere, quam attingendo irritare, si autem tangi debet, palliative tantum tractetur: vel periti Chirurgi manus commendetur, feliciter enim excisa fuisse ejusmodi Carcinomata legimus *Obsf.* 1. *Guilhelm. Fabric. H. Idan. & Obsf.* 18. *Henrici Rhonhsen.* Ad acidum ergo cancerosum, cor-rosum scilicet, omnia Saturnina conducunt sæpe cum cinnabarinis permixta, cinnabaris enim f. un. resolvit, & acidos arsenicales hu-mores absorbet, nervosque solatur. Sequens applicetur sæpius.

$\mathfrak{R}$ . *Plumb.* ust  $\mathfrak{z}$ j.

*Cinnab.*  $\mathfrak{z}$ ii  $\mathfrak{z}$ ss.

*Croci*  $\mathfrak{z}$ ss.

*Cum oleo ros. q. s. in mortario plumbeo F. Lini-mentum.*

Imponatur etiam amalgama  $\mathfrak{z}$ ii cum  $\mathfrak{H}$ o.

Exulceratum Carcinoma ut planè non tan-gatur, author sum.

*Ficus scir-rhosa.*

Et cum *Scirrhosis Ficus* facile exulceretur, cautè incedendum est, communis enim in scir-rhis & scrophulis affectio est, ut si nigrescant, vel livescant, vel sint dolorosa, degenerent in cancerum exulceratum, acidum enim istud vola-tile corrosivum obscurè mordicat fibrillas quas-dam nervas & partes vicinas, unde dolor ille punctorius. Acidum ergo in hisce tumoribus scirrhosis temperandum, & durities emollien-da. Faciunt huc resolutiva discutientis matu-rata. Inter hæc eminent Emplastr. ex Gummi- $\times$ co, de cicuta, de ran. *Vigon.* cum  $\mathfrak{z}$ o. Sed ob partem mobilem non bene imponi possunt, hinc variis liquoribus illine-da sunt hæc partes, ex. gr. Aq. Flungar. Spiritu viperar. maritata, Spir. vin. *Camph.*

In *perforatione Oculi tunicæ, sive Annatæ, sive Cornæ, sive Uvæ* absq. humoris aquei affusio-ne curari solet per vulneraria, ex quibus præ aliis magnificimus succum charesolii rectenter ex-

pressum, velaquam ejusdem, vel Veronicæ ritè destillatam & applicatam; in herbis enim his traumaticis latet alcalinum principium; possunt & Decocta fieri ex agrimon. alchymill. chare-sol. fanicula hyperic. rad. plantag. primul. ver. flor. balauft. & sic calidè oculis latus foveri.

Saturnina omnia, ut Lac  $\mathfrak{D}$ æ, lapis calami-naris, pompholyx, Tutia, ut & bol. Armen. Gum diaphoret. profunt, ex quibus varia parari possunt Collyria & sæpius tepidè applicari.

Quemadmodum etiam certum est & con-stans siquæque asserunt, Traumatica pro in-terno usu ad externam curationem plurimum prodesse, ità & in hoc casu eadem non sunt omittenda, qua de re non parùm laudatur Tin-ctura Terr. Japon. Sæpe quoque sufficiunt oculi  $\mathfrak{z}$ , vel soli cum succellinà me usurpati. Addi etiam Traumaticis hisce possunt specifica oculis dicata & adscripta, ex gr. paretur Tinctura Terr. Japon. cum spiritu euphras. & detur. Non raro & hic conducunt omnes potiones vulnerariæ communiter dictæ, quæ tamen non ita largiet sunt exhibendæ, sed tantum cochleatum, sic enim liquores sanguinem & serum ad id aptant, ut & ipsi partis clima non destituant, aliàs com-muni vita privandum; insuper resistunt putre-dini, sanguineum & serum ichorelens corri-gunt, motum luccorum in parte læsa conser-vant, simulque pororum laxitatem debetè coar-ctant, de quibus vide de *Vulneribus in genere librum* 5. cap. 19.

In ea Perforatione verò, ubi jam aquei hu-moris effluxus fuerit factus, sunt Neotericeorum quidam, qui aqueum hunc humorem restituere satagunt. Humor enim hic aqueus five ante-rior, pupillæ motui & radiorum temperationi maxime inservit, hinc ex humoris hujus defectu in senibus visionis munus, ceu superius dictum, non ritè peragitur.

Humor ergo aqueus, utpote à lymphâ pro-genitus, facilius, (Tunicæ cornæ vulnere ad-tingentium ope priùs obstructo; ad inflamma-tionem arcendam sequens vel simile applicari potest aq. plantag. cum holo album, ovi, & grani aliquot Camphoræ: optimum verò reme-dium est, si oculus vulneratus optime operiatur, & ab aëre defendatur, si enim non tantum citius generabitur cicatrix, verum humores restituen-tur: ) Succu nutritii particularum & lymphæ blandioris copiosius influentis beneficio resti-tuitur, prout centies in anserè aliisque animalibus tentavi, instricto enim vulnere, & elapso hu-more aqueo, altero vel tertio à vulnere die ocu-lus collapsus pristinam recuperavit formam, unà cum vilu. Inutilia, sunt ergo ab authoribus im-primis à *Burrho* commendata arcana, & alia quæ de ulmi & chelidonii viribus prædicantur, & tantum impostura est, ut quilibet mecum ex-periri potest, de quibus inferius, ubi de humo-ribus restituendis agemus, plura videre poteris, in quem finem metetur legi *Obsf.* 126. *Eph. Germ. A. 6. & 7.* Sic reperias apud *Benivennum de abd. morb.* c. 73. historiam de puella 4. annorum, cui dum nodum in panno solvere acuto gladio nite-retur, resiliens mucro oculum dextrum percus-sit, quo perforato ipsius oculi tunice humor effluxit; quare etiam visum prorsus amisit. ipsum tamen haud multo post recepit, restituito scilicet humore effuso, *Gonfer Fallop. de vuln. cap.*

$\mathfrak{z}$ . *Tulp.* 1. 1. c. 30.

G 3

CAPUT

## CAPUT VII.

*De Morbis Palpebrarum, Trachomate, Emphysemate, & Oedemate, Coalitu, Cancro, & Ectropio seu Inversione & Lagophthalmos, de Hydatide, Callo & Calculo.*

## §. I.

**S**I quis alius, *Celsus* certe Romanorum ille Nobilissimus, admodum pulchre de Oculo fermocinans *lib. 6. cap. 6. p. m. 368.* Ingentibus & variis, ait, calibus oculi nostri patent; qui cum magnam partem ad vitam simul & usum & dulcedinem conferant, summa cura tuendi sunt. Nemo autem melius illis prospexit, aut prospicere potuit unquam, quam Ipse Sapientissimus nostri Opifex, utrumque duobus munientis velamentis, *Palpebris* videlicet, ut tum aliis, tum in somno potissimum, illis sese conjungentibus, gemmarum adinstar pretiosissimarum sub iis tegantur, & custodiantur à quovis cæteroque imminenti periculo. Proinde ut eadem ipsæ suo hoc rite fungantur officio, opus est, ut à morbis serventur immunes, aut impetiti protinus liberentur, hinc eodem nunc merito tractandos atque depellendos aggredimur.

**Trachoma** *Trachoma* vocatur iste affectus, ubi Palpebræ in parte internâ asperitudo adest, vocatur & *Dysymma*; Describi potest, quod sit asperitas palpebrarum seminum milii aut granorum crvi instar cum dolore & gravitate. Dividitur etiam in tres alias species, quas ob confusionem metuendam haud libet addere.

**Emphysema.** *Emphysema* Palpebrarum, dicitur & *Physoides*, & est earundem tumor & inflammatio ex flatuoli spiritus copia ibidem sub cuticulâ palpebrarum collecta, & subsistens: sit & à rebus acerbis, ictu araneæ, vespæ, apis, vel erucæ.

**Oedema.** In Palpebrarum externâ sede intumescencia quædam oedemati diffuso haud dissimilis aliquando oritur, per quam palpebræ inflatæ & tumidæ apparent, nonnunquam & circumferentia quæ eas ambit simul, tum in oculorum morbis, tum extra hos, quæ diu sæpe permanet, aliàs innox remittit, hanc *Oedema oculorum* nonnulli nominant, rectius tamen *Intumescencia* diceretur.

**Coalitio.** *Coalitio* Palpebrarum dicitur & *Connexio*, Græcis *Anelglobeopharon*, & quia sit semper nocturno, hinc *nocturna* dicitur *Cohærentia*, item *Palpebrarum sclus*, cum scilicet Palpebræ vel inter se, vel cum aliis oculi partibus per somnum coalescant, ut vix aperiri queant.

De Palpebræ superioris cum Oculo coalitu vide *Hist. Cent. 6. Obs. 7.*

**Cancer.** *Cancer* etiam aliquando occupat Palpebras, isque vel exulceratus, vel non, qui cum nihil vel parum admodum habeat peculiare præ aliarum partium cancro, videas de *Cancro in genere lib. 5. cap. 8.*

**Ectropion.** *Ectropion* dicitur Inversio Palpebræ inferioristalis, ut nihil præter carnem rubram videas, estque caro luxurians suborta in palpebrâ, quæ suâ gravitate palpebram foras evertit, à cicatrice ut plurimum producta.

**Lagophthalmos.** *Lagophthalmos* est inversio palpebræ supe-

rioris, vocatur *Leporinus Oculus*, cum superior palpebra adeo retrahitur, ut oculus, dum clauditur, integrum non tegat, quod vitium nuper in lanione observavi, cui pustula exedit palpebram, quâ brevior factâ, nunc oculo aperto dormire necesse habet.

*Hydatidis* dicitur & *Agnula*, à *Zaccho Lusitana Hydatidis* appellatur *Alfarnac*, & est pinguis quædam substantia tanquam adipis frustulum sub palpebræ superioris cute latens. Describi potest, quod sit mollis & laxus tumor, totam palpebram adeo obsidens, & oedematofam reddens, ut pondere degravata palpebra surrigi nequeat. Hydatides palpebrarum d'fferunt ab aliis Hydatidibus, quia illæ pinguedinem, hæ verò aquosum liquorem continent.

Sæpe etiam accidit, ut *Calenti* generentur, ut & *Callos* in palpebris, qui affectus videantur inferius suis capitulis lib. 5.

§. 2. *Pars affe*cta sunt palpebræ, externæ illæ *Pars affe* oculi partes superciliis subacentes superne inferneque, interiores oculi tunicas contingentes, quarum una Inferior, altera Superior vocatur. Superior major atque mobilis, Inferior minor atque immobilis. Palpebræ hæ constant cute, membranâ carnosâ, musculis, nervis, tunicâ, tarsis & ciliis, vocantur & *καλύμματα*, i. e. tegumenta Oculorum, vel cooperacula.

§. 3. *Trachoma* cognoscitur ex rubore, pruritu & milii granorum veluti eminentiâ, si triceritur palpebræ, magis intumescunt, adest gravitas & dolor.

*Emphysema* apparet per se ex intumescencia scilicet palpebrarum, & si præcelsere vel ictu araneæ, vel vespæ, vel erucæ; si enim erucam digito apprehendas, & dein palpebram attingas, statim hunc affectum patieris, quod sæpe meo damno expertus sum; sic in febribus diurnis, vigiliis nimis, cachexiâ, affectus hic oritur, & oedematofus iste tumor ex seroso colligitur humore, ibidem stagnante.

*Coalitio* exinde cognosci solet, quando palpebræ vel inter se, superior cum inferiore, vel cum albâ, aut cornæ, aut utraque oculi tunicâ coalescant, cunctinuntur & extremitates earum conglutinantur, ut vix aperiri queant; & ut plurimum fit noctu, hinc vocatur *Cohærentia nocturna*.

*Cancer*, tumor ille rebellis, cognoscitur ex suis propriis signis, de quibus infra lib. 5.

*Callos* diagnosi ibidem quoque tradetur.

*Inversio* seu *Ectropion* cognoscitur ex carne luxuriante palpebras inferiores gravitate suâ premente, ut *Lagophthalmos* patet ex superiorum palpebrarum retractione, unde oculi semper aperti manere debent, & hinc vocatur *leporinus oculus*, quia lepores apertis oculis dicuntur dormire.

Econtra alium vidi affectum, ubi quidam tractum

# CAP. VII. DE MORB. PALPEBRARUM. 55

palpebram semper clausam & oculum exinde tectum habebat, eundemque aperturus manu palpebram elevare coactus fuit, absque ullo tumore seu hydatide, in quo palpebra superiores totum oculum tegebant.

**Calculi.** *Calculi & Calli per se patent.*

**Calculus.** *Calculus Trachomatidis secundum Galenicum.*  
§. 4. *Veteres Galenicis Causam Trachomatidis* statuerunt humores acres, mordaces, ex bile adusta vel pituita salsa serosa oriundos, & palpebris illatos, sæpe à causa externa, vento aspero, fumo, & collyriis acrioribus excitatos & allectos, membranam palpebrarum interiorem dissolventes aut exasperantes.

**Emphysema.** *Emphysematis* causas ponunt tum internas, humores videlicet aquosos & serosos, interdum etiam status; tum externæ ictum vespæ, apis vel aranei, &c.

**Calculus.** *Calculus* Palpebrarum oriri voluit vel à materia quadam pituitosa & viscidâ ad partes hæc oculi affluente, vel ab ulcere negligentius tractato, quoad sanitatem vergente, partes hæc antea mobiles & ductiles aut sibi invicem agglutinantur, aut cum alba, vel cornea, vel etiam utriusque tunica uniuntur & coalescunt.

**Cancer.** *Cancer* non exulcerati causam imputant succo atrabiliario adusto crasso, aliquantum tamen miciori, in venisillarum partium hærenti; exulcerati vero, materia isti ita acri existenti, ut ipsas Palpebras corrumpat, & illuviem quandam foetidam ad oculos emittat.

**Entropion.** In *Entropion* tanquam causas accusant vel paralylin, seu resolutionem, vel carnis in parte interiore incrementum, vel vulnus aut ulcus male curatum, ex quibus omnibus internam Palpebræ inferioris partem dilatat, tum externam abbreviari & strictiorem fieri contendunt.

**Lagophthalmus.** *Lagophthalmum* oriri existimant vel à mala conformatione in utero, vel prava in pueris consuetudine, vel vulnere aut ulcere male curato.

**Hydatidis.** *Hydatidis* causam derivare student ex humore seroso intra Palpebrarum membranas illapso, à quo substantia illa unctuosâ in medio Palpebrarum exiens dilatare & augeatur.

**Calculus & Calculorum.** *Calculus & Calculorum* causam ponunt succum quandam crassum & peculiari sua natura lapidescentem, à faculae, nescio qua, lapidifica in huiusmodi duritiem & solidam substantiam convertitur.

**Quæstio Palpebrarum Causa Trachomatidis.** §. 5. *Paracelsus* causam *Trachomatidis* esse vult Sal aluminosum separatum & plumosum, quod non modo exedendo membranam Palpebrarum interiorem variè exasperat, sed in varias guttas segregatur, quæ coagulatur, & à sale aluminoso dulci detentæ, in durities & tubercula ista, milii semina ostendunt, abeunt, ab eodem vero derelictæ partes corrodunt & varia produciunt foramina.

**Emphysema.** *Emphysema* oriundum vult ab arsenico puro præter resolutionem Palpebram cum aliquâ duritiæ & intentione instante.

**Calculus.** *Calculus* Palpebrarum fieri censet à vel nervorum claro effusio, & Palpebras invicem glutinante, vel à humidi in sanum corruptæ post malam ulcerum aut vulnere tractationem, unde tunice oculorum eroduntur, & tandem Palpebræ similiter inficiuntur, & usdem adhærent, æque mediante munia vulnera curantur concrevunt.

*Cancer* causam statuit sol quoddam acutum *Cancer*, colcotharinum ab eo, quod temperare potuit, separatum, & ob subtilitatem suam etiam ad superiores hæc oculorum partes externas perveniens, easque rodens & variè deformans.

**Entropion & Lagophthalmum.** cum prioribus *Entropion* & vel à contractione aut paralyti, vel malâ conformatione, vel inconsideratâ ulcerum aut vulnere tractatione ab imperito Chirurgo produci posse concedit.

**Hydatidis.** *Hydatidem* oriri existimat à sale narcotico, & separato à sale terium, ut inquit, primorum quod à natura propulsum in pustulam transmutatur vel bullulam instar aquæ transparentem.

**Calculus.** *Calculus* statuit tumorem arsenicalem, ex liquoze carnis & sanguinis proveniente, dum perfricationes excitatur, & in superficie carnis suam ponit emunctorium.

**Calculus.** *Calculus* oriri aliis persuadere conatur à sale corporis ab occulto suo igne accenso, & Nephriticum quendam ictum recipiente, unde in lapillos istiusmodi induratur, uti firmamentum est causa lapidis & sudaminis, quæ similiter in microcosmo existunt & interdum in externum veniunt conspectum.

§. 6. *Helmontius* causam *Trachomatidis* querit in acido cruoris ad interiorem Palpebrarum partem effuso, eamque exigantem, immulque cruoris quasdam partes variè coagulante, unde non tantum asperitas & pruritus ab irritato Archeo, sed etiam pustulæ & tubercula exoniuntur, pro diversitate partium cruoris, in quas acidum illud agere consuevit.

**Emphysema.** *Emphysema* similiter ab acido diducit, membranam palpebræ externam distendit, sicque dolorem exciunt, & convellente, quare Blas Palpebrarum intenditur, exque intumescunt.

**Calculus.** *Calculus* contingere docet à mucilagine ex latice à Cistode Cerebri errante ad Palpebras demissa, dum Cistosis ille vel ab aëris injuriis agitur vel ob ulcus & vulnus cruor corrumpitur, ex quo latex dissoluta saliva diutius, & glutinum convertit Palpebras vel inter se, vel cum tunica ipsius oculi connectens.

**Cancer.** *Cancer* ortum adscribit indignationi Archei, ob compressionem doloris aut spontaneam confusionem, unde passio exurgat furiosa, quæ palpebris confermentata venenum conglomaret, sicque tuberculum efformet, non cessante Archeo fabricare ideas in alimentum propagandas, in eo autem tuberculocere vult causam ipsius ulceris, quod facili ex eo produciatur.

**Entropion & Lagophthalmus.** *Entropion & Lagophthalmum* causam adscribit vel latice, aut peregrino cuidam hospiti acidiori membranas Palpebrarum externas crispanti & contrahenti; vel cicatrici externæ eorum membranz annatz; vel etiam malæ in utero conformationi.

**Hydatidis.** *Hydatidem* formati vult à liquore nutriende copiosius in Palpebras transmissis ab Archeo aliquantum prodigo, nec portionem abundantem reducunt, quapropter membranz earum partium distenduntur, & liquor ille tumorem inducens, per easdem transparent, & interdum etiam exsudare consuevit.

**Calculus & Calculorum.** *Calculus & Calculorum* originem similiter ex latice deducit, quatenus saliva in eo detenta aliquid rodendo subigunt, & à nativâ conditione in neutrum trahunt & coagulantur, accedente

dente acido quodam nutrimentum harum partium corrumpente, & spiritum latius compingente.

*Widius  
je. tentia  
de causa  
Trachoma-  
tis.*

§. 7. Ex *VVidius* sententiâ *Trachoma* ortum sumit ab humore lymphico aut latice seroso acescente, & fibrillas in cute Palpebrarum nervas variè exagitante, accedentibus sanguinis quibusdam recementis, postmodum fermenti corruptivi naturam induentibus, & per effervescentias suas cum aliis succis variè coagulatis, ut adeo non modò pruritus, ob spirituum agitationem majorem, sed etiam ex diuturniore stagnatione granula, pustulæ, & quandoque scabiola disposicio illis obveniant.

*Emphy-  
matis.*

*Emphysema* similiter latice isti seroso vel soli, vel simul aliis succis ex sanguine ei se immiscensibus & sub cute stagnantibus natales suos debet, præsertim quando succi isti humori lymphico rari nequeunt misceri, ita enim ex eorum colluctatione vapores quidam assurgunt cutem Palpebrarum discedentes. & tumidam reddentes, quam succorum ebullitionem & externum quoddam heterogeneum per ictum & stimulum insectorum quorundam parti communicatum excitare solet.

*Cohæren-  
tia.*

*Cohærentia* Palpebrarum contingit, quia humor ille aqueus pro oculorum humectatione ex sanguine per arteriolas edelatus, & reliquo sanguine per venulas secedente, à glandulis lacrymalibus imbibitus, crassior & viscosior existit, qui dum oculi per somnum clauduntur, inter utramque palpebram & oculum diffusus easdem glutinositate suâ combinat; interdum ob vulnera vel ulcera, mediante eodem & succo nervoso nutritio similiter tunicis oculorum agglutinantur & concrevunt.

*Cancer.*

*Cancer* in his locis, secundum Autorem hunc oboritur à succis impuris acido-salis ex arteriis cum sanguine effusis, & ab eo separatis, simul liquore nervoso multis particulis salinis scatente, ibidem stagnantibus, sicque depressis spiritibus in fluorem degenerantibus, non modò in parte extra venas tumorem excitantibus, sed quia sanguis per venas refluentis iisdem inficitur & turgescit, ipsæ etiam venule intumescent, & tandem majori per stagnationem impetratâ acrimoniâ, & corpusculis sulphureis sibi adsociatis, ille succus corrosivitate inducens partes hæc corrodit atque planè exulcerat.

*Etiopium &  
Lagophthalmum*

*Etiopium* & *Lagophthalmum* vel à vellicatione spasmodicâ fibrarum cutanearum externarum, vel à eicatrice membranz interioris post vulnus aut ulcus; vel à malâ conformatione ortum habere iidem cum reliquis arbitrat.

*Hydatida.*

*Hydatida* à latice cutaneo lentescente, adeoque non facile transpirante deducit, quapropter eo diutius & tenacius adhærente, novus ex sanguine arteriali affusus simul detinetur, quia verò non sunt æqualiter proportionati, hinc ebulliendo cutem attollunt & pustulam excitant. ex cuius poris dilatatis latex aliquando diffinit, præsertim quando novus latex factâ distributione ex sanguine apportatur, inde effluxus ille humoris lymphici horis matutinis obungit.

*Calli.*

*Callus* haud dissimili ratione à latice particulis ipsioribus scatente dependet, quæ cum per poros cutaneos commode nequeant dissipari & evaporare, eidem tenacius adhærent & dense coagmentantur.

*Catenæ.*

*Catenæ* excrevunt ex particulis terrestribus

& salinis, spirituosus liquoris nervi avolantibus aut depressis, acque accedente quodam acido ex liquore cutaneo easdem coagulante.

*Sylvius de  
morborum horum  
Palpebras  
Sylvius de  
Trachoma-  
tis.*

§. 8. *Sylvius* de morborum horum Palpebras occupantium causis ratiocinia eo colligit, ut *Trachomatis* ortum deducit ex acido acris aucto à sanguine quidem separato, & ab pituita glutinosiore poros cutaneos obstruente minime exhalante, quare non modò acrimoniâ suâ pruritus excitet & cutem exedat, sed vi suâ coagulatâ pituitam aliquando conglomeret & tubercula producat.

*Emphy-  
matis.*

*Emphysema* verò tum generatur, quando acido illi se se immiscet salum aliud lixiviosum, quod ab acido agitur redditur statulentum & cutem distendit.

*Catens.*

*Catens* fit à pituitâ glutinosiore, maturi, quàm par erat, copiâ à sanguine separata, & ad glandulas oculorum lacrymales diducta, sicque oculis superfusa, & Palpebras conniventes conglutinante; qui verò post ulcera & vulnera contingit, inde dependet, quod membrana Palpebrarum interior à pure acido-acri fit corrosa, & ab accedente sanguine benigno consolidationem absoluturo, cum tunicis oculorum conjungatur, atque hæc modo concrevcat.

*Cancer.*

*Cancer* scaturiginem tribuit succo acido-acti in glandulis collecto, acrimoniâ ex stagnatione à pituita obstruente causata adepto, quod tunc spiritus volatilis ei naturaliter junctus, & cum blandè temperans, magis inasque ab eo secedat, & residuum acre tumorem & ulcera maligna excitet.

*Etiopium &  
Lagophthalmum*

*Etiopium* & *Lagophthalmum* excitari credit vel ab humorum acrimoniâ, fibras mulculorum Palpebrarum ita vellicante, ut perleverans spirituum animalium motus ad easdem consequatur & convulsio oritur; vel ab iisdem causis, quas reliqui Autores unanimiter admittunt.

*Hydatida.*

*Hydatida* ortum lymphæ adcrebit è vasis suis intra Palpebram effusa, & propter obstructionem ibidem coacervatâ & majorem consistentiam natâ, à qua cutis in tumorem attollitur.

*Callorum  
& Catulorum.*

*Callorum* & *Catulorum* concrevcentiam impunita succo austero, materiam terrestrem & salinam volatillem glutinosâ junctam, & ex sanguine cum nutrimento ad Palpebras delatam, coagulanti.

*Certis-  
fian-  
nem op-  
nis de cau-  
sâ Trachoma-  
tis.*

§. 9. *Certisfian* qui prenunt vestigia *Trachomatis* causam attribuit particulis acidis, salis, asperis, acutis & valde subtilibus, vel cum luco nutritio ex sanguine, vel ab aere aut topicis sensu collyriis extrinsecè ad Palpebras delatis, quæ non modò reliquorum succorum particulas variè exagitant & circulant, rubram iis conciliant tincturam per cuticulam transparentem, sed cuspidibus etiam suis fibrillas cutaneas pungunt & aliquo modo vellicant, citra tamen ulteriorem eandem læsionem, fibrillæ verò cutaneæ ita agitate simul vascula cutanea succutunt, ut majori copia succum suum ad glandulam innominatam effundant, à quo lobi ejus distenduntur, & nimia mole onerati sarcinam tandem deponunt, & lympham ad interstitia fibrillarum exernunt, quæ diuturniore mora à particulis illis inficitur, & in similem sui redigitur dispositionem, quæ poros cutaneos arduat, ut non solum pustulæ scabiei similes extollantur, sed interdum ipsa lymphæ subtilior reliqua crassiore per poros effluxu conformes reddat.



# CAP. VII. DE MORBIS PALPEBRARUM. 57

ditos emanat, sique cutis Palpebrarum interior rimarum quasi plena undique & sepiuscule diffluit, interdum moleculis crassioribus cum lymphâ allatis & ab acido precipitatis inter membranam relictis granula repræsentantibus.

*Emphysema* induci credunt cum ob liquorum crassitiem minus commode per vasa transeuntium, cum ob pororum mutationem à fermento quodam peregrino factam. flagrant enim liquores, siue lymphæ sit, siue ipsæ partis illius succus nutriendi, & ab austero coagulatur & inspissatur, sique Palpebram reddit tumentem, vel status succis istis innuisti cutem distendunt, aut venenosum quidpiam mori insectorum per poros illatum, fermento suo acerrimo & spiculato fibrillas nervæ & cutaneas exagitant dolore inferi, & maiorem humorum affluxum, qui similiter infecti vitiole effervescunt, & majus sibi querentes spatium, cutem attollunt & palpebram reddunt tumidam.

*Coherentiam* adscribunt particulis gummosis & glutinosis, ex particulis pinguibus oleosis inspissatis oriundis, majori copâ lymphæ glandulari uniuersis, quæ ex glandulâ lacrymali per oculorum humectationem una cum lymphâ effusa extremitates seu cilia utriusque Palpebræ conglutinant; *Coalitum* autem unius aut utriusque Palpebræ cum tunicis oculorum ab iisdem particulis glutinosis derivant, cum succo nutritio per consolidationem vulneris vel ulceris eo delatis.

*Cancer* caulam ponunt particulâ acidâ volatiles, acres & corrodescentes, ex succis ob diuturniorem extra vasa stagnationem corruptis exsurgentes, quæ sepe ex parvo principio intra breve temporis spatium magnam capiunt incrementum, & ipsum sanguinem in venis corrumpunt, & hæc propterea circa tuberculum intumescunt, tandem verò crescente corrosivitate tuberculum eroditur, & ulcus malignum & penè incurabile subiequitur.

*Etiopis & Lagophthalmos* non alias causas adscribunt, quàm illas, quæ superius ex aliorum Auctorum opinione jam percepimus.

*Hydatis* sit, quando lymphæ circa palpebram superiorem abundans effunditur & ductibus suis, atque ob alterationem in vasis suis factam, siue eadem obstruantur aut rumpantur, siue aliter lædantur, inter cutem & glandulas stagnat, ita enim ejus collectio copiosior in eandem partem cutem distendit & tuberculum efficit, ex cujus poris dilatatis lymphæ tenuior nonnunquam exsulare solet.

*Calli* excresecunt, quando post fibrarum nervearum aut muscularum agitationem diuturniorem, vel frictione vel acrimonia succorum factam, eadem extenduntur & succum nutritium majori copia recipiunt, eumque retinent, qui assimilatus in easmodi tubercula spissa convertitur.

*Calculus* generantur, dum spiritus acidus jungitur lymphæ pinguiori aut salî cuidam volatili cum eadem in Palpebram delatæ, tamen enim posteriori à priore ita coagulatur, ut in duram rigidam substantiam facillè faciliant.

§. 10 Juxta *Nostram* sententiam causa *Trachomatosis* sunt particulæ salinæ, acres, acidæ pungentes vel in sanguine vel succis evasales latentes, quæ pruritus in fibrillis ac ruborem excitant, sic è ductibus etiam lacrymalibus lymphæ acribus particulis imbuunt, quæ Palpebræ oculos obte-

gentis cutem internam rodendo hunc excitare possunt affectum, & si Palpebræ fricentur, major effluxus sit harum particularum; externè acris frigidus, seu acido-nitrosus, imò & collyria acra facillè hunc affectum producere valent, quod serum vitiosum ita evasatum in palpebris, avolantibus spiritibus volatilibus, & accedente acido in substantiam semini milii haud abhominem induratur; ob acrimiam particularum hic occurrentium & subsistentium copiam fibrillas amicè afficientium oritur vibratio placidæ palpebrarum fibrillarum, qui resultat ad sensorium commune, hinc oritur ille pruritus.

*Emphysema* oboritur ex lymphâ stagnante ab obstructione valorum lymphaticorum, vel ob lymphæ per hæc vasa transeuntis crassitiem, vel particularum ad poros partis ineptam conformacionem, vel ob acidum nimium hos humores coagulantes & inflantes; humorum enim particulæ male figuratæ poros & canales transire nequeunt, hinc stagnare coguntur. Fit hic affectus sæpe ob fibrarum partium contracturam atque crispationem, indeque tubulorum angustiam in dolore à partium nervosarum irritatione, hinc ab ictu vespæ, vel araneæ, vel apis, vel alius veneni statim affectus hic exoriri potest, hæc enim irritata animalcula per ictum spicula deponunt fibris nervosis inimicissimâ & propterea fatalia, quarum vellicationem & excitatum liquorum fermentationem à peregrino deposito statim variorum sequitur succorum effluxus, aut à stagnatione excitatur stultentia palpebræ cutem attollens in tumorem, suntque ideo verissimi sequentes verius *Virgulus*, *Georg. lib. 4. v. 235. p. m. 50.* non modò de apibus, sed & vespis aliisque infectis stimulo præditis intelligendi.

Illis ira modum supra est. læsæque venenum Moribus inspirant, & spicula caeca relinquunt

Affixa in venis, animasque in vulnere ponunt.

Nec hic excludere volumus alia externa, quæ per percussione, attritum, &c. affectum hunc inferre possunt, neque rejiciamus status Palpebrarum tunicas extendentes, aliosque stagnantes succos.

*Nocturna Coherentia*, quæ sæpe accidit in sub-  
jectis humidioribus multâ lymphâ scatentibus, præsertim infantibus & pueris, facillè hinc concludere est, affectum hunc oriri ex lymphâ viscidâ evasata ex glandulis noctu exsudente, & palpebras cum tunicis oculorum conglutinante, & cum materia sæpe sic instar picis, inde patet ipsius viscositas; sic & ulcera prægressa ob acidum viscosum, quo pus abundat, hunc affectum excitant.

*Cancer* Palpebrarum oritur ex acido volatili insigniter corrosivo, de quo suo capite. Sic & *Callosi* generantur, quando pars carneæ vel nerveæ ex quacunque causa externa læditur, ut nimia extensio staminum, & sic tubulorum depravata figuratio superveniat, tunc fibrillis lætis alimentum partis proximum ulterius recipitur, distius retinetur, & magis quàm par est induratur, & sic oritur callus, de quo etiam suo loco ex prolesso pluribus agetur.

*Etiopium*, siue Palpebræ inferioris inversio, sæpe oritur ab hypercarcosi vel tumore Palpebræ inferiore, sæpe etiam ex ulcere vel vulnere, imprimis ex mala ulceris curatione, qualia

H

plura

plura novimus exempla, quæ omnia ortum suum habent ex particulis male figuratis ibidem stagnantibus & à sua massa separatis & quasi præcipitatis, quæ dein tandem ibi resiliunt, donec scindendo, pungendo, ardendo tandem exitum inveniunt, & abscessum vel cicatricem inferunt.

*Lagophthalmi.*

*Lagophthalmus*, ubi Palpebræ superiores retrahuntur, ut oculus claudi non possit, oritur vel à mala conformatione, vel à consuetudine puerorum in cunis sursum versus respiciendum, vel spasmodicæ retractione à fibris nerveis dependente, spiritibus scilicet animalibus impetuosè motis. Econtra affectus is, ubi Palpebræ semper oculum tegunt, oritur à paralyti vel vultue, fibris scilicet laxis, & musculis clausoris.

*Hydatidæ.*

*Hydatides* Palpebrarum ut plurimum à proprii sui alimenti obstructionem vasorum immutatione & stagnatione seu coactione oriuntur, hinc illa lymphæ pinguis facili in pinguedinem mutari potest. Pueri hic affectus familiaris est.

*Calculus & Callorum.*

*Calculus* & *Callorum* causa consistit in eadem obstructione ab acido violento, succum nutritium in lapideum coagulante duritiem.

*Pregrosi.*

§. 11. Hicce ita enodatis, ut nihil penè clarius dici possit, de *Pregrosio* deliberandum, cumque pars affecta non sit nobilis, hinc de vita res erit salva, modo deformatio impediatur.

*Trachoma.*

*Trachoma* difficulter curatur, & si simul accedat scabies, exulceratio & callositas, malum est. In quo verò minor pruritus, & parvæ pustulæ adsint, facilius curatu est. Ubi verò lividus humor affluit, pessimum est, acidum enim intensius indicat, & partium adiacentium necrosus.

*Emphysema.*

In *Emphysemate*, ubi tumor hic oritur ab interna obstructione vasorum lymphaticorum, difficilior est curatu, quam ubi assurgit à causa externa, ut ictu vespæ, apis, araneorum, aliorumque animalculorum venenatorum. Difficilior verò, quoniam ictu, plaga, vulnere, item, si oritur in febris, vigiliis, cachexia.

*Cobarentia vel coarctatio.*

*Cobarentia vel coarctatio* nihil mali portendit, nisi acida hæc visciditas ipsas tunicas oculorum efficiat, hinc sæpe multæ lachrymæ, hoc est, affectus pessimi, acidum enim cotiosissimum tunicam albam aut corneam facili corrodere & corrumpere potest. Curatur verò difficulter, si tota coarctat, & planè nunquam, si cum cornea simul concrevit.

E contra faciliè curatur, si extremitate duntaxat oculo inhaeret, & si annata saltem agglutinatur. Si ab ulcere oritur, difficilior est curatu, quam si à lymphæ acida viscosa.

*Cancro.*

*Cancer* Papillarum, sive exulceratus sive non, difficilissimus est curatu, ut & *Cancer*, de quibus vide inferius cap. 21. lib. V. de Cancro.

*Entropia.*

*Entropion* curationem difficulter admittit, cicatricem enim tollere nova dissectione res est periculi plena & incerta, namque Tumor excrecens catharteticis est extirpandus, sed ob oculum adiacentem non audemus, hinc melius in principio, quam dum radices jam egerit, curatio expectanda est.

*Lagophthalmi.*

Si *Lagophthalmus*, sive *Oculus leporinus*, à mala conformatione fuerit, quale novi exemplum, non est curabilis; sic & illa inversio, quæ est vel à vulnere, vel ulcere male curato & convulsione, difficilis est curatu, nec non affectus iste, in qua oculi ob palpebrarum superiorem dependen-

tem semper clausi manent, quia à paralyti ut plurimum hic affectus est, nullam nisi palliativam admittit curationem.

Recens *Hydatidis* facili, inveterata ac diuturna *Hydatidis* difficillimè curatur. Si verò peculiari membrana includatur, tunc non à difficultate excindi potest.

Eadem res est cum *Calculus* & *Callus* Palpebrarum.

*Calculus & Calli.*

§. 12. Requiritur in his affectibus etiam accurata mediocritatis observatio circa res illas, vulgò Medicorum ita non dictas naturales.

Aër ergo sit temperatus, cibus & potus congruus, motus & quies, somnus & vigilia pro re nata sint juxta leges sanitatis, & conditionem morbi. Ante omnia ager sibi caveat ab animi affectibus, & pro affectus ratione ista facili à Medico præsentem præscribi possint, cum hæc omnia hic accuratè addituri tempus tereremus, hinc ad magis proficua & necessaria properemus.

§. 13. Ad *Curam* enim morborum Palpebrarum *Pharmaceuticam* & *Chirurgicam* nunc accedere necessum erit, & de his omnium primò percipiendi Veteres *Galenici*, qui *Trachomata* curam aggrediuntur præmissa totius corporis evacuatione, ac massa sanguineæ depravatione per Decoctum polypod, cum fol. sen. Elect. diacathol. Syr. de fumar, compos. &c. materie peccantis aversione per scarificationem, ac cucurbitularum bullis & scapulis applicationem, ac repercussionem, topicis emollientibus & humorum acrimoniæ antemperantibus, Decocto rad. altheæ, lil. alb. liquirit. herb. malv. beæ, chelidon. maj. flor. prælv. melilot. Camomill. sem. lin. fœnigr. fœnic. &c. quo linteæ duplicata humectanda, & oculis tepide imponenda sunt, vel mucilago sem. lin. fœnigr. aq. ros. & fœnic. facta palpebris illinenda; hicce usurpatis substitui aut subjungunt abitergentia. fac videl. mulieb. in quo parum myrrhæ est dissolutum, vel aloë in aq. ros. dissoluta & loco laboranti illita. Si scabies palpebrarum occupaverit in *Pterophthalmia*, Unguentum rosatum magnificatum, cui quidpiam rosatum magnificatum, cui quidpiam de tutia pp. sit intermixtum, vel Ungu. nihil ad oculos.

In *Emphysemate* itidem post evacuationem humorum peccantium feroforum & pituitosorum per insulum rad. mechoac. Jalapp. sem. cartham. rad. & bacc. ebul. sem. & flor. genist. Symp. diafer. Andem. vel Electuar. Eleleoph. *Mef.* institutum, & statum ablationem per Decoctum aliquod carminativum, Aquam Phylagonam, spec. diacum. dianth. &c. topica applicant emollientia & discutientia, forum vel epithema ex decoct. aneth. calamith. rut. puleg. flor. Chamomill. Melilot sem. anil. carv. cumin. coriand. pp. fœnic. baccis lauri, croco, &c. Olea inungunt Sulfurum, seu lil. alb. aneth. lauri &c. Ungu. album camphoratum similiter applicant. In causâ admodum calida adhibent album, ov. cum succ. semper viv. & plantag. interdum cum tert. sigill. vel bol. Armen. pro majori repulsionem. In ictu vespæ, apis, &c. superungunt theiacam vel iolam, vel cum succo plantag. commistam.

In *Cancro* Palpebrarum eandem observant *Cancer*, curandi rationem, quam tradunt in Cancro generali inferius lib. 5. cap. 8. percipiendum.

*Entropia* à resolutione seu paralyti oborto ea *Entropia*, adhibent remedia, quæ in Paralyti aliis usurpantur.

# CAP. VII. DE MORB. PALPEBRARUM. 59

pare solent, tum internè, tum externè, si si majore carnis interioris incremento dependeat, illud vel medicamentis, vitriolo albo, alum. ust. &c. vel citius sectione tollunt; si ab ulcere vel vulnere male curato & cicatrice sit induratum, adhibet primo emollientia, solum ex decocto rad. altheæ, lil. alb. sem. lini, malv. flor. mellor. &c. Unguentum dialth. ol. amygd. dulc. Chamomill. Postea parùm incidunt cutem ad cartilaginem, figurâ innatâ, eâ tamen minimè læsa labiisque ad mala spectantibus, plagæ aliquantum diductæ imponunt linimentum conjunctionem labiorum impediens, cui tandem imponunt emplastrum, & fasciâ in debitâ servant figurâ, ne reflectatur & pristinam pravam recipiat.

In *Lagophthalmo* à malâ in utero conformatione nullam tentant curationem, incurabilem enim iudicant; si à prava sit consuetudine, eandem suadent methodum, quam in priore capite de Strabismo tam percipimus; si ab ulcere vel vulnere male curato & cicatrice ortum habeat, eodem modo procedunt, quo in *Ectropio*, ita tamen, ut incisio paulum infra supercilia fiat, & labia oculum spectent.

In *Hydaride* aliquando præmittunt universalia; ad humorum peccantium & serosorum copiam minuentem & evacuandam, quare hydragoga propinant, & apoplegmatisantia exhibent, hinc externè applicant discutientia, solum nempe ex decocto salviæ, origani, sol. lauri, summit. thym. absinth. flor. Chamomill. sem. cumini. carvi, fenic. fœnigr. vel oleo anethi & scorpiorum inungunt; post hæc exsiccantia substituant, inspergendo pulverem ex ossib. ostreæ, ulis, ungula asini combustâ, cortic. cappar. olivano, &c. vel eundem millescent & imponunt; si his non cedat & peculiari membrana nulla obvolvat, sectionem in cute institunt & integram eximunt, vel, si metus sit aliquid remansisse, sal commune manum imponunt, ut id, quod restitit, consumatur, tandem palpebram & totum oculum aquâ rosar. & plantag. abluunt.

*Callis & Calculi* fortiter emollientia imponunt & consumentia, ut emplastrum de Gum. animon. diachylum jecatum cum sale armoniæ, quibus si cedere nolint calculi, sectionem institunt, eos eximunt, & plagam emplastro gryseo iterum sanant.

§. 14. *Paracelsus* in *Trachomate* eo dirigit curam, ut sal aluminosum separatimque plurimum acre corrigitur, & aliis deniq. intermiscantur, ne sola existentia Palpebram nimium exulcerent, quod præstari posse nullus dubitat ipsâ cuti & lapide calamitari, secundum inventionem suam rite preparatis, si enim hæc cum aquis rosar. fenic. & ausrag. per modum redigantur in collyrium, illudque palpebris in *Trachomate* à salibus istis exedentibus corruptis illinunt, nagaum inde pollicetur juvenem.

*Emphysemâ*, seu tumor ventosus, ut curetur, sicut ut materia intus contenta resolvatur, & acrimoniæ crudum mitigetur per pinguiâ viscosâ & terebinthinâ, proinde sequens laudat emplastrum humori illi assiduo imponendum, donec cedat & dispareat:

1. *Terebinth.* 3℔.  
Cumini 3℔.

Sem. lactuc. 3℔.

Cereq.

F. Emplastrum.

*Coalitus* Palpebrarum ut inhibeatur, clarum illud nervorum abluat, & ulteriores ejus effluxum sistit & prohibet, muniâm verò corruptam ad pristinum sanitatis statum redigit, quæ omnia præstat lapis calamitarius pp. succo chelidoniz immittit, & instar collyrii adhibitus.

In *Cancro* summum acæum æstimat alkali, imprimis quod ex auripigmento sequenti modo paratur.

1. *Auripigmenti* 3v.

Fulig. 3℔.

Sal. xci 3iij.

Reduc ad quartum gradum reverborationis per diem & noctem, fiat Alkali.

Hoc postmodum cum Sale de cineribus simi columbini & oleo vitellor. ovor. redigit in Unguentum, quo locum cancrorum sæpius inungit.

In *Ectropio* & *Lagophthalmo* non videtur à reliquorum instituto recedere, hinc in Paralyti ea adhibenda, quæ in aliis ejus speciebus Autori huic consueverunt, in reliquis ab aliis jam calcata viæ erit tenaciter insistendum.

In *Hydaride*, ut corrigatur sal narcoticum, laudat interiùs assumentem quantum essentiam Chelidoniz, quæ restitatur, & in debitum statum salia primitiva restituit, externè commendat alkali lithargyri cum succo chelidoniz in unguentum redactum, & pustula applicatum.

*Callo*, si post frictionem in apostema transierit, unguentum superponit ex oleo rosar. calce vivâ extinct. & caphura; reliqua videri possint capite de Callo in genere.

*Calculus* in Palpebrâ similiter abigi posse credit, uti reliquæ coagulationes tartareæ in corpore, si resolvantur salia incensa & indurata, sæpiusculæ usurpato lapide saxifrago preparato; externe idem lapid præparatus cum sale gemmæ & sale fusco, admixto succo chelidoniz, in unguentum redigi potest & calculo superimponi.

§. 15. Juxta *Helmontium* in *Trachomate* acido cruotico corrigendum per alkalica, & Archeus irritatus sedandus, ita enim prævius cellabit & pustulæ atque tubercula faciliè disparebunt.

In *Emphysemate* Blas illud statulentum ab acido excitatum iterum resolvendum, & materia excitans averruncanda est remediis ex anetho paratis & tum intra tum foris adhibitis, quæ de causâ etiam oleum lauri illini potest.

*Coalitus* impediatur, si mucilago ista dissolvitur, & à viscositate suâ exiit. Cistos verò erans ad debitam reduci viam, ne laticem tam copiose mittat ad oculum, quod ipsi fieri poterit spiritu salis armoniaci, cum spiritu vegetabili lociato & intus assumto; externe alkali ex ossibus humanis adhibebit, à quo latex in ulceribus aut vulneribus corruptus insignem accipit correctionem.

In *Cancro* hoc Palpebrarum præ aliis remediis præstans existimatur gluten de aquatico, ut eo sæpius illinatur.

*Ectropium* & *Lagophthalmum* nullâ peculiari tractat ratione, quare in reliquorum Autocum placitis acquiescendum est.

In *Hydaride* Archeus ad officium vocandus

H 2

est,



est, ut superfluum liquorem nutriendum reducat, quod autem reduci nequit, ad evaporationem disponendum est per alkalia volatilia.

*Calli & Calculi.*

*Calli & Calculi* sui resolutionem exposcunt, & acidi correctionem, ne nutrimentum ulterius compingatur, internè igitur spiritus sanguinis hirci in aqua chelidonix & fœniculi dari potest, externè autem Unguentum vel emplastrum ad scrophulas conveniens adhibendum.

*Ullisig-  
rain Tra-  
chomate.*

§. 16. Ad *Ullisigum* rectè accedimus, cuius *Trachoma* curandi ratio eò spectat, ut latex serotus accensens corrigatur, & recrementa sanguinis educantur, quod præstari potest infuso laxativo ex rad. polygod. oxylapath. valerian. chelidon. fol. fen. Mechoac. turpeth. epithym. santal. citrin. sem. fœnic. coriand. pp. in cervisi. vel vino, de quo per aliquot dies omni mane debita dosis sumenda; his subiungi possunt diaphoretica, Decoctum rarsaparill. lign. santal. herb. fumar. euphrag. raser. ebor. & rad. liquirit. in aq. communi. Externè applicari possunt topica pruritum & scabiosam dispositionem corrigentia, quæ tamen hoc in affectu mitiora sunt, quam quæ aliis partibus adhibentur. Lini-  
mentum sequensturo usurpari posse promittit.

*Re. Int. pp. 3ss.*

*Flor. sulphuris 3ß.*

*Butyri non sals. 3j.*

*F. Liniamentum.*

*Emphyse-  
ma.*

*Emphysema* si est ab internâ laticis aliorumque succorum colluctatione, eorum copia minuenda, & ulterior colluctatio sedanda, additis purgantibus carminantibus, ut infusum senæ in vino Rhenano cum rad. valerian. mechoac. epithym. sem. coriand. pp. fœnic. anisi. carvi. cubeb. &c. aliquoties usurpetur, externè etiam discutientia applicentur, macerentur flor. Camomill. & sem. fœnic. in spiritu vini, friteretur, aut per deliq. effundatur, & in eo dissolvatur camphora, quo tuberculum, aut palpebra tumens aliquoties illinatur aut ablucatur. Si ab icth. insectorum, cheriaca, vel discordium cum melle thustum emplastrum formâ imponatur.

*C. Cap-  
sula*

Etiâ in *Cabeent* illi Palpebrarum à latice aquoso crassiore ad glandulam lachrymalem affluentem oriunda, ejus copiam minuenda & evacuanda præstabit, & pro revulsionē vesicatoria applicat nuchæ, oculo vero collyria immittit, viscositatem humoris resolventia, corrigentia & majorem fluxum inhibentia, ex aqua ros. fœnic. flor. calcatrapp. verben. chelidon. Sief. citrin. de ros. &c. Si à vulnere vel ulcere malè curato cum tunicis concreverit Palpebra, eam, ut alii, scalpello vel convenientiori instrumento à tunicis vult separandam, & linteolum rasum unguento de tertia vel nihili obductum inter illas interduendum, donec ulcus aut vulnus sanatum fuerit, cui voto Sief. de plumbo & thure conducunt.

*Cancro.*

In *Cancro*, quamvis difficillimè sit curandus, & summa cura & cautè admodum in hisce locis tractandus, ea applicat remedia post usurpata sanguinem purificantia, quæ succos impuros acido-acres corrigere & hebetare possunt, ut spiritus depressi pristinum recuperare valeant dominium, emplastrum nempe ex melle, terebinth. succo sempervivi, gypso usto, ciner. ss. sacchar. B. camphora, &c.

*Emphyse-  
ma & Can-*

In *Emphysema & Lagophthalmos* à spasmodica vellicatione, etiam antispasmodica exhibet re-

media, maxime  $\sim$ um &  $\Theta$ . C. C. spir. & flor. *gophthalmos* & *xi* in aq. fœnic. paralyf. & epilept. Larg. cum Syr. pæon. edule. In reliquis speciebus aliorum effusa quoad curandi rationem facile approbat.

In *Hydatide* ut latex lentescens subtilior redatur, & ad transpirationem disponatur, sudorifera ex lignis, rad. rarsaparill. & lapath. acut. &c. propinat, pustula verò emplastrum diachylum imponit, aut si dissolvi & emolliiri nequit, excindit, & foramen aqua aluminosa parum abluir.

*Calculi & Calli* valde indurati medicamentis *Calculi* vix abiguntur, quapropter, si motui Palpebrarum sint impedimento, prius emolliendi sunt emplastro ex gum. & postea cultello artificiosè excindendi.

§. 17. *Sylvius* in *Trachomate* tam ad acrimonia-  
m acidiâ corrigendam, quam pituitam glutinosam resolvendam, præscribit salia lixiva, tum fixa, tum volatilia intus adhibenda; externè aquam rosar. in qua parum croci sit dissolutum, commendat.

In *Emphysemate* ad tumorem à materia fluxu-  
lenta excitatum discutendum, vel fotum applicat ex carminantibus, vel tinctura cum spiritu vini ex sem. fœnic. anisi. carvi. macis extracta illinit, vel aliquid de emplastro suo carminante imponit, quo & hunc tumorem discuti posse nullatenus dubitat.

Ad *Coalitum* Palpebrarum impedendum vel  
pituita glutinosior est dissolvenda, & opera danda, ne ulterior ejus copia in sanguine colligatur, usurpatis intus salibus lixiviosis volatilibus, spiritu  $\chi$ ci mace vel cinamomo imprægnato; vel pus acidum acre in vulnere & ulcere corrigendum succo chærefol. contusi, & aqua rosar. & fœnic. affusus allecto.

In *Cancro* ad acidem acce corrigendum per  
salia lixiva volatilia omne studium adhibendum esse monet, unde etiam sal volatile  $\chi$ ci externis emplastris immittunt maxime salutare existitutum promittit.

*Ectropium & Lagophthalmos* si convulsio-  
nem agnoscant causam, ad eam abigendam curam dirigit, ex malâ conformatione dependentem ut incurabilem negligit, in prava consuetudine ad meliorem adpescit parvulus vult disponi, reliquas species committit Chirurgis.

*Hydatidem* tolli credit, si lymphæ motus impeditus restituitur, per eadem volatilia, quibus & pituita obstruens dissolvitur, sicuti aromaticis extrinsecè discutitur, aut si ob crassitiam, & quod peculiari vesicula includatur, discuti nequeat, sectione, à perito Chirurgo petenda existipatur.

*Calli & Calculi*, si possunt, dum adhuc in fieri sunt, resolvendi iis medicamentis, quæ acidum aulterum corrigunt, & materiam terebrent separant, ne coagulationi obsequatur, & hic scopus itidem volatilibus obtinebitur, si verò ob moram diuturniorem & compactionem densitatem hoc sit impossibile, callus prius enollitus deradendus, & calculus planè excindendus est.

§. 18. Ad *Cartesiano* nunc accurtimus, quorum Curatio in *Trachomate* eò ditiguit, ut particule acutæ & asperæ in succo nutritio fibras nervæas agitates mitigentur, obcundantur & hebetentur, illud quo effusum est aperitis poris ad exhalationem disponatur, sique discutitur,



tianur, & fibræ nervæ & cutaneæ in pristinum reducantur tonum & debitum situm. Anguli & cuti particularum acidarum acrimie obduntur alius particulis porosis, quorum potius anguli dunt inferuntur, & in corpufcula aut parietes horum agunt, tantum amittunt impetum, quantum particulis istis impendunt, ut propterea tanta vi ulterius non agant in partes earumve fibras, sed obtuse adeoque valde mitigatæ redeant, donec omnino correctæ non amplius noceant. Usurpandos igitur suadent pulveres ex Sio diaphoret. C. C. l.  $\Delta$ . terr. sigil. oc.  $\mathcal{E}$ , cocall. pp. myrrh. &c. quibus omnibus laxiores pori conceduntur, ut particulas acutangulas absorbere, & eorum impetum refrenare possint. Eadem etiam externe conveniunt in collyriis, quibus tutia pp. lap. calam. pp. camphora, saccharum cantium,  $\mathcal{H}$ i, & parum Oli albi associari possunt, & cum aq. fenic. euphras. flor. cyani, plantag. verben. componitur collyrium. Ut pori aperiantur, & non modo materia æthe rea non valde subtilis, sed majores & imitiores particulas invehat, & acutas secum iterum evehat, focus instituit parum emollientes, ut fibræ citè dispositæ debitum exitum querentibus particulis, cedere neant, quales sunt qui sunt ex fol. chelidon. maj. malv. menth. flor. cyani, cilix, sens. enic. rutæ, &c. in aqua simpli. coctis. adpersis interdum aliquot guttulis spir. vini simpli. aut euphrasii. Quando vero fortius sedunt fibras nec ita domari possunt, aliis medicamentis ramosis & viscosioribus, inarctanda sunt, ut alligatæ quasi vires existerent nequeant, & hoc tentant mucilaginis ex sem. eydon. alth. gum. tragacanth. quod præstans judicant, aq. rosar. &c. extractis. Succo tandem nutritio & massa sanguinea magna earum particularum scitentibus copia, eam diuturne situdent vel blande purgantibus serum, vel diaphoreticis, aut revellere vesicatoriis.

*Emphysema.*

*Emphysema* ut abigatur, si indicia adant de liquorum crassitie, & pororum angustatione, eosdem attenuant, subtilisant & poros dilatant, intus adhibitis volatilibus spiritibus, spir. æci, fenic. euphras. sale succin. volat. C. C. Tinetur, cinamom. essent. cubeb. externe foris exspiratiosis & carminativis, maxime si status sint internistis, spiritui lumbric. camphorat. spit. vin. in quo rad. chelidon. fol. rut. flor. camomill. sem. fenic. & bacc. laur. macerata fuerint, vel etiam sem. fenigr. dilatatis enim poris etiam peregrinum fermentum cum materia subtili facile exhalat. Oleosa vi permittunt, cum ramosis suis particulis poris obrepant, eosque occludant. His si non cedat tumor, fortiora emollientia & fibras distentas relaxantia adhibent, emplastrum videl. diachyl. simpli. de gum. Ammon. Infecta quædam si spiculis suis & morsu venenosum quoddam intulerint fermentum, illud quanto citius suadent eliciendum, vel emplastro ex melle, theriaci, myrrh. & camphora vel solo disaccordo imposito, vel foris ex spiritu vini theriacali & aqua Scordii. Etiam in hoc casu tragacanthum utile fuerunt expecti, si in aq. ros. rut. & chelidon. dissolvatur, parum camphoræ addatur, & liquore isto Palpebra exiit tumens imungatur, quo remedio puella aliquot jam dies palpebram valde tumidam ha-

bens, ut tolli vix ac ne vix quidem poterit, & ob suffusionem ab ictu crabronis allecitat penè subfuscam, una nocte fuerit liberata.

*Cohærentia* Palpebrarum à particulis glutinantibus cum lymphæ glandulari ad oculos effusis oborta, juxta hos Auctores corrigitur & imposterum impeditur ejusmodi medicamentis, quæ viscidas illas particulas dissolvunt & liquidiore reddunt, ad quæ referunt collyria ex aqua calcatripp. chelidon. feniculi, quibus aliquot guttule spiritus æci fuerint instillatæ, ab hoc enim spiritu lymphæ illa fluidior fit & particule glutinosæ resolvuntur. Vitriolum album aquæ rosar. in pauca quantitate additum particulas illas gummosas præcipitat, & à lymphæ separat, ut cum illa oculo tam largè nequeant superfundi. Si auctæ acres particule lymphæ commixtæ ramosas fortius coagulant, & illas mitigandas volunt collyriis cum croco & lacte recente. Ex ulcere aut vulnere male curato, à particulis purulentis acerbis interiore Palpebrarum membranulam corrodentibus causatam tollunt prius instrumento cautè adacto, sine oculi tuncuram læsione, instillata postmodum aqua saphyria Chirurgorum. In Concretescentia Palpebrarum in se invicem à primo statim ortu præstare tollenda nobilium conveniunt.

Ad *Cancrum*, si nulla spes sit plenarie curationis, palliative tamen tractandum commendant remedia particulas acutas, acres & rigidiusculas transmutantia, flectentia, vim earum infringentia, & ulteriorem partis & succorum corruptionem impediencia, qualia sunt, quarum particula majori constant superficie, obtusa sunt & aliquantum porosa, ut illis commixtæ intercurrente materia subtili ita agitentur, ut priores multos angulos deponant & perdant, quo referunt caneros fluxuales calcinatos, plumbumustum, saccharum  $\mathcal{H}$ i, ejusdem amalgamæ cum  $\mathcal{H}$ o, ex quibus vel pulveres parati oculis infperguntur, vel liquores sunt cum aq. sempervi & solani, vel emplastro diaporpholyg immisceantur & imponuntur. Spiritu vini & volatili æci corroboreto locum canerosum aliquando attingunt. Existipationem ejus chirurgicam in hac parte admodum æstimant periculosa.

In *Ectropio* & *Lagophthalmo* corrigendo, miso illo, qui ex mala contigit in utero conformatione, & adhibitis antispasmodicis ei, quem convulsio causat, mala etiam consuetudine in meliorem redacta, cicatricem cutem exteriorem abbreviantem accuratè & debita circumspeditione, ne fibras musculosas cultellum fortius adigant, iterum dividunt, & lamellam plumbeam interstitio illi tandem commode alligant, donec convenientibus emplastris alia minori superinducta cicatrice fibræ cutaneis nullo impedimento futura incisio ista fuerit sanata. Hyperlarcosin interiore vel amputant, vel collyriis ex myrrha,  $\mathcal{V}$ , Glo albo, succo chelidon. aq. verben. &c. consumunt.

In *Hydatide* ut lymphæ crassiori debitu teoncilietur fluxus, & vasa aperiantur, volatilia intrus & foris adhibent, poros simul dilatantia, ut resoluti succi exhalent, & glandula palpebralis onere liberetur, quod præstat Spiritus seu Elixentia euphras. chelidon. cum spiritu Salis æci cinam.

H 3

nomi

monstrato, aut ligno aloë impregnato, & Sal volat. C. C. nec non alia diaphoretica. His succedere nolit, cutem emolliunt emplastro diachylo & vesiculam cum liquore plantæ exscindunt.

**Callos.** *Callosam* materiam itidem emolliunt emplastro diachylo vel citrino, eaque emollitâ ipsam callum abradunt, & quò facilius hoc præstetur, emplastro glutinatorio ligaculum aliquod affigunt, quo Palpebra extendi & fortius teneri possit, ne ictus intervenientes operationem impediunt.

**Calculo.** *Calculum* tentant prius resolvere emplastro ex galbano, terebinthinâ & sale gemmæ, vel ejus arcano, & si alia nequeat ratione tolli, locum aperiunt, Palpebrâ prædicto jam modo in fixiori statu servatâ, & calculum eximunt.

**Nosstram**  
**thodis cu-**  
**randi**  
**Trachoma.** § 19. *Ex nesi* à lentitiâ in affectu *Trachomate* dicto in id saltem omnes nervi intendendi sunt, ut particulae acres contemperentur, & si quæ adeo evaluto liquoris cujuscunque, is vasis suis assenderent, sublati videlicet causis, aut si hoc non procedat, diffusio tentetur, si nec hæc impetretur, per incisionem loco pellatur, maxime ubi resurgant tubercula ficiis vel miliisemina referentia. Huc & pertinent medicamenta purgantia saltem ac acre serum educentia, & his semper specifica admiscenda sunt, postea adhibeantur pororum obstructionem referentia & confirmantia.

Interne quoque conveniunt incidentia, consolidantia & discutientia pro re natâ & acres particulas temperantia, quem finem obtinere possumus per decoctâ lignorum, Essent. fumar. viperin. ocul. es. terr. Japon. cinnabarinis commixta, & in formâ pulveris sæpius assumenda.

Præ aliis hic conveniunt Topica emollientia, accrimoniâ temperantia, mox abstergentia vulgò dicta, quæ etiam sæpe sola sufficiunt, quia simul acres & acidas angulares istas obtundunt particulas, quare in affectu miliari sæpe omnem paginam supplet lac muliebre tepide applicatum. Si magis abstergere animus, & affectus pertinacior est, sequente uti potes:

℞. *∇ rosar.*

plantag. aa. ʒij.

Aloë lota ʒß.

Myrrh.

Turis, aa. ʒj.

Pulveris ʒi. gr. ij.

M. F. Collyrium.

Vel fiat, quæ sæpe satis fecit, ex sem. cydoæ. psyll. euphrat. cum aq. ros. plantag. mucilago, & tepide applicetur loco affecto. In pauperioribus sufficiunt flores lactis. Fetus quoque sicci applicari possunt, & hic nuper cum effectu applicavi linteum aqua Regin. Hung. imbutum. Abstinentium autem à medicamentis mineralibus corrolivis.

**Emphysema.** In *Emphysemate* ed incumbendum, ut motus restitatur lymphæ stagnanti, quem restitunt omnia dissolventia, attenuantia alcalia temperata, quæ acidum coagulans maxime corrigunt, & prout coagulum plus minus est forte, ratione vel acidî inspissantis, vel lymphæ crassæ subfistens, varianda sunt remedia, diaphoretica ergo hic conveniunt, quæ participant de sale oleoso tam fixo quam volatili, ut sint Essent. viperin. liq. C. C. succin. Tinctur. Qi compof. cum Sale aci. Tinctur. ʒi volat. &c.

Externè imponantur, varia dissipantia, illinatur locus spirituosis, spiritu theriacal. camphorat. spiritu C. æ. Emplastrum de Ammon. aliaque discutientia, & hic aliquando interponi possunt Cinnabarina.

Sin affectus est ex ictu araneæ, apis aut vespæ, tunc theriaca vel dialcordium per se vel cum succo chærefol. imponenda. Si ab aliâ causâ externâ, vulnere scilicet inductus, illud lege artis curari debet.

In Convulsionibus Palpebrarum externum optimum est balsamus Peruvianus, tanquam in omnibus affectibus paralyticis euporiston, ut & balsamus spasmadicus *Mysfichis*, noster nervinus externus, &c. Tr. Castorei.

**Coalitus** quod concernit, seu *Ancyleblepharum*, quamvis hic affectus rarissime curandus venit Medico, attamen non negligendus est ob periculum, quod sæpe oculis inferre potest. Præmissis ergo Universalibus, imprimis ad serum superfluum educendum radice laxativâ, quæ sæpe sola sufficit, ad ʒj. in formâ pulveris in adultioribus, in infantibus pro eorum ætate & conditione; melius verò dentur diaphoretica cinnabarina volatilia, quæ omnia siccorum stagnationem impediunt.

Inter topica in infantibus delicatissimis sæpe sufficit lac maternum oculis tepide instillatum. Ad viscidam lympham attenuandam conveniunt varia volatilia. sic sæpe cum magno emolumento appofui oculis clausis linteum sequenteliquore tinctum:

℞. *∇ junic.*

chærefol. aa. ʒi.

Regin. Hung. ʒij.

Sal. C. C. volat. gr. iij.

Tinctur. croci ʒß.

M. D.

Si à pure ex ulcere quodam abdito emanante, puris acidum corrigendum balsamo Quis anisato, & imponi potest emplastrum de Charitate vel man. Dei. Hoc etiam in affectu sæpe instrumenta chirurgica ad sepiandum requiruntur, quod ex ipsâ inspectione patebit, non necessaria erit nec ne. Palpebræ si invicem abortu concreverint, & oculi tunicis non adhæreant, ex tactu etiam de oculi latentis iusta conformatione, emplastris glutinatoriis attollendæ sunt, & instrumentum illis debito loco inter cilia infigendum, & per vices ita adigendum, ut sine ulla oculi læsione commode valeant separari.

Quod attinet *Cancrum* Palpebrarum, omnia *Cancrum*, ea conveniunt, quæ diximus capite generali de Cancro, sed excisio hinc in locis ob fibrillas nerveas valde est periculosa, & optimum Anatomicum requirit: sic & *Callos* in eadem enati, ut illi, qui in aliis corporis partibus generantur, curari solent, de quibus vide infra.

In *Ectropio* si Palpebra inferior apparet instar *Ectropium*, carnis rubræ, & est hyperæcrosis facieque inversionem, curatio est difficilis & vix expectanda: dissolutio externa cum levi attritione optima sunt, conglutatum albumen ovi cum momento aluminis, Ungu. diapompholyg. diapalm. *∇* plantag. cum Siefalib. externè applicata, quæ & acidum corrigunt. Hæc non juvantibus caro excrefcens aut tumor sui ablationem, si possibile, exigunt, quæ tamen causæ & blandè instituenda est, maxime ubi res agitur cathæ-

catueticis, quod ferè fieri solet, vel filo ligetur.

Si affectus ab ulcere vel vulnere, tum eo curatio dirigenda est; si ex restagnatione humorum ab acido, ea promovenda, & acidum corrigendum & temperandum blandioribus anodynis, emulsionibus & mucilaginis ex sem. fœnigr. &c.

*Lagophthalmus* si est à convulsione, antispasmodica tum interna tum externa conveniunt. Interna sunt liq. C. C. succinat. Cinnabarina, imptius pulvis psalmodicus, &c. Externè profunt emollientia & temperantia nervina, Balsamus meus Divinus externus, quo pluma fibrilla Palpebrarum illini possunt, ut & axungia viperina.

Si à cicatrice, curam eam nullam admittere existimo, ut & illum, qui est à malâ conformatione à teneris. Si est à consuetudine puerorum in cunis sursum versus respiciendum, ea contrario visa corrigitur, cunas circa caput obscuran-

do, & circa pedes lucidum aliquid ponendo. Si est à vulnere vel ulcere, ea curenanda sunt.

Si *Hydatis* est recens, solâ salivâ jejunâ saepe *Hydatis* abigi potest, sed curatio ut plurimum sectione ejusmodi substantiæ superfluae, illæsi vicinis partibus, peragitur, hinc salmansum loco, unde excisio facta, imponatur, quod tabescere facit materiam, ne renascatur: quæ sectio facilius perficitur, si peculiari membrana inclusus est tumor; sectione factâ imponi possunt albumen ovi in aq. rosar. solut. & Emplastrum defensivum acidum corrigens.

*Calculi* Palpebrarum si non emolliiri & discuti possunt, excindi debent, & procedatur ut superius in aliis iam docuimus.

Sic & *Calli* Palpebrarum cataplasmatibus resolventibus & emollientibus abigantur, de quibus præter ea, quæ in præcedenti paragrafo jam sunt prolata, alibi abundè dicitur, tædet enim toties repetere remedia.

## CAPUT VIII.

## De Morbis Ciliorum, Hordeolo scil. Grandine, Madarosi,

*Trichiæsi, Phalangosi & Phibriæsi.*

## §. I.

**E**xcrementis Palpebrarum, reliquâ substantiâ cartilagineosioris, id præstant commodi, ut Pili, una cunctis Cilia dicti, instar paxillorum illis foris infixi, oculos custodiant, ne tam facile aliquid externi in illos irruere possit, suntque præterea oræ quædam maximè aptæ, ut conformis claudi, & sine difficultate denuo referari possint, cum impediant, ne una Palpebra inter clausuram supra alteram deducatur, & sic, cum denique aperiri debeant, aliquam creent molestiam. Ut autem hoc suo bene fungi possint officio, à morbis debent esse immunes, quos propterea hic examinabimus, & quomodo tolli vel corrigi possint, paucis ordine edoccebimus, & Invis cognitur. sequi Veteres, qui certe nimis curiosi fuerunt in exco-

§. 2. *Partes offensa* sunt Cilia, extrema illa Palpebrarum partes externæ, semicirculares & veluti cartilagineæ, quæ in somno clausis oculis committuntur. Iis pili semper, ferè eandem servantes magnitudinem implantantur.

§. 3. Affectus hi omnes facile in nostros incur-  
*Diagnosis.* runt oculos, & ex eorum jam datis descriptionibus cognoscuntur.

§. 4. Quoad *Causas* horum morborum, *Galenus* & *Aetius* contendunt, *Hordeolum* produci ab humore phlegmatico & crasso cum lîngine mixto & ad partes has pro nutrimento delato.

*Grandinis* causam statunt peculiarem quandam materiam lapidescentem à facultate quâdam specifica in substantiam illam duram & translucentiam insubstantiam.

*Trichiæsi* & *Phalangosi* causam ponunt humorem copiosum & pituitosum à facultate ex-  
*Trichiæsi* pultrice ad Palpebrarum hæc partes extremas *Phalangosi* detrusum, vel ob tumorem diuturnum ibi collectum, tum etiam, imprimis *Phalangosi*, vitiolam & diuturnam deligationem, vel defectum humiditatis & exsiccationem cartilaginis, quam sequitur cutis quædam versus Cilia depresso.

§. 5. *Chymici* dicunt *Hordeola* & *Grandines* esse portiones calculosas & Teas congelatas in Ciliis, sic *Paracelsus* dicit *Grandinem* esse generatum aliquid per saltem.

*Trichiæsi* & *Phalangosi* ab alimento partis superfluo oriri docet idem *Paracelsus*, hoc enim in excrementum abiens materiam præbet istis pilis copiosioribus.

§. 6. *Helmontius* ipsius *Hordeoli* causam statuit mucilaginosum quoddam nutrimento maxum & inspissatum, *Grandinis* verò sal aliquid cum nutrimento ad Cilia translatum, quod partem artodens aliquam ejus portionem lubegit & postmodum fuit coagularum.

*Trichiæsi* & *Phalangosi* causam imputat abundantiam nutrimenti proprii pilorum in ciliis, *Phalangosi* cum *Trichiæsi*.

*Hordeolum.*

*Grandis.*

*Madarosi.*

*Trichiæsi.*

*Phalangosi.*

*Phibriæsi.*

# 64 ENCYCLOP. CHIRURG. RATIONAL. LIB. I.

cum enim illud sit copiosius, quam ut pili jam constituti eo alantur, Archetus novam ex eo producit pilorum seriem, qui postmodum ut alii sua vivunt quadrat, & alimentum cum reliquis ordinario accipiunt.

**Ex mente Villifii.** §. 7. Villifius vult *Hordeola* & *Grandines* excrefcere à succo nutritio particulis crassis, viscidis & terrestribus scatente, & lymphâ acidiorē eas cum condensante & inspissante.

**Trichiasis.** *Trichiasis* verò & *Phalangosin* deducit à copiâ ejus succi nutritii ad glandulas pilorum delatâ, unde novi quidam furculi exsurgunt, qui ab aliis sæpe ad locum inferiorem verius oculos depriuntur.

**Intra Syt.** §. 8. Sylvius à succo austero ad cilia cum sanguine aut lymphâ transiit *Hordeola* & *Grandines* produci judicat, vel extrinsecè ad partes illas veniente, quæ nutrimentum coagulat & in densa istiusmodi tubercula inspissat.

**Trichiasis.** *Trichiasis* & *Phalangosin* causam adscribit sanguini nutriendi ad radices & glandulas pilosâs copiosius affluenti, ut ita ex superfluo, quod in reliquorum alimentum non absorbitur, alii & novi producantur.

**Corsejani.** §. 9. Corsejani causam *Hordeoli* dicunt particulis succi nutritii crassiores & fuliginosâs, quæ per diaphorē exhalare deberent, at ob injuriam quandam externam, sæpe impuritate pinguiorem digiti tangentis, contractis aut impletis poris intus manent, & motu privata per solam quietem sibi invicem arctissime coaglutinatæ tubercula ista representent.

**Grandines.** *Grandines* ortum habere putant à gutta quadam majore lymphâ spissioris è ductu suo effusa, quæ à materia subtili omnia penetrante aliquid quantum agitata & rotata, accedente tandem liquore quodam acido-austero, seu multis particulis acutangulis & rigidis prædita, quæ materia illa subtilis flectere nequit, ab eo in motu impeditur, & ad quietem impellitur, unde coagulatio illa & grandio oboritur, qui pellicula quadam idem aliquando obductus esse videtur, quod exteriores partes interioribus citius moveri desinant, & hinc duriores, & solidiores evadant.

**Trichiasis.** *Trichiasis* oriri tenetur ab abundantia materiæ illius fuliginosioris, quæ peculiariter nutriuntur pili, cum reliquo succo chyloso nutriente ad corpora ovalia circa radices pilorum deposita, quare, cum nequè consumatur ab aliis pilis jam existentibus, neque alias exhalat, novi quidam furculi pilosi ex ea exsurgunt.

**Phalangosin.** *Phalangosin* vel à lymphâ crassiori & copiosiori, inter externam palpebrarum cutem ad cilia effusa, & eandem laxante, vel à siccitate cutis interioris ex defectu lymphæ lachrymalis eam irrigantis produci æstimant, ut ita cilia curvevant, & pili intus ad oculum flectantur.

**Nos.** §. 10. Nos existimamus, ex alimento plus minus alterato oriri *Hordeolum* & *Grandinem*, ut tumores alii peculiari membrana inclusi, materia enim illa, ex qua isti producuntur, vel à proprio alimento viscido acido, vel à lymphâ tali acida condensata, in talem gypseam aut crystallinam abit duritiem.

**Maderoseos.** *Maderoseos* causam vide superius in desfluvio capillorum.

**Trichiasis.** *Trichiasis* oritur à succi nutritii in glandulis nimis turgidi ad Palpebrarum extremitates in pilos superfluos abeuntis copia majori; sed

quoque accidit ob tumorem diuturnum, seu ob deligationem.

**Sic & Phalangosin.** ubi duplex vel triplex conspicitur pilorum acies, itidem à succi nutritii pilorum abundantia oboritur.

**Phthiriasis.** *Phthiriasis* causæ ad nauseam dictæ sunt in *Phthiriasis* Encycl. Med. Pract. de Morb. Infant.

§. 11. Sed jam satis de horum affectuum causis dictum est, pergead eorum *Prognosis*.

*Hordeola* & *Grandines* in initio sunt curatu faciles, at ubi inveteravit malum, & in gypseam, raphaceam aut crystallinam duritiem concrevit, vix sanationem admittit, & si propria continetur cysti, vix humor intus contentus ad supurationem perducitur potest, reveri insuper tolet in iis, qui semel illis laborarunt. Reliquorum affectuum prognosin patet ex capite de Pilorum desfluvio.

§. 12. Diata hic absolvitur legitimo sex re-

rum ab antiquis dictarum non naturalium usu, quo de videlicet præcedens caput. Carnes suillæ, pingues ac aliæ adiposæ, caseus recens copiose ingestus, pomacrua aliique fructus arborum, cerevisia crassa, ac lacticia in pulvis cocta angue pejus fugienda sunt, hæc enim omnia succos flagrare faciunt.

§. 13. Ipsam curam *Pharmaceuticam* & *Chirurgicam* quod attinet, *Galenicus* in *Hordeolo* adhibent emollientia & discutientia, forum nempe ex chamomilla, rad. alth. sem. lin. vel solo *Galenicus* hordeo. Gumm. Galban. & Ammon. aceto solutum, addito paucis nitri, apponunt. Si emolliiri nequeat, vel suppurant, vel sectione tollunt.

In *Grandine* similiter ejusmodi emollientia *Grandines* usurpant, digerentia, discutientia & resolutiva, prioribusque subungunt emplastrum diachylon cum gumm. vel filii Zacharie, si verò illis credere nolit, pergunt ad sectionem.

In *Trichiasis* præmissis universalibus *Trichiasis* ipsos pilos superfluos forcipe evellunt, & medicamenta adhibent eorum regenerationem prohibentia, vel medicamentis corrodentibus auferunt, quæ tamen hac in parte cautè sunt applicanda, ne oculi timicas ardant. Gumm. hederæ in aqua euphras. solut. conveniens æstimant. Laudant etiam cineres hirundinum & lumbricor. terrestr. cum succo brassicæ & album. ovi applicatos.

In *Phalangosin* initio focus instituitur emollientes, hinc cilia attollunt, & ut sublatis manent pili, subadstringentia adhibent ex nuc. cupressi. jugland. ferment. alum. &c.

§. 14. *Clymici*, & inter illos maxime *Paracelsus* & *Grandines* sæpius urina calida cura hordeoli, putat enim ab oleo, quod est in urina, omnivaria ejusmodi tubercula ex sale resoluta & denuò coagulato oriunda optime resolvi & abigi posse.

In *Trichiasis* eadem ipsa in usum revocat medicamina quæ superius capite 2. de Pilorum inconcinna excrefcencia jam percepimus.

§. 15. *Helmontius* ad *Hordeola* & *Grandines* *Helmontius* abigendos inprimis laudat lixiviosa & alkalia, quæ omnium optime eorum resolutionem præstare posse confidit, quare haud parvi facit ipsorum cinerem muleræ, ut vel inspergatur, vel cum succo quodam subactis instat linimentum illinatur; sic etiam affricat tuberculum mase obruncata canique specifica quadam virtute juvare credit.

Ad



*Trichiasis.*

Ad pilos in *Trichiasis* exstirpandos commendat alios pilos è cadavere spontaneâ morte sensim sublâti evulsos, his enim si pili superflui attingantur, eos pariter excisuros promittit.

*W. lili raris curandi Hordeola & Grandinæ.*

§. 16. Secundum *Willisium* curantur *Hordeola* & *Grandinæ* attenuatis particulis crassis & viscidis, & correctis lymphâ acidâ inspissante, adhibitis sanguinem purificantibus exsuperioribus jam notis; ipsis tuberculis applicat vel emollientia ex gummi, vel consumentia ex vitriolo, melle & cerâ vel terebinthinâ.

*Trichiasis.*

In *Trichiasis* pilos superfluos eradicatori vult, sive per evulsionem id commodius fieri possit, sive per medicamenta superius indicata.

*Sylvius raris curandi Hordeola & Grandinæ.*

§. 17. *Sylvius* tubercula ista curaturus intus exhibet saliva volatilia acidum illud austerum corrigentia & subtiliantia. extus autem emplastra emollientia ex gummi ammoniaco, galbano & terebinthinâ.

*Trichiasis.*

Pilos superfluos in *Trichiasis* evellit usurpatis prius medicamentis emollientibus & poros dilatantibus, postea adstringentibus, ut ocludantur & angustentur, ne noviterum propullulent.

*Nix a Car. tesiano Curatio Hordeola. V. M.*

§. 18. *Car. tesianorum* ratio curandi *Hordeola* est, ut succus ille spissior resolvatur, attenuetur & fluxilis reddatur, quo per poros apertos exhalet, si verò id obinari nequit, emplastro de gummi ammon. aut cerato citrino emolliunt & lancetâ aperiunt, ut liquor crassus effluat, vel linteolo exprimatur, hæc aqua rosar. & verben. in quibus camphora & sacch. canch. soluta fuerint aliquoties ablunt.

*Grandinæ.*

Similiter si *Grando* in superoculis ciliis ob membranulam, quâ aliquando obvolvitur, crassiores per emplastrum diachyl. simpl. aut cum gummi nequeat resolvi & dissipi, emolliunt tamen aperiunt, aliquantum exprimunt, & eodem ipso emplastro diachyl. iterum sanant, relictis fortioribus absummentibus oculis facillè novam intereruntibus.

*Trichiasis.*

In *Trichiasis* emollientibus poros aperiunt, & sudoriferis succum pilos nutrentem subtiliant, quò per apertos poros facillè abeat in auram, ipsâ verò psilothra cautè admittunt, & potius in altum quodammodo ductis Palpebris, pilos superfluos evellunt, quod emolliis fibris & poris dilatatis haud ita difficulter obtineri posse sibi præsumunt.

*Phalangis.*

*Phalangis* juxta mentem horum Autorum ex incurvatione cartilaginis versùs interiora dependens, curatur, vel lympham crassiorem exteriori cuti suffulam attenuando sudoriferis & externis dissolventibus, foru flor. iambuc. & Camomill. in aqu. c. coct. addito spir. vini; vel emolliendo cartilaginem interiorem, ut facilius extendi possit; quod si sponte non contingat,

emplastris glutinatoriis externè supercilia affixis Palpebra filis attollenda est, donec debitum situm & figuram decentem recuperaverit.

*N. lili in Hordeola & Grandinæ.*

§. 19. Quoad *Nosstram* sententiam, cura in his tuberculis consistit in eo, ut ab initio omni operâ contendatur, ut resolvantur & discutiantur, & simul acidum temperetur, hæc ergo pertinent omnia, quæ crassum attenuant, coagulum solvunt, & viscida incidunt in quem finem admovenda sunt remedia aciora & sale volatili participantia, ut volatilitate sua in poros penetrent; Essentia ergo viperina, spiritus vini Clat. lumbric. ☞, & ci, conveniunt, Emplastra quoque imponi possunt ex ammoniaco cum axung. viperar. gallin. vel terebinthinâ & cera parata, aut imponendum galbanum cum momento nitri subactum, vel emplastr. Apostol. Sic ab initio plura hordeola sanavimus singulis matutinis horis ægri propriâ saliva inungendo, saliva enim constat sale volatili. Alii granum hordei, jejunio ventriculo sapius masticatum imponunt, at non hordeum, sed saliva sanat. Vel malaxetur Emplastrum de melilot. & de gummi, carann. cum ol. philol. & imponatur.

Si discuti vel emolli non possunt, & jam in gypseam concreverint duritiem, aperienda sunt hæc tubercula, ut contenta materia diffusetur aut exprimatur. Si exiguum tuberculum sit, traiciatur acu filum trahente, quod in plaga relinquatur, ea longitudine, ut ejus extrema glutinante emplastro affigi possint, ad frontem quidem, si in superiori palpebra tuberculum infederit, aut ad genas, si in interiori. Novum verò bi duo quoque substituendum, ceu in setonibus chirurgicis fieri solet, sic enim tuberculum complanabitur. Postripiente curantur hæc tubercula sectione.

*In Madar. r. In Trichia.*

In *Madar. r.* conveniunt omnia ea, quæ in De-  
fluvio pilorum diximus.

Sic & in *Trichiasis* omnia psilothra conveniunt, quæ idem diximus superius, sed cautè adnotandum ea in hac parte corporis tenerrimâ cum aliis prudentioribus volumus applicanda, & non nisi oculis studiosè proximius, ne quid inde accipiant damni, quin totaliter quoque extinti possunt pili per evulsionem forcipula aut volfella quadaam apertè administrandam, dein locus mungatur sanguine ranarum viridium, vel cum aqua calis vivæ.

*In Phalangis.*

In *Phalangis*, ubi duo vel tres pilorum ordines exurgunt, & oculum pungunt, eadem requiruntur remedia, ut & illa, quæ in Encycl. Med. Pract. capite de Phthiriasi in genere diximus, hic repetantur, ad Ciliorum hanc particularem *Phthiriasin* abigendam.

## CAPUT IX.

## De Vitio Carnis Oculi Angularis, Rhyade, Encanthide,

Æglope &amp; Fistulâ lachrymalis.

## §. I.

**A**ngulos oculorum nunc progredimur, ut & ex iisdem conquiramus & in apri- cum proferamus latentes ibidem affectus, nec ullus relinquatur, quem non fuerunt ri-

mati, ejusque corrigendi modum manifesta- verimus & ex quidem ex parvo hic spatio non parvi aut vilipendendi nonnumquam exsurgunt hostes, magnam sæpe devastantes viciniam, at-

que ingentem lachrymarum torrentem prolicientes, ut ex sequentibus patebit, in quibus iterum excogitandis commendanda potius quam laudanda Veterum curiositas.

*Rhyas*, seu *Rheas*, & describitur, quod sit caruncula lachrymalis secundum majorem angulum immittitur, cum notabili, continuo & involuntario lachrymarum effluxu.

*Encanthis*. E contra *Encanthis* est intumescencia caruncula lachrymalis, cujus dein differentie observantur, siquidem interdum hoc carnis incrementum benignum est & tenerum, laxum & sine dolore, aliquando verò malignum, durum, inaequale & cum dolore punctorio.

*Aegylops* vel *Anchylops* est caruncula lachrymalis in cantho majori oculi existens exulceratio pus continens, quod erumpens aut os exedit, aut ad angulum, aut usque ad nares defluit, & *Fistula lachrymalis* inducit, quae describitur, quod sit ulcus profundum, angustum, inveteratum, & ut plurimum intus membranâ aut callo obductum.

Apud Autores hi affectus saepe confundi solent, sed ritè sequens inter illos notetur differentia. *Anchylops* est tantum tumor glandulatum, in *Aegylope* tumor est exulceratus, *Fistula* dicitur, cum ulcus jam inveteratum sit. Differunt itaque, sed diffinitat secundum majus & minus.

*Pars affectus*. §. 2. *Pars off. &c.* hic sunt anguli oculorum, vel canthi, estque oculi pars communis superioris & inferioris palpebrae, vel est extremum utriusque palpebrae connexum. Habet autem uterque oculum angulum duplicem, unum majorem juxta nares, sub quo caruncula lachrymalis, *Encanthis* propterea dicta, delitescit, alterum minorem juxta tempora, Hircum dictum.

*Diagnosi*. §. 3. Affectus hi per se patent, & ex eorum descriptionibus datis abunde cognosci possunt. Adnot etiam in his affectibus tumor, durities, dolor, humiditatem ab oculo defluxus, gravitasque cum lippitudine.

*Aetologia secundum Galenicum in Rhyade*. §. 4. Oritur *Rhyas* juxta veterum *Galenicorum* sententiam, à catarrhis acrioribus à capite ad oculum fluentibus & carunculam illam depauperantibus, nonnunquam ab humoribus exedentibus ex ulcere generatis, sicut absque illis à defectu alimenti eandem flaccescere & diminui posse non minus affirmant.

*Encanthis*. *Encanthis* ortum adscribunt sanguinis nutrientis majori copia ad carunculam hanc transmissae, & praecedenti duxte laetiori multum sanguinem in corpore generanti, ex quo facile ejusmodi hyperaercolis & caro luxurians producat.

*Aegylops*, *Anchylops* & *Fistula lachrymalis*. *Aegylops* primum ortum assigant humori phlegmatico, qui cum nutrimento ad oculi hanc partem affusus in caruncula tumorem vel mellem, vel sebaceam, vel pustulaceam substantiam continuentem excitet, qui *Anchylops* propriè vocatur, postea affluente sanguine calido & acri tumorem inflammari & tandem suppurari dicunt, sicque *Aegylops* oritur, ex quo deinde acrimoniâ humorum accrescente, vel medicamentis corrosivis applicatis facili exulceratio & *Fistula lachrymalis* carunculam planè ad fundum usque perforans sublegetur.

*Paracelsi sententia*. §. 5. *Paracelsus* causam *Rhyadis* deducit à nutrimento ob defectum salis naturalis exortui

ad sustentationem caruncula inidoneo, unde flaccescat, vel à sale peregrino ex nutrimento corrupto generato, carunculam absorbente.

*Encanthis* causam ponit excrementiam quandam ex venis Jovialibus oriundam, & ad regiones lucidas solares excurrentem, dum spiritus Jovis è propriâ viâ deviat, & splendoribus solis microcosmici concussus in generationem hujusmodi excrementiæ transmutatur.

*Aegylops* oritur ex nutrimento corrupto & morte salis nutritivi, hinc excrementa carunculam augent. & sal alienum ex illis exurgens eandem exulcerat, & progrediendo vicinas partes perfodit, unde *Fistula lachrymalis* emergit.

§. 6. *Helmontius* in *Rhyade* accensit cruorem male nutritum, vel ejus defectum, unde caruncula destituta isto suo alimento flaccescit, vel à malo & corrupto latice exeditur & consumitur.

*Encanthis* fit à latice copiosius in carunculam influente carumque extendente, accedit etiam Actheus irritatus & incandescens, laticeum fortius agitans & carunculam distendens.

*Aegylops* à fermento quodam deleterio cruorem corruptum exoritur, qui cruor postea in corrosivum saniem abit, à qua ulterior devastatio & *Fistula lachrymalis* exicitur.

§. 7. *Villissius* causam *Rhyadis* dicit serum salinum & acre per vasa lymphatica ad glandulam hanc in angulo dextro sitam delatum, à quo ipsa glandula absorbatur, ut valde diminuat, atque ad suscipiendum ulterius serum inidonea reddatur, hincque lachrymarum illum effluxum involuntarium obtingere.

*Encanthis* causam existere vult majorem serici aut lymphae copiam, ad glandulam praenominatam è vasis suis effusam, glandula enim instar spongiae eam imbibens intumescit & turgida fit, interdum etiam à particulis corrosivis laeditur, & succus nervus eidem affunditur, à quo deinde nova quaedam excrementa oriuntur, sicque ejus magnitudo similiter augetur.

*Aegylops* oritur à particulis corrosivis, vel ex arteriis cum sanguine, vel è succo nervo ad glandulam delatis, quae in saniem mutata glandulam exulcerant, & puncta lachrymalia novum modo corrumpunt, sed cum tempore ad ipsam canaliculum & os nasi subeunt transcurrent, easque partes perforando *Fistulam* constituunt lachrymalis.

§. 8. Ex *Sylvii* sententia *Rhyas* oritur ab humoribus acris vel muriaticis vel acidis, circa glandulam stagnantibus & eandem detodentibus, hinc ipsa consumitur & decrescit.

*Encanthis* autem vel ab humoribus copiosis ortibus quos glandula imbibit, exoritur, vel à sanguine nutrientissimo, quo substantia ejus augetur, & potissimum fit, quando glandula vel à sero acri, vel materia purulenta, prius exesa, hinc ulcere sanato, denovo nutrirî incipit, cuticula enim detracta nutrimentum intra limites debet detineri nequit, sed latius diffunditur & excrementa carnea exurgit.

*Aegylops* item ab acido acri glandulam profundius perforante, & à pure intus collecto producit, & si malum increseat, ut ipsum os nasi exedatur, & puncta lachrymalia occalescant, exoritur ulcus profundum, quod *Fistula lachrymalis* dicitur.



# CAP. IX. DE VITIIS CARN. OCUL. ANGULAR. 67

*Coris-  
anum  
sentia de  
causa  
Rhyad.*

§. 9. *Corisiani* particulas angulosas acutas vel cum lymphâ per arteriolas ad glandulam in oculi cantho maiore existentem depositas, vel externè cum aëre aut medicamentis aliis rebus oculo illatas, vel ex ulcere oculorum progenitas, ut causam in *Rhyade* acculant, puntautes, easdem assidue poros glandulæ permeare, & angulis suis acutis parietes eorum radere, donec destructis fibrillis illa planè dissolvatur & funditus corrosa secedat.

*Encan-  
thi-  
da.*

*Encanthidum* oriri volunt à lymphâ illâ crassiori, in glandulæ poris diutius hærente, & fibrillas illius aut membranam extendente, vel à succo nutritio copiosius ad eam transmisso, dum post exulcerationem denuò sanefcere incipiens, inapris capit incrementum, alteratis & dilatatis per corrosivas particulas prioribus vestigiis, & moleculis eidem appositis.

*Aglypis  
& Fistula  
lacrymalis*

*Aglypis* & *Fistula lacrymalis* causam eandem statuunt particulas acutas, acres, fortius agitata, & non modo glandulam, sed cum punctis lacrymalibus ipsam cancelliculum exedentes, continuitatem harum partium solventes, & rimam illam seu fistulam in nares detegentes, quin os narium erodendo eandem dilatantes, simul etiam angulis suis fibras membranarum oculi pungentes, & ita continuum ferè lacrymarum effluxum prolicientes, qui eo est largior, quo caruncula eam aliis impediens magis est vel imminuta, vel consumpta.

*Nos-  
tra  
sentia  
de causa  
Rhyad.*

§. 10. *Nos* existimamus, quòd *Rhyas* utplurimum ortum habeat à proprii sui alimentis defectu, partem, seu carunculam non nutriente, vel à particulis acris & acidis eò delatis, partem corrodentibus, hinc facile hic affectus excitatur post variolas vel epiphoram, vel ulcera profunda, eò enim delatae particulae hæ acres, substantiam carneam abraderent. & sic maiorem oculi angulum five canthum imminuere possunt, huc faciunt medicamenta corrosiva vel venena, hisce partibus incaute adhibita. Sic & lymphæ acris per ductus lacrymales eò delata, & continuo istas partes allabens, hunc affectum producere valet.

*Encan-  
thi-  
da.*

*Encanthis* vel intumescencia carunculae maioris anguli oritur ex nimio alimentis effluxu, ejusque stagnatione ab acido facto, sæpe fit ex mala *Pterygiorum* curatione, quo & pertinet lymphæ per ductus lacrymales eò delata ab acido ibidem latente coagulata, præsertim ubi jam spiritus animales ob obstructiones fibrillarum harum partium avolare coacti fuerint, & sic circa has partes necessario tumor stagnat, & eadem intumescencia inducere debet.

*Aglypis*

*Aglypis* causa plerumque existit circulario humorum læsa, & acrimoniae fero & sanguine expirans, circa canthum imperium sibi rapiens, ibidem stagnans & tuberculum excitans, (natura enim cysti propria includitur,) quod acrimonia diu hac in parte hærens succum etiam nutritium tandem degenerare facit in succum vitiosum, qui successivè collectus dat tumorem continuo in ileum degenerantem.

*Fistula  
lacrymalis*

Ulcus etiam hoc facile abit in fistulam, & ob acrimoniam & acidi copiam ipsam cariem ossis inducit. *Fistula* enim lacrymalis oritur, quod porci varum vicinorum detorsit, & sæpe rupti sint, ita ut particulae feri acriore transmittant, quod in partibus vicinis ob angustos tubulos hærens acido suo aut particulis suis salinis corrosi-

vis carunculam perfodit, unde puncta lacrymalia occalescunt, aliaque graviora produciuntur symptomata, & glandulae in his partibus quasi excavantur.

§. 11. Hi affectus sunt difficiles curatu, ob vi-  
*Prægnis.*  
cinitatem nobilissimam hujus partis, oculi nempe, si verò in fistulâ lacrymalis ulcus fuerit cancrum, nulla curatio tentanda, ne Medicus vel Chirurgus sanæ suæ maculam inurat, quia incurabile est tale malum.

§. 12. *Diatæ* sit, uti in aliis tumoribus vel ulceribus, sæpius jam dicta, abstineat patiens à frigidis & acidis nutrimentis, quia hæc sanguinem aliosque succos inspissant, & ad motum seu circulationem ineptos reddunt.

§. 13. Ad ipsam itaque *Curam Pharmaceuticam* & *Chirurgicam* properantes, à Galenicis vestigiis antiquitatis causa ordinem consulendi inchoabimus, quorum unanimitas ferè est sententia, ut in *Rhyade* ad humorum acrimoniam temperandam, & humorum noxios educendos, *niros* in præmissis aliquando universilibus, purgantibus imprimis & serum acre educentibus, adhibeantur medicamenta sarcotica & consolidantia, ut non modo ulcus sanetur, sed caruncula denuò, si possibile sit, succrescat & conveniens capiat incrementum, quare huiusmodi prius applicat collyrium, quod constet ex resin. latic vitell. ovi cum aq. rosar. & plantag. agnatus, ut formâ liquidâ facile oculo immitti possit. Hoc aliquoties adhibito ad lequens accedunt linimentum magis adhuc sarcoticum:

*℞. Tut. pp.  
Sarcocoll. nutrit.  
Thuris aa. ʒss.  
Plumb. nſs.  
Alei.  
Myrrh. aa. ʒj.  
Pulverisatæ excipiantur melle rosaceo, & loco  
officis applicetur.*

*Encanthis* ut corrigatur, similiter vitiosos humores educenda quandoque præmittunt, *ve-  
thide.*  
næsectionem itidem & vesicatoria nucha adhibita, ut nimius humorum minuatur affluxus, hincæ usurpant medicamina topica, quæ partem carunculae superfluum imminuunt, sed non in totum absumunt, alumen videlicetustum, asustum, autiam onium & pumicem combustum, æruginem, cineres concharum, &c. vel formâ pulveris subtilissimi inspersa, vel aquâ aliquâ ut rosar. verben. chelidon. flor. lignis excepta & instat collyrii adhibita. His non imminuatur, ex *Celsi* adhortatione carunculam hamulo prehendant, & cultello vel fornice abscindunt, applicatis postea adstringentibus & consolidantibus ex tut. sarcocoll. bol. armen. &c.

*Aglypis* curationem instituit venæsectio. *In Anchy-  
lepis.*  
ne, purgatione, revulsione & interdum repulsionem, ut quovis modo inhibeat suppuratio, hinc tuberculum nondum cellurum vel sectione, vel caustico tollunt, escharâque decisa ulcero imponunt unguentum aureum, cui parum aluminis & antimonii ultimum sit, quando verò suppuratio nequit impediri, & *Aglypis* heri cepit, omni studio ipsam maturacionem promoven, vel inposito unguento digestivo communi, vel emplastro Apostolico, vel cataplasmate ex cepis sub cineribus coctis, & pinguetudine nullâ

subactis, additâ quâdam parte saponis nigri; rupto abscessu pus evacuant, ulcus abstergunt & mundificant oxymelle simplici, vel aquâ rosar. plantag. succo granator. in quibus mel rosatum fuerit dissolutum, additis floribus æris; ulcere mundato, carnis generationi, & cicatrici superinducenda incumbunt, vel pulvere insperso ex rad. aristol. rosund. Ir. Flor. sarcocoll. cort. thur. mastich. myrrh. vel melle exceptum pulverem instar linimenti impo-  
nunt. Ipsam autem jam existentem *Fistulam lacrymalem* ut commodè tractent, primò omnium callositati auferendæ maximè student, vel insperso pulvere alum. ust. vel applicato unguento *Ægyptiaco* cum turundâ, vel cauterio actuali locum affectum & ipsum os subiectum cariosum incurrunt, oculo adhibito defensivo ex album. ovor. in aq. ros. plantag. dissoluto, & panno lineo eidem intincto, hinc escharâ calum promouent linimento ex mucilag. cum vitell. ovi & butyro, & tandem ulcus curant sarcoticis superius paulò jam dictis.

*Paracelsi  
cura in  
Rhyade.*

§. 14. *Paracelsus* ad sal peregrinum corruptum corrigendum, & nutrimentum restaurandum mundificativa adhibet, & imprimis ea, quæ componuntur ex lapide Calaminari, sequenti modo parato:

℞. *Lap. calaminar. ablusi & puri* ʒi.

*Colcothar.*

*Qvis viri aa.* ʒiiss.

*F. S. S. S. ad quartum ignem per diem & noctem, reduc in secundam ablationem.*

℞. *Lap. huius calam. pp.* ʒi.

*aceti destill.* ʒvi.

*F. Extraculum, deinde exsiccâ istud.*

*Hinc*

℞. *Lapidis huius Calaminaris posterioris* ʒj.

*Aq. enphrag.*

*ſanc.*

*rosar. aa.* ʒiij.

*F. Collyrium per noctem, quo Rhyas seu Caruncula decrefens sapius illinatur.*

*Excrescentiam istius caruncule in Encan-  
thide tolli posse confidit ipsa tutia præparata, &  
quidem non modò ut in maculis oculorum,  
sed & in fistulis eam exhibere assuevit, nempe*

℞. *Thur.* ʒiij.

*Sol. fus.*

*Calc. vro. aa.* ʒvi.

*F. S. S. S. ad quartum gradum ignis, reduc in alkali, & cum aq. ros. vel ſanc.*

*F. Mixtura, caruncule intumescenti studiosè applicanda.*

*In Æglope & Fistulâ lacrymali potissimum curationis studiũ eò dirigit, ut excrementa & sal alienum corruptivum destruat, & sal naturale emortuum cum debito partis nutrimento resuscitet, capropter ulcus illud & ipsam etiam fistulam lacrymalem sequenti aquâ singulari frequentius abluit;*

℞. *Alum. Roch. lbj.*

*Aceti albi lbss.*

*Salis fusæ portionem unum.*

*F. Mixtura cum ebullitione usque in coagulationem, destilla.*

Hac aquâ ulcus fistulosum abluatur. Eidem ratione sequens commendat unguentum, quo fistula sæpe inungenda:

℞. *Anasthon* ʒvi.

*Ciner. fabar.* ʒij.

*Calc. ex testis ovor.* ʒiij.

*Reduc in quartum gradum reverbationis ad horas duodecim.*

℞. *Huius analtri* ʒij.

*Butyri erudi* ʒij.

*Pingued. murmentor.* ʒiij.

*F. Unguentum.*

Fidelis ille *Paracelsi* sectator *Crollius* in *Basil. sua Chym.* non modò alios morbos oculorum penè cunctos, sed ad *Fistulam* etiam miris extollit laudibus speciem suam *Ophthalmicum*, ex pluribus oculis appropriatis compositum, sicuti lapidem quoque medicamentosum encomiis haud parvis ad eandem commendat.

§. 15. *Helmontius* ad cruorem & laticem corruptos corrigendos, & debitam nutritionem suscitandam in *Rhyade* interius adhibet parata ex mumia, exterius autem aloëtica cum thure & sanguine draconis.

*Encanthis* secundum hunc Authorem immittitur sistendo ulteriorem laticis influxum, & *Archeum* ad statum quietiorem reducendo, proinde tuberculo inspergit pulverem ex tunica interiori putaminum ovi recens exclusi, & colcothare calcinato, temporibus autem inungit pinguedinem lucci piscis, quâ *Archeus* ad placidam componitur quietem.

*Ad Ægloper & Fistulam lacrymalem, adeo-  
que ipsam feruentium deleterium in iis mortificanda, præ aliis laudat fel lucci piscis, ut ulceri vel fistulæ sæpius illinatur, vel guttatim instil-  
letur.*

§. 16. *Villisus* in *Rhyade* curam eò dirigit, ut serum illud salsum & acre corrigitur, & nimia ejus copia evacuetur, vel aliò reuellatur, quare decocta ex rad. valer. fenic. lapath. verben. beton. flor. cartham. turpeth. fol. len. cort. aurant. cum vino & aqua facta laudat, postmodum decocta ex lignis & fumat. hinc velicatoria nuchæ vel brachiis applicat, & sequenti vel simili decocto consolidante & sarcotico carunculam sapius abluit, & linæola eodem humectata imponit;

℞. *Rad. Hierac.* ʒj.

*flor. rosar.* p.

*thur.* ʒiij.

*mastich.*

*sarcocoll. aa.* ʒiſs.

*gran. sumach.* ʒj.

*sang. drakon.* ʒſs.

*M. Cog. in vino, & angulus sæpe abluatur.*

In *Encanthis* præmissis aliquando purgantibus, & sanguinem purificantibus, hinc *dis-  
velicatoriis aut setonibus, ad carnem superfluam abluendam inspergit pulverem ex alumine uſto, vel vitriolo uſto vel Unguentum Ægyptiacum illinit, vel, si medicamenta hæc minus sint efficacia, carnem superfluam forfice vel cultello abscindit, & residuam carunculam aqua vel decocto quodam adstrin-*



# CAP. IX. DE VITIS CARN. Ocul. ANGULAR. 69

adstringente frequentius abluat, donec debite sit sanatum.

*Eglopa  
& Fistula  
lacrimalis*

In *Eglopa* etiam purgantia nonnunquam premitte, & reliqua in superioribus jam indicata; ad carunculam vero exulceratam abstergendam & consolidandam aquam mellis in ulum ducit, cui saccharum canthium & myrrha pulverisata sunt immixta, & si suppuratio impediri nequit, eam promovet, postmodum ruptum abscessum abstergit lixiviosus, & consolidat adstringentibus, ut plumbo uto, thur. lap. calam. alum. ust. sang. dracon. &c. In *Fistula* callum Unguento *Egyptiaco* exedit, vel cauterio escharam inducit, quâ depositâ consolidationi promovendæ incumbit antequam dictis, & ulterius additis lap. hæmatit. ceruss. sarcocoll. aloë, myrrh. &c. cum resina & cera in unguentum redactis & studiose applicatis.

*Myrrh. C.  
in Rhyade*

§. 17. *Sylvius* ad acrimoniam humorum in *Rhyade* corrigendam consultit, ut concentrantia usurpentur & mitigantia ex creta, terra sigill. lap. ss. C. C. ust. sarcocollâ, &c. quibus omnium optime humores isti attemperentur, & ulterior abscessio præpediatur, insimul debitu incrementum à laudabili sanguine expectandum promoveatur.

*Encanthide*

*Encanthidem* optime curari posse sibi aliisque persuadet, si humorum copia minuat, & sanguinis nutrientis influxus nimis inhibeatur, evacuando lympham superfluum per jalappam & mechoac. bacc. ebulli. & alia, vel sudorem proliciendi decocto ligni sassafr. quercin. junip. buxi, flor. sambuci, Herb. & summit. cent. min. posthæ ipsam carunculâ superfluitatem admittit vel alumine uto, vel unguento *Egyptiaco*, vel *Chirurgo* præcipit, ut eandem sectione prudenter auferat.

*Eglopa  
& Fistula  
lacrimalis*

*Eglopa* & *Fistula lacrimalis* curaturus idem acidum acre concentrantia, in *Rhyade* jam memorata, pusculis commendat laudibus, ulcus autem & fistulam exercitio committit *Chirurgo*, non ab simili modo tractanda, ut ex aliis superius modo intelleximus, eique simul injungendo, ut post supurationem & ulceris abstergionem non omitat pro consolidatione ea medicamenta, quorum in compositionem rutia, myrrha & saturina ingrediuntur.

*Cartesiani  
rem. Cura  
in Rhyade*

§. 18. *Cartesiani* jam in promptu sunt, ut de morborum horum curatione interpellati placide respondeant, admonentes, ut in *Rhyade* potissima locetur opera in hebetandis particulis angulosis acutis cum lymphâ ad glandulam lacrymalem illabentibus, quod impetrari promittunt iis medicamentis, quæ angulos istos poris suis laxioribus suscipiunt; eos flectunt & excitatâ quidam collutatione cuspidulas frangunt, propter sanguineæ massæ, & mediante illâ reliquis succis & ipsi etiam lymphæ insundunt dulcia, porosa & spirituosâ, Tincturam videlicet myrrhæ, Sili, ipiritum ꝑci sem. foenic. & rad. Chelidon. imprægnatum, ☉ volatil. C. C. & similia, quibus simul reliqui corporis pori aperiantur & superfluum impurum eliminatur. Angulo oculi, & ipsi glandulæ immittuntur insimul fistula porosa ex plumbo uto, saccharo saturni, lapide calaminari pp. quæ dulcedine unâ mitigant, subjunctis leviter adstringentibus & poros glandulæ istius oppellulantibus, ne ulteriorem lymphæ acutæ admittat influxum, ex rosâ, balauftis, lap. hæmatit. pp. mastich.

sarcocoll. sang. dracon. vel pulveris formâ, vel unguenti cum melle facti linteolis carptis suscepti admovenda.

Ulymphâ superflua in *Encanthide* ex carun-<sup>Encanthi-  
da</sup>culâ abigatur, rareficientia & sudorifera intus exhibent. Spir. C. C. cum essent. rosmar. ipsi etiam succum chylosum purissimum immittunt, ne copiosius admittatur, per similia diaphoretica & resolventia. tum tuberculum exedunt & consumunt, vel alumine aut ☉ uto, vel oleo ejusdem melli immixto, vel forfice abscindunt, & remanentem carunculam aqua plantag. & rosar. tinctis sanguine draconis abluunt, aut pulverem adstringentem ex balauftis, nuc. cupress. lap. hæmatit. pp. bol. ammen. corall. ust. &c. inspergunt.

*Eglopa*

Non ab simili ratione ipsum tractant *Anchylopa*, at quando diuturnitate temporis & succorum majori corruptione in *Eglopa* transmutatus est, ad particulas illas acutas valde agitas corrigendas eadem in usum ducunt, quæ in *Rhyade* jam consideravimus, insuper ut cuspidis illæ magis hebetentur, & filamenta carunculæ mitigentur & blandè in pristinum statum reducantur, insillant aliquando guttam unam vel alteram lactis, cui parum myrrhæ immistum est. Suppuratio, si non potest præcaveri, sed succus chylosus ab acido corruptus per eandem ejici debet, eam faciliat cataplasmate ex rad. alch. lil. alb. flor. chamomill. cepis sub cineribus coctis, &c. abscessum ruptum abstergit aquâ mellis, hinc consolidat linimento ex thur. C. C. ust. plumb. ust. sarcocoll. cum vitello ovi indurato susceptis. Ossis sub ecti portionem ab acutis particulis corruptam & cariâsam eximit & unguento *Egyptiaco* vel *Hio* uto posteriori corruptionem prohibent & callositatem adimunt oculo reliquo prius studiose custodito, hinc aquam Ophthalmicam auream *Mysicis*, insillant, & *Fistulam* vel Unguento *Fistula* lo *Hartmanni* ex *de viv. O* ☉, rad. lapathi, acet. *crystalis* fort. composito, vel ex thure, sarcocoll. aloë, myrrh. spod. thur. rad. aristol. melle exceptis ad sanitatem perducunt.

§. 19. Cum ordo *Nos* tangat, methodum, *Nosra Cura* <sup>in Rhyade</sup> quâ in morbis hîc citandis uti adsuëvimus, <sup>de</sup> distinctè nunc edocebimus, & quidem in *Rhyade* ad succum nutritium augendum salia adhibemus volatilia, & aromatica temperata aliis blandis immixta, quæ omnium optime restaurant & nutrimenti distributionem promovent, succum itaque cancerorum, juscula consummara, spir. C. C. cinamomif. Essent. tennic. Elitix macis intus sumenda exhibemus, ad particulas autem acidas acres corrigendas sudorifera propinamus, Tinctur. ☉ Batam, cum ꝑci succinatum, Tincturam salutaris, Bezoardicum *Oare*, & his similia, unde acres & corrosivæ particule mitigantur, & ulterior devastatio & carunculæ abrasio præcavetur, quare ipsum etiam angulum aqua Regia. Hung. aliquando abluimus, & collyria applicamus ex myrrh. aloë, thur. præsertim quando ab ulcere reliquæ quedam acres ejus erosione & consumptione cautaverint, vel etiam si post vatiolas lymphæ acrior stagnans & pusillam excitans, aut medicamenta acra corrosivâ carunculam abluerint, cui icopo etiam sequens succiat collyrium:

\*. *Mucilag. Gum. tragac. aq. plantag. fall.*

3ib.

*Succ. Cydon. 3b.*

*Pompholyg. lot. 3i.*

*C. C. ust. & subtiliss. pulverisat. 3ij.*

*Thur. 3b.*

*Myrrh. 3j.*

*M. F. Collyrium.*

Lympha quoque acris per ductus lacrymales in glandulam delata similiter venit corrigenda & mitiganda, vel lacte muliebri recentetepide instillato, vel fotu ex decocto Canomillæ, fenic. san. fœnigr. herb. rot. euphras. vel mucilag. ex sem. cydon. lin. rad. alch. &c. aliquando illinen-  
da. In specie landatur succus ex grano Parnas-  
sio viridi expressis caruncula aliquoties instilla-  
tus. Nec omittenda reliqua sarcotica, deco-  
ctum flor. rosar. rad. aristol. rot. sarcocoll. thur.  
&c. in aq. rosar. & plantag. quibus simul con-  
stringuntur vasa, ne lympham acrem ulterius  
succipiant.

*Encantili-  
des.*

*Encantili* curatio reposcit resolutionem  
tum succi nutritivi, tum lymphæ aliorumve suc-  
corum stagnantium & acidi correctionem, quod  
per volatilia & spirituosâ impetrabitur, quibus  
defectus spirituum animalium compensatur,  
dantur itaque interius Essent. & Sal volat. vipe-  
rar. liq. C. C. succinar. essent. chelidon. maj.  
spirit. æci, ambr. molechata, &c. externè discuti-  
entia adhibemus, & acrimoniam succorum  
corrigentia, imprimis quando ex malâ Pterygio-  
rum curatione malum ortum suum habet; fotum  
itaque instituius ex rad. valerian. rad. & herb.  
chelidon. herb. rut. puleg. verben. flor. sambuc.  
lavandul. beton. fenic. filer. caryophyllor.  
alœ, in vino generoso coctis, addito paucò  
camphoræ, si verò hîc discuti nequeat, &  
hyperfarcosis durior sit, superfluum ut absuma-  
tur, cauteria apponimus, oculo tamen diligen-  
ter præmunito; tangi proinde sæpius potest cau-  
terio meo indolenti, vel linteolo humectato in  
aqua calcis vivæ in vase cupreo factâ, cui ali-  
quid 3ij. ætati additum est. Si nec his cedit,  
forcepe apprehendimus tuberculum, & super-  
fluitatem forscie conveniente abscindimus,  
omni posito studio, ne nimium auferamus, &  
ipsam cartunculam valde decurtemus, ne vitium  
hoc vertatur in aliud, & malum superius jam  
curatum, Rhyas nempe, exoritur. Abcis-  
sione hæc feliciter peracta, ad mitigandam aci-  
moniam & residuum carunculatam parùm adstrin-  
gendam, vel pulverem ex ceruss. thur. cinnab.  
sarcocoll. matre perl. pp. C. C. ust. &c. paratum  
inpergimus, vel aliud collyrium ex aq. flor.  
cyan. plantag. chelidon. maj. cum sacch. canth.  
alœ. myrrh. & paucò 3i. alb. compositum ap-  
plicamus, in quo casu etiam Unguentum Oph-  
thalmicum *Myrsib.* tanquam singulare quod-  
dam & specificum cuiuslibet serio commendamus.

*Anchylor.*

In *Anchylor* etiam cura pharinaceutica con-  
sistit in eo, ut in principio tumor ille glandula-  
rum discutiatur, quod sæpe obtinere possumus  
per discutientia ex spirituosâ volatilibus parata,  
ut sunt Aqua Reg. Hungar. spirit. pan. lilig. in  
mortario æneo parum agitati in oculi canthum  
instillatus, humores etiam stagnantes viperum  
propelluntur in parte affectâ; hic & conveniunt  
myrrh. alœ, croc. cum melle in unguentum,  
vel cum aq. fl. sambuc. additis spirituosâ, in

aquam Ophthalmicam redacta, adhibeantur &  
varii fumi ex discutientibus parati, ut succini.  
Si tumor hîc discuti haud potest, tum ad ma-  
turationem & suppurationem accedendum est,  
hinc varia cataplasmata ex herb. emollientibus  
& seminibus parata applicari possunt, ut & em-  
plastra de melilot. de ammoniac. Crocat. *Myrs.*  
Sequens cataplasma semper proficuum reperi,  
quod paratur ex micâ panis albi, lacte, vel aq.  
ros. & croco, vel ceratum ex farinâ ervi & mel-  
le confectum, vel instilla in oculum aq. rosar.  
vel plantag. cum tutiâ maritata, vel lac ma-  
ternum.

Hæc si non juverint, tendatque nihilominus  
abcessus ad pepsalium sive maturationem, pu-  
vetur adnoto peptico, ut basilico, moxque cau-  
terio aut scalpello aperiatur, quia periculum est  
in morâ, vel ulcere inponatur gr. j. cauterii po-  
tentialis. *Aquapendens* habet methodum os-  
narium aperiendi & peterebrandi, ut pus per  
aperturam effluat, ne acrimoniâ sua in partes  
vicinas prosperat, easque corrumpat, verem-  
dum enim ne pus subiectum erodât hâque ex  
*Anchylor* *Æglops* & *Fistula lacrymalis*.

Sed hîc in calibus pro re nata interponantur  
temperantia, & præ aliis detur decoctum vulne-  
rarium non verò mensuratum, sed cochleatim,  
quod sæpe plus præstat quam omnia, & quidem  
optima externa. Si cauterio potentiali fuerit  
elchara inducâ, ea est removenda digestivo  
communi notissimo ex terebinth. & vitello ovi  
parato, addito pro libitu momento croci, potest  
imponi in forma emplastri cum parvaturunda.

Post remotam elcharam adhiberi potest se-  
quens vel similis ex 3ij. Atirub. p. vj. & p. j. alu-  
minis cum unguent. aur. exceptis, & toties re-  
petendum est, donec os conspici potest an illud  
corruptum vel carie infectum sit nec ne; si os ad-  
huc sanum est, exsicceat ulcus linteis carptis,  
& bis indies mutatis, & ulcus consolidandum  
& cicatrificandum. Ad ulceris acie corrigendum  
commendamus myrrhata & alœtica: Ex gr.

\*. *Trech. de myrrh. 3ib.*

*Croci 3j.*

*Aloes hepat. 3ij.*

*Cum reser. terebinth. & melle F. Unguentum.*

Alii uti solent butyro recenti ad separationem  
perficiendam. Si oculus valde rubeat, Aq. Re-  
gin. Hungar. cum camphor. proderit applicata.

In *Fistula lacrymalis* eo incumbendum ab ini-  
tio, ut pori valorum coarctentur, ne humores  
acres transmitti possint, in quem finem condu-  
cut modice adstringentia dicta, sola igitur aqua  
aluminosa linteis madefactis inponi potest.  
Cum in fistulosis his ulceribus raro curatio abs-  
que cauteriis feliciter succedat, ea propter cau-  
teriiis potentialibus cura incipienda est, & cum  
ulcus os denudavit, fistula idoneo instrumento,  
si fieri potest, discindatur, & ut in alio ulcere cu-  
rando l. a. procedatur. Imprimis conducet bal-  
sanus Saturei rubicundus vel seq. remedium ca-  
lide, dum lancetta fuerit fistula aperta, insun-  
dendum:

\*. *Elux. vitæ 3ij.*

*Sir. Myrrh.*

*Aloes aa 3iss.*

*Ammoniac. 3b.*

*Camphor. gr. xv.*

*Ol. Sabin. 3j.*

*M.*

*Gau.*

# CAP. IX. DE VITIIS CARN. OCUL. ANGULAR. 71

Cauterium meum indolens imponere soleo, quod constat ex cineribus fraxini sacculolinteo inclusis, & sic parti affectæ imposito, unde eschara nascitur, & ut eschara cadat, imponi possunt mucilagines cum vitello ovi. Quod si cauterium aduale necessarium sit, si os denudatum & cariosum fuerit inventum, partem immittatur, ut tenuis tantum decedat squamula; alij abradere solent instrumento idoneo, ne puris acrimonia poros variet, & ita corruptionem inducat. Modum urendi docet *Aquapendens*, qui in ulcus cannulam argenteam intrudit, ne oculus à ferro candente lædatur, & cannulam fortiter loco affecto applicat, ut forti compressione sensus quodammodo obtundatur, tum candente ferro ulcus exurit, usque dum os videre possimus, tunc prospiciatur, an os cariosum sit an secus, si os fuerit infectum, ulterius uratur, dein curetur ut ulcus commune. Sequens optime curat fistulam lacrymalem.

℞. *Limas, Martis,*

*Spir. Salis* aa. q. l.

Digere donec acrimonia remiserit, filtra, evapora, ad dimidium, add, aa. Sacchar. Feni, leni igne inspersa in pulv. rubrum admodum dulcem ab aere servandum. Internè conducet Decoctum Antiscorbuticum.

Exemplum novius in diuturno hoc affectu, ultra anni unius spatium durante, frustulum ossis exesi in Cancho majore oculi, una cum carne corrupta illi adnatæ, à parte sanâ sponte decidisse, & in narium cavitatem subito delapsum excretumque fuisse, unde dein nullum pus

ex istâ fistulâ, sed per viam illam in nares descendit, & quod cum tempore tandem carne obductâ coaliuit, hinc optime *Aquapendens* docet methodum, ut os narium, quod ibi valde tenerum est, subtili cerebro perterebatur, ut ita materia, pus scilicet. & lachrymæ, per nares effluat. Si caries junctæ est, tunc usque ad os fistula aperiendum, & calidè infundendum seq. medicamentum:

℞. *Spir. matricul. 3j.*

*Elis. Vice 3ss.*

*Gumm. Ammon. 3j.*

*Tinct. Castor.*

*Aff. sœtid.*

*Galban. aa. 3j.*

*Sal Q 3ss.*

*Campbor. 3j.*

*Myrrh. 3iss.*

Cum Spongia vel siphunculo applicetur sæpius, & ligetur i. a. Si hæc non juvant, ad ferrum & ignem, vel cauterium potentiale, seu diximus, accedendum est. Si verò fistula fuerit ablata, & callosæ partes consumptæ, tunc ad miora coniungendum est. ex gr.

℞. *▽ Sambuc.*

*fenicul. aa. 3j.*

*Spir. matricul. 3ij.*

*Myrrh.*

*Aloës aa. 3j.*

*Camp. 3ss.*

*Croc. gr. xij.*

*M. F. Collyrium.*

## CAPUT X.

De Tunica Adnata Vitiis, Ophthalmiâ, Pterygio, Panno & Hyposphagmate seu Sugillatione Oculorum.

### §. I.

**I**psi certè oculi in omnibus partibus suis patiuntur males, seu cælo contermino compatiuntur, indeque grassantes experiantur ignes, seu inferiori loco flamma huc ascendat. Tristatur hoc incendio, nec fungi munere suo possunt amplius, quousque facès accenduntur dolorum, & in ambitum exportiguntur ignis; Ophthalmometor quidem fundit lachrymas, hinc unde uberes domesticæ affluunt, ast alunt potius ignem, quam extinguunt. Derubore hoc flammæ oculorum *Ophthalmiæ* nomine insignito pauca hic referamus. Dicitur autem *Ophthalmia* à Græco nomine ὀφθαλμία, (oculus,) & quamvis hoc nomine sædè omnes oculorum lachrymas plures Auctores comprehendant, ut inaginat de oritur confusio, stricte tamen sumitur pro inflammatione, hinc Latini dicitur *Inflammatio oculorum*, seu *Pblegmone*, aliis etiam *Epiphora*, Celsi audit *Lippitudo*, quòd in hoc vitio lachrymæ fervidæ sunt comites & ex oculis stillare soleant. Hic asterisco notandum, quòd Lippitudo duplici sensu accipi potest, latiori, pro quacumque inflammatione involuntariâ & morbosâ, seu cum, seu sine inflammatione, unde Lippitudo modo humida Ophthalmiam denotat, de quâ *Horatius*:

Hic oculis ego nigra meis collyria lippus

Illinere.

quod etiam notus ille versiculus de eodem & Virgilio, disponat fortè laborante, exprimit:

Hic inter lachrymas sedet & suspiria *Castus*, modò de sicca Ophthalmiâ, vel pumiceis oculis accipitur eadem, quibus *Pseudolus* ille apud *Plantum Act. 1. p. m. 301.* laboravit, quando inquit:

Pumiceos oculos habeo, non quæ Lachrymæ exoratur ut expuant unam modò.

CA. Quid ita? Pli genus nostrum semper laccoculum, fuit.

Germani dicunt die *Entzündung der Augen/rotte flüssige Augen.*

Describi potest hic affectus, quòd sit inflammatio tunice adnatæ oculi, cum rubore, dolore Ophthalmiæ & illachrymatione, à sacra sanguinis acrioris aliorumque succorum ibidem imperium sibi sapientium, & fibrillarum tunice vellicantium, & commoventium.

Ophthalmiæ ratione generis tres sunt differentiæ juxta gradus, sic & ratione subiecti quoadque alteruter oculum, interdum ambo afficiuntur oculi; sic interdum sola tunica adnata, aliquando etiam vicinæ partes in consensum trahuntur; alia est à causis externis, alia ab internis; alia scilicet vulgò contagiosa, alia benigna, alia

Lippitudo  
hæc horatius  
significat.



alia epidemica, alia sporadica; quædam à motu est periodica.

**Pterygium** *Pterygium* dicitur Germanis *ein Zell der Augen* alias *Unguis*, omnesque Antecessoricas distinctiones faciunt inter Pannum & Unguem oculi, si enim tunica plana, tenuis ac alba est, dicitur *Unguis*, si est carnosior & rubicundior, tunc vocatur *Pannus*, quæ distinctiones memoriam torquent.

**Unguis seu Pterygium** *Unguis* oculi, seu *Pterygium*, describitur vulgò, quod sit membranæ, n. exterius *Tunica* oculi adnatæ affixa, seu suffusio quædam exterior, à particulis crassiss & viscidis per poros vasorum p. n. apertos ad tunicam delatis, & pelliculam hanc efformantibus exorta, & oculolum præcipitibus.

**Differen-**  
**tia.** *Differt* à Suffusione, quod hæc membrana exterius *tunica* oculi adnatæ sit affixa, suffusio verò intra oculum.

**Pannus.** *Pannus* maximam habet cum priore affectu assimilantem, estque quiddam instar panniculi rubeum, à sanguinis particulis stagnantibus nonnunquam evalatis in hanc tunicam coactum, & differt à *Pterygio*, eo quod *Ungula* sit nerveum quid sine venarum repletionem, exoritur ab angulo oculi majore. operitque oculum in formâ sagittæ, *Pannus* autem obtegit totum oculum, siue tunc cum adnatam, vel etiam corneam, instar panni rubei intertexti.

**Hypophagma** *Hypophagma* dicitur & *Sugillatio*, & est macula rubra seu livida, à sanguine de vasis suis ruptis effusa, exorta.

**Est differentia.** Aliud est à causis externis, aliud ab internis; aliud est recens, aliud inveteratum malum: hoc livefcit & nigrescit, de quibus in causis. Sic quoque adnatam hanc tunicam non duntaxat inflammari, sed & aliquando suffundi posse humore legimus in *Eph. Germ. Obs. 124. Ann. 6. & 7.*

**Parti affe-**  
**cta.** §. 2. In *Ophthalmiâ Subiectum* primarium, seu radicationis; est *Tunica adnatæ*, Ab Anatomicis dicta, album oculi constituens, levis hæc est membrana à pericranio ortum suum habens, omnium extrema atque offi proxima. *Tunica* verò hæc adnatæ afficitur imprimis quoad vasa arteriosa, venosa & substantiam nerveam. Si bene se habeat hæc membrana, vasa illa sanguinifera non conspicuntur, vel raro tantum vestigia, atamen morbus ea facile manifestat. Facile hæc membrana, ut & alia, suos patitur manes, & imprimis inflammationem subit. Secundario & afficiuntur relique *tunicæ* & musculi, ut uvea & cornea. mo humores in bulbo stant. Sic quoque hæc tunica in *Ungue* oculi & *panno*, ut & *Hypophagmate* patitur.

**Diagnos**  
**is Ophthal-**  
**mia.** §. 3. Quod felicitis curationi operam impendamus, *Signa diagnostica* præmittamus, ut re magis ita cognita in causis iudicium melius ferre queamus. In *Ophthalmiâ* ergo oculus rubore, ardore & dolore afficitur, lachrymæ plus minus pro causarum conditione & evehementia, ab humore tenui exsillant, adeit imminuta videndi actio, apertis enim oculis conuivet, nec ipsilucem videre possunt, hinc illam refrigerare coguntur, oculis enim tunidis ac lachrymis afflictis dolensque, officio suo nequaquam fungi potest, sic horis matutinis fit *Palpebrarum* coactis, qui debetur lachrymis vel humoribus viscidis noctu eo delapsis & stagnatione glutinosis factis. Quin pupilla subinde angustatur, & ungiculo obducitur crispatis fibrillis. Sæpe etiam visus depravatur, objectis omnibus rubris apparentibus & flammis. Coniunguntur sæpe dolores capitis, febris ipsa facies dolorum accensas majores sequitur, & suppuratio, nisi caveatur, succedit. Sæpe non sola *tunica adnatæ* inflammata est, sed & quibus oculi totius ejusque musculi & palpebræ. Lachrymæ tenues ita sunt acutæ, ut genas defluentes ipsas exulcerent exorientque, & oculi hoc casu quasi uri videantur, prout observavi hoc die, quo hæc scribo, in filiâ 8. annorum, quæ non tantum oculos inflammatos, sed etiam ipsas genas adeo excoriatas habuit, ut si manum aut brachium applicuerit loco affecto, ipsum brachium eodem modo ac genæ exulcerarentur, & pustulis in manibus iniceretur, ob acidum illud volatile emanans; hinc distinguimus *Ophthalmiam infernam* & *benignam*: *inferna* illa est, quæ oculi exterminium quasi intendat, tum feri rosionibus in toto capite, oculis facie emicantibus se in conspectum tradit; benigna verò mitior est.

In *Ungue* oculi membrana aliquando conspiciuntur carnosa, aliquando adiposa & membranosa, interdum albica, interdum ruber, ut plurimum ab angulo interno, aliquando ab externo, raro ab alterutra palpebrâ protenditur, & nunc magis, nunc minus latè per oculum extenditur. Ut plurimum conspiciuntur pellicula, quæ asperæ *tunicæ adnatæ* adhæret.

In *Panno* signis non opus est, apparet tanquam tela carnosa in superficie, præsertim *tunicæ adnatæ*, cui prurit, dolore, oculorum à lumine offensione, visione obscurâ vel penitus ablata.

Sic quoque *Sugillatio* seu *Hypophagma* facile *sugillatio* visui deprehenditur ex maculâ rubrâ seu lividâ, à sanguine ex venis apertis effusio.

§. 4. *Causam* horum affectuum, & quidem *Ætiologia* primò *Ophthalmia* ipsi *Galenici* statuunt sanguinis inter *tunicam oculi adnatam* affluxum, qui *Galenici* vel à causis externis, fumo nempe, solis nimio splendore, percussione, corporis motu humio, &c. vel internis, humorum, maxime bilis, acrimonia, ob epatis intemperiem calidam prouata, plethora, flatibus aliisque per venulas in cornea existentes allectis, tunicam istam annatam, aliâs albam, reddat cruentam; simul etiam humorem confluere volunt copiosorem modo ex pericranio, modò cerebro, unde non tantum dolor capitis, sed lachrymarum frequens effusio & sterminatio crebra succedunt.

*Unguis* oculi, seu *Pterygi* causam statuunt sanguinem multis humoribus crassiss & tenacibus lentis permixtum, ex partibus capitis potissimum inter cranium & cutem contentis, ad angulum oculorum maiorem defluentem, atque inaequalitatem & scabritiem ibi producentem, quam facilitas nutritrix complanare studens, maiorem sanguinis nutrientis alisque humoribus repleti adducit copiam, sicque affundendo & operiendo novam producet membranam, eamque in tantum per vices augeat, ut sagittæ instat ab angulo ad tunicam annatam, interdum etiam ad ipsam corneam extendatur.

*Pannicantiam* dicunt sanguinem vel purum, vel alius humoribus mixtum, ad oculum, & imprimis *tunicæ adnatæ* superficiem copiosius derivatum, siue ex venulis exterioribus, siue interioribus illuc perveniat, ilque vel per modum edulxus, vel congestionis, qui superficiem istius



tunicæ intertextus, pannum rubrum repræsentet.

*Sugillationis* causam proximam itidem ponunt sanguinem, vel ob sui copiam, vel venas à causis externis lapsu videlicet, ictu, contusione, vocis intentione adeoque clamore, vel tubarum inflatione, interdum aëris asperitate ruptas effusum, & modo annatæ, modo cornæ tantum, modo utriusque tunicæ albedinem simul obsecrantem, qui sanguis si multâ scateat bile, roborem in colorem lividum facillè transmutari affirmant, quòd ipse sanguis in grumos sedetu & emoriatur.

§. 5. *Paracelsus* uti ipsos oculos ex tribus constare asserit, ita etiam morbos eorundem ex tribus istis corruptis dependere existimat, nimirum vel substantiâ, vel materiâ, vel formâ, & quidem ipsam *Ophthalmiam* ex substantia deficiente produci docet, quem defectum potissimum sal quoddam vitriolatam efficit, & rodendo non modo sulcat dolorum, sed ipsum etiam oculi colorem in alium transmutat.

*Unguem oculi* ex materia produci æstimat, sale videlicet fîsso & sulphureo alido, quæ ambo sese invicem miscentia, & cum humore nutritivo per potum oculi anunctorialem transeuntia, in huiusmodi excrementum abeunt oculo sagitte aut unguis instilar adherentem.

*Panni* originem deducit à latione venarum, ex quibus sanguis effluens & tunicæ annatæ inherens, à sale quodam sylvestri coagulatur, & sic in membranulam quandam rubeam concrevit.

*Sugillationis* causam itidem à sanguine ob venas à contusione aut alia causa violenta ruptas, inter tunicam oculi corneam effuso & emoriente derivat, unde inacula ista ex exhalans sul naturale vividum exoritur.

§. 6. *Helmontius* ab excandescencia Archæi *Ophthalmiam* produci affirmat, quatenus materiam quandam occasionalem oculo illapsam expellere nitens, at non valens, seipsum accendit, & sic oculum inflammat, inferunt dolorem & roborem in signum incendii super oculum suspendit.

*Unguis* originem deducit à latice, qui cum ad sordes oculorum eluendas à natura sit destinatus, digestionum verò vel aliena vitia repetiens, ea secum defert, & in oculi angulum deponit, quæ accumulata laticeam stagnare faciunt, & tandem in novam quandam pelliculam convertuntur.

*Pannum* succreiscere putat ex diuturniore Archæi incendio, ad quod extinguendum cruor cum latice à custode partis transmittitur, at cùm fortius sit, latex ille per extinctionem non sufficit, sed coagulatione in velum quoddam transmutatur, quo ignis ille operiatur, cui tum cruor immisus, tum splendor igneus ab incendio Archæi translucens ruborem istum conciliat.

*Sugillationem* oriri æstimat à cruore extravasato ob venulas oculi diffractas, qui vitæ sodalio sensum destitutus & corruptus varie transmutatur, & spiritum vitali orbatus mutat colorem & lazureum induit, postea lîvescit & tandem planè emoriens nigrescit.

§. 7. *VVilsius* etiam *Ophthalmiam* causam ponit sanguinem extravasatum inter tunicam oculi adnatam effusum, sicque copiosius aggestum, rursus inflammationem excitantem, cui ob solutionem continui membranz istius maxime sensilis dolor superveniat acutus, rubor à trans-

parente sanguine calido, & lacrymarum affluxus, quas tamen ab ardore vehementer interdum exsiccari vult, ut lymphâ illa pro oculorum & palpebrarum lubricitate aliâs valdè necessaria planè consumatur & deficiat.

*Unguem oculi* pronafci putat à sicco nutrimento, propter asperitatem ab acrimonia liquoris lymphici, seu laticis serosi in glandula angulari & tunica annata excitatam mitigandam & levigandam, majori copia & spissiori substantia transmissio, qui postmodum in superfluam ejusmodi concrevit membranulam.

*Pannum* deducit à sanguine extravasato & liquore nutritivo invicem mistis, & inter tunicam annatam effusis, ibidemque in panniculum istum carnosum ob spissitudinē concreviscentibus.

*Sugillationis* causam statuit sanguinem extravasatum & inter membranam annatam vel corneam ab acido quodam ibidem existente coagulatam & discoloratam, itâ ut particula congruemescent nigrescat, serum autem cum portione bilis separatum, lividum & flavescentem colorem præbeat.

§. 8. *Sylvius* morborum horum causas itâ explicat, ut *Ophthalmiam* à sanguine vel in vasculis stagnante, vel ex iis intra tunicam annatam oculi effuso, & avolantibus partibus spirituosius cum acidis & salinis effervescentiam producentem deducit, quibus cùm simul partes oleosæ intermiscantur, inflammatio oritur & dolor eo quod acrimonia calida ex effervescentia illa pronata membranas & muculos oculorum vehementer agitat, & hanc sanguinis effusionem, stagnationem & effervescentiam sepe ab exteriori aëre, huiusmodi partibus acrioribus repleto, excitari & promoveri.

*Unguem* produci credit à nutrimento à sanguine oriundo, post erosionem ab humoribus actibus factam, ad glandulam angularem & tunicam annatam ex arterioli majori copia affuso, & ab acido aucto in membranam istam duriculam coagulato.

*Panni* originem itidem ex sanguine nutritivo per arteriolas tunicæ annatæ copiosius superfuso deducit, dum post ophthalmiam sanguis stagnans materiæ pingui viscidiori intermiscetur, & à acido isto austro inspissatur.

*Sugillationem* potissimum ab externa causa violenta oriri credit, contusione videlicet, lapsu vel etiam effusione aut vocis intentione vehementi, unde venula rumpantur & sanguinem effundant, qui effusus itâ mutatur, ut corpori vel oculo ulterius nulli sit usus, sed grumescat, corrumpatur & ex corruptione livorem contrahat.

§. 9. *Cartesius* causam *Ophthalmiam* ponit liquores ex arterioli in ipsos tunicæ annatæ poros effusos, sape ab acre acri prolefectos, eosdemque stagnando itâ obstruentes, & tunc exigua relinquentes spaciola, ut non nisi materia illa primi elementi per eadem transire queat, & hæc cum igne sit dispositionis, tunica illi inflammata ruborem conciliat, quod globuli secundi elementis ab eadem in superficie istius tunicæ varie circulentur, simulque rapidissimo suo motu & impetu quodam irrumpens in poros fibrillas itâ lancinet, ut vehementer exoriatur dolor, & vas ad humorum effusionem vel succutiantur, unde lacrymarum effluxus copiosior, vel urendo omne humidum exsiccat, atque sicco oculi reddantur.

K

Unguem

ng ui.

*Unguem* excrecere docent à liquore nutritio chyloso crassioribus particulis intermixto, & ob eorū vasculā à materiā acutangulā acri copiosius effuso, cuius particulæ sibi inaicem acquiescunt, quatenus ab aëre externo multis particulis rigidis referto in motu impediuntur, & invicem solā quiete arctissime junctæ in membranulam sagittatā -- vel unguem -- formem compinguntur.

Pannu.

*Pannum* produci volunt à mixturā sanguinis & materiæ nutritiæ chyloso in superficiem tunicæ annatæ effusæ, & stagnando, seu quiescendo inspissatā, ut sic intermixtis particulis crassioribus, terrestribus & austeriusculis coagulentur, & panniculum istiusmodi carnosum præsentent.

Sugillationis.

*Sugillationem* fieri censent ab ipso sanguine ex vasīs, à causis violentis dilaceratis, inter tunicam anaputam aut corneam effuso, & ob poros compressos ibidem stagnante, cum tempore, quia extra vasā exiit, corrupto & livorem inducente eo, quod pori & interstitia à parte illā sanguinis corrupti mutata globulos secundi elementi modō suffocent, modō fibrillæ intercurrentes à spiculis acidis agitatæ superficiebus suis eosdem dispergant, unde color iste lividus, & tandem, nisi discuriat, sanguine corrupto omnibus poris se insinuante, & superficiem tunicæ ita alterante & poros irregulares reddente, ut globuli isti eo propulsi penitus suffocentur, ipsa nigredo succedit.

Nostra sententia de causa Ophthalmiæ.

§. 10. Ex *Nostrā* sententiā causa inflammationis oculorum seu *Ophthalmiæ* eadem est, quæ in aliis inflammationibus; ubicunque enim in nostro corpore humores morulam necientes stagnant ubi ergo humores in circuitu suo extra vias sibi convenientes defleant & aberrant & sistantur, ibi tum statim illam, ubi hærent, pattem labore deprehendimus. Et idcērimus quotiescunque sanguis, & alius humor per rimam seu continuū solutionem viis suis, quibus incidebat, exiit, seu in partes vicinas, seu in ipsas rimas se insinuant, fit potius sugillatio. Solvitur autem hoc iocasi valorum continuum, ubi sive hæreant in ipsis fucis, sive in eum aliunde advenierint particulæ acres & acidæ, rodentes, puta, sciendentes pungeutesque, quæ spiculis suis lapsu temporis magis magisque fibrillas divellunt & rimas faciunt; à spiculis enim istis inæqualibus, aut salubris silvestribus seu acerbis, peregrinis, teneræ, delicatæ & sensiles illæ pulsantur fibrillæ, sique molestiam fibrillis creant, & hinc dolor, rubor & alia mala producuntur. Solvitur etiam continuum nuptio sanguinis vel alius humoris motu undecunque denum orto, quo in hæc illamve fibrā impetuosius ruenis, illius cedere necesse compingens dissolvit; cum ergo sanguis aliqui humores in tunicam adnatam palpebrisque succedant in nimia copia exundant & recipiuntur, ut vasā distendantur, distētia quasi divellantur, unde tumor partium vicinarum interdum simul exoritur, & quia tubulin hac parte sunt finioris texturæ, hinc & ophthalmia est perniciosior inflammatio quā mulcorum; hinc non credimus sanguinem extravasatum primariam esse causam inflammationis, sed præter sanguinem alii etiam humores effunduntur, qui facilius obsequuntur motum ætheris, & hinc inflammatio.

Solvitur sæpe sanguis seu alius humor, confestim per vasā seu teneriora, seu angustiora, seu tantæ molis non capacia delatas, fibras dilatat,

atque ita per hiatus fluit effluitque. Quando-  
cunque verò vel sanguis ampliores affectat vias, proprio licet intemptivo motu, vel lymphæ acrior lancia poros dilatat, & peregrinum hospitem invitat, inflammatio talis oboritur, utriusque vitio motu, quod phenomena testantur. Lachrymæ enim sero, (siquidem lymphæ ibi congestæ tumorem, effusa verò lachrymas efficit,) rubedo acido sanguini accepta ferenda, oculi enim rubent, quia tunc vasā ibi minutissima rubicundo implentur sanguine, ab acido coagulante, & idcō conspicuntur, quæ partes subiectæ albet, ardor verò oritur, quod potius tubuli tunicarum oculi à salinis istis particulis ita obstruantur, ut per reliquias pororum nil nisi materia prima elementi feratur, omne liquidum calidum influens est ab æthere continuo & indefinente motu poros corporum pervadente, illeque quamdiu legitimo motu per massam sanguineam fertur, ordinem, proportionem, & mixturam particularum ejus inter se invicem conservat, unde tandiu optimā perfurimur sanitate; quamprimum verò, quod in sanguine perfecte sano accidere solet, poripartium minutarum in parte quādam solidā, v. gr. membranosa obstruuntur, non quidem in solidum, in tantum tamen, ut minutissime quædam singulis in oris restent reliquæ, necessariū est, ut illæ pororum reliquæ adeo exigux sint, ut non nisi materiam subtilem perfuere patiantur, quæ sicuti igneæ est naturæ, fulminis instar movetur, & undique trajicit cum violentia, ut etiam vehementi illā agitatione ignem producere queat, & ut ad rem accedamus, idem si contingat Tunicæ oculorum adnatæ pariter ac corneæ, & materia primæ elementi obstruitorum pororum spatia relicta pervadens, velocissimo suo motu inflammationem producit. Mirum ergo non est, quod magnus adsit ardor, cumque humores circulant in formā toris vel succi valde subtilis membranarum illarum tubulos trajicientes inagunt in modum rarefacti & exagitantur ab accurrentibus continuo spiritibus, ita ut producat tumor, rubor vero ardoris productum est, & ob vasā capillaria valde distēta conspicuntur, cumque globuli cælestes in sanguine circa proprios validius rotentur axes, colorem saturatè rubrum præbent.

*Causæ remotiores* sunt ætas juvenilis ob errores in victu commissos facili in hunc morbum proclivis. Hac & facit hereditaria dispositio, è lippis enim lippis geniti subinde id probant.

Ex Non-naturalibus symbolum suum addit Aër quoad anni constitutiones & aliis variis, maxime verò aequilonius, acido-nitrosus, maxime obstruens & circulationem succorum impediens, Ophthalmiæ ferax à Coo habetur 3. aph. 16. Item inæqualis quoad tempora anni, unde si hyeme sicca prægressa & aequilonia, ver pluviosum & australe fuerit, æstate ophthalmias fieri necesse est, maxime verò mulieribus & vris humidioribus, 3. aph. 15. Vel contra, si hyemem australem, pluviosam & elementem ver siccam & aequilonium excipiat, 3. aph. 12. quod verum esse nos annus hic docuit, dum plures hoc malo vexatos curæ nostræ commissos vidimus. Aër enim frigidus aequilonius quatenus suo tale acido obstruit poros, sicque calida effluvia retardat, ita ipsos mordet oculos. Frigus ergo dum obstruit, coagulat humores torpidosque reddit,

## CAP. X. DE TUNICÆ ADNATÆ VITIIS 75

reddit, facile statim excitat, imò ipsos spiritus animales membranis & fibris ocularibus incolentes inspissat, maximè cum oculi injuriis aëris præ aliis sint expositi.

Memorandi hic quoque sunt *Venti irruentes*, atque hinc non raro etiam epidemice Ophthalmiæ observantur, uti hæc in nostrâ Hæstia, ob aeris talem constitutionem frigidam ac acidam catarrhis idoneam. Nuper observavi intensissimam inflammationem à nive oculo incautè imposita, frigus enim oculis inimicissimum existit, ut & aliis partibus nervis & membranis, quia maximè coagulatur humores.

*Causa  
Vagus.*

*Unguis oculi* eodem ferè modo generatur ac membranz, nonnunquam constar substantia adiposa vel albicans, vel nigricantis magis coloris. Proteriditur potissimum ab angulo oculi interno, quia dum pars extrusæ sanguine laticis ob asperitatem superficiæ Adnatæ, suum huc contribuentem tenacitate ejus, ac pororum angustia, ibi detenta in membranz indumentum secundum partes minimas disponitur, hinc copiosiori materia rudimento illi suffusa, nascitur tunica alba & opaca; quæ paulatim incrementum sumens, & sensim ac sensim per corneæ superficiem prærepens, partem iridis & pupillæ tegit, ac opacitate sua legitimum radiorum ingressum impediendo & penitus obtegendo, visus inducit immutationem. Sic & quando in Ophthalmia lachrymæ salino-acidæ aut acres carnem in angulo majore arrodunt, hinc membranam adnatam lædunt, nutrimentum inde transfusa & coagulatur in concretum ejusmodi membraneum, cetero loquitur *Estmüllerus* de *Ungue oculi*, distinguere eam in malignam seu cancerosam, & benignam.

*Pannus.* Pannus verò oculorum oritur, si quando vascula sanguine nimis repleta, una cum adjuncto chyllo sanguinem sub forma sanguinis emittant, qui dein stagnatione crassior factus, una cum arterioli coalescens, panniculum oculis carnosum inducit, non alio modo ac carnes in primordiis embryonis formari solent, in quibus sanguis in vasis sanguiferis coagulatur, illaque sibi invicem applicantur & uniuntur, hinc fibræ carnez suas habent tunicas, quæ olim fuerunt vasa sanguifera.

*Causa  
Sanguilatiois.*

*Sanguilatiois* causa est, quando sanguis ex vasis lux excurrit, & tunica suffunditur, eodem modo, quo in ictero humor flavus effundi solet, & color flavus se exferit, ac omnia objecta flavo colore imbuta conspiciuntur, imprimis ab obstruccionibus facta.

*Prognosis  
Ophthalmiæ.*

§. 11. Signa prognostica quod concernit, ratione Generis nullum vitæ imminet periculum, verum si incrementum sumserit morbus, vel inveteratus, gravis damnum infert & difficile curatur, quia pori arteriarum stabilem tandem illam detortam figuram acquirunt, ut particulas peccantes transmittant.

In puerulis & senibus non tam faciles sunt curatu Ophthalmiæ, quam in illis, qui mediæ sunt ætatis, argumento §. aph. 28. in his enim circulatio humorum est fortior. Prout oculi plures partes vicinæ, palpebræ, musculi, tunica corneæ, &c. læsæ, & humor exudans acrior, eareus gravior est affectus. Membrana sola affecta minus malum portendit. Ferius humor si adit, omnium pestimus est, ob acidum corrosivum, quo abundat, hic enim si diu perseveret,

pupillæ tabem & *perleuesis* arguit, aut oculi visusque corruptionem, aut destructionem; verò, sæpe cæcitatem totalem ac incurabilem portendit, imprimis si spiritus ob crassiciem influere nequeat.

Dolor urgens in ophthalmiâ ac perseverans malum signum est, quia humoris acredinem, fibrillarum rorionem & continuatum effluxum notat.

Si evacuationes spontaneæ subsequantur, spes maturæ ac securæ liberationis affulget. Alia ægros affligit instar aliorum acutorum morborum, quæ est cum periculo a ori, brevius tamen terminatur; alia est chronica & habitata quasi, quæ lentè progreditur, molesta magis, quam periculosa est. Inflammatio hæc vel dispalefcit sensim sensimque per diaphoretin attenuato humore, nec ulcerantibus amplius, quod salutare est; vel tendit ad suppurationem, quod oculo funestum, rarius tamen id accidit, nisi ferum sit adeo corrosivum, porique sint planè obstructi, & rupti canales. Suppuratio verò levior superficialia in palpebris & partibus extra bulbum consistentibus non adeo timenda. Quod si maturatione per evaluationem in alias nobiliores partes v.g. cerebrum, cor, vel nucham influat, ubique res periculosa plena est; imprimis si nova accedat fluxio, quæ cæcitatis vel suffusionis metum prænuñciat. Si pus ex oculo effluit post ophthalmiam, tunc periculum ædum est de oculo, suppuratio enim ob acrimoniam oculis ferè semper funesta est.

Ophthalmia serosa intempellivè suppressa transit sæpe in phthisin. Huic affectibus oculorum chronicis obnoxii si isdem subito liberentur, raro ultra annum solent supervivere, quod ex observatione Domitii *VV. ejens* communicavit Cl. D. Valentini.

Si lippientibus caput assidue longoque tempore dolet, si malum latius serpit latente acido fomite in massa sanguinea, vix boni quid sperare possumus. Imperfecte aliquando solvitur, si post se relinquat unguiculum, nebulam, ulciculum in cornea, angustiam pupillæ vel obscurationem, imò aliquando fistulam lachrymalem, sed in nonnullis accidit, ut post lippitudinem acutius videant, discussis turbantibus humoribus & consumis. Si in uno oculo incipiat, non raro ad alterum etiam transire consuevit, præcipue si notabilis sanguini adit visciditas ac crassities.

Si ab inclementia soluta fuerit unitas, inde ex lege circulationis appulsi succus nutritius imponi non potest paribus, scilicet tunicis affectis, sique in materiam purulentam potius degenerat. Ac licet brevi quandoque curetur, notabile tamen remanere solet aliquando incommodum, impropertionata videlicet dispositio in ipsiis tunicis, quæ postmodum efficit ut facile redeat, nec hoc solum, sed membrana oculorum adnatæ, crebris inflammationibus continui solutionem passa, notabilem quandam acquirat asperitatem, siquidem cum frequentibus ophthalmiis dicta modo tunica quodammodo erodatur, non potest aliter fieri, quin post consolidationem quadam reliquantur eminentie, quas aliquando palpebræ, tanquam organa valde sensibilia, cum specie asperitatis sentiunt. Quod si ferè tubuli vasorum & runicarum erosione

K 2 magis

magis aperti, particulas quasdam crassiores & vicidas transmittant, asperæ illi tunice adhaerent, & successivè pelliculam efficiunt, quam unguem oculi superius appellavimus.

*Prognosis*  
*Pterigi*,  
*sem Unguis*.  
Prognosis huius est, quod *Ungula* recens non adeo difficulter curatur, inventata verò operam Chirurgicam exposcit, requirit tamen ea ungula longum temporis intervallum, eò quod ob exquisitum oculorum sensum affectus acris medicamentis oppugnari nequeat, unguis autem ob sui attritionem eadem exposculet, aliis non cedit. Quo magis ergo hæc acria diluuntur, eò tardius operantur, atque eo longius spatium postulant. Si tunica cancerosa fuerit, non attingenda, item si cum ungue oculi progreditur. Superius dicta possunt etiam ad *Pannum* referri.

*Pannus*.  
*Singulatio*  
*nis*.  
In *Singulatione* cura festinanda est, si enim nigrescit sanguis atque grumescit, malum est, difficile enim iterum dissolvitur sanguis evasatus, & oculus livescit & denigratur, hinc tandem vilus obscuratur aliaque graviora accidunt symptomata. Suppuratur facilissimè hic sanguis, hinc difficilis est cura, & raro in ulcus & fistulam abit: observavi per 20. annos hoc affectu laborantem virum.

*Cura Dietæ*  
*etiam, ratione*.  
*etiam, ratione*.  
§. 2. Restat *Dietæ* regimen probè observandum in hiis oculorum affectibus. Aer eligatur temperatus & purus, sumi, pulveris & ventorum austrinorum experts, admixtus enim hic furibundus aether, humores movendo, oculos lachrymis aliisque subsequècibus malis suffundit. Obscurior etiam paulo & tenebriofior locus querendus est, in quo curationi se submittant patientes, lachrygos enim eà conditione eos existere, minime turpe ipsis est. Non male quoque solent oculi pannis viridibus obtegri, qui color oculis gratissimus est, quia blandè lucis radios moderatur, rubrorum autem, rutilantium aut fulgentium intuitus studiose fugiendus est, quia lucem intendunt & in proportionatam reddunt debilibus iam existentibus spiritibus in oculis, nude & luminola omnia intensius removenda sunt.

*Ch.* Cibi sunt boni succi facilisque digestionis, exulent salina acria, fermentativa & corruptiva obnoxia vaporosa, seu nervoso generi inimica, omniaque acida, omnia legumina, quæ cuncta haud inconcinne comprehendit *Schola illa Salernitana* sequentibus versibus:

*Balnea, vina, venus, venus, piper, allia,*  
*sumus,*  
*Porrum cum cepis, faba, lens, flemisque*  
*sinapi,*  
*Sol, coisique, ignis, labor, illius, acumina,*  
*pulvis,*  
*illa nocent oculis, sed vigilare magis.*

Sic & Poëta canit:

*Hac oculis multum Sol, pulvis, fumus ac aestus,*  
*Venus cum fletu, vina venusque nocent.*  
*Acricæ mander, nec quæ sunt plena vaporum,*  
*Nec cepas, lentis, allia, porra, fabas.*

*Potus*.  
Potus sit cerevisia tenuis, bene defœcata, & non nimis lupulata, aut ob loliolum spiritibus & oculis infesta, nec nimis recens, vel decoctum Theriæ, vel lignorum; acida autem pejus fugienda sunt, hinc oculorum rubedo, quod & jam

olim novit Sapientissimus Rex Salomo *Proverb.* c. 23. v. 30. dicens: Cui rubor oculorum erit? His qui immorantur circa vinum, euntibus ad disquirendum multum: Ne igitur intuearis vinum, quod rubrum sit, quod det in calice colorem suum, agitet sese probe. In fine velut serpens mordebit, & velut regulus dolore afficiet, oculi tui videbunt visiones extraneas, &c. Intendit id etiam *Marialis de Aulo*, vim potore nobili, ita loquens:

*Hinc dicit Medicus, bibas caveto.*  
*Vinum si biberis, nihil videbis.*

Moderatâ tamen quantitate sumtum aliquando concedi potest, imprimis medicarum euphrasii, beton. fœnic. verben. fragar. meliss. aliisque herbis appropriatis.

Huc & tabaci fumus in societate cerevisiæ admixtus à pluribus laudatur.

*Mors & quies, somnus & vigilia* sunt moderata, somnus enim & quies pro oculis afflictis *Mors & quies, somnus & vigilia* sunt optima sunt remedia; æger verò non dormiat in latere, cuius oculus afficitur: Omnes autem vehementiores commotiones oculos quoque damno suo maciant, sic salutationes & incubationes in multam noctem protrahit, ut quædam, sic & sanitatis fures nocturni inflammationem hanc oculorum parere possunt, nec lumen adeo admittunt.

Quoad *excreta & retenta*, si non legitimo tempore fiant, humores stagnantes faciliè ad oculos redeunt, ibidemque salia sua infundunt, sic novimus puellam 20. annorum, nondum menstruatam, singulis mensibus per oculos viginti & plures guttas sanguinis loco menses emittentem, confer alios, *Dodonæum, Mercatum, Ephemerides, Gavielliferum*, &c. sic quoque hunc affectum ex nimia Venere observavi, per quam succi in corpore spisiones redditi fuere.

*Animus* quoque in hoc affectu sit tranquillus, & liber conservetur à motibus impetuosius, *Animus* tristitia enim & combustionem lymphæ plus justo salina redditur, & ad motum ineptior, & lachrymarum profusio, utraque consequenter ophthalmiæ occasionem præbent vel præbentem augent. Hinc à lachrymis rubent ordinariè oculi, eliquatâ sic per glandulas lymphæ, accersitis salibus liquatis & immeris quasi e centro suo spiritibus animalibus, indeque tum noxæ plurimæ oculorum, tum ophthalmia scaturiunt.

Huc referri possunt plures res externæ, solis radii, ignis, fulgur, fumus, quo acrior est, & propius ac crebrius oculos impetit, eo majorem illis molestiam creat, hinc aurifabri ob Gas venenosum acre, quod continetur in fumo aliisque, quæ tractant, ophthalmiis sæpe corripiuntur, à fustitu etiam cinabaribus & ortum hanc ophthalmiam observavit *Hildanus*; pulveres præcipuè adurentes casu quandoque aut vindictâ ab iratis in oculos dispersi, cineres, arena, uti & omnia mordacia salina, nitrum, Gum, alumen ustum, ærugo, & ætus & ætus, faciliè oculum inflammare possunt, quia humores acres reddunt, & ad stagnationem invitant.

Cataractum, coryzam, rissum faciliè hic affectus comitari solet, & à dyserteriâ male curatâ ophthalmiam propemodum fatalem observavi, quoniam acidum acre mox in his mox in aliis tabulis sibi imperium rapit.

Op



Ophthalmiam aliquando esse contagiosum ob effluvia acria calida, nullus dubito, nuper enim mihi accidit, cum infans oculum ophthalmia laborantis manu palparem, & eadem manu meos fricaverim oculos, statim in eundem incidit affectum, quod & confirmare videtur Poëta canens:

*Dum scellantur oculos, leduntur & ipsi,  
Multaque corporibus transiunt nocent.*

In *Pterygio*, *Panno* & *Hypophagmate* ferè eadem conducit *Diata*, nisi aliquando calidior concedatur, ne humores viscidiores reddantur, sed potius circulatorum succorum promoveatur.

§. 13. Hisce præmissis ipsam Curationem *Pharmacentico-Chirurgicam* aggredimur, quam *Galenus* in *Ophthalmia* instituit, omnium primo toti corpori, & maxime capiti prospiciendo ipsa venæ sectione, imprimis humeralis, oculo patienti è directo oppositæ, aut cephalicæ dicæ, in extremâ manu pollicis vicinæ; post hanc purgantia propinant humores peccantes, & potissimum, quem sæpius peccare credunt, biliosum educit, quare hujusmodi aut similem parant potionem:

*Myrobolan. citr. ʒiij.*

*infund. in aq. cicbor. vel borag.  
rhei elect. ʒi.*

*infund. similiter seorsim.*

*cinam. ʒj.*

*F. Expressio, in qua dissolv. Elect. cathol.*

*Syrup. acetos. simpl. aa. ʒb.*

*F. Potio.*

Vel in aquis prædictis dissolvunt electuaria de succo rosarum & syr. solut. rosar. pallidar. Ubi vero pituita peccat, pilulas præscribunt cochias, de acatice, hiera simpl. lucis maj. & c. in melancholicis verò hiera Rusti & Diacolocynchidos cum epithymo & senâ. Hisce purgationibus clysteres substituant & suppositoria per intervalla repetenda. Revulsionis gratiâ hirudines apponunt nuchæ, vel velicatoria eidem applicant & post antres, humeris verò & dorso cucurbitulas cum scarificatione, fonticulos brachii inurunt, & setaceum instituta paracentesi nuchæ traiciunt, interdum auriculæ cartilaginem scarificant, & sanguine existente calido & spirituosissimo, arteriolarum celebrant in fronte; postmodum ad topica pergant, initio inflammationis repellentia adhibentes & anodyna collyriorum formâ oculis impolita, ex gr.

*M. Mucilag. sem. psyll. aq. rosar. & plantag.  
sabl. ʒij.*

*Aq. papav. errat. ʒj.*

*Troch. alb. Rhis. ʒiij.*

*N. Ceras. cum aq. rosar. lot. & iterum bene exsiccat. ʒij.*

*Pompholyg. lot.*

*Sacchar. canib. aa. ʒb.*

*Camphora parum, prout urget dolor.*

*M. F. Collyrium.*

Vel

*Cum album. ovor. F. Collyrium.*

quod usus tempore dissolvatur in lacte, & oculo applicetur,

Fronti etiam & temporibus applicant adstringentia & vias, per quas fluit materia peccans, contrahentia, cataplasmata videlicet, anacolemata ex bol. armen. terr. sigill. mastich. album. ovi exceptis. Morbo crescente foveant oculos

decoct. flor. camomill. melilot. aneth. sem. fer-nigr. lini, fenic. in lacte vel vino diluto facto, quo gossypium imbutum oculo imponunt, & fasciâ leviter alligant, ne oculum gravet. In statu tandem & declinatione balnea foveant, cer-rhina, gargarismos & masticatoria, oculo verò sequens instillant collyrium.

*N. Sarcocoll. lallennurir. ʒiij.*

*Croc.*

*Spica aa. ʒj.*

*Aloes aquâ fenic. lot. ʒb.*

*M. F. Pulvis*, cuius portio quædam dissolv. in aq. rosar. ant. fenic. & liquor ille immittatur oculo. Sic etiam ovum crudum coctum & induratum calidum vel per se, vel lacte muliebri subactum applicare solent.

*Pterygii* seu Unguis curationem inchoant ve-næ sectione, scarificatione, setonibus & caute-riis, ad sanguinis affluxum minuendum, educendum, revellendum & derivandum, si verò humores vitiosi in corpore abundant, purgatione eosdem educunt, adhibitis in specie humiori peccanti convenientibus: post hæc pro opinione suâ convenienter ita administrata, ad ipsa remedia accedunt topica, eaque valde exsiccantia, aut hircenon juvantibus, erodentia, instillantibus oculo aquam mellis, vel simplicem, vel cum aquâ fenic. mistam, aliquando sel aliquo admiscunt, ut lucii & carponis, vel pulverem inspergunt hujusmodi:

*N. L'umic.*

*Off. sep. aa. ʒj.*

*Pompholyg. alb. ʒb.*

*Aloes.*

*Myrrh. aa. ʒj.*

*Sarcocoll. gr. xvi.*

*Sacch. canib. ʒiij.*

*M. F. Pulvis subtilissimus, oculo & imprimi-  
ungui inspergendus.*

Eundem etiam pulverem cum succo chelidon. maj. centaur. min. & melle suscipiunt, indeque parant linimentum, quo unguem sepe illinunt. Inter erodentia recentest antimonium, erig-æris, vitriolum album, marchasitam, calcantium, &c. Sed si medicamentis hisce abigi nequeat, ipsam celebrant sectionem, hamulo apprehendentes unguem in agro aliquantulum supino, oculoque ducto per speculum oculi, hinc unguem inter hamulo sublatum, & tunicam annatam acum filum levigatum ducentem trahunt, sili extrema alligant & membranam illam vel unguem sic trahendo elevatam, vel scalpello falcato, vel forfice abscindunt, & albumen ovi aquâ rosaceâ agitatum loco secto imponunt, additâ agro præceptione, ut oculum frequentius agitet & moveat, ne palpebris accrescat.

Eodem penè modo ipsius *Panni* curationem perficiunt, interjectis aliquando fomentationibus, ut oculus eo melius præparetur, hinc exsiccantia adhibent, videlicet:

*N. Plumbi ust.*

*Antim.*

*Lap. calam. aa. ʒij.*

*Tus.*

*Ceras. aa. ʒiij.*

*Off. sep. ust. ʒj.*

*Sarcocoll.*

*Myrrh. aa. ʒb.*

*Fell. carpon. ʒij.*

K ;

Excip.

magis aperti, particulas quasdam crassiores & viscidas transmittant, asperæ illi tunicae adherent, & successivè pelliculam efformant, quam unguem oculi superius appellamus.

*Prognosis*  
*Pregus,*  
*suu gustu.*  
Prognosis hujus est, quòd *Ungula* recens non adeò difficulter curatur, inverterata verò operam Chirurgicam exposcit, requirit tamen ea ungula longum temporis intervallum, eò quòd ob exquisitum oculorum sensum affectus acerbis medicamentis oppugnari nequeat, unguis autem ob sui attritionem eadem exposculet, aliàs non cedit. Quo magis ergò hæc acria diluuntur, eò tardius operantur, atque eo longius spatium postulant. Si tunica cancræsa fuerit, non attingenda, item si cum ungue oculi progreditur. Superius dicta possunt etiam ad *Pannum* referri.

*Pannu.*  
*Sugillatio*  
*nis.*  
In *Sugillatione* cura festinanda est. si enim nigrescit sanguis atque gremescit, malum est, difficile enim iterum dissolvitur sanguis evasus, & oculus livescit & denigratur, hinc tandem visus obscuratur aliaque graviora accidunt symptomata. Suppuratur facilissimè hic sanguis, hinc difficilis est cura, & raro in necis & fistulam abit: observavi per 20. annos hoc affectu laborantem vitum.

*Cura Di-*  
*etetica, ra-*  
*tionis.*  
§. 27. *Dietæ* regimen probè observandum in hiis oculorum affectibus. Aer eligatur temperatus & purus, sumi, pulveris & ventorum austriorum expertus, admittis enim hic furbundus æther, humores movendo, oculos lachrymis alisque subsequenter malis suffundit. Obscurior etiam paulo & tenebriofior locus querendus est, in quo curationi se submittant patientes, lucifugus enim eà conditione eos existere, minime turpe ipsis est. Non male quoque solent oculi pannis viridibus obtegi, qui color oculis gratissimus est, quia blandè lucis radios moderatur, rubrorum autem, rutilantium aut fulgentium intuitus studiose fugiendus est, quia lucem intendunt & improporionatam reddunt debilibus jam existentibus spiritibus in oculis, unde & luminosa omnia intensius remota sunt.

*Chi.* Cibi sint boni succi facilisque digestionis, exulenti salina acria, fermentativa & corruptio-nis obnoxia vaporosa, ceu nervoso generi inimica, omniaque acida, omnia legumina, quæ cuncta haud inconcinnè comprehendit *Schola* illa *Salernitana* sequentibus versibus:

Balnea, vina, vennis, ventus, piper, allia,  
sumus,  
Portum cum cepis, faba, lens, fœnisque  
sinapi,  
Sol, coitusque, ignis, labor, stilus, acumina,  
pulsus,  
Illa nocent oculis, sed vigilare magis.

Sic & Poëta canit:

Hæc oculis multum Sol, pulvis, sumus ac æstus,  
Vennis cum fletu, vina vennisque nocent.  
Acriane mandes, nec qua sunt plena vaporum,  
Nec cepas, leutes, allia, porra, fabas.

*Pulsu.* Potus sit cerevisia tenuis, bene defæcata, & non nimis lupulata, aut ob lolium spiritibus & oculis infecta, nec nimis recens, vel decoctum Theræ, vel lignorum; acida angue pejus fugienda sunt, hinc oculorum rubedo, quod & jam

olim novit Sapientissimus Rex Salomo *Proverb.* c. 23. v. 30. dicens: Cui rubor oculorum erit? His qui immorantur circa vinum, euntibus ad disquirendum mustum: Ne igitur intuearis vinum, quòd rubrum sit, quòd det in calice colorem suum, agitet sese probè. In fine velut terpens mordebit, & velut regulus dolore afficiet, oculi tui videbunt visiones extraneas, &c. Intendit id etiam *Martialis de Aulo*, vini potore nobili, ita loquens:

Hinc dicit Medicus, bibas caveto.  
Vinum si biberis, nihil videbis.

Moderatè tamen quantitate sumtum aliquando concedi potest, inprimis medicatum euphrasie, beton. fœnic. verben. fragar. meliss. aliisque herbis appropriatis.

Huc & tabaci fumus in societate cerevisiæ admixtus à pluribus laudatur.

*Motus & quies, somnus & vigilia* sint moderata, somnus enim & quies pro oculis afflictis optima sunt remedia; æger verò non dormiat in latere, cujus oculus afficitur: Omnes autem vehementiores commotiones oculis quoque damno suo mactant, sic saltationes & incubitationes in multam noctem protrahæ, ut quætiis, sic & sanitatis fures nocturni inflammationem hanc oculorum parere possunt, nec lumen adeò admittitur.

Quoad *excreta & retenta*, si non legitimo tempore fiant, humores stagnantes facile ad oculos redundant, ibidemque salia sua infingunt, sic novinus puellam 20. annorum, nondum menstruatum, singulis mensibus per oculos viginti & plures guttas sanguinis loco mensium emittentem, confert alios, *Dodonæum*, *Mercatum*, *Ephemerides*, *Gabelseferum*, &c. sic quoque hunc affectum ex nimia Venere observavi, per quam succi in corpore spisiones redditæ fueret.

*Animus* quoque in hoc affectu sit tranquillus, *Animi af-*  
& liber conservetur à motibus impetuos, *à fœsum,*  
tristitia enim & conturbatione lymphæ plus iusto salina redditur, & ad motum ineptior, & lachrymarum profusio, utraque consequenter ophthalmiæ occasionem præbent vel præben-tem augent. Hinc à lachrymis rubent ordinariè oculi, eliquatà sic per glandulas lymphæ, accersitis salibus liquatis & immeris quasi è centro suo spiritibus animalibus, indeque tum noxæ plurimè oculorum, tum ophthalmia scaturiunt.

Huc referti possunt plures res externæ, solis radii, ignis, fulgur, sumus, quoacrior est, eo majorem illis molestiam creat, hinc aurifabri ob Gas venenosum acre, quod continetur in fumo alioque, quæ tractant, ophthalmia sæpe corripiuntur, à suffitu etiam cinubaris qui ortum hanc ophthalmiam observavit *Hildanus*; pulveres præcipuè adurentes casu quandoque aut vindictæ ab iratis in oculis inpersi, cineres, arena, uti & omnia mordacia salina, nitrum, plumbum, alumen istum, ærugo, quæ ætus & ætus, facile oculum inflammare possunt, quia humores acres reddunt, & ad stagnationem invitant.

Catarthum, coryzam, tussim facile hic affectus comitari solet, & à dytenteria male curatà ophthalmiam propemodum fatalem observavi, quoniam acidum acre mox in his mox in aliis tubulis sibi inperiuat rapit.

Oph



Ophthalmiam aliquando esse contagiosam ob effluvia acris calida, nullus dubito, nuper enim mihi accidit, cum infantis oculum ophthalmiā laborantis manu palpatim, & eadem manu meus fricaverim oculos, statim in eundem incidi affectum, quod & confirmare videtur Pöytä canens:

*Dum stellas oculi lefos, ledantur & ipsi,  
Medique corporibus transiunt nocent.*

In *Pterygio*, *Panno* & *Hypophymate* serè eadem conducit *Dixta*, nisi aliquando calidior concedatur, ne humores viscidiores reddantur, sed potius circulectio succorum promoveatur.

§. 13. Hisce præmissis ipsam Curationem *Pharmacentico-Chirurgicam* aggredimur, quam *Galenici* in *Ophthalmiā* insinuant, omnium primo toti corpori, & maxime capiti prospiciendo ipsa venæ sectione, imprimis humeralis, oculo patienti è directo oppositæ, aut cephalicæ dicar, in extremâ manu pollicis vicinæ; post hanc purgantia propinquant humores peccantes, & potissimum, quem sæpius peccare credunt, biliosum educuntia, quare huiusmodi aut similem parant potionem:

*R. Myrobolan. citr. ʒiij.  
infund. in aq. cichori. vel borag.  
rhei elæct. ʒij.  
infund. similiter seorsim.*

*F. Expressio, in qua dissolv. Elect. cathol.  
Symp. acetos. simpl. aa. ʒʒ.  
F. Potio.*

Vel in aquis prædictis dissolvunt electuarii de succo rosarum & syr. solut. rosar. pallidar. Ubi verò pituita peccat, pilulas præscribunt cochias, de acario, hiera sumpl. lucis maj. &c. in melancholicis verò hieram Ruffi & Diacolocynthidos cum epithymo & senâ. Hisce purgantibus clysteres substituant & suppositoria per intervalla repetenda. Revulsioni gratiâ hirudines apponunt nuchæ, vel vesicatoria eidem applicant & post hæc, humeris verò & dorso cucurbitulas cum scarificatione, fomiculos brachii inuunt, & setaceum instituta paracentesi nuchæ trapiunt, interdum auriculæ cartilaginem scarificant, & sanguine existente calido & spirituosissimo, arteriotomiam celebrant in fronte; postmodum ad topica pergunt, initio inflammationis repellentia adhibentes & anodyna collyriorum formâ oculis impolita, ex gr.

*1. Mucilag. sem. psyll. aq. rosar. & plantag.  
sabl. ʒij.*

*Aq. papav. erras. ʒj.*

*Troch. alb. Rhas. ʒʒ.*

*2. Cernis. cum aq. rosar. lot. & nerum bene exsiccat. ʒij.*

*Pompholyg. lot.*

*Sacchar. canib. aa. ʒʒ.*

*Camphoræ parum; prout urget dolor.*

*M. F. Collyrium.*

Vel

*Cons. album. ovor. F. Collyrium.*

quod usus tempore dissolvatur in lacte, & oculo applicetur.

Fronti etiam & temporibus applicant adstringentia & vias, per quas fluit materia peccans, contrahentia, cataplasmata videlicet, anacolemata ex bol. armen. terr. sigill. mastic. album. ovi exceptis. Morbo crescente sovent oculos

decoct. flor. camomill. melilot. aneth. sem. fenigr. lini, fœnic. in lacte vel vino diluto factis, quo gossypium imbutum oculo imponunt, & fasciâ leviter alligant, ne oculum gravet. In statu tandem & declinatione balnea suadent, erichina, gargarisinos & masticatoria, oculo verò sequens instillant collyrium.

*R. Sarcocoll. lacte nutrit. ʒiijʒ.*

*Croc.*

*Spica aa. ʒj.*

*Alot. aquâ fœnic. lot. ʒʒ.*

*M. F. Pulvis*, cuius portio quædam dissolv. in aq. rosar. aut fœnic. & liquor ille immittatur oculo. Sic etiam ovum cradum coctum & induratum calidum vel per se, vel lacte muliebri subactum applicare solent.

*Pterygi* seu *Unguis* curationem inchoant ve. In *Pterygio* nasectione, scarificatione, setonibus & caute. seu *P. pte.* riis, ad sanguinis affluxum minuendum, educendum, revellendum & derivandum, si verò humores vitiosi in corpore abundant, purgatione eosdem educunt, adhibitis in specie humiori peccanti convenientibus: post hæc pro opusione suâ convenienter ita administrata, ad ipsa remedia accedunt topica, eaque valde exsiccantia, aut hisce non iuvantibus, erodentia, instillant oculo aquam mellis, vel simplicem, vel cum aquâ fœnic. mistam, aliquando sel aliquo admiscunt, ut luci & carponis, vel pulverem inspergunt huiusmodi:

*R. Pumic.*

*Off. sep. aa. ʒj.*

*Pompholyg. alb. ʒʒ.*

*Alot.*

*Myrrh. aa. ʒj.*

*Sarcocoll. gr. xvi.*

*Sacch. canib. ʒʒ.*

*M. F. Pulvis subtilissimus, oculo & imprimi ungui inspergendus.*

Eundem etiam pulverem cum succo chelidon. maj. centaur. min. & melle suscipiunt, indeque parant linimentum, quo ungum sæpe illinunt. Inter erodentia recentent antimonium, arguris, vitriolum album, marchasitam, calcantium, &c. Sed si medicamentis hisce abigi nequeat, ipsam celebrant sectionem, hamulo apprehendentes ungum in agro aliquantum supino, oculoque diducto per speculum oculi, hinc ungum inter hamulo sublatum, & tunicam annatam acum filum lævigatum ducentem trahunt, hinc extrema alligant & membranam illam vel ungum sic trahendo elevatam, vel scalpello falcato, vel forfice abscindunt, & albumen ovi aquâ rosacæ agitatam loco secto imponunt, additâ agro præceptione, ut oculum frequentius agitet & moveat, ne palpebris accrescat.

Eodem penè modo ipsius *Panni* curationem perficiunt, interjectis aliquando fomentationibus, ut oculus eo melius præparetur, hinc exsiccantia adhibent, videlicet:

*1. Pumic. nst.*

*Antim.*

*Lap. calam. aa. ʒij.*

*Tur.*

*Ceruss. aa. ʒʒ.*

*Off. sep. nst. ʒj.*

*Sarcocoll.*

*Myrrh. aa. ʒʒ.*

*Fell. carpon. ʒij.*

K 3

Excip.

*Excip. mell. & album. ovor.*

*F. Linimentum*, quo panniculus sepe inflatur. His substituitur fortiora erodentia ex calcantho, Sale ammoniaco, æruginè æris, quibus si cedere nolit, vel venulas Panniculi radicem filamentum vincunt, ne ulterius nutrimentum per eas accipiat & exsicceat, vel ut in Ungue modo dictum, Pannum elevatum abscedunt.

*In Sugilla-  
tione.*

In *Hypophagmate*, seu *Sugillatione*, si major adsit sanguinis affluxus dolorem & inflammationem excitans, ad eum revellendum reliqua curæ præmittunt venæsectionem, uti & si diu retentus suppuretur, postmodum adhibent discutientia, inter quæ laudant sanguinem columbarum, & imprimis ex pennâ alæ calidè oculo instillatum, vel decoctum flor. chamomill. melilot. rosar. herb. chelidon. fœnic. sem. fœnigr. &c. in aquâ & vino factum, quo oculus calidè fovet. In inflammatione sugillationi huic conjunctâ albumen ovi agitatum imponunt, & ut pus exstenuetur, linimentum adhibent ex mucilagine fœnigr. aquâ fœniculi factâ & melle. In livore, & si malum sit inveteratum, sequens laudant linimentum seu Collyrium:

*℞. Succ. chelidon. maj.  
raphan. aa. ʒiſſ.  
Fell. lactis piscis ʒij.  
Myrrh.  
Thuris aa. ʒiſſ.  
Croci ʒſſ.  
Mellis q. ſ.*

*M.*

Medicamentis autem hæc vel similibus quando malum nov. est cellurum, sectionem instituunt, & tubulo vel pus vel sanguinem corruptum exsugunt.

*Paracelsi  
Curatio  
Ophthalmiæ.*

§. 14. Sequitur Chymicorum ille Monarcha *Paracelsus*, qui absque ullis veborum ambagibus in *Ophthalmiâ* aliisque oculorum doloribus, ut summum experimentum lapidein extollit calamitarem, secundum propriam suam inventionem præparatum, & aq. fœnic. euphras. & ros. per noctem in collyrium redactum, quo oculos summe rubentes frequentius inungi præcipit, & certan promittit medelam.

*Unguis &  
Pannu.*

In *Ungue & Panno* commendat præ aliis thustiam suam præparatam, vitriolum album pp. & oleum siliginis, quibus non modo hujusmodi excrecentias, sed ipsam Neutham, seu cuticulam in partu puerorum oculis subnascentem, abigi posse plenè promittit buccis. maximi vitriolum album sequentia ratione adhibendum:

*℞. Oli alb. pp. ʒj.  
Liquor. euphras. ʒij.  
Papav. rub. ʒj.  
F. Collyrium.  
℞. Oli hujus pp. ʒſſ.  
Liquor. junquiani ʒij.  
Ol. Nuc. Mosch. gr. vij.  
F. Collyrium.*

*Sugillatio-  
ne.*

In *Sugillatione* curam omnem eo dirigendam esse autumat, ut dissolvatur sanguis ille coagulatus, neque cœruleum illum colorem, hoc est, livorem, adeo vult timeri ut præ aliis adverti, facile enim post dissolutionem sanguinis corrupti illum disparitum esse promittit, quapropter ut coagulatio resolvatur, sequens è vitriolo paratum collyrium maximo perè conducitur esse confidit.

*℞. Oli alb. ʒj.  
Ol. Q. ʒvj.  
lateris, ʒv.  
Destill. simul.*

*Crollius* hic non cessat laudare specificum illud ophthalmicum ex chelidoniâ & cancris, chymico more parandum, quo non tantum sugillationes, sed longè etiam graviiores oculorum læsiones sanatum iri minime dubitat.

§. 15. Succedit Chymicis hæc magnus illorum castigator *Helmontius*, qui ad Archeum in meliorem viam deducendum in *Ophthalmiâ* commendat erucicam nuchæ applicandam, ad incendium verbò extinguendum, oculis imponi jubet folia viridia tabaci, à quibus inflammationem illam valde credit mitigari, quibus interdum substituit chelidoniam & flores cichorii.

*Unguis* secundum Autorem hunc curatur, si pellicula illa è sordibus laticis pronata ab oculo separatur, & latex depuretur, ne novam in angulum oculi deponat impuritatem, ipse etiam oculus corroboretur, ne quid sordium istarum suscipiat, quod præstari creditum succo hieracii, frequentius pelliculæ isti illito, cum pulvere testarum ovorum tritæ præparatarum (subtilissimo eidem aliquoties insperito.

Ut velum illud in *Panno* detrahatur, conveniens æstimat, ut Archeus prius sedetur, & incendium extinguatur, quo ille mitior ab opere cepto desistat, cui scopo satisfaciunt sedativa sua Archei aliunde jam nota, postea velum illud facile auferri permittit, vel solo illito succo chelidoniz, cum selle lucii piscis, quod tanquam singulare quoddam in hæc oculorum vitium ab Autore hoc ejusque sequacibus perquam commendatur.

Ad cruorem in *Sugillatione* coagulatum & *Sugillatione* corruptum resolvendum & discutendum adhibet herbam perficariam & caules nigellæ Romanæ, qui impositi maculam illam à cruore corrupto inductam in vividiorè transferant colorem, dissipato & abacto cruore emortuo, quod pariter à bryoniâ contusâ & impositâ præstari posse experientia certus affirmat.

§. 16. Præsto nunc est *VVilsius* ad aperientiam suam de curatione horum morborum sententiam, præcipiens, ut sanguinis ebullitioni, & ulteriori ad oculum affluxui occurratur venæsectione in brachio, & vesicatorio nuchæ imponendo, frons verò oxyrhodum adhibitis, tum Julapiis, Emulsionibus aliisque remediis fervorem ejus compescentibus, vel serum aliosq; humores peccatis eliminantib⁹ intra sumendis, hinc ipsa depromit topica inflammationi oculorum in specie condicentia, dolorem apprimè sistentia, quo cesset humorum affluxus, quod præ aliis insperari retur cataplasmate ex pomis coctis, micâ panis albi, album. & vitell. ovi, & pauco croci cum lacte muliebri, vel in defectu ejus etiam vaccino parato, & tepidè inposito. Dolore itâ sedato pergit ad paulum fortiora & magis adstringentia, quibus solutioni continui obviam itur, & humorum acrimonia mitigatur, proinde sequens vel simile suadet Collyrium.

*℞. Mucilag. sem. cydon. aq. ros. facit. ʒj.  
Aq. sperm. vana.  
verben. aa. ʒſſ.  
Sist. alb. Rhin. f. op. ʒj.  
Sacch. cantb. ʒij.  
Fi. ʒj.*

*M. quo*



# CAP. X. DE TUNICÆ ADNATÆ VITIIS. 79

*M. quo oculus aliquoties in die est illinendus, vel linteculo eo imbutum imponendum.*

In ardore & siccitate lintimentum parat ex butyro recenti, thut, pp. ærur. æris, & camphorâ, quo oculum sæpe vult illinendum sub spe certi iuvaminis.

*Ungula.*

Ungula ut ritè curetur, suadet similiter pro avertione laticis fetosi, neulceridus in fluat & majus apportet nutrimentum, vesicatoria nuchæ imponenda, & fonticulos brachio inurendos, nec non cathartica superfluum serum educantia, pilulas nempe de succino cum resinâ Jalap. vel sequentem pulverem:

℞. Ceruss. ʒi gr. xv.

Scammon. ʒat. ʒb.

Salis verben. gr. vj.

M. F. Pulvis.

Ad ipsam membranulam consumendam proponit collyrium sequens:

℞. Succ. Chelidon. maj. ʒiij.

rubis. ʒij.

fell. tauri ʒi.

aloes ʒb.

ærug. æris ʒj.

℥i alb.

myrrh. aa. gr. vj.

M. llinatur Ungula sepius.

Vel pulverem inspergit ex sacchar. canth. ʒlo alb. myrrh. & Zinzib quibus medicamentis si cedere recuset, Chirurgis eam abscindendam committit, impositis post sectionem, quæ inflammationi & dolori obviam eunt, siccandoque parvulam inducunt cicatricem.

*Yanus.*

Panni curationem aggreditur venæsectione, ut sanguinis minuat copia, & ulterior ad oculum avertatur affluxus, nec hirudines collo apponendas negligit, nedum cucurbitulas scapulis adhibendas, ipsius verò illius ex sanguine & succo nutritio concreta dissolvendi & abstergendi gratiâ, primo forum instituit ex decocto malv. euphras. chelidon. verben. flor. camomill. sem. aneth. fenic. squamâ æris, &c. postea axungiam illinit nyctitracis vel picis thymalli, vel sequentem aut similem inspergit pulverem, quem interdum cum succis & mucilaginis convenientibus in collyrium redigit, studiosè postmodum illinendum.

℞. Lap. calam. pp. ʒj.

Sarcocoll. ʒb.

Myrrh. ʒj.

Succ. ʒi gr. vj.

℥i alb. gr. iij.

M. F. Pulvis.

*Sugillatione.*

In Sugillatione pro discussione sanguinis coagulati oculum fovet decocto malvæ, hyssopi, ruthe, verben. chærefol. flor. chamomill. sem. fenic. fenigr. Si verò totum hoc discuti nequeat, & livor ex sanguine corrupto oculum valde deformet, oculo superimponit cortices raphani, quibus livorem brevi dispariturum esse confidit.

§. 17. Syllui quoque non contemnendum est de morbis huius curandis salutare consilium, quod in Ophthalmiâ eo respicit, ut inflammatio contemperetur, externis potissimum, ut cataplasmate ex pomis acidiusculis aliisq; humorè acrem discutientibus, ex succo euphras. verben. calendul. fragor. paratis & tepide applicatis. In majori sanguinis ebullitione permittit venæsectionem, aliaque topica reliquis Autoribus Chirurgicis consueta.

Ut nutrimentum in Ungulâ immineatur, intus propinat sale volatili prædita medicamenta, attenuantia nimirum & resolutiva, ex radicibus valerianæ, fœniculi, chelidon. maj. herb. euphras. orig. puleg. majoran. sem. fœnic. siler. mont. & similibus; externè itidem incidentia & extenuantia admoveat, ut coagulum dissolvatur, fovendo oculum prædictis herbis in aquâ & vino dulci coctis, tum oculum collyriis ungit ex succis fœnic. chelidon. fellibus animalium cum osse sepiæ, aloë, myrrhâ & ꝑo paratis, quibus si nequeat absumi, Chirurgis eam committit abscindendam.

Similiter in Panno eo dirigat curam, ut sanguis stagnans salibus volatilibus reddatur fluxilis, & acidum corrigatur superius jam dictis, ex quibus etiam forum parat externè oculo adhibendum, cum similibus collyriis aliquantum lixiviosis, intermixtis nempe succis prædictis C. C. ult. cinerib. equiseti, hirundinum, item sarcocollâ & myrrhâ; si verò malum diuturnitate temporis prorsus sit induratum, illud aut Chirurgorum committit instrumentis, aut ut planè incurabile relinquit.

Sanguis stagnans in Sugillatione ut fluxilis reddatur, & corruptus amoveatur, adhibet salia volatilia intus & diaphoretica, quibus pori simul aperiantur, ut sanguis coagulatus subtilior redditus per eosdem exhalet, cuiusmodi sunt oculi ʒs, sperma ceti, imania, Gum diaphoret. externè discutientia commendat. & vala contusa sanantia, inter quæ magni æstimat lac muliebres cum croco tepide instillatum; aut illitum, vel cataplasma ex rad. Sigill. Salom. vino maceerat. & contus. farin. fabar. fenigr. lini. sem. cymini, flor. camomill. rosar. sambuc. cum succo chærefol. & hyssopi paratum; addito paucò camphoræ, tepide impositum, neque absque juvamine prorsus adhiberi indicat mucilagines sem. altheæ & cydoniorum.

§. 18. Restant adhuc consulendi Cartesiani, quorum fores minime frustra pulsantur, siquidem morbis huius laborantes.

\* Auxilio laetos dimittent opibusque juvabunt.

Proinde ut ritè & secundum artis regulas curatio in Ophthalmiâ instituat, ulterius rem liquorum ex arteriis prohibent affluxum, removendo prius causam eosdem allicientem quancunque, sive sint corpuscula quædam per infortunium extrinsecus illapsa, & cuspidata, vel angularia, sicque pungentia, sive aër acris à ventis agitatus, quo vel planè abstinere, vel probè contra eundem se munire suadent ægrotis; deinde revulsivis etiam causâ venæsectionem approbant in brachio instituendam, si malum nempe sit gravius, & sanguis multus particulis angularibus acerbis ramolis intermixtis abundet, & ab eisdem sæpius agitatus ebulliat. Quando verò lymphæ peccans in causâ est, variis particulis istiusmodi angularibus pungentibus resecta, & per ramulos lymphaticos in oculum illata, eius copiosorem affluxum avertunt vesicatoris nuchæ impositis, vel ipso setaceo per eandem tractato, ut majori, si opus sit, effluat copiâ, & fonticulis in brachio ejus laceris, cujus oculus plurimum laborat, excitatis, cujus etiam exsiccandi gratiâ suffumigationes ex succino, mastiche, gummi Juniperino, animæ, aliisque convenientibus accendunt, adjunctis frictionibus humerorum & brachiorum, nec explodunt ut supravacanea hoc

*Ungula.*

*Panno.*

*Sugillatione.*

*Cartesiani.*

*Syllui.*

hoc in casu emplustra bregmati imponenda & suspensoria dicta ex majorana, betonica, rosmarino, semine nigellæ, mastiche, luccino, thure, gummi Juniperino, tacamahacâ &c. fermento suscepris & aceto lavendulæ malaxatis, præterquam enim quod vasa, & fibras leviter constringendo eorum tonum insigniter restituant, ne nimia copiâ contentum effundant liquorem. Spiritus etiam restaurant & humorem evasatum huc illuc fluctuantem per poros alliciant, imbuntur atque absorbunt, ne partibus subjectis cum spiritibus ulteriorem creet molestationem. Quò verò citius ejusdem minuitur abundantia, purgationibus eum per alvum eiciunt, nempe per sequentibus Pilulis:

*R. Mass. pil. de succin. Craton. gr. xv.  
resin. jalapp. gr. v.  
Cum s. q. essent. Chelidon. maj. F. Pilule No.  
tot, quot placent ægro, excip. pulv.  
spec. dianthos.*

Vel sequenti mixturâ liquidâ:

*R. Aq. Senecion. ʒiʒ.  
Turbitur. jalapp. ʒb.  
— Oxi dulc. ʒb.  
Syr. de fumar. compos. ʒiiij.  
M. Prepineatur una vice exhaurienda.*

Hinc ut residuum eò eliminetur facilius, undique referant ostia, quo absque ullo obstaculo effluere queat atque exhalare, quod obtineri ajuut sudoriferis & præsertim sequenti:

*R. Rad. valerian. ʒiʒb.  
Sassafr. ʒiʒb.  
Rasur. ligni Junip. ʒb.  
Guaiac. ʒij.*

*Herb. verben.*

*ruth. aa. mʒ.*

*Flor. anth. p. ʒ.*

*Mixtis & convenienter apparatus superinf.  
vini generos. ʒiiij.*

*Aq. fl. Sambuc. ʒij.*

*Stent per ʒ in digestionem,*

*Mane filtrantur, addanturque*

*Spir. euphras. ʒij.*

*Syr. de fumar.*

*Card. bened. aa. ʒj.*

*M. dentur tribus vicibus, corpus postea ad sudorem disponendo.*

Prospectis ita interioribus, & hoste graviore ejecto, ipsam partem læsam in pristinum integritatis statum reponendi se gerunt sollicitos, fibras à peregrino hoste in tunica annata valde agitate ad quietem ducendo, easque unâ cum spiritibus incolis earundem consuetis corroborando, particulas acutas noxias eliciendo, & poris debitam suam figuram conciliando, quod facile nonnunquam impetare sciunt cataplasmate ex pomis dulcibus allatis & per cribrum trajectis, additis succinato canthio, croco & camphora, tepide oculis laborantibus applicato, vel sacculo herbis euphras. verben. flor. ros. camomill. sem. fœnigr. fœnic. repleto, in aqua ros. cocto & similiter tepide imposito, quo peracto ad reliquias discutiendas & fibras confirmandas, sequens collirium nunquam frustra se adhibuisse scribi affirmant.

*R. Aq. flor. cyan. ʒvj.*

*euphras. ʒb.*

*fœnic.*

*rosar. aa. ʒiij.*

*Vitrioli alb. ʒj.*

*M. agitentur & filtrantur, liquor filtratus guttatim instilletur oculis.*

Addunt interdum sacchar. canth. ocul. & pp. alcali C.C. thur. pp. sacchar. ʒi, sed absque his vitriolum illud laudabilem edere effectum probe norunt, ut reliqua sæpius primarium remedium palliandi causa adjuce conficiantur; ubi tamen acidum acre fibras lancinat, eadem adjungunt pro majori illius absorptione. Spina vel festucam alcius infixam eliciunt vel carne bubula adhuc à mactatione calidâ, vel emplastro Apostolico toti oculo per noctem imposito, quod eandem cum lacrymarum copiosiori effluxu eliminat. Siccatate urgente macilaginola illinunt, & collirium ex aqua spermatæ ranar. semperviv. maj. cum albumine ovi conqussato, additâ interdum pro majori fibrarum obfirmatione, ut primi elementi exagitationi fortius queant resistere, particulâ quâdam aluminis. Si verò pori penitus sint obstructi, & fibræ exiez, ad acicula corrodens domandum, & membranarum restaurationem adhibent unguentum album Gale, Ang. Sale, magno, ut credunt, exiturum juvamin.

Unguis nondum confirmatus ulterius impediunt incrementum, & quod de pelliculâ illâ jam est productum, iterum destruunt medicamentis acidum austeralesculum, sive partes angulares terrestribus & ramolis inviscantibus immixtis dissolv. tibis, ne tucos coagulent & spiritus in motu impedian, quod præstant spirituosus & volatilibus coagulationi maxime resistentibus, & spiritibus in motu, liquoribus autem fluorem reddentibus, quapropter spiritum euphras. lumbricor. essentificatum, & C.C. frequentius portugum mens inmedium, ut & salia volatilia succini aliarumque. Externe abstergentia niurpant particularum quieti resistentia, & corpuscula angularia fragrantia, & destructos eorum angulos absorbentia & secum auterentia, cujus efficacie sequens extenuum creant collirium:

*R. Aq. Chelidon. maj. ʒj.*

*mell.*

*Succ. ruth. aa. ʒb.*

*Oss. sep. ust. & subtiliss. pulverisat. ʒb.*

*Myrrh. ʒj.*

*Æru ust. ʒb.*

*M.*

Instillantur aliquot guttulæ, & postea linteolo eidem intincto levis aliquando fiat absterasio. Majorem & diuturnitate temporis obfirmatum prius emollire student focu ex decocto malvæ, euphras. flor. cyanî, camomill. sem. fœnigr. fœnic. hinc iungunt axungiam pilis multæ, & emollitum acris oculis aliquantum auferre tentant, adhibita vel aqua Saphirina Chirurgorum, vel sequenti mixturâ pro collirio quam iidem guttatim instillant, & linteo eadem humectato leviter unguem abstergunt.

*R. Aq. fragor. virid. ʒvj.*

*centinod. ʒv.*

*Sacchar. Canar. ʒj.*

*Myrrh. ʒij.*

*Thur.*



# CAP. X. DE TUNICÆ ADNATÆ VITIIS. 81

*Thur.* pp. 3℔.

*Vitrioli alb.* ʒj.

*M.*

Aquam etiam destillatam fellis lucii piscis non parvi pendunt, quæ unguis sæpius est abluendus. Tandem, qui nec his cedit remediis, cum ferro committunt, ut, desiderantibus id ægris, aculo si loque traducatur, sicque in altumeductus ita pello pentus abscondatur, loco, in quo abscessio facta, postmodum sequenti abluto colligro, ut consolidatio & pororum harardictio:

*ʒ. Aq. rosar.*

*verben.*

*euphras.* 22. 3℔.

*Sarcocoll.* ʒj.

*lap. hæmatit.* pp. 3℔.

*Vitrioli alb.* ʒ℔.

*M.*

**Pannum.**

Panni curationem, cum mixturæ sit sanguineæ, inchoare solent venæsectione, ut sanguinis aliorumque humorum affluxus avertatur, quin vesicatoria nuchæ applicanda non omittunt, & ut pori itidem aperiantur, & materia inspissata resolvatur, attenuetur & fluxilis reddatur, spirituosus usurpant ex antecedentibus jam cognita, quibus ita administratis, ipsa deprimunt topica, primo emollientia, post abstergentia & panniculolum illum renouentia, ex quibus non contentendam virium existere affirmant saltem, si ejus ʒj. dissolvatur in aqua vel succo chelidon. maj. & infus colligro adhibeatur, tum instillando oculo guttam unam vel alteram, tum linteo eodem liquore humectato pannum illum abstergendo; vel eodem modo usurpandam sequentem laudant mixturam:

*ʒ. Aq. Chelidon.*

*euphras.* 22. 3vj.

*Infundantur per p. super croci metall.* 3℔.

*Mane filentur, & filtrato liquori add.*

*Aq. destill. fell. human.*

*succ. artemis.* 22. ʒij.

*M.*

Etiam sequens colligrium non parvum in abigendis istis pelliculis & extrescentis dissipandis repererunt virium:

*ʒ. Aq. Sabin.* ʒj.

*stercor. asferin. mense mayo collecti destillat.* 3vj.

*fell. capra* 3℔.

*ciner. mandibul. lucii pisc.* ʒj.

*Myrrh.* ʒij.

*Vitrioli alb.* ʒj.

*M.*

& panniculus eo sæpius illinatur, hinc abstergetur linteo tenui. Frustra vero hisce & similibus tentatis, administrationem chirurgicam celebrant, eamque haud diversa ratione peragunt, ab ea, quam supra in aliorum, & imprimis veterum ætatis jam reddidimus perspebam. Resecto etiam panniculo oculum abluunt aqua plantag. & rosar. in quibus lap. hæmatit. ʒj. oc. ʒj. pp. thur. & sacch. canth. suere dissolvantur.

In leviori suppuratione, sine plurium vasorum læsione, ad discutendum sanguinem evasatum & corruptum illinunt macilaginem gannu tragacanth. factam in aq. ros. calcitrapp. & euphrag. addito interdum pauco croci & camphoræ. quo exposito non semel hujusmodi suppurationes tum in palpebris, tum in bulbo oculi

discusserunt. In graviore vero, ubi cum vasorum læsione multum sanguinis effusum & coagulatum est, instillantur focus ex decocto charesol hyssop. euphrag. summit. fœnic. rad. polygonat. sem. fœnigr. vel linimentum adhibent sequens:

*ʒ. Macilag. sem. fœnigr. aq. charesol.*

*traci.* ʒj.

*Succ. Hyssop.* 3℔.

*Thur.* pp. ʒj.

*Croci* 3℔.

*Camphor.* ʒ℔.

*M. Illinatur.*

Vel sequens:

*ʒ. Succ. chelidon. maj.* 3vj.

*fœnic.* ʒij.

*Lap. calaminar.* pp. 3℔.

*Myrrh.* ʒj.

*Croci gr.* vj.

*Camphor.* gr. iiii.

*Mell. ros.* 3℔.

*M. F. Linimentum,*

quo lintecolum obductum superimponatur, vel imple oculus suppurat illinatur. Medicamentis autem hisce aliisque, si sanguis corruptus resolvi & discuti nequeat, etiam internis in usum ductis diaphoreticis & poros dilatantibus, quo facilius exhalet, tunicam aperiant, ut contentus ille sanguis inutilis majorem inveniat exitum, digito prementes ad foramen, ut citius egrediatur, quæ operatio chirurgica tum maxime est commoda, ubi sanguis ille corruptus chyloso intermixtus secedit in pus, quod in tempore eximendum, ne per moram acrescens acredine suâ partem adhuc magis corrumpat.

§. 19. Accedamus jam ad curationem nostris Nostra suppuratationis suffultam, quæ in Ophthalmia duosentia de curatione Ophthalmia.

Indicatio curatoria morbum seu inflammationem oculi tollere jubet; eo respiciendum simul, ut symptomata urgentia mitigentur medicamentis stagnationem humorum impediuntibus, & spiritibus subveniant. Scopo huic ex voto obtinendo inserviunt præsidiorum materia ex duplici fonte, nempe Chirurgico & Pharmaceutico depremoda. Remedia Chirurgica agunt hic efficaciter.

Primum autem fontis Chirurgici remedium putatur Venæsectio, quæ verò, meo iudicio, hic magis obest quam prodest, quia sanguis non est in culpa, nec ille est evasatus, aliis esset suppuratio, & si sanguis esset evasatus, tunc nunquam V. S. institutâ revelleretur vel resorberetur in venas, eæ nuper in suppuratione observavi, ubi et V. S. absque ullo commodo instituta fuit: ejus ergo curatio duplici instituitur via: prima per materiam obstruentis diffusionem; quæ duplici rursus modo tentatur, primo medicamentis externis parti affectæ applicatis; secundo internis ut v. gr. diaphoreticis salinis volatilibus, quia hæc sunt omnium penetrantissima: ad mentem etiam Gallorum apex auris perforandus, & frustulum radicis Thymelææ intrudendus, & de die bis commutandus. Vesicatoria verò cum seroso acri ichori deplendo unice inserviunt, summum Ophthalmia erunt remedium, cum quoque extremis convulsionibus à vesicatorii dolore productis, forte obstructio ex inflammationis poris tollatur, si enim ex cantharidibus formâ emplastris vel cataplasmatibus parata cervici, vel humeris

L

quo-

suppurat-

nem.

quoque simul, vel etiam brachio applicentur, locum ostendunt naturæ convenientem, quo extrudere hostica & sylvestria salia, sub lymphæ vehiculo hospitata, possint. Sic quoque si brevi tractu depletio feri onerosi acrioris fieri nequeat, & de massa sanguinea scaturiat hic impetus feri, ut duret longius, vel repetat, aliaque graviora symptomatica minetur, Fonticuli suadendi sunt in brachio vel pede insuli, eo nomine setaceum quoque applicari potest, duro enim nodo durum tuncu, gravi morbo heroicum sed tutum apponamus remedium. Plenæ hæc sunt laudibus meritis Aurorum observationes, adeo ut in Ophthalmia inveterata & Eppicitudine non dari generosiores medelam, nullum præstantius remedium statuatur in scholis Medicis, quam setaceum aut fonticulus. Hirudinum quoque applicatio ad vasa temporalia alii commendant. Frictiones, quæ absoluntur manibus vel linteolis asperis, maxime profunt, sicciore ferè ut plurimum, tantis per continuandæ, dum abunde incalescat & mollius reddatur corpus, jucundusque rubor effluerit. Eodem spectant etiam capitis pectinatio & frictio specialis, ventriculo jejuno blande insitenda.

Ex Pharmacæutico fonte curationi inferiunt omnia ea, quæ obstructionem ex inflammationis poris tollunt. Ut ergo particulae acres & acida sæpe in primis viis latentes, & tandem ad oculum delatæ eliminentur, conducunt lenientia, imprimis pilula aloëtica quæcunque, marcosoline, Francosutenes, & de succino Craton. Cæter, esles, Pilul. Conring. ex gummi vesperi assumenda. Alii in pertinaci malo ad inunctionem galem temerè accedunt.

Dein ad diaphoretica blandiora & quasi deobstruentia pergendum est; diaphoretica enim ut omnium inflammationum remedia sunt genuina, ita quoque in hoc affectu apprime juvant, quo nimium feri vitiosi & particulae sylvestribus & hosticis imbuti copia imminuitur, & obstructio tollatur. Laudari hic merentur Ebur & C. f. Δ. unicorni fossile, lap. bezoar, ocul. es. gata, cinabarina & Galia ritè preparata, Gum bezoar. Anthrac. Poter. M. S. Sunt formulae in juniorum gratiam:

℞. Specif. Cephal. D. M. ʒi.  
Camphor. gr. j.

M. F. Pulvis pro una vice in vehiculo domestico.

℞. Card. bened.  
scord.

fl. sambuco. aa. ʒj.

Rob. Ebuli ʒb. (quod in omnibus inflammationibus optimum est remedium.)

M. D.

℞. Unicorn. fossil.

CC. f. Δ. parat. aa. gr. ij.

Pulvis ʒij gr. ij.

Arcan. duplicat. gr. iij.

M. F. Pulvis pro una vice exhibendus.

Nec spem penitus defraudabunt diuretica, quæ serum fundunt, & sic serum vitiosum cum particulis istis lixiviosis educitur, ut sunt arcan. duplicat. succin. arcan. Çi. Clyst. ʒij; spiritus Oxi dulc. millepedes notat enim Cl. Muys in Podalir. suo, in Ophthalmia diuturna cum successu exhiberi pulverem millepedum exsiccatorum,

vel eorundem tincturam benè preparatam & ritè propinatam.

Ad sanguinis & feri particulas acidas silvestres diluendas & corrigendas, simulque acidum in primis viis subsistens absorbendum, conducunt sequentia, Tinctura Oxi, Elix. propr. martiale, Tinctura Corallor. cum spiritu Guajaci parat. Essent. fumar. Spec. diamarg. frig. succinatæ, petla, nepeta, valerian. euphras. indeque parata infusa, maxime verò hic commendamus potum Thee, vel eodem modo parata infusa cum prædictis herbis vel radicibus; sic quoque mixtura, tragemata, & si simul dolor urgeat, cum anodynis miscantur superius dicta medicamina. Esto formula:

℞. Essent. succin.

anodyn. aa. ʒij.

M. D.

℞. Pulver. succin.

anodyn. aa. ʒb.

M. D.

Spir. Ophthalmicus sequens est egregium remedium v. g. Sacch. ʒi & spir. vin. ana, destill. per ʒi dosis gr. v. in aqu. ros.

Ex evacuantibus particularibus laudem merentur masticatoria, quæ destinata sunt superfluo sero evacuando, in salivalibus succibus contento, ut isthinc quadantenus avocetur & ab oculis ad palatum derivetur, ne partibus nobilioribus inferat molestiam, paranda ex cubebis; Mastice, N. M. Terra Japonica. Vel

℞. Sem. staphid. agr. ʒb.

Rasa. pyrethr. ʒj.

Piper. alb. ros. ʒb.

F. pulv. recipiatur melle F. pastill. pondere ʒij.

Errhina verò sunt miora, ne propter tunicis haribus continens nervi optici in consensum trahantur, hinc sternutatorii consultius abstineamus, ne concutiendo ad lacrymandum inducamus oculos, & spiritus æquè ac humores confundamus & irriteremus vehementius.

Præter jam dicta interna, etiam externa topica hecclaria sunt, & sæpe totam implent paginam, his enim dolores & acres oculorum lachrymæ instar incantamenti tolluntur. Inter hæc topica sunt præ reliquis polychrestia pluribus scopis satisfaciencia satirina, vitriolata, quatenus obstructions suæ penetranti vi tollere possunt, certum enim est, quod vitriolum album, Alumina & Thutia sint anima oculi. Esto una & altera formula, ubi simul dolor urgeat:

℞. Sacchar. ʒi ʒj.

Thut. pp. ʒb.

Crocioptim. anfricac. gr. vj.

Camphor. gr. iij.

▽ sperm. ranar.

solan.

rosar. aa. ʒi ʒb.

M. D.

Ubi dolor adeit intensus, maximo cum frictu applicui sacculos flor. euphras. cyani, chamomilla, summit. anethi refertos, & spiritu vini, vel aqua Reg. Hungaria aspersos & foris impositos, Spiritus noster Ophthalmicus est egregius oculis, si guttae, vel plures in aqua rosarum immittantur & applicentur. Cataplasma sequens conducet,

℞. Pomor.



† *P. mor. dulc.* No. ii).

Coq. ex aq. rosar. & plantag. q. s. ad molli-  
niem, trahiciantur per cribrum, pulpa

*Mucilag. sem. Cydon. 56.*

*Sacchar, alb.* ʒij.

*Campb-r. gr. xp.*

*Croci* gr. v.

*M. F. Cataplasma.*

Vel Alumen cum albimine ovi in vase stanneo  
agitetur, usque dum in puliculam abit, & tunc  
parti applicetur affectæ.

Ubi verò dolores non urgent, possunt aliis  
addi Vitriolum & Sal \*cum, quia obstructions  
tollunt & poros faciliè pervadunt, Ex. gr.

R.  $\nabla$  *F. nuptias*.

rosar. aa. ʒj.

Sacchar. Hi

*Vitrioli alb.*

This \*cl,

Camphor. aa. gr. v.

*M. F. Collyrium.*

Acida & frigida suspecta sunt, cum humores & spiritus oculis inhabitantes ab iis incraffentur, qui semper volatiles esse debent.

Omnia oculis, tanquam partibus nervosis, tepide applicantur, blandis enim & mucilaginosius, alde & acriusculis, tanquam de obstruentibus, delectantur oculi, acque urgente dolore magis demulcendum, urgente inflammatione magis temperandum, ubi non neglecto opio, nimis acris violenta potius alliganda sunt, quorum illa tristi inducunt sensum magis irritant, hæc vero nimis obducunt, non enim patitur lustrum oculus, & sæpe religioſa nimis medicamentorum copia lædi eundem compertum est. Acidum tanquam nervis inimicum oculis haud applicanda sunt.

Caro vituli recens macerati, vel hœdina, vel  
vervecina oculis infopita, quia spiritus carnis  
cum nostris poris conuenit, ad illos obstruc-  
tiones referandos maxime conducit. Ros rogi Solis  
infusus, in inflammationibus æque externis ac  
internis oculorum summum affert solamen, ut  
& aqua ruthe. Fungus sambuci cum Tris op-  
thalmicis in adfectibus, item cataplasma ex omni-  
bus dulcibus non nimis calide applicatum, sæpe ma-  
ximum afferunt solamen. Sic quoque epiori-  
tis et remedum succus fumarie instillatus in  
oculos, ut & proficiens ex corticibus recentibus  
citri. Inter demulcentia & recenseri po-  
tuit lac recens emulsum & in oculis instillatum.  
Herba fœniculi in oculorum affectibus est com-  
mendatissima, iis præprimis, qui lubricatio-  
nibus nocturnis oculis nocuerunt, unde & li-  
quor ejus saccharatus à *Barbeto* tantum æstimat-  
ur, qui sequenti modo paratur:

¶ *Herb. fœnic. cum summit. q. v. cum caulibus molliter excavatis immitt. sacchar. & ita per noctem relinquatur, quod saccharum in liquorem abit, & colyrium præbet præstantissimum.*

Sic etiam pinguedo viperina ipsa suis calibus, ubi discutienti fuerit intentio & resolvendi, habito utrobivis selecta, v.g. in unguculis & aliis conducit. hæc enim recens magis demulcet, vestitus magis discutit, hinc vidit celeberrimus *Vedelius* ejus beneficio una nocte unguculos curatos.

Tanquam polychreſum commendatur à non-

nullis spiritus panis filiginei, ex pane secco per  
defecum mortario, quem spiritum sumunt in-  
duntque mortario æneo, & obturaco clau-  
dunt, & diu linteo vel plumâ oculo hunc liquo-  
rem instillant; mihi verò magis arident salia  
volatilia, imprimis V sæpius & tepide appli-  
catus.

Temporibus applicentur quoque acidum corrigentia, ne inpetuosiùs lymphæ acidæ jam effera facta ad locum affectum ruat, in quem finem Emplastrum m. catarrhale sequens proderit.

℞. *Mastic.* ʒiij.

*Ladan.* ʒij.

*Bol. armen.*

*Sang, dracon. 22. 3j.*

Op. Thebaic. 3j.

Cum terebinth. s. q. F. Massa.

Ad oculos lippientes varia unguenta, lini-  
menta, collyria, trochiscos, Sief describunt  
Auctores Practici hinc inde, prout ad nauseam  
usque saepius jæn diximus.

Pertinet huc & lenis palpebrarum frictio, imprimis cum succino sapphiroque. Nostra experientia valet butyrum majale cum bol. mixtum, & sindoni inditum, quo ipsi oculi sunt palpani vel solâ chartâ bibulâ plantis pedum fermentum panis applicetur. Capilli capitis abrasantur & caput tegatur pelle lupi vel cucurbit.

*Rubedinis* oculorum imprimis post variolas relictae curatio eadem est cum jam dicta curatione ophthalmiae.

Nunc paucis curationem *Unguis oculi seu* *Sententia*  
*Pterygi* videamus, quæ cum priore in univer- *nostra de*  
sibus convenit. Remedia ex fonte Chirurgi- *curationis*  
ferè eadem conveniunt quæ jam diximus, ex- *Unguis.*  
cepto eo, quod pellicula hinc instructa ab  
oculo manu Chirurgica divelli potest, & si ocu-  
lo nimis firmiter adhæreat, filo serico ligari ac  
forfice abscondi potest, quam Chirurgicam ope-  
rationem accuratè describit *Claudinius*.

Externis topicis plurimum peragitur cura-  
tio huius affectus, quæ tamen est difficilis, quia  
medicamentis acia ad membranam hanc ero-  
dendam hic necessaria sunt, sed tamen ob ocu-  
lum, ætquam partem acuti sensus, hæc simul  
periculosa sunt, merito ergo cutis huius hic. Ex-  
tergentia hic maxime prosunt, inter palmas  
remedia mihi sunt axungia viperina & anguilla-  
rum, instar aquæ limpide à Soleita destillata &  
ungui oculi illita, maxime enim resolvit axungia  
hæc & deficiit; inter faccharum Candi pulveri-  
tis, & ipsius maris mixtum conducer. Succus  
Taraxaci lacteus oculis instillatus leniter mor-  
dicat quidem, attamen pro visu clarificando &  
cuticulâ absumenda optimus est. Alii com-  
mendant balsamum Fi, nonnulli fel & sangui-  
nem anguillæ vive, verum omnia medicamenta  
exsellibis animalium & hominum prosunt qui-  
dem in affectibus his oculorum, quædam tamen  
sunt fortiora. Aqua *Maximiliani Imperatoris*  
ex hercore asnerino tempore vernali collecto &  
destillato à *Lipsolaudatur*. Inter lenissima re-  
fero mel rosar. cum myrrhâ & camphorâ exte-  
rius applicandum. Vel

R.  $\nabla$  *Chelidon. maj.*

verben.

*euphras.* 22. 3j.

Croc. metallor. gr. x.

L 2

Alois

*Alœi succotr. gr. vj.*

*Os. alb. gr. ij.*

*M.*

Convenit quoque contra Ungues oculorum oleum rectificatum formicarum, quia valde visum roborat, circulationem humorum promovendo. Vel

*℞. ∇ Cyani,  
Calceatripp.  
fumar. aa. ʒvj.  
perlar. pp.  
facchar. Canar. aa. ʒß.  
M.*

Omnia enim terrea exsiccantia, ut perlæ, flores cinici sacch. faturni, Unquent. Nihili, Thut. pp. pompholyx, tum æriuscula salina qualitate donata, ut sacchar. Canariense, vitriolum album,  $\Theta$   $\times$  cum, lixiv. cum calc. viv. paratum, &c. in unguiculis, excrecentiis, pustulis, carunculis, perquam utilia sunt. Sunto formulæ t

*℞. Mucilag. sem. cydon.  
cum aq. Chelidoui, ʒj.*

*∇ sanic.*

*suphrasf. aa. ʒij.*

*Mel. rosat. ʒß.*

*Thut. pp.*

*C. C. ust. pp. aa. ʒß.*

*Camphor. gr. iiii.*

*M. F. Collyrium.*

Sic & sequentem aquam plures magnificiunt:

*℞. Alœi spat.  
Sarcocoll. aa. ʒj.  
Camphor. gr. vj.  
Croc. ʒß.  
Pulverisemur subtiliss. add.  
Vini Cret.  
Aq. rosar. aa. ʒvj.  
M.*

Ad pelliculas istas removendas conducunt etiam sumi per infundibulum oculis admissi, ex res solventibus & anodynis parati. Sacculi varii ex his aliisque parati & impositi apprimis profunt.

*Curatio  
Panni.*

Sic etiam *Panni* curatio coincidit cum curatione prædicti *Pterygii*, & hic pro renatâ adhibeantur sæpius jam dicta prædicia Chirurgica. Interna quoque confortantia conducunt, ut Elethuarium ad visum *Mynsichi*, aliaque circulationem sanguinis & succorum promoventia sæpius dicta.

Ad pelliculam ergo hanc carneam tollendam sæpe opus est operatione Chirurgicâ, de quâ vide *Actium* & *Celsum*. Quod externa Topica attinet, eadem sæpe, quæ superius in curatione *Pterygii* diximus, conducunt, maxime liquor ex formicis rubris expressus, cum felle angillarum & pulvere subtiliss. pumicis permixtus & oculis illitus. In initio sequens potest ad guttas 2. pluresque calide in oculum instillari.

*℞. Lat. muliebr. ʒij.  
Tinctur. myrrh  
Croc. aa. ʒß.*

*M.*

Valer & hic pinguedo collecta ex hepate piscis mustelæ, succus aristotoloch. rotund. oculis instillatus epositorum est remedium. Sequens aqua cærulea pro oculorum collyrio optima est, quæ paratur ex aqua pluviali &  $\Theta$   $\times$  eo, diu in

pelvi tonforiâ simul agitata, cui addatur parum spiritus  $\Theta$  li, qui in agitatione commixtus elegantem inducit viriditatem. laudatur & Tinctura bellidis, quæ in pelliculis oculorum depellendis egregia est.

Succum ex linacibus pelliculis illitum cum fructu sæpius applicatum vidi, ut enim verrucas abigit, sic etiam pelliculas. Quod si topicis non cedat, ad manûs operationem quoque, ceu superius diximus, deveniendum erit.

Curatio *Hypophthalmatis* oculi, seu *Sugillationis Hypophth.* convenit cum curâ Ecchymoseos, sanguis enim evasatus suis valis iterum alserendus, discussio. ne ergo hic opus est, & conveniunt varii sacculi herbis discutientibus impleti, v. gr. hyssop. charesol. rasur. bryon. flor. sambuc. aneth. &c. in aq. simpl. vel lacte cocti. Si dolores urgeant, & ipsi illi sacculi seu noduli oculis tepide applicati convenient. Alii adhibent cascum recentem, alii sanguinem columbium in specie continentem, cum tamen omnis sanguis id propter calorem faciat. *Hartmannus* commendat ovum ad duritiem coctum, per medium dissectum & oculo per noctem calide applicatum. Nos vero, præmissis si opus est, absorbentibus, cum lintheis tepidis applicamus cum succellâ spir. vini camphoratum, vel solam aquam Hungaricâ, vel aquam mirabilem, aliaque calida, & sale volatili imprægnata.

In hoc affectu optime conducit aq. flor. cyani & charesolii, item Decoctum rad. symphyt. & Sigilli Salomonis. Hisce quatuor fidendum, & tanquam ad sacram anchoram confugiendum est. Summitates hyssopi etiam in nodulo immergantur vino Hispanico calido, postmodum cum succellâ calide applicentur oculis, & mox omnis cessabit sugillatio.

In puero 7. annorum ex continuo perseverante atrocissimâ tusli, oculos ita protuberantes ac sanguine suffusos observavi, ut diuiles, non oculos sed grumos sanguinis representare ægruunt, qui nihil se videre ajebat, & si quid oculis offerebatur, ignem se videre ajebat. qui tamen à nostro Chirurgo *Mutillie* intra 4. septimanarum spatium, supradictis & similibus, sine visus læsione, feliciter restituebatur.

Si in tunica adnatâ suffulso percipiatur, non statim instrumento aperitur, sed ut dissipetur humor ibidem concretus annuitur, in quem finem varia conducunt su dorifera superius sæpius dicta, imprimis sequens:

*℞. Aq. Card. bened.  
fumar. aa. ʒijß  
Essent. succin. alcalina. ʒß  
M.*

Exterius & vesicatorium nuchæ applicetur, & oculo instilletur vel illinatur balsamum expinguedine viperinâ, & collyrium ex croco metalorum cum aq. chelidoui. paratum. In omnibus jam dictis affectibus cum comodo instituetur setaceum in nucha, in malo nempe sæpe desperato tentando; in omnibus oculorum affectibus, colluvie lymphæ salis existente copiosiore, conducet ratio capillorum, & capiti raso imponatur capillitium ex pelle vulpino, vel sequens cucupha paretur ex sem. anis. fœnic. hacc. lauris sem. milii. sal. commun. in sartag. frix. & vini generos. aspersi. quod sæpe pluribus incassum tentatis adjuvmentum attulit.

CAPUT

## De Tunica Corneae Vitiis, Crassitie, Nebula, Albugine, Pustulis, Hypopyo, Vulneribus &amp; Ulceribus.

## §. i.

**J**am præmissis hiis, ad Tunicam Scleroticam, seu duram dictam, nos conferamus, quæ à dura matre oritur, estque crassa & posterius opaca, hinc hujus partem anteriorem nuncupant Tunicam Corneam, quia est sicut cornu politum & pellucidum, cui Tunicae plures contingere solent affectus; & primò ipsi accidit *Crassities* quædam, & nihil aliud est, quam obstructio pororum Tunicæ hujus corneæ, inde ægri hoc affectu infestati quasi per fumum videre coguntur, & ipsis nebula quasi in superficie apparet.

Crassities quid.

Nebula.

Albugo.

*Nebula* verò est color Corneæ parum mutatus ab humore subuliori illapso ita factus.

*Albugo* aliis dicitur & *Leucom*, estque macula alba Corneam nostram tunicam ita densam reddens, ut radii transitus denegentur. Describi potest, quod sit macula quædam Corneæ tunice, ex condensatione humoris impacti; vel propter cicatricem vulneris ulceris, vel propter obstructionem à viscido crodoroque humore inductam oborta, visionem lædens.

*Differt* à Nubecula (*νεφέλη*) durâ crassitie. Generaliter utraque species cicatricum *ἰδίων* nomine venit: nemo Medicorum vix has species discernere potest.

Pustula.

*Pustula* super Corneam tunicam sunt tumores à vi externâ & continui solutione ut plurimum exortæ.

Hypopyon.

*Hypopyon*, nonnullis *Prophis*, aliis *Lunella* audiens, est puris quædam sub tunica corneâ, vel inter illam & uvæam facta collectio, aliquando post ophthalmiam male curatam, interdum etiam post sigillationem, materiâ in pus transmutatâ, oboriens.

Ulcera &amp; vulnera.

*Ulcera* huic membranæ & sæpe accidunt ab acri acido, lympham ex glandulis oculorum emanantem ita corrumpente exorta, ut & *Vulnera*, facile enim fieri potest, ut à re externâ violenta Cornea hæc membrana ruptur & humor aqueus effluit; sic & erosi & rupta Corneâ tunica oritur tumor qui Græcis *Staphyloma* dicitur, qualem vidit in Infante 2. annorum frater meus Germanus Jacob. VVilhelmus Dolæus, Præct. Francothalensis.

Pari affe. na.

§. 2. *Parti affe. na* est Tunica Cornea dicta; quæ involvit totum oculum anteriorem, firmiter quoque adhæret in posteriore parte Choroides, Crystallino tamen sociata in medio, ut aquam à vitreo separet.

Diagnosi.

§. 3. Affectus hi faciles sunt cogniti, ipsos nostros ferunt oculos. Cognoscitur *Crassities* & *Nebula* exinde, quod Nebula quasi in superficie appareat, & ægri quasi per fumum videntur.

Sic & *Pustulæ*, quæ sunt tubercula, & ipso visu cognoscuntur, magnitudine granum milii æquant, nigredine exactâ, rotunditate, quod in fundo circulum album non exhibeant, à Proci-dentia uvæ distinguuntur; nonnullæ sunt cum inflammatione, plures absque hac; aliæ sunt superficialiæ, aliæ profundiores, albæ magis

videntur, & facile totam corneam corroderæ possunt

*Hypopyon* verò ex eo cognoscitur, quod pus vel nigrum oculi totum occupet, vel iridem adimpleat & per tunicam corneam pelluceat, maximè commotò oculo, vel portio ejus haud ita magna in cornea unguem resedant, vel lunam decrecentem seu falcatam præstent, unde etiam nomen adipiscitur *Lunella*.

*Ulcera & Vulnera* nullis peculiaribus indigent signis, & facile à perito Chirurgo solo aspectu, & relatione ægri dignosci possunt.

§. 4. *Veteres*, & ex illis maximè *Galenici* Corneæ hujus tunice *Crassitiem* originem ducere ajunt ab humorum crassorum intra illam seles infusantium copia, tum etiam à topicis refrigerantibus aut acti frigidis imprudenter applicatis, unde substantia ejus exliccet & corrumpitur, quæ corrugato tunicam ea in parte, ubi fit, crassiorem reddat & visum imminuat, vel prorsus tollat & aboleat.

Causam *Nebula* alii statuunt humorem subul-lem, alii crassum, tunice corneæ illapsum, & colorem ejus mutantem, tum etiam cicatricem post ophthalmiam aut exulcerationem oculo inductam, & tunicam hanc incrassantem, ut visus obscurior fiat, & nonnisi per fumum perfici videatur.

*Albuginis* seu *Leucomatis* causam nominant humores crassos, & imprimis pituitam spississimam tunice corneæ impactos, sæpiusculè post ophthalmiam discussis subulioribus remanentes, & non modo crassitiam, sed etiam colorem album tunice isti inducentes, quod idem contingere posse perhibent ab ipsâ cicatrice, post sanatum ulcus aut vulnus ibidem relicta.

*Pustularum* seu *Phlyctenarum* ortum attribunt humoribus acribus, sive biliosis, sive scrofulis, salis, & mordacitate sua tunicam vel distendentibus, vel corrodentibus, sicque ipsam visionem lædentibus.

*Hypopyon* oriri dicunt à sanguine in tunicam corneam vel uvæam illapso, ibidem corrupto & in pus converso, quod frequentius accidere observatur, dum post inflammationem abscessus relinquitur, atque discusso reliquo sanguine, aliqua ejus portio remanens suppuratur. Nonnulli suppurationem hanc absque ulla inflammatione vel causa violenta externa prægressâ, tamen fieri posse contendunt à solo aqueo humore, non ab simili modo, ut sanguis aliis solet, in pus convertere, quod post diuturniores & graviore cephalalgias interdum ita fieri solere affirmant.

*Vulnere* Corneæ causæ sunt, ut aliis, ita etiam his Auctoribus, res externæ, violentè intrusæ, sive sint perforantes, ut gladius, stylus, acus, fructum vitti spina, ictus animalium; sive secantes, ut culter, &c. sive contundentes, ut pugnis, baculus, lapis, &c. fortiter & impetuosè oculo, & in specie corneæ huic tunicæ impulsæ.

L 3

Ulcera



*Vicerum.* *Ulcera* causas distinguunt in externas & internas: externas nominant tum icūs, tum res alienas oculis illapfas, tum etiam medicamenta acra & erodentia oculis applicata; internas dicunt esse humiores acres erodentes. eosque vel biliosos, vel serofos aut pituitosos falsos, tum ex sanguinea mafsā ad oculos affluentes, tum post ophthalmiam aut pustulas, sive variolas in oculo, & potissimum cornea hac tunica relictos.

*Secundum* §. 5. *Ex Paracelsi* principiis Corneæ *Craff-*  
*Paracel-* *ties* causam agnoscit ipsam materiam, sive sal cum mercurio primo resolutum, & sub tunica hanc oculi corneam majori copiā influens, innox denuo cum sulphure inspissatum & coagulatum, unde ipsa tunica hac crassitie crescit & pelluciditatem amittit.

*Nebula.* *Nebula* ex materia generatur, quatenus sulphur à sale resolutum nimiam assumit humiditatem, & à mercurio & sale separatus non potest consumi, sed in alienam quandam abiectionem quæ tunica Corneæ (subiecta salis & mercurii activitatem supprimens, eidem pelluciditatem, quam à duobus hisce posterioribus habere debebat, in tantum admittit, ut ipse visus obcurior, & per vaporem quandam crallum fieri videatur.

*Albuginis.* *Albugo* oritur à separatione spiritus salis cum mercurio à sulphure, sal enim subtile fluidius seise ex consortio sulphuris eripiens, & cum mercurio resolutum subter corneam se diffundit, & rubedinem sulphuris extinguit, ea propter tunicæ proprium suum inducit colorem, & maculam albam inprimis.

*Pustula-* *Pustula* excitantur à sale corrupto & urente, mercurii & sulphuris consortium relinquente, & alienam quandam materiam oculo noxiam sequente, sique ignea sua vi, quam sibi à naturali suo statu secedens assumit, in corneæ hac tunica bullulas seu pustulas quasdam provocante.

*Hypopyi.* *Hypopyum* ortum habet à putredine, quatenus à sale corrodeute pars oculi inter corneam & uveam ita destructa est, ut debita ejus forma non maneat amplius, unde mumia naturalis corrupta in putredinosum abiectionem, & sulphur vitale penitus aboletur, ut ita flore & fractu suo oculus privetur.

*Vulnerum.* *Vulnera* communes habent causas quas nec hic Auctor immutat, sed ex prioribus jam perspectæ sunt.

*Ulcera.* *Ulcera* oriuntur à sale per occasionem quandam allecto, & tunicam hanc corrumpente & corrodeute, quod tum demum fieri adest, quando tunica hac ab aliis quibusdam causis corruptionem jam est separata, aut notabili quadam labe infecta.

*Helmontii* §. 6. *Helmontii* juxta fundamenta *Craff-*  
*ex funda-* *mentis* *Corneæ* oculorum tunica à fucis oritur mucilaginis, cum latice intra tunicam hanc ab aliis, atque ibidem inspissatis, qui cum arcte adherent, nec se tam facile ab ea iterum patiuntur divelli, substantiam ejus augent & crassiores reddunt.

*Nebula.* *Nebula* ortum ducit à latice isto cruoris multo scatente excrementis, quæ dum à cruore separatus, & sub corneam hanc à venis effusus ibidem deponit, spiritus lucidus simul redditur impurus, hinc visio non amplius cla-

ra, sed obscura existit, & tanquam per fumum fieri adest.

*Albuginis.* *Albugo* producit ex proximo venarum nutrimento, dum post inflammationem vel aliam graviozem oculi lationem sanguis ex disruptis venis tanta effluit copia, ut eo corrupto venulæ exhaustæ bono cruore, proprium tandem effundant nutrimentum, quod sub tunica hac consistens pellucet, & naturali suo radiat colore.

*Pustula-* *Pustula* excitantur à sale resolutum, quod latex in viā sibi adjungit, & succum ad oculum desert, illud autem acrimonia sua tunica corneam exedit, & effervescendo ac fodiendo pustulas inducit, interdum etiam latex iste cum sale sibi associato ab externis causis evocatur, dum ab indignatione animæ sensitivæ in liquamen acre transmutatur, quod inter fibras Corneæ ebulliens istiusmodi parat vesiculas.

*Hypopyi.* *Hypopyon* fit ex cruore sub Corneam effuso, & ab acido ibidem jam existente in grumum coacto & corrupto, qui cum transpiratione sit ineptus, natura quiddam extrinsecè ex aere, tum intrinsecè ex venis in auxilium trahendo congrumationem illam impedire nititur, at defatigata & impotens à conatu isto cessat, statim verò tunc extraneum acido coagulanti accedens, corruptionem & congrumationem illam promovet, hinc pus oritur plus vel minus, prout copia cruoris major vel minor fuit, modo sub uvea collectum.

*Vulnerum.* *Vulnere* quod respicit causas, non recedit Auctor hic à communialiorum Auctorum sententia, saltem particularia quædam eorundem symptomata ratione laticis & cruoris mutationum aliter explicari poterunt, quæ tamen nimis prolixitatis evitandæ gratia hic studio omittimus.

*Ulcera.* *Ulcera* hæc Corneæ emanant ab acrimonia falsa vel acida in cruore latente, hæc enim ipsas ejus fibras corrumpit, exedit & dilacerat insimul latex cruori mistus eodem allicitur, & continuo salinum liquorem effundit, quo simul arteriæ eroduntur, & sanguinem effundunt, qui extra vasa constitutus corrumpitur.

§. 7. Secundum *Villium* oritur Corneæ *Crass-*  
*Crassities* ab humoris partibus spissioribus tunica hanc constringentibus, ut non modo a vaporibus ita denegetur transitus, sed illi in motu præpediti aggerantur, & tunica fortius adhareant, sique eandem reddant crassiores.

*Nebula.* *Nebula* ab iisdem vaporibus causatur, qui densiores humorem aqueum turbant, & tunica corneæ obducti perspicuitatem ejus adimunt.

*Albuginis.* *Albuginis* causa putatur succus glutinosior, ex liquore nervoso instar gelatinæ ad tunicam illam corneam delatus, cujus superficiei dum affunditur, & expansus agglutinatur, perspicuitatem ejus transmutat in opacitatem, ut in tunica annata plures lamellæ compactæ eam opacem reddunt & albedinem inducunt, quod idem cicatricem post uleris aut vulnus relictum parare non minus existimant.

*Phlyctenarum.* *Phlyctenarum* causa ponitur vel humor acris interius ad corneam hanc tunicam affluens, à quo distenditur, & tunc album colorem referunt pustulæ, vel res quædam externa tum acris,

acris, tum ignea, tunicae huic illata, & fibras ejus corrugans, quae pustulae atrum magis colorati referunt.

*Hypopyi.* Hypopyon originem habere credit ab inflammatione male curata, vel contusione aut sugillatione, quatenus sanguis corruptus copiosior ad Corneam effundit ichorem, qui ibidem aggestus diuturniore coctione in materiam crassam convertitur, & sic pus intra tunicam hanc corneam colligitur.

*Vulnere.* Vulnere causa sunt res externae pungentes vel scindentes, & continui solutionem in cornea tunicam facientes.

*Ulcere.* Ulcera producantur ab humoribus acerbis, vel à sanguine in Ophthalmia aut Sugillatione corrupto, & tunicae corneae continuitatem acrimonia sua dissolvende, quam acrimoniam corrodentem ulteriori stagnatione haud ita difficultate fieri acquirere.

*Syphilis opio de causa Crassitie.* §. 8. Syphilis Corneae Crassitiei causam de ducit à pituita viscida cum sanguine per arteriolas humori aequo affusa, quae dum tunicae huic artius adheret, & cum tempore induratur, eandem crassiores reddit & minus diaphanam.

*Nebula.* Nebula causam statuit halitus à pituita ista exsiccatos & humori aequo confusos, qui oculo obversantes nubeculam istam praesentant, & tandem nonnisi admodum obscure lumen admittunt.

*Albuginis.* Albuginis causam eandem pituitam viscidam ponit, à qua humor aequus incallatur, & tunicae corneae tenacius adheret, sensum sensimque albescentem & tunicam opacam reddens.

*Pustularum.* Pustularum originem adscribit acido acri plethumque in pituita viscida haerenti, & ad superficiem tunicae delato, vel ab externis quibusdam oculo illatis, acri sua mordacitate eandem in partibus quibusdam corrugantibus.

*Hypopyi.* Hypopyi ex sanguine à valis effuso, & diutius sub tunica hac stagnante & ab acido accedente corrupto uriri existimat, eo quod sanguis iste facillime in purulentam redigatur dispositionem, eamque vel crassam, vel fluidiorem, prout varii ei immiscerentur humores.

*Vulnere.* In Vulnere causis cum prioribus absque ulla contentione aut contradictione consentit.

*Ulcere.* Ulcerum causa ipsis humoribus acerbis ab Auctore hoc ascribitur, qui tunicam hanc erodunt, & continuitatem ejus dissolvunt, sive cum sanguine per arterias effundantur, sive ex eodem sub tunica hac corrupto successive egrediantur.

*Crassitiei.* §. 9. Crassitiei causam Crassitiei Corneae imputant variis particulis terrestribus, glutinosis commixtis, sese fibris illis tunicae scleroticae in anteriore oculi parte Corneam constituentibus inferentibus & quiescentibus, quo pacto fibris illis artius adherentes illarum immixtione texturata, ut lucis radios ulterius non transmittant, sicque earundem pelluciditatem plane auferunt.

*Nebula.* Nebulae originem adscribunt tum vaporibus copiosioribus, quibus humor aequus abundat, & lucis radiis transitum difficulter permittentibus, tum moleculis quibusdam terrestribus spissioribus, humores illi inpartantibus, sive ab impuriore succo nutritio à aliquo sanguine per

arteriolas separato, sive à indurata tunicae uvae abluta per ductus aquosos allatis, & humorem turbantibus, à quibus pariter transitus ille radiorum lucis ad retinam usque impediatur, & visio fiat obscurior & nebulosa, sicuti idem ab ipso humore aequo minus fluido aut diluto sed, densiore, similiter contingere posse affirmant.

*Albuginem.* Albuginem oriri volunt à diversarum particularum mistura, sub Cornea in humore aequo facta, dum particulae acutae acidae ex lymphā per peculiare ejus ductuum ramulos eo delatae, particulas ramosas sulphureas & pinguinseculas ex succo nutritio ibidem existentes, praecipitant & coagulant, sicque una cum illis massam albam constituunt, quae tunicae corneae artius adherens, & poros obtegens, radiis lucis transitum denegat, unde illi parum mutati resiliunt, & colorem album exhibent: quibus annumerant cicatricem post vulnus vel ulcus relicta.

*Pustularum.* Pustularum causam dicunt esse particulas acutae & oblongas seu salsas, vel cum succo chylosiore ex sanguine per arteriolas, vel cum lymphā per ramulos lymphaticos humori aequo, & deinde tunicae huic illatas, quarum figurae minime respondeant poris & interstitiis fibrillarum ejus, proinde pori à particulis istis pervertantur, & fibrillae nimis distendantur, unde pustulae emergant, quae non minus à spiculis acutis externis inferri possunt, dum poris hujus tunicae se insinuant, ut sunt guttulae aquae fervidae, plumbi fusi, humorum & medicamentorum actum parti huic imprudenter admodum, vel per infortunium illapsum, à quibus pori obstruuntur, & humor intus alleclus fibras nimium extendit.

*Hypopyi.* Hypopyi causam ex eo adducunt, quod dum pori tunicae corneae à sanguine corrupto in sugillatione aut inflammatione valde sunt mutati & depravati, materia primi elementi in fibrillas ejusdem tanto cum impetu irrumpit, ut ex continua ejus pulsatione rumpantur, à se invicem separantur & cum humoribus ibi stagnantibus commisceantur, sicque confusum quoddam omnis generis particularum conficiant chaos, quod in peculiari, quanti sibi format, cavitate contentum, vocatur pus, & per corneam hanc tunicam facile transleat.

*Vulnere.* Vulnere causae ex superioribus satis sunt perspectae, ut nulla hic indigeat repetitione, tum prioribus & hi Auctores penitus adfuerunt.

*Ulcere.* Ulcerum causas dominant particulas acutas acres seu acidas, fibras Corneae corrodescentes & earum substantiam absumentes, insinuat succum nutritium eadem labe inscipientes, ut non nutriat, sed labia ulcusculi exedat, & fibras ipsamque tunicam ulterius consumat.

§. 10. Causa Crassitiei & Nebulae consistit, iudicium meo iudicio, in obstrukione pororum tunicae Corneae à particulis humoris viscidioribus in oculi cavum delatis & variè motis, dicit enim particulae eidem agglutinantur, & crassitiei inducunt, vel ex massa linginea, vel ex lymphā & glandulis exudante eo facta, plerumque vero à frigidiorum & acidiorum applicatione, unde tubuli facili Marte obstruuntur.

*Albugo seu macula alba* oritur à crassa & viscida

viscida materia, circa has partes se coagulante; sic quoque a cicatrice post vulnus vel ulcus facta. Particulae enim viscidae, tunicae corneae poris intro foras spectantibus, adeo sepe inflantur, ut facile corpus aliquod membranaceum repraesentent, unde necesse est, ut suam omittat perspicuitatem Cornea tunica & crassior evadat, quod in se ipsis non raro contingit, ob fibrarum duritiem ac rigiditatem nimiam, quod irreparabile inducit damnum. Idem fere contingit a cicatrice ex ulcere relicta, cuius occasione densior reddita Cornea, *Leucoma* contrahit, cuius magnitudo variare solet.

*Pustula-  
rum.*

*Pustula* hujus Corneae oritur vel a continui solutione, ab externa injuria facta, vel humor partis proximae conservatur & colligitur p. n. unde stagnatione & obstructione facta pustulae oriuntur, aut propter frigus fit tubulorum horum restrictio, aut propter acidum humores hos coagulans, aut propter remedium etiam externum male adhibitum, eos in crassum humoris denique particulae salinae male figuratae per tubulos transire nequeunt, quia haec per motum ex massa sanguinea vel serosa separata, tantum densius agglomerantur, ut circa tubulos partium Corneae resistent, & haec pustulas intendant.

*Hypopyi.*

*Hypopyi* causa proxima est puris collectio sub Cornea; pus autem hoc exinde oritur, quod ipsi succi in graviore Ophthalmia, aut contusione vel singillatione extra vasa diutius constituti corrumpantur, & accescere incipiant, sicque multas particulas acidas inter fibras hujus tunicae transmittant, quae tubulos etiam obstruunt, & pristinas transmutantes figuras, materiam subtili consuetum denegant transitum, hinc illa fibras impetuosis agit, unde fibrae irritatae ad stilendum illum in regionibus suis excitatum tumultum, omnes concutit canales, qui tum inordinate suos effundunt succos, quo impetus ille materiam subtilis vi contraria sedetur, at varia & intemperata sic constituit diversorum humorum, etiam chyli crudioris, miscela, quae peculiarem sibi efformant fossam, modo in medio Corneae majorem, & *Hypopyum* ceritur, modo in ejus sine sub initium *Uvae*, unde figura hujus tunicae se accommodare tenetur, & figuram unguis relecti seu Lunae falcatae praesentat, & propterea nomen *Lunella* nanciscitur.

*Vulnere.*

*Vulnere* ut quorumvis aliorum, est causa & continui solutio, & divisio facta a vi externa, sic & hujus tunicae corneae est, & quia tunica haec membranosa, hinc se solutio in hisce nervosis partibus. In his vulneribus saepe particulae ramosae extra tubulos prolapsae sibi invicem implicuntur & concretis in materiam quandam fibrosam ac caudicem, non dissimilem illi materiae, quae conspicitur saepe in aqua, quae ex V. S. profluit, quae etiam igni insolita inspillatur. Saepe etiam ex contusione valcula sanguifera disrumpuntur, & quibus sanguis sub ratione sanguinis emanans stagnat, ac livore inficit partes sibi vicinas. Sic & raro vulnus in nobili hac parte fit, quod fibrillae plures simul dirumpantur, & disrupta resiliunt in circulos, atque ita tubulos multos obstruunt, in quibus humores circulares accumulati prement vasa sanguifera vicina, sic ut sanguis stagnet,

unde etiam comites tumor & rubor in toto semine oculo oboriti solent. Dolor vero & ardor oritur, quando sanguis in vasis suis capillaribus stagnans & evasatus brevi accescere incipit, hincque particulas suis pungentibus fecantibusque fibrillas vicinas solito citius & impetuosius commovet. Lachryma quoque saepe emittuntur, & hoc fit, quando particulae acidae eisdem sanguinis stagnantis & coagulati irritatione suae leves quasdam concussiones inducit in glandulis oculi, unde contentus liquor excutitur, adfunt enim octo vel novem ductus novi, ab Anatomicis hactenus non observati, quae glandulis in oculum stillant lachrymas, & a quibus oculi irrigantur.

*Ulcus* Corneae est solutio unitatis ab acredine corroden-  
*Ulceri.*  
te, seu acida corrosiva producta, hic enim pervertitur alimentum Corneae proprium in excrementum acre, & in saniem transmutatur. Ulcera haec, cum dictum, oriuntur ut plurimum ab aciditate hac peregrina, in sanguine vel lymphae quacunque occasione oborta, & sibi imperium rapiente circa hanc tunicam corneam, & tyrannidem suam lacerando, urendo, dividendo & ablimendo exercent. Sic quoque post vulnus factum facile acido exuperante in ulcus fit transitus, cum vasa plura rumpentes plures succi evadantur.

§. 11. Omnes hi affectus cum partem nobilem occupent, periculosi & curatae difficiles sunt, & cum in *Crassitie*, *Nebula* & *Albugine* acerbis medicamentis opus sit, facile malum his augeri potest. Si *Albugo* fuerit iuxta cicatricem, tum curatio est difficilis in junioribus, & in senibus nulla. Haec quae est a viscida materia coagulata ab acido, facilius curatur.

*Pustula* vero si sunt in annata tunica, facilius, si sunt juxta pupillam, difficilius, si Cornea in partem internam rumpitur, nulla ratione curari possunt, tunc enim transit in ulcus; superficiei etiam profundioribus facilius curantur.

*Hypopyum* non caret periculo, etenim si materia diutius lateat sub Cornea, & una, orem induat acrimoniam, quod dolor vehementer subinuit, fieri potest, ut propter spiritum nimiam coagulationem in ipsis cerebro subsequatur gangrena, cum alias semper sit difficilis curationis, pus enim iam maturum apertione tunicae postulat, & sui excretionem, at tunica non sine noxa instrumento pungitur, & foramen minusculum non satis commode puris egressum transmittit, eo autem existente majore, humor aqueus facile simul effunditur potest, & vius debilitari, quem cicatrix etiam relicta hebetare solet, ob incrasationem tunicae, eam parte, in qua illa remanet.

Si *Pustula* non totam dilaceraverint tunicam, hoc est, si non tam alte penetraverint, apparet aliqua spes curationis, si vero Cornea fuerit rupta, & humor aqueus effluerit, quod in *Ulcere* accidere solet, omnis curandi spes evanuit. Tum si *Vulnus* sit angustum, minus periculi habet, si ad vnam vero procedit, incurabile est. Sic etiam quo *Ulcus* sordidius & profundius latiusque est, eo curatio difficilior existit, quia in his partibus membranosis ichor seu sanies tenuis aeris & minus albens emanare solet, quod maxime impedit partis curationem; reliqua possunt peti ex capite ulceri dicato.

Dietā.

§. 12. Quantum ad *Dietam*, non opus est ut plura hic adiungamus, quoniam prolixè sæpeque ad Nauseam, & speciatim superiore capite eam prosecuti sumus. Generatim tamen fugienda, quæ sanguini & lymphæ acorem conciliant, eorumque circulationem ac motum impediunt; & regione verò ulsivanda, quæ eorum acorem temperant, corrigunt & ipsis celebriorem impertiunt motum. Imptius in vulneribus oculorum lumen fugiendum, & ægri in obscuro detinendi sunt, impropius potus Thee commendatur.

Curatio Pharmaceutica secundum Galenicum Crassitiei Cornæ,

§. 13. Ordine nunc devolvimur ad *Curationem Pharmaceuticam & Chirurgicam*, quam Veteres Galenici in *Crassitie Cornæ* instituiunt, evacuando prius humorem superfluum, pituitosum scilicet, convenienter tamen ad evacuationem apparatus aqua fœnic. beton. euphras. Oxytel. simpl. & compos. Syr. de Stœchard. Hyssop. &c. hinc sequentes vel similes exhibent pilulas:

℞. Mass. Pil. aloëphang. ʒj.

Agar. trochisc. ʒj.

Trochisc. Alband. gr. ij

M. & c. f. q. ag. euphras. F. Pilula.

His aliquando substituiunt cochias vel sctidas, & quibus pilulæ minus placent, iis sequentem parant potionem:

℞. Agar. trochisc. ʒiſs

Rhei elect. ʒiiij.

Macerentur scorsim in aqua hyssop. vel beton.

F. expressio in quâ dissolv.

Diaphœnic. ʒij.

Syr. de Stœchard. ʒſs.

F. Potio.

Posthæc, ne novus fiat affluxus, frictions instituiunt, vel sacificationes, interdum velicatoria adhibent nuchæ. Inter topica humorem crassum attenuantia maximè laudant fel hircinum aut milvinum. ut & mel cum succo rutæ vel chelidoniz commistum, aut succum raphani cum myrrhâ, croco & opopane, in formam collyrii redactum & oculo sedulo adhibitum. In veteratam tamen Crassitiam plantæ æstivant incurabilem, uti & illam, quæ ex corrugatione & exsiccatione Cornæ substantiæ originem duxit, difficilem credunt curari, eique emollientia applicant, totum videlicet ex decocto camomill. malv. alth. euphras. sem. fœnigr. fœnic. &c.

Nebula.

In *Nebula* præmissis interdum universalibus ex superioribus jam notis, tum internè, tum externè discutientia adhibent, unde humor vel vapor resolvatur, ne ulterius sit impedimento qua de re sequentem laudant pulverem post passum assumentum:

℞. Rad. Galang.

sol. majoran.

euphras. aa. ʒiſs.

rut. ʒſs.

Cori. citr. ʒij.

sem. fœnic. ʒiſs.

ſter. montan. ʒj.

carvi ʒſs.

Cinam. ʒi.

Caryophyllor. ʒſs.

Pip. long.

Zingib. aa. ʒj.

Sacchari duplum ad pondus omnium,

F. Pulvis.

Hunc etiam in finem frequentius usurpandas faciunt confectioes sem. anis. fœnic. carvi, co-

riand, &c. Externè sequentem commendant aquam mellis, qua oculum sapiusculè volute ablutum, eaque non modo nebulas discuti possit credunt, sed ipsum visum multum corroborari.

℞. Mellis opr. lbij.

Rad. aristol. rot.

fœnic. aa. lbj.

Herb. rut.

Chelidon. maj.

summit. fœnic. aa. Mvj.

ſlor. ros. recent.

centaur. min. aa. p. ij.

Macerentur omnia in melle prædicto & lbij. urinae perit venerem non experti, reponantur in vase vitreo per dies decem, agitentur sapius, & postmodum desillando elicantur aqua.

Cicatricem Cornæ inductam sapius iniungunt butyro, vel idem solvunt & linteolum eo madefactum instar fortis adhibent, quo eam dem emolliari, conterri & abstergeri experti promittunt.

In *Albugine* post eadem universalia & reliqua interna cum proximè præcedente huic affectui communia usurpata, emollientia adhibent, butyrum videlicet modo jam prædicto applicandum, vel cataplasma ex pomisq. fœnic. coctis, additis mucilag. sem. fœnigr. cremor. lactis, album. ovor. lap. hæmatit. pulv. cort. granat. & camphor. paratum; deinde abstergentia subjungunt ex lap. calam. plumb. ust. antim. myrrh. Sarcocoll. cort. thur. thut. fellib. diversorum animal. succ. rut. chelidon. maj. centaur. min. granat. dulc. fœnic. In specie laudant nonnulli aquam sequentem ex prioribus quibusdam compolitam. affectui huic singulariter profuturam.

℞. Succ. rut.

chelidon.

euphras.

fœnic. aa. ʒij

ſlor. anib. Mſs.

hepat. hirci ʒanij ʒiſs

sarcocoll.

antimon.

thur.

aloes aa. ʒſs.

fell. capon.

gallor.

mitiv. aa. ʒij.

Sacchar. canisbat. de syr. rosar. ʒvj.

Nucisl.

Croc.

Caryophyllor. aa. ʒj.

utritis terendis hepar in frustula concidatur, tunc omnia mista per alembicum vitreum bis desillantur, aqua secundo prodians servetur ad usum, de qua 2. vel 3. guttulae instillantur oculo.

In *Pustulis* etiam humores superflui evacuantur, revulsionis gratia venam lecant, humores scarificant, velicatoria applicant nuchæ & nihil pro contemperandâ humorum acrimoniâ omittunt, postea accedunt ad topica, eaque in principio adhibent adstringentia & repellentia, ut sunt albumen ovi cum alumine & aq. rosac. bolus armen. Sief de ros. &c. posthæc ad dissipantia accedunt & resolventia, decoctum videlicet malvæ, alth. ſlor. camomill. melior. sem. lini, fœnigr. &c. mucilag. sem. cydon. malv. &c. cataplasma ex mitta panis albi cum lacte & croco, tandem materia resoluta, & per pustulas apertas effusa.

M



effusâ extergentibus & siccantibus curationem finiunt,unguento nimirum nihili, Sief viridi Rhaz. Vel collyrio sequenti :

℞. *Aq. plantag.* ʒiſſ.  
    *ſmilac. lav.* ʒi.  
    *verben.* ʒb.  
    *Ceruf. lot.* ʒiſſ.  
    *Terr. Lemn.* ʒi.  
    *Lap. ca'am.* ʒb.  
    *Sarcocoll.* ʒj.

*Hypopy.*

*M.F. Collyrium quo oculi aliquoties abluendur.*  
In *Hypopy* si simul addit inflammatio dolorosa, venæsectionem instituunt, & ipsam materiam purulentam digerunt cataplasmate ex rad. lil. alb. flor. camomill. melilot. sem. fœnigr. in aq. fœnic. factio, vel ex farina fabar. cum melle, hinc eam resolvere & discutere student, nitillatâ guttulâ unâ vel alterâ sanguinis ex alis columbar. adhuc calidi, vel collyrio ex aq. vit. succ. chelidon. ma. myrrh. & croco; si verò discuti nequeat, Corneam aperiunt & purulentam, materiam el ciunt, vel linteolo tenuissimo leniter preinendo, vel per canalem fugendo, ut in prioribus jam fuit relatum; pure ejecto, mundantia adhibent, abstergentia & consolidantia, quæ ex Ulceris curatione paulo post pateſcent.

*Vulnerrum.*

In *Vulnerrum* curatione semper ferè præmittunt ventresctionem ad sanguinis affluxum, & inde facili subſequuntur inflammationem prohibendam, clysteres applicant, & humores peccantes convenientib⁹ remediis expurgant, interceperunt etiam & repercussionis gratia fontinalia adhibent ex album. ov. bul. armen. terr. figill. ol. ros. & pauca acet. rosaceo. Ad dolorem mitigandum cataplasma ex sem. lini, malv. fœnigr. camomill. &c. vel mucilagines sem. lini, cydon. psyll. adhibent, & vulnus denique consolidant sequente vel simili collyrio.

℞. *Thut.*

*Sarcocoll. nutrit.*  
*thur.* aa. ʒb.  
*myrrh.*  
*antimon.*  
*aloes*  
*lycii* aa. ʒj.  
*Pulversata excip. melle rosac.*  
*F. Collyrium vulnerrum imponendum.*

*Ulcrrum.*

Eodem penè modo in *Ulcrrum* curatione procedere solent, præmissis enim universalibus, & subjunctis mox intercipientibus, resolventibus & anodynis, ad mundificantia pergunt & abstergentia, quare aquam multam oculo instillant, & linteo eadem indestroto ulcus aliquoties abluunt, vel decocto fœnigracii cum melle & myrrhâ, aut liquore folior. olivæ & agrestis, hinc proma⁹ ore exſiccatione & adſtrictione adhibent succum balauſtior, cum lycio aut hypocystide, & si hæc non sufficiunt, collyria componunt ex flore vel squama æris, chalcite & myſi uſtis & pulverisatis cum melle mixtis, vel ex cornu cervi uſto & subtilissimè pulverisato; quibus adiungunt Sief viride vel rubrum. Absterſione & delicatatione hac peractâ, ad solutam unitatem deniq̃ uiuendam properant, in usum ductis fortioribus consolidantibus ex thure, sarcocollâ, sangu. dracon. antimon. uſto, Sief de plumbo, &c. quorum plures species subtilissimè pulverisatæ, cum melle vel vitello ovi ad duritiem cocto ſuſcipi, & in unguenti formam redigi possunt, Ex. gr.

℞. *Thut.* ʒj.

*C. C. nſſ.* ʒb.  
*antimon. nſſ.*  
*plumb. nſſ.*  
*sarcocoll.* aa. ʒj  
*sangu. dracon.* ʒb.  
*Cum f. q. mell F. unguentum.*  
*De hoc portio quadam indatur vel imponatur oculo.*

Magni quoque faciunt hoc in casu collyrium *Rhazis* Eleilar dictum, quod ex antimon. lap. hæmatit. Acac. & Aloë cum succo cydon. ſuſceptis componitur & in magna exul ceratione post abſceſſum ab inflammatione ortâ, ubi etiam pupillæ procidentia metuitur, ſingulari iuvamini futurum exiſtimatur.

§. 14. *Paracelsus* etiam in horum affectuum *Paracelsi* curatione magnarum virium æſtimat remedia *remedia in* illa, quæ ex lapide calaminari, thutiâ & vitriolo albo ſtudioſa operatione Chymica elaborantur, ad coagulatum enim illud ex *Œe* & *Œio* cum *Œe*, in *Ciſſitie* Corneæ denuo reſolvendum, unguentum hocipſum, quod & reliquas abigere expertus eſt maculas omnes, non ſine laudabili effectu applicari promittit:

℞. *Thut.* ʒj.

*Œli alb.*  
*Succ. euphrag.* aa.  
*Fiat in modum boli cum Gummi Arabico,*  
*duc ad ſecundum gradum ignis, F.*  
*Unguentum.*

Ob eandem quoque cauſam in *Nebulâ prædi. In Nebula.* ctum medicamentum ex Thutiâ idem maximo perè laudat, Crollius verò hoc in casu amplioribus ferè laudum ſpoliis exornat Specificum ſuum Ophthalmicum, & pulverem ex lac. canth. alum. calcin. & oſſi ſep. aa. paratum, quo omnem nebulam facile diſcui poſſe nullatenus dubitat.

Ad tollendam *Albuginem* eadem ipſa com. *In Albugi.* mendatur Thutia in lacte extincta, & per no. ætem in aquam roſaceam poſita, tum aqua hæc albugini adhibita eandem abactura creditur, vel ſequens paratum collyrium,

℞. *Thut. modo jam dicto* pp. ʒj.

*Œli albi* ʒvij.  
*Camphor. irit.* ʒb.  
*Fiat mixtura cum aq. ros. vel ſanic.*

*Pustula* ſimiliter ante dictis medicamentis curantur, in ſpecie verò ad ſalis corrupti, & urentis igneam illam vim minuendam, extinguendam & bullulas ab ea excitatas diſcutiendas, tanquam apprimè conveniens proponitur medicamentum oleum *Œi*, ritè ac ſedulo paratum, ut puſtulæ eodem aliquoties illinantur.

In *Hypopy* poſt exemptam materiam purulentam, oculus abluendus eſt ſequenti collyrio vel lixivio :

℞. *Alum.* lb. v.

*Succ. chelidon.*  
*plantag.* aa. lb. b.  
*parthenion.* ʒiij.  
*Deſtilla.*

℞. *Aq. iſtius deſtillat.* lb. b.  
    *commun.* lb. v.

*M. F. Lxivium.*

In *Vulnerrum* his Corneæ bene curandis, ipſe lapis calaminaris pp. aliis additus non paucarum æſtimatur virium, nec non ſequens emplaſtrum vel cataplasma :

℞. *Flor.*

*Flor. aris* pp. 38.

*Aloe epat.* 3j.

*liquor. consolid.* 3iij.

*F. in modum visci.*

**Ulcerebus.** Ad *Ulcera* Cornæ sananda, ex mente huius Auctoris, præ aliis commendatur lapis calam. pp. cum camph. in succ. chelidon. & euphrag. adhibitus, vel unguento de flore aris mistus & aliquoties ulceri inunctus, si verò eadem ulcera humida sunt aut sanguinolenta, commodè additur lapis hæmatides cum bolo Armeno; sic etiam Talcum pp. cum liquore munniz & terebinthina in unguentum redactum, in huiusmodi ulceribus à Monarchæ huius affectis non sine causa magni pendi videtur.

**Helmonia-  
na curatio  
Crassitiei  
Cornæ.** §. 15. Sequitur jam arcanorum custos ille tenacissimus *Helmonius*, latiore quodam sydere nunc agitatus in *Crassitie* Cornæ, ad spissiore illam accretionem resolvendam, & tunicam hanc ab eâ liberandam, remedium manifestans paucis admodum communicandum, sanguinem videlicet muris, quo oculus sæpius abluendus aut illinendus, ut alliciatur latex purior, qui similiter interius nuccagine in illam abluat, & tunicam hanc clariorem reddat.

**Nebula.** In *Nebula* ad depuranda illacrementa, & spiritui luciditatem pristinam reconciliandam, mirum in modum commendat fella quorundam animalium, maxime verò leporis & piscis mustelæ, ut oculus iisdem sedulo illinatur, ita enim densum illum fumum iri cum tempore discussum, & serenitatem successurum esse pronunciat.

**Albuginis.** *Albuginem* non ita difficultè removeri possètur, si oculo frequentius instilletur liquor ex hepate mustelæ extractus, quem singulorum virum hoc in affectu cum aliis existimat.

**Pustulatum.** In *Pustulis* eò maxime operam collocat, ut acrimonia salis mitigetur, ea propter ipsas pustulas sæpius abluat aquâ destillata stercoris humani, in huiusmodi affectibus magnâ putata utilitatis.

**Hypopyi.** In *Hypopyo* aliorum *tyxæ* tantum concedit, ut corneam loco conveniente aperiant, & ipsam pus bene maturum eximant, quo exempto oculum vel antedictâ aquâ stercoris humani, vel succo chelidoniz crebro & studiosè vult abluendum.

**Pulverum.** In *Pulveribus* Cornæ laudantur medicamenta quælibet ex tutiâ parata, maxime verò tinctura ejusdem exterius nunquam sine commodo adhibenda.

**Ulcetum.** In *Ulcetibus* hisce oculorum, & quidem tunice huius cornæ, ipsam autimonium, & parata ex eo medicamina ab Auctore hoc ejusque sectatoribus valde judicantur prodellè.

**Instauratio-  
nem Curatio  
Crassitiei  
tuni.** §. 16. Juxta *VV. illis* præcepta *Crassitiei* Cornæ curatio, etsi difficilis sit obtentu, institui tamen potest, præmissis humorum peccantium copiam minorantibus & avertentibus, his remediis, quæ humores spissos resolvere, & spiritus augere & subtilizare possunt, ut sunt internè Aqua rutæ, fœnic. rosmari. Spir. euphrag. essent. anthos. Spir. C. C. & cum succino imprægnatus, Syrup. flor. caryophyllor. cinanom. Spec. dianth. diamolch. dul. &c. externè ad spissum illud concretum resolvendum emollientia suadet, ut fortum ex decocto malv. beton. euphrag. summit. fœnic. sem. lin. flor. melilot. quibus subiungit fortiora quædam incidentia & abstergentia, succum videl. rutæ, chelidon. anagallid. & alia, quæ in *Albugine* proximè sequuntur.

*Nebula* cura peragitur resolventibus vapores *Nebula*.

illos crassos, humorem aqueum turbantibus, quod similiter spirituosis obtineri poterit internè usurpatis; maxime spiritu sal. armon. cum succino imprægnato, & Essentiâ rosmarini, vel elæosaccharo fœnic. externè leviter abstergentibus & discutientibus. haliu pueri adhuc jejuni semen fœniculi manducantis, quod ipse etiam æger sibi eodem modo præstabit, & propriâ ista saliva virtute fœniculi dotata oculum illinet; collyrio deinde ex aq. fœnic. rosar. chelidon. maj. ocul. ʒs marg. pp. myrrhâ & camphorâ parato, curam istam absolvit.

*Albugo* ut curetur, eò incumbendum esse censet hic Auctor, ut agglutinat io illa emolliatur decocto præcedente in *Crassitie* jam denominata, vel simili quodam, postea abstergentia adhibet ex fellibus potissimum animalium, ut lucci piscis, lyncis, falconis, humano &c. succis fœnic. centaur. min. chelidon. cum myrrhâ. aloë, tale armoniaco, camphora. Oleum ex linteis combustis non continendi usus habetur.

Ad *Phlyctenas* curandas eò imprimis respicit, *phlyctenas* ut causa easdem excitans aut fovens amoveatur, nam. evacuando humorem acrem ex latice oriundum, revellendo etiam eundem adhibitis vesicatoriis nuchæ vel post aures, eximendores externas, & materiam collectam resolvendo, omni studio colocalo, ne eadem superpiretur, proinde in principio discutientia admovenda, cataplasma videl. ex mica panis albi in lacte cocti, cum alhum. ov. & croc. vel fotu ex decocto camomill. & sem. fœnigr. Res externæ eximendæ sunt, & oculis mucilag. sem. cydon. aq. flor. sambuci factâ illinendus, postmodum in progressu magis exsiccantia adhibeantur ex tut. bol. armen. camphor. vel Sief de ros. cum succo rutæ & aq. verbenæ.

In *Hypopyo* ubi suppuratio jam consummata, *Hypopyi* tunica cornea est aperienda, ut pus eximatur, hinc abstergentia adhibenda, exsiccantia & consolidantia; si verò pus adhuc est in fieri, emollientia usurpat & discutientia, decoctum nempe prædictum camomill. & sem. fœnigr. quibus adjungi possunt herb. chelidon. euphrag. valerian. sem. fœnic. hiscet tandem sub. unguntur abstergentia & exsiccantia, quale sequens collyrii:

*ʒ. Aq. Chelidon. maj.*

*ʒvi.*

*emphr. ʒf. aa. 3j.*

*tut. pp. 3j.*

*aloes,*

*myrrh. aa. ʒij.*

*Croc. ʒj.*

*sacch. c. amb. 3℔.*

*M. F. Collyrium.*

In *Pulveribus* Cornæ, quantum fieri potest, *Pulverum* humoribus oculi asservandis, & dolori aliisque symptomatibus præcavendis summe intentus est adhibitis fotibus alstringentibus ex decocto fol. rubi, plantag. verben. euphrag. flor. ros. acac. carne cydon. in vino adstringente facto, & tandem conglutinantibus curam absolvit, ex tut. paratis, farcocoll. lap. calaninar. aliisque, laudat etiam balsamum Peruv. aliquando tepidè instillatum, vel aliis convenientibus interunitum.

*Ulcetum* curatio ut ritè peragatur, præmittenda vult humorem acrem minuenda & aliò derivantia, potissimum verò fonticulum brachio

*M 2*

*inustum,*

inuultum, ipsi ulceri detergentia admovet & exsiccantia, collyria scilicet ex aq. verben. flor. ligustr. plantag. additis thure, lach. canth. aloë, myrrh. rut. sarcocoll. aliisque brevitate studio hic omittendis.

*Sylvi* sententia de curanda *Craffisia*.

§. 17. *Sylvius* ad curandam *Craffisiam* in eo occupatus est, ut pituita viscida corrigatur medicamentis incidentibus & attenuantibus, seu sale volatili præditis, radicibus nempe valerianæ, apii, fœnic. chelidon. maj. herb. euphrag. rut. majoran. fol. rorismar. sem. fœnic. carvi siler. mont. Syr. Byzantino, stœchad. &c. vel si eadem ipsa pituita corrigi nequeat, & simul copiâ peccet, evacuetur per phlegmagoga, tum communia, tum maxime chymica, æum potissimum dulcem, vel pilulas suas magistrales, capite proximè sequente communicandas; externè succum chelidon. vel fœnic. oculis instillari permittit, vel spiritum vini tam simplicem, quam prædictorum simplicium virtutibus imprægnatum.

*Nebula*.

Ad discutiendam *Nebulam* in eo totus est, ut halituum proventus inhibeat, corrigendo potissimum bilem acriorem, ipsam halituum causam efficiantem, medicamentis subacidis, nitro imprimis, aliisque plantis nitrosis, ut lachucâ, endiviâ, semperviv. plantagine, &c. vel nimia peccet copia, evacuando eam medicamentis cholagogis, rhabarbaro scil. tamarindis, Cassia & similibus. Ne ad oculos ipsi halitus ulterius deferantur, eosdem tum discutit medicamentis sale volatili, maxime oleoso præditis, tum effervescentiam intestinale vitiâ corrigentibus. Ad oculum jam delati halitus discutiendi non minus sunt salibus volatilibus & internè assumptis, & externè admotis.

*Albuginis*.

*Albuginis* cura in ejusdem pituitæ viscidæ infectione & attenuatione consistit, quæ quomodo sit instituenda, in *Craffisie* curatione modo manifestavimus.

*Pustulis*.

*Pustularum* curatio obtinetur acidum acre corrigentibus, lixiviosis maxime, seu alcalicis fixioribus & concentrantibus, ut sunt tutia, lapis calaminaris, cerussa, quæ misceri possunt aquis plantag. rosar. semperviv. maj. flor. mell. loc. & in collyrii formam redigi, quo Cornea pustulosa aliquoties est abstergenda, & guttula ejus una vel altera oculo instillanda.

*Hypopie*.

*Hypopyon* curatur ipsâ puris emissionem, & si aliter discuti & expelli nequit, apertione Corneæ loco conveniente, hinc novi puris generationem impediuntibus, abstergentibus & consolidantibus; ut ergo discutiatur, materia puris nondum adeo existente copiosa, salia adhibenda sunt volatilia, iisque prædita medicamenta intus & extus usurpanda, quibus si nihil præstari potest, suppuratio facilitanda cataplasmate ex melle, farina fecal. & vitell. ovi, ejecto verò pure, abstergio fiat aquâ mellis vel alia conveniente, & tandem consolidatio instituitur collyriis, quibus tutia & sarcocolla sunt intermixta.

*Vulneribus & Ulcibus*.

In *Vulneribus & Ulcibus* curandis in eo pene totus est, ut acidum seque huiusmodi inmiscens corrigatur, & ipsum vulnus vel ulcus mundetur & consolidetur, quod omnium optime salibus volatilibus oleosis impetrari posse confidit, eamque ob causam non parvis exornat laudibus balsmum Ais vel terebinthinatum, vel anisatum, aut fœniculatum, à quo spiritus acidus in pure luxurians & humores corrumpens præ aliis obtundatur, mitigetur & consolidatio promoveatur.

§. 18. *Cassianus* ad Corneæ hujus tunicæ morborum, & quidem antea ipsius *Craffisie* curationem accessit, distinctionem observant inter accrescentem aut oriundam adhuc, & eandem jam consummatam. Accrescentis augmentum omni studio inhibere tentant vocatis in subsidium medicamentis cunctis implicationem particularum terrestrium cum particulis glutinosis impediuntibus, & factam jam denuò destruentibus, resolventibus & in fluxum reponentibus, adeoque ab ipsâ quiete ad motum illas excitantibus, & variè agitantibus, ne fibrillis iterum adhaerescant, qualia sunt, quæ particulis constant tam porosis & alcalicis, ut aliquas partes glutinosas cum terrestribus prioribus inviscatis absorbeant, quam particulis variè acutis, ut materiam viscidam penetrent, attenuent, resolvant, & poros ita sub utraque forma dilatent, quo materia ætherea facilius & sine ulla obnubilata aut conflictu cum peregrinis, eosdem subintraret, & ulteriorem in fluxum ordinariam repositionem perficiat; adhibent ergo internè spiritum æcis anisatum vel fœniculatum, C. C. succinatum, rorismarinatum, essentiam, chelidonæ maj. euphrasæ, rorismarini, elixirium illuminans, Salia fixa prædictarum herbarum & volatilia C. C. luccini, &c. Paradigma aliquod sequens est.

℞. Aq. fœnic. ʒj.

nepeib. ʒ℥.

Essent. rorismar. ʒ℥.

chelidon. maj. ʒj.

Spiritus æcis anisat. ʒ℥. xxvj.

℞. volat. C. C. gr. iiii.

Syr. bizant. ʒiij.

Flor. tunic. ʒij.

*M.*

Impediente verò nimia humorum vitiosorum copia medicamentorum horum ad partem affectam, & virtutem eorum debilitante, eandem convenientibus remediis immittunt & evacuant, pilulis nempe lucis maj. vel gummosis aliisque. Oculo exteriori similia adhibent spirituosâ, subtilibus & acutis suis particulis poros Corneæ faciliè penetrantia, & limum glutinosum interius eidem adhaerentem similiter incidentium & resolventium, particulas etiam rigidas acidas flectentium, qualia sunt Spir. Chelidonæ majoris, Sp. Vin. succo chelidonæ mixtus, liquores ex fellibus animalium destillati, axungia viperina paucis & parvis guttis non adeo frequenter instillata. Confirmatæ jam *Craffisie* curationem difficulter admodum obtineri proficuntur, ob poros Corneæ nimium alteratos, & à particulis tenacioribus artissimè iisdem adhaerentibus clausos, quos medicamentorum etiam efficacissimorum particule, ut vel subtilissimæ, nequeunt penetrare, sed absque ullo præstito effectu, & hebetatæ regrediuntur, tentant tamen aliquando eandem superius jam dictis, maxime quæ ex fellibus parantur & axungia viperina.

*Nebula* curationem consistere ajunt in resolutione & attenuatione vaporum, ne illi humorem aqueum obscurant, & Corneæ intus obversantes radii lucis transitum impediunt, nec non in particularum terrestrium humorem illum inspillantini correctione, ut humor pristinam suam fluiditatem cum puritate recuperet, & à mucagine atrâ depuratus limpidior existat, quod præ-

*Craffisia* notum cum sit in *Craffisie*.

præparari possent existimant medicamentis spirituo-  
sis & volatilibus tum internè assumptis, tum  
externè instillatis, illis vel alio modo impositis.  
Interea sunt medicamenta composita ex radic.  
fœnic. Chelidon. sarsaparill. valerian. herb. eu-  
phras. verben. rut. beton. fol. rorismar. flor.  
Cheyri, calendul. anth. stœchad. Arab. sem. anis.  
fœnic. rut. amom. lign. fassaf. &c. Externè aliis  
præferunt liquores ex fellibus animalium & he-  
pate mustelæ piscis, cum succo chelidon. & fœ-  
nic. instillatis. In leviore huiusmodi affectu  
halitum illum proprium post manducationem  
fœniculi oculo instillatum non parvi pendunt: tol-  
litur nubecula pulvere sacchari Canthi, & spu-  
ma maris seu superius dictum.

*Albuginis.* In *Albuginis* curatione itidem discrimen illud  
observant inter incipientem & confirmatam.  
Priorem speciem facilius curari credunt spirituo-  
sis illis subtilibus ulteriorem particularum oleo-  
sarum ab acidis coagulationem impredientibus,  
& factam jam destruentibus, interius adhibitis;  
externè abtergentia usurpant, & similiter resol-  
ventia & attenuantia massam coagulata, suc-  
cum nempe fœniculi, chelidon. maj. balsamum  
Peruvianum rectificatum, liquorem ex fellibus  
variorum animalium & hepate mustelæ, aquam  
mellis & similia. Confirmatam & diuturnitate  
temporis magis induratum majorem operam de-  
siderare norunt, difficiulter admodum depelli,  
ne tamen hic prolixus sint otiosi, cataplasmata  
adhibent emollientia & resolventia ex pulpâ po-  
mor. cum aq. fœnic. coctis, additis mucilag. se-  
min. fœnigr. vitell. ov. lap. hæmatit. pp. cort.  
granat. & lo. alb. aliisque concinnatum, & *Albu-*  
*ginem* jam emolliant fortioribus absterguunt,  
aqua nempe saphirinâ, lacte equino cum melle,  
succis granat. dulc. apii, agrimon. vel sequenti  
collyrio, quo *Leucoma* istud frequentius erit  
abluendum:

℞. *Aq. mell.* ℥j.  
    *flor. rorismar.* ℥℥.  
    *Succ. cent. min.* ℥ij.  
    *Off. sep.* ℥℥.  
    *Civer. Card. pratens.* min. ℥j.  
    *Myrrh. gr.* vj.  
    *Camphor.*  
    *℥ li alb. aa.* gr. ij.

*M.*

*Pustulis.* Ad corrigendas particulas salsas & acutas in  
*Pustulis* Corneæ, medicamentis utuntur poro-  
sis & alcalicis, à quibus priores facile possint ab-  
sorberi, & fibrillæ distentæ in statum pristinum  
reponi, ut sunt rut. pp. mater perl. pp. lap. cal-  
lam. pp. off. sep. nihil. alb. Sarcocoll. sacchar.  
℥i, aq. rosar. plantag. flor. ligultri, chelidon.  
pimpinell. flor. sambuc. album. ovor. cum & lo  
ust. Liqueur ad *Phlyctænas Herodi*, Aqua saphi-  
rina, Unguentum nihil, vel sequens collyrium:

℞. *Aq. flor. sambuc.* ℥vj.  
    *ligustr.* ℥℥.  
    *rut. pp.* ℥j.  
    *℥ li alb.* ℥℥.  
    *Croc. gr.* vj.  
    *M.*

In verruca, vel cataracta vel nebula oculorum  
nihil præstantius dicitur quam succus bellidis  
recenter exprellus & 14. dierum spatium oculo  
affecto instillatus.

Colluvie lymphæ salsæ existente copiosiore,  
vesicatoria applicant nuchæ vel post aures, inter-

dum ipsas scarificant auriculas. Ab externis cau-  
sis excitatas, pulveribus nempe acrisbus & corro-  
sivis, vel spiculis ignitis, spiritu vini ablunt  
camphorato, &c. si lymphæ corrupta in pustulis  
hærens nominatis hisce medicamentis nequeat  
ablumi, easdem suadent aperientes, ut liquor  
ille falso-acris emanet, adhibito hoc studio, ne  
partibus adhuc sanis diutius inhærens easdem si-  
militer corrumpat, postea iisdem abstergentibus  
ablunt & iterum consolidant.

In *Hypopoe* incipiente solliciti sunt ut pus non-  
dum adeo copiosum discutatur, & ultior ejus  
generatio præcaveatur, ductis in usum fomentis  
& Cataplasmatibus ex decocto sem. fœnigr. fœ-  
nic. fœsel. herb. euphras. verben. chelidon. maj.  
flor. canomill. sambuc. croc. pomis putridis,  
farin. fabar. fimo columb. camphorâ, &c. Si ve-  
rò discuti nequeat, & suppuratio jam facta sit,  
tunicam aperiant & pus eximunt, illio linimen-  
to ex melle cum myrrhâ & camphorâ, pure au-  
tem penitus exento foramen claudunt balsami-  
cis, ut in ulcere.

In *Vulneribus* Corneæ operam dant, si in tem-  
pore præitò esse possint, ne humoris aquei efflu-  
xus sequatur copiosior, eaque de causâ vulneri  
superimponunt foliolum unum vel alterum auri  
bracteari, quod Corneæ arctè adhærens efflu-  
xum illum humoris commodè prohibet, & si  
vasa sanguifera simul læsa sint, ejusdem profu-  
sionem istum mucilaginosus & subadstringenti-  
bus, quin aversionis gratiâ in largiori hæ-  
morrhagiâ aliquando venæsectionem per-  
mittunt & dolori sedando studiosè incumbunt,  
ut inflammatio subsequatur, instillato liquore  
ex lumbricis contusis per linteum expresso cum  
camphorâ & saccharo ℥i, hinc transire ad vul-  
neris absterisionem & consolidationem, quam  
egregie promoveri existimant pulvere & ust. tut.  
& & lo. alb. vel per se insperso, vel aquis & suc-  
cis convenientibus, alchimilla potissimum, foli-  
or. pyri, cydonior. album. ovor. commist. &  
cunctis informant collyrii redactis.

Ulcus curationem optimè credunt admini-  
strari, si particulis acutis destructivis acidis in  
quibuscumque ulceribus faciliè nidulantibus,  
eatur obviam, spirituosus scilicet & balsamicus,  
ut Spir. lumbric. camphorato, Sp. Vin. cum pau-  
co Spir. terebint. commisto, Spir. chelidon.  
myrrhato, aliisque; hinc ulcere benè mundato  
consolidationem non ita difficiulter subsequutu-  
ram esse sperant, instillato vel solo balsamo de  
Capaiba rectificato & debite depurato, cujus  
guttula una vel bis in die solum instillata miræ  
existimatur efficacia.

§. 19. Quoad nostram de Curatione horum  
morborum sententiam, nobilia certè hic Chirur-  
gia nobis exhibet præsidia. conducunt enim fon-  
ticulari, vesicatoria, & setacea non raris capillorum.  
Ex Pharmaceutico fonte in *Craffitie* Corneæ,  
*Nebulâ* & *Albugine* conveniunt & interna reme-  
dia, & præ omnibus saburra quocumque in lo-  
co latens est eliminanda, quod obtrineri potest  
per pilulas Cephalicas sive Ophthalmicas meas  
sequentes decrecente Lunâ exhibendas.

℞. *Extract. marocossin.* ℥℥.  
    *pil. luc. maj.* ℥j.  
    *de succin. Craton.* ℥j.  
    *diagrid.* ℥at. gr. xv.  
    *℥is euphras.* gr. x.  
    *succin. volat.* gr. viij.

*M. 3*

*OL.*



*Ol. d. ſenic. gr. iiii.*

*F. Maſſa.*

Dentur veſperi cubitum ituro ſ. & ſubſequente mane adhuc 6. vel 7. & dein danda ſunt ſtomachica & cephalica, v. g. ſalv. euphraſ. anthos. thet. lavendul. beton. cent. min. trifol. aquat. rad. calam. aromat. ex his parati poſſunt Inſuſa (uti cum thet. facere ſolemus) Decocta, Eſſentia, Tinctura, Extracta, Conſerva, &c. Sic & vinum medicatum conducit ſequens:

*Rad. Caryophyllat.*

*Calam. aromat. aa. ʒiſſ.*

*Corr. rad. cappar.*

*ſaſſafr.*

*tamaric.*

*med. frangul. aa. ʒij.*

*Herb. euphrag. mʒ.*

*beton.*

*ſol. toriſmarin. aa. pʒ.*

*fl. cent. min.*

*anthos*

*roſar. aa. pʒ.*

*Corr. citr.*

*aurant.*

*ſem. anif.*

*ſenic.*

*cinnamom. aa. ʒiſſ.*

*M. F. Nodulus 5. vel 6. menſuris vini Inſuſnendus*, de quo in prandio & cœna primus hauſtus ſumendus: præſertim hic pro ulu continuo ſal volat. C. C. quod hodie in cœna cum vino aſſumere ſolent plures & non absque emolumento; ſed ne quid nimis. Pro maſſa ſanguinea depuranda Eſſent. mum. Elix. propr. alcalicum ʒ volat. oleos ſuccin. pulv. cinnabar. cum ſuccino & alia exhiberi poſſunt.

Hic quoque topica magnum aſſerunt ſæpe ſolamen, eo enim incumbendum, ut pori obſtructi referentur, & acidum coagulans & nervis inimicum corrigatur, ſpecificæ in Crasſitie, Nebula & Albugine prodeſſe dicunt aquam anagallidis ex ſucco deſtillatam, quod euporiſtonerit remedium, ſi vel Vitriolo alb. vel Sale volat. C. C. vel ſuccini parum acuat. ad obſtructionem tubulorum eo melius referendam & ſpiritus animales alliciendos, qui quaſi freno iniecto torpidi in cerebro detinentur, item axungiale porina illita proderit; ſic & omnia ea, qua trademus remedia in Suffuſione huc quadrant, quare hæc repetere vel ruminare non libet. Imprimis hic prodeſt aqua Regiæ Hungariæ ad guttas 2. oculo inſtillata, mira enim hæc præſtiti aqua temperata ophthalmicâ.

Hæc tamen remedia commodum aliquod præſtare poterunt, ſi vitium ſit ab humorum crasſitie vel impuritate, ſi ſi filamentum quodam proceſſu ciliaris à membranâ ſua libero & humori aqueo innatante, quod obſcuritate & nigredine ſua radorum lucis tranſicunt impediatur & nebulofam præſtet viſionem, neque hæc, neque alia remedia quicquam præſtare poſſe iudico, & optimum hoc in affectu remedium erit vel neglectus remediorum, vel quies & locus non ita luminofus, ne ſpiritus animales copioſius alleſti filamentum illud fortius agitent & plurium reſolutionem intendant. Optime & hic conducunt veſicatoria ſetacea, ac tritulum radicis Thy. melex apici auriſtrum. Sequens vero Collyrium erit egregiuſ uſus in Albugine:

*ʒ. Decoct. ſanigr. & cydon.*

*in aq. toriſmar. ſaſſ. ʒij.*

*lap. calaminar. ʒj.*

*ſacchar. hni*

*Myrrh.*

*Croc. or. aa. ʒb.*

*ariſt. ʒb.*

*F. Collyrium.*

Aqua vero ſequens ad oculorum affectus egregia eſt, roborat enim viſum, tollit nebulas, inflammationem, ſordes &c. paucis guttis in oculum inditiſ ter de die.

*ʒ. vin. alb. lbj.*

*ʒ roſar. lbj.*

*chelidon.*

*ſanicul.*

*euphraſ.*

*rutæ aa. ʒij.*

*Tutia præpar.*

*caryophyll. ʒj.*

*ſacch. canib. ʒj.*

*Caphur. alois aa. ʒiſſ.*

*Digerantur per plures hebdomadas.*

Cicatrix difficillimè curatur, notum tamen nobis eſt exemplum illud à *Platero* in Obſervat. relatum de cicatrice caſu per pulverem ſublimati loco ſacchari canthii oculo inſperſum curatâ, quamvis in principio tanta inſequuta fuerit inflammatio, ut de oculo periculum aſſuerit, quare iſtiusmodi caſus non temper adeo promptè imitari licebit.

*Puſtula* curantur ſerè ut inflammationes, imprimis prodeſt ſequens:

*Puſtula,*

*ʒ. Aq. Euphraſ. ʒij.*

*ſacchar. ʒj.*

*M.*

ubi verò animus eſt exſiccare magis, tunc tutia & lap. calamin. reliquis addantur.

Quando poſt graviorem contuſionem aut inflammationem oculi ſanguis evaſatus & corruptus diſcuti nequit, idque ſuppurari, & *Hypopyon* fieri incipit, ipla illa materia purulenta omni ſtudio diſcutienda erit, ne ulterius ſibi ſumat incrementum, quare oculus abluendus erit ſpiritu vini camphorato, cui ſuccus chelidon. maj. & cent. min. immiſti fuerint, vel ſocis inſtituatur ex decocto rad. valerian. raphan. herb. euphraſ. chelidon. maj. flor. melilot. Camomill. lil. alb. pal. avenæ, vel ſi ne ſic quidem diſcuti poſſit, imponatur cataplaſma ex pulp. poni. putr. & paſſular. cum mucilag. ſem. ſanigr. lini, altheæ & pauco ſtercore columbino. Hæc etiam de cauſa ſæpiuſcule illinatur oculo ſpecifico illo ophthalmico *Hartmanni*, ex ſelib. anſer. gallin. & pauco mellis in vitro in linimentum redactis. Materiâ autem purulenta tam copioſa exiſtente, ut omnino diſcuti nequeat, inſtituenda eſt punctura, & ſtoramen ea magnitudine formandum eſt, ut pus illud commodè eximatur, & quidem puncto hæc ea in parte Corneæ ſiſtituatur, in qua tunica omnes concurrunt & terminantur, ad iridem videlicet, ubi tutius pungere licet. Proſpiciendum quoque eſt, ut pus omne eximatur, ne quid reſiduum maneat humores & ſuccos facile inſiciens, & novæ puris collectioni anſam præbens, quapropter ſi nec ſponte nec levi preſſione emanabit, ſiphunculus quidam foraminum commodè eſt intrudendus, quo pus à famulo exiatur, qui affabrè ita aptandus eſt, ut in medio ventrem

quent-

quemdam contineat, in quem pus ex succum ad-  
infuat, nec ligentis os cum nausæa subintret,  
& ab ulteriore suctione molestia illa abarceatur.  
Puretandem egesto, fiat ablutio vel aqua hordei  
cum melle rosaceo, vel sequente collyrio.

℞. Aq. verben. ʒj.

Chelid. maj. ʒij.

Succ. cent. min. ʒj.

ibnr.

rut. pp. aa. ʒj.

Myrrh. gr. vj.

Vitrioli alb. gr. iiij.

M.

Consolidatio sollicitè instituatur, ne cicatrix  
adeo magna relinquatur, & adhiberi eadem hic  
possunt, quæ proximè in curatione vulnèrum &  
ulcerum sumus proposuimus.

Vulnus.

Vulnus ergo Cornæ hujus tunicæ admodum  
providè debet tractari, quia est pars nervea, ma-  
ximè proinde eò incumbendum est, ut circulus  
sanguinis & reliquorum succorum restituatur, at-  
que acidum temperetur, & cum vulnèris hujus  
curatio consistat in unionè partium membranose,  
soli naturæ, cuius id opus est, ea committenda,  
si enim succus nutritius, lymphæ & sanguis, be-  
nè constitutus sit, tanquam balsamus easdem  
partes divisas reunit, convenit ergo Decoctum  
vulnèrarium. Chirurgus tantum hic applicet  
remedia membranosas partes consolantia, ea-  
rumdemque corruptionem ab acido inductam  
impedientia, qualia sunt vulneraria & balsamica,  
& hic, ut in aliis vulnèribus, aër externus & pe-  
regrinus ante omnia arcendus est, nihil enim ma-  
gis lædit quam aer & lumen, acidum enim inest  
aëri, quod vulnèribus maximè infensum est, &  
acor semper est intensior in partibus nerveis,  
quam in aliis.

Vulnèribus oculorum columbæ sanguinem  
sub ala per v. f. emanantem laxo oculo calide  
immitte, postea collyrium sequens oculo tepidè  
infilla.

℞. Tut. pp.

aloes pulv.

Sief. alb.

Rosæ aa. ʒß.

Δ. rosar.

plantag. aa. ʒij.

vin. rubr. ʒi.

mucilag.

sem. psyll.

tragacanth. aa. ʒj.

lac mulieb. imponatur, cataplasma quoq;

ex pom. assat. ʒij.

mucilag.

sem. psyll. ʒij.

farin. lini ʒß.

opii crud. ʒj.

croc. gr. v.

vitell. ov. no. i.

Ad balsami ergo nutritivi & quasi glutinosi  
aciditatem impediendam & jam factam tollendam  
& motum succorum conservandum, con-  
ducunt salia volatilia oleosa temperata, talia  
enim acidum corrigit, ut sunt bals. Peruvian.  
bals. ʒis. ol. hyperic. terebinth. ex gr.

℞. Aq. veronic.

euphras.

plantag. aa. ʒij.

Ocul. ʒ. pp.

Corall. pp. aa. ʒj.

sacchar. ʒi ʒß.

rut. pp. ʒij.

F. Collyrium.

Sacculi quoque imponendi sunt ex senogr.  
hyssop. flor. Camomill. euphras. lavendul. & in  
vino cocti.

Temperata debent applicari, non acria, non  
acida, non urinosa, quia nervosis partibus sunt  
inimica, & magis acidum arguit quam minuunt,  
nec applicentur acria volatilia, detergenzia aut  
mundificantia dicta. Hic & laudantur Satur-  
nina, imprimis ol. ʒi rubrum, si enim destillatur  
saccharum ʒi, prodit Spiritus, ol. flavum & ru-  
brum, quod Chirurgus secretissimum est. Vel  
instilletur sequens.

℞. Ol. dest. terebinth. ʒj.

Spir. vini ʒj

Camphor. gr. vj

M.

Cnôphelii experimentum ad dolores compescen-  
dos in oculorum vulnèribus est sequens:

℞. Pomor. dulc. No. iij.

Cog. in f. q. aq. euphras. & rosar. ad molli-  
tatem. trajiciantur per setaceum, pulpis tra-  
jectis add.

Omnibus aliis palam præcipit columbæ sanguis  
calide oculis instillatus.

sacch. ʒij.

Camphor. gr. v.

M. applicentur.

Aqua album ovor. *Harmanni*, vel cum aq. ve-  
ron. & charrefol parata laudatur, item succus in  
veliculis ulmi collectus, de quo videatur. *Henr.*  
*ab Heer. in Oyster.*

Laudat & *Bartholus* Romæ non ita pridem  
mortuus aquam ʒli ʒis mysteriosè paratam,  
alii aquam Chelidonæ cum Camphorâ, ridiculâ  
hac ratione, quod hiruncines occæcatis pullis vi-  
sum restituat sua chelidonâ; quod tamen po-  
tius figmentum cenicimus.

Ubi simul aliquid in oculum illapsum fuerit,  
sive pulvis, sine festuca, sive musca, hac manu  
Chirurgi ope instrumenti eximantur, & dein ap-  
plicentur acidum absorbentia & demulcentia, ut  
sunt mucilag. sem. cydon. psyll. cum aq. appro-  
priatis. Sic *Dona. Mutillæ*, Chirurgus auli-  
cus noster experientissimus ex puella rusticæ 17.  
annorum oculo sinistro festucam sub tunica cor-  
neâ, sæper pupillam infixam, forcipulâ feliciter  
exemit, & dein appositis collyriis & cataplasma-  
tibus demulcentibus & traumaticis intra breve  
temporis spatium ægram curavit. Exemplum  
quoque novimus insignis vulnèris oculi curati  
ope unguenti *Angeli Salæ* de cerussâ ʒij, & se-  
quentis collyrii,

℞. Sief. alb. f. op. ʒiß.

rut. pp. ʒß.

thur. subtiliss. pulv. ʒj.

Camphor. ʒß.

Croc. gr. iij

Aq. plantag.

ros. aa. ʒij.

M.

In vulnere cornæ ubi aliquid humoris aquei  
effluxerit, applicatur Cornæ jam flaccidæ se-  
quens:

℞. Album. ov. No. ij.

Conquass. add.

Aq. plantag. ʒij.

ros. ʒi.

boli

*boli Armen.  
terr. Japon. aa. ʒb.  
Camphor. gr. ij.*

*M.*

Per intervalla applicetur hæc mixtura, & patientis in loco obscuro detineatur. Humor aqueus à motu succorum ipso restituitur, quia humor ex propria glandula per proprium ductum ad oculum mittitur. Vide de his celeberrimum Anatomicum Hagjensem *Nuck*, nunc Professore Leidenfem celeberrimum.

Oculus vulneratos salivâ jejunâ illitâ curatos fuisse testantur *Miscell. Med. Phys. Obs. 92. ann. 3.* ubi recensetur, adolefcentuli cuiusdam 12. annorum cuspidem cultelli tunicam Corneam Uveamque ita vulneratam fuisse, ut notabilis quantitas humoris effluerit, insititum vulnus nullo alio quam matris salivâ curabatur, mater enim diductis palpebris linguam salivâ madidam vulneri admovebat, quo sensim ad curam perduxit, remanente tantum exigua cicatrice cum pupilla angustiore. Sic & *Hagendorn Miscell. Med. Phys. Ann. 9.* sequentem historiam habet: Ancilla, inquit, casu quodam rupturam oculi experitur, quâ humor oculi aqueus tam copiose effluxit, ut oculi figura, quæ antea globosa, jam collapsa appareat, cum hæmorrhagia, partium vicinarum tumore & intolerabili dolore; accessit Chirurgus varia frustra applicuit, tandem verò *Hagendorn* pulvisculum immisit ex Catechu, myrrha & sacch. canth. quo immisso & dein aquis ophthalmicis juncto, & calide in oculum instillato oculus pristinam recuperavit figuram, & pateriens curata fuit.

*Methodus  
nostræ curæ  
vuln. ulc. cornæ.*

Ut *Cornæ ulcero* & erosio tollatur, applicentur acido corrigentia, consistit enim tota cura in huius acidi mortificatione in quem finem conveniunt saccharina, tutia, pompholyx, caput mortuum Oli, & hic quoque detergentia & mundificantia non acria sed temperata eligenda sunt, ut balsamus Petruvianus. Est formula una atque altera.

*ʒ. Aq. sambuc. ʒj.*

*Sp. ʒi ʒj.*

*Tutia pp. ʒb.*

*ʒn. diaphor. ʒj.*

*myrrh. camp. ana. ʒj.*

*guttula quadam oculo immittantur huius mixturæ.*

Vel applicetur & instilletur Sanguis columbinus calide.

*ʒ. Aq. plantag.*

*pmor. rodolent.*

*euphras. aa. ʒj.*

*sacch. ʒi ʒb.*

*ʒii dulc. gr. xv.*

*Camphor. gr. i.*

*F. mixtura vulneri applicanda.*

*vel:*

*ʒ. Spir. vini camphorat. ʒj.*

*Bals. Petruvian. ʒb.*

*M. D.*

His præmissis tandem ad vulneraria balsamica, sarcotica & epulotica dicta accedendum est. Hic conveniunt temperata & balsamica, de quibus abunde diximus superius in vulneribus, quæ tædet hic repetere. Infusum fl. balaustr. instilletur oculis variolis laborantium, ad exulcerationem eorum impediendam.

Ad aqueum humorem restituendum nihil aliud usurpandum quam superius dictum modicè adstringens, nam non aliud medicaminis genus hic necessarium, quam quod mucagine quadam labia vulneris obliniat, & viam elabenti humori aqueo quodammodo præcludat, ne aqua de novo progenita per vulnus elaboretur; dein inflammatio arceri debet, & levi adstrictione extrema vasorum apertura claudatur, quibus in dicationibus jam dictum remedium absolutissimè respondet: totius rei cardo in eo vertitur, ut aer arceatur à vulnere, aer enim incrassat succos circulant, hinc non facile coit vulnus.

Interne etiam nonnulla adhibenda sunt ad promovendam curam externam. Præmissis ergo universalibus, præsertim ʒio dulci & Galibus, ut & Tinctura ʒii in usum ductâ, semper interponendi sunt oculi ʒcum myrrh. corall. & quandoque cum aceto dest. propinati. Sic & conducunt omnia viperina, Spir. viperar. & earundem essentia, uti & omnia remedia ex lignis conveniunt, imprimis decoctum lignorum, ubi excrementa quadam carnosa super corneam tunicam adfuerit præter interna etiam transeundum est ad externa, Δ ophthalm. c. ʒi. alb. & extract. ʒn. & mimi convenit, quæ tangatur excrementa addito ac ʒli, vel alio caustico mitori, confet. Eph. G. Decur. 2. A. 7. Obs. 176.

## C A P U T XII.

### *De Uvea Tunica Morbis, Procidencia, Pupillæ dilatatione, Angustia & Suffusione seu Cataractâ.*

#### §. I.

**N**obili huic organo plures certè contingunt affectus, nunc videamus eos qui Tunica Uvea contingunt. Debilitas enim visus non semper dependet ab oculis ipsis, sed sæpe lassitudo & debilitas est tunica Uveæ à spirituum animalium debiliori influxu orta, quæ Tunica, si objecta propinqua vel longinqua sunt, dilatatur & contrahitur à spiritibus animalibus, & si vitium sit in hac tunica, tunc laeditur visus. Humor aqueus etiam aliquando turbidus existit & crassior, & nervus opticus in principio suo nonnunquam est obstructus, inde de-

pendet pupillæ vel tunica Uveæ laxitas & lassitudo, & per consequens, debilitas visus, qui fere semper est à tardiore motu succorum.

Uvea tunica procidit, quando Corneæ unitas solvitur, sive per vulnera, sive ulcera.

Species ejus vulgo quatuor numerantur: *Procidencia* 1. Dicitur *Myocephalus*, quæ extra duram tunicam se exerens Uvea caput misceat magnitudine refert, 2. *Staphyloma*, quæ uvæ acinum, 3. *Malum*, quæ pomum, 4. *Clavus*, quæ clavi caput, ubi obducta cicatrice occalluit. Sed differentia hæc vix à Practico felicissimo & accuratiss.

## CAP. XII. DE UVEÆ TUNICÆ MORBIS. 97

ratissimo observari possunt, quia entia præter necessitatem læpe multiplicantiur à veteribus.

*Pupilla dilatata.* *Pupilla dilatatio* Græcis *Μολασμα*, *Αδυσια*, vel *Πλατυνεια* dicta, est aliquid pupillæ, n. versus iridis circulum ampliatur.

*Pupilla angusta.* *Pupilla angustia*, Græcis *Μυωσις*, est, quando illa angustior, quam naturaliter fieri debet, redditur.

*Suffusio.* *Suffusio* Græcis *Υμεχυρα* vel *Τρυχων*, est visus læsio à particulis crassis acidisque humorum aqueo tum vitreo p. n. permixtis, eosque obscuros reddentibus inducta.

*Pars affe-*  
*cta.* §. 2. *Pars affe*cta est *Tunica Uveæ*, ob colorem uveæ ita dicta, quæ parte anteriore crassior est & duplicata, mobilis dicitur, & pro diversitate objecti & luminis contrahitur & dilatur, anterior ejus pars est perforata in medio, ad specierum ingressum, ubi pupilla efformatur in homine rotunda, in quibusdam brutis oblonga. Quia verò Uveæ Tunica limbus varios habet colores, hinc oritur his vel circulus, qui variis conspicitur coloribus prædictis, & ubi iridem consistit, nunc cuticula est, nunc cæcia, nunc nigra, & hæc tunica afficitur plerumque in ejus precipientia, in pupillæ dilatatione ejusque angustia, in suffusione verò afficiuntur humores, aqueus æque ac vitreus, crystallinus verò, quia paulo solidior est, quam ut facile materię peccantis particula in illum penetrare possint, ab hoc vitio immunitis est; humores enim hi æque incallantur & ad circulationem inepti redduntur ac alii.

*Diagnos*  
*Uveæ pre-*  
*cidentia.* §. 3. *Precipientia Uveæ* facile cognoscitur, ex ipsius prolapsu & disceditur exinde, quod pars, quæ precipit, aut nigra aut cuticula est, & in fundo circulum album, qui à labiis Cornæ erosus est, exhibet, & pupillæ parte sua quadam divilla apparet.

*Pupilla di-*  
*latationis.* *Pupillæ dilatatio* cognoscitur ex eo, quod patientes seu propter nimiam externi luminis copiam in oculis incutitur, seu obligatorum radiorum, qui perpendiculariter debilesior, casum, minus acutè videant, cum aliqui intueri volunt, oculos nonnihil comprimant, & oculo uno clauso, alterius pupilla dilatari non possit.

*Pupilla an-*  
*gustia.* *Pupillæ angustia* cognoscitur ex eo, quod vitio hoc laborantes ab externo luminis splendore, ut alii, non facile offendantur, sed omnia intueantur majora, nocte verò adveniente, aut tempestate existente nubila & sub tenebris, minus & obscurius cernant ac ceteri, quod copiosiore luce ad visionem indigeant quam illi, qui latiore præditi sunt pupilla, unde vitium hoc *Nyctalopia* præ aliis causam præbere solet.

*Suffusio.* Signa verò *Suffusionis* pro ratione principii, augmenti & perfectionis diversa sunt, pellicula aliquando alba, interdum nigra est vel castaneæ coloris, vel livida pro diversitate materię, ex qua generatur; hinc pelliculæ vulgo distinguuntur in maturas & non maturas: Maturæ dicuntur, cum patientes clauso oculo satis nihil vident oculo affecto, cum vero aliquid vident, dicuntur iumenturæ. Objecta enim in hac suffusione videntur apparere in aëre volitantia & colorata hoc vel illo colore, & quoad objecta apparent vel alba vel nigra, hinc vocant suffusionem; *den grauen oder schwärzen Etid*; quia eundem motum faciunt in nervo optico, quin in oculo sano à talibus objectis fieri solet, & cum hæc pellicula planè opaca redditur, tunc matura dicitur.

Rarum est, quod cum hæc scribo, in puero unius anni observavi, cujus mater tunc temporis gravida, intuens hominem quandam ebrium oculos invertentem, inde perterrita peperit puerum prædictum duas pelliculas in bis oculis habentem.

§. 4. Sequitur resolutio *causarum* quam *Galenus* *Ætiologia* *lenici* ita insinuat, ut circa *Precipientia Uveæ*, juxta *Galenum* cum reliquis ferè cunctis, adeoque & *lenicos in Uveæ precipientia*.

*Pupillæ dilatationis*, causam frequentiore ponunt externam & violentam, idem videlicet, *In pupillæ dilatatione* casum, vulnus &c. unde Cornæa vel Uvea relaxatur, item humores copiosos & conatum magnum, à quibus Uvea distenditur.

*Angustia* ejus causam dicunt contractionem *In angustia* Uveæ, ab exticcatione ut plurimum, ut in senio fieri consuevit, oriundam, vel etiam à nimia humiditate, unde Uvea à circumferentia ad centrum contrahatur.

*Suffusionis* causam statuunt obstructionem pu- *In suffu-*  
pillæ, ut spiritus animales transire nequeant, *ne*, factam ab humore quodam à cerebro ad illam affluente & ibidem cælescente, unde humor albugineus similiter crassior redditur, sive vitio Stomachi, sive cerebri, humor ille productur, qui pro diversitate crassitiei diversos efficiat gradus, ita ut stabilis, crassus & copiosus omnimodam *Cæcitatem*, paucus verò, rarus & æquabilis *Visionis immutationem*, & denique vagus atque per partes raras & crallas diffusus, varias pariat imagines ob oculos volitantes.

§. 5. *Paracelsus* causam *Precipientia Uveæ & Dilatationis & Angustia* Pupillæ ipsi adscribit formæ naturaliter in te quadam viva & rotunditate consistenti, sed hic corrupta & à re vitio- *Paracelsi opinio de causa Uveæ precipientia* lenta in vitium transmutata, adeo ut disrumpat *pupilla dilata-* *tionis* *Uveæ*, exeat ultra debitum terminum ipsa *Uveæ*, vel hæc nimium distendatur aut constringatur.

*Suffusionem* seu *Cataractam* ex materia pro- *In suffu-*  
nanare statuit, dum Mercurius, Sulphur & Sal in vicein resolvuntur, & ipsi humori aqueo se immiscet & vitreo obducuntur, unde perspicuitas iisdem admittit.

§. 6. *Helmontius* quoad *Uveæ precipientia* *Pupillæ dilatationis* & ejusdem *Angustia* causas reliquorum sententis facile subscribit, *Suffu-* *tionem* verò seu *Cataractam* oculorum è latice corrupto oculorum scaturire autumat, quando hic vel digestionum vitia reperit, vel aliena secum ad oculos deferat, ut potest ex insubito alienos partium defectus combibens, à quibus spiritus vitalis lumine suo privatur & obscurior redditur.

§. 7. *Videllius* in *Pupillæ dilatatione*, quæ non est à primo ortu, ut causam accuat vel humores *Secundum* *tristissimum* *causa pa-* *tionis* copiosius illabentes & æquum augentes, vel spirituum animalium impetuosum influxum, illa dilata- vel externas violentias, lapsum videlicet, percussionem, aut spiritus retentionem.

*Angustia* ejus causam statuit vel humoris aquei defectum, unde tunica Uveæ non satis humedetur & relaxetur, sed sicior fiat & corrigitur, atque pupillæ foramen angustetur; vel spirituum inopia, quod fit, ut pariter flaccescat, & foramen istud reddatur angustius.

*Suffusio* causam ponit humorem crassum, *Suffusio* *viciatum*, ut plurimum cum liquore nervoso *hugiori*



humori aequo aut crystallino illatum, eosdem obfuscantem, & simili tenacitate & crassitie inficientem.

*Sylviu in Angustia Uveæ causam dilata-  
tionis &  
angustia  
pupillæ  
Suffusionis*

§. 8. *Sylviu* in *Angustia Uveæ* causam constituit humoris aquei exsiccationem, ex defectu ejusdem humoris cum sanguine per arterias ad oculum delati, uti in *Dilatatione* ejusdem humoris nimiam copiam & pelluciditatem.

*Suffusionem* produci vult à pituita viscidior quacunque de causa genitâ, attenuatâ & sanguini confusâ, atque una cum hoc ad oculos per arterias delatâ & in humore aequo imprimis hærente ipsiunque obfuscante, usque dum magis magisque accrescens iterumque concretescens ac coagulata circa pupillam constituentem uveam, vel ex parte, vel in totum lumini externo, ac imprimis speciebz visibilibz transillum denegat, sicque cecitatem tandem inducat. Viscidam autem hanc pituitam in corpore generari credit ab alimentis similibus, augeri à tristitia & metui, commoveri ab iisdem affectibus iræ præsertim copulatis, item aëre conturbato aut asuante, vigiliis protractis, solitudinibus, corporis motu vehementiore, &c.

*Luxa Car-  
resionis  
causa pu-  
pillæ dila-  
tationis, &  
angustia  
Suffusionis.*

§. 9. Secundum *Carresionem* ipsa *Dilatatio pupillæ* originem habet à spirituum animalium & humoris aquei copia majori, unde tunica Uveæ expanditur, sicut ejusdem *Angustiam* ab eorum defectu tripliciter contingere existimant.

In *Suffusione* acculantur particule crassiores & terrestriores ex arteriis ocularibus emissas, in humoribus oculorum primò obvolantes, & radios lucis diversimode reflectentes, tandem vero cum ramosis particulis sibi invicem implicatas, & verius aliquem oculi angulum propulsas ibidem stannina componentis aliquis tunica, quæ temporis tractu ex particularum novarum accessione augeatur & incrassentur, donec in insolubilissimam degenerent membranam, oculum totum devolvantem & homini visum adimentem.

*Nosra sen-  
tentia de  
causa Uveæ  
proci-  
dentia*

§. 10. Nunc ex *nosra* sententia ætiologiam morborum horum formabimus, & quidem *Proci-  
dentia* causâ unicâ est Corneæ rupturâ aut vulnere, vel à vi externa, & ita continui solutione facta, vel ab acrimonia humorum, in variis potissimum, tunicam istam Corneam erodente, quam disruptam Uveæ hic prolapsus facile sequitur.

*Pupilla di-  
latationis.*

*Pupilla dilatationis* causa oritur ut plurimum à relaxatione Uveæ, cuius illa foramen est, ex fibrillarum laxitate, spirituum animalium inopia, & humoris aquei defectu, seu ob externas, seu internas causas productâ, potissimum verò hæc dilatio fit à causis externis, ut percussione, cû ab alto, &c. sic à statibus hanc dilata-  
tionem pupillæ observavi intubante.

*Pupilla an-  
gustia.*

*Pupilla angustia* oritur à motu convulsivo sive contractione spasmódica, cum pupilla sic angustior reddatur. Quandoque etiam à spirituum animalium ad pupillam denegato influxu, hinc pupilla labat & angustior redditur, imprimis ob obstructionem.

*Suffusio.*

Contorquetur aliquando in Convulsionibus per consensum, desinentibus enim spasmódicis insulibus partium reliquarum corporis, cessant etiam strabismi.

*Suffusio* seu *catarrhus* oritur à particulis crassioribus, humoribus, aequo scilicet & vitreo, innatantibus eosque in crassantibus, quæ radios so-  
lares vel impediunt in eorum progressu, vel eos

deflectunt, vel totationem globulorum innu-  
nuunt, vel contraaugent, quare objecta videntur apparere in aere volitantia & colorata hoc vel illo colore, quia etiam eundem motum faciunt in nervo optico, qui in oculo sano à talibus objectis fieri solet. Facile enim fieri potest, ut particule hæc crassiores humoribus supra dictis innatantes, sibi quæ invicem adherentes, massulas quasdam parvas efforment, quæ si tenacitate sua tunica Corneæ adhaereant, primò visus debilitatem inferunt, postea aliis semper accedentibus particulis ramosis tunicam seu pelliculam quandam raram faciunt, visumque magis arcent; aucta tandem hæc pellicula penitus opaca redditur, & nullo amplius poros habet, ut radii admittantur, hinc totalis cecitas inducatur necesse est. Si affectus hic facile sanguine scorbutico multis salinis viscidis & il-  
vestribus particulis inferto oboriri potest, à quibus tubuli arteriarum ita aperiantur, ut particulas has justo crassiores emittant. Hic & possunt summi synbolum addere res p. n. & res non-naturales vulgo ita dictas, de quibus paulo infra agemus.

*Prognosis  
Uveæ proci-  
dentia*

§. 11. *Proci-  
dentia Uveæ* tunica difficilis curatu est, imprimis in senibus, facilius curatur in subiectis cotinuo dioribus. Si ab ulcere vel villi-  
tere majore, tum vix curationem admittit.

*Pupilla di-  
latationis.*

Sic & *Pupilla dilatatio*, si est cum inflamma-  
tione, curatu est difficilissima, ut & si sit cum rup-  
tura Uveæ, si vero hæc est sine inflammatione atque  
ab humiditate, hujus curatio felicius succedit.

*Pupilla an-  
gustia.*

Quod si *angustior* reddatur pupilla ob viti-  
sam conformationem, aut deficientibus spiritibus,  
pestimum est lignum, si verò ob humiditatem  
laxior reddatur, spes adhuc superest curationis.

*Suffusio.*

In *Suffusione* spes curationis assequitur, cum æger  
non plane cecus est, cum pupilla lama dilata-  
ti & constringi potest, tunc enim partes oculi adhuc  
sunt mobiles, quod semper bonum est signum.

Curatio verò est difficilior, si scilicet ex febre  
aut vehementi cephalæa accedit, si in pueros vel  
senes incidit, si humilis est nigra, si æger lumen  
vel nihil certere potest; quo enim visus magis  
læditur, eo majus periculum & minorem spei  
curationis præ foribus esse, nullus regulat,  
præsertim ubi affectus diuturnus accedit, quâ  
mediante causâ proxima viscosior, forsitan etiam  
copiosior evadit, quodque etiam probant juven-  
tia, ut quisquis manum adhibens experitur.  
Tempus auni, ætatem, sexum, vitæ genus, cau-  
sas remotas omnes & lex res non-naturales dic-  
tas nunc prodesse, nunc nocere curationi,  
omnes percipiunt.

§. 12. Postquam de his affectibus, eorum cau-  
sis, generatione atque signis, tam diagnosticis,  
quam prognosticis, satis superque ad affectus  
notitiam interea explicatis egimus, ad curatio-  
nem & quidem ex fonte dietetico depromptam  
progredimur.

Dietæ ergo talis instituitur, ut curationem  
nunquam impediatur, sed omni tempore pro-  
moveatur.

Ac ut corpus humanum conservet & in me-  
dus aliat, ita quoque pro diversa in eo exceden-  
te qualitate corpus diversimode afficit: in genere  
omnis frigidior & humidior fusiendus, quia  
ille poros nimis constringit, hic verò poros ar-  
riatum in oculo nimis aperit, ut particula crasse  
in oculi humorem facilius irruere possint.

hic enim quā datā portā ruunt, sit ergo aer hic temperatus absque nebula & fumo.

*Cibus & pituita* dispositionem corporis nostri & humorum pariter immutant, in his affectibus itidem sit cibus conveniens, facilis concoctio, nimis frigida non tantum hic sunt fugienda, sed etiam omnia nimis acida, quia in suffusione potissimum poros arteriarum oculi nimis adstringere possunt, & sanguini motum minorem conciliare: concedenda tenuis cerevisia defaecata & medicata, appropria somnaticis, tum radicibus, tum herbis atque feminibus.

Quenadmodum *Semina* moderatis ad humanam sanitatem conducit, & plane intermissis producendo vel saltem augendo in corpore crassiores particulas magnam noxam eidem inducit: ita quoque *Vigilia*, quas si sint nimia, acriores particulas, lymphasque minus temperatam posse efficere, nullus dubitabit.

Sic quoque *Motus & Quies, Excreta & Retenta*, si suo haud fungantur officio, aniam huic affectui præbere posse nemo inficiabit, ut & *animi perturbata*, spiritus enim animales per hanc motu nimio dispersi, plura incommoda inferre possunt, eosdemque incretando & ad motum ineptos reddendo.

*Cura Pharmaceuticum*, §. 13. Nunc ad fontem pharmaceuticum & Chirurgicum, ordine nobis propositi pergamus, & quidem aliorum prius de curandi hocce affectionis ratione percipientes sententias, postmodum & nostram addituri. *Galenus* autem in *Uveæ præcidentia* ad statum naturalem reducenda utitur

adstringentibus & repellentibus, omni carentibus asperit, ut sint, quæ ex bolo armenia, albumine ovi, flor. acac. rosar. cort. granat. plantag. rosar. conscribuntur, quibus si curari nequeat, ad manus operam, non tam vilis restituenti, quam indecora figuræ emendanda gratia, consugunt, eamque diversimode instituant, vel etiam acut duplex filum ducente ad radices per medium transeunt, & alterius filii duo capitula superius, alterius vero inferius inter se adstringunt, ut paulatim secando id excident, vel instrumentum in summam partem præcidentis ad magnitudinem lenticiulæ tam excindunt, & spodiū aut cadibium infricant, albumen etiam ovorum lana exceptum peracta hac administratione imponunt, vapore aque calidæ oculum fovēt, & medicamentis lenibus eundem frungunt.

*Pupilla dilatata* a causis violentis factam, cum magno humorum affluxu, corrigere tentant præmissis universalibus evacuantibus; ipsa emissione sanguinis tam è venis: emporam, tum ex illis, quæ in angulis oculorum conspiciuntur, hinc cucurbitulam in occipio, & hirudinum postea res applicatione, & denique medicamentorum resolutivum & adstringentium adhibitione, quæ inter præ aliis aquam salicam maxime laudant; à flatibus si sit causata, eosdem præcipiunt discutientes.

*Pupilla angustata* ab exsiccatione nimia causata, humectantibus & nutrimentum copiosius allicientibus emendant, lacte nimirum & aqua dulci capiti admovent, quin ipsi etiam oculo; à nimia vero humiditate obortam sicantibus corrigere student, ut ruta & chelidonia.

Ut *Suffusio* incipientis incrementum cohibeat, omne adhibuit studium, proinde venam secant in cubito, vel etiam in fronte, materiam obstruentem educunt elyptiris acrioribus al-

que purgantibus, præsertim hiera pica & diacolocynth. quapropter sequentes pilulas magno habent in pretio.

℞. Pulv. Hier. pic. ʒij.

diacolocynth. ʒj.

Cum i. q. succ. fenic. f.

Pilula Capiat horâ somni, & die decimo quarto eandem repetat.

Laudant etiam pilulas lucis majores, Cochias, &c. Cucurbitulas cum scarificatione revulsivis gratia occipito affigunt, quas tamen aliæ omittendas suadent, ne parte spirituosâ exhalante, crassior remaneat, apoplegmatisantia verò frequentius volunt usurpanda, & caput corroborantia, quibus sequens constat electuarium:

℞. Conser. anth. ʒij.

ros. ʒj.

Spec. diamarg. calid. ʒb.

M. Capiat duobus vicibus vel per se, vel in aq. beton. aut fenic. dissolutum.

Post hæc ita usurpata accedunt ad collyria, ex quibus in principio eligunt ea, quæ ex succis rutæ, feniculi, chelidonie & mellis similibusque conscribuntur, nec non ex felibus animalium. Nonnulli loquens linimentum singulariter commendant:

℞. Amygd. pp. ʒib.

Thur. pp. ʒij.

Omphac. infusiss. ʒib.

succ. canth. ʒiib.

Cum mucilag. sem. fenic. ʒv.

excip. & in Liniment. formam redigantur.

Non minoris efficaciac judicatur illud quod ex bacis lauri in urina pueri tritis & expressis cum mucagine tragacanth. paratur. Quando verò suffusio in tantum accrevit, ut medicamentis ejusmodi corrigi nequeat, ad Chirurgiam & punctiōem acui faciendam accedunt, eamque matura existente suffusione, id est, eotempore, quo non confluere, sed duritie quadam concrevisse videtur, institunt, ægro prius convenienter præparato, modico cibo & triduo solâ aquâ uso, pridie verò ab omnibus abstinent. Modus administrandi inferius pluribus edocebitur.

§. 14. *Paracelsus* medicamentis suo more præparatis multum attribuit efficaciac, in *Uveæ curam* quoque præcidentia magno exitum juvenum ambigit, thuriam suam magistrali nullatenus ambigit, liquorem hujusmodi eâ crasse testatur affectus, de quibus Medicis, etiam ex professione oculares, penitus desperaverant.

In *Pupilla dilatata* ipsam lythargyrium præparatum, & vitriolum album non omnino tentata adhibuit in consilio, uti in ipsius *Angustia* succum Chelidonie & feniculi.

In *Suffusione* concretum illud humori a quo suffusio obductum denud resolvatur, & pericupitas resoluatur, sequens maxime laudat collyrium:

℞. Olibast.

alum. sciss.

thur. cat. vel. aa. ʒj.

liquor emtrag. ʒvj.

Campbor. trit. ʒiib.

reduc in liquorem suffusantiam super porphyride, quo liquore cataracta aliquando est illinenda. A copiosioribus tamen & furiosioribus corrosivis abstinendum esse admonet, & potius omnia ex consumptivis paranda, quin occipito cauteria ex calce viva & cineribus applicari præcipit, inveteratam vero cataractam

etiam medicamentis radicibus tolli posse planè negat, sed instrumentum opus esse contendit & manu periti Chirurgi, quæ operatio postmodum patefceret.

*Helmontia-  
natio  
hæc mor-  
bi cura-  
di.* §. 15. *Helmontius* ad particularem etiam hanc *Uvea proci-*  
*denia* curandam utiliter adhiberi promittit pulverem ex scatebis siccatas, uti ipse oculus prolapsus eodem haud difficulter reponatur. In *Pupille dilatatione* & *Angustia* corrigendis non admodum est sollicitus. *Suffusionem* verò non nimis inveteratam emendari credit ipsa aqua stercoreis humani, succo Chelidoniz, hieracii & liquore ex hepate piscis mustelæ, vetustiore committit Chirurgis.

*Willis mo-  
dus cura-  
di Uvea  
proci-  
denia.* §. 16. *Willis* uti *Proci-*  
*denia* curandam a modum difficulter obtineri posse existimat, ita pauca tentanda vult remedia, eaque subadstringentia, ex succo cydonior. thur. pp. farcocoll. & mucilag. tragacanth. Chirurgos prudentes requirit & in casu hoc valde exercitatos, ne temerè nimis partem hanc tenerimam tractantes, ei majus inferant damnum, quam emolumentum.

*Pupilla di-  
latationem.* In *Pupille dilatatione*, à nimia humorum copia exorta educantia lympham & exsiccantia ex lignis aliisque convenientibus parata commendat; à spirituum nimio influxu inductam, eorumdem sedatione per margaritas & corallia pp. Gum. *osis*. aq. rosar. paralyf. jaceæ, spir. sulig. Syrup. portulac. &c. corrigit, externè subadstringentia admovento ex thur. ros. rubr. siccis, cort. thuris &c. paratis. Quæ ab externis causis violentis illata est, eam communi curâ cum consensione tractandam esse judicat.

*Uvea angustia.* *Angustiam* ejus ab humorum defectu oriundam corrigit humectantibus remediis & lympham augentibus, quo humor aqueus incrementum recipiat, dista humidâ, jussulis carniū juniorum animalium, julapiis & apoze-matis restaurantibus ex rad. gramin. acetos. liquorit. fol. endiv. lactuc. nymph. lulul. flor. borag. eorumdemque aquis, ut & linacum, cancerorum, &c. laudat. Si à spirituum defectu ortum habeat, eosdem refluendo & augeri vult Spiritu C. C. cetafor. nigr. Tinctura luccini, aquis rutæ, fenic. majoran.

*Suffusio-  
nem.* *Suffusioni* emendandæ plurimum convenire censet, ut in principio statim humoris crassi affluens copia minuiatur pilulis de suecino, lucis majoris, &c. hinc attenuetur & resolvatur internè per decocta salvia, betonicæ, rorismarini, feniculi; externè foribus ex decoctis herbarum quarundam specificarum, ut chelidoniz, rutæ, euphras. fœnic. charæfol. flor. melilot. camonill. hæc lauri: si vero renacior sit, ut adeo facile resolvî, attenuari & discuti nequeat, fortiora aliquantum incidentia & abstergentia subiungit, ex succis rutæ, chelidon. maj. centa. min. conizæ, aq. mellis, lixivia prædictarum herbarum, in quibus radix valerian. asar. fol. lauri & semen rutæ fuerint incocta, sella animalium cum aloë & croco; at cùm suffusio ita inducit, ut nullis resolvî possit medicamentis, agros committit ophthalmicis operatoribus, ut pellicula condensata acupungatur, & si possibile sit, pommâ decutatur, quo patiens oculus ab ea liberetur & visum recuperet.

*Sylvisson-  
tentia di-  
curatio-  
Uvea proci-  
denia.* §. 17. *Sylvius* in *Uvea proci-*  
*denia* curandâ

non adeo se gerit occupatum, cùm visus restitui nequeat, saltem decore reconciliando ab aliis incumbatur, pauca tamen subadstringentia oculo inspergenda concedit, ex thutia, spodio usto, margaritis pp. &c. Chirurgicam operationem cante vult peragendam.

*Angustiam.* *Pupille* ab exsiccatione humoris aquei ortam corrigi posse contendit fotu aquæ *Pupilla An-  
gustia.* dulcis tepidæ oculo adnoto, & usurpatis alimentis solito magis aqueis. Debilitati visus inde produetæ succurri arbitratur, perspicillis medicoribus convexis ac valde perspicuis.

*Dilatationem Pupille* emendat exsiccantibus, & aquosis humores blandè consumentibus oculo adhibitis, visus autem imbecillitati ex hoc vitio pronatæ perspicillis concavis succurri posse, aliis persuadere conatur.

*Suffusio* ut præcaveatur, in eo penè totus est, quo pituita viscidâ medicamentis incidentibus & attenuantibus, adeoque sale volatili præditis, corrigatur, radicibus nempe valerianæ, apii, fœniculi, chelidon. herb. majoran. euphras. rutæ, sem. fœnic. carvi, siler. mont. oxymelite simplici & squillitico, syrupo stecad. absinth. byzantinæ, &c. Quando verò tardius corrigi possit pituita hæc viscidâ, & simul nimia ejus adit copia, eandem penitus vult tollendam & evacuandam medicamentis phlegmagogis tum vulgaribus, tum chymicis, & præsertim mercurio dulci, vel pilulis suis magistratibus sequentibus.

*Uvea proci-  
denia.* §. 18. *Gummi, Galban. cum acet. scyllis.* pp. 3j.

*Mastich. el. li.* 3℔.

*Castor. opt.*

*Myrrh. rub.* 2a. 3j.

*Carab. alb. gr. xv.*

*Croci select.* 3℔.

*trochisc. alband.* 3j.

*el. fanic. still. gr. vi.*

*M. F. Pilula No. 50. deauranda;*

de quibus æger alternis diebus unâ vel altera post cenam modicam horâ 3.4. vel 5. accipere debet, ut sequenti die manè semel inde alvum deponat. Post hæc in discentendis statibus à pituita illa productis, tum per interna, tum externa, ex superioribus jam nota, discutendis omnem locat operam, cum per experientiam sibi notum sit, saltem volatilem sufficiente aquæ quantitate dilutum & oculis applicatum discutere tandem halitus oculis conclusos, sicque humores ipsorum atque visum clarificare. At ubi vel per negligentiam cataractæ præcæcio fuerit intermissa, vel eadem nullo modo valuerit impediri, ipsius indurationem seu maturationem suadet patienter expectandam, quâ tandem & requisita ejus soliditate obventa, ac argentea rotunda oculum in parte exteriori vult perforandum, & cataractam sensim ab uvea liberandam deorsumque depellendam, donec tum lunem, tum objecta externa dignosci possint ab ægro, quo facta, mixtura ex ovi albumine atque alumine simul in vase terreo tritis parata & cannabæ excepta, oculum præcipit devinciri, ægrumque per aliquot dies in dorso decubentem quietum servari, quo subsidens cataracta non elevetur denuo, visumque offuscat.

§. 18. *Cartesius* curandam *Uvea proci-*  
*denia* admodum pronunciant difficilem, & *Cartesius Cu-  
raturâ Uvea  
proci-  
denia* nonnisi in duabus speciebus, & quidem in ipsis illis vix adhuc sperabilem, *Myocophalo* vide-  
licet,

# CAP. XII. DE UVEÆ TUNICÆ MORBIS. 101

licet, & *Staphylomate*, incipiente, in confirmato verò, item *Melo* & *Clavo* nullo modo medicamentis inputari posse, sed ornatus reconciliandi gratiâ ope Chirurgicâ vicia ista curanda esse existimant, reliquis subadstringentibus quando lenia adhibentes, ex aquâ flor. cyani, calcatrippæ, albumine ovorum, pulvere lumbicor. C. C. uft. & subtilissimè pulverisato, thutiâ, fircocolliâ, myrrha & oleo rubro Saturni.

**Pupilla Dilatationem.** *Pupille Dilatationem* à nimia spirituum copia exorta corrigi posse concedunt, si Sylviano more oculis præminuatur perspicillis concavis, ut radii colligantur, ne spiritus adeo fortiter dispergant, tum oculis parcendo ne frequentius objectis præfulgidis obvertantur, ut spiritus recedant & quicquid fiant, vocatis stimulis in subsidium collyriis quibusdam temperantibus & fignitibus ex aqua rosar. semperviv. plantag. cum pauco Oli albi & margaritis, vel oculis canceror. pp. Ab humoris aquei nimia copia dependente corrigunt exsicantibus ex lignis, radice valeriana, chelidonia, herbis majoran. beton. rosmarini &c. cucurbitulis cervicæ & post aures applicatis, quin vesicatoriis, frictionibusque linteis succino infumatis perficiendis.

**Pupilla Angustiam.** *Pupilla Angustiam* subcontrariis corrigunt remediis, in defectu namque spirituum, eorundem reparationi incumbunt volatilibus & spirituosius intus & foris adhibitis, vino videlicet euphrasii, ejusdem essentia, Spiritu ❖ci foeniculato, elæosaccharo sileis montani, macis, sale volatili C. C. aliisque ex superioribus jam cognitis. Humoris aquei defectum quomodo rearciari posse censeant, ex sequente cognoscetur capite.

**Suffusio.** *Suffusio* incipiens ab ulteriore sui concretione, si possibile est, revocari debet discutientibus, ut succo feniculi, Chelidonie, anagallidis, marubii, verbenæ, Spiritu vini, ❖ci. Aqua cancerorum, Consolide regalis, rutæ, mellis, valerianæ, nepethæ, fellibus variorum animalium, internè spiritibus adhibenda, penetrantia & similiter discutientia, ut spiritus euphrasie, rutæ, ❖is ❖ci succinatus, Essentia Valerianæ, Chelidonii, rosmarini, Conservæ majoranæ, rosmarini, & salia dicta volatilia; si concretio in tantum processerit, ut discussio nullum ulterius habeat locum, ejusdem resolutio & dissipatio tentanda venit primo medicamentis fortioribus, additis ante, jam nominatis, discutientibus, luviviosis videlicet & actiusculis, luvivio fermentorum vitis, liquore hepatis mustelæ, aqua stercoris humani, ex urina pueri & Oleo, liquore acido perlar. *Mynicht.* oleo myrrh. aloë, vitro ❖ii, Oleo albo, aliisque. Si tandem adeo sit confirmata, ut nehis quidem medicamentis resolvi queat, eandem benematuram submittunt acui, quam operationem & præcedens paragraphus jam descripsit, & sequens plenius adhuc edocebit.

**§. 19.** Nunc ordo Nos tangit, ut pluribus videamus, quæ in *Procidemia Uveæ* juxta nostra fundamenta conveniant, in qua cominodè adhibentur modicè adstringentia, membrana relaxate iterum firmantur, vulnus vel ulcus consolidetur jam sæpius dictis remediis; in Uveæ Procidemia præ aliis à pluribus commendatur ☐ album, ovor. cum succino; nostra experientia convenit pannus scarlaceus vinorumbo

intinctus, vel alii aquæ adstringenti, & sæpe oculis tepidè applicatus; aluminosa hoc in casu non negligenda sunt, imprimis hic opem affert thutia quocunque modo applicata. In tali protuberantia conducit cataplasma ex pulv. rosar. myrtill. balauft. fl. chamomill. melilot. herb. beton. euphras. farin. fabar. & hord.

In *Pupille dilatatione* post aures applicentur calidiora. Ubi opus est exsiccatione, convenit Essentia lignorum. Si à flatibus, conducit Spir. anticol. cum essent. Ophthalm. vel potest misceri cum Spir. ❖ri, cum Spir. euphras. Essentia lignorum cum Spir. rutæ mista cominodè usutur.

**Angustia Pupille** curatur pro diversitate causarum. Hic in genere conveniunt corroborantia, ut sunt helenium, valeriana, herb. euphras. rosmarini, melissa &c. Si à Spirituum influxu denegato, conveniunt omnia spirituosâ, Aqua Regin. Hungar. Sp. vin Sp. euphras.

Curatorem *Suffusionis* quod attinet, ea ex nostra sententiâ dupliciter venit instituenda, alia enim requiritur, ubi affectus adhuc producit, alia ubi jam productus est; ubi affectus producit iterum variatur, pro varietate causarum proximarum, remotarum variè peccantium, atque lex rerum non-naturalium, vulgo sic dictarum, male usurpatum; ubi verò jam productus est, itidem variè instituitur propter materiam, causæ suffusionis multifariam diversitatem. Cautè ergo & sedulo allaborandum, ut materiae causæ proximæ Suffusionis generatio ulterius impediatur, si ergo motustardior sanguinis adit, ante omnia hæc acceleranda venit: hinc conveniunt varia acida aborbentia, antequam ad medicamenta externa seu Chirurgicam cum succellu accedere possimus, imprimis sequentes Pillulæ ophthalmicæ dictæ superius, vel lequentes.

❖. *Extrait. pil. de succin. 3ß.*

*Catbol. gr. xv.*

*Diagrid. ʒss. Rutæ. gr. v.*

*Sul succin. vol. gr. iij.*

*Euphras. gr. ij.*

*Ol. sanc. gr. ij.*

*M. F. Pillula.*

Vel detur pro re natâ apozema, quod in sanguinis Crassitie plus efficit, quam medicamentum in forma pilularum exhibitum: dein usurpetur sequens vel simile apozema.

❖. *Herb. Chelidon.*

*Verben.*

*euphras. 2a. Mj.*

*Raf. tien. Guajac. ʒi.*

*Rad. Coine*

*salsaparill. aa. ʒx.*

*liquirit. raf.*

*Qi crud. aa. ʒß.*

*F. infusio calida per horas 12. in vino.*

*F. Decoctiolemia. Colar. it. iij. add.*

*Oxymell. ʒss. ʒiß.*

*Salis euphras. ʒj.*

*Spir. Salis ❖ci ʒij.*

*Vi. Matthiol. ʒiß.*

*M.*

In crassiss humoribus incidentibus optime conducit ejusmodi apozema per 6. vel 7. dies usurpandum, & tunc pillulæ supra scriptæ interponendæ sunt, materia enim ante omnia attenuanda est, dein aliquando decoctum sudoriferum exhibendum vel varia salia volatilia, potus Thæe &c.

N 3

fumus



fumus tabac. internè detur essent. mum alcal. Elix. propr. alcal.  $\varnothing$  volat. oleos. Essent. viperæ &c. Omnibus externè præfertur aqua Ophthalm. *Quere.* ex croco metallor. ut &  $\nabla$  benedict. *Ru-land.* nec omittenda sunt vesicatoria, fonticuli & setacea.

Si adhuc spes appareat rudimenta Suffusionis discerpendi & attenuandi, instituantur varia incidentia & attenuantia, tum per jam dicta interna, & nunc dicenda externa, parentur ergo in hunc finem varii fatus, ex, gr.

*R. Herb. euphras.*

*fanicul.*

*Chelidon. maj. aa. Mj.*

*verben.*

*flor. chamomill.*

*sambuc.*

*melilot. aa. Mß.*

Decoq. in vino, & vapor ex ferventi hoc decocto in oculos excipiat, cum jam deferbuit, sub forma fatus adhibeatur, vel collyrium hoc oculo affecto aliquoties mediante linteolo aliquo puro applicetur, quod magnarum est virium.

*R.  $\nabla$  facic.  $\tilde{z}$ ij.*

*Sp.  $\times$ ci gr. xij.*

*Regin. Hung.  $\tilde{z}$ ij.*

*M. F. Collyrium.*

Quod si talia volatilia solo Sp. vini rectificato diluantur, summo cum succelli operantur, hinc

*R. Spir. pan  $\tilde{z}$ ij*

*Salis  $\times$ ci gr. vj.*

*Aq. rosar.  $\tilde{z}$ ij.*

*M.*

Nonnulli commendant panem cum herbis cephalicis subactum & coctum, ex quo in medio discillo & ex furno recens extracto vaporem calidum oculo excipiunt. Sic quoque ex herbis cephalicis aliis, quæ particulis balsamicis & mollibus constant, cataplasmata parari & oculo affecto imponi possunt. Ex, gr.

*R. Herb. euphras.*

*verben. aa. Mij.*

*flor. Chamomill. Mj.*

*sem. fanic.  $\tilde{z}$ ß.*

*Aloes  $\tilde{z}$ ij.*

*Coq. in lacte, & dein add. Croc.*

*M. F. Cataplasma.*

Ad suffusionem à Dn. Muys. & aliis laudatur infusio croci metallorum in aqua chelidoniz, spir. panis siliqinei, vapor spir. salis Armoniaci, Sal volat. oleosum cum aq. mixtum, aqua mellis, extractum chelidoniz in aqua solutum, fumus succini, aliaque sic ex calce viva & sale armoniaceo quidam globulos parant, quos in aquam conjiciunt, ut ita fumus inde excitatus per infundibulum perveniat ad oculos: quidam cataractam exsurgere conati sunt, sed frustra.

Sequens aqua ophthalmica in pluribus oculorum affectibus, imprimis hoc in casu, est experientia multa comprobata, in quem finem junioribus Medicis eam communicare volui.

*R. Rad. Caryophyll.*

*fanic.*

*angel. aa.  $\tilde{z}$ ß.*

*Chelidon. maj. cum.*

*totò Mj.*

*Herb. euphras. Mv.*

*salv.*

*beton.*

*hyssop.*

*fanic.*

*veron.*

*verben. aa. Mj.*

*ruiba Mß.*

*flor. lavend.*

*caprifol.*

*bugloss.*

*rosar. aa. Mß.*

*sem. filer. mont.*

*fanic.*

*hepat. hircin. san.  $\tilde{z}$ ß.*

*$\nabla$  vitis non acid. & plantag. aa. q. l.*

*Stent mixta dieb. 4. postea s. a. destill. ad lbj. de qua aqua Ophthalmica  $\tilde{z}$ . vel 4. guttulæ oculo affecto instillantur, frons quoque & tempora eâ sepe illinantur.*

Sanguis quoque animalium, præsertim colubarum, oculo instillatus à pluitibus laudatur, ut & ipsi pulli vivi dissecati & oculo applicati, quia multo sale volatili gaudent; ad particulas crassas & coagulatas abradendas & discerpendas conveniunt varia amara, præ aliis laudantur aloetica & fel carpiionum piscium aliorumque animalium, quia tale suo penetrare & cuticulam abradere possunt. Hic & conveniunt Vitriolata &  $\tilde{z}$ ta, Croc. scil. metall. Ex gr.

*R. Succ. Chelidon. maj.  $\tilde{z}$ ij.*

*Croc. Metall.  $\tilde{z}$ ij*

*M.*

Sequens Collyrium *Vgonis* in Suffusione à multis pro secreto habetur.

*R. Hepat. hircin. san. &*

*recent. lbj.*

*Calam. aromat.*

*Mellis ana  $\tilde{z}$ ß.*

*Succ. rni.  $\tilde{z}$ ij.*

*Aq. Chelidon. maj.*

*fanic.*

*verben.*

*euphras. ana  $\tilde{z}$ ij.*

*Piper. long.*

*N. M.*

*Caryophyll. ana  $\tilde{z}$ ij.*

*Croci  $\tilde{z}$ ij.*

*Flor. rorismar. Mß.*

*Sarcocoll.*

*al-es hepat. ana  $\tilde{z}$ ij.*

*fell. raja (vel carpiion.)*

*lepor.*

*perdic. ana  $\tilde{z}$ ij.*

*Terantur omnia, & trisque add.*

*sacchar.  $\tilde{z}$ ij.*

*Mell. ros.  $\tilde{z}$ ij.*

*Conjiciantur in alembicum vitreum, & de-*

*still. in Mß.*

stillatitius liquor sæpe oculo instilletur, Collyrium sequens ad incipientes cataractas multum laudatur.

*R. panis:*

*secal  $\tilde{z}$ ij.*

*Croci Metall.*

*frœ hepat. rni  $\tilde{z}$ ij.*

In his per hor. 24. filtra ipsique tincturæ filtra-  
tæ vitriol & ad levem coruleitatem inducendæ.

Liquor hepatis piscis Mustelæ singularè habetur  
specificum in oculorum affectibus; Duplici  
autem modo adhibetur, vel enim illinitur saltem  
palpebris, cavendo ne in oculum penetret, vel  
ipsi oculo immittitur, ubi sc. fortius agendum,  
ut in suffusione. Si ex felle piscis Lucii destilla-  
tur  $\nabla$ , quæ tutius instillatur oculis, quam ipsum  
fel,

fel, & beneficio Spiritus Vini essentia elici potest, quod experimentum est egregium in oculorum affectibus, quia hæc humoribus motum suum restitunt.

Omnia linimenta viscida, quæ porostunicarum oculorum tantum obstruunt & paribus spirituosam viam intercludunt, angue pejus fugienda sunt.

Hic quoque frictions, fonticuli & vesicatoria & setacea non omittenda sunt, quin danda etiam masticatoria, nunquam parerga, si non juvant, non etiam nocent.

Quod si his & tot generosis remediis nil profectum, & pellicula jam matura visa fuerit, acu removenda est, hinc Chirurgus incumbit inter noscere, quibus maturam pelliculam ab immatura, & sanabilem ab insanabili discernat. Sola enim matura & sanabilis manu & acuta cutanda venit, immatura verò & tenerior, quæque durior & densior, tanquam insanabilis, non est tentanda; sic hic Cassellus nuper empiricus quidam oculista plures pelliculas acu punxit, sed incassum, quia statim malum recruduit, vitium etiam saepe latet in nervo optico, quantumvis ergo cataracta feliciter decussa, superflus cæcitas manet, præstat tamen tentare remedium non adeo tutum, quam absque ullo remedio in cæcitate vitam degere. Cataractæ depositionem in utroque oculo feliciter celebratam ridit Cl. Febrinus. Confer

Eph. G. Dec. 2. A. 7. Obs. 229, sic etiam idem in observatione seq. Tumorem juxta oculi iridem feliciter vidit sanatum.

Operatio hæc sequenti peragitur modo: eligendus est locus mediocriter illuminatus, jejunosque æger sedili angusto imponendus, ipsiusque manus pedesque ligandi, caputque ab alio firmiter continendum, sicque ut à latere lumen habeat æger; oculo sano imponatur lana & deligetur, ne nimis moveatur, nam uno oculo moto movetur & alter: tunc Chirurgus in scanno paulo altiori acu manubrio instructa chalybea seu argentea in oculum penetret, comprehendensque pelliculam decutiat penitus, & tunica cornea separet, & partem inferiorem, partem ad latera est deducenda. Postea parum expectandum est, antequam acus iterum eximatur, & rite prospiciendum, an partes detrusæ iterum emergant, quod si non fiat, acus extrahatur & oculus rite ligetur, imposito prius album. ov. c. aq. ros. agitato, adstrictionis accendæque inflammationis ergo, quod & vicinis partibus imponi potest, æger in lecto siti resupino colloctur, nec multum loquatur, & oculus, quantum possibile, non moveat, ut pellicula semota firmam accipiat positionem, & postea non facile redeat. Si quis de hac operatione plura desiderat, adeat *Vigierum* cap. 23, de Cataractâ.

## CAPUT XII.

## De Visus debilitate Gutta serena, totali Cæcitate, &amp; Humorum Oculorum amissione.

## §. 1.

Visorio organo clauso, vel ablato, carcerem Plani corpus nostrum non immerito salutat. Cæcos, quod insignia Majestatis videre aut revereri nequeant, à postulatione excludunt jure consulti. Visu intercepto quantæ enalutur infortuniorum lerna, satis novere Philistæi, Simsonis oculos eradentes, Ulysses Polyphæum excæcans. Totus oculus sit, oportet, cui sensus exquisitissimi emolumenta perspicere, totus lingua, cui ejusdem elogio exactè sistere lubet. Paucis ut multa comprehendamus, quo ex omnium animarum operationum numero plus eminent sensus, hoc sensu quocumque eminentior primatum sibi & scepta dignius postulat Visus. Superet necessitate reliquos Tactus, omnibus palman præcipit nobilitate Visus. Jamque sensuum maximus certè est in oculis. Movit tam jucunda, tam necessaria, totique vitæ utilissima functio animum meum, ut diutius, quam par est, ejus affectibus indagandis operam locarem, & de hujus Visus Debilitate, Gutta serena, Græcis *Αναστροφή*, alijs *Suffusione nigra*, Germanis *dem schwarzen Staar*, ipsa Cæcitate, & Humorum oculorum relictione agerem.

*Visus Debilitas* dicitur, quando ægri parum vident, ob plures infra dicendas causas. Imminuitur visus in nonnullis, quando rerum species, quas naturaliter visus assequi deberet, ubicumque & quandoque non bene vel obscure vident, idque plerumque nullâ quoque causâ in

*Amblyopia* oculis se offendent, atque *Amblyopiam*, seu Visus

obscuritatem, hebetudinem, & in senibus hoc vitium *Caliginem* vocant. Huc & referri potest visus ea imbecillitas, cum visus res propinquas non melius quam distantes, ut naturaliter fieri deberet, sed vicinas oculis minus, quam distantes assequitur, & proin ubi res minutæ cernere volunt aut legere, eas procul ab oculis removere coguntur, vitium senibus familiare, quod cum peripicillo idoneo corrigi possit, eo in rebus minutioribus apprehendendis continuo utuntur, ob quam causam senum visio appellari meretur. Sic & visus debilitas est, si visus res paulo distantes non rectè discernit, & à *Placero* juvenum visus nuncupatur. Similiter visus debilitas est, quando nonnulli res, nisi oculis omnino propinquæ sint, non rectè judicant, & dicitur *Myopia*. Occurrit & alia visus debilitas, quando noctu ad accessitæ flammæ lumen parum aut ferè nihil vident, inter diu verò in diei luce nullum impedimentum visus percipiunt, quos *Nyctalopes* Latini *Lusciosos* nuncupant. Si adhuc alias species, desideres, adeas *Placitum* aliosque Practicos, qui ad naufragam aliquæ te informabunt: sed quis quæso omnia hæc memoriæ imprimere potest?

*Gutta serena*, seu *Amaurosis* dicitur, ubi visus est abolitus propter nervorum opticozum obstructionem vel angustiam, nihilque vitium oculis animadvertitur, & ægri oculis aperti & serenis cæci sunt.

Quando aboletur visio, ut omni tempore & semper nihil videant ægri, *Cæcitas* dicitur.

*Humores*



Humores  
oculi.

Humores jam excutiamus, quorum tres Anatomie sinit. *Aqueus* dilectis anterioribus tunicis effluens primum sibi postulat examen. Spatium id totum inter corneam & Crystallinum, velut alveum rivus interfluit, fluxilis & aque ad instar pellucidus, *Albumineus* à nonnullis nuncupatus. Parum abest, quin à multis ex partium vitalium consortio ad excrementorum colluviem detrudatur. Sed proprium ductum, per quem sanguinis & succorum circulatio defectum eius continuò restituit, invenit celeberr. Anatomicus D. *Nuck* in Tract. suo de Ductu novo salivali. In hoc Humore Aqueo radiis visibus fortius uniti, communis fert Authorum sententia.

Quemadmodum vitellus in medio albuminis duplicis, ita *Crystallini* Humoris globus inter *Aqueum* & vitreum cecujat sedem. Crystallus & glacies concreta vel gemma nitidissima videtur, corpus splendidissimum ac diaphanum. Eleganter cum tunica Uvea impertitur *Ciliare*, à similitudine ciliorum oculi exteriorum nuncupatum, cuius ope necitur reliquis partibus & velut à melleo lucillo pro objectorum diversitate moveret, nigrare vero visio distinctior redditur, uti hæc luculenter proponit *Carlesi* de hum. §. 119. *Dioptre* c. 3. & 5. Hic humor densior est reliquis, & si exlicceat, ex meris videtur constare pelliculis, instar corporum invicem se excipientibus.

Ultimus *Vitreus* propria membrana cinctus, crystallinoque pulvinari adinstar inerviens, superest. Ab hoc vitreo crystallinum nutrire credunt quidam, aliter verò (qui de totius oculi, tum de humorum nutrimento iudicium fert *Barb.* de sero & sangu. p. 63. cum quo conserti meretur exactissima sententia *Emili. Parisian.* l. 10. c. 10. §. 3. p. 409.

Tantus Naturæ Artificis in nobilissimo instrumento apparatus eminet, paulo infra videndum, quomodo humor ille evalatus cognosci & restitui potest.

Parti affe-  
cta.

§. 2. *Parti effecta* est in genere totus oculus, in specie vero nervi optici, tunice oculorum, eorundemque humores circulares.

Diagnosi.

§. 3. *Visus* debilis ex ipsius agri relatione facile hauriri potest, ut & *Gutta serena* æque ex relatione ut ex ipsius adspectu patet, in qua plerumque nullum plane oculorum vitium advertitur, & sic agri oculis apertis & serenis cæci sunt.

Humoris aquei effluxus post vulnera factus, ipso quoque intuitu, dum contingit, animadverti solet, vel ex ipsius vulnerati aut adstantium relatione percipitur, ejusdem verò, ut reliquorum humorum consumptione temporis diuturnitate pronatam, ipsa visus debilitas, & Pupillæ angustias, vel Oculi Atrophia morbositos subsæquens facit huiusmodi.

Ætiologia  
secundum  
Galenicum  
ipsius visus  
debilitatis.

§. 4. *Causa visus debilitatis* secundum veteres Galenicis non una, sed multiplex esse potest, vel enim ea exhibet ipsa facultatis videndi imbecillitas, vel spirituum defectus, aut nimis influxus, aut vitiosa qualitas, vel ipsum instrumentum tum in totum, tum secundum aliquam ejus partem male affectum, ita oculus alter deficiens, vel naturæ hebes, aut male conformatus visum reddit debiliorem. Eam visus debilitatem, in qua aliquantum remota non discernuntur, à spirituum animalium defectu, adeoque ipsius facultatis in-

ertia pronasci dicunt, sive illi ob cerebri morbes & debilitates pauciores generentur, sive ob nervorum angustiam debita copia influere nequeant. Assiduam & continuatam intuitum objectorum, imprimis splendidorum similiter hic acculant, ut spiritus nimis defatigantem & absumentem. *Sennu visum* causam attribuit crassitie & turbulentie humorum, aut tunicarum densitati, à qua parum vel nihil pene *Nitilopie* causam distare credunt, nisi quod causæ istæ magis existant intensæ.

*Gutta serena* & ipsius *Cæciutatis* causas constitunt vel ipsam videndi facultatem penitus in fonte suo extinctam, vel spirituum animalium defectum, vel etiam nervorum, quos spiritus cum facultate transire debent, occlusionem. Addunt iis intemperiem cerebri aliarumque partium principalium, tum ipsorum oculorum siccam, vel sine, vel cum materia, horum vitia in conformatione, ut totalem defectum, figuram inconcinnam & strum depravatam, humorum vitia & defectus, pupillæ angustiam vel dilatationem, tunice Corneæ rugas & densitatem, suffusionem, unguem totum oculum occupantem & palpebrarum tumorem & resolutionem earum motum & sublationem impediens.

*Humorum* & imprimis *Aquei* defectum à variis causis oriri statuunt, quas inter potissimum recensent calorem & siccitatem ex febribus, tum ardentibus, tum hæcticis & phthisicis, ætate senili, venere immo dicā, evacuationibus nimis, effusionem per vulnera vel ulceram inductam.

§. 5. *Paracelsus* videtur *Visus debilitas* à substantia corrupta in tantum oriri, quatenus in compositione deficit & conjunctio subsequens est incongrua, quia spirituum impeditur accessus. *Cæciutatis* causa eadem ipsa est substantia depravata, dum centrum coagulatur à spiritu salis, & falsā contingit generatio.

*Humorum* defectus ad vulnera, eisdem effluere, tum siccitatem, eisdem absumen-

tem, refertur. §. 6. *Holmström* causā *Visus debilitatis* & ipsius *Cæciutatis* est impuritas spiritus vitalis, qui opinio de minus elaboratus à lumine, seu luce vitali non satis illuminari potest, quare tenebrosus permanet, & character *Cæciutatis* inducitur.

*Humorum* defectus aut consumtio nullam peculiarem ab hoc Auctore notatam habet causam, sed reliquorum hic effectus penè consensite videtur.

§. 7. *Villius* causam *Visus debilitatis* maximam partem imputat spiritibus animalibus sive deficientibus, sive crassioribus, ut ita minus agiles tunice retinæ fibras sequuntur aut non sufficienti copia transcurrentes species visibiles & radios lucis tardius & debilius ad commune deferant seuolorum; tum etiam humori aqueo inipuro, pupillæ inconformi, aliisque organi vitis, ob quæ radii ab objectis lucidis aut illuminatis progredientes ad retinam tunicam nequeant intrinse.

*Cæciutatis* causam potissimum adscribit tunice retinæ ab expansione nervi optici dependenti, adeoque ipsimet illi nervo, quibus obstructis, compressis, vel alio modo latis spiritibus animalibus debitus denegetur influxus. Reliqua vitia organica integros oculos pro admittendis radiis ineptos reddentia, quin ipsorum totalem defectum

defectum causis hujus Cæcitat accensenda cum aliis facile permittit.

*Humorum defectus.*

*Humorum* defectum vel vulneribus aut ulceribus uveæ solutionem inducentibus, vel æstui interno in sanguine, aliisque morbis chronicis vel malignis laticem & humiditates absumptibus impurari posse, aliis id statuendis haud illibenter assentiri videtur.

*Optici opus de causa debilitatis.*

§. 8. *Sylvius* etiam *Visus debilitatis* causam putat maxime, & ex ea excitatis halitibus adscribit, à quibus humor aqueus obscuratur, & obiecta cum lumine difficulter admittuntur.

*Cæcitas.*

*Cæcitat* causam statuit pituitam & halitus istos adeo spissos, & humorem aqueum ab illis ita obscuratum, ut pupilla quasi ab iis occlusa lumini cum speciebus visibilibus nullo modo transire concedat.

*Humorum defectus.*

*Humorum defectum* præter effusionem ob defectum Uveam, potissimum oriri cenet à defectu aquei in sanguine universo ab eisdem exsiccatione induto.

*Iuxta Cassanum visus causa visus debilitatis.*

§. 9. *Cassianus* in *Visus debilitate* ut causas proximas acculant tum spirituum animalium defectum, tum eorundem impuritatem & pigritiem ob admissos vapores crassos & viscidos, à quibus nervi optici facile obstruantur, & debitus transitus spiritibus occludatur, ut remotas verò nimiam venerem, spiritus continentem, & lucubraciones frequentiores, maxime ab assueto oculo statim inceperat & diutius protractas, nec non crapulam, à quibus multe oriuntur cruditates, spirituum generationem impediens, & materiam illorum multis particulis impuris adspersas.

*Quæritur.*

Inter *Cæcitat* causas præ aliis recensent nervorum opticorum obstructionem vel dissolutionem, & hinc spirituum animalium transitum denegatum, humorum in oculis turbulentiam, ut & tunicas præternaturales pupillam occludentes & radiorum lucis introitum inhibentes.

*Humorum defectus.*

*Humorum defectum* quod attinet, de eisdem causis aliorum sententia facile subscribitur.

*Humorum defectus.*

§. 10. Certum est *Nobis*, omnium Visionis enarratorum accidentium causam vel in spiritibus influentibus, vel in instrumento recipiente Oculo consistere. Visus ergo debilitati & in totum aboliri potest ex læsione cerebri, præsertim in ea parte, ubi nervi optici prodeunt, sic nuper ex iniuncta consulsione cerebri cæcum factum quandam consulum observavi. Si compressio vel irrigatio circa nervum opticum sit violentior, necessario fit cæcitas, quia succo nervo seu spiritibus denegatur influxus. Sic *Gutta serena* potissimum exoriri solet, quædo vasa sanguifera ita aperiuntur, ut humorem aliquem effundant, qui nervum opticum aut foris comprimat, aut intus penitus obstruat, poros enim arteriarum valde dilatatos magnifici nutrienti egreditur copia, una cum crassioribus corpulentis aliis in tunica corneam, ac ipsos adeo oculi humores, sicque una cum cornea densiore facta opaciores evadunt, in uvea in motus sui dilatandi & contrahendi pupillam officio valde impeditur, ita ut radii luminis vix admittantur in oculum, unde visus detectus si non plenarius, saltem magna videndi imbecillitas, in quibusdam verò, quibus non contingit tanta visus hebetudo, quia tamen à luminis actione dolor exacerbat, obscuriori in loco semel laus degere tenentur oculis, ut doloris obviam eant acerbitati, ne spiritus in ma-

jores & tædæ concitentur. Sic affectus subito fit, si statim humor eò defluat & obstruat, vasa quoque ceu dictum, in cerebro contenta possunt facile humorem peccantem in nervos opticos deponere, sed & nervi suas habent arteriolas, quæ si oscula earum nimis aperiuntur, materiam crassiusculam in nervos deponere possunt. Ut plurimum verò visus debilitas oritur à tardiore tum tum sanguinis aliorum succorum, imprimis verò nervi circulatione, ob acidum illos coagulans, vel viscidum illos inviscans.

Post convulsiones graves & frequentes cæcitatem sæpius relictam observavi, absque dubio ob partium membranarum & fibrillarum contorsionem vel lacerationem & diffusionem, unde spirituum influxus denegatur, ut & solutio continui in nervo optico, seu cerebri cæcitate infert potest Omnia quoque frigida sum symboli addunt, v. gr. ventus austrinus frigidus, aque frigida innatatio, prout in puero Viceris uatante observare licuit, qui caput nimium aque frigida intrulit, & planè exinde cæcus factus est. Sic ex oxorrhodiorum actu frigidissimum incauta applicatione eundem affectum observare licuit, quod & observavit *Plater. de vis. le. fol. 137* Sic post febres malignas, variolas, &c cæcitas inducitur, partim ob metastasin humorum crassorum ad nervum opticum, partim ob nimiam stagnationem, coagulationem humorum & effluxum. Confer obviæ. ostentum in *Ephem. G. m.*

*Amantius* seu *Gutta serena* causa latet ut plurimum in obstructione nervi optici à quacumque causa facta, & spirituum animalium influxum impediende. Subito hic affectus fit, & aliquando subito perit. Ob obstructos menses in feminis, & hæmorrhoides in viris Guttem hanc serenam observare licuit. Scire quoque hæc cæcitas secundum magis & minus duntaxat differunt.

*Humorum* oculorum præfatio ut plurimum oritur à continui solutione à violenta causa induta, præfatione plaga, punctura, ictu mortu, aliisque venenis acerbis medicamentis in oculis immixtis, vasculis ruptis arteriis. Reliqua eorum vix ab aliis Autoribus numerosè annotata hic consulo transimus, quum in superioribus oculorum affectibus non raro fuerint causarum classibus inserta, & paucissima omnimodam admittant curationem.

§. 11. Omnes Visionis læsiones ob organum nobile sunt periculosæ, quo verò causa tortior, & quo humor crassior & copiosior, obstructio scilicet, que major, eo affectus est periculosior.

Si affectus hi extra oculum adhuc, vel in cerebro vel nervo optico consistant, pro cause ratione prædictio instituenda; si vero ex læsione insigni vel vulnere circa oculum adacto ad nervum opticum usque visio sublata sit, cæcitas ista insanabilis erit; quod si quoque post convulsiones ex contorto nervo optico cæcitas induta sit, nisi intra triduum sponte visio redeat, ut aliquando accidere solet, desperata salus est; sic & spes nulla est, si ex obstructione plenaria, vel abscessione nervi optici cæcitas relictæ sit. Sic quoque si ab externo frigore, vento, vel applicatione oxorrhodiorum frigidorum & acidorum seu repellentium cæcitas fuerit oborta, cum nervi frigidum caninum inimicum sit, noxa etiam terè insanabilis existit.

Si morbus hic scil. *Gutta serena*, comitetur vel sequatur capitis morbos, ut Apoplexiam

*Causa Amantius.*

*Humorum præfatio.*

*Prognosis horum affectuum.*

*Epi-*



Epilepsiam, plerumque signum est lethale, indicat enim spirituum animalium totalem absorptionem & stagnationem; Cæcitas subitanea Epilepsiae prodromus sæpe est cui constat. *Exh. G. Decur. 11. A. 7. obs. 159.* hinc moribundi non vident, imò plerumque tanquam incurabile malum non tangitur. Senes quoque huic affectui valde sunt obnoxii, quia naturaliter quoad visum hebescent, ob sanguinis & reliquorum humorum circulationem tardiores quam habent. Interdum relaxata tunica retina omnino excruciantur, malo incurabili. In genere omnis Amaurosis difficiliter curatur. Nyctalopia, si interdum recedat, vesperti parum aut nihil videtur, raro curatur.

Quod attinet p. n. *Effusionem humorum* oculorum, si Aqueus effunditur, spes est, quod à circulatione restituitur. Crystallinus verò & vitreus si effusus fuerit, tunc maxima imminet periculum, qui humores si opaci reddantur à pluribus incongruis particulis in illos delatis, plurimi exinde exfurgunt affectus, & visus hebetudines ac obfcuritates.

Diala.

§. 12. *Aer* sit temperatus, acidus vel frigidus enim poros arteriarum nimis adstringit, & sanguini impetivam stagnationem conciliat, frigidus etiam concentrat humores in crassatque.

*Cibus* moderate utatur ægri, atque iis, qui boni sunt succi facilis digestio, omnia enim frigida fugienda. sic & acidia iumenta, quia poros arteriarum nimis constriungunt; exulent ergo cibi saliti, acres, fumo & sale macerati, sturulentii, carnes faule, brassica capitata, omniaque legumina, acidaque.

*Potus* sit Cerevisia tenuis, herbis cephalicis optime inaritata & bene fermentata, non nimis lupulata, triticea, vinum potens fugiatur, neque nisi maxime temperatum & *dry*. *Pigeu* concedatur: potus Thee egregius hic est.

*Somnus* sit moderatus in cubili temperato, decubitus fiat in latus bonum. Optimum est elato capite decumbere & in dorsum reclinare.

*Vigilia* etiam ordinarii cum somno lervent *opumistegia*.

*Astrum* ne sit nimium. Author sum, omnis enim ad malum proventum confert.

*Quies* est impetanda, lubricatio verò & maxima illuminatio maxime nocet, hinc vitanda.

*Astrum*, & in sexu sequiori mensis, in viris hamorrhoides & vesica urinaria, quantum licet, officio suo tempeliva de cessione, si urgeat, fatisciant.

Inter *Animi patlemata* Mæror, ob lachrymas continuò stillantes, & oculorum quoscunque affectus deteriores reddentes, fugiendus est. Sic & ira aliique motus animi vehementiores culpandi veniunt, quia stagnare faciunt succi.

§. 13. Aggredimur nunc curationem methodo medendi per indicationes & materias auxiliorum illis respondentes institutam. Eam itaque *Galeni* in *Visus debilitate* aggredimur in spirituum defectu, & facultatis imbecillitate usurpando corroborantia, & visum ex proprietate quidam peculiari confortantia, oxyderica propterea dicta, qualia sunt euphrasia, salvia, colmarinus, feniculum, chelidon. majoran. beton. sem. filer. montan. Nucilla, &c. ex quibus aliisque varia parare solent medicamenta tum intus, tum extus usurpanda, præ aliis autem si quis laudant electuaria visum admodum corroborantur.

Curatio

Pharmaco-

centica &amp;

Chirurgica

secundum

Galenicis

in visus de-

bilitate.

re. flor. anib.

salv.

euphras. ana. ʒvj.

Chamedr.

rad. Chelidon. ana. ʒvj.

sem. fenic.

siler. mont. ana. ʒv.

sem. anis.

petrosel.

junip.

saxifrag. ana ʒi.

*Omnia quam tenuissime pulverisata*, q. mellis excipiantur, & in formam electuarii redigantur, de quo nucis suglandis quantitas hori somni & duabus à pasto assumenda. Esum quoque viperarum maxime commendat, & usum frequentiores tryphera minoris, theriaca, in thei datæ & mirobolanorum conditorum. A spirituum nimia copia obortam imbecillitatem, cum potissimum ab obstructione nervorum ab humoribus crassis spirituum effluxum impediuntibus pendeat, corrigunt remediis aperientibus & attenuantibus, inter quæ referunt purgantia, ut Pilulas Aloephanginas, Arabicas, Cochias, Lucis majores & minores, de quinq. generibus myrobolanor. Hieram picram compol. Agaricum trochiscatum & similia. Cucurbitulas etiam aliquando asligunt occipitio cum scarificatione, ut obstructions ab humoribus crassis eo citius referantur. Vinum euphrasiatum hoc calui magni ab iis habetur pretii, quin trochisci viperarum *Galeni* spiritus valde clarificare creduntur, & sequens sal oxydericum:

R. Sal. commun. ʒi.

euphras. sec. ʒij.

mace.

Cinamom. ana ʒj.

M.

Externè etiam varia adhibent remedia, ut vaporem ex decocto ratæ, marrubii fenic. chelidon. euphras. saliv. croci &c. cinerem caputim hirundinum oculis insufflant, collyria ex succis feniculi, chelidon. ruta & felle perdisci, sicuti & exuvio aspidis oculos frequenter solent fricare. In *Nyctalopia* peculiariter laudant vel caprinum vel hircinum assatum quotidie comestum, sanem autem ex hepate isto cum felle suo inter assandum desillantem vel per se, vel cum succis prædictis commistam oculis intrinsecè illitanti.

In *Cacitate* & Guttæ serenâ, ubi spirituum defectus in causa est, remedia in *Visus debilitate* ab eadem causâ dependente jam reconstituta in usum recipiunt, si verò graviore adsint cause, & organa visoria vel plane deficient, vel insigni laborent vizio in conformatione curationem nullatenus sperandam esse norunt, sed vel baculo, vel alterius hominis videntis ductu Cæcis pericula suavitè evadere.

*Humoris Aquei defluxum* cum tempore à natura restitutum iri considunt, soli usurpatâ diæta vitam, bene nutriente & succulentâ, reliquorū verò penuriam refarcire, & graviora eorum vicia in meliorem reducere velle statum, reu credunt admodum difficilem aut penitus impossibilem.

§. 14. *Paracelsus* arcans teret omnes morbos curaturus, etiam in *Visu debilitate* & *Cacitate* singulariter extollit Atcanum seu Essent. quintam Chelidon. & Valerianæ, quibus visum multum corroboratum iri promittit. *Crolius* verò fidelis *Paracelsi* lecturer, in debilitatibus hinc, aliisque oculorum &

Humorum

Humorum

Paracelsi  
Cura in visu  
debilitate & Cacitate

*Humorum* eorumdem vitii magnarum vitium esse deprecatur liquorem ex humore crystallino oculi bovis destillatum. Essentia quoque quinta Euphrasie non sine insigni utilitate adhibebitur. Externè collirium in prædenti capite ad suffusionem communicatum etiam hoc in casu cum comunodo in usum duci posse existimat.

*Helmentis  
sententia  
de causa  
visus debi-  
litate &  
Cecitate.*

*Willisi au-  
ditur curan-  
di visus de-  
bilitatem.*

§. 15. Ab *Helmentio* in *Visus* debilitate & ipsa etiam *Cecitate* corrigendâ & corroborandâ fella piscium, & imprimis lucii nigrum in modum laudantur, si oculis intillentur, tum enim characterem caliginosum *Cecitatis* in luminosam & splendidam visionis imaginem transmutari promittit.

§. 16. *VV. Illisus* ad augendos spiritus in *Visus* debilitate utitur salibus volatilibus aliisque medicamentis spirituosius, ut sale volatili succini, spiritu C.C. spiritu  $\alpha$ ci, Essent. rorismarini, Majoranæ, spiritu euphrasie, aliisque. Ad crassiores subtilisandos & tenuiores reddendos similia adhibet, ad humores autem viscidos cerebrum obstruentes nervosque comprimentes evacuandos sequentibus utitur pilulis.

℞. Pilul. Aloophang. ʒi.  
de succino ʒib.  
Resin. Jalapp. gr. v.  
G. li. ʒi. gr. vj.  
Ol. fenic. gr. ij.  
Bals. Peruv. q. l. F. Massa & ex ea servetur  
Pilula No. x.

Demur duob. vicibus.

Uti spiritus crassiores ulterius subtiliscentur, quo promptius & majori copiâ nervos pervadant, itaque bene fungantur officio, sequens in promptu habet destillatum.

℞. Herb. beton.  
euphras.  
rut.  
majoran.  
meliss. ana Mj.

Rad. valerian.  
Ir. Florent.  
enul.  
fenic. ana ʒb.  
flor. salu.  
anthos ana Pij.

sem. fenic.  
rut. ana ʒij.  
siler. mont.  
saxifr. alb. ana ʒij.  
Nuc. Mosch. ʒib.  
Cubeb.

Macis ana. ʒi.

Lucif. & confus. assand. vin. alb. lbijj; stent per  
noct. 2. aut 3. postmodum destill. Lignor  
servetur ad usum.

cujus dosi cochlear unum aut alterum, in quo  
sequentem pulverem optimo cum successu ad-  
hiberi posse confidit:

℞. Carn. viperin. Monspel. pp. ʒvj.

Spec. dianth. ʒi.

Herb. euphras. ʒijj.

flor. salu. ʒi.

sem. fenic. ʒij.

M. F. Pulv. add. sacch. ad pondus omnium

M. Dos ʒj.

mane & vespere hora somni. Hoc pulvere & hu-  
mori aqueo majorem claritatem conciliari pro-  
mittit pupillæ verbis in conformitatem incurabilem  
æstimat, sicut & reliqua graviora organi vitia.

*Cecitate*

*Cecitati* incipienti eadem jam dicta idonea

retur, confirmatam verò vix abigi aut in melius  
mutari posse; ut autem nervi optici cum retinâ  
tunicâ aperiantur, & humor crassus eosdem  
comprimens attenuetur, reolvatur & ad egestio-  
nem reddatur commodus, sequens commendat  
apozema.

℞. Rosur. ligni Sassafr. ʒijj.

Rad. fenic.

Sassaaparill.

valerian.

Chelidon.

enul. ana ʒib.

Herb. salu.

beton.

euphras.

meliss.

verben.

fol. rorismar. ana Miß

flor. tunic.

lavendul.

beton. ana Pj.

sem. siler. mont.

rut.

fenic. ana ʒvj.

Cinamon. ʒib.

Caryophyll.

Cubeb.

Macis ana ʒj.

Cog. in Aq. fem. lbvj. F.

Colatura,

qua utatur æger per tempus aliquod pro pota  
ordinario. Externè fella animalium approbat,  
aliaque ex superioribus jam nota, sed graviora  
vitia organica ut incorigibilia vix attingit.

*Humoris Aquei defectum* dictâ humedante, *Humoris*  
& commodum succum sanguini contri-  
buente cum tempore refarciri posse non du-  
bitat, reliquorum verò constitutiones præter-  
naturales neque medicamentis neque aliis reme-  
diis tam facile, aut vix quidem corrigibiles esse  
pronunciat.

§. 17. *Sylvius* pro *Visus* debilitate curandâ in eo *Sylvii* judi-  
occupatus est, ut pituita attenuetur, & hanc ex ea  
producti discentiantur, quod præstari posse cen-  
set medicamentis sale volatili præditis ex rad.  
Valerian. apii, fenic. herb. majoran. euphras.  
rutæ, sem. siler. mont. carvi, fenic. &c. ex su-  
periore capite jam cognitis.

*Cecitatem* omnimodam & superioribus iisq;  
similibus medicamentis haud emendabilem, nul-  
lam penitus curationem admittente experientiâ  
teste prohibetur, sed cæcos illos aliorum fidelium  
ductui & custodiæ commendat, ne in perpetuis  
tenebris ambulaturi ullo modo offendant, &  
corpus suum exponant periculo.

In *Humorum defectibus* aliisque vitiiis curandis  
antecedentium effatus atque sententius jam pro-  
latis sine ulla controversia lubens subscibit.

§. 18. *Cartesianorum* opera in curandâ *Visus*  
debilitate eo potissimum vergit, ut spirituum de-  
fectus reparetur medicamentis volatilibus aro-  
maticis ex radicibus Valerian. fenic. Galang.  
Zingib. herb. menth. majoran. euphras. salu. basil-  
licon. chamaedr. fol. rorismar. bacc. Junip. laur.  
cubeb. Spic. Nard. lign. Sassafr. aloës, cort. au-  
rant. Gran. paradif. cinamon. Nuc. Molch. Pip.  
alb. & nigr. &c. Ex compositis laudantur Elixir vitæ  
Marthoi, Elix. illuminans, Tinctur. cinamon.  
cum Tinctur. flor. tunic. Essent. anth. & ambe. cum  
Aq. Nymph. menth. fenic. nepeth, & ʒ. c. de



Strechad. Pro vaporibus crassissattenuandis, discutendis, & spiritibus oppressis excitandis & clarificandis eadem & similia adhibent, evacuat is nonnunquam humorib' viscidis & crassis, à quibus impuritates istæ progrediuntur, spiritus obfuscentes & nervos opprimentes, cui scopo p'te alijs destinatas credunt ab alijs jam memoratas Pilulas Aloëphanginas, it. de Extract. Panchymag. Extr. Hermodactyl. cum Essent. Valerian. & ol.  $\gamma$ . fenic. caryoph. paratas; postmodum remotis hisce crassioribus obstaculis; ad nervos magis pervios reddendos & spiritus animales subciliandos, usum volatilium aromaticorum continuant, etiam cibum & potum hujusmodi visus debilitate laborantium iisdem condiendo & medicando, edulis additis herb. salv. roremarino, sem. fenic. quod massæ etiam panis cum carpo immiscet, Vinum autem concedentes euphrasiatum, vel pluribus ex antecedentis speciebus medicatum. Esum carnis viperinæ per tempus aliquod continuatum, non sine juvenum fieri p'ile existimant, vel eandem in pulverem redactam & cum specificis quibusdã commixtam, cum *VP* l'isso omni bus maiorem oculorum aciem desiderantibus serio commendant, nec non ipsum ejus sal volatile. Cucuphas ex herbis aliisque speciebus cephalico-aromaticis paratas externè capiti imponunt, pro ejusdem corroboratore & spirituum suscitatore Oculis etiam Collyria nonnulla adhibent, halius crallos discutientia, tubulos retinæ tunice & nervorum opticorum referantia, & spiritus allicientia, qualia sunt aqua ex fellibus animalium, Collyrium ex Aq. fenic. verben. ros. & euphras. & vitriolo alb. Unguentum Ophthalmicum *Mysq.* Ulmi Veneris rarum esse voluit & crapulas omnimodò vitandas.

*Cecitas.*

In *Cecitate* à nervorum opticorum obstru-  
ctione oriundâ eadem in usum ducunt, quæ in  
Visus debilitate jam commendaverunt; à dissolu-  
tione nervorum obortant incurabiles pronun-  
tiant; humorum turbulentiam clarifican-  
tibus corrigunt, ut El. illuminant. Essent. anth.  
Valerian. ruta, &c. In tunicis præternaturali-  
bus in principio abigendis laudant Aquam destil-  
latam sacchari, oleum ejusdem mercuriale, sic-  
cum ruta, valerian. chelidon. Zinzib. Caryo-  
phyll. Euphras. margarit. thut. pp. Vitrioli  
alb. externè oculis applicata; obduratas  
autem incurabiles judicant, ut & in senibus diu-  
tinnitate temporis obfirmatum Visus defectum,  
quorum incelsui omne obstaculum voluit re-  
movendum, eosque aliorum ductui & tutelæ  
cum baculis serio commendant, in solatium il-  
lis *T'resse* Vatis, eadem quondam jacturâ labo-  
rantis, dictum hoc animo sæpe suadentes vol-  
vendum.

*Obvius ora Deu, totamque in pectora lucem  
Detulit;*

quo externis quamvis destituti facibus. internâ  
tamen eo magis illuminati mentis claritate etiam  
in tenebris valeant gaudere.

*Humorum defectum.* præter Aqueum, quem  
cum aliis sponte ex communi fonte lymphatico,  
per peculiare suos canales reparabile pronun-  
tiant, nullo modo restitabilem esse terè per-  
suasi sunt, aliorum promissis non prius credi-  
turi, quam t' illius oculis suis ipsis clarè in-  
venientibus aliquod percepere experimentum.

*Crassum* verò Aquei & turbulentiam colly-  
rii resolventibus & attenuantibus corrigibilem

esse non semel observarunt, qualia sunt Aqua  
rorismarini, tinctura croci, &c.

§. 19. Nos quod attinet, tum *Debitas Visus*, *Nostri sen-*  
ut & ipsa *Cecitas* consistant ut plurimum in ob-  
structione tum majore, tum minore, & succo-  
rum circulantium crassitie, hinc convenire exis-  
timamus omnia deobstruentia tum interna;  
tum externa. Quandoquidem ergò sanguis cras-  
sius sit, vel primæ viæ sint viscidis humoribus  
repleta, tunc incidentia & acidum absorbentia  
exhibenda veniunt. Nec v. l. nec cucurbitulas  
admittimus, sed non negligenda sunt veticato-  
ria, setacea, fonticuli, &c.

His felici, ut speramus, cum successu per-  
actis, compellamus Pharmacian, & præprimis  
commendamus præter absorbentia varia sudori-  
fera ex salibus & mineralibus constantia, quæ ad  
nervos opticos penetrare & obstructions ibi-  
dem factas referare possunt. In curandâ cetè  
Visus imbecillitate miras habet vires Valeriana;  
hoc enim in casu vix simplex tale habetur inter  
vegetabilia. Inter sudorifera sunt salia volatilia  
quæcunque, imprimis commendamus sequen-  
tem spiritum volatilem deobstruentem, tan-  
quam elporitior remedium in omnibus capi-  
tis affectibus, præsertim verò in obstructioni-  
bus remedium palmarium.

*℞. Spir. C. C. essentif. cum  
Sale propr. inebriat.*

*℞. 3ij.*

*Spir. vini cum f. q. ol.*

*still. ver. junip. circulat. 3b.*

*M. add. Sal. volat. succin.*

*ver. successivè, donec stilus cesset, v. gr. 3j.*

*M. in vase accuratè clauso, repetatur per alemb.  
Dosis à gutt. 30. ad 50. in vehiculo quo-  
cumque.*

Conducunt etiam Antimoniata fixa, ut sequens  
innuit formula.

*℞. 3ij diaphoret. 3b.*

*Salis euphras. gr. x.*

*Aq. fenic. 3ij.*

*liq. C. C. succinat. gr. xxv.*

*Syr. fenic. 3b.*

*M. D.*

Item. Tinctura Antim. Croll.

Vel dectum lignorum cum herbis cepha-  
licis. Visum roborantia conveniunt omnia;  
cephalica, nervina, balsamica, ut sunt enaba-  
rina; pulv. spasm. Salia volatilia oleosa, quæ  
conjunctim spiritus, humores ac motum succo-  
rum respiciunt, imprimis hic convenit tum  
internè, tum externè Aqua Regin. Hungar. vel  
sacculus imponitur fronti seq.

*℞. rad. valerian. siv. 3b.*

*herb. euphras. mj.*

*sem. fenic. 3ij.*

*Danci C. 3ij.*

*M.*

In oculorum affectibus semper ad fontem  
respiciendum, an iste lateat in capite, vel hypo-  
chondris, vel mass. langu. scorbuticâ, acri, le-  
rosa, catarchosa, & eò cura dirigenda est, sem-  
perque cephalica & ophthalmica adjuvenda  
sunt. His nihil juvenibus, ad salivationem gio  
dulci excitandam subito deveniendum est, quia  
enim per nervos, glandulas, & vasa lymphati-  
ca penetrant, & obstructions in his latentes  
aperiunt. Sequens remedium pro visu corru-  
borando non inutiliter adhibebitur.

*℞. El.*

*℞. Electuar. Opic. Myri. 3ij.*

*Spir. cupras. 3ij.*

*M.*

Manē & vesperti magnitudo Nuc. jugland. capiat. Hic & theriac. conveniunt.

*Gutta  
serena.*

In Debilitate Visus, Gutta serena & Cæcitate (ubi plerumque nulla curationis spes est) præter jam dicta interna, & externa varia tentanda sunt, hinc omnia ferè, quæ superiore capite de Suffusione diximus, etiam hic conveniunt, præ aliis autem infusa Antimonialia, Aquæ ex sellibus aliisque amaris paratæ, axungia viperarum calide externè palpebris inuncta egregiè confert pro aciendo visu tam juvenum, quam senum. Acriuscula hic optima sunt ophthalmica, præsertim commendamus Aquam Ophthalmicam *VVedelii*, maxime polychrestam in Ophthalmicâ æquæ, ac unguculis & Visus debilitate, quæ est sequens:

*℞. gr. 1v. vel vj. Croci metallor. impuriors. & misce. cum 7 Chelidon. maj. infusa præv. a mortificatione aliquot guttas in oculum affellum, & externus quoque cum linteamine impone.*

Alia superius jam ad nauseam usque revelavimus, quare ne cramben his coctam offeramus, nunc manum de tabulâ removebimus, quia in his affectibus ferè oleum & opera perditur. Gutta serena solis jejunii sublata dicitur apud Riverium: quiete enim & abstinentia plures curantur morbi. Trencina Lugdunenſis per 9. annos Gutta serena laborans; omnibus adhibitis remediis convenientibus tam internis quam externis non curari potuit, quàm ope setacei, quò ter quaterve ab illo malo restituta fuit, quamprimum ulcus ad aliquod tempus fuerit clausum quasi in momento hoc morbo tutus correpta fuit.

*Humor  
amissionis.*

Paucis verò adhuc videbimus, quomodo *Humores* oculorum reparari debeant. De Aqueo certum, & autopsia Anatomicâ, teste D. Nuck. confirmatum est, ab ipsâ Naturâ per proprium ductum cum restitutum, si modo caveatur, ne per vulnus elabatur, (de Vitreo verò & Crystallino non idem sentio:) hinc varia adstringentia oculo imponenda, ne effluat id, quod Motus restituit. *Hærias* iucco vesicularum ultimi tempore vernali reperibilis humorem oculi tum Aqueum, tum Vitreum, æquè in gallinis ac puella quadam se restituisse potavit, cum tamen ipsa forsân Naturâ fecerit, quod ipse hoc iucco se fecisse putavit, quod & *Burrhus* Amstelodami cum aqua sua mirabili destillatâ per MB. ex foliis Chelidoniz, addito tantillo camphoræ effecit sibi planè persuasit, sed impostura est.

Alii in eum finem commendant sel humanum alioque liquores ex animalium oculis depromptos, & *Crollius* huic ului destinatam habet Aquam Chelidon. compositam. *Eisnerus* laudat liquorem ex oculis maſcati Urogalli erutum, ut instilletur oculo sæpissime. Nec possum persuaderi (ablit invidia dicto) quod *Kerkringius* spicileg. Anat. Obs. 100. p. 198. novit artificium quo oculus crystallino cæterisque spoliatus visum recuperare poterit, cum humores hi nimis inspissati sint, ut impossibile sit, quod per vultus elabi possint, dubito etiam, quod aliis satis faciet, ego enim incallum tentavi. *Sala in sept. Planet. terr. pag. 1.* describit sequens medicamentum, quod comprobatum dicit ad oculorum humores quoscunque restituendos.

*℞. Cupri flav. bractear. 3ij.*

*Vini Malvar. sequilib.*

*Circulatur ad solem vitro bene clauso, donec liquor viridis & transparens instar smaragdi fiat.*

Varias curas, ut ille ait, feliciter exactas vidit, unam palam fecit de juvene Nurnbergenſi quodam, & Concionatoris uxore, quos liquoris hujus adjuvamento adjuvatos fuisse statuit.

Alii ex aluminibus ovorum conqussatis, vel destillatis, vel ex humoribus oculi bubulialiorumque animalium ejusmodi humores restitui posse sibi persuadent. Optime verò mecum existimat *VVedelius*, Vir certe multum de republ. Medicâ meritis, in *Amæm. Medic. cap. 1.* de Ophthalmicis sic agens: An verò Crystallinus exentus restitui possit, & sic *Cæcitas*, vel saltem conformatio oculi incongrua curati, dubium est maximum, nam de humoris Aquei regeneratione res clara est. In lachrye consimili B. Rolfinccius aquam Calcatrippæ unice adhibebat. Sufficiat, nulla aliâ ratione restitutionem fieri posse, quàm principaliter quidemâ Naturâ, vulgò ita dicta, eam superius jam diximus, adjuncta medicamentis traumaticis, oculi spiritibus amicis & specificis, prohibita inflammatione & suppuratione, hinc aqua Chelidoniz vel consimilis ob vini aquosam resolvit & roborat, ob vinum nitrosam terream absorbet, discutit, & optima est inter omnes ophthalmicas.

Qui plura desiderat curiosos, vid. *Act. Med. & Phil. Haffn. p. 1. Obs. 69. 132. 133. Ephem. Gall. Tom. 5. Eph. 3. & Germ. Ann. 1. Obs. 2 & 17. a N. Eisnero* notat. item *Celeb. VVedelii* superius allegat. *Amæm. Kerkring. Spicileg. Anat. Obs. 10. Sachsii Gammarolog. &c.*

## CAPUT XIV.

*De aurium Morbis, dolore scil. inflammatione, ulcere, vermibus, Rebus externis auribus immisſis, Carunculâ aurem obstruente, & Parotide.*

### §. I.

**E**Xam inato Organo nobilissimo Visus, nunc ordo nos ducit ad organum Auditus, multis certè obscuritatibus obseptum, partes enim, ex quibus constât aures, non tantum parvæ & tenerissimæ sunt, sed & structura partium maxime intricata est, quo ergo structura

obscurior, eo & affectus, qui organo hui accidunt, obscuriores esse debent. Omnem verò impendamus operam, ut illos clarè ac distinctè ordine proponamus, & primò examinabimus morbos partes externas occupantes. Maxime verò frequens est partibus auris externis Dolor *Aurium* *dolor.*



ab humoribus acrioribus obortus. Hic dolor saepe cum inflammatione, saepe absque illâ oboriri solet, quæ *inflammatio* meatum auditorium occupat, & saepe est cum Abscessu & Ulcere, quæ communiter sequuntur. Inflammatio enim vulneribus & contusionibus hujus partis accidit, & nonnunquam etiam aliquas febres consequitur.

*Ulcera* uti in aliis partibus, sic quoque in Auribus vel per rupturam, vel abscessum, vel per acrimoniam liquoris alicujus generantur. Hoc tamen vel verum est vel apparens.

Verum dicitur, quando inflammationem abscessus sequitur vel quando ab acribus succis in tubulis nonnullis aurium stagnantibus meatus interius exulceratur. Apparens dicitur ulcerus, quando pus ex auribus effluit varium, ceti id instantibus contingere solet, modò cum modo sine earundem præcedente dolore & talis effluxus interdum diu durat, quo verò cessante varia capitis accidentia supervenire solent, quæ rursus continuante fluxu levia sunt & saepe cum fluore cessant.

Fit saepe, ut ex auribus *Vermes* variaz magnitudinis & formæ prodeant, de quibus testantur *Ephem. Germ.*

Sic quoque *Extranea* intruduntur in meatum, velut pisa, globi, nuclei, quæ saepe difficilimè extrahi possunt, & aliquando germinant & intumescunt. exempla vide apud *Fabric. Hild. & Schenk.* quale quid nuper in filia observavi, cujus à forore ex improvviso pusum auri sinistrae injectum fuit incisui parentibus, hinc tandem geminare incepit, & à Chirurgò maximo cum auri periculo eximebatur.

*Excrecentia* etiam *carnea* & *sanguosa*, quæ nonnunquam ex ulcere hujus partis oriuntur, vel ex locis pelle nudatis, dum auri pungitur instrumento nimis aspero, meatum auditorium implere & obstruere possunt.

*Parotis* significat omnem abscessum & tumorem glandularum penes aures occupantem. *Hippocrates* eos nominat tumores œdematosos & scitirrhosos citra inflammationem, glandulas sub auribus occupantes: Germanis dicuntur *die Ohrendrûsen / oder Geschwulst hinter den Ohren.*

*Parte infesta* §. 2. *Partem affictam* dicimus totam aurem cum adjunctis membranarum, arteriis, venis, nervis, glandulis multis, ossiculis, cavitatibus, aliisque, quæ abunde est instructa.

In *Parotide* afficiuntur Glandulæ *Parotidis* dictæ, quæ sunt corpora post & sub auribus sita, tum seri & sanguinis depurationi & circulationi, tum imprimis partim vi structuræ suæ, partim verò salivæ humoris productioni & elaborationi, ejusque in vasa salivæ distributioni inservientia: & ex glandulis his aliæ sunt conglomeratæ, aliæ conglomeratæ, quæ sicut aliæ glandulæ parenchymata sunt spermatica ex innumeris fere glandulis minoribus & vasis capillaribus, ut & nervuli, conglomerata. Vidimus enim ex quacunque conglomerata parotide glandula peculiarem furculum obortum, qui postmodum in unum coalescentes corpus, dum salivalem constituunt. Conglomerata autem collectioni magis quam distributioni videntur apta.

*Diagnos* §. 3. *Dolor* auri ex ipsius relatione ægri Medico innotescit, saepe admodum intolerabilis est, ut ægri per totas noctes vigilare cogantur, imò

non raro delirium, convulsiones, lethargia, &c. producantur, aliquando per menses & ultra durat hic affectus, & ut plurimum hunc dolorem puris excrecio ex aure comitari solet. Sic & *Inflammatio* auri ex ipso dolore seu ardore & tumentia.

Inflammationem faciliè sequitur *Ulcus* & abscessus, ruptis sc. vasis, quæ semper dolorem habent comitem, & cognoscuntur ex eo, quod magna materiz quantitas inde profluat, ac difficulter admodum sanantur, imprimis ea, quæ sunt in meatu osseo.

Contingit interdum, ut ex diuturnis aurium *Vermium*, ulceribus cum pure *Vermes* variaz magnitudinis & formæ prodeant, prout ego nuper egressum vidi vermem ex aure longitudine digiti, capite instar serpentis præditum.

Solent etiam infantes pondè aures multum humoris ejicere, quæ evacuatio ipsis valde prolicua est, unde etiam magna cura eò agi debet, ut fluxus iste impediatur, per abforbentia & volatilia acres humores corrigentia, alioquin enita infantes in motus convulsivos & epilepticos inciderent. Sic quoque sanguis aliquando ex auribus prodit, quin *Res extranea*, quæ in aures *Ratum* eximuntur, & ex relatione & dein ex inspectione innotescent, semper autem bene observandum, an corpora ista in meatu cartilagineo, an verò in meatu osseo detineantur.

*Carcinoma* & *Excrecentia* carnea seu fungosa ipso visu dignosci possunt.

*Parotidum* signa diagnostica duplicia sunt, imminetium videlicet, & actû jam existentium. Si in malignis febribus adit faciei rubor, capitis gravitas, surditas cum stupore, locus crissos per abscessum erit post aures, & prædici possunt *Parotides*. Præteritis verò *Parotidum* tumoris adducere signa, non necesse existimamus, siquidem omnis tumor per se manifestus est, & oculos nostros incurrit, adest enim tumor, dolor, rubor. Tumor fit à stagnantium & glandularum distendentium humorum colluvie. Post febres, in peste, lue &c. imò in lethargo & aliis capitis affectibus oboriri solent.

§. 4. In eruenda *Causa* *Doloris* ascribunt *Galenico* eandem *Galenici* tum parti patienti acri nimis tum judicio sensu prædixit, quæ de re intimioribus auris partibus dolor accidat vehementissimus, exterioribus verò & patentibus, ob sensum non ita acutum, minus etiam vehementis dolor obveniat; tum parti agentis, cujus respectu causarum classi associari possit, quicquid live obscure, live manifestè unitatem, solvendi vim habeat, ac naturalem aurium constitutionem corrumpendi, ut sunt tela, ictus, insolens ac magnus calor, frigoris, ventorum, pluviarum, &c. appulsus, status dissendentes, humores superflui tumorem, pondus, extensionem, & quandoque inflammationem inducentes, aut acrimoniam suam rodentes, nec non sanies, fordes, vermes, externa illapsa, ut lapilli, ossicula, grana, pulveres, medicamenta incongrua, sonitus & strepitus vehemens & hostilibus, comitem, explosio tormenti bellici & similia tristem auri sensum inferentia, & continui solutionem minuantia.

*Inflammationis* causam constituunt sanguinem *Inflammationis* biliosum & tunc, è vasis suis vel apertis, vel ruptis

vel ruptis aut exiis in ipsas aures membranas effusum, & copia sua tumorem, tensione vero dolorem & calorem excitantem.

*Vulva.* Viceris causa illis est res quæcunque erodendi vim habens, sive sint humores acres interni, & fordes ex abcessu rupto effusæ, sive externæ quædam auti illata, ut medicamento vel venena corrosiva, aliæque continuum in aure solventia & saniem producentia.

*Vermium.* Vermium originem deducere volunt ex putredine humorum & calore loci, dum vel fordes, vel sanies, aut pus ætenuum putredinem suscipiat, vel ex ulcere neglecto & non satis mundato multa egrediantur impuritates, æ quibus putrescentibus tandem ipsi generentur vermes.

*Res externæ.* Res externæ varias in causis doloris jam notatas, vel ex ipsius ægri imprudenti pecculantia, vel alio quodam infortunio auribus illabi, intrudi aut violentè impelli posse existimant.

*Carcinoma.* Carcinoma autem obstruens causam adscribunt vulneribus vel ulceribus antegressis, huiusmodi excrecentiam ob nutritionem copiosius affluens in meatu illo relinquentibus.

*Parotidis.* Parotidis causam proximum constitunt humorem calidum & præ aliis sanguinem, cum quo uplurimum alter ex tribus reliquis humoribus junctus sit, præsertim autem pituita nonnunquam humor biliosus, aut melancholicus, ut ita tumor ille non semper inflammatio, sed quandoque etiam œdema aut erysipelas, aut scirrhus nominari debeat. Causas minus proximas statuunt vel humoris illius paulatim collectionem, vel subitam & momentaneam receptionem. Collectionem viscosi istius humoris in glandulis hinc fieri dicunt ob partium laxitatem, facultatis concoctricis & expleticis imbecillitatem, excrementorum crassiciem & meatuum angustiam. Subitam receptionem contingere aiunt tum propter calorem immodicum, tum dolorem à vicinis partibus humores attrahentem, tum potissimum quod vicinæ partes humoribus turgida easdem ad glandulas, natura aliis partibus debiliores transmittant, ut in febris malignis per crisin ab omnibus partibus fieri volunt, partienlatum vero in phrenitide & lethargicis affectionibus a cerebro, item in ulceribus oris & dentium doloribus, quibus pravi stercis à capite copiose alliciuntur, & quandoque ad glandulas istas propelluntur, nec non à frigore exteriori recundantes in cerebro pituitolos humores ad ipsas illas glandulas exprimentes.

*Paracelsus.* Paracelsus cum his affectis Doloris Aurium causam constituit spiritus salium resolutos à sulphure benigno, cuius mixtura aliis acrimonia & corrosivitas salium inhibeat & contemperetur, & qua defuncti sales descendunt ad Aures, & dolores excitant. Duplici autem casu hanc separationem contingere aiunt, vel enim ab accidente, dum materia aluminosa descendit, vel à loco, à proprio ingenito paroxysmo cum signis chronicis, distinctu aurium & apostematibus, in auribus ideo existentibus vehementioribus, quod consuetum cum salibus potentioribus repetant, ipsumque cerumen aurium sal sit amarum magnæ potentie, licet reliqua duo mercurium & sulphur in se contineat, unde phlegma

sen mucus ad aures decideis in iis dolorem faciat, mucum vero ex malâ digestionem membri cuiusque propria volunt provenire.

*Inflammationem.* Inflammationem etiam in hac parte ab obstructione spiritus Vleidi generari dicunt, quem spiritum omnia corporis membra transire & eadem infotmare fingunt, & si exitum ob cerumen obstruens non inveniatur, in se ipso abire in putrefactionem, qua diversa, quæ in se continet, resolvuntur salia, & hinc exurgens sal oportinum reliquis potentius & vinculis solutum in parte hac corporis calidum hunc producere affectum.

*Vicium.* Vicium progeniem eidem imputant salium resolutorum & corruptorum acrimoniam & corrosivitatē, propter malam digestionem partis, & hinc ortam mucum copiam, à quo magna sit cum salibus potentioribus confluentia, sal autem durum per se coagulatur, & facit apostema usque ad tempus ruptionis, quod remanet, partem exedit, corrodit & ex mucoso stercore ipsius auris pus & saniem projicit.

*Vermium.* Vermium generationem affirmant esse putrefactionem cæcā, ideoque nec amaritudinem aurium ceruminis obstrare posse, quin in iisdem procreantur vermes, eo quod putredo in iis sale natura debilitato & aures desereat, contingere possit, ex qua ipsa putrefactione in loco rei propriè resolutæ vermes enascuntur, quarum generatio inaximè fit lunaris, canique fieri ex immo calore, oppilatione vero ætrem auribus adimente magnopere adjuvari.

*Res extraneas.* Res extraneas vel propria petulantia, vel alterius malitia auribus intrudi, earundemque aliquas peculiari sua dispositione, humore & calore loci, atque insuetudine cæcā germinare posse, non minus quam ceteri existimant.

*Carcinoma & Excrecentia.* Carcinoma autem obstruens ex superfluo quodam, Ulceribus ex tribus primis à sale corruptivo resolutis & denudè viosis conglutinationis aut coagulatis superfluis existunt.

*Parotidum.* Parotidum causam dicunt esse ens veneni, & quamlibet putredinem ens tale venenari existere loco isti, in quo generatur, cum bonum in parte corruptum & destitutum, hac autem in parte venenum illud esse arsenicale, ut in peste, quam sæpe Parotis comitemur, quod sub Aurē existat enunctorium pro exprimendo sudore stercorali, unde & quidam huius sectæ morbum hunc à spiritibus arsenicalibus produci & astrales esse statuunt, Martique & stellis Martialis, ut scorpionis & cancro subijci, ajuntque, astris celestibus fructum suorum resolutionem in terram demittentibus, alimentum spirituum signaturis malignis eorundem inquinari, quo in corpus affluunt morbi consentanei & symptomatum vehementia generantur infantes.

*Aliam.* Aliam huiusmodi Aurium morborum speciem addit Paracelsus, eamque Fugile vel fugio-Fugiles alium apostema nominat, quod indicium primum Noli me tangere, & ex ferrugine Martis prodici statuit, usque potissimum accidere, qui nondum adolevere, videlicet infra quartum & vigesimum annum existentibus, aliis autem si contingat ætatem istam prætereuntibus, eos Noli me tangere expectaturos prædicat. Fiunt autem ad auriculas bullæ cum inflammatione.

flatione in eorum circumferentia, & tertia post die rubescunt, calor & dolor capitis partim unâ cum squinantiâ concurrunt. Liquor materialis quivis apparet, antequam locum fixum ponat, postea quicquid oritur in sui sanguinis principio, transit in pravam leniginem.

*Helmontii opinio de causa Aurium Doloris.*  
§. 5. *Helmontius* ordine nunc succedens, *Doloris* Aurium originem adscribit peregrino cui-dam, sive ab aëre, sive a cruore iunulto, & in Auribus nidulatur o, à quo animâ ad indignationem simul & metum disposita, spiritum instum ad hospitis illius ingrati ejectionem admonet, eoque operi isti se accingente, auris statim sui crispatione aversionem ab hospite suo subinnuit, sicque manifestus redditur dolor.

*Inflammationis.*  
*Inflammationis* causam proximam constituit spiritus infiti incalefcentiam, dum causam occasionalem instat spinâ Auri in fixam expellere nitatur, quo in nisu spiritus, sive Archeus, se ipsum accendat, & cruor simul collectus copiosius accurrat, sicque tumor, pulsus durus, dolor & calor subsequantur.

*Ulcera.*  
*Ulcera* ex cruore in Aure corrupto progengeri docet, dum in se acefat, & acor exinde exurgens partem hanc corrodat, ejusque alimentum in simile virus convertat, ex quo sanies tanquam productum facile promanet.

*Vermium.*  
*Vermes* in Auribus ex putredine pronasci, cum aliis quibusdam statuit, quamvis eosdem acerrimè exagitet, in eo tamen differre se probat, quod à defectu balsami naturalis, putredinem alias longè à se arcens, vermium horum proventum facilitari proficitur.

*Res externæ servatum.*  
*Res externæ* eodem modo, ut præcedentes jam aperuerunt Auribus inferi contestatur.

*Excrecentiarum.*  
*Excrecentias carnosas* ex nutrimento, sive cruore, alenda interiori Auris parti destinato copiosiori, ab Archeo in superfluum hoc fabricari productum æstimat.

*Parotidum.*  
*Parotidas* generari credit ex laticis erroribus, dum in via salia quædam resoluta imbibit, eaque secum ad glandulas illas Aurium deferret, quæ pungendo Archeum ad eorum expulsionem sulcat, at hic ob materię multitudinem & tenacitatem eam præstare non valens, partem hanc Aurium iracundus distendit in tumorem satis sæpe dolorosum.

*Willisii opinio de causa Aurium Doloris.*  
§. 6. Sequitur *Willisius*, causam Aurium *Doloris* imputans materię morbificæ sulphuræ, acidæ, salinæ, biliosæ aut melancholicæ, copia vel acrimoniâ sua fibras nervosas, membranolas & musculosas aurium distendenti, divellenti vel irritanti, sive illa sit sanguis, sive serum ejus, sive succus nutritivus, sive liquor nervosus, vel alia quædam materia peregrina, quorum vel unus pondere gravet, aut motu vehementiore extendat, vel plures consuli aut congressi effervescentiâ suâ mutua partes fibrosas in auribus divellant, spasmosque dolorificos in iisdem excitent, quibus multum etiam contribuere censet ipsam partium aurem constituentium, malam conformationem aut debilitatem, variaque Dixerat, adeoque & aëris vitia, materiam istam dolorificam facile ad actum provocantia.

*Inflammationis.*  
*Inflammationem* quoque aurium à sanguine extravasato in meatum auditorium vel post tympanum, vel alium quendam locum receptioni aptum affuso, ibidemque lentore suo obstructionem & turgescientiam inflammatoriam in-

duente provenire, sibi maxime habet persuasum.

*Ulcera à sanguinis & succi per vasa quibusdam Ulcerum.*  
*Ulcera* à sanguinis & succi per vasa quibusdam recrementis in Auribus collectis, & diutius ibidem retentis produci censet, dum morâ suâ continuatâ abscessum causet, eoque rupto multas particulas acres erodentes relinquant, Aurium partes corruptantes, depalescentes & saniem projicientes.

*Vermium in Auribus proventum accenset san-*  
*Vermium.*  
guini & succo nutritio in Ulceribus corruptis, à quibus partium aurium compages resolvatur, spiritus cum sale & sulphure confundantur, & cum reliquis inordinatè effervescent, quæ dein fermentescentia particulæ sulphuræ & salinæ acquirant fluorem, & evaporare incipiunt, unde ipsa sequatur putredo, & ex illa, principiis acti-vis confertim erumpentibus, seque mutuo præhendentibus, in ulceris superficie denuò combinatis ipsi producantur vermes, quorum tamen alii diversarum specierum, etiam inter

*Res externæ servatum.*  
*Res externæ* Auribus à foris illabentes ab ipso annuuntur, quantumque ingressi aut intrusioni eosdem relinquiendi modos, quos reliqui Auctores iisdem adducunt.

*Excrecentias carnosas aut fungosas post ul-*  
*Excrecentias.*  
cera idèò generari credit, quod ex corruptione & confusione succorum particulæ salinæ fluorem adeptæ aliena corpulcula mox sibi affocient, & mediante liquore nerveo simul ibidem stagnante, & concretionem moliente, pro diveritate particularum illarum terrestrium diversimodas ineant concretiones.

*Parotidum.*  
*Parotidum* originem duobus illis succis potissimum adscribit, sanguini videlicet extra arteriolas ad glandulas Aurium effuso, & circa illas sensim congesto formamque sanguinis amittenti, & deinde succo nervolo ibidem congesto & stagnanti, à quibus duobus in communi tanquam foco congestis, excitetur tumor, dolor, & particulis salis & sulphuris exaltatis inflammationi, quin diuturniore quâdam concoctione ex confusa illa massa conficiatur pus, quandoquidem tumor hic ex succis collectis sit minus torridus in parte frigidiore, adeoque satis idoneus suppuracioni.

§. 6. Anglicum hunc Authorem nobilissimum excipit decus illud quondam Leydensium *Sylvii* de causa Aurium Doloris.  
*Sylvii* de causa Aurium Doloris.  
Academici splendidissimum, Franc. de le Boë *Sylvii*, cujus iudicium de causâ Aurium *Doloris* eo se extendit, ut sub ea comprehendat objectum quodvis sensibile tum intra corpus existens, tum forissecus ipsi adveniens, & sensorium hoc auditus moleste afficiens ac lædens. adeo ut & ipsum sonum fortioiorem huic includat seriei, à quo non minus aliis sensorium hocce lædi, atque ex ejusdem perceptione molestia dolor produci soleat.

*Inflammationis.*  
Ex sanguine aut alio humore noxio, vel in inflammationis adhuc recente & subsistente, vel extra illa post casum vel ictum in Aurium cavitatem, sub tympanum aut ad glandulas effuso & ibidem stagnante *Inflammationem* suscitari putat, dum partibus spirituosiss & volatilibus acidis salinæque temperate solitis evanescentibus, posteriores hæc actiores factæ in se mutuo accius insurgant, obque partes sanguinis oleosas calidam excitent effervescentiam, & sanguinem ipsum tandem ita corrumpant, ut in purulentam materiam convertatur.

A pure

Vuln.

A pure autem hoc magis corrupto, & in sanguinem acrem converso, facile *Ulcus* Aurium produci posse docet, dum acrimonia ista partes molles erodantur, quin etiam ulcera per se ab aliis humoribus ad Aures effusis, atque acidam quandam acrimoniam in se continentibus, ortum aliquando ducere iidem testantur.

Vermium.

*Vermium* productioni etiam in auribus occasionem præbere existimat sanguinem & humores, cum primis pituitosos, corruptos & putrescentes, ut in icticibus putridis quandoque contingere solet.

Rerum extranearum.

*Res extraneæ* varias varios habere scit Aures ingrediendi modos, inanimatas enim potissimum casu illabi, aut petulantia vel vi & malitia intrudi, animatas vero, ut vermiculos, pulices, culices, & aliaque animalcula iidem irrepere, & nonnunquam periculosa excitare molestia.

Excrecentiarum.

*Excrecentia* carnosæ secundum hujus Auditoris principia sanguine nutriente copiosius ad musculosas Aurium partes affluente, earundemque magnitudinem augente producuntur.

Parotidis.

Sanguinem aliosque humores, maxime pituitosos, à variis causis solutos & fluidiores redditos ipsa *Parotidis* efflere hoc modo demonstrat, quatenus nempe abundantius hinc inde delati, tandem ad glandulas aurium conglobatas appulsi, à frigore externo superveniente in iisdem coagulentur, sive ad motum inepti hæreant vel in vas, vel in canalibus intermedii, & sanguinem siliant, quo minus per vias impeditas transire queat, sed per glandularum istarum parotidum subtilitatem diffusus, eandem in molem majorem, adeoque tumorem hujusmodi dolorosum distendat.

Corrosionum opinio de causa Aurium Doloris.

§. 10. *Corrosionem*, quos ordo tunetangit, *Otagia*, seu *Doloris* Aurium causas adscribunt nimis exagitationi fibrillarum tympani, sive aurium membranae, aut musculorum earundem, ut etiam fibrulae istae vel ruptio periculum, vel ipsam incuranturruptionem, indeque in mente tristis oritur lentatio, & hanc subsequens spirituum nihil in nervos influxus, exagitationem vero illam violentam fibrarum interdum provocat à vehementi & impetuosa materia æthere influxu, fibrulas illas fortiter & moleste concutiente, vel à particulis acerbis acutis pungentibus & vellicantibus in ulcere & inflammatione lapsus progeneratis, vel à vermibus mordentibus exterius auribus irrepentibus, vel quocumque alio acutibus illapso & fibrulas illas nimium distendente.

Inflammationis.

*Inflammationem* Aurium à sanguine aliisque humoribus arteriosis è vas suis catodicalibus in poros partium Auris, sive internæ, sive externæ, effusis exoriri statuit, à quibus pori partium istarum ita obstruantur, & adeo exigua relinquuntur spatia, ut non nisi materie primi elementi subtilissima per ea concedatur transitus, hanc vero, cum ignita sit natura, & fulminis instar celestem moveatur, non modo parti inflammatione imprimere ruborem, sed cum impetu etiam in poros illi irruentem fibrillas lacinando prædictum foveare dolorem.

Vuln.

Quin ab eodem illo impetu vehementi in fibrillas partium Aures constituentium, & inflammatione jam occupatarum, *Ulcus* tandem efformari docent, quatenus ex continua illa pulsa-

tione fibrulae rumpantur, à reliquis separentur, & cum humoribus ibidem stagnantibus commisceantur, ut confusum illud quasi chaos omnis generis particularum etiam in hisce partibus aurium collectum, quandam sibi efformet cavitatem, in qua mixtura hæc per tempus reservatur, & pus appellatur.

Vermium in cavitatem aurium ingressum ut plurimum ab exta contingere putant, qui

*Vermium* in cavitatem aurium ingressum ut plurimum ab exta contingere putant, qui varii generis existere queant, & partibus aurium ipsique sensui multum procere molestia, ulceribus vero aliquando superficialibus ex oculis quibusdam Auribus illatis, & à calore illo focu ovulorum & animalculorum ex istis exelusioni maxime tum accommodato proveniunt, cum aliis nonnullis nobisque existimant.

*Rebus externis* in auribus existentibus eundem cum reliquis adscribunt introitum, cu specus, & paulo post pauca adhuc sumus addidit.

*Excrecentias* quasdam carnosas aut linguas idem nonnunquam ulceribus suis cistui credunt, quod e. est mixtura purulenta & cavitatem inundata materia quadam chylosa nutritia tubsequatur, quæ fibrulis à priori miscela corruptiva de pristina firmitate in laxiorem vertis facile adhaereat, easdem extendat, & nova figura variè conglutinet, ut relictis inde poris lateribus copiosius influere, & tandem flammibus agglutinari solet, unde canosum aut linguosum illud proveniat augmentum.

*Parotidem* fieri dicunt à maiori excrementorum copia per arteriolas ad glandulas illas aut conglobatas delatâ, quæ cum multas in e continet particulas heterogeneas, ab acido quodam præternaturali & quandoque maligno præcipitatas, easdem per vasa lymphatica non satis commode iterum deponere valent, sed in se retinere coguntur, quare extenduntur & mole sua augentur cum dolore, quod fibræ nervosæ & musculosæ subjacentes summi premantur & torqueantur, spatiosa verò acia à suis materie primi elementi accommodentur furiosius postmodum irruenti, multasque particulas acutas ignitas secum ferenti, inflammationem sublequantur ansum facile præbituras.

§. 11. Ex *Nostre* sententia *Doloris* Aurium causa statuitur, uti aliarum partium, continuo & citato illo ætheris impetu, poris ac fibrillis magna illata violentia, quæ etiam tensa & insuper ab incongruis corpusculis in poris hærentibus vellicantur, ac spasmodicè irritantur, ita ut quodammodo à vicinis, quibus junctæ sunt, separentur, motum proinde illarum tremulum valde augeri necesse est, unde ab instanti illius motus productione Mens spiritibus & corpori unita, à nervorum incolis nervos & fibrillas membranosas inflatas tenuentibus, mediante illorum modulatione seu regurgitatione nunc maiore, nunc minore, doloris concipit ideam, accurrunt hinc statim ex cerebro spiritus suppætas lateri reliquis, ad canales suos affectos molestia illa liberaudos, insauso tamen succellu, magis enim tunc adiguntur & impingunt acutas illas & spiculas particularum in poris obstructis hærentium eminentias, unde Mens soluta hujus uniatas à spiritibus certior facta, dolet male affectam Aurem suam dolore saepe intolerabili.

P

Dolor



Dolor hic concham utplurimum occupat, & provenit idem, ceu diximus, à solutione continuitatis particularum, quæ solutio motum conecat in spiritibus irregularem. Hoc supposito facile colligitur, omne id, quod solutionem continuitatis efficere potest in particulis membranæ, quibus meatus auditorius intus velatus est, & motum irregularem producere, illud etiam esse sufficiens producendi doloris, ita inflammatio, corpora externa in meatum immixta, pus, cerumen, vermes & omnia ea, quæ abundant salibus acris & lixiviosis; sic & quæcunque obstructions his partibus vel à frigore, vel aliâ causâ inducæ dolorem efficiunt, lucernam salis, qui in motu sunt ut percoleantur, detenti in glandulis illas inflant & tumefaciunt, qui & per hanc moram aciores fiunt, extremitatesque nervorum, qui in membranam meatus sparsi sunt, vellicant, quod à *traſſa* spirituum, & per consequens magnum istum auris dolorem producit; fit enim sepe, ut sermone acce & salsum, quod per glandulas auris evacuetur, dolorem in meatu efficiat, id quod patet in suppuracionibus, quæ in ea parte fiunt. Causam in genere deducimus à succis acrioribus, tubulos membranarum aurium modo comprimentibus, vel extendentibus, modo rodentibus, modo vellicantibus vel à catarrhis &c.

Quod doloris differentias attinet, si particularæ ceruminis vel aliorum liquorum in glandulis contentorum salis & rigide sunt, & per agitationem solito maiorem violenter impingunt filamenta nervosa hujus meatus, tum dolorem excitant pungentem, & hoc fit in omnibus inflammationibus. Quando verò salia admodum acra sunt & corrosiva, doloris causâ fiunt, qui junctus est erosioni, quæ imprimis in ulceribus hujus partis observari potest. Quando autem materia ceruminis in glandulis adhuc contenta, vel sola, vel cum aliis liquoribus fermentationem patitur, tunc extendit & dilatat particulas membranæ, & sensum tensionis excitat. Cum verò glandulæ inflantur per copiam liquorum, quos umbilicant, sentiri incipit gravitas.

Quod dolor hic adeo vehementis, & sepe cum febre acutâ conjunctus est, cui accedunt insomnia, deliria, convulsiones ac deliquia animi, tanquam symptomata sæpè lethalia, evenit ex eo, quod membrana, quæ meatus auditorius velatus est, tenerrima est & nervosa & eandem texturam habet, quam habet membrana nervosa stomachi & intestinorum, nisi quod non est testâ pari tegumento contra humorum acrimoniam cum tegendo. Sparsa est & hæc membrana infinitis nervorum filamentis, quæ à quinto pari recipit, & dici vere potest, nullam esse in toto corpore humano membranam, quæ pro magnitudine sua plures, quam hæc; nervos habeat, certum enim est, membranas super ossa adglutinas habere sensum cæteris acutiorem, quia firmiores & magis tensæ sunt, & plures fibrillas habent.

Nunc paucis enucleationem horum symptomatum ex prædictis principiis dabimus, & febrem deducimus ex perturbata sanguinis mixtione, per *traſſa* spirituum, & sanguinem turbari posse ex lib. de febrib. à nobis comprobatum est, cum enim spiritus animales maximâ vehementia undiq; & per totum corpus secundum lineam

rectam protant, hinc particulae multæ sanguinis, quæ motui illi veloci & vehementi obsequi non possunt, secedere coguntur, & turbationem ipsius mixturæ causantur. Sic quoque succi acres & corrosivi ceruminis, & serositates in aure collectæ in massam sanguinis facile immisceri possunt & turbationem excitare, in quâ consistit febris essentia, in catarrhis enim vix aliunde incendi febrem existimamus, quam à mixturâ succorum acrim, qui à massâ catarrhum nutriende separati cum sanguine conjunguntur, & turbationem ejus inducunt. Vigiliis unde, nisi ab *traſſa* spirituum animalium extraordinariâ deducemus? Spiritus enim à doloris violentiâ irritati in omnes partes impetuose influunt, sed & ab insomniis vigiliis delirium facile hoc in affectu oboriri debet, quoniam spiritus motum omnino irregularem habentes varia cerebri vestigia permeant, id quod idearum confusionem efficit, quas idem spiritus primo animæ repræsentant; sic & convulsionem ad hanc hypothesin facile explicari possunt: quando enim crispatur à motu spirituum irregulari productæ sunt, sufficit succos salios nervos, qui in membranam meatus auditorii sunt, vellicare, ut irritatio hæc per communicationem nervorum & membranarum omnibus spiritibus communicetur, atque ita in musculis convulsionem producantur.

Accidit sæpe ut *Inflammatio* meatum auditorium duobus modis invadat, quorum primus *Inflam.* est obstructio glandularum, à quâ cum comprimuntur, humor in iis detinetur & eadem disrumpit, & sic quæ data potius ruit: alter est acrimonia ceruminis, quæ etiam suis spiculis rimas facere, vasa dilacerare, & sanguinem ex iis elicere, potis est, hinc obstructio redditur major & dolor.

Sic quoque *Ulcera* ea hic eodem modo, quo in cæteris corporis partibus, vel rupturam abscessus, vel per acrimoniam liquoris alicujus, lymphæ puta acrioris meatum ulterius exulcerantis, oboriri possunt. Materiam, quæ in pus abit, non tantum sanguis suppeditat, sed & glandulæ irritatæ à pure, magnam ferri quantitatem à canalibus suis excretoriis emittunt, hinc acris & salis illa lymphæ reunionem partium & cicatricem impedit, ea propter difficulter sanantur ejusmodi ulcera glandularum.

Quomodo verò *Vermes* in Auribus generentur, variz sunt sententiz, nos existimamus illos generari in his partibus ex ovis minutissimis mediante sanguine vel succo nutritio eo delatis, & accedente calore exclusis.

*Excreſcentia* carnosæ & fungosæ utplurimum exoriri solent à nutrimento, ibidem nimia copia collecto, quia membrana auris ab externâ causâ violentius distenta dilaturatur aut laceratur, vel si à causâ interna, levi tamen erodantur loca membranosa, fit enim exinde, ut fibris se invicem separatissimisque dilatatis & ampliatis; alimentum partis uberius recipiant, retineantur, & extorsum versus talem tumorem generet.

Sic & fungosæ excreſcentiæ eodem modo ex dilatazione aut laceratione membranarum, vel casu inductis læsionibus excreſcit, talisque tumor mollis sensum incrementum acquirit, & accrescit sæpè in substantiam carneam, & si humor nutritivus diu retentus & collectus occultam accrescentiam acquirit, hinc sæpè fungi fiunt cancroſi.

Sic

Aurium ex-  
ternum.

Sic quoque Corpora extranea in meatum auditorium saepe ex improviso, saepe studio ab aliis auribus injiciuntur, ut sunt pila, globi, nucleae, vespa (Ohr-Jaus), & si haec & alia in profundum meatūs intra sunt, difficilissime extrahi possunt, clauduntur enim tunc meatu osseo, qui valde obliquus est, & versus membranam tympani declivis, quin & detinentur ibidem a cerumine viscoso, quod ibi colligitur.

Parotidum  
tumorem.

Causam tumoris Parotidum immediata dicitur tum feri & sanguinis, tum aliorum humorum colluvium stagnationemque in glandulis auriū. Sanguis & serum, quandiu naturali suo gaudent circulo & symmetria particularum, corpus nutriunt, quamprimum vero particulae serosae sive sylvestres atque heterogeneae consilientiam iustam sanguinis vitant, variis excitantur affectus; haec particulae ad glandulas parotides delatae, ibidem subtiliores & quasi captivatae & incarceratae, parotides adimplendo turgescunt, reddunt, citum simul attollunt, & sic tumoris huius causa immediata est humorum. & ob hanc subtilitatem tumorum ordinario parotidibus accedit inflammatio.

Prognosis  
Aurium  
Doloris.

§. 11. Dolor qui in fundo auris sentitur, adeoque in meatu osseo, semper sunt maxime violenti. Quod symptomata atrociora, eo periculum magis imminet. Si dolor hic iunctus est febris acutae, cui accedant insomnia, deliria, convulsiones & hypothyria, sunt certe signa lethalia, prout nos bina ejusmodi exempla in praxi nostra notavimus, hic & dolorem hunc interduci (Inpor partium) sequitur, qualem historiam in puella 12. annorum ex globulo vitreo in aurem sinistra inmisso notavit Fabric. Hildan. Obs. 4. cent. 1. Senibus praesertim Dolor hic est grave malum, infantibus v. per purulentam excretionem facile solvitur.

Inflammati-  
o.

Inflammationem si subsequitur abscessus, perfisum est, item quando partes membranae occurrunt, & si dolor vehementissimus ipsam comitetur. Dum suppuratur periculo non caret, quia saepe cerebrum cum suis membranis afficitur & sic delirium inferit.

Pleurum

Ulcera quoque auri difficulte sanantur, difficultas autem sanandi haec ulcera inde est, quia semper a liquore glandulis profluente humectantur atque irritantur, omnes enim affectus glandularum sunt difficiliores aliis partibus corporis curatu, materia enim glandulis enanans, acris quippe & salsa, reunionem partium & cicatricem prohibet. Sic quoque ulcera in meatu osseo adhuc difficilius sanantur, quam in meatu cartilagineo, quia canalis osseus versus membranam tympani declivis est, & ubi in planum descendit, fossam efficit notabilem, & qua pus non nisi difficile eximitur, cum & contra meatu cartilagineus concham versus sit declivis, pus & serum statim ejiciuntur, neque ut in altero meatu corrumpuntur, saepe etiam in fistulam abiit.

Effluxus materiae saniole nonnullos etiam a plurius praeservat symptomatibus, cephalalgia, epilepsia, &c. quibus levantur sub fluxu huius confectione, uti in infantibus subinde observavimus, qui per huiusmodi auriū fluxus plus minus sordidos a

pluribus malis; tam externis, quam internis, levati sunt.

Cum pure quandoque Vermes variae magnitudinis & formae prodeunt, qui maximam corruptionem humorum denotant, & nihil boni portendunt. Vera aurium ulcera & inveterata facile in fistulam degenerant, vel erodendo occasionem membranis suggerunt, ut hyperpharcoma succrescat, quod meatu auditorium obturet.

Saepe quoque Res externae in aurem immittuntur, maximam cum difficultate eximi possunt, imò aliquando nunquam, si nempe in profundum meatūs intra fuerint haec corpora extranea, clauduntur enim facile in meatu osseo, qui valde obliquus est. Maxima omnium difficultas est, pila eximere, ea enim in meatu intumescunt & nonnunquam germinant.

Quod attinet prognosin Excrecentiarum illarum fungularum, si ex ulceribus prognatae fuerint, malum; si carnosae sint, non aliter quam excisione curari possunt.

Parotides vero, si cum signis concoctionis die critico, & a natura huc depellantur, bona sunt, si vero absque his signis, semper male astimanda sunt: quale exemplum infelicis abscessus notat Boerhaave Cent. 10. Obs. 85. ut & Comagenis: Quae dolentes ad aures exiungunt, perniciem minuant.

Verissimum est, Parotides periculosissimas esse, ob membranarum consensum & cerebri vicinitatem, unde facile delirium & phreptus prodici potest. Hinc omnes ferè Parotides suspectas habent Riverius, Forestus, Rhodius alique Practici celeberrimi; nuper adhuc felicit in Principe nostro Juniore Parotidem in abscessum versam nostra directione curatam vidi. Parotides certe febre non remittente semper perniciosa sunt.

Parotidis inflammatio suppurantis expers recidiva metum avertit, & interdum quamvis appareat, pro lethali habetur. Huc pertinet prognosticum River. Instit. Med. lib. 3. §. 3. Parotides, inquietis, si nulla subsequatur suppuration, malum est signum, nisi larga haemorrhagia, aut copiosus alvi fluxus, nempe criticus & signis concoctionis apparentibus succedat. Non vero de omni alvi fluxu existimandum, quod parotides dissipet, saepe enim in febribus petechialibus aliisque malignis agros cum Parotidibus apparentibus surripit. Imò suppuratis licet praeditis tumoribus, mortem tamen sequi, notat, Rolfe. Ord. & Meth. Med. Spec. comment. p. 161. Deficiente enim robore naturae, & morbo recidivante, vires ut succumbant necesse est. Riverius jubet observare tumorem crescentem ante maturationis tempus aperiendum, ne periculum suffocationis imminet, locum enim non esse capacem aut, ut omnem materiam simul naturae possit.

§. 12. Nunc ordo nos deducit ad curam Diata haereticae: Aëre ergo in his morbis sit temperatus, ne accedente ex improviso frigore, obstructio augeatur, sicut observari potest in aliis corporibus glandulosis, quae his vicina sunt, ubi eadem aëris dispositio partium obstructionem causa est, unde sequitur, succos salios, qui in motu sunt, diutius detentos & acriores redditos spiculis suis vellicare fibras nervorum & membranas, quae vellicatio.

cationem excipit *ἀνάστα* spirituum, & per consequens vehemens iste auri dolor & inflammatio; sic & *ἄether* impetuosiorens in hac obstruatas partes facile inflammationem inducere potest, cui id quotidie fieri animadvertimus.

Sic & in Parotidibus ex improvise accedente frigore humores ad suppurationem tendentes stagnando aciores, & sic indisplicati laudabile pus producendum redduntur.

*Animalis* Dixit exoptat quietem, motu seposito, ne spiritus turbati & jam impetiosi facti ulterius moveantur & confundantur.

Tranquillum quoque maneat corpus, ne spiritus in expellendo occupati viribus destituantur.

*Naturalis* licet in omnibus febribus & morbis, tum malignis, tum plurimis vacillet, & nullum cibi adit desiderium; attamen si forte cibi appetantur, non concedendi sunt difficiles concoctu, aut varia iuscula herbis appropriatis maritata, ova forbilia, carnes vitulinæ, perdes, pulli &c. & que facilem laudabilemque chylum porrigunt, omnia tamen respectu habito ad regionem, consuetudinem, ætatem & circumstantias ipsius morbi: fugiantur angue pejus acida ac frigida. Alvus quoque sit libera, ut & alix consetæ evacuationes, ne graviora superveniant symptomata.

*Chirurgicalis* 9. 13. Sequitur Cura *Pharmacologica* - *Chirurgica*, quam *Galenici* in Dole auri cum compescendo ita insinuant, ut morbi à quibus tantam causis proximis dolor iste procedat, attenuentur, si verò ob dolorem vehementiam, indeque metuendum virium lapsum integra morborum curatio expectari nequeat, eundem mitigare docent adhibitis convenientibus quibusdam medicamentis & quidem in humorum frigidorum & crassorum aures occupantium copia, præmissis internis attenuantibus, resolventibus & evacuantibus, nec non externis frictionibus & scarificationibus, ipsi auri bus instillant ol. amygd. amar. aneth. Camomel. Croc. Irin. laurin. nardin. vel cepæ in medio excavatæ indunt parvum euphorbii & oleum commune, illamque super prunis ponunt ad ebullitionem olei, quod tepide postmodum auri bus instillant: vel in aliquo aut pluribus ex prædictis oleis coquere solent majoranam, storchad. salv. sature. Castor. Croc. aut Al. fixid. & similiter instillant, vel forum exhibent ex decoct. malv. majoran. aneth. flor. camom. sem. fœnig. Croc. &c. In causa calida unanimi ferme consensu, præmissa aliquando venæsectione & clysteribus soluta alvo, lac muliebri vel vaccini tepide auri dolenti immittunt, cui interdum vitellum ovi immiscunt, vel oleum amygd. dulc. aut rosæ, necnon axung. anar. rec. guttatim instillant, aut locum sovent decocto malv. alth. viol. hord. fœnig. vel cataplasma imponunt ex pane tritice in lact. coct. additis farin. sem. lin. fœnig. ol. camomill. vitell. ovi & paucis croci. Dolorem ex flatibus excitatum sedant discutientibus & carminantibus; fomento nempe surfuris milii, salis, anisi, carvi, sacculo fl. camomill. schœnanth. nuc. moschat. caryophyll. mastich. mac. &c. repleto & imposito, vel auri immixtis abetho, moscho, croco, castoreo, aut succo cyrenæico. Vehementi inflammationis dolori occurrunt albumine ovi cum lacte muliebri recentem emulso, item oleis amygd. d. ros. viol. lumb. bric. assellor. quibus aliquando addunt succos

portulac. polygonii, auric. mar. umbilic. Ven. &c. In perleverante dolore cum virium prostratione ad narcotica accedunt, ut sensus partis illis hebetetur, adhibitis philonio Rom. succo mandrag. cum castor. theriac. Mithridat. & opio.

*Inflammationem* vetò incipientem curare tentant derivatione, naribus adhibitis hircudinibus, vel instituta venæsectione in fronte aut occipitio tum revulsionis gratia in cubito lateris dolentis celebrata, & si repellentibus abigi nequeat, discutientia in medium proferunt, qualia sunt superius in dolore ex causa frigida oborto mittendo memorata, ut focus ex decocto Camomill. fœnig. aneth. meliloth. olea aneth. Camomell. irin. lilior. &c. quibus si prohiberi nequeat, sed ad suppurationem pergat, tandem promovere student maturantibus, ut Cataplasmate ex rad. lil. cepar. farin. sem. lin. hord. butyr. non salit. Ol. camomill. & croco parato, & unguento basilico in oleo lin. dissoluto auri bus immisso, rupto abscessu, quod vel sponte fit, vel manu Chirurgi ferro armata, aut succo cepar. in quo fermentum sit dissolutum, auri immisso peragitur, materiam purulentam commode effluere sinunt, hinc locum mundant & abstergunt vino rubro tepido, cti beton. aristol. spic. celt. &c. aliquando incocta fuerint, addito paucis melle vel lyso rosar. quæ valde in hisce affectibus detergere observantur.

*Ulcus* ut ritè curetur, illud eluunt & mundi-  
ficant vel vino rubro, vel aceto, in quibus herb. beton. aristol. marrub. abrotan. macerata & decoctæ fuerint, vel succos harum herbarum, nec non succum omphacii cum vino dulci & melle admodum crassitudinem decoctos auri ulceratæ infundunt, vel folia olivar. & myrthi contrita coquunt in aqua multa ad mellis crassitatem, & simili modo adhibent. His præmissis ad magis extergentia & exsiccantia pergunt, utiturque *Galenus* trochiscis Andronii in aceto dissolutis, vel scoris ferri in pulvere redactis, & cum aceto ad mellis consistentiam coctis, quibus simul ulcus consolidari promittunt.

Ad *Vermes* ex foridibus ulcerum oriundos enecandos, amaris utuntur, cum detergentibus, ut succis apii, abrotani, absinthii, fœniculi, felle bubulino, quibus pulverem hellebori nigri & aloes aliquando immiscunt, vel oleum nucleor. perlicor. aut amygdal. anar. instillant.

*Res externæ* quantocius suadent eximendas, *Rebus* quoque si fieri potest, vossellis tenuibus aut instrumentis auriscalpij formâ elaboratis, vel si hisce nihil profici possit, terbellis adhibent, ut in globis plumbeis & vulneribus extrahendis fieri afolet, duriora corporcula sternutatoris excutere coherant, lubricato prius auri meatu gutta una vel altera olei communis, aut amygd. dulc. & ore naribusque manu præclusis. Conatu verò hoc irritò & meatu nimis existente angusto, eundem scalpello aut novacula suadent dividendum, quo liberius instrumenta immitti queant, itaque versari, ut res prehenzæ commode iisdem eximantur.

Ad *Excrescentias* aurium denuò amovendas aut consumendas omnium primò humorum affluxum inhibere student, præmissis evacuanti-  
bus & minorativis, instituta sectione venæ, exsiccantibus capiti adpersis, & setaceo aut fonticulis in nucha efformato, filo easdem tandem attrahunt & abscindunt, reliquias eroden-



erodentibus absument, immixtis meatui auditorio particulis cere, ne ab erodentibus illis ledatur, & exsiccantibus exlap. calaminar. thut. plumb. & C. C. uti stitire, malthic. aliisque catagmaticis curationem concludunt.

Parotidis  
hui.

In *Parotidum* curatione ad tria solent spectare, morbum nempe, causam & symptomata. Hæc tamen, cum æque multa sint, neque gravia, post morbi curationem remittunt, primum scopum ad causam proximam, à qua morbus fovetur, dirigentes, quæ cum humor quidam sit, sive simplex, sive mixtus, ubi tumore latens, ejus evacuationem commodis instrumentis peragendam repositi dicunt, ab in criticis natura motum non esse impediendum, sed missa venæsectione & purgatione potius promovendum, si debilis sit, humeris calefacientibus & emplastris attrahentibus ex bacis lauri, rad bryoni. thapsia, sinapi, simo columbino, euphorb. caticis &c. vel cucurbitulis applicatis. Ad morbum vero jam factum debite curandum, pro dolore & tensione sedandis emollientia adhibent atque laxantia, ut cataplasmata ex rad. alth. malv. lil. alb. flor. camomill. melilot. far. leni. lin. fœnigr. butyro recenti, adipe suill. metall. atiet. vitulin. vel foveis ex oleo, in quo prædicta simplicia decocta sint, spongia applicandos, vel illitus ex oleo, amygd. dulc. chamemel. melilot. lil. butyr. adip. asner. quibus si dolor cum tensione minus remittat, tumorem pluribus locis suadent scarificandum, & mitigato dolore evacuationi materia incumbendum, ut in Parotidibus non criticis fieri afolet. quæ cum inflammatione conjunguntur, in quibus prohiberi volunt humoris viscosi novam generationem, & geniti jam ad partem affluxum, instituta in sanguinis redundantia ejusdem larga detractione ex secta vena mediana lateris dolentis, atque hæc non sufficiente, altera vice in cubiti venâ externa repetitâ, si vero alii peccent humores, ut biliosus, pituitosus, vel melancholicus, eosdem convenientibus remediis purgantibus subent evacuandos, hisque rite peractis ipsius materie in tumore contentæ evacuationi student, impositis primo digerentibus & obscure post verò manifeste etiam attrahentibus, ut in tumore sanguineo cataplasmate ex farin. hor. d. tritic. sem. lini, fœnigr. oleo rosaceo ac mulsâ exceptis; in bilioso, cataplasmat. ex ovi lut. ol. camomel. croco. & sapâ; in pituitoso, emplastro diachilo magno iterato, in melancholico, linimento Oe-typo humido, vel unguento basilico, aliisque, quibus si sanguis, vel alii humores sub cute contenti digerere nequeant, eorundem in pus conversionem promovere, quod cute scalpello aperta eximunt, & sinu absterfo cavitatein cerato diachalcit. Gal. i. diapalut. deniq. consolidant.

Paracelsi  
særam  
pne  
curativum  
Aurium  
dolenti.

5. 14. Paracelsus de morbis hisce consultus in Aacina Dolore suadet duplicem instituendam curationem, unam ex appetitis frigidis de humido resoluta; alteram per suppurativa anodyna. Remedia in his convenientia potissimum commendat sequentia.

℞. thut. pp. f. aceto 3℔.

Cerato. 3℔.

reduc. in liquorem.

℞. hujus liquoris 3℔ss.

alcohol. vini exsic. 3℔j.

reduc. per maris præparationem, F. Sief. album, imponatur morbo emplastri.

In *Inflammationibus* ipsisque *Ulceribus* Aurium <sup>inflammationibus & ulceribus</sup> omnibus aliis remediis præsert ipsam thuriam, eamque tantæ estimat, ut eâ exceptâ nihil auribus infundi permittat, cum nulla medicina tam sit subtilis, quin aliquid ex tartaro secum habeat, quo se in auribus separet & loco isti inherente morbus fiat pejor, & curationi raro obediat.

In *Vermibus* Aurium enecandis & ejiciendis <sup>vermibus</sup> laudat colocynthidem & Θ li, quibus jungit aloë & myrrham, nec non farinam ex abiete putridâ, quâ vermes ex nutrimento potissimum enecari contendit.

Rex externas commodè inuadet eximendas, si *Rexum* ex aliter fieri nequeat, instrumentis ad hanc rem <sup>transeat</sup> debite accommodatis, quorum aliquod sub tri-domatis nomine commemorat.

Ad *Carcunculas* & *Excresecientias* Aurium ab- <sup>Carcunculas & Excresecientias</sup> fundendas similiter non multa auribus vult inj- <sup>latum.</sup> cienda, eum malum facile augeri aut in deterius transmutari possit, sed thutia debite præparatâ earundem exsiccationem & flacciditatem promoveri permittit, certus quod eadem aliis minus noccat.

*Parotides* ut pro opinione sua commodè <sup>Parotides</sup> curentur, huus scetz alumni cum Antefignano suo spiritus effervecentes, ebullientes ac inflammato-  
res volunt extinguendos, & nature quietem restituendam, quod præstare putant laudano opiato, aliisque narcoticis, nec non supereactivis anodynis; post hæc venenunt per sudores valide excellentia & discutientia propinant, & cum nempe diaphoret. flores 3℔ diaphoret. Spiritum Qi. Cum vitæ diaphor. &c. In Panaricio & sequens præstribunt remedium:

℞. sem. lysiam.

p. qv.

solis.

nigell. aa. 3℔.

fell. lauri 3℔ss.

camphor. liquesact. ad pondus omnium, reduc. in Sief. secum.

In *Fugilio Apofstomate* ab omnibus aquis for- <sup>Fugilio</sup> tibus & corrosivis cavendum præcipit, ut & à *Apofstoma-*  
purgationibus, capitellis, lixivis acutis, cum per <sup>tu.</sup> succum emundatorium, id est, per annum purgari debeat; hinc tripartitam ejus constituit curationem, unam per maturacionem, per mudi-  
ficationem alteram, & tertiam per consolidatio-  
nem. Nullam fieri vult apertionem, quod prava inde sequantur accidentia, sed per se maturefcere potius esse, quare ad primam curam maturacionem scilicet obtinendam sequens laudat imponen-  
dum emplastrum.

℞. Ol. laterin. 3℔.

Opoponac. colat. 3℔.

F. Emplastrum super carbones.

Opoponacum per acetum colatur, deinde sic iterum massa & induratur. Mundiatio fit sequenti:

℞. Mellis.

Bravella aa. 3℔.

Aristol. rot.

Alceapatic. aa. 3℔.

F. mixtura in modum emplastri, administra-  
cû jam apofstoma fuerit apertum. Consolidatio  
tandem ita abfolvitur.

P 3

℞. V. scil.



Re. *Intell. Ov.* No. iiii.

• *rasin.* de botin. ʒiij.

*farin. tritic.*

• *hord.* aa. q. *f. fuerit pro incorporatio-  
ione. fiat unguentum.*

*Helmontius* 5. 15. *Helmontius* in Aurium sedando *Dolore* in eo totus est, ut peregrinus ille hospes ejiciatur, quo spiritus insitus Archeusque placaretur, & antea à erisipatione cesset, cui scopo quidem hac in parte nullum peculiare præscribit remedium, sed non obscurum præbet indicium, peritiam etiam hunc actum suo sedare dolorem.

*Inflammatio* *Inflammationis* curam eo dirigit, ut causa occasionalis, sive spina adimatur, qua depulsa Archeus ab ulteriori accensione redigatur ad quietem, qua in reſel capræ & sanguis anguillæ auribus instillata non contemnendam æstimationem virium.

*Vicaria.* *Ulcera* Aurium eadem convenire judicat, quæ virus illud corrodens domare possunt, ne conveniens alimentum ulterius corrumpatur, quo superato & correcto sanies sponte desinet, quare succum Cyclaminis auribus instillatum suo bene functurum esse munere non dubitat, omnibus tamen præfert colcotarina, quæ in vis enecantia corruptorem, modò cautè hoc in casu adhibeantur.

*Vermium.* In *Vermibus* enecandis & expellendis etiam hic magni æstimat gum. cum quo aqua viva bullita auri infunditur guttatim, & vermes certò interimentur.

*Res externæ* *Res externæ* varias diversimodè eximendas esse, modo instrumentis, modo sine illis, reliquis id consulentibus, haud difficulter assentitur.

*Excreſcentia.* *Excreſcentias* mortificari & extingui credit illitu sudoris morientium, mira in hujusmodi excreſcentis mortificandis vi præditi, eo enim attractæ ita in radice enecantur, ut deinceps sponte sua facile evanescant.

*Parotid.* *Parotides* curantur succurrendo Artheo, ut ille confortatus materiam exolam à se depellere, parremque ab ea liberare valeat, qua abacta tumor & distensio cessant, proinde sulphur li-anodinum egregium hic judicatur & salutarium remedium.

*Ussissim.* 9. 6. *Ussissimus* ad *Dolorem* Aurium abigendum, curam eo dirigit omnem, ut tum morbi fomes præcè natur. tum causa eius conjuncta eradicietur, & quidem si sanguis nimis æstivans dolorem hunc fovet, eundem vena in brachio lateris affecti aperta emittendum inadet, hunc remedia fevorem ejus compescunt propinat, ut sulphur & decocta resergerantia ex tero factis, endivitarax, lulaj lign. santal. citr. &c. Si ferum in culpa sit, ejus copiam immuere jubet tum pilulis ex succino & Jalap. tum alius medicamentis evacuantibus, ut Apocematibus, & Infusis Succi nutriti & liquoris nervoni viam eadem corrigenda sunt remediis etiam sanguinis restitutibus, & succi nervi viam emendantibus, scorbuticis nimium & cephalicis. Nec omittenda externa, quæ dolor ipse mitigetur, & symptomata graviora præcaveantur quorum varæ formula parari possunt, focus videl. ex decocto altheæ, malv. hyoscam. solani, flor. Chamomill. Croci, roiar. hyperic. rad. lil. alb. vel Cataplasma ex rad. alth. flor. chamomill. far. hord. sem. fœmegr. in lacte coctis, additis axung. auter. vir-

tul. vel æſſypo & pauco croco, vel olea quædam instillanda sunt Auri, ut aneth. lil. alb. lumbricor. scarabror. Si his non cedat, cautè ad narcotica pergendum, quale sequens existit oleum aut linimentum Auri dolenti guttatim instillandum.

Re. *Ol. nucl. persic.* ʒb.  
*papav. alb.* ʒiij.  
*hyoscium* ʒi.  
*Campbor.* gr. iij.  
*land opiat.* gr. ij.  
*M.*

*Inflammatio* ut curetur, sanguini motus suus *Inflammatio* est reconciliandus, & à lentore suo in statum debitum restituendus, quod perfici solet venæsectione, hircudinibus & aliquando cucurbitulis syncipiti aut humeris applicatis. Alvus adstricta clysteribus est relaxanda, & reliqua sanguinem temperantia & æstum ejus sedantia intus assumenda, tum pro dolore mitigando superius dicta auri applicari poterunt, & si suppuratio præcaveri nequeat, materia impacta digerenda est & maturanda, cui scopo sequens optimè conveniet cataplasma.

Re. *Cepam.* No. j.  
*buir. recent.* ʒij.  
*Ol. Chamomill.*  
*resac.* aa. ʒj.  
*Croci* ʒb.  
*M. F. Cataplasma, auri imponendum.*

Pus debet jam confectum abscessu aperto est eximendum, & cavitas decocto hordei cum melle rosac. à recrementis est mundandum, abstergendum & ritè consolidandum.

*Ulcus* Aurium ut debitam admittat sanationem, sanguis universus à recrementis est expurgandus tum evacuantibus ex carthamo, sena. Jalap. &c. tum decoctis lignorum, aliisque reliquis ulceribus convenientibus, mixtis cephalicis, hinc ulcus ipsum mundificandum, particulæ acres mitigandæ, corrigendæ & eliminandæ sunt decocto majoran. menth. beton. heder. terrestr. nicotian. inccisapij. centaury. min. marub. &c. auribus inspersis, si quæ turunda iterum mundatis & absterſis, pro majori verò materiæ humide exsiccatione, decocto scoriat. ferri & aristol. coruq. nec non fumo ex gum. landarac. mallich. myrrh. succin. auri per infundibulum immittendo. Consolidationi promovendæ balsamus de Capaiba non parvum præbebit invamen.

*Vermibus* enecandis & expellendis varios adsignat succos amaricantes & putredini resistentes, ex absynth. flor. & folior. persic. scord. rut. sel bubuli, aloei, ol. anygd. amar. colocyndi &c.

*Rebus externis* iterum eximendis eandem *Res extracommendat* eucheireſin, quam præcedentes jam manifestantur.

*Excreſcentia* optimè igitur absumi posse affirmat, sed cautè hic verandum esse consiliat, & si ve medicamentis hijs catharteticis, sive sectione adiuvantur, ejus regenerationem præcavendam inspersis in cavitate ad locum illum, cui istæ inhæserunt, pulveribus exsiccantibus ex aristol. thut. myrrh. sarcocoll. ænig. x-ris, &c.

In

Parotidis.

In Parotidibus curandis, ab initio in eo totus est, ut sanguis evasatus circulationi restitatur, & succus nutritius stagnari ceptus resolvatur, secta venâ in brachio, & diaphoreticis sale volatili præditis intus exhibitis, exterius verò ipsi tumori illinit olea resolventia, ut lumbrior. Chamomill. nuc. jugland. aranear. vel emplastrum diachylum tum simplex tum compositum imponit, & si discuti nequeat, suppuratiorem promovet cataplasmate ex cepis in Inflammatione superius manifestato, pus hinc confectum tumore aperto præcipit eximendum, & curam residuam eo modo, qui in ulcere jam traditus est, communè absolvendam.

Sylvaria  
in  
aurium  
Doloris.

§. 17. Sylvaria in curatione aurium Doloris, ut in aliis ejusdem speciebus, ad tria necessaria præstanda respicere solet, videlicet ad objecti dolorem inferentis ablationem aut emendationem; ad sensorii læsi reparationem & urgente dolore ad sensus stupescationem. Doloris causa externa auferatur amovendo & fugiendo quicquid sensum auditus lædere potest, ut clamorem & sonitum magnam, contritum, item ventos ætiales. Interna causa auferatur, si sanguis peccet, venæ sectione, si humores alii, eorumdem evacuatione. Emendatur causa externa, obvelando aurem tegmine molli, quo radii sonori absorbeantur, ne forti repercussione sensorium hoc auditus ulterius lædant. Sensorium verò ipsum pro diversitate læsionis variè reparatur, cujus quædam species inferius venient pertractandæ. In generetamen, si causa sit pituita & flatus, convenient spirituosâ & Salia volatilia oleosâ carminantia, ut oleum baccar. laur. ruta, castor. destill. majoran. salv. macis, carvi, item crocus, decoctum Chamomill. & caryophyllor. in vino rubro, spiritus utatigi vari, &c. In dolore ardente lac muliebre laudat & fomentum ex decocto malv. alth. aneth. chamomill. sem. lini. cap. papav. in lacte vaccino parato. Sensui inducitur stupor narcoticis & opiatis prudenter adhibitis.

Inflam-

mationis.

Inflammatio Aurium etiam rectè curabitur, secundum Authorem hunc nobilissimum sanando & auferendo quemvis tumorem vasa comprimendo, & eorumdem obstructionem à pituita viscida reterando, & sanguinem coagulatum fluxilem reddendo salibus volatilibus & diaphoreticis interius assumptis, & aliquando instituta venæsectione, exterius verò dissolventibus, ut oleo lil. alb. camomelia. aneth. lauria. Unguent. alth. compos. hinc sanguinem ipsum è vasis suis effusum, & per partes vicinas diffusum removendo, & coagulationem ejus impediendo, dissolvens partibus ejus crassioribus, diluissis tenuioribus, & temperatis acrioribus per eadem diaphoretica & externa jam memorata, vel fomentum ex plantis aromaticis & discutientibus, si verò sanguis hircosolvi & discuti nequeat, sed ad suppuratiorem & abscessum tendat, illa confectio puris est promovenda & acceleranda medicamentis emollientibus & maturantibus ex rad. lil. alth. fol. malv. branc. ursin. sem. lini, fœnigr. far. hord. caric. Axung. hum. &c. medullis ac oleis ex superioribus jam cognitis, Unguento Agripp. emplastro diachyl. simpl. & cum gummi. vel sequenti cataplasmate.

R. Cepar. sub cinerib. coll.  
& confus. No. ij. vel,  
si major existat, N. j.

rad. lil. alb. simili modo parat. ʒiʒ.

Caric. ping. in lacte coll. & confus. N. iijj.  
pulv. sem. alth.

lin. aa. ʒiʒ.

Axung. viiul.

buirr. recent. aa. ʒiʒ.

Ol. camomill.

fl. sambuc. aa. ʒiʒ.

Croc. ʒiʒ.

M.F. Cataplasma.

Pus genitum absque morâ est educendum, ne acrius redditum dolorem augeat, & partes vicinas corrumpat, quare si sponte abscessus non apertietur, cultello aut ruptorio ex lapone & succo cepar. vel caricis contulis appositis, vel alio conveniente puri exitus est parandus, & si post abscessum hunc apertum relinquatur.

Ulcus Aurium, illud prius mundificandum. Merco. erit vel decocto lupinor. vel succi apii, heder. terrestr. betæ, cenaur. &c. cum melle rosaceo, postmodum consolidandum finimento ex rad. aristol. thut. sarcocoll. lithargyr. cinabar. melle rosaceo exceptis, vel quem Auctor hic laudabilem ejus tum in mundificando, tum consolidando effectum reliquis omnibus præfert, ipso balsamo ʒiʒ terebinthinato, cuius guttula una vel altera ulceri aliquando instillata, paucis diebus spatio ejus curationem felicissimè absolvit.

Vermes si ex putredine in ulcere hoc aurium Vermium. genti sunt, eos eiecandos vult amaris, ut succo tenaceti. perlicar. Decocto helleb. felib. animal. ol. amygdal. amar. & postillimum mercurio dulci.

Res extraneæ quantocyus expellendæ aut eximendæ sunt, meatu auditorio aliquando oleo <sup>Rebus ex-</sup> quodam lubricato, ut eo facilius reddatur exitus, <sup>traneis,</sup>

Excrecentias, si fieri potest, filo attrahere <sup>Excrecenti-</sup> suadet, ut munditudo exstirpari queant sectione, <sup>as,</sup> ad dispersis postmodum medicamentis exsiccantibus, vel pulveribus exedentibus, sed tutioribus, easdem pedetentim absumendas permittit, ut sunt alumen ustum, ærug aris, cort. granat. gallæ, &c.

Parotides, quando possibile, discutiendæ sunt, si vero hoc impetrari nequeat, ad maturatiorem & suppuratiorem deducendæ, quæ cuncta iisdem obtinentur remediis, quæ superius in Inflammatione jam sunt prolata.

§. 18. Cartesiæ ad mitigandum Aurium De Cartesiæ. lorum toti pene in eo sunt occupati negotio, quoniam nimiam fibrillarum exactionem impediunt, easque dislocatas in pristinam & decentem repellant configurationem, quod tum facilius heri credunt, quando causæ noxiæ prius amoveantur, aut ita superentur, ne fibrillas illas particulis suis acutis ulterius vellicent, hebetantibus videlicet, & aliquantum ranois, particulis illas noxias inviscantibus & ad quietem disponentibus, quod omnium optimè diaphoreticis, poris laxioribus præditis obtineri rentur, quo particulæ noxiæ pungentes ablorbentur, sicut capæ nam cum illis subsequito sudore ejiciuntur, & interstitia fibrillarum partium auris ingressui non modò materiæ æthereæ, sed & secundi elementi, aliisque particulis paulo crassioribus ita redduntur conformia, ut nullam ulterius inferant noxam, hinc sequens mixtura sudorifera non contemnendi habetur usus.

R. Ag. pulg. ʒiʒ.

Spir. C. C. essentif. gt. xij.

ʒiʒ

ḡiḡ diaphoret. 3!

Θερσιμαριν. Εβ.  
volat. succin. gt. iiii

Syr. de beton. 3üj.

*M. D.* unā vice corpus ad sudorem disponendo. Ut autem posthæc fibrillæ commodius pristina recuperent configurationem, & imprefio vellicationis istius dolorosæ complanetur, auricæ extrinsecus idonea quædam instillant remedia, ut sequentem mixturam paucis guttulis calidè quandoque instillantam.

24. *Essent. Heder. terrestr.* Zij

fior. melilot. ʒiſs.

*Smcc. nicot. rec.* 3j.

*Spir. C. C. essent.* 3℔.

M.

Intensius minimum fibrillis istis, relaxationem earundem praeferat foto quodammodo conveniunt; verb. gr. ex decocto rad. alth. fol. malv. flor. li. alb. & canonim. in aqua & urinâ pueri factô, & ne nimia hinc sequatur humectatio, brevi succino suffragiumus ex Gummi Junip. & succino superfluum humiditatem egregie exsiccans. Inter mitigantia quoque recentem olea nonnulla lubricis & ramolis suis corpusculis angulos acrios hebetantia, qualia sunt, oleum verbasci, lumboricor. fearbazor. quibus guttulæ quadam olei destillati anethi sint intermixtæ. Ad narcoticâ rarâ, & non nisi extremâ postulante necessitate accedunt.

இந்தியா-  
காங்கா.

*Inflammationem* Aurium debite curaturi, nihil intermittunt opera, quæ pores partium ab heterogeneis illis particulis ex sanguine evalatis & corrupto oriundis liberent, ut sufficiens particulis convenientibus pateattransitus, nec fœciginia materię æthere corpūculis nociva eosdem pertranseat, quod similiter convenientibus ladorisfisc obinetur, quibus subjungenda externa quædam discentia, coagulatas particulas ex sanguine corrupto relolventia, & acutas particulas pungentes obfudentia, quod tum spirituosis alcahis, ut spiritu urinz, ❖, ❖, lumbric. C. C. tum oleis temperatis & alcalicis saturate impregnatis, ut oleo alior. lumbricor. caneror. caranor. caneror. cum Sale volat. citruli, aut Cogn. C. luccin. &c. peragere solent, & quandoque essentia aneth. Chamomill. Roman. Spiritu vini extractis. Fibris autem jam icti ruptis, ut particule earundem secedentes cum succo nutritio le commisceant, & massæ purulente sufficiens spatium relinquant, quo abcessus colligeretur, ejus maturatione promovet cataplasmatibus ex farin. fœnigr. medull. panis alb. pulv. flor. melior. in lacte coctis cum pul. chamomill. ovor. axung. gallin. & croco. Pus bene maturum rupto abicelli eximunt, & cavitate erimdatam commodè claudunt.

*Viceris.*

Hoc vero si pro voto non succedat, sed propter acrimonium puris *Uenis* pro tempus aliquod relinquatur, illud bene abluantur & emundantur, ut urina pueri in qua agnomonia & lignum Guajacum aliquantulum fuerint uiscerata, vel phlegmata spiritus urinae, vel succo marub. cum melle rolato tepide infundatur, & quo citius hae praesente iuvenet: non negligant etiam hoc in casu interna suadifera, ut elient. rorisnat. lignor. Tinct. *g. a. &c.* Sordidius emundant decocto ligni Guajacui, in quo parum

unguenti *Aegyptiaci* sit dissolutum, quo nimia humiditas optime simul exsiccabitur, ea vero siccitate obtenta consolidatio facillè subsequetur, vel sola aliquando inspersa: thurâ preparata, vel additis huic pulueribus rad. aristol. rotund. larcocoll. myrrh. & cum syrupo de ros. siccis in linimentum aliquod redactis.

*Vermes* in auribus aliquando generatos, vel jam vivos ab externa in aurem ingresses, ne mordicando dolorem adaugeant, vel dulcibus, ut lacte calido, pomo cocto, &c. vivos eliciunt, vel anaris prius enecant, qui de causa sequens Plateri addunt, jam probatum remedium etiam non singulari habent in usu:

Р. *Colocynthis*. Эб.

*Aloes* 36.

HeRebor. alb. 31

*cum succo Persicariae F. instar linimenti*,  
indatur auri aliqua ejus portio. Etiam sequens  
ejusdem Autoris experientissima in enecandis  
& ejciendis veribus illis maxime acriter reme-  
dium, quod constat ex pinguedine capi, oleo  
coryli & pauxillo gii dulcis, in unguenti for-  
mam redactum, & bombace auribus verminan-  
tibus inditum.

Reliquas *Res externas* varii generis auribus  
illapsas, quæ fieri potest ratione, denuò volunt  
eximendas, vel saltu, aut forti sternutatione, na-  
ribus & ore obtutatis, expellendas; ne auditui ul-  
luni inde procreetur dampnum, de quarum en-  
cheiresi paulo nunc usque pluribus ætemus.

*Exercitium* interdum mediocribus con-  
sistens iterum destini polle concedunt, ut alu-  
mine ullo, xurgine aris, aristol. uff. myrrh. &c.  
interdum vero vel nunquam, vel sedula ope-  
ratione cum filo atrata communio instrumento  
abscindi, atque sic, non tamen citra molestiam  
egri & operatoris, auferti, loco vulnerato abhi-  
bus exsiccatibus ex thutia & pompholye.

*Parotidem* non ablimili modo ac incipientem *Parotidis*  
Inflammationem curari potest exstant, affusis  
diaphoreticis, poro dilatantibus, particulis  
heterogeneis diluiventibus & attenuantibus,  
ut commodius exhalent, quodsi praestari ne-  
queant, apophyses externas nurationem promo-  
vent, & eodem modo ut in abscellu procedunt,  
aliquoties tamen in junioribus oleo chamomill.  
& terebinth. nec non emplastro diachylo simpli.  
effecerunt. ut vel disculsa feriat, vel line ul-  
terioribus aliis remediis ad suppurationem com-  
mode disposita, & post apertionein lancetta  
factam pure exempto emplastro lictico cum cer-  
e de beton. mixto, & balsamo Peru. maxime  
felicitissime sanant, in malignis vero & peccen-  
tialibus Emplastrum magnet. A. S. & theriacalia  
magnis exoriant ene

9. 19. His praenitiis ad *nigra* remedia pro-  
greddiamur, quae ad *Dolorem* Auris maxime len-  
sibilem sedandum diverſa eſe debent, pro di-  
verſis morbi cauſis. Auſpicanda ergo doloris  
curatio à cauſarum externarum, antecedentis  
utrin & continetur per contraria ablatione. Si  
dolor proinde à frigore fuerit fortiori, contra  
frigus & procellis agitatum aërem defendenda  
venit auris, applicatis ſuper aurem omnibus illis,  
quae caleſcere poſſunt; frigida enim acria &  
acida auribus ſunt inimica, ut & repellenda  
ſicca topica applicata, ex quibus laeſe ma-  
ius damnum, quam emolumentum agere aſſertur,

de quibus legi metetur Obs. Sz Ephem German.  
Ann. 6. & 7. Præstat ergo species pro fomento  
sacculo inclusas cum lacte coctas auribus im-  
ponere. Ex. gr.

℞. Herb. folv.

calamirrh.

myrrh.

meliss.

hyssop.

flor. Chamomill. aa. Mj.

sem. sanic. ʒi.

bacc. Lauri No. ij.

Dentur incisæ pro sacculo. Vel in vino coq.

℞. Vapor auribus excipiantur.

Panis quoque calidus cum sem. carvi vel aneth.  
coctus & discissus auri applicetur sapius. Vel  
infundatur ol. amygd. amar. rec. cum guttula  
una vel altera ol. d. caryophyll. vel carvi, aneth.  
anis. & cum gossypio molchato auris obturetur,  
quæ jam dicta remedia sale abundant volatili  
valde penetranti, hæc partes facile calefaciunt,  
poros & canales glandularum aperiunt, & circula-  
tionem humorum adjuvant: hinc & convenit  
Spiritus fornicat. Cum dolor vero hic sit à  
congestionem feri scilicet acris & falsi, qui chronicos  
& molestos affectus producere solet, hinc con-  
veniant spirituosæ, quæ tamen cum cautela ap-  
plicanda sunt; nihil spiritibus auris magis alicui  
est, quam humor talis peregrinus, excipiat-  
tur ergo in eum sinem fumus tabaci, vel ex thure,  
mastiche, succino, gum. sandrac. Omnia hic  
quoque conveniunt remedia sale volatili alca-  
lico prædita, aciditatem humorum seroforum  
destruunt, nec non ambrata, muschata, Essen-  
tia scilicet ad auditum Michaelis sequens.

℞. fol. asar. Mij.

Lauri.

Herb. Card. ben. aa. Mj.

flor. stachad. Arab. P. iij.

Chamomill. Rom. Mj.

sem. raphan. ʒij.

cepar.

porri aa. ʒiib.

Cumin.

Carvi.

angel. aa. ʒi.

rad. asar.

cyclam. aa. ʒiib.

elleb. alb. ʒi.

Incisa & confusa grosso modo infund. spiriui  
formicæ. tum instillentur aliquot guttæ.

Convenit præ primis Tinctura mea nepenthes  
in aurem immilla guttatum.

Spiritus Otalgicus Myns. & Apoplect. Lang.  
Anhalt. Acovist. Mund. sunt polychresta robo-  
rantia auribus remedia. Laudatur cepa sub ci-  
nere asata.

In dolore aurium egregium quoque est reme-  
dium, ob vim suam anodynani oleum scorpio-  
num, vel scabæborum per infusionem paratum,  
ad guttulas aliquot cum bombace auribus inditu-  
m, vel cum lacte muliebri commixtum. So-  
lùm lac muliebri tepidum è mannis emulctum  
auribus instillatur.

℞. Ol. Chamomill.

angel. aa. ʒi.

hyssopam. expr. ʒiib.

M.

Balsamus & sequenti modo paratus in dolore  
aurium est egregius.

℞. & part. i.

ol. theri. vith. p. jv.

coq. in aren. ad solut. & instil. balsani rubri, ei  
assunde Sp. vini rectif. digere ad Tinct. decanta  
& inspilla in Balneo qui remanet balsamus est,  
& potest per Retortam destillari in oleum dulce.

Nec hic interna negligenda sunt, imprimis  
diaphoretica cinabarinis mixta in Otalgia o-  
mnem implent paginam, lymphæ enim, ceu dixi-  
mus, omnium affectuum aurium est causa, quæ  
omnibus modis emendanda, dissipanda & in or-  
dinem redigenda. Hic ergo præ aliis con-  
ducit balsamus noster nervinus, vel lig. C. C.  
succinat. Essent. viperin. anodynâ VVedeli  
permixta, & sapius exhibitæ. Tinctura succini  
per vices exhibitæ nostrâ experientia est poly-  
chrestum remedium. Vel detur sapius sequens  
pulvis.

℞. Specif. Cephal. Mich. ʒj.

Pulv. anodyn. gr. iij.

M. F. Pulvis.

Detur una vice, & reiteretur aliquando.

Pulvis anodynus confortatus est sequens.

℞. Magister. Cordial. ʒij.

Landan. opiat. ʒb.

M. P. Pulvis.

Vel spasmoticus noster.

In contumaciori malo & decoctum lignorum  
cum herbis appropriatis sæpe magno cum fructu  
proluit; item conducit Tinct. ʒui volatilis no-  
stra, Sp. cephalicus.

In doloribus hisce sæpe quoque ad caput alia-  
que viscera respiciendum est, hinc conveniunt  
sæpe in sexu sequiori antihisterica, splenetica,  
aliaque, ut Tinct. & nostra. Dolorem hunc sæ-  
pe unico vesicatorio in nucha applicato curavi.  
In graviore & diuturniore etiam conveniunt  
fonticuli, setacea, &c. Si simul humor ex auri-  
bus effluat, assumat pilulas Rossii, cum extracto  
Rhabarb. vel sequens hydragogum, cautè tamen  
purgantibus incedendum.

℞. Pulv. rad. laxativ. ʒj.

Resin. Gialapp. gr. iij.

Oil euphras. gr. v.

M.

Si à rebus externis in aurem immixtis dolor  
hic obortus fuerit, illæ ut exsiccentur necesse est,  
de quo modo inferius dicemus. In his dolori-  
bus non opus est tanto apparatu, modo internè  
exhibeantur opiatæ, imprimis Tinct. nepenthes,  
quæ sola plures feliciter curavimus, exhibendo  
ʒo. ad 40. guttas.

Si verò dolor auris ab ejus Inflammatione de-  
pendeat, ea curanda ut alia inflammatio, vel  
Erysipelas, nam hic eadem indicationes obser-  
vanda sunt, quæ in cæteris aliarum partium in-  
flammationibus. Abstinentium est à catini-  
nativis aliisque nimis acribus, sed eligenda  
sunt blanda diaphoretica interna & externa ano-  
dyna & demulcentia, non enim statim ad sus-  
pirationem accedendum est, nec Venæ sectio  
tam cito instituenda, quod tamen sæpe magni  
nominis Medici & Chirurgorum vulgo facere  
solent, non sine ægri peticulo & tortura. Ut in-  
flammati tollatur, succus evasatus discussione  
suis vas itorum allerendus est. Auribus im-  
ponantur vasit sacculi ex florib. sambuci, hyssopi,  
aliisque herbis parati & lacte incocti,  
vel infundatur auri ol. amygd. amar. dulc.  
cum

Ratio en-  
randa in-  
flamma-  
tionem.



cum gr. j. vel altero camphoræ, alii oleum ovorum magnificiunt, auribus per vices immittunt, & ol. rosato vel nymphi. permixtum. Pinguia verò & oleosa mihi valde suspecta sunt, potest melius cataplasma emolliens & discutien: ex prædictis parari & auribus imponi.

Si autem pertinax sit inflammatio, & ad supurationem tendat, maturantibus utendum est, qualia sunt cataplasmata ex micâ panis, cepis coctis, bulb. lil. flor. chamomill. melilot. &c. In ulcere recenti & inveterato internè conduct Decoctum sequens:

℞. Rad. chin. rub. tinctor. aa. ʒiſs.

enul. camp. ʒij.

bacc. lauri, Junip. aa. ʒiſs.

rorismarin. ʒß.

salv. ʒij.

Θ ʒ ʒß. coq. in vin. colat. ʒXL. add. oxy-  
mell. scyll. ʒj. M. Conduces quoque Θ  
volat. Ol.

*℞. M.* Cum abscessus fuerit apertus, ad extergentia fugiendum, quæ non tantum obstructions reserant, sed & mundant, inter quæ sunt aristol. raphan. rust. cepæ & amara ipsæ quoque rad. hellebor. colocynth. imprimis absinthium in lacte coctum, & per injectionem adhibendum, flor. pericor. alarum, rosular. chamomill. ut & ol. amygd. amar. velut basis omnium oticorum exteri. quæ omnia in ulceribus aliisque sordibus proficua sunt, & si ulcus valde putridum & sordidum sit, frustum spongiæ imponatur, quod imbibit pus, ac arceat aerem ambientem, & præsertim indatur seq.

℞. Elix. vite ʒß.

Tinct. castor.

ass. satid. aa. ʒiſs.

Θ ʒci ʒß.

Camp. ʒij.

M.

Tincturam aloes cum Sp. vini paratam magnifico, ad guttulas aliquot immittam, vel tinctur. myrrh. & si valde profundum fuerit, balsamum viride nostrum proderit. Cum detersum fuerit ulcus, exsiccandum deinceps & ad cicatricem reducendum, ubi laudatur vinum granatorum descriptum ʒ de ʒss, sed cum auris sicca expectat, possunt in formam pulveris, vel sumi, vel balsam. exsiccantia adhiberi, quæ parari solent ex malliche, succino, sandar. & thure, aliisque, quæ cum alibi diximus de ulceribus, hic etiam proderunt, quo lectorem brevitatæ ergo remittimus. Sed hic asterisco notandum, ne apparentia huiusmodi ulcera aurium seu effluxus eorumdem plus minus saniosi nimis cito sanentur, præsertim in subjectis humidioribus, & infantibus ne pejora symptomata oboriantur, ceu plura novimus exempla; hoc in casu meatus auditorius tantum mundus servetur, & elavetur quotidie urinâ humanâ, vel aquâ ʒis ʒci infusâ.

Ad intersticiendos Vermes amara commendamus auribus instillanda, ut succum absynth. flor. pericor. centaur. min. decoct. colocynth. vel etiam guttas aliquot olei amygd. amar. cum oleo tanacet. vel ol. diacolocynth. maritati, item convenit oleum nucleor. pericor. cum ellên. fellis perdecis vel lucci piscis maritatum, sel enim animalis alicuius hic optime conducit. Sequens mixtura oleosa non sine insigni adhibetur juveni.

℞. Ol. diacolocynth. ʒij.

nuc. persic.

amygd. amar. aa. ʒj.

ol. d. ligni coryl. gr. iij.

M.

Sic quoque urinosa hoc in casu conveniunt, Ephem. Gallor. de anno 1677. commendant spiritum vini tanquam infallibile remedium contra vermes aurium. Ex remediis hinc illa, quæ oleosa sunt & spissa, excellunt, & quidem eo nomine, quod insectorum rostellâ & proboscides obcurent. atque ita eo momento suffocent. Hic & omnia anthelmintica in Encyclop. Med. jam dicta proderunt. Sæpe & allicitur vermis imposito dimidio pomo excavato, mox enim vermis ex aure properat in cavitatem pomi.

Et cum acidum viscidum in corpore peccet ubi vermes hospitantur, hinc id corrigendum est, in quem finem seq. vel simile decoctum præscribere soleo.

℞. Lign. sanct. ʒij.

sassafras ʒj.

rad. gentian.

Angelic. aa. ʒß.

bacc. lauri Junip. aa. ʒj.

herb. cent. cochlear. aa. Mj.

Sal. ʒ ʒlat. ʒj.

Inf. & coq. inf. q. feri last. Colaturâ ad ʒxxx. add. oximel. scyll. ʒj. vel delicatulus infund. vino, & amara possunt interponi.

℞. Essent. absynth. camp. ʒß.

Elix. vite ʒv.

Tinct. corallor. ʒj.

ol. sassafras gr. xv.

aurant. gr. v.

M.

assumantur 60. guttæ in vino mane stomacho jejuno. dentur per septimanam bis pilulæ seq.

℞. Resina guajac. ʒß.

Gumm. ammon. gr. iij.

ʒ dulc. gr. iij.

ol. sassafras q. s.

purgandi sunt quoque pueri & adulti Trochiscis Hermeticis.

In infantibus quibus non multa exhiberi possunt, solum decoct. rad. contrayer. vel chynz conduct, & in vino malv. exhibeantur guttulæ 6, vel 9. seq. Mich.

℞. Elix. vite ʒj.

Sal. volat. oleos. ʒß.

Ol. sassafras gr. x.

M.

Externè conducet in ulcere ipso seq.

℞. Elix. vite ʒj.

Tinct. myrrh. ʒß.

Spir. Sal. ʒci. ʒij.

Extr. centaur. min.

gentian. aa. ʒß.

Campbor. ʒij.

Ol. lign. sanct.

M.

Si verò alia animalia in aurem irreperint, ea variis blandioribus elicienda sunt, vel lacte, vel oleo olivar. scorpion. Legimus exemplum in Ephem. ann. 4. obs. 50. quod gryllus in aurem irreperierit, & immisus 8. guttis olei gryllorum cum ol. olivar. parati gryllus in aure mori cepit. Simili modo aurium illa vespæ seu scolopendæ parvæ, porti one pomi dulcis recens micæ & auri-

*Ratio tollendi Vermes.*

auribus admodum elici potest, ut pulex, ex fusu D. Riverii, pilis caninis in globum convolutis & auri insertis allicitur, ut iisdem inhaerens una cum iis eximatur.

*Ex extra-  
medi.*

Si corpora externa in meatum auditorium incidunt, ante omnia hæc extrahantur, quod ut dextrè fiat, perpendendum est, an corpora talia sint ut emolliari possint, sicut pila, vel an dura sint, ut globi vitrei, plumbei, nuclei, &c. Videndum etiam est, an corpora ista in meatu cartilagineo, an verò in meatu osseo lateant. Si corpora mollia sint & in meatu tantum cartilagineo, eò annitendum, ut frangantur, vel cochlear ab *Hildano Ois. 4. cent. 1.* designatum pone ea digendum, quod in parte flexibili, qualis est cartilago auri, haud difficulter fieri potest, atque ita eadem extra meatum protrahi: idem fieri potest circa corpora dura, quæ sunt in eodem loco, & cochleari vel terebello eximi possunt. Quod si verò corpora extranea in meatu osseo hæreant, illumque in totum adimpleant, difficillimum est ea cochleari vel terebello eximere; melius verò est incisionem facere pone aurem, & versus ejus partem superiorem, id quod hoc loco latens fieri potest, cum nullum ibi vas sit notabile; eo modo evidari quadantenus potest obliquatus meatus, & adhiberi terebellum, cujus ulus potissimum est in globis plumbeis extrahendis. Sed prius injicienda sunt ad vias lubricandas varia olea, præsertim verò amygd. dulc. & si nucleus vel pilum, in meatum oleum fuerit intusus, qui propter figuram ovalem utraque sui extremitate potest apprehendi, utendum est instrumento descripto à Fabric. Hild. quod tenaculum nominat; oportet autem ut genuinà curâ conficiantur hujusmodi instrumenta, ex optimo chalybe, ut tenuia fieri possint, & si inveniuntur, ex seipsis fieri recta fiant. Sed cavendum in his operationibus, ne membrana tympani lædatur.

*Excre-  
scen-  
tia fungo-  
sa & car-  
nosa.*

Ad Excrecentias fungosas & carnosas Auri adnatas vel innatas tollendas meretur legi *Ois. 1. cent. 1. Fabric. Hildani*, ubi describit excrecentiam fungosam & scirrhosam, quæ meatui innata erat post abscessum antequam verò illam aggrediebatur, præparabat cum curâ ægri corpus, quo facto, quantum poterat, auferbat. Si excrecentia hæc magna est, & extra meatum prodit, abscindenda est vel forficis culpe, vel cultello incisorio, vel etiam filo liganda, & dein abscindenda, ad sanguinem sistendum liquor stipiticus usurpetur, & dein Eschara inducatur, sed cavendum, ne membrana interna lædatur causticis. Eschara inducta applicanda sunt aliquot guttæ olei ovor. vel amygd. ad eandem separandum. Alii illinum unguentum fuscum VVurtzii. Deinceps deterlivis & mitigantibus remediis utendum, ut incarnetur ulcus & citaretur, subinde tamen nihil ejusmodi remediis, quæ resuscitantia fungorum impediunt, ut sunt omnia acidum imbibentia, ex. gr. C. C. uls. pulv. myrrh. pomphol. sacchar. &c. paululum enim vitrioli solutum in sufficienti quantitate decocti alicujus vulnerarii admodum proficuum erit, si injectiones ex hoc liquore fiant in aurem, & tormenti aliquid hoc liquore imbutum in aurem imponatur, & imprimis utile erit tormentum si facile possit imponi, compri- mit enim ulcus & excrecere carnem prohibet. Ad cancerosâs excrecentias nulla cura superest, nisi ab initio pars superflua excerpatur & radicis tollatur, tollitur enim fungus ex aure scir-

rhosus vel instrumentis vel ligatura vel caustico inprimis Elixir. vitæ nostræ cujus ope plures fungos abstulimus, & si hoc fieri nequit, curâ palliativa utendum, & tantum majus incrementum impediendum, & hoc obtinere possumus, si quoti die parti affectæ in speciem pulveres ex aristolochia, myrrh. Ro. saccharo, &c. lapid. &c. calce viv. & similibus paratos, quandoque & opus est ætaro, si hic non suffecerit, malum lethale est. In mitiori vero casu interna, inprimis diaphoretica remedia non negligenda, quæ jam ad nauseam usque superius diximus.

*Parotidum* curacionem aggreffiuri monemus, Ratio an- ne externa tantum, sed & interna assidue adhibe- antur. Ex Chirurgicis prædictis in tumore orto aliquando velicatoris posteriori cervicis parte adnota, quatenus portionem feri peccantis deri- vant, non contemnendi sunt usus, & fibrillas commovent.

Externæ quoque applicantur varia, quæ præsertim calore suo laxent poros, humoresque ad motum incitent, laudatur in eum finem nostrâ experientiâ Empl. stict. nostr. vel *Paracels. Magnet. Sile. Oxyroc. Diachyl. Caricæ* cum butyro fixæ, Gum. Ammon. Galban. crocat. *Mys. V. gon.* cum Sio, nostrum & le. Emplastum ad Parotides *V. Videt*, quod sequens est:

Emplast. magnet. A. Sal.

Diachyl. aa. 3ß.

Ol. N. M. q. f.

Camphor. gr. iij.

M.

Emplastum de melilot. cum gum. Ammoni. in + solut. anat. portione malaxac. ol. nicotian. irin. scorpion. applicatum egregiam sæpe navat operam; sic & hæc dicta olea illinantur & dein imponatur emplastum. Suppuratione jam facta ulcus mundificandum cum digestivo communi ex therebinthina, vitell. ovor. & ol. rosac. cum aa. 3j. adde camphoram.

Internæ quoque varia excellentia & acidum corrigenia exhibeantur, omnem ferè paginam absolvunt Alexipharmacæa diaphoretica, inter quæ palmariis præcipit spec. cephal. D. M. in omni Parotide cum vel sine malignitate proficuum, ut & pulvis ipsam ac temperans noster. Nec pejoris notæ sunt Gum. diaphoret. Antisept. & Stomach. *Poter. bezaord. min. Syolat. C. C. viperar. omnia cinabarina, liq. C. succ. Tinct. bezaord. N. flor. Sio.* Sic etiam diuretica ad superfluum serum ad renes mittendum conducunt, danda in hunc finem varia abstergentia. *Q. Gat. Absinth. geust. & C. Purgantia* tanquam acria hic nocent.

Hic affeetibus etiam adjungi potest *Antich-* Auricularia deficientes relatiendi ratio à *Taliacotto & ram. def.* *Paræo* excogitata, sitque, si portio ejus dilace- tum reser- rata aliqua adhuc in parte reliquæ adhæreat. ean- diu dila- tem stylo aliquot locis perforando, & vinclis commodè adnectendo, postmodum emplatris consolidantibus ejusdem agglutinationem & accrescentiam promovendo, qui annexus quàm fieri potest citissime ab ipsa latione & dilacera- tione præstandus est. In totum verò deficiente auriculâ, si à primo ortu, seu per infortunium aut penam oratio ista obigerit, ad fræditatem contegdam artificialem conficiunt auriculam ex conglutinata pyrrho aut corio, eamque ita aptatam, ut alteri correspondeat, funiculis ex vertice aut occipite commodè vincunt, quo capillus nutritus vel pileolum gestarum fraudem istam affabre celet & obtegat, quâ de

Q.

causa

causa etiam pictoris industria carnis colore infucata & virgula fereâ occipiti circumposi-

tam, instar oculi artificialis impositi & affixi, in deperditæ locum annectunt.

## CAPUT XV.

## De Sonitu &amp; Tinnitu Aurium, Obauditione &amp; Surditate.

## §. I.

**M**Orbi, qui superius explicati sunt, diminuant saltem sensum auditus, Sonitus verò & Tinnitus depravant, Obauditio imminuit, & Surditas planè ipsam tollit. Depravatio autem hæc in eo consistit, quod Auris sonos percipit qui non sunt, vel qui minimum non sunt extrâ ipsam, ita ut occupata jam à sono interno, minus apta sit recipiendæ impressioni sonorum externorum, nisi sint admodum violenti & impetuos.

**Surditas.** *Surditatem* dicunt, ubi in totum Auditus fuit abolitus, Germ. die Taubheit.

**Obauditio.** *Obauditio* est soni externi obscura saltem perceptio, in qua per densam quasi nebulam radiis soniferis penetrandum est, Germ. das üble hören.

**Sonitus & Tinnitus.** *Sonitum* vocant vulgo das Gausen und Brausender Ohren/ Tinnitum verò das Klingen/ quæ duæ depravationes Auditus ab aliis species quædam Obauditionis constituuntur.

**Parti afflicta.** §. 2. Vitium horum affectum latet vel in aurè externâ, vel in meatu auditório, vel in membrana tympani, quando in Tinnitu p. n. movetur, vel in surditate, quando rumpitur à causâ violenta, vel exeditur à spiculis acribus, vel ab iisdem exulceratur. Sic etiam sæpe vitium latet in nervo auditório, si vel est obstructus, vel compressus, vel vitiosè conformatus; frequentius tamen in interioribus illis cavernalis per exiguis laminâ olèa vestitis, si illæ viscidiores quâdam lymphâ obducatur aut oppleantur: sic & in ipsis succis circulantibus imprimis succo nervo causâ latere potest.

**Diagnos.** §. 4. Vitia hæc Sonitus, Tinnitus, Obauditionis & Surditatis cum per se pateant, non operæ pretium est ducopura de his adungere. Cognoscenda potius surditatis causâ, quapropter si surditas baculum dentibus admoveans sonum percipiat, inde colligere licet, vitium in nervis non esse, sed fortassis in meningibus meatus auditórios.

**Galenicorū opinio de causa Sonitus, Tinnitus & Obauditionis.** §. 4. De Causis horum inbororunt quædam Galenici, in Sonitu & Tinnitu Aurium, nec non Obauditione, ut causam conjunctam accusant flatum aërem innatum præter naturam commoventem, unde spiritibus auditoriis falsâ imprimatur soni imago; ut antecedentes verò causas omnia, quæ flatum in auribus vel excitant, vel aliunde ad aures transmittunt, ut hilmores vapores, vel in ipso capite vel in aliis corporis partibus contentos, quorum priores tinnitum per se, posteriores verò per consensum producant. Vapores autem hos ad aures elevati volunt vel ex fordibus in sanguine detentis, vel è ventriculo crapulis & ebrietate debilitato, vel ex pulmone, liene, jecore, utero; & quandoque è toto corporis habitu male affectis, eosque tum per arterias & venas, tum nervum auditorium; tum membrarum continuitatem in meorum aures internam delatos aërem innatum diversimode impellere; idque eo magis, quo sensus organi sit exactor & facultas debilior. Diversas autem sonituum species à diversitate

flatuum eorumque generatione vel assidua, vel interruptâ produci dicunt, ut sonitum ex flatu crassiori, tinnitum ex flatu interrupto, obauditionem verò humorum jactatione, & sic in cæteris horum sonituum speciebus procedendo juxta flatuum dispositionem.

*Surditatis causam efficientem ponunt quod Surditatis* umque receptionem & judicationem soni in Auribus impediens, five hoc contingat ob debilitatem facultatis, five læsionem instrumenti auditus primarii, aut partium subministrantium. Facultatis audiendi læsionem fieri dicunt vitio vel cerebri, vel nervi auditórios vel spirituum. Partis primariæ, seu Aeris congeniti culpâ eandem fieri volunt, si ille vel deficiat ob continui solutionem membranæ tympani, aut dissipationem, aut defectum nutrimenti, vel impurus redditus sit à materia quâdam vitiosa, modo à cerebro, modo à toto corpore prolata, & eidem se immisceat. Inter partium ministrantium vitia recentior meatus auditórios malam conformationem aut obturationem per obstructionem ab humoribus crassis, configurationem ex inflammatione, tumoribus, tuberculo carnosio, aut ulcere male curato, compressionem ex ictu & fractura. His adjungunt vitia tympani, crassitatem nempe & densitatem, tum à primo ortu, tum post eum ab aliis causis inductam, nec non ossiculorum auditus malam conformationem originalem & dislocationem à variis causis, tum exteris, ictu, casu &c. tum internis, humorum nempe affluxu, inflammatione, &c. obtingentem.

*§. 5. Paracelsus in Auditus depravationem, ut Paracelsus* Tinnitus Sonitus & reliquarum specierum causam judicium de causâ aurium Sonitus & Tinnitus modo enim easdem refert ad guttam, modo à fluxionibus capitis orti vult, ut quid tandem pro rato habuerit, vix cognosci possit, sed aliquando prioribus consentaneæ necessitate quâdam coactus fuisse, apparet.

*Surdus* nasci vult ex domi illi defectu, in quo morari debet auditus, quamvis enim hic ipse non sit exto, vel ex eo, de quo nascuntur aures, sed hæc organa tantum sunt illa corporea, vel serena, in quibus nascitur sensus auditus, attamen corpus hoc spirituale operationem suam non perficit in loco male disposito, quare organis illis vel originaliter, vel aliunde post ortum corruptis surditas inducitur.

*§. 6. Helmontius* depravationem auditus ad scribit delirationibus spiritus acoustici in labyrintho aurium commorantibus, quatenus ille species externas sonoras non debite excipit, sed Tinnitus illis relicti propriis suis commotionibus internis phantasticam quandam ideam Sonitus aut Tinnitus efformat, dum ab hospite quodam alieno, ex materiæ excrementitia sæpe exurgente, ad exandelecentiam irritata species quasdam falsas in imaginem rei sonoræ excudit, quas anima sensitiva internum, seu veras percipit, donec diuturniore con-

templatione erroris communefacta, aliquando etiam trahitur aut irascitur, sicque partes aurium membranofas ad finilem passionis perceptionem commoveat, ut tumultum istum fedate & exosum hospitem eicere conentur, cui operi tamen peragendo sæpius impares vires ostendunt, nisi aliis adjuventur remediis.

**Surditas.** *Surditatem* oriri credit à defectu luminis vitalis, quo anima sensitiva ad quemcumque sensum, adeoque etiam auditum præstandum, prædicta esse debet, dum illud à contagio quodam venenoso, sæpe ex inferis ad organum auditus, & spiritum in interiore ejus contaminatione habitantem affurgente extinguitur, aut oculo illo instrumento auditus externo suffocatur, quo tum delicta hæc in parte anima sensitiva nihil de speciebus sonoris amplius percipit, si quidem ipsum organum suo prius sensu fuit privatum, ut nullas species ad archetum & animam sensitivam ulterius valuerit deferre.

**§. 7. Vnde videtur Sonitus & Tinnus aurium provenire à particulis quibusdam salinis, ex sanguine aut succo nervolo cavitati aurium interiori, & imprimis specui sono excipiendo alias destinato illari, quæ fibras membranarum & nervorum auditoriorum agitant, & undulationem in spiritibus excitantes id præstant, quod species sonoriificæ simili sale prædictæ ab extra admittit, quapropter ejusmodi perceptio soni ope spirituum communi offertur sensorio, qui pro diversitate particularum salinarum tum crassiorum, tum subtiliorum, variat.**

**Surditas.** *Surditatis* causa modo laet in membrana tympani laxiore, unde non nisi ingentem fragorem transmittit, modo in meatu auditorio à cerumine spissiore & lapidescente, vel aliis excrecentiis aut rebus toto genere præter naturam obstructis, vel corrupta membrana antrum obducunt, aut spirituum defectu vel crassitie & nervorum, ranulorum nempe duorum partis quintæ, obstructione, compressione aut dilaceratione.

**§. 8. Symplicium Depravationis Auditus, adeoque Sonitus, Sibilus, Tinnus Aurium & Obstructio** aurium causam statuit sonum præter naturam in ægri aure mutatam, vel excitatam à vaporibus & habitibus aut sursum elevatis, aut ibidem productis, & falsa sunt externi specie illudentibus,

**Surditas.** *Surditatem*, sive auditum abolitum, vel nativum, vel adventitium esse cognoscit, surdosque à nativitate simul & mutos nasci & permanere, cum voces articulatæ non audiant, sicque eas imitari nesciant. *Surditatis* verò adventitiæ causam novit vel in externa auris cavitatè hærete, vel internâ, modo in tympano, modo in nervo, aut spiritibus animalibus, aut cerebro. In externâ cavitatè hærentem causam originem debere assentit fœdibus collectis & induratis, aliisque rebus forinsecus obvenientibus & aures obturantibus. In interna cavitatè excitatum apostema *surditatis* causam esse; sic Tympanum quoque modo ruptum, nervum auditorium exsiccatum, vel ab humore intra membranam ejus contento oppressum, aut à tumore quodam vicino coarctatum, Spiritus animales torpidos & immobiles, ac denique cerebrum graviter læsum, concusum, vulneratum, aut corruptum

*Surditatem* inducere posse existimat. Difficili & gravi Auditum, seu *Barycoia* easdem assignat causas, sed leviores, nec non humores tum caput universum, tum in specie Aures occupantes, & catarrhi nomine vulgo insignitos.

Histandem adjungit *Auditum autem*, nempe eundem acutiorem, quæ laborare dicit illos, qui minimos sonos etiam dormientes observant, & inde expergiscuntur, ejusque causam adscribit sensorio perfectissimo, & quodammodo plusquam perfecto, & simul valde tenero, ut ad minimum cujusvis objecti motum excitetur, & quamvis tali sensorio præditi quamplurique alii objecta accuratius & distinctius observent, sensorium tamen illorum facile molestiâ quadam affici, si vel minimum ab exacta mediocritate objecta recedant, quare & sonum illis hominibus valde levem & continuo ferè interruptum esse, non sine magnâ quadam adjuncta molestia.

**§. 9. Cariesani** Auditus depravati, ut *Sonitus* rum rationum, *Sibilus*, aliarumque ejus specierum causam adscribunt rei cuiusque fibras membranarum Auris interioris commoventi, sequæ interdum Aëri interno committenti, & similem quandam modificationem motus intra membranas istas inferenti, quam à radiis soniferis patiuntur, sive sint vapores varii interni, sive percussiones capitis autumque, sive harum obturationes, agitationes cerebri circa partes illas, intra quas nervi auditorii fibra terminantur, hujus & spirituum motus irregulares & extra-ordinarii, ut in delictis, vertigine &c. quibus annuerant defectum aliquem ex quatuor illis officialibus interioribus carie separatis & excidentibus, unde organi structura corrumpitur, & motus aëris interioris alteratur.

*Surditatis* causam frequentiores statuunt obstructionem nervi auditorii, vel ejusdem compressionem à sanguine, aliisque liquoribus vasa luegessis, quibus addunt occlusionem meatus auditorii, vel à membrana præter naturam eidem innascente, vel à cerumine inspissata & lapidescente, vel excrecentiis aut glandularum aurium à serosa colluvie factâ intumescentiâ, meatum comprimentem & angustantem, vel à rebus extraneis intrusis, nec non ruptionem aut indurationem tympani, quatenus hæc transitum aëris in meatum interiore denegat, illa verò, quamvis statim *surditatem* non efficiat, cum tempore tamen eidem futuræ ansam det, transmissis quibuslibet aëris particulis, etiam acrioribus, internas aurium partes destruentibus, & quandoque ossium capsam & labyrinthum constituentium cariem inducentibus, à qua cavitas illa ita reddatur inepta, ut nullus imposterum sonus in ea efformari possit, sed *surditas* planè subsequatur.

**§. 10. Nos** causam horum morborum nunc explicandam aggredientes, primo naturalem Auditum statim perpendimus, antequam ad præternaturalem accedamus, ut eo felicius causas defectus evetire possimus, & rem omnem breviter & extremo veluti digito tangemus, ut ex tot variis sententiis indidiorem propinuemus. Ec cum aures & oculi uno modo, hoc est, minus corporaliter afficiantur, merito inter sensationes præstantiores numerari solent. Existimamus ergo auditum fieri per motum sonoricum

*Auditum autem.*

*Cariesani.*  
rum rationum de causa Auditum Sonitus & Sibilus.

*Surditatis.*

*Nosra sententia, de causis Auditum & modo auditum.*



tremulem ad Tympanum, membranam hanc, quæ est expansio nervi auditorii, & ad ipsum nervum auditorium delatum & partes hæc commoventem, quando nimirum ær percussus motum talem distinctè imprimi auditus organo, ex membrana Tympano, quatuor officulis & nervo auditorio constanti, ad quod tamen negotium, ceu inferius dicemus, reliquos apparatus & elegans totius auris machina requiritur; sine enim ære nullus percipitur sonus, ceu experimento constat sequenti, quod præfente Sereniss. nostro Principe Carolo Hassia Landgravio, Dn. meo clementissimo institutum: Vitro imponatur Campanula cum malleo, & ex vitro extrahatur ær, & pulsetur campana, quo factò nullum audies sonum. Ut enim radii visivi impressionem faciunt in partibus oculorum nervosis, sic etiam motus tremulus ad auditus organum primarium, nervum seu auris internum terminum, cochleam scilicet. pertingit, hæcque plus sensibilitatis à nervo majore habet, hinc existimamus (speciem impressionem in eâ fieri, præsertim cum lamina hujus spiritalis seu testudo facile contrahere, sonosque egregie multiplicare & refractos nervorum fibrillis potenter imprimere queat.

Instrumentum auditus non necesse est ut actus sonorum fiat, sed huic talis sufficit dispositio, per quam ab objecto percussum in sensorium commune ita vibretur, ut hoc tale objectum adeo judicet nostra anima, quale quid nervum hujusque reiformem expansionem merito nobiscum suspicantur plures Auctores. Quod verò motus hic tremulus tardius ad aures, quam radii visivi ad oculum perveniant, hæc ratio est, quatenus innumera æris solidioris particulæ particulis vel radiis sonoris in motu constitutis totidem & infinitas moras neunt, per quas non adeo velociter & in momento quasi terminum ultimum attingere possunt, cum è contra lucis particularum propulsus ac motus simplex & directus magis sit, i. e. per lineam rectam potius contingit: transit ergo sonus per æris partes, quæ luminis non resistunt, & hic lumen citius videtur, quam sonus percipitur. Concessis ergo illis clarum est, quod auditus fiat, dum diffusus in orbem sonus ad aures externas appellat; indeque in internam flectitur. Alii dicunt, hoc fieri per undam vocalem vel circulum sonorum, quod tamen paulò generalius dictum est, sc. non per superficiem illam circuli rotundam, sed per lineas rectas ab illa superficie mathematica decedentem, vel potius contrario modo ductas id fieri existimare par est. Motus hic tremulus recta decurrit lineâ, dum nullum impedimentum invenit, nec tamen huic obstat, quo minus nonnunquam per obliqua audiamus.

Sonus verò in prima cavitate ab anima minime percipi certum est, quia nulli nervorum rami hic terminantur, invicta enim veritas est, sensum sine nervis nullum prolixum neque in aures, neque in oculo, neque in naribus aut lingua fieri posse, ex quibus prædictis colligitur, sonum hunc in os alissum ab illo reflecti pro lege reflexionis in latus, quod ex adverso est, rursusque alio ire, ut motus tremulus in illud incidat, nervumque, qui in his latibulis latet, ipsiusque expansionem membraticeas moveat, sonus autem ab eadem ex concha in cochleam ac labyrinthum, nervus enim utriusque proxime adjacet, & in quo excubias agentes spiritus animæ

referunt, si quid moveatur, & ut brevius sim, sonus collisione duorum corporum ortus, se per ærem undique diffundit, ea tamen conditione, ut si impingat in corpus durum, æquale ac leve, reflectatur pro superficiei illius duri corporis dispositione.

Præmissis hæc ad statum morbo sum nunc accedamus & videamus causas Sonitus extraordinarii & Tinnitus auriæ, statuimus ergo, hos affectus ut plurimum oriri sequenti modo; quemadmodum falsa luminis species, quæ ab objecto externo non producuntur, nihil habent distinctum & exactè visibile, sed lumen duntaxat simplex, ita etiam nunquam penè contingit, ut soni in aures, de quibus sermo nobis est, quicquam exhibeant, quam confusum illum sibilum & tinnitum, qui sunt alioqui voces maxime distinctæ, in hoc autem symptomate sunt simplicissimi. Uno verbo, quicquid commovere potest nervum ipsum auditorium, mediante aere, (sine aere enim ceu dictum nullus percipitur sonus) vel ejus continuos furculos, membranas & tympanum, aptum est producere vel sibilum, vel strepitum, vel sonum, vel tinnitum, affectus enim hi tantum secundum magis & minus differunt. Hinc omnes causæ externæ hic recenseri possunt, quæ tantum nervum auditorium cum annexis membranis movere possunt, ex enim animæ talem tinnitum aures offerunt, adeoque si sanguis turgescat in febre, ibidemque coarctatio seu pressio æris fiat, nervus iste commovetur, & sic affectus hic producit, hinc vapores, status alique halitus volatiles peregrino ex prunis viis ad pertingentes affectum hunc excitare possunt. Sic existimamus quoque soni falsi perceptionem fieri posse abs ullo vitio organorum auditus, sed ab ære spirituum animalium, seu succi nervi crassitie nimia spiritus enim hi præter naturam agitati, vel alios nervos, qui cum filamentis nervi auditorii communicationem habent, commovent, & ita tristem hanc sensationem producant, & sic oritur sensatio falsi istius soni, quod probatur ex eo, quod hic affectus læpe & penè semper conjunctus esse potest cum delirio, phrenesi, vertigine, epilepsia, &c. nervi enim auditorii æquæ à cerebri incolis moveri possunt, ac in aures, sic & spiritus hi variis heterogeneis particulis innati & ad nervum hunc ducti hunc Tinnitum producere possunt, & hoc fit eodem modo, quo in vertigine, in qua notum est, solum motum circulem spirituum eandem affectionem producere, ac si objecta visibilia revera habere & motum illum circulem, vel in phreneticis, qui festucas videre credunt, quæ non sunt, quod fit per solam concussionem nervi optici intus in cerebro à spiritibus itaque quemadmodum suffusio sonum & phreneseos symptomata referuntur vulgò ad imaginationem depravatam ita eidem causæ tribuendi sunt tinnitus, qui accidit morbis auris, quamvis sæpe nullo modo dependeat à prava dispositione organi auditus, hinc optimè statuuntur Tinnitus duo genera, quorum unum ab effectibus cerebri & ipsius incolis, spiritibus dependeat; alterum à morbis ipsius auris. Tinnitus verò qui auris morbos sequitur, vel est verus, vel falsus, & ex his quidam tinnitus proprie dicuntur, quidam sibilus, quidam fremitus, pars verò murmuræ, & hoc accidit tantum à concussione vel debili, vel fortiori & intensiori. Rheumatismi & suppurationes, in quibus fibrillæ nervorum & membra-

*Nostri sonitus, de causa Sonitus & Tinnitus auriæ.*

brantium relaxantur, ordinariè futurum excitant, inflammationes autem & dolores auris, à quibus ut plurimum hæ partes tenduntur, ubi-los & tinnitus, & ut contractis velis tem proponam, causa tinnitus aurium vel provenit ab infimo ventre, vel inquinato sero & spiricibus vel fatibus, vel à spirituum animalium *crassa* in cerebro, vel eorundem paucitate, vel à ardore sanguinis & succorum circulatione, præsertim in aurium membranis stagnatione, quæ tunc acres existentes, continuo vellicant ac commoveant fibrillas, inde succus nervus resulat ad cerebrum, ibidemque hunc sonum producit; imprimis si succus hic vaporibus multis inquinatus est.

Cum nervus auditorius difficilis movetur, quod fieri potest vel vitio auri externæ, cum fuerit abscissa, vel meatus auditorii aliquantum vel in totum obstrictus, vel ab internis vel externis illapsis, aut cerumine, vel vitio humorum offensa vasorum prope autem in tantum obstruendum, vel à mala dispositione nervi, ossiculorum anastoriorum, tympani aut meatus externi, *difficilis & gravis redditur Auditorii.*

*Sententia nostra de causa Surditatis.* Cum vero nervus auditorius immobilis est, vel in eo contentus succus stagnat, totalis *Surditas* oritur, ejus causa ut plurimum latet in meningæ meatus auditorii, si vel rupta, vel exesa, vel exulcerata, sæpe tamen latet in ipso nervo auditorio, si vitiosa à nativitate fuerit conformata, & in alium locum, quam aurem internam derivatur, aut si in totum fuerit obstrictus, aut à vicinis nimis compressus, adeo ut spiritibus animalibus crassis omnis transitus fuerit præclusus, quod fieri potest à causis externis, ut à casu ex alto aut nimio sonitu, quin morbis etiam acutis supervenit ad statum properantibus & per hæmorrhagiam criticam finitur. Sæpe etiam latet in defectu spirituum animalium, quando non influunt & resiliunt, sic videmus in moribundis, quod non audiunt, quod evenit à coagulatione & stagnatione tum sanguinis tum reliquorum succorum. Multi tympanum ruptum tanquam unicum surditatis causam allegant, sed modo cum non, ut illi putant, pulseatur, sed alias functiones habeat, de quo videatur Nob. *Schellhammer*. Sæpe etiam causa latet in primis viis in Chylo, seu id sæpius observavimus, nonnunquam & Surditas à cerumine retento suboritur, quod aliquando petrificatur, ut sic radii sonori, seu motus tremulus aeris ad nervum auditorium pervenire nequeat. Sic & alia excrecentiæ, item intumescentiæ glandularum hunc meatum obstruere possunt, & quidem premeendo nervos, succum nervum influere impediunt.

*Pregressi* §. 11. Percognito sic affectu non minus invenit, ejusdem quoque eventum prænosse, hincque egri saltem & mortem, item morbi longiduriam & brevitem, modumque eventus quantum possibile prænunciare, utpote quod quæsum summan sæpe auti soneratur gloriam, quare æqueam curationem aggredimur, de Tinnitu & Surditate *Prognosticon* præmittere decebit. In genere autem Tinnitus aurium nullum maximum inferre periculum, & in febribus ardentibus sponte citari solet, sed aliquando diu perseverans obauditionem, & ræo surditatem producere potest. Quod si murmur aut strepitus adest, tunc difficilior est cura,

quam Tinnitus. Sic & in senibus ræo medelam recipit. Tinnitus etiam hic, ut sæpe observavi, est præco & antecambulo apoplexiæ. Sic & teste *Cos S. 3. A. 17.* austrinx constitutiones corpora exolvunt & huncant, sicque auditum hebetant. Idem *S. 4. A. 18.* ait, quibus dejectiones sunt biliosæ, superveniente surditate cessant: & quibus surditas adest, biliosorum dejectione finitur. Existimat enim *Hippocrates*, surditatem fieri excrementis biliosis retentis & ad caput recurrentibus, taleque surditatem cessare, alvo turbata, & bile per inferiora dejecta, dummodo non hæctica fuerit surditas, sed repente in febribus facta; quod tamen salsum est.

Extra omnem dubitationem aleam ponimus, istam surditatem, quæ vel à vehementi percussione capitis, à lapsu vel ictu, vel à nativitate, vel ubi in organis & nervis, imprimis auditorio, aut aliis auri partibus lægat dispositio præternaturalis, semper esse incurabilem, imprimis in senibus.

§. 12. Deducitur nunc ad fontem *Dietæ Cura Dicitur*, auxiliis distisum, utpote ejus solius *medica*, beneficio sæpe gravissimi tolluntur morbi, & quo sine etiam ut plurimum frustra laborare solent Medici. Consistit autem in legitimo fex rerum non-naturalium usu, hæctenus à Medicis hoc nomine dictarum.

*Aer* itaque, quo surdaster fruitur, sit purus ac temperatus & clarus, non nubilosus, humilis, ac frigidus, qui maxime nocet nervis, auditorio enim maxime inimicum est frigus quocumque modo admittum.

*Cibi* quoque sint facilioris digestionis, boni succi, ut spiritibus nervo auditorio inhabitantibus robur inde accedat & circulatio promoveatur, vitiosa & gummosa, adeoque frigida & vaporosa ut sunt omnia legumina, carpe, rapa, & id genus alia, nec non omnia quæ diximus superius de visu, hic etiam nocent. Sic etiam *Potus* sit optimus, imprimis cerevisia benedicta, ac herbis eticis maritima, vel vinum generosum modicè potum, roborat enim ventriculum & spiritus corporis augeat, ubi inde languent. Vitandæ vero sunt omnes potationes & ingurgitationes immodicæ, præsertim vini, hæc enim ratione ventriculi tonus & fermentatio destruitur, massa sanguinea nimia crudiatum accumulatione vitatur & spiritus debilitantur. Potus Thee hic etiam sumit opere conducit, quia circulationem sanguinis ac reliquorum succorum adjuvat.

Corpus quoque *quiescat & somno* indulgeat longiori, ubi in aurem oppositam cubandum est, nec *motibus animi*, curis, mœtore, terrore, metu, irâ, meditationibus, amore, nimiove Veneris usu abigantur spiritus animales, aliis non sufficient ad auditum producendum. *Motus* vero nervorum tubulorum obstructionibus multum conducit, & corporis exercitium modicum.

*Alvus* sit libera, melius enim est, eam ad mentem *Hippi.* laxam esse, quam adstrictam, obliqua ergo officii per *Grea* admonetur.

§. 13. Restat adhuc exponenda ipsa *Cura Pharmacæutico-Chirurgica*, quam *Galenicus* in *secundum Tinnitu, Sonitu, Sibilo, Obauditione*, aliisque de *Galenicis* prævati auditus speciebus ad ipsam dirigunt causam, à qua symptoma illud sit productum, quæ

*Cura Pharmacæutico-Chirurgica*  
*in Tinnitu, Sonitu & Obauditione*  
quæ

quæ, si sanguis sit nimium ebulliens, eundem venâ secta emittunt, in cacochymia multorum crassiorum & viscidiorum humorum, eosdem prius incisos purgantibus superadditis evacuant, pilulis videlicet cochleis, sine quibus, Hiera Pachi, Hiera Ruthi & sim. masticatoria etiam caput exsiccantia subjungunt, nec non frigidiores & lotiones capitis cum decocto abanth. heron. hyssop. roreinar. majoran. fol. lauri, spicæ nardi, intemperiem quamcumque debent corrigunt, & tandem statim & vapores dicuntur, auribus immisso fumo ex decocto aneth. rutæ, chamomill. spic. sem. anis. cum carv. fœnigr. in aq. & aceto, vel instillatis guttulis quibusdam ol. amygd. amar. costin. nardin. vel sequentis compositi.

℞. Ol. Castor. ʒij.

Costin. ʒij.

amygd. amar. ʒiſs.

Aq. ardent. ʒiij.

ebulliant omnia simul ad consumptionem aquæ, liquor residuus servetur ad usum.

Sordes aliaque meatui auris inharrentia præcipue eximenda. In critico & febribus quandoque superveniente Tinnitu ipse Galenus veteris nimium propere ad medicamenta accedere, sed caveri vult, ne crisi aliquid fiat obstaculum, eam enim suo bene functâ munere, Tinnitum illum facile cessurum promittit, at si levis sit, facilius expultricem situ aliquo, us decocti resolventis, ut absint. Chamomill. Castor. croci, &c. facile juvare possit, ut vaporem molestem excutiat.

In Surditate.

Surditatem plenariam, ubi ipsa functio penitus perit, remedio ulli cessuram esse planè negant, eam verò, quæ à debili facultate, aut morbis cerebri, nervorum, vel aurium proveniat, & adhuc sit in fieri, aliquando curabilem aut emendabilem esse concedunt, cum vel solâ manus cavatæ admotione facultas imbecilla juvare possit, ut sonum facilis & fortius percipiat, aucta sic quasi aure, ut sonus magis unitus in eandem ingrediatur. Tympanum verò æstum, aut ab ortu male conformatum, arte redintegrari aut corrigi non posse unanimiter consentiunt, & à biliosis humoribus sursum vergentibus ortum habentem surditatem, ut in febribus itidem aliquando contingat alvo turbata & dejectionibus biliosis subsequens denudè cessare, quare easdem aliquando promoveat cholagogis exhibitis, ut electuar. & succo rosar. Insul. rhabarb. &c. ab humoribus autem crassiss & pituitosis inductam curari dicunt incidentibus pituitam & resolventibus, Oxym. simpl. lyr. hyssop. stechad. & tandem evacuantibus, ut agar. trochisc. pil. coch. aur. aggregat. sicut melancholiam peccantem decocto fol. sen. Syr. de lupul. & simar. prius præparatam, electuaria Diabazener, Hiera Logad. pil. coel. cum helleb. de lap. Lazuli &c. evacuant. In specie quoque ipsi caput à labritia peccantium humorum liberare tentant apoplegmatis, errhinis, & sternutatoriis, Hicce omnibus subjungunt topica auri immittenda, ad humores viscidos incidentes, attenuandos, & obstructions aperientes, ut fomentum ex decocto rad. alari, cucum. asin. cyper. herb. heron. hyssop. puleg. origan. thym. flor. chamomill. stechad. Arab. caryophyllor. mac. croci, suffumigium ex thure, mastiche, succino, ligno

aloes, fella animalium quorundam guttatim instillata, ut apri, leporis, pinguedo anguillæ, sanguis corvi calens instillatus, vel sequens oleum.

℞. Rad. Cucum. asin.

Colocynth. aa. ʒiſs.

Castor. ʒij.

Mixta & diligentius trita infund. in

Ol. laur. ʒiij.

raphan. ʒiij.

Stent in infusione per dies tres, postea ad tertiam partem consumptionem leviter ebulliant, quod restat exprimatur, & colatum servetur ad usum, de quo calefacto aliquot guttæ tempore somni instillantur auri.

§. 14. Paracelsus in Tinnitu & Sonitu aurium ad destruendam oppilationem à fluxionibus inductam exsiccantia capiti admoveat ex herb. betton. fol. roreinar. flor. stechad. auri verò ipsi instillat quintam essentiam folior. alar. aur oleum succini & caryophyllorum

Surditatem originalem penitus incurabilem pronunciat, cum illud, quod natura semel adiecit, à Medico nullo pacto reparari possit, in ea verò, quæ sanabilis existit, oppilationem itidem relemandam præcipit, indies simul auri aliquot guttulis balsami sulphuris, aut essent. ambr. & helleb. nigr. vel etiam olei philosophor.

§. 15. Helmontius ad Tinnitum & Sonitum Aurium inhibendum oleum corylinum multarum esse virium existimat, si auribus instilletur, interne verò sulphur vitrioli ad exolum illum hostitem domandum, & peregrinam ideam destruendam, non parum juvenis additurum sibi persuasit.

Ad impressionem Surditatis obliterandam laudant Auctoribus huius sedatores succum vineæ pervincæ auribus instillandum, uti & fel leporis cum pauillo mellis commixtum.

§. 16. Willisius in curandis Sonitu & Tinnitu aurium eo potissimum operam locat, ut peregrinæ & heterogeneæ illæ particule salinæ in aurium meatu existentes, fibras agitanter, & spiritus turbantes temperentur, & qua fieri potest ratione eliminentur, quamobrem si massa sanguinea huiusmodi particulis abundet, eandem corrigit variis decoctis & aquis destillatis ex rad. ar. pecon. Serpentar. virgin. herb. chamadr. fumar. Card. bened. roreinarino, &c. cum sero lactis paratis, si verò copia peccet & æstuet, etiam venâ sectâ eandem immittit. Si sanguis sit cacochymus, humores peccantes evacuat pilulis de succino, resina Jalapp. vel Aque Gu. Dein ut spiritus recreentur in ordinem redeant, medicamenta commendat sale volatili prædita, tincturam videl. succini, spiritum C.C. talisannon. cum aqua roreinar. saliv. puleg. &c. Meatus etiam auditorius ut ab omni materia impura depurgaretur & pervius fiat, & si quid in eo hæreat, radios sonoros immutans, illud discutatur, aliquando vaporem ex foris panis calidi, cui spiritus vini superfusus fuit, auribus immittit, vel ex decocto herbarum capheicarum, aut spiritus acoustici guttulas aliquas instillat, vel lolan tincturam castorei, aut oleum anygd. & rutæ, cum oleo destill. macis.

Surditatem à tympani laxitate obortam Surditatem interdu emendari posse opinatur admissio fumo aliquantum exsiccante & sbris pristinum

tonum

Paracelsi  
remedia in  
Tinnitu &  
Sonitu.

In Surditate.

Helmontii  
remedia in  
curandis  
Aurium  
Tinnitu &  
Sonitu.

Surditate.

Willisii ratio  
curandi  
Aurium  
Tinnitum  
& Sonitum







hantur capiti, sic & vesicatoria post aures vel in cervice ponantur, quæ obstructionem poros aperiendo tollere solent: sic & in hac specie Tinnitus magis conveniunt oleosa & spirituosâ, quia magis discutunt & roborant. In susurris aurium & malitiora commendamus ad phlegma elucidandum, & circulationem promovendam.

*Doctrina sententia de surditate.*  
In *Surditate* cura variat juxta causarum diversitatem, & quidem nulla est, ubi vel nervus auditorius immobilis, vel plane ruptus aut abscissus, vel exesus, vel vitiosè à nativitate fuerit conformatus. ubi verò aures externa & interna à cerumine fuerit obcurata, id emollientibus attenuari potest, ex gr. succ. absinth. rutæ, cum Spir.  $\square$ , & vapores ex emollientibus, melius verò est cerumen istud viscidum peculiari instrumento vel scalpello exinere; sic novi civem quendam Hanoviensem, Bernes dictum, plures ejusmodi speciei surditates feliciter curasse. Possunt & hic varia corroborantia instillari, semper verò cum ol. amygd. maritata, vel ol. nucl. persicorum.

Quidam Chirurgus aliquot surdos curavit hac methodo. altè inserit fistulam tabaci & quidem ejus partem subtiliorem in auris cavitatem, tunc vehementillâ suctione ori admovent alteram fistulæ partem crassiorē luxit, ægri hac suctione percepit aliquid doloris in aure, ast hac methodo curati sunt, auditusque restitutus, confer. *Eph. G. D. II. A. 6. obs. 123.*

Ubi verò *Auditus difficilis* oritur à defectu spirituum animalium & eorum tardiore circulatione, pro succo nervo roborando & eo corrigendo, remedia ambrata & moschata excellent, ut & omnia spirituosâ, ut sunt Spir. lil. conval. Aq. Apoplect. Anhalt. Essent. Castor. card. bened. aq. magnanimitat. Spir. formicar. lumbricor. acoustici. *Myrs. & Barbette*, cum bombace auribus admoti. Vel sequens formula sæpe cum insigni juvamine exhibita.

*℞. Herb. rut. recent. Mj.  
cep. medior. No. j.  
rad. cyclam. recent. No. j.*

*Incandantur & imponentur mortario lapideo, add.*

*summit. absinth. Pß.  
bacc. laur. No. x.*

*sem. carv. 3j.*

*amom. 3ß.*

*Macis tantund.*

*Caryophyllor. 3ß.*

*aselor. No. xv.*

*Contundantur omnia, sensim affuso spiritum vini, indantur vitro & per P. 2. stent in digestionē, postea exprimentur, liquor expressus servetur ad usum.*

*℞. hujus liquor. 3ß.*

*℥e volat. 3iß.*

*Essent. ambr. 3ß.*

*M.*

Dux vel tres ad summum guttæ instillantur auri, quæ bombace optimè occludenda erit, ne exhalent, sed ad interiora penetrant, tum enim non modo spiritus singulariter attenuantur, sed & nervi cum fibris membranosis insigne hinc percipiunt juvamen, eos sc. ad motum incitando, succo recens expresso rutæ nuper quendam à surditate liberavi.

Oleum etiam ex floribus & nucleis persici, exprell. & inditum in omnibus aurium affectibus commendatissimum est.

Si verò à catarrho & stagnatione feri oriatur Obauditio, tunc conveniunt varia anticatarrhalia, succinata, carminativa, ex gr. sæpius dicta Essent. carm. *℞* ed. cum essent. viperin. Spir. catarrhalis N. vel Spir. aromaticus ad extra N. quæ omnia quovis modo tubulos circa aures & auditorium nervium obstructos reterare, superfluum serum demere, vapores discutere & succum nervium invigorare apta nata sunt. Externè itidem varia lustrigia & prædicta specifica non negligenda sunt; pinguedo anguillæ pro restituendo auditu commendatur, anguilla enim dum assatur exstillat pinguedo, quæ ipsa excipiat foliis lauri & exponatur per tempus radius solaribus, ut clarescat, dein tepide instilletur auribus, postea obturandis, idque per se, vel additis olei anisi aliquot guttulis: omnia falsa volatilia auribus indici possunt.

In quacunque Obauditione quidam ægri auribus adaptant tubam quandam acousticam, ad modum tubæ illius, quæ veredarii utuntur, fabricatam, (*Wie ein Posthorn*) & sic melius vocem percipere possunt.

## CAPUT XVI.

*De Nasi Morbis, & quidem de Nasi Sarcomate, Polypo, Verrucositate, Ulcere, OZæna, Inflammatione, Macula rubra, Maculis seu punctis nigris, Naso deperdito & ejusdem figura depravatione.*

### §. I.

**N**asus ita locatus est, ut quasi murus oculis interjectus esse videatur. Dicuntur quidam Nasuti juxta *Martial. xiii.*

*Nasutus sis usque licet, sis denique nasus.*

Nasuti certe sunt, qui ex nasi magnitudine etiam de mole & magnitudine membri genitalis

judicare audent; ex magnitudine ejus melius iracundiam hominis harolari possumus, seu loquitur Sacra Scriptura. Nares profectò multum usum commodumque corpori nostro afferunt, per eas enim omnes odores intrant, item acir ad respirationem maxime necessarius. Sic

*R. 2 quoque*

quoque excrementa per nasum seu canalem effluunt, ad vocem quoque aliquid confert, & ad ornatum multum facit. Hinc nali abicissio adlateri pena fuit apud Aegyptios, quam Hierosolymitanis quoque minatur Jehovah apud Ezechielum, à qua deinde Chirurgia Curtorum nata. circa renascendum nasum occupata, de qua *Tahicotius* primus scripsit. Nares proinde, uti reliquæ corporis partes pure, merito suos castigatores, nimirum peculiare affectus, seu manes patiuntur, quos jam recensimus. Occurrit ergo 1. *Nali Sarcoma*, Germanis dicimus *Nasen Geschwür mit einem Fleisch-Verwachs.* *Sarcoma* enim & *Polypus* sunt excrecentiæ carnee in naribus obortæ. *Sarcoma* quidem certam figuram habet, sed caro est eidem ex humerosque similis, quæ in alius ulceribus luxuriose excrecere solet, hunc aliis *Hypertrophos* dicitur. *Polypus* autem in sua luxuriantia carnosa excrecentia certam quandam præ se fert figuram, atque radices agit exiles, quæ tanquam pedibus adhærescit, & sic crescendo nares opplet, in longum & latum se extendens, naribusque propendens similitudinem Polypi pilcis refert. Dicitur & affectus hic à nonnullis *Hæmorrhoides narium*, quia non dumtaxat hæmorrhoidibus in ano quodammodo assimilatur polypus, verum etiam profusionis sanguinolentiæ proles fit, uti illa in ano. Sæpè etiam polypus hæmorrhagiam narium sequitur ex sanguine illo in naribus jam sedato & con-

*Nali sarcoma.*

*Polypus.*

*Differentia Polypi & Sarcomatis.*

*Verrucositas.*

*Vici & Ozana.*

*Carcinoma Nali me tangere. Tentigo prava Lupus.*

*Inflammatio.*

grumato. *Differt* verò *Polypus* à *Sarcomate*, quod *Polypus* angustum habeat fundamentum, quod *Sarcoma* latum: adhuc *Polypus* habet carnem sui generis, & quo melius intelligas, ut *Polypus* referat tumor, necesse est in pedes aut cirros dividatur; ut *Sarcoma* sit, latus est, unam adellè & globosam verè partis protuberantiam: Deinde, *Sarcoma* magis in carnosioribus ac imis narium partibus generatur, *Polypus* autem in superioribus ad radicem nali, ubi interdum ad palatum propendit, ac obstructione meatui oris inolevis est, non raro è naribus prominet, modo albicans, nunc rubens, jam livens, tempore penilium & aultræ constitutionis longè plus turget, novilunii verò & aquilonis decrevit ac flaccidit, maximum incommodum infert tam respirationi, quam somno.

*Verrucositas* narium sunt copiosæ verrucæ externam narium partem carnosam occupantes, ipsasque mire delitantes.

*Vici* naribus etiam sæpe accidit, & si est inveterata malum, tunc Chirurgis dicitur *Ozana*, quod est ulcus facitidum & lordidum; cognoscitur ex eo quod in simplici exulceratione prodit pus album, in *Ozana* verò pus acre & lividum; in *Ozana* dolores sunt majores ac atrociores, quam in simplici exulceratione, & si simul exsilio partium adelt, cancrofa seu corrosiva esse incipit, quæ Chirurgis dicitur *Carcinoma* narium, Germanis dicitur *Nasen Geschwür*, naribus est ilcus quoddam inaximè corrosivum & serpens, aliis & dicitur *Nali me tangere*, nonnullis *Tentigo prava* vocatur, quibusdam etiam *Lupus*, ob horrendam narium partium depauperationem; incipit in quibusdam à male & intempestive curato Polypo, in nonnullis sponte enascitur. Hi affectus ergo secundum naves & minus different, quò enim causa pejor, eo gravius est malum.

*Inflammatio* narium sæpe hos affectus præce-

dere solet, quæ dependet ab obstructione partium circumstantium tubulorum, & detentione particulatum crassarum & acrimiarum moras ibi retentionum.

Conspiciuntur interdum multe maculæ seu punctula nigra in summitate & tuberculo nali, *Macula seu punctula nigra*, aliquid viscidum sub tenui cuticula contentiã nigra, & materiæ pinguis, quæ tamen spatiosa à nonnullis à verimibus occupari putantur.

*Nasus* quoque interdum à causa violenta tum externa, tum interna penitus *absumitur*, vel figura ejus *depravatur*, vel fit maximus, vel parvus exilit, vel sinuosus aut aquilinus, aut nimis longus, qui affectus faciei defædationem afferunt maximam.

§. 2. *Parti affesta* est sensus organum olfactorium, *Nasus* tum æternus, tum interitus cum cute, nunculis, ossibus, cartilaginibus, vasibus, nervis, tunicisque.

§. 3. Priusquam verò ad ætiologiam nos accingamus, suis oportet ex omnimodis signis eruamus genuinum affectum. *Nasi Sarcomatis* & *Polypi* igitur *Signa diagnostica* in sensus incurrit & manifesta sunt, carnea enim narium excrecentia in oculos incurrit. *Polypus* sæpe totam narium cavitatem implet, & penè extra eas prominet, & hinc ægri in respirando difficultatem non levem percipiunt, & quandoque ab unâ in alteram narium partem, imò ad palatum prorepit, hæmorrhagias quoque patiuntur subinde spontaneas largifissimas, quæ sæpe nec internis, nec externis sili possunt remediis. Duo Polypi interna narium foramina adimplentes suffocationis periculum minabantur, prout ego observavi. Differentias horum affectuum, quibus unus ab altero facile discerni potest, superius jam diximus.

*Verrucositas* ut & *Vici* cum *Ozana* itidem facile in sensus nostros incurrit; dignoscitur, ut superius notavi, utrinque ex eo, quod levis & incipiens exulceratio non magnum colorem infert, & sicciore crustula subnigricante obducitur, quæ nisi vi revellatur, sæpe exarescere solet, ac sic sponte sanatur, at violentius sapius atacta vel detracta sanguinem fundit, ac ab emunctione narium forti, sæpe unâ exturbatur, ubi mox densior crusta generatur, ac incurrit habita tandem in *Ozana* transibit, quod ulcus est priori magis dolorificum, cum crusta humidiori ac sordidiori, ex quo emanat graveolentia, adeo ut etiam mucum reddat graveolentem ac tetrum; anhelitus etiam ægri non modo adsistantibus, sed & ipsi ægro naufragam parit. Sic sæpe narium ulcera, quæ intus latent, cognoscuntur solum ex eo, quando fætor è naribus provenit.

*Inflammatio, Macula rubra, Macula*, seu *Punctula nigra*, & *Nasus depravatus*, ut & ejus *Figura depravata* ex ipso visu etiam facile internoscuntur.

§. 4. *Ad Causas* morborum nasum occupantium eruehdas nunc progredientes more nobis consueti aliorum Auctorum sententiam nostræ anteponemus, quoniam Lectori magis sit liberum huc vel illi Sectæ pro placito subscribere. Ordinem verò vetustatis ratione ducunt ipsi *Galenicus*, in *Sarcomate* & *Polypo* narium, ut causam easulantes humores viscidis picuifolios sanguini permixtos, & vel è cerebro ad nares exulceratas copiosius dilabentes, & excrecentiam hanc carnem pro diversitate ulcerum producentes, vel etiam sanguis.

*Macula seu punctula nigra.*

*Nasus depravatus & Figura depravata.*

*Parti affesta.*

*Diagnostica.*

*Ætiologia secundum Galenicum & Polypus.*

# CAP. XVI. DE NAS. SARC. POLYP. VERR. ULC. &c. 133

fanguinem cessante hamorrhagia concrescentem in Polypo huiusmodi excrecentiam pedicularem & propendulam inferentem.

*Verrucositas* nasi originem adscribunt tum humori crasso & melancholico, nec non pituitoso, è capite imprimitis à facultate expultrice ad nasum externum missis, tum succo nasum nutriendi copiosiori & luxurianti, cuius quantitas ultra nasi alimentum abundet, & hinc superfluitas illa in Verrucas aut naulorum facunditatem distillatur.

*Ulcera* narium causam statuunt humorem acrem, erodentem, sæpius ex catarrhosa colluvie è capite ad nares defluentem interdum etiam à causis externis productum. quatenus à vulnere vel contusione sanguis in pus abigit, quod actio naria sua cutem erodit & nares exulcerat, in *Ozena* vero eundem humorem simul putridum & virulentum esse autumant.

*Inflammationes, Erysipelas & Maculas* narium in naso nunquam conspicias ortum suum putant à sanguine fervidiore, ob calidam hepatis intemperiem, à primo ortu, vel errore dietæ producto, in nasi musculos sub cute effuso, atque ob crassitatem suam fixis ibidem hærentes, *Puntula* vero atra à succo melancholico sub cute punctatim differt.

*Nasi deflexio* vel externa causa violenta adscribunt, abscessioni nempe quocumque instrumento acuto, & vel percutiente vel scindente factæ, vel acrimoniz humorum in ulceribus eundem absumenti, vel facultati plastice in utero, ut ita quidam à primo ortu nae carent.

*Figure depravationem* variam tamen vel in utero à facultate formatrice eundem diversimodè delineante, vel ab externa causa violenta consuetam figuram depravante, originem ducere asserunt.

§. 5. *Paracelsus* proximè jam sequens *Sarcoma* & imprimis *Polypum* appellat carnem deviatam & buccellos, qui per poros extra locum suum in excrecentiam nodosam transeunt, dum deviatum quodvis nutrimentum in alio quam suis situs loco generat eandem carnem sitæ generationis in magna copia.

*Verrucositas* nasi ex alimenti eius proprii abundantia originem suam putat, unde & sæpius ipsius nasi similitudinem habeant, & parvuli quidam natuuli apparent.

*Cossi*, qui apostema est, quo nasus admodum uritur, & postmodum fricationibus crustæ ponuntur, per annum perseverant, causam ad eribit albo cuidam sulphuri & salis scitilo, quæ prodeant ex regionibus Martis, dum sal cillum in parte Martis erumpens, ibidem extra cutem sua signa proferat in locis, in quibus cartilagine existunt, ubi enim caro cum carneungatur, naturam ataliquid producere emuncturum.

*Ulcera* & *Ozena* originem deducit à salibus corrosivis ex minerâ Martis profluentibus, à quibus etiam proprium nasi nutrimentum corrumpatur, & tæda sanies promanet.

*Inflammationes, Erysipelas & Ruboris* Nasi causam imputat liquori salis ex venis Martialis profluenti, & suo excremento rubedinem producenti. *Puntula nigra* aliquando oriri existimant à minerâ Saturni cum minerâ Martis se commiscet, & nutrimentum nasi proprium iis interpergitur, & cum hæc non satis exactè commisceri possint, minerâ Saturni dispersa maculas illas nigras seu plumbeas producit.

*Nasi deflexio* & *Figuram depravatam* ab iis causis contingere asserunt, quas priores in medium jam protulerunt.

§. 6. *Hilmodius* productionem *Sarcomatis* & *Polypi* adscribit tum nutrimento Nasi proprio copiosiori, tum Archeo aberranti & à lumine & fermento quodam peregrino in delirium redacto, à quo in tantum seducatur, ut officii sui distributivi ulterius inmemor, pro lumine illius irradiatione & in materie occasionalis dispositione aequitatem transgressus, peregrinas concipiat ideas, atque huiusmodi carnosas & polyposas formet eminentias.

*Verrucositas* originem accenset similiter ipsius nutrimenti Nasi abundantia, ex qua funguli narium supercrecant, dum caro à latice copiosius affluente nimium humectatur, & in fundum quandam eiusmodi excrecentis profectendis appropinquabilem disponitur.

Quando verò latex hic ponticatus quidam *Meris* & acidulâ fil. edimis miria infectus sit, ipsa *Acidula* & *Ozena* ab eodem vult excitari, & quidem *Ozenas*, dum fermento quodam virulento, ejusque occulto contagio lit oppignoratus, à quo nutrimentum nasi simul inficitur, caro depalcitur, & ossa exceduntur.

*Inflammationem* & *Erysipelas* in Naso ab excrecentia Archei excitari credit, hic enim à peregrino quodam vel in nutrimento Nasi, vel in latice eo affluente existente irritatus & ad iram provocatus, statim ignem illud trophæum in signum indignationis suæ producit, & externo naso in turpitudinem hostis eum provocantis apponit.

Similiter *Maculas nigras* ab Archeo seminali delineari vult, pro dispositione materie ejusque ipsitudine, unde colores illi emergant proprietates vitæ mediæ imitantes.

*Nasi deflexio* & *Figura depravationem* vel externis causis violentis, vel ipsius Archei variis deviationibus in utero factum fabricantis annumerat.

§. 7. *Willisius* huic accedens *Sarcomatis* & *Polypi* generationem deducit à succo nervo in trauitu impedito, & in aliquo nasi loco stagnante, in quo particulis spirituosus vel depressus, vel evanescentibus, salina acorem concipiunt, & arreptis corpusculis sulphureis in tumores hosce carnosos & polypos concrescunt.

*Verrucositas* Nasi originem tribuit laciei cutaneo & seroso multis particulis spissis & viscidis referto, à quo pori cutanei in naso non modo valde inficiantur, sed fibre nervæ simul rumpantur, & succum nervæ & nutrimentum copiosius profundant, qui postmodum in ejusmodi verrucositates coagulantur.

*Ulcera* & *Ozena* causam imputat eidem laciei seroso, dum non modo ob lentorem in parte quadam narium stagnat, sed ob stagnationem illam diuturniorem contumitur, partes exedit & tandem contagium quoddam concepit, quo omnem liquorem nutrimentum similiter inficit, corrumpit, & narium partes cum palato interdum destruit.

*Inflammationem, Erysipelas & Rubedinem* Nasi oriri existimant à sanguine ex arteriis sub cute effuso, & multis particulis salinis fioxioribus maxime acidis, referto, ob quas diutius ibidem detineatur, febriliter effervescat, & huiusmodi ruborem & tumorem quodque producat.

*Puntula nigricantia* induci credit, quando *Puntulorum nigricantium* induci credit, quando



foramina sudatoria modò humore atro crassiore, modò verniculis capita nigra habentibus op-  
pleantur, quæ animalcula è poris expellat & Soli  
exposita vivere, & se movere, facile conspici  
posse aliis persuadere conatur.

*Defectus  
& Figura  
depravata*

Quantum ad *Nasi defectum* & *Figuram depravatam* attinet, in eorundem causis designandis  
à reliquorum sententiis ne latum quidem sece-  
dit unguem.

*Sylvius  
dixit de  
causis Na-  
rium.  
Sarcomati  
& Polyp.*

§. 8. Sequitur industrius ille *Sylvius*, ut sen-  
tentia suâ de morborum horum causis prolata  
eorundem cognitionem reddat faciliorem. Exi-  
stimat verò Autor hic nobilissimus *Sarcoma* &  
*Polypum* Narium à sanguine nutritie copio-  
sius ad nares affluente, sed corrupto ab acido  
quodam ex lymphâ glandulosa producto exci-  
tari, dum partes fibrosæ ut ulcere, in quo aci-  
dum quoddam acre & corrodens dominatur,  
destruunt, sanguinem illum majori quantitate  
succipiunt, qui dein cum lymphâ acidiuscula  
in excrescentias illas carneas facessit.

*Verrucos-  
itates.*

*Verrucositates* Nasi ab eadem lymphâ glandu-  
losa acido spiritui abundante pronai autumat,  
à quo humor ille spiritus reddatur, & in poros  
cutaneos deductus eosdem opplens ab alio lu-  
co affluente propellatur, sicque protuberantias  
illas verrucosas producat.

*Ulcera  
& Ozæna.*

*Ulcera* & *Ozæna* originem sumere docet  
ab acido quodam acri narium partes corroden-  
te, & sanguinem ex arteriis affluentem non  
tantum in pus vertente, sed si maiori moris red-  
datur, ipsum pus etiam auctâ sua acrimonia ul-  
terius corrumpente, & non modo colorem ejus  
diversimodè mutante, sed, quod in *Ozænâ* fit,  
intolerabilem quandam fetorem eidem infe-  
rente.

*Inflamma-  
tionis, Ery-  
sipelatis &  
Ruboris.*

*Inflammationem*, *Erysipelas* & *Ruborem* Nasi  
vel à sanguine è vasis narium sub cutem effuso  
ibideinque stagnando accenso, vel à bile acriori  
effervescente cum sanguine ad nasi partes exter-  
nas delato, vel ab acido acriori ebulliente eo-  
dem effuso, & ignis instar fuente produci posse  
existimat.

*Macularii  
nigrarum.*

*Maculas nigras* exotiri credit ab acido in  
sanguine contento austeriusculo, & hinc inde  
sub cutem nasi disperso, à quo interdum ipsa etiam  
cutis atrodat & attenuetur, ut sola cuticula  
maculas illas opereire conspiciatur.

*Defectus  
& Figura  
depravata.*

In *Defectus* & *Figura depravata* causis con-  
stituendis etiam hic Autor reliquorum senten-  
tiam facile subsequitur.

*Cariesis  
narium opi-  
nis de cau-  
sis Nasi  
Sarcomati  
& Polypii.*

§. 9. Ad *Cariesin* illius subtilissimi vestigia præ-  
mentes nunc properamus, quorum de *Sarcoma-  
tis Polypis*, origine hac essententia, quod particu-  
larè chylosiores ad partes narium exelatis antea  
à materia quadam acri, atque spatiosis ob fibras  
disruptas majoribus præditas majori copiâ  
adinsuant, ibidemque diutius detentæ extremita-  
tes fibrularum ita extendant, ut isdem fortius  
adhærentes novam hujusmodi excrescentiam  
efforment, quæ ab affluxu novarum illiusmodi  
particularum chylosarum nutritiarum in tantum  
augeatur, ut ex neglectu non modo naves obstrua-  
tur, sed ad ipsum palatum propendens totiocatio-  
nem minuetur & quandoque subinferat.

*Verrucos-  
itates.*

*Verrucositates* Nasi excrescere volunt ob fibras  
cutaneas seu nervæ nasi elongatas à succi nu-  
tritii copia, quærum diductioni exterior cuticula  
se facile accomodat, & pro diversis particu-  
lis, quibus succus ille nutritius sit refectus, in  
superficie variè configuratur.

*Ulcera* Narium causas statuunt particulas a *Ulcera*  
cutis acido-salinas, fibras nasi erodentes & cor-  
rumpentes, sæpiusque fermenti instar à huc *Vene-  
reæ* acribus cum sanguine & succo nutritio  
corruptis communicatas, quæ si ipsa ossa nasi  
cum aliis ejus partibus erodant, iisque destruc-  
tis fetorem intolerabilem inferant, *Ozænâ*  
ipsam subsequi facitur.

*Inflammationem* & *Erysipelas* etiam in naso *Inflamma-  
tionem* habere putant ab humoribus arterio-  
sioribus, & poros cutaneos nasi ita obstruenti *Erysipela-  
tis*, ut non nisi particulis primi elementi igni-  
tam quandam naturam præ se ferentibus tran-  
situs permittatur, quæ proinde ruborem facile  
inferant; absque tamen inflammatione. *Macu-  
lam rubram* interdum Naso inprimi ob teneram  
cutis texturam & arteriolarum capillarium co-  
piam sanguineas particulas effundentes, quæ  
per cuticulam proprio luo colore transluceant.  
*Maculas* vero plumbeas ortum habere existi-  
mant ab halitibus quibusdam pinguibus poros  
cutaneos dilatantibus, & ab acido præcipitatis,  
underadi luminosi non repellantur, sed absor-  
beantur & lussocentur.

Nasum *deperdi* posse ab externis causis violenti-  
sime facile concedunt, nec non ejusdem *figuram* *Bus* &  
vel intus à spiritibus animalibus in formatione gurgu-  
sectus aberrantibus, vel extra illum ab externa *prævaria-  
tionem* quodam causa diversimodè depravari.

§. 10. Ut in causarum recensione eò feliciter  
provehamur, ponemus ulterius, quæ ad harum  
confirmationem *nostro* judicio solidiorem fa-  
ciunt. Existimamus ergò *Sarcomatis* causam  
latere ut plurimum in sanguine aliusque succis,  
quando scilicet oscula extrema vasorum narium ita  
dilatantur, ut ipsæ quasi prolongentur, hinc  
succus viscidus eò propulsus, novas quasi partes  
progignit efficitque, hic enim cum tempore accre-  
scit & semper novus sanguis eò delatus accre-  
scit. Sic eodem modo in *Polypo* sanguis serosus ex  
suis vasis effusus fortuito calu continuo per oscu-  
la hæc semel aperta cum humoribus quibuscun-  
que exillare solet & effectum hunc producere,  
nihil verò est, quod affectum hunc magis exci-  
tare valet, quam acidum in humoribus hospi-  
tans, maximus enim coagulatur est omnium hu-  
morum, & sitandem acrimonia accedat corro-  
siva, facile hic affectus transiit in acrimonia seu  
cancerum, unde sanguis in his partibus mortificatur  
& destruitur una cum feri vigore, acida e-  
nim acrimonia corrosiva nihil aliud est, quam  
aqua fortis sicca, & acrimonia acidam vola-  
tilem sulphure invicantem seu palliatam gerit.  
Hæc exulceratio non adeò corrosivam sed magis  
viscidam comprehendit materiam.

*Verrucositates* oriuntur reverà à diductis & *Verrucos-  
itates* prolongatis fibris nervæ, quibus cutis & vasa  
ejus capillaria copiose sunt intertexta, papilla-  
res enim ejusdem processus à succi nutritientis  
abundantia nimium repleti, in igne capiunt in-  
crementum, & cuticulam substratam attollunt,  
ut prominentius istis facile cedat. Affluente verò  
indies novo nutrimento, quod succellit empori-  
confectum sibi acquirit viam, tubercula ista  
augentur, quin glandulæ cutaneæ substratæ is-  
dem ductum aliquem excretorium sæpe communi-  
cant, ut liquor aliquis viscidus per meatum  
quendam verrucositasibus istis ab expansis ab  
humiditate perpetuo persulfente papillis ner-  
veis reſervatum, non minus, ac per reliquas nares  
indies

indies excernatur, ceu experientia apertè com-  
monstrat, atque hic Castellus aulicus quondam  
fuit minister natio ejusmodi proflitero præditus,  
cujus singuli nafeuli, quibus septem superbiuit,  
quotidie mucum quemdam album ac viscidum  
reddiderunt, quo etiam expresso melius habuit,  
revento verò, dolorem tenuim leuiter per inte-  
grum natum reliquit. Hæc itaque glandulis  
affluens affluens humiditas exitum moliens etiam  
in distortis & ductis fibrulis sibi viam serbare  
potest, unde meatus interior pervius manet, ac-  
crescentibus interius particulis crassioribus tu-  
berculum illud verrucosum solide componen-  
tibus.

*Nasus sim-  
plicis &  
vulgaris.*

Quod concernit causam Narium *Ulcera* sim-  
plicis & *Ozæna*, eadem est, quæ & aliorum ulcerum  
læpius jam dicta. Causæ enim sunt humo-  
rum acris corrosivus plus minus dilutus, modo  
magis fluidus, modo ab ære frigido factus visci-  
dus, acque vel à sanguine & lymphâ per natum  
vasa suppeditatus, vel à sanguine & lymphâ in  
ipso ulcere demum corruptis promatus, in ea  
enim parte hæret acrimonia, quæ sanguini de-  
lato malignitatem inserit, hinc ulcera hæc dili-  
gissimè curantur, quia viciatitas non inheret  
tantum sanguini, aliisque succis, sed quoque  
tæpe hæc morbus ortum suum trahit vel à sue  
venæ, vel à scorbuto absidit, in particulis cor-  
rosivis extortis, vel à causa violenta, calu sc.  
hinc vascula facile disrumpuntur, & hinc succi  
evadunt & obstructio oritur, adeit quoque ob-  
strem febris.

*Inflamma-  
tio & Erysipelat.*

*Inflammationis & Erysipelatis* Narium causâ  
eadem est, quæ aliarum partium, Erysipelatis,  
quæ dependet ut plurimum à circulatione im-  
pedita particularum. Accurum in partibus his na-  
rium stagnantium, & ab acido productatum,  
sed ut plurimum oritur à causa externa, nemi-  
pe ob frigus, hinc videmus plures ob frig-  
us in ejusmodi affectum incidere, à frigore  
enim in vasis valde exiguis humores aliqua-  
tenus commorantur & crassescunt, ac progres-  
su temporis acorem contrahunt, unde tumor,  
rubor ac dolor facile deduci possunt, hinc quia  
tubuli semel distorti sunt à sanguine ac humo-  
ribus stagnantibus & acrescentibus, non facile  
ad statum pristinum redire possunt, quare ad-  
veniente bruma sanguis ac humores in circula-  
tione aliquod ostendunt obitaculum, hinc agri  
semper recidivam patiuntur.

*Maculæ  
nigrae.*

*Maculæ nigrae* seu *plumbeæ* originem suam  
credo à diversis corpusculis succo nutritio in-  
termixtis, pinguisbus potissimum & ramosis, ab  
acido hinc inde dispersis & cutis superficiei ap-  
positis, ut ita facile per cuticulam transpareant  
& radios luminare suffocent.

*Nasus deper-  
ditus.*

*Nasus deperditus* causa vel est ab externa violenti-  
a, quod vel gladio, vel alio instrumento planè  
amovetur, vel ab acrimoniâ corrosiva, puta Can-  
cro, Lupo, &c. ipsum devorante.

*Figura de-  
pravatio-  
nis.*

*Figura depravatio* fit vel in utero materno,  
vel extra eum itidem à causa violenta.

*Prognosis  
Sarcomatis  
& Polypi.*

§. 11. Nunc progrediemur ad *Signorum pro-  
gnosis* *Sarcomatis* doctrinam, quod hæc Polypo fa-  
nabilis est, quamquam innum pene & idem  
sint, & iisdem medicamentis curentur, hocque  
tantum discriminis intercedit, quod affectus in-  
cipiens appellatur *Sarcoma*, confirmatus autem

*Polypus*, qui difficilior curatur, ac neglectus aut  
male tractatus in cancerum seu carcinomâ nari-  
um degenerare solet. Quo affectus diuturnior,  
eo difficilior est curatur, quia porci stabilem figu-  
ram & magnitudinem acquirunt, hinc particu-  
le silvestres acresque transmittuntur. Si Poly-  
pus cancerolam induat naturam, ferè incurabi-  
lis est.

*Verrucositas* nasi præter deformitatem non-  
nunquam magnam inserunt molestiam, præter-  
pue quando simul meatus illarum mucos quo-  
dam viscido repleti sunt, qui quotidie expe-  
rimendus, ne fibras premendo dolorem inferat,  
quia totalis earundem ablatio difficiliter obti-  
neri potest, ægrique easdem per dies vita sæpe  
ferre coguntur.

*Ulcus* verò simplex facilius curari potest, *Ulcus &  
Ozæna*, diuturnitas enim efficit, ut porci  
stabilem figuram acquisiverint; si quoque ex-  
ulceratio simplex narium ad deteriorem natu-  
ram proclivis est, & remedia nullum commo-  
dem afferunt, & si simul acris materia instat  
catarrhûs velis suis ruptis effluat, facile ex ul-  
cere nunc, nec minus palens serpensque fieri po-  
test unde narium pinna interstitiumve, vel ipsa  
nonnunquam ossa corrumpi exedique solent,  
ceui plura observavimus exempla, imo talia, ubi  
palatum simul fuit erosum. Si morbum hunc  
committit lues veneræ, lepra, piora vel cancer,  
ferè incurabilis est, nec curentur simul prædicti  
morbi.

*Inflammati* recens facile curatur, inveterata  
verò facile renascitur.

*Maculæ etiam rubra & Punctula nigra*, deli-  
catulis & formicæ admodum studentibus per-  
quam intolerabilia, non facile tolli & mutari  
queunt, præsertim si sætis iisdem in utero jam  
fuerit notatus.

*Nasus acerbatus* haut restitui potest, aliter,  
quam palliati.

*Figura depravatio* itidem difficiliter corripi-  
tur.

§. 12. Superest *Dietam* subnectamus, quæ  
in lex rerum non naturalium recto uti consistit.  
*Aer* ergo sit temperatus, ad caliditatem paulo  
inclinans, vitetur frigidus. *Cibus* sit in omnibus  
his narium affectibus levis ac temis, profunt  
omnia temperata & insipida, in quibus nullum  
acidum latet, contra vitentur omnes cibi acres,  
salii, fumo indurati ac acidi, quia sanguinem  
acerrumaciores reddunt ac crassiores, *Pennis*  
sit hordeatum, vel vulnerariis maritatus, exu-  
lent vina fortiora, & acida quæcumque viten-  
tur, condnet potus Thea & Coffea.

*Corporis exercitia* vehementiora summo opere  
fugiat æger, quia sanguinem fervidiorem ac  
acriorem reddunt.

*Alvus* sit libera, & ab omnibus *Animi pas-  
sionibus* æger absteat.

§. 13. Ad remedia tandem properandum, quæ  
ex duplici fonte Chirurgico & Pharmacæutico,  
desumuntur. Eavero *Galenicorum* hoc modo præ-  
sent, ut in *Sarcomate* & *Polypo* ulteriores ejus  
accretionem prohibeat inhibendo ut crassa & *Polypum*  
viscida materia in naribus colligatur, & eandem  
jam genitam avertendo, quod siccando & fir-  
mando cerebrum fieri volunt, ne morbum fo-  
veat. Hinc polypum ipsum tenui pedunculo  
naris tunice internæ inhaerentem rescindunt, &  
ulcus cruentum solâ poscâ frequenter per nares  
attracta

*Verrucosi-  
tas.*

*Ulcus &  
Ozæna.*

*Inflamma-  
tio.*

*Maculæ  
rubrae  
& punctu-  
larum ni-  
grorum.*

*Nasus deper-  
ditus.*

*Figura de-  
pravatio-  
nis.*

*Dietæ.*

*Galenicorum  
modus en-  
randa Sar-  
coma &  
Polypum  
narium.*

atracta fiant. Quando verò Polypus basi latiori naribus inhaeret, medicamenta præmittunt partim adstringentia, partim extenuantia & incidentia, partim denique exsiccantia ac discutientia, laudant proinde experimentum Galeni ex malorum puniceorum triplicis generis succo modice cocto, & in vase stanneo servato, cuius autem tempore in collyrium formæ nasi, cui applicari debet, redactum & applicatum, quod si æger diu continuatum molestius ferat, vel succum mali punici humidum, vel pulverem ex eodem exsiccatum naribus attrahendum interserunt, nec non succum serpentariæ. In malo graviore ad validiora progrediuntur medicamina, qualia sequentia magni ab iisdem habentur usus.

R. Alum. scissil. ʒß.

myrrh.

Sandarac. aa. ʒiij.

Gall.

ar. ust. aa. ʒi.

Trita abluantur vino odorato, & penicillo exspecta naribus adhibeantur.

Vel :

R. Scor. ar. ʒj.

helleb. nigr.

arsenic. rub. aa. ʒj.

Chalcant. ʒß.

Ad. F. Pulvis qui insuffletur naribus, vel cum vino dissolutus instar linimenti adhibeatur.

Ad eundem usum commendant etiam attractamentum sutorum per se cum aceto adhibitum, nec non pulverem Alexandri ex chalcant. chalcitide, misy & areusto paratum, & pastillos Andronici. Caustici etiam medicamentis per cannulam argenteam aut fistulam plumbeam parti solum affectæ applicatis excrecentias istas adurunt, & loca perusta bntro illinunt ad crustæ excisionem, quo peracto ulcus curant ut reliqua ulcera. Remedii vero isti voto minus respondentibus ad chirurgiam properant, & feramentum acuto ad modum spathe efformato Sarcoma aut Polypum ab osse abscindunt, abscissumque unco ferreo extrahunt, datâ curâ ne cartilago lædatur, postmodum sanguinem superimunt & cicatricem inducunt. Polypum malignum ferramentis candentibus tenuibus urunt, canerosum verò vel omnimodo non tangunt, vel solo succo solani in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo agitato & condensato, aut succo foliorum salicis sæpe studiosius abluunt, & ut citra mortuum exsiccentur, unguento diaphanophlyogis aliquoties inungunt.

Figura offi-  
talis.

Verrucositates Nasi minores instar aliarum verrucarum tractant, sæpius easdem fricando elaterio cum sale, vel atramento sutorio, aliisque reliquis verrucarum speciebus dicatis medicamentis, quas sili constrictione circa radices abigi posse existimant.

Virus &  
Ozænam.

In Ulceribus & Ozæna operam dant, ut ultior prohibeatur materiæ vitiosæ accretio, instituta debita victus ratione, purgatione, venesectione & capitis corroboratione, ne vitiosam materiam ulterius transmittat ulceris curationi impediendam. His præmissis ad curationem ipsius ulceris pergunt adhibitis medicamentis siccantibus, repellentibus & discutientibus invicem mixtis, & tandem, si affectus iisdem

renitatur, subjunctis valde detergentibus. Abluunt proinde ulcus frequenter aquâ & vino austero, in quibus rosæ tubæ sicca, & flores lentici macerati & decocti fuerint. Ulcere existente sordido, mel rosar. cum terebinth. vel succum calamench. aut amurcam cum melle permixtam naribus infundunt, ut non modo ulcus ita detergatur, sed crusta etiam resolvatur, & sternutamento ejiciatur, coque facto vaporumque calidæ submittunt & omphacium cum amurcâ permixtum, vel succum marrubii aut menthæ, vel atramentum sutorum prius candens redditum, hinc subtilissimè tritum & cum melle mixtum. Quando verò hæc medicamina debiliora sunt, transeunt ad validiora, ulcusque sequenti liquore frequentius attingunt.

R. Myrrh.

alum. sciss.

Corr. thur.

gallar. immat.

Chalcit. aa. ʒvij.

squm. ar. aa. ʒiij.

atrament. sutor. ʒvj. alnm. ros. ʒij.

Coquantur f. q. aceti in vase arce. Decoctum servetur ad usum.

Pro majori exsiccatione impetranda curam sequentibus trochiscis concludunt, quorum funus naribus est recipiendus.

R. Myrrh.

Corr. thur. aa. ʒij.

sandar. ʒj.

auripigment.

cinab. aa. ʒß.

Ex his f. Pulvis, qui terebinth. susceptus formetur in trochiscos & hi prunis pro funo excitando frequenter imponantur.

Inflammationem, Erysipelas, & Maculas Nasi inflammations, Erysipelas, maculas, & pustulas lanigra, rubras ut rictu eurent, omnium primò ad calidam hepatis intemperiem respiciunt, quain hepaticis frigidis corrigere student, ob quem finem etiam venæsectionem celebrant, & tandem ad topica & repellentia accedunt, quæ componuntur ex succis plantag. nymph fumar. solan. citri, limon. emulsion. ex sem melon, cucurb. cicer. nuel. persicor. ceruf. myrrh. borac. camphor. alum. Gerf. serpentar. &c. Unguentum item album camphorac. laudant, & unguent. de lithargyro. In Pustulis nigris abigendis succum melancholicum in sanguine existentem expurgant, & nasum succo raphani cum sulphure vivo aliquoties abluunt.

Nasum totaliter abscissum nulla arte reparare sciunt, si verò frustulum aliqua parte adhuc hæreat, illud residuo statim apponunt, & vel ligatura, vel emplastris glutinatoris firmant, additis consolidantibus, ut cum tempore demum accrescat.

Figuram in utero depravatam vix corrigi posse judicant, à causa verò extrinseca inducam aliquando enendari debita compressione, totalem tamen restitutionem difficulter admodum obtineri sciunt, idque eo magis, quo causa depravans existit violentior.

§. 14. Paracepsis curam Sarcomatis & Polypi Paracepsi ita instituendam vult, ut bubucelli isti prius incindantur, nutrimentumque illorum tollatur, & tandem integra cura absolvat emplastro opodeltochi.

Verrucosis etiam nutrimentum omne vult verrucosis adimi, distortis & contractis earundem venis & lateribus, insuper ut facilius flaccescant & exci-

centur

# CAP. XVI. DE NAS. SARC. POLYP. VERR. ULC. &c. 137

centur linimento ex realgar. pp. & succo chelidon. aliquoties easdem (uader) inungendas.

Cassum.

Cassum titō vult auferri, ne fistula sublequantur, à quatuor cura omnimodo vult abstineri. In tempore proinde Collo sequens præcipit adhibendum.

℞. Succ. agrimon. ʒi.  
de porris ʒb.

Ol. arth. ad pondus omnium.

Fiat mixtura, cui pannus intingendus, & hic sine aspersione superponendus, si liquorem exire & per se Collum curari promittit.

Vicus & Ozanam.

In Ulcibus Narium & Ozana ad salia corrosiva ex mineris Martis producta corrigenda, ulcus mundandum & incarnandum, præ aliis sequens commendat oleum à minima arsenicali partem, ulceribus istis peria illuminandum.

℞. Arsenici alb. ʒvj.

Sal. fus.

Colcothar. aa. ʒib.

Fiat mixtura, reduc ad secundum gradum reuerberationis per horas tres vel quatuor & excipe.

Tam.

℞. Huius mummie ʒi.

Liquor. myrrh.

Botis. aa. ʒij.

Fiat in modum olei.

Eadem illa ulcera & sequenti lixivio talido aliquoties suadet abluenda.

℞. Alumi. lbx.

Succ. Chelidon.

plantag. aa. lbj.

parthenion. lbis.

Destilla.

℞. lbj. istius aquæ.

Aqu. commun. lbx.

Fiat Lixivium.

Inflamma-  
tionem. E-  
culam rubram  
Maculam  
rubram.

Ad Nasi Inflammationem, Erysipelas, & Maculam rubram abigendam sequens commendat linimentum.

℞. Myrrh.

laur. aa. ʒi.

lithargyr. ʒiv.

Aceti fortiss. lbis.

Reduc in decoctionem.

℞. huius lithargyr. pp. ʒb.

Alum. de roch. ʒij.

Aq. Sal. ʒib.

M.

Maculas plumbeas oleo ʒii aliquando, caute tamen, attingi permittit. ut decolorentur.

In Naso perditum restituendo, & Figura ejus depravata corrigenda nullatenus occupatur, ne videatur fructu incerto adhibuisse labores.

§. 15. Helmentiano more morbi hi curati solent absumendo. nutrimentum superfluum, vel auferendo illud, ne ulterius ad nasi loca adinfluat, & Archeum in viam & officium pristinum revocando, ne à fermento illo peregrino se amplius patiatui seduci, quod ʒio diaphoretico & tinctura lili ammoniacalis perfici posse ab Autoris huius affleci vix ullatenus dubitatur, utpote à quibus Sarcoma cum Polypo haud ita difficulter absumatur, & nasus ad integritatis statum reducat.

Eodem modo in verrucosis procedere solent, quas & cum aliis excrescentiis sponte evanescente sibi Autor hic imaginatur, quando

Luna lumine per vitrum collecto superintradiuntur, donec frigus intro fuserint, fortasse quod alimentum eorum ita destruat, & liqueant.

In Ulcibus Narium & ipsa Ozana tum radicem Gentianæ, tum vinum, in quo colocothar fuerit maceratum, si frequentius eodem abluantur, nec non remedia exacte elaborata ex arsenico, & auripigmento in casu fortiori magnopere commendant.

Inflammationem & Erysipelas, seu potius Maculam Nasi rubram, etiam in utero matris factis inductam, deleri posse promittunt, si menstruæ muliebri frequentius abluantur. Maculas autem nigras succo byroniæ, & persicariæ abigere satagunt.

Nasum deficientem & Figuram ejus depravatam resarcire, & corrigere vix tentat Autor hic, aliorum iudicio hoc in casu libenter adficientens.

§. 16. VVilissi intentio in Sarcematibus & Polypuratione eo dirigitur, ut stagnatio succi nervi solvatur, diaphoreticis imprimis, aliisque massam sanguineam ab acrimonia falsa depurantibus, ut decocto lignorum similibusque destillatis convenientibus ex cephalicis compositis; posthac ipsi tumores consumantur, & concretum illud heterogeneum destruat, quod præter alia à superioribus jam notata remedia sequenti destillato præstari posse confidit, si tumores illi nariumque partes internæ eo frequentius tangerantur.

℞. Uvar. immatur lbij.

Cort. mali granat.

balanstor.

sumach. aa. lbij.

Macerentur in aceto & destillentur,

dein add.

alum. lbj.

denno destillentur omnia simul.

Mercurium ætium rubetum plurimis lotionibus edulcoratum, pulverisatum, melle susceptum, & cum turunda in nares demissum non minus approbat, tanquam in excrescentiis istis absumendis summe idoneum. Emplastrum iidem ex viridi æris, auripigmento, vitriolo. alum. antimon. in aceto maceratis & demum exsiccatis & pulverisatis, cum lithargyrio & oleo rosaceo parata ab aliis commendata nullatenus contemnit, si cereoli ex illis formati naribus indantur, & excrescentiis illis applicentur, quibus remediis incassum tentatis, tumores hosce Chitragia committit abigendos.

Verrucositates Nasi minores iisdem remediis tollere tentat, quibus reliquæ verrucæ aliarum partium abiguntur, majores verò citra periculum adimi haud posse retur, solamque ligaturam in iis aliis remediis omnibus præfert.

In Ulcibus & Ozana curatione se non parum præbet occupatum, ut lacrimæ & sanguinem ab impuritate acri vindicat, & ad debitam crassam reducat, quare noxios humores evacuat vel electuario diacartham. cum speciebus diacubich. tum rhabarb. vel pulvere ʒis ʒii, vel sequenti decocto i

℞. Polypod. qu.

rad. laparb. acut.

scabios. aa. ʒi.

ʒ

Herb.

Inferro-  
sitibus.

Inflamma-  
tionem. &  
Erysipelas  
Maculas  
rubris &  
nigris.

Naso de-  
ficientem. &  
Figura ejus  
depravata.

Willissi  
modum  
disarcoma  
Nasum &  
Polypum.

Verrucosi-  
tates.

Nasi &  
Ozanam.



*Herb. fumar.*

*Senec. aa. Mj.*

*ful. sen. 3x.*

*epithym.*

*turbid.*

*agar. aa. 3j.*

*sem. caribum. 3j.*

*for. ejusd. 3ß.*

*raf. fantal. citrin. 3ij.*

*sem. anif.*

*fanic. aa. 3j.*

*Incisa & confusa coq. in aq. font. lbvj. ad*

*medietatem, add. postmodum*

*Vini albi lb.*

*Statim colectur, F. Apozema.*

*Dentur 3vj. una vice horis matutinis.*

Ulenis ipsum topicis convenientibus vult tractari, crustas effluendo in vapore aquæ dulcis, vel in quo radices altheæ decoquantur, & easdem emollitas digitis oleo amygd. dulc. inunctis leviter amovendo, hinc ulenis adluendo decocto hordei cum melle rosato, vel aqua ferrator. in qua flores rosar. decocti fuerunt. Ad fortius adstringendum in *Ozanâ* aquam laudat aluminolam, & pro majori exsiccatione summum ex pulvere mastich. Gumm. iandar. myrrh. cinab. & scurpimento prunis injecto, qui caribus est suscipiendus.

*Inflammationem, Eryspelas, Maculas rubras.*

*Inflammationem & Eryspelas* Nafi non aliter, ac reliquis aliarum partium inflammationum & eryspelatum species vult tractari; *Maculas* verò *rubras* Colmetidis, ut lacte Virginis, aliisque frequentius suadet abluendas, inprimis sequenti liquore.

*R. Camphor. incif. 3ij.*

*terrantur in mortario vitreo,*

*senfim affund. succum unius limonii,*

*dein add. vini albi lbj.*

*F. Colatura, & Camphora residua petia ligata in vuvro suspendatur.*

*Maculas nigra.*

*Maculas nigra* vix ullo remedio citius abigi possent, quam aqua Cosmetica mercuriali, vel succis ari, bryoniae & Sigilli Salomonis.

*Nasi deficietium & Figuram depravatam.*

*Nasum deficientem*, aut in *Figura depravatam* restituere sibi non præsumit, aliorum laborem hunc in se suscipientium agitati & felicitati minime videnda.

*Sylvarum curandi Narium Sarcomate & Polypum.*

*Sylvarum* in curandis Narium *Sarcomate* & *Polypo* ad acidum, tanquam omnis mali hoc in morbo fontem, præprimis respiciunt, ut illud doceatur, & excrementa superflua consumatur, quod cauteriis tum actualibus, tum potentialibus ex liviosis paratis, nec non medicamentis Galibus optimè obtineri possent alius periclitari laborat.

*Verrucositates.*

*Verrucositates* simili modo exsiccati vult, quo omni succo privati ita cessant, & decidunt, maxime autem constrictione filii & tactu lincolii spiritu Aëis humectati.

*Vici & Ozanam.*

In *Ulcere* videm & *Ozanâ* acidum maxime corrigendum est secundum Auctoris hujus methodum, abstergendo illud lixivio quodam vel urinâ, in quibus aliquid aluminis fuerit incoctum, tum Unguento Aegyptiaco in succo plantag. & heder. terrestri. dissoluto. Posthac exsiccantia & acidum ulterius imbibentia sunt ex-

hibenda ex thuriâ, lithargyr. plumb. usto, thure, myrrh. & cinabari similibusque composita, & vel pulveris, vel linimenti aut unguenti spissioris formâ applicata.

*Inflammationem & Eryspelas* Nafi non aliter curat, ac reliquarum partium, in *Rubedine* vero à bile effervescente aut ab acido acri ebulliente ortâ sulphuribus metallicis effervescentiam istam sedat, & maculas succo vel aquâ taraxaci cum borace & myrrhâ illinit. *Macula nigra* abiguntur correcto acido & abluto naso ex lixivio cinerum betulæ, in quo radix lapathi decocta fuit, addito tantillo florum Aëis, cum camphorâ aut Spiro sublimato correcto.

*Inflammationem, Eryspelas, Maculas rubras & nigras.*

*Nasi deficietium* totalem ullo modo reparare nescit, ut & *Figuram depravatam* in utero, ex intortunio autem indictam aliquando corrigi concedit, prout reliqui Auctores jam protulerunt.

*Nasi deficietium & Figuram depravatam.*

*S. 18. Cariesiani* in curatione morborum horum sequenti modo procedunt. In *Sarcomate* & *Polypo* sanguinem & succum nutritum muniunt ab omni impuritate acri, tum purgantibus Galibus, tum sudoriferis ex lignis & antimonalibus aliquoties repetitis, etiam Tincturâ Si potui ordinario per tempus aliquod instillata. Præter hæc interna, forissecus *Sarcomati* & *Polypo* incipienti ca applicat, quæ eadem exsiccare, & ne ulterius excrecant impedire valent, ut succum nascitur. hortens. & aquæ oleum Si, Pulverem ex cort. granat. cadmia fossil. antimon. crnd. litharg. mastich. myrrh. Croco Aëis & similibus adstringentibus, ne via succo chyloso ulterius adeo pateat, quibus non sufficientibus, & Polypo nimium increfcentem ad fortiora & exedentia accedunt. Aquam scil. Alem, quæ fit, Spiro sublimatum decoquendo in aqua communis, linimentum ex xring. ar. Glo. alum. cort. granat. rad. aristol. rotund. melle vel succo plantag. exceptis. v. ex chalcid. pp. & auripigment. aa. f. q. mellis commixtis. Si nec his cedat, vel hilo eundem constringunt, vel forasprehendunt & abripiunt, loco vulnerato exsiccantia & sanguinem sistencia postmodum submittentia ex alum. ust. balast. ter. sigill. lap. hæmatit. croco Martis adstring. succino. thure & similibus paratis, vel forma pulveris adpersa, vel cum cerebinth. & melle colicoe suscepta instat turunda caribus ad locum affectum minutata.

*Cariesiani tum ratio curandi Nasi Sarcoma & Polypum.*

*Verrucositates* exticcati dicunt constrictis radicibus illarum hilo serico, ne aliquid ulterius recipiant nutrimentum, ita enim succescunt & decidunt quod si minus pro voto succedat, easdem aquâ Aëata vel lacte siccum aliquando attingunt, quibus itidem interiores Narium verrucas consumere tentant, partibus vicinis defensivo conveniente prius munitis, & Unguento Aegyptiaco gangrenam aut inflammationem subito tempore præcavendo, aut ferro caudente leviter & successive easdem comburunt.

*Verrucositates.*

In *Ulcere* Narium & *Ozanâ* eodem modo, ut in *Sarcomate* jam innumus massam sanguineam immixtum redditur ab impuritatibus acerbis, omnesque particulas acutas erodentes hebetant, mitigant & ad temperiem commodam redigunt medicamentis antimonalibus aliisque diaphoreticis & porosis absorbentibus, quo voto obtento, externè ulcera abster-

*Vici & Ozanam.*

# CAP. XVI. DE NAS. SARC. POLYP. VERR. ULC. &c. 139

gunt & mundant vel Aquâ viridi Hartmanni, vel mixturâ taliaut simili.

*R. Ag. plantag.*  
*majoran. aa. ʒiʒ.*  
*mell. rosat. ʒvj.*  
*Spir. vin. rectificat. ʒiij.*  
*ʒii ʒsat. ʒt. vij.*

M. & vel guttatim naribus absorbeat, vel linteolum mixturâ hâc madefactum & contortum naribus inferatur, vel syringula quadam iisdem inspergatur.

Hinc ad magis exsiccantia accedunt, exhibentes vel Unguentum ex chalcit. pp. sandarac. & alum. uil. succo granat. & melle exceptis, vel sequens magis compositum:

*R. Aloes aq. plantag. lot. ʒiij.*  
*myrrh. dest. ʒij.*  
*rad. Irid. N.*  
*Sarcocoll. aa. ʒij.*  
*Ceraf.*  
*ʒii.*  
*Thur.*  
*Min. aa. ʒʒ.*  
*Ol. hyper.*  
*rosat. aa. ʒij.*  
*Mell. rosat. colat. ʒj.*  
*Succ. granat.*  
*oleosell. aa. ʒij.*

Coquantur primum succi cum oleis deinde mell. ultimo species pulverisate inspergantur, & bene miscendo redigantur in formam unguenti.

Tandem pulveres pro fumo ex superioribus jam notos accendunt, ut â fuligine adscendente naribus suscepto reliquæ penitus absorbantur.

*Inflammationem, & Erysipelas.*

*Inflammationem & Erysipelas* Nasi tollere autem poros obstruâtos reterando; quoniam tantum particulæ primi, sed & secundi elementi eosdem permeare queant, & fuligines retentæ exhalant, quæ de caula sequente mixtura Nasum inflammatum vel attingunt, vel etiam abluunt:

*R. Ag. plantag.*  
*ʒperm. ranar. aa. ʒj.*  
*In iis coq. myrrh.*  
*olivan. aa. ʒij.*  
*ʒtrentur & add.*  
*Spir. vini camphorat. ʒiij.*  
*Spir. flor. sambuc. ʒj.*  
*M.*

*Maculas rubras.*

Reliquas *Maculas rubras*, quibus semellæ tenera cute præditæ sepe deformantur, difficilius norunt esse curationis, & si sanguis copiosior ad cutem effusus in vasa reforescere nequeat, extremum nasum aliquando rubent scarificare, hinc aquis flor. Hyper. & flor. cil. in quibus lac ʒis dissolutum sit, vel liqore rad. Oxylap. in aceto macerare, contulæ & expressæ, addito unctillo cerul. myrrh. & camph. aliquoties abluere.

*Maculas nigras.*

*Maculas nigras*, seu *Punctula plumbea* si non penitus abigi, tamen minui posse sciunt, ut ad tempus minus conspiciantur, si in unoquoque puncto cutis acicula perforetur, ut liquor piflus, seu vapores pingues ab acido coagulati exprimantur, & Nasus postmodum decocto balsustor. & alum. in aq. plantag. & fragar. facto abstergantur.

In *Nasi defectu* & *Figura* ejus depravata corrigendis aliorum & nostro calculo suum peribenter subjiciunt, quare quid de iisdem nobis videatur, proxime nunc pluribus percipies.

§. 19. Cum ordo Nos ergo tangat, en de morbis hîc debite curandis nostram sententiam. Curatio *Sarcomatis* & *Polypi* ferè eadem est, ante omnia enim circulatido sanguinis & humorum promoveatur, in hunc finem conducunt varia absorbentia suasu Chirurgi Amstelodamensis, *Meckerani* in hoc opere versatissimi, præprimis verò hic conveniunt quæcumque sudorifera, hinc pro sudore ciendo optime prodest cinaberis ʒii aliquoties exhibitus item ex eo paratum specificum cephalicum. vel pulv. ipsam. dentor & tinct. ʒii volat. & Oris decoct. lignor. &c. dein ad operam Chirurgicam accedendum, ubi remediis cedere recusat, in quem finem erodentia & caustica conducunt. Possunt placetula parvæ & tenues ex mercurii sublimati & viridis æris cum fermenti tantillo subactis parari, & harum una parti prominenti imponi, & ne decidat cum gossypio applicari, vel ad mentem Hartmanni ʒ præcipit. vel aliorum, butyrum ʒii rectificatum, vel nostro iudicio melius conducet lapis infernalis cum cautela cum canula argentea. a. applicatus: & quilibet tyro gradatim curam peragat, & Elchar. imponat seq. digestivum:

*R. Ungu. bas. ʒij.*  
*Elix. vin. ʒʒ.*  
*myrrh. ʒj.*  
*M.*

& dein utere seq.

*R. Elix. vitæ ʒʒ.*  
*Olei sab. ʒij.*  
*Spir. Sal. æci ʒj.*  
*M. imponatur plum. accedens.*

Sed antequam ad hæc accedamus, prius exsiccantia vulgo dicta naribus sæpius immittenda, imprimis commendamus, sequentem vel similem pulverem consumentem ex cort. granatorum, gallis, & magist. hi paratum cum colchotare Oli. Elcharam post horarum aliquot spatium Chirurgus potest blanda manu separare, & iterum aliam placetulam imponere. idque toties repetere, usque dum totus Polypus ablatus fuerit, & si potentiali huic cauterio non obediât malum, ad festum candens accedere potes, quod percaniculum ad carnem luxuriantem usque trahat, atque sic adimas comburasque: post combustionem atque operationem turundam albumine ovi cum oleo rosato imbutam iunittas, postea aliam digestivo maritatum imponas per tempus aliquod, & dein solo unguento albo c. ʒperm. ceti & saturum totam peragas curam. Sunt quicum Cartesians specificum hoc in morbo jactant, nasturtium scil. hortensie & aquat. vel contusum, vel ejus succum polyo applicatum, à quo omnis luxurians caro cecidat. *Poterius* commendat succum scorpiion. seu heliotropii minor. naribus die die cum gossypio immisum: alii laudant ut Panacæam ʒiij. album Hartmanni, ex ʒio ʒsat. vel arcan. corallin. paratum. Nos aliis præferimus medicamentis sequentem aquam ad polypum:

S 2

*R. Auri.*

℞. *Auripigmenti* ʒij.

*Atr. virid.* ʒij.

*Vin. generosi* lbj.

*Cog. ad medium.* & add. *aq. rosar.* &  
*Solani* aa. ʒij.

*M.*

cum penicillo Polypum sæpe attinge, vel quod magis ardet.

℞. *Δ calc. viv.* ʒj.

*Elix. vin.* ʒʒ. ʒij.

*Olei sabin.* ʒij.

*Spir.* ☉ ʒij.

*Merc. sublim.* gr. v.

*M.*

quo continuasque ad totalem Polypi extirpationem. Alii instrumentum plumbeo longitudine unius digiti, forma pyxidis excavato imponunt cauterium potentiale, & admovent Polypo intero, & ita excrescentiam carneam absumunt, remota hac cannula butyrum applicant, donec elichara & caro combusta ceciderint. Excell. D. *Crauw* commendat Gum album sæpe parti affectæ applicatum, ut & succum granatorum per coctionem infusatum. Si verò radices Polypi narium partibus naris firmiter affixæ fuerint, melius est cum vel laqueo, secundum *Aspicratem*, vel alio instrumento radicem extirpare & evelere, quæ operatio Chirurgica sequenti modo peragitur. Aget die & loco claro in sedili collocetur capite fixato, forcipe extractorio cavo, & in summitate denticulato prehendatur Polypus; & dein turundæ unguento detergente imbutæ naso indantur, vel si hæmorrhagia larga subsequatur, liquore stipitico madefiant turundæ, & si reliquæ non omnes eximî possunt, inurantur sacramento per cannulam narium immisso, imprimis si in palatum usque promineat, quod æque forcipe evellatur: post operationem gargarismus conducet ex decocto hordei, vini spiritui & melle paratus, qui etiam per nares ope syringæ incipiat, & ad crassos humores incidendos & corrigendos per tempus decocto lignorum utatur æger.

Novinus ægrum Hanoviensem Dn. le Roy dictum, qui Polypum in naribus fovebat respirationem maxime impediens, quem Dn. *Vedlinus* me præsentem feliciter forcipe exemit frustulatum, & nihil aliud erat, quam mucus sanguine permixtus & congelatus, cui diu præscripti humores temperantia & fluidos reddentia varia, unde nunquam recidivam passus est. In hoc etiam Polypo, qui serosus & punitotus, formaque Sarcomati, quam Polypo propior est, convenit foniculus in brachio institutus: ad infundendum seq. utere:

℞. *Spir. vin. Camph.* ʒij.

*matricar.* ʒʒ.

*extr. cent. min.*

*abjynth.* aa. ʒij.

*myrrh.*

*aloës* aa. ʒij.

*camph.* ʒj.

*sacch. Satyrin.* ʒʒ.

*M. D.*

In *cancrofa* verò ac cartilagineâ dispositione, qualen Belgico idiomate *Observat.* suarum cap. 11, describit *Mecernanus*, tantum abest, ut alterutro remediis in genere aliquid efficere possis, ut ne extirpationem quidem, nisi summa cum prudentiâ adhibendam esse existimemus adeo

difficilis illa molitio & periculo plena, ut eam jam senel inceperis, aliquando desistendum esse ducas ad tot symptomatum ipsa sectione saeviorum, deliquiorum, hæmorrhagiæ, suffocationis & reliquiarum metum. Cessit alias illud artificium senel atque iterum *Mecernanus* ex voto, tum illi apud *Tulpium* lib. 1. Obs. 26, attamen non semper contingit, & vidimus, cui post tentatam hanc curam nil præter immensam dolorum vum & tumoris cancerosam malignitatem relictum fuit solati.

Curatio *Verrucosarum* Narium in eo maxime consistit, ut nutrimentum illis adimatur, quo ex-  
*verruca*  
*verruca*  
siccata decidunt, quod in minoribus, tum internis, tum externis, perficitur succi portulacæ & salis ammoniaci frequentiori attractu & attritione, vel butyro ʒij, si leviter eo aliquoties attingantur, vel succo folior. ficus, vel lacte esulæ, vel succo mucoso limacum. Possunt etiam emplastro diachyli, emolliiri & emollitæ abscondi, & ne recrescant, locus abstergetur aceto cum alumine. Ferro candente si sæpius adurantur, marcescunt & flaccidæ tandem decidunt. Majores autem pendulæ, & minutos quasi nasulos seu Nasi factus præ se ferentes admodum difficulter abiguntur, & si tenui dependent petiolulo, vix ullo remedio melius tolluntur, quam curatione per Anabrochismum, seu constrictionem fili vel seti equini, ut ita fibræ artius compressis, meatus, per quem nutrimentum hauriunt, præcludatur, & sic eodem destitutæ & exsiccata decidunt, indies filo artius confictis, & inuncto aliquando unguento *Egyptiaco* non dolor & gangræna sequantur, petiolusque tandem dissiccetur, atque ut radices illarum penitus extirpentur, remedium ex sandaracæ in lixivio sacmentorum ficus silvestris dissolutæ, vel unguenti, vel emplastri formâ adhibeatur. Sic feliciter pastor Schlizenis à tali nasulo verrucoso usque ad os pendulo fuit liberatus.

Narium *Ulcera* sunt curatû difficilissima; interne convenienter corrigentia, ex quibus præstantiora non dantur mercurialibus, hic affectus enim eodem modo acules Veneræ debet curari: post hæc sudorifera conducunt, imprimis decoctum lignorum, ex gr.

℞. *Lign. sancti.*

*Corr. quæd.* aa. ʒiv.

*Rad. Chin. Zedoar. Imperator.* aa. ʒj.

*herb. scord. hyper.* aa. Mj.

*Sabin.* ʒj.

*Nasturt. ag.* Mj.

☉ ☿ aa. ʒj.

*cog. in liq. vin. & ferulast.* aa. p. n.

*colan.* ad ʒxli.

Post hæc Elix. propriet. omnia enim myrrhata & aloëtica item antimoniata & martialia omnem implent paginam, hinc acidulæ egregiæ sunt in curando hoc malo. Omnia quæ sanguinis acrimonia corrosivam corrigunt, hic conveniunt, ut sunt omnia absorbentia, præprimis commendamus ocul. & sæpius & per vices assumtos; interdum propineur decoctum vulnerarium, non ad mensuras, sed tantum cochlearium exhibendum. Pilulæ de sumariâ sæpius exhibite egregiæ sunt. Dentur & Essentia lignorum cum ess. flor. anthos, vel cum ess. traumaticâ. Si ulcera à scorbuto oriuntur, semper admisceatur antiscorbuticâ

# CAP. XVI. DE NAS. SARC. POLYP. VERR. ULC. &c. 141

butica, hinc conuenit pulvis temperans N. item spir. nollet antiscorbuticus, item pulv. spasmol, vel detur seq. spir.

℞. Spir. Cochlear. ʒß.  
 Oleul. Oleos. cephal. ʒj.  
 Elix. vita ʒvj.

Exeterius laudamus omnia mercurialia, Satur-  
 nina, myrrhata, aloetica, cinabarina. Hic ju-  
 nioribus Medicis communicamus in ulcere na-  
 rium incipiente euporiston remedium raro sal-  
 lens.

℞. Ocul. ʒß.

Spir. ceti aa. ʒß.

Cinab. nat. gr. vj.

facchar. ʒi gr. v.

Campbor. gr. iij.

Bals. Peruv. q. l.

F. Balsamus, quo sepius illi natur pars af-  
 fecta. Conuenit quoque ung. aureum vel se-  
 quens mistura contra Ozzenam: ∇ majoran.  
 plantag. aa. ʒß. Mell. ros. ʒvj. Spir. vin. rectif.  
 ʒiij. applicentur cum syringa, aliquando addi  
 potest mercur. sublim. gr. vi. Si febris adest se-  
 quenti vel simili linimento utatur.

℞. Ung. basil. ʒj.

Ol. guajac. Bals. Peruv.

Ol. ass. sfras, gummi. elem. ammoniac.

disolut. aa. ʒj.

precipit. alb. gr. ij.

M. F. linimentum, vel cum plumaceolo im-  
 ponatur decoct. hord. c. mel. rosar. & aq. calc.  
 vii.

Si febris abest fiat injectio seq.

℞. Hydromel. ʒvi. succ. hyper. absinth.

apil. Sp. matricar. aa. ʒß.

myrrh. campb. aa. ʒj.

M.

cum spongia bacillo alligata eluatur ulcus seq.  
 vel simili mixtura.

℞. ∇ Regin. Hung. Elix. vita aa. ʒß.

Spir. matricar. ʒj.

Θ \* ʒß.

myrrh. aloes aa. ʒj.

Campb. ʒij.

Ol. guajac. ʒj.

M.

vel seq. trochisc. f. Suffumigium.

℞. Iadan. pur. mastich. gummi. animx, hypo-  
 cist. storac. calam. sandar. aa. ʒj. excip. There-  
 binth. & f. trochisci. Et si olla fuerint infecta,  
 conuertet ol. vel Spir. cochlear. vel Caustero a-  
 ctuali opus est Seracae, fontanellae, vesicatoria  
 & eius generis remedia ab authoribus commen-  
 dantur, quae tamen fidem raro explebunt.

Decoctum myrrhae & olibani aa. ʒij. in vi-  
 no & aceto aa. ʒiij. & in petiis (de syndone)  
 aliquoties ad mentem Hartmanni calide appli-  
 candum. Nec ipsius contemnimus Gam viti-  
 dem sepius adhibendam. Vel fiat suffumigium  
 sequens, quod saepe egregias praestat vires.

℞. Ther.

Gum. anime aa. ʒj.

Cinabar. ʒj.

M. F. Pulvis pro suffumigio carbonibus in-  
 jiciendus, vel cera susceptus informans candela re-  
 digatur, assiduo in concolo accendendus.

Inflammationes & Erysipelat narium com-  
 muni more intus erypematum ceterorum re-  
 stinguuntur; Rob sambucinum instar linimenti

inungatur, vel locus affectus Aqua Regin. Hung.  
 cum camphora illinatur, vel Spir. vin. campb.  
 Si affectus est a sanguine, D. Muys commendat  
 linteolum spermate ceti imbutum & naso appli-  
 catum. Plura qui cupit, ea ex generali Indam-  
 nationum capite petat.

Maculas reliquas rubras abigere potes  
 sanguine menstru, vel aqua sperm. ranar. cum  
 camphora, vel Aur liguatur in petia, & per no-  
 stem ponatur in aqua rosacea, qua nasus fre-  
 quentius abluatur. Maculas nigras aqua oxy-  
 lapathi cam lacte ʒis, vel colugetico Clavii in  
 aqua bryon. & centaury. min. solut. aliquando,  
 caute tamen attinges, ut materia spissa eliciatur,  
 quam acicula quoque cuticula aperta eximere  
 poteris, & locum postmodum decocto agrimon.  
 rad. ari. balauft. cum alumine abstergere, ut fi-  
 brulae cutis aliquantum adstringantur, ne suc-  
 cum spissorem, & vel flavum, vel atrum, tanta  
 copia ulterius admittant.

Nasum deperditum, vel alio modo, ob erro-  
 rem sc. virtutis plastica; deperitum quod atti-  
 net, cum pars ejusmodi ablata haud restitui, nec  
 defectus resarci possit, operam e. us gratia ad-  
 hibeam omnino perdi reor, quamvis nonnulli  
 sint, qui existimant, si aliud frustulum statim  
 imponatur, illud consolidari posse; credat ta-  
 men Judaeus Apella, ego non, quia fibrae tam  
 exacte invicem nullatenus respondebunt, ut  
 succus nutritius cum spiritibus animalibus per  
 tubulos commodè distribui queat, & pars appo-  
 sita eadem gaudeat quadra cum reliqua. Interea,  
 si vulnus instructum portionem Nasij nondum  
 omnimodo semoverit, sed ea residuo nasi adhuc  
 in parte quadam adhareat, ab actu statim iterum  
 uienda est, & emplastris glutinatoriis firmam-  
 da, ne decidat, sed emplastris sticticis & consoli-  
 dantibus interveniente cicatrice denud ag-  
 glutinetur, cujus rei gratia, ut nasus commodius  
 tractari & emplastra firmius adherere queant,  
 aeger supinus decumbat, per os adabsolutum us-  
 que curam potissimum respiciet, & nasi cavitati  
 portio quadam plumbea figura nasapte respon-  
 dens inseratur, qua ratione cura aliquando voto  
 citius succedet. Nasum vero artificialem in defe-  
 ctum veri Parentis substituere docet, exauro, ar-  
 argento, papyro aut conglutinatis linteis con-  
 sectum, ejusque coloris & figurae, quae proximi-  
 tate accedat ad naturalem, qui ad occiput & pi-  
 leum funiculis est revincendus. Sed non credo  
 artificium illud tam affabile praestari posse, ut  
 nasus ille factitius exactè prout respondet  
 foraminique adeo firmiter adherereat, ut frustra ista  
 aliis non facile detegatur, odoratus tamen, & ne  
 quid foramini aperto ingruat inconmodi ita  
 facilius providebitur.

Figura depravatio varia in utero materno de-  
 lineata omnino nequit mutari aut corrigi, su-  
 pra enim hoc omnem est artem, & si fieri possit,  
 ha! Medicum illum vix sufficere credo tot of-  
 ficiis, quum magnus foret hominum numerus,  
 qui alium sibi fugi vellex nasum, pristina ejus  
 figura minime contenti, & proinde Medieum  
 illum simul praedicarem diutissimum etiam  
 ad quos augeat sui vitiis potius avertimus, ut  
 loquitur Hippocr. de artic. l. 3. & nullo parcer-  
 rent precio, maxime virgines & mulieres diu-  
 res, quo pulchritudo illis coiviscit ut augeatur,  
 ad quam nasi figura continua non parum  
 contribuit. Quando vero excessu, percussione,



aut alia quadam offensa figura naturalis variè distorquetur, opera danda est, ut in pristinum situm reducat, digito molliore naribus inserto, yel turunda ex carbaso aut corioconveniente, externè autem cataplasmate ex farina triticea imposito, quo facile ad pristinam redeat figuram: nec splenis impositis nasus nimium venit deprimendus, sed potius manibus leviter & convenienter componendus, idque eà statim die, qua latus fuit, posthæc quietum se gerat æget, ne quod Chirurgus convenienter disposuit, ille iterum destituat, maxime quando cartilago aut os simul fractum est, ubi id quod eminet, deprimendum, quod deprellum, debite attollendum est, naresque ita contrectandæ, ut omnia in debitum & naturalem reducantur situm, imposito emplastro ex albu. ovi, thure, matich. terr. sigill. sang. dracon. & punicum. ust. indituoque frusto ex pulmone ovil-

lo ad narium figuram dissecto, ut *Hippocrates* vult, vel liniamentis in longitudinem implicatis, & pelliculo molli cinctis circumfistisque, juxta *Celsum*, vel qui commodiores sunt, ex invento *Paræi*, immististubulis non exactè rotundis, sed aliquatenus latis & deprellis, itaque foraminibus instructis, ut pileolo nocturno revincti nec saniei exitus, nec inspirationi & expirationi via præcludatur, externè verò locum ex corio molliore convenienter resecto & extenso ad Nasum inclinatum agglutinetur, & infra aures circum caput obducatur & in fronte ligetur, super illum verò ceratum aut emplastrum ad fracturam applicetur, & si callus augeri videatur, spongia aqua calida imbuta, ex ejusdem *Celsi* præcepto, in dies foveatur, post diem verò duodecimum aut decimum quartum sortum cum emplastro iterum denatur, quo tempore oñia debite constabilita & ad integritatis statum omnia erunt reducta.

## CAPUT XVII.

*De Hemorrhagia Narium, Coryza, Sternutatione nimia, Odore depravato & abolito.*

## §. I.

**Q**uemadmodum aliorum sensuum organa suos patiuntur affectus, ita & Olfactus sensorium, ipse nimirum Nasus, non paucis morbis divexatur, inter quos autem illius haud postremum locum *Hemorrhagia* obtinet. Frequenter enim in praxi nobis occurrit, & adeo nonnunquam enormis est, & impetuosa, ut ægrè admodum sibi queat, & propterea laborantem non raro ob spirituum reliquorum succorum stagnationem ac sanguinis effluxum in vitæ discrimen adducat, prout nuper adhuc in puella observavi intra spatium 3. dierum 18. libras sanguinis effusus, quæ & sic Creatori suo animam, quam ab ipso accepit, reddidit. Sanguinem enim esse vitæ nostræ thesaurum, (qui consistit in ejus motu;) & spirituum animalium nutrimentum, quo certe coagulato & stagnante omnia in corpore pereunt, & homio cadaverosus relinquitur esca vermium, quotidiana nos docet experientia.

*Hemorrhagia quid?*

Dicitur verò hic affectus *Hemorrhagia* Græca origine, ab *hæma* & *hæma*, quasi dicas fluxum sanguinis, cuius quidem variæ dantur species, quales sunt, qui vel ex sedalibus provent vasculis & fluxus *Hæmorrhoidum* dicitur, vel ex utero singulis mensibus elabitur, & Mensium fluxus appellatur, vel qui post partum è mulieribus effluit, & *Lochiorum* fluxus audit. Sunt adhuc aliæ cruentæ excretiones ex quibuscumque partibus, de quibus suo loco dicemus: nunc verò fluxum sanguinis è naribus eruptentem, *Hæmorrhagiam* scil. Narium, videamus, quæ interdum non adjecto partis nomine exprimitur sanguinis eruptionem, quæ per nares fit, ut testatur *Gal. 1. Epidem. comm. 1.* quo sensu etiam hic usurpatur, & significat fluxum illum è venis arteriis cerebri in ejus præsertim basi existentibus. Describi ergo potest, quod sit p. n. & immoricia sanguinis per nares excre-

tio, vel ejusdem è naribus effluxus, à causa nunc internâ nunc externa productus imprimis ob vas rupta. *Differentias* quod attinet, dicitur vulgo aliam esse criticam, aliam symptomaticam, illa in affectibus acutis quandoque constituitur; hæc vel pauca est, vel nimia, aut nunquam secuta. Omne nimium vertitur in vitium.

*Gravado*, quæ & *Coryza* dicitur, est species *Gravado* catarrhi cuiuslibet nota & solennis, & describi *seu Coryza* potest, quod sit excretio p. n. cum strepitu humoris à capite ad nares defluentis acris, fibrillas membranaceas narium fortiter commoventis, & vasa lacerantis disstringentisque.

*Sternutatio*

Ad narium affectus etiam referri potest *Sternutatio*, quæ dicitur *Bartholinus* parva Epilepsia, aliis Apoplexia parva, & describi potest, quod sit motus convulsivus musculorum pectoris expectorationi interventium, quo per os & nares aer una vice exploditur, à particulis acris sero inhospitantibus, vel extenè advenientibus, & membranas narium vellicantibus oborta. *Sternutatio* est quidem indicium optimæ valetudinis, si debite fiat, ac aperte viæ sint, ut noxia educatur materia, hoc enim modo morbos alios curat, & à gravioribus præservat, sæpè tam etiam malum signum præbet & noxam parit, dum humoris acres coacervatos in capite denotat, quibus alii morbi vel producuntur, vel augentur, vel exitiosi redduntur, merito hinc *Sternutationibus* gratularum & salutem iis precamur, quod salubritatis adhuc aliquid desit. Hinc à nonnullis & planè morbus appellatur, & incatarrhis, in cephalalgis, Epilepsia, apoplexia, phrenitide, in lethargo, in caro, in pleuritide, peripneumonia & pluribus aliis morbis *Sternutoria* tanquam noxia rescili solent. Cæterum *Sternutamentum* adeo latè se extendit, ut ab *Ovidio* lucernarum crepitus eo quoque designatur, & pro sauto omine, non

non tamen siue ethnicā quādam superstitione, habitus fuerit, quando in *Epist.* ita refert: *Interdū lumen (postro nam scribimus illo;)*

*Sternunt & nobis prospera signa dedit.*

*Oder de depravatum.* *Oder* Narium depravatus est, quando agri odorem altum, quam ipse est, percipiunt, vel quando fetorem exhalant. Depravatur etiam odor, quando odores alii, quam sunt in rebus, percipiuntur, iique ut plurimum putridi & fædidi.

*Oder imminutus & abolitus.* *Oder imminutus*, vel plane *abolitus* dicitur, quando agri vel parum, vel nil olfaciunt. Fit autem olfactus, quando effluvia odorifera mediante aëre impetum faciunt in tunicam nervorum narium.

*Pars affe-cta.* §. 2. *Locus affectus* in morbis hisce est Nasus, olfactus organum & aëris inspirationi quoque inserviens, quia quandoque a excrementorum crassiorum, muci scilicet evacuationem utilis est. Præditus autem est nasus multis vasculis per ipsam cutim dispersis. ex quibus arteriarum sectionem eleganter delineat *Hæmorrh.*

In *Sternutatione* & *Osculo* in viis partes membranasque cum processibus mammillaribus, fibrillisque nervis ac arteriis potissimum afficiuntur, quatenus per harum oscilla posteriora fit effluxus sanguinis.

In *Hæmorrhagiā* verò afficiuntur Nares, quando vasa illorum ut plurimum tamen propagines rami arterialis à carotide internā apertiuntur, ruptumque, vulnerantur, eroduntur, vel à vi externā, vel à causā internā, ad quam referenda sunt viscera conficiendo & depurando sanguini destituta, in his enim cum sanguis non sit itē elaboratus, sed sero filiori sociatus, aut vitiose coagulatus & acris factus, hæc oritur letna morborum. Certum etiam est, Nares laborare vel per effusam, vel per consensum; & ut in *Hæmorrhagiā* afficiuntur vasa lingue, ex quibus optime Rosolus autumat arterias magis in culpa esse, quam venas, summumque tertium cralla meningis per longitudinem tales ad os tribrosam excurrentis in hæmorrhagiā aperti; sic in *Sternutatione* & odoribus lætis patiuntur partes membranasque, pars verò proximè affecta in *Sternutatione* præter membranam narium sunt & musculi intercostales dicti & infimi ventris, quod ex eo liquet, quia in hoc motu convulso non solum confringitur thorax, sed & abdomen comprimitur ab ejus musculis, hinc *Sternutatio* commendatur in partu difficili & secundinam retentione.

*Diagnos. Hæmorrhagiam.* §. 3. Cum *Hæmorrhagiā* narium oculis usurpetur, non operæ pretium ducimus Signis d'agnoscere recentendis diutius immorari. Imminentis verò *Hæmorrhagiæ* narium indicia sunt, capitis dolor punctorius, facies intente rubra, ejusque intumescencia & vasorum obstructio, in ipso fluxu sanguis exillat floridus indicio acidorum ærumque copiosè sanguini immittotum. Vires labalesunt, ob depauperatum plus iusto vitali nequæ corpus. Pallidior redditur facies, ob eandem causam tingente purpura expressa. Vertigo comitatur huic affectum ob ære spirituum animalium. Post desinentem fluxum obstruuntur sæpe nares, ob coagulum concreti & restituntur sanguinis. Sic quoque respiratio per nates minus procedit, denegata scilicet per angustatos tubos aëri vitali viā.

Titillatio & *Sternutatio* irritationi appellens sanguinis acrioris & salioris delicatas narium

membrarum fibrillas ferientis accepta ferenda. Regurgitat quandoque sanguis ad fauces, ob vias, per quas effluerat sanguis, obstructas, adeoque pristino impetu durante ad vicinam portam declinare cogitur.

*Sternutatio*, quam titillatio narium ut plurimum præcedit, non opus habet signis, uti nec odor depravatus vel plane abolitus, hi enim affectus ex relatione ægrotum facile parent.

§. 4. *Causas* horum morborum quod concernit, Veteres Galenici in *Hæmorrhagiæ* narium symptomatica tres ejus constitunt species, *aragiam*, *sternutatio* & *diapnoe*, quarum causas speciatim enumerant, easdem in externas subdividendo, & quidem Anatonosofes causas internas ponunt ipsius sanguinis copiam cum impetu ad venarum ora ruentis, ejusdem caliditatem & acrimoniam facultatem expultricem stimulantem, recenteris debilitatem, venarum molliem & tenuitatem, externas autem diatam lautioris sanguinem copiosum generantem, intermissionem venæsectionis, abstinentiam à Venere, exercitia immodica, medicamenta oscula venarum nimis reserantia & similia. In *Diapnoe* internè culpant vasorum raritatem & relaxationem, & sanguinis tenuitatem; externè exercitia vehementiora, ambientationem aut moram longiorem sub Sole, balnea, In *Diapnoe* internè sanguinis acrimoniam & mordacitatem valè erodentem, eorundem distensionem à sanguine copiosiore & ebulliente; externè acria quævis, motum vehementem, pondus grave, clamorem, contusionem, incisionem, puncturam, rupturam. *Hæmorrhagiā* criticam à natura robusta in febribus aliisque morbis acutis, prægressis signis coctionis & crisco, sanguinem, ut causam morbi, die critico copiosius deiciente excitari refertur.

*Coryza* causam proximam statuunt nimiam humorum copiam, eamque cum ob debilitatem cerebri, ab intemperie calida vel frigida inductam, & minus contenta non satis concoquentem, sed unilicos crudos humores relinquente, quos facilis expultricis cerebri ab onere eorundem agitata ad nates ablegat excrendos; tum etiam ob vapores multos ex visceribus inferioribus ad caput adscendentes, & ibidem in humorem à frigidity cerebri condensatos: inter remotas veto recensent, refrigerationem capitis ab aëre nocturno hyemali, vento boreali, nive, aque frigida appulsi, aut medicamentorum refrigerantium usu immodico, & id genus aliis.

*Sternutationem* nimiam causari dicunt à vapore vel substantiā quādam tenuiore aut acrimonia prædicta, instrumenti olfactus facultatem expultricem irritante, & ad noxia expellenda stimulante, cujus indolis esse volunt ad specum Solis vaporem excitantem, refrigerationem capitis calorem ad interiora cerebri repellentem, & eo modo vapores provocantem aut humorem tenuem ad nates exprimentem, medicamenta acria in pulverem redacta, ut piper, euphorbium, pænicum; vel externa quædam naso intra, ut stylos, pinulas, turundulas, & quæcunque partes illas irritantia.

*Odorem abolitum* iidem vel ab intemperie cerebri frigida & humidā, ac copiosa pituita collectione meatum narium & cerebri obstructo produci credunt, vel à cerebri aut processuum ejus nariumve, aut ossis ethmoidis angustia, vel

*Sternutatio & odor depravatus & abolitus.*

*Pathologia secundum Galenicum in hæmorrhagiā.*

*In Coryza.*

*In Sternutatione.*

*In odore depravato & abolito.*

vel ab humorum copia eodem modo, ut in praecedentibus jam dictum, collectorum & ad nares nimium profusa. *Depravatum* olfactum à quacunque materia factum vel ex naribus in ulcere, vel alià quadam corporis parte vapores ad cerebrum & olfactus organa transmittente oriri poile agnoscunt.

*Paracelsi.* §. 5. *Paracelsi* in *Hæmorrhagiarum* accu-  
sant sanguinis nimiam liquiditatem Mercuria-  
lem, quæ debita ejusdem consistentia resolvitur  
& ipse in vasis ulterius contineri nequit, sed  
exitum sibi quaerit, tum etiam sulphur volatile  
resolutum à vinculis ob majorem sui expansio-  
nem vasa dirumpens.

*Coryza.* *Coryza* causam statuunt sal tartari resolutum è  
regia Mercurii ad regionem Martis destillans,  
emunctorium illud copia sua claudens, & si  
exitum ibi non inveniat, vel acrimoniam ac-  
quirens emunctorium, illud erodens, vel ad fau-  
ces aliquando descedens.

*Sternutatio.* *Sternutationem* à sale ejusmodi acri nares sti-  
mulante deducunt, sed impetu & sonitu illo  
sibi exitum faciat.

*Olfactus depravatus & abolitus.* *Olfactum depravari & aboleri* dicunt pro di-  
versitate salium istorum nares occupantium,  
& externos sales à rebus odoratus evolantes  
infectantium aut virtute propria spolianti-  
um.

*Helmontii.* §. 6. *Helmontius* in *Hæmorrhagiis* Narium  
dumviratum lacum in culpa esse existimat,  
nec non acorem in sanguine extra pomaria sua  
vagantem. Archeumque partium irritantem &  
interdum vasa rumpentem.

*Coryza.* In *Coryza* os ethmoides potissimum pec-  
care censet, dum mucos oppilatum, conti-  
nuum provocat laticem, mucumque pro-  
fundit.

*Sternutatio.* *Sternutationem* ab eodem osse ethmoide pro-  
vocari dicit, dum ad expellendum mucum il-  
lum, vel se liberandum è materia molesta, in  
subsidium vocat musculos thoracis, qui trah-  
mittendo aërem os illud inieciendo hospite illo  
molesto apprimè adjuvant.

*Olfactus depravatus & abolitus.* *Olfactum* pro diversitate muci istius varie  
etiam *depravari*, quin *ledi* & interdum planè  
*aboleri* putat, eo quod Archeus aliquando de-  
cipiatur, judicando odorem esse in re externa,  
qui in mucos vel latice consistit, aliquando à  
causis illis irritatus, nullum planè admittat  
odorem.

*Wallerii.* §. 7. *Wallerius* causam *Hæmorrhagiæ* aut in  
sanguinis, aut in vasorum, aut simul in utrius-  
que horum vitio consistere docet. Sanguini-  
nem verò per se hæmorrhagiam inducentem  
aut quantitate aut qualitate peccare. Qualita-  
te quidem, dum occasionaliter effervescent intra  
vasa contineri nequit, sed ora eorundem aut  
distendendo aperiens, aut acrimoniâ suâ referans,  
foras exilit: vel ut compage solutus & quasi  
venenatus, circulationis filo continuando im-  
par evadit, quatenus portiones ejus ad invicem  
decedentes, partim in carne aut cute deligan-  
tur necrosin palli, partim erumpentes, hæ-  
morrhagias immanes & non raro lethales cient:  
uti passim in febribus malignis & aliquatenus  
nonnunquam in scorbuto cernitur: mera ta-  
men quantitate aut acrimoniâ peccantem, nisi  
vasorum culpa etiam superveniens effluxum  
ejus proritet, aut facile nimis permittat, raro  
in hæmorrhagiam immanem erumpere, sed

vasa sanguifera, quoties ad affectum istum pro-  
ducendum conspirant, in vitio esse solere, vel  
1. quatenus ob fibras nimis laxas & debiles oscu-  
la istorum debilitata sanguinem ex arteriis in  
venas non expedite transvalet, ut in scorbuticis  
& cachecticis contingit, vel 2. quatenus ob  
easdem fibras motrices spasmodicè affectas &  
convulsas, sanguis huc illuc, & imprimis versus  
caput inpetuosè correptus; propter conti-  
nuandum circulationis flum erumpere co-  
gatur.

*Coryza* originem deducit è colluvie serosa *Coryza*,  
è sanguine suffusa, qua procellis mammillares  
& membranæ tubulatae narium compages ob-  
ruantur, & ejusdem pori & meatus tam copiosè  
inundentur, ut materiam illam serosam diutius  
continere nequeat, sed interdum nimis eadem  
istat spongiæ repleta, levi de causa compressa  
eandem vel per nares foras, vel per palatum ad  
fauces transmittat.

*Sternutatio.* *Sternutationem* ab eadem colluvie serosa  
citari vult, quatenus impuritatibus aut parti-  
culis quibusdam spasmodicis imbuta tubulos  
nervolos exagitat, & ad motum convulsivum  
stimulat, qui subito mediantibus spiritibus  
animalibus similiter irritatis, & pectoris, &  
abdominis musculos in consensum trahentes,  
materiam noxiam motu illo explodere satigant.

*Olfactum* itidem variè *depravari* putat à par-  
ticulis illis, quibus materia ista abundat, vel è  
ulcere aliisque tuni nasi tum inferiorum par-  
tium vitiosis & impuritatibus expirantibus, &  
fibras sensiles membranæ narium agitantibus;  
minui verò & *aboleri* eundem, dum pori ejus-  
dem membranæ nimium infertiantur, aque  
fibræ sensiles in eadem & simul in linguæ men-  
branâ obstruantur, cumque nares & lin-  
gua humore continuo madere debeant, hinc  
utraq; feri exundantis depluvium non mo-  
do gravius & plus quam alias partibus luere, sed  
quoque ambas eidem malo leviori quavis de cau-  
sa æquo obnoxias existere.

§. 8. *Sylvio* videtur omnis *Hæmorrhagiæ* cau-  
sa esse appetit vasorum qualiscunque, sive illa  
fiat ex nimia vasorum à copioso, valde rare-  
facto aut retardato sanguine, flatibusve, disten-  
sione, sive ab humoris aut vasis, aut extra ipsa  
subsistente acrimonia rodente, sive à re dextra &  
acuta vulnerante, obtusave contundente, aut  
quovis alio idem contingat modo.

In *Coryza* glandulas conglobatas circa ple-  
xum chorocidem in cerebri ventriculis laterali-  
bus & alibi observabiles, ab aëre externo male  
credit affectas, pituitamque non modo ita coag-  
ulari, sed gravèdine urgente lympham quoque  
produci salso-acidam, qualis in *Coryza* plenius  
que gustatur.

*Sternutatio.* *Sternutationem* à causis quibuscunque cate-  
nus produci credit, quatenus nares irritando  
vellicandoque ad molestiam illam expirato per  
nares potenter aëre simul expellendam, partes  
expirationi dicatas movent; cum quæ vehem-  
enti aëris excussione concutere solet uni-  
versi corporis concussio vehementis. Inter cau-  
sas autem illas recenses tum Solis lucis  
splendorem aut immedieatè, aut mediantè reflec-  
tione per nivem, glaciem, aquam, speculum &c.  
facti nares attingentem; tum res acres, cepa  
puta, sinapi, raphanum, &c. vel naribus ad-  
motas attractasve, vel ore assumtas: tum  
Humo-

Humores icidem acres è capite ad nares in grave-  
dine seu Coryzâ delabentes; tum vapores  
halitusve similiter acres è ventriculo, tenui-  
ve intestino ascendentes naresque irri-  
tantes.

*Officium depravari, immutari, abolui & audi.*  
Officium depravari dicit à fœtore in corpo-  
re existente, atque odoribus externis admixtis  
se admiscere, illosque inficiente ac vivante;  
& forsitan aliquando à quibusdam habitibus ad  
certos demum odores externos admixtos in cor-  
pore excitatis & tunc per ætrophagium sursum  
propulsis, cæteros alimunde accedentes inficienti-  
bus. Fœtorem vero sponte ac continue ad nares  
è corpore ægri delatum parti alicui in naribus,  
faucibus, ore, pulmonibus, vel alibi corruptæ  
aut putrefacti debet asserit. Abolui & dimi-  
nui odoris causas gradu tantum differre novit,  
easque vel in sensorii ineptitudine ab exsiccatione  
potissimum & humectatione nimia inducta; aut  
gravi læsione, vel in nervi odoratorii, spirituum  
animalium aut cerebri morbis existere. His ac-  
cescet Odoratum auditum, cuius causam enume-  
rat sensorium solito tenerius, atque à quovis  
odore potentialis affectum.

*Coryza-  
norum in-  
diciam de  
causa hæ-  
morrhagie.*

§. 9. Coryzæ causam Hæmorrhagiæ Narium  
similiter ferè cum Vitislo adseribunt tum san-  
guini, tum valis. A sanguine oriri dicunt Hæ-  
morrhagiæ, quando vel à fermento nimis po-  
tente, impetuofo motus magna cum vehementia  
irriti in arteriis carotidas, indeque deductos  
narium famulos, eorumque oscula, aut poros  
aperit & effunditur; vel quando nimis acris &  
corrosivus existens vasorum poros perforat. Va-  
sa in culpa esse volunt, quando ipsa aut nimis  
sunt tenera & tam, ut sanguini facile concedant  
transitum, etiam non adeo ferat impetuofo; aut  
à causa dissidente & tumpe aperiuntur; aut  
poris osculisve constant nimis dilatatis aut aper-  
tis, quibus sanguis nullo obstante impedimento  
facile elabatur.

*Coryza.*

Coryzæ potissimum excitari existimant à  
particulis acutis, acidis, acerbis in acre volu-  
tantibus, fibrasque membranulæ illius, quæ  
nares investiuntur, vellicantibus, unde vasa  
lymphatica simul congesta liquorem effundunt  
aliquando adeo acrem, ut partes illas, quas ali-  
luit, erodat, tanque copiosum, ut & ad  
laryngem & fauces profluat, easque simili  
modo afficiendo tæcedum & tussim pro-  
creet.

*Sternutatio-  
nem.*

Sternutationem ab irritatione hæ fibrarum  
Narium membranæ originem sumere asserunt,  
quatenus vel lymphæ antedictæ, vel alia quæ-  
dam causa acris & molesta easdem exagitat &  
vellicat, quapropter ad rem molestam explo-  
dendam spiritus animales irritati musculos dia-  
phragmatis & abdominis in motum convulsi-  
vum disponunt, prægressæque altæ & profun-  
dæ inspiratione, magna acris copia thoracis  
cavitatem intrat, & per canaliculos interme-  
dios cum impetu in musculos ruit thoracis, &  
diaphragmatis, antagonistas musculorum abdo-  
minis, à quibus deinde aer celerim excurrit  
ex cavitatè thoracis & narium, & insultu suo  
vehementiore sonitum excitat, excussorem  
istam affiduo subsequenterem.

*Officium  
depravari  
immutari  
& abolui.*

Officium sæpe depravari dicunt in Coryzâ  
à particulis lymphæ sepe particulis odori-  
feris variè immiscensibus, earumque figuram

& motum alterantibus, vel ab aliis quibusdam  
affectibus partes quasdam corporis corrupten-  
tibus, egrediuntur particulæ motum aliarum o-  
doriferarum turbantes. & nervis olfactoriis ali-  
um imprimentibus; Inimici vero è aboleri eun-  
dem existimant à fibris nervorum nimium in-  
crassatis, aut nervis obstructis, ut spiritus ani-  
males species odoratas ad commune sensorium  
fatis commode nequeant apportare.

§. 10. Nostrum de causis horum morborum ra-  
tiorum sequenti se habet modo. Quandiu  
sanguis intra sua menia placido ac tranquillo  
gaudet in circuitum motu, tam diu omnia manet  
pacata, quamprimum vero à causa aliqua tur-  
batur, & ejusque motus in circuitum impeditur, in  
varias motus degenerat anomalias, seque am-  
plius continere nesciens vasa sua distringendo  
osculaque distendendo liberum sui vindicat exi-  
tum, quæ data porta foras erumpit, hinc sic illa  
ad mentem Scholasticorum appetit vasorum vel  
per anastomasis, vel per diresin, vel per diape-  
desin, de quo posteriore modo valde dubito,  
quomodo scilicet sanguis è vase aliquo transi-  
re possit. Causa ergo Hæmorrhagiæ immediata  
est apertio p. n. canalium sanguiferorum ad Na-  
res terminatorum, sanguinem foris suis con-  
tineri nesciens, tenuior, serosior, acrior, qui al-  
veos suos transcendit, limites integerrimos di-  
rumpit, tenuitate sua penetrat, acedine fero-  
sa & salina stimulat, verbo, erumpit n. qua-  
rit.

Qualitate quoque delinquitur primâ acrior  
existens, dum nimium exaltatur & poros reserat  
ac dilatat; tum secundis, ut cum scholis loquar,  
tenuior, & imprimis salinis, lixiviosis ac sul-  
phureis atomis plurimis scædens, unde & findit  
oppositorum murorum tubulos, ac erosione va-  
sorum extremitates afficit, suas enim talis san-  
guis in sinn gerit claves, quibus effringit suas  
portas, & sic non tantum emanat, sed sæpe cum  
impetu profluit.

Motu denique peccat generationis & lo-  
cali, generatus si fuerit impurius, salior ac  
crassior, in cohobis debitis non depositis  
serosis & visceribus læsis. Chylus enim acrior  
sæpe & de characterem sui sanguini & sero im-  
primit, sulphureque sanguinis a sancto motum  
non citatorem & impetuosum conciliat, sed potius  
stagnando acrimoniæ acquirit, & sic vasa sua  
erodit.

Causæ huic proximæ plures aliæ vellicantur  
occasionales & antecedentes, quas inter Res non-  
naturales & præternaturales quarere solent.  
Ex Nonnaturalium causarum classe suum sym-  
bolum asserit Aer, & quidem acidior, & multis  
particulis peregrinæ æthereæ inferentibus im-  
pregnatus, quæ fibras sanguinis divellendo eas  
ad prosequendum circulationis sanguinis mo-  
tum ineptas reddunt, ut in extremitate cutis  
dehærentes sæpius maculas, intra vasa au-  
tem arteriarum ostiola exedendo, hæmorrhagias  
producant. Ne ergo longiori mora quis  
se radiis solaribus exponat.

Nec ex Vitislo genere succendicula mali des-  
cunt, ut sunt alimenta calidiora ac aromaticis  
condita, salia ac fumo indurata, quæ sanguinis  
circulationem impediunt & scorbutum inferunt.  
Huc facit Spiritus vini abusus, potus enim qui-  
cumvis acrior consimilem characterem im-  
primit sanguini, cujus crassitie & ceterivisa  
T tricea

*Nostrum  
causa de  
Coryza hæ-  
morrhagiæ  
Narium.*



triteica iusto pinguior, & vini abusus aliaque animum quantum vellicant.

*Metus* quoque corporis irrequietus, qui ut motum sanguinis dispensat, ita non potest non eundem non promovere, sed tardiores redde-

Quantum verò & *Ira* ad stagnationem sanguinis excitandam possit coagulando humores, confundendo spiritus, excitando motum intestinum utrumque vix dici potest; unde vili sunt quidam ita excaudasse, ut non duntaxat facie spirarent ignem, sed & sanguinem ex oculis ac naribus emiserunt.

Quod consuetas excretiones suppressas concernit, quid hic valeant, præsertim in sexu sequiori, abunde testantur monumenta Medicorum.

In *Præternaturalium* rerum classe stant plures affectus tum chronici, tum acuti, ex inveteratis viscerum obstructionibus, & acrioris sanguinis diathesi oriundi, e quorum prolapsa sunt hydrops, scorbutus, cachexia, febres omnes, tum intermittentes, tum malignæ, variolæ, ipsaque pestis. Huc relecti possunt spasmodice fibrillarum contractiones sanguinis circulationem retardantes & quandoque sufflaminantes, quo pariter vulnera, contusiones, tumores, cancro, leophula scirrhoide nunc exulcerata relecti possunt, tum quoque ob gangrenosam sanguinis constitutionem, tum ob præstitionem sanguinis per capillaria vala egredi cogitur. Sepe à sanguine acri eroduntur valvulæ sinus cerebri, & ut inde hæmorrhagia narium curatu difficillima. Sed & p. n. constitutio Nasi, vel naribus p. n. inherens & irritans hunc affectum producere potest, siue sit officulum oblongum & acuminatum, quale exemplum habet *Bartholin.* in *Atti. Hafn.* Vol. 5. Obs. 122. siue aliud quoddam externum intus lapsum. Vermes rodendo arterias quandoque aperiunt, & hunc fluxum excitant, prout patet ex *Ephem. Germ. Decem. I. Obs. 99.* Sic & ac & certus influens æther hunc affectum producere potest.

*Coryza.*

Causa *Coryza* est plerumque effusio salis à sanguinis massa, quod per arterias sitas circa narium radices in Nares ipsas deponitur istas excorians; sic & sæpe phlegma in foramine palati & naribus hærens os cerebriforme obstruit, admissio scilicet acri frigido, hinc respiratio per nares impeditur, & lymphæ sic præternaturalis excretio, ita ut lymphæ ista copiosa, sicque minus temperata effluens, sed acris, & membranam narium erodat; & Olfactum gustu depravat & sæpe proclius aboleat.

*Sternutatio.*

Causa *Sternutationis* nimis est omne acre, siue particula salina cuspidata ad organum hoc, siue membranam anteriorem narium delata eamque irritans, siue hæc sub lymphæ aliisque humoris & catarrhi nomine insignita, siue externè eo percutiant. Sternutationes manes crebra & immo dicæ plerumque gravissimam latentem causam denotant, ex qua sæpe deterrimi effectus & affectus oriuntur. Sic *Horat. Aug.* in Laura uxoris Fioravanti Martini sternutatione creberrimè vexata antetiore cerebri parte, in qua narium meatus elucescunt, abscellum quandam contineri suspicatus est, à quo sternutatio ista creberrima fuerit oborta. Sic *Cassidini* l. 5. A. 47. *Hipp.* observavit ex

inani & frequenti sternutatione epilepsiam. *Hildanus* observavit sternutationem frequentiore per sternutatoria intempestivè in odontalgia exhibita, *Horsius* ex subsistente hæmorrhagia narium per aliquot dies certis intervalis conatibus magnis puellam afflixisse. Ex acris quoque catarrho sternutationes continuas productas observamus continua nostra ptaxi.

Et salubris acerbis volatilibus & corrosivis ad membranas narium delatis affectus hic facile oritur, uti in famosa illa peste Attica, in qua cum frequentes sternutationes ægris acciderent, statim concidebant & animam efflabant. Confer. *Diemerbroek.* l. 4. de peste.

Lumbricos etiam in intestinis hærentes, naves vellicare & sternutationes producere, quis non in quotidiana praxi, præsertim in pueris, experitur? adeò ut hinc concludendum foret, crebram sternutationem absolute noxiam, cerebro incommodam, vitæ periculosam, sæpeque mortis causam esse, præsertim, si manas sit, & non ab acris materia hæc, tum scilicet ethalis existit, magnam enim cerebri affectionem, & partium membranarum illi adiacentium lationem significat. Confer. *Misericord. Doct.* 2. Ann. 6. obs. 2.

Ex pectinatione capitis antrosum versus nares nonnullis sæpe, pro materia copiosa & inopia, frequens, vel rara sternutatio oboritur.

In catarrhis & Coryza lymphæ acrior rodendo membranam narium, primitus sternutationes, deinde dolorem, hinc rhinorem narium, sæpe eandem excoriationem & exulcerationem infert. Sic quoque acris externus rigidus particulis præditus interiora narium ita afficit, ut ex irritatione membranarum copiosam glandulæ fundant lympham, puram, tenuem adeoque acrem, à qua in naribus Coryza & sternutationes oriuntur, hæc referuntur omnia sternutatoria dicta acriora, nimis frequenter usurpata, quæ continuo stimulo membranam narium irritando, copiosam lympham effluere faciunt, imò non tantum sternutationem, sed & coryzæ inducunt; Confer Epistolam II. celeberrimi Dn. VValdschmidii ad nos scriptam. Huc medicamenta acris insufflata, ut sunt nicotiana, lil. convalli. majoran. item summi variè inspirati pertinent; sic radii solares eundem excitare possunt morbum, causa enim occasionalis huius motus est omne id, quod narium membranam internam superiorem irritat, simulare ac efficere potest, hinc & pectus per consensum patitur, & consensus hic sic per plexus furculorum nervorum pariter tertii & quarti ad nates productorum, cum pari nervorum vago & intercostali pectus imprimis moventium: in istis ergo nervis sic motus celerior spirituum, eorundem traxit & spasmus iste, & quo subtilior est ista narium membrana superior, eo propter facilitatem irritationem promptius sternutat homines.

Causa *Depravationis Olfactus* consistit sæpe in singulari textura huius membranae narium; sic feminam novi, quæ plantæ nullum incommodum habet, nisi quod semper peregrinum concipiat odorem. Sæpe etiam organa huius sensus

lenius ab humoribus variis vel habitibus peregrini odoris infici possunt. Similiter ob ulcus narium in fœe Venereæ ægri fetidum continuo sentiant odorem, item ob scorbutum oris olfactus depravatur, seu pluribus exemplis comprobare possum.

*Olfactus animalium & aboli.*  
Causa vero Odoris imminuit vel plane aboliri consistit utplurimum in defectu spirituum animalium, in membranis narium non influentium. Interdum etiam contingit a causa externa, violenta, vel ab interna. Sic videmus toto die in apoplexia, paralyti, quod ægri his morbis decuti non olfaciant. Sæpius tamen causa in organo hujus sensus male conformato, vel singulari modo vitato consistit, si nimirum membrana hæc p. n. crassior & carnosior est, vel si callus, vel cicatrix istam occupaverit partem, cuius aliquot novi exempla eorum, qui ob has prædictas causas olfactu carere. Hic paucis addamus naturalem olfactus statum, ut eo melius præternaturalem intelligamus. Olfactus ergo fit, quando effluvia odorifera quæcumque mediante aëre impetum faciunt in tunicam nervorum narium internam, quæ impressio contactu vel motu horum effluviis facta ope nervorum narium & spirituum animalium, illos instantium, delata ad sensorium commune, ab anima percipitur, eaque tunc de objecti conditione iudicium ferre, & sic olfacere dicitur.

*Prognosis hæmorrhagiarum.*  
§. II. In Prognosi Hæmorrhagiæ Narium cautus sit medicus, nunquam immemor, hic non ludi de c.rio, sed de sanguine humano, vitæ thesaurus. Certe si hic fluxus sanguinis narium se extendat ultra 4. libras, malum est, si ultra 6. & 8. pessimum, si verò à 14. ad 20. lethale est. Rarissimum ergo est exemplum illud *Servanæ*, quod mulier gravida ex familiâ Zabarellarum Patavinarum oriunda fibras sanguinis excideret 22. & naribus profluerent, quæ tamen peperit & una cum fœtu supervixit. Omne enim profluvium sanguinis immodicum est periculi plenum, viam sternens ad mortem, imprimis si extrema frigeant, si facies appareat pallida viridis aut livida. Sic quoque hæmorrhagiam narium facile insequitur cachexia, hydrops aliique morbi, quos frigidos vulgo nominant. Sic filiam Prætoris pagi Mors prope Francothalium observavi ex nimia hæmorrhagiâ narium cæcam factam, quæ adhuc in vivis est. Capiti dolenti & vehementer laboranti si pus, vel aqua, vel sanguis per nares, aut os, aut aures effluit, morbum solvit, teste *Hipp. Aph. 10. S. 6.* Mulieri menses p. n. deficientibus sanguinem e naribus profluere bonum est, itidem teste *Coo Aph. 33. S. 5.* Quibus per febres aures obstruuntur, iis sanguis e naribus profluens, aut peruribata alvus morbum solvit, ex *eadem Aphorismo 60. S. 4.* Quæ vertigines tenebrosas sentit, ab initio sanguinis profluvium e naribus solvit. Profusa narium hæmorrhagiâ violentè suppressa spasmi & convulsiones nonnunquam parit. Ut enim hæmorrhoidibus longo tempore consuetis inconsideratè supprimantur, secundum nostrum Senem, periculum tabis aut hydropsis, & secundum alios scieris, canceri & lepræ impendit, ita hæmorrhagiâ narium intempestivè cohibita præter prædicta convulsio, epilepsia &c. succedunt. Hinc illud *Hipp. in Coac.* Qui

statis temporibus sanguinem fundunt, si non profuderint, epileptici sunt. Si verò convulsiens est ægrotantis natura & morbi indoli, & non in excessu fiat, nihil est quod inde timeamus; Sanguinis verò stillicidium sive subdilla in his morbis inausum prædicat eventum, & vel mortem, vel recidivam prænotat, Epaminonis & Sileni exemplo penes *Hippocr. Epidem. lib. 1.* qui interierunt, quod pusillum quiddam naribus stillaverit. Symptomata semper mala, & morbum reddit pejorem. Semper etiam malum est, si in senibus oboriatur hic affectus, indicat enim sanguinis coagulum, & in his non facile resarciendum.

*Coryza* sapius ullo caret periculo, & inter- *Prognosis*  
dum salubris existit, materia catarrhosa hoc mo- *Coryza.*  
do per nares exitum querente. Contingit tamen aliquando, ut lymphâ existente acti interiora narium valde exulcerentur, & ipsis ulceribus & Ozanis via sternatur. Quin ipsa Coryza existit contagiosa, & miasmata ex partibus affectis exhalantia, & vel per aërem attracta, vel per lintea aut pocula communicata fermentum talis similem labem inferre solent. Gravedines & sternutationes in omnibus circa pulmonem morbis & antecessisse, & succedere, malum est, observante *Hippocr. Prognost. §. 13. Coa. c. 3.* Raucedines & Gravedines in valde senibus non conequuntur *S. 2. Aph. 40.* Quibus vero dolores circa caput & frontem ex magnis ventis sunt, & ex rigoribus cum vehementer cassati fuerint, eos gravedines quidem maxime perfectè liberant, sunt autem gravedines perfectæ, adeo ut tules succedant, *Perhor. lib. 1. §. 36.* Oriuntur Gravedines vere *S. 3. A. 20.* & hyeme post ætatem siccam & aëquilonarem, aut autumnum vero pluviosum, *S. 3. A. 13. & de Aer. ag. c. loc. §. 28.*

*Sternutatio*  
*sternutatio.*  
Sternutatio peculiare prognosticon vix meretur hæcenus enim periculosus non esse solet, præsertim in coryzæ & catarrhis; sæpè prænuncius est apoplexiæ & epilepsiæ, aliorumque catarrhorum. In Pleuride & peripneumoniâ sternutatio mala est, teste *Coo nostro.* Sternutatio, seu dictum, leve malum est, & lethalis tamen observata in puerpera ab *Hildano*, qui ex sternutatione nimia etiam cæcitatem observavit, *Centa. Obs. 24.* Sternutatio crebrior, diuturnior & gravior cum animi deliquio & motibus convulsivis non sine periculo vitæ est aliquando transit hic affectus in paralytin, vid. *Ephora Germ. Ann. 3. Obs. 138.* *Cardanus* juvenem ægrum se vidisse testatur, qui altera die perit, cum vesperæ præcedente sternuisset trices & plus inanimiter. Sic mulier *Hildani c. 4. O. 12.* postquam duodecies inaniter sternuisset, mortua est: & *Famianus Strada l. 3. prælec. 4.* refert, quandam cum vigiles & ter continenter spiritu sternutatione afficeretur, 24. sternutatione simul animam effluisse. *Amatus Lusitanus* juvenem frequentibus sternutationibus ita dedecoratum fuisse, ut propter ea hominum frequentiam fugisset *Hildanus* etiam recenset, quomodo ex sternutatione crebra & inmodica obstructio nervorum opteriorum suborta, & profluvium mensium periculosissimum sequuntur. Accitit sternuisse abortivum esse refert *Plin. Secund. Nat. hist. lib. 7. & ex eo A. Gell. Noct. Att. lib. 3. cap. 16. p. m. 101.*

Sternutatio quandoque & prodest, & quidem in pluribus morbis, in Surditate, oculorum

lorum affectibus, Cardialgia, singultu, hinc sunt illi versus:

*Tollere singultum sternutamenta, Platonis  
Conversus est nobis testis Aristophanes.*

Uteri materiam sternutatione in facie, oculisque excuti notavit de Gradi. Sternutationes & profundi difficulter parientibus. Sternutationes in morbis longis & chronicis, exceptis morbis pectoris, signum bonum sunt, quia spiritus cerebri validos significant. Tandem & miraculi loco Sacre Scripturæ lib. 2. Reg. cap. 4 exemplum adduci potest, ubi filius Sennamitis per Prophetam Elisum à mortuis sternutatione suscitatus, quod sternutando caput humores gravantes expulit, unde purgato cerebro puer pristinae sanitati tunc restitutus.

Prognosis  
Odore  
depravati  
imminuit  
& abest

Si Odor depravatur, vel imminuitur aboletur, que in catarrhis, periculo carent, si enim curatis, etiam sponte cessant hæc pathemata, sin verò inveterata sunt, difficultas sunt curatu, & omnia sæpe generosa remedia respuunt. cœu nos sæpe inviti experti sumus. Ab Odore depravato aliquando prælagium mortis desumitur, hinc Boerhaave cent. 4. O. 8. inquit: Terram oluit quidam, & paulo post fato cessit: quod & confirmat Garmanus in Ephem. Ann. 1. Obs. 144. Sic legitur in Obf. 65. Kidini, quendam circa nares sensibile factorem lætidissimum, nec liavissimis odoramentis, nec aliis medicamentis plurimis curabilem

Diatra Hemorrhagia

§. 12. Diatram in Hemorrhagia Narium quod spectat, opera danda, ut æger decumbat in conclavia Aer temperato perfuso, vietur autem aer liguilidus ac particulis uliginosis inquinatus, sit potius particulis aquosis temperatus. Quoad Potum, is sit tenuis ac herbis specificis imprægnatus, vinum generosum, ut & omnia acida, acia & salsa sanguis pejus fugienda sunt.

Prospiciendum semper agro de Cibo boni succi ac humedante, ut sunt varia brodia herbis acetosæ, chartrefol, tarax. endiv. portulac. alisque alterata, pulmenta ex amylo, hordeo, oryza & milio confecta ætegia sunt, gelatina, carnes gallinar. agnorum, vitulorum, pruna, pyra, poma cydon. cerasa cocta, demque olera superius dicta in utrum vocari possunt. Avicenna scribit, cerebella gallinarum multum & sæpe comesta singularem esse cibum & medicinam in sanguinis fluore. quod hæc tenus experiri non licuit. Exulent omnia salia, & acia, quæ sanguinis visciditatem & acrimoniam augent. Conveniunt iomnis & quies, quoniam humectant & sanguinis stagnationem impediunt, & spirituum animalium ferociam placant.

Excreta & retenta sibi invicem correspondant, ne hic vel excessus vel defectus deprehendantur.

Animi pathemata prudenti moderamine ad præceptum Salomonis componenda, imprimis hic ira cœu pestis fugienda

Coryza

In Coryza conveniunt diuretica, internæ & externæ assumpta conducunt. Omnia quoque acia hic vitanda sunt.

Sternutationum.

In Sternutatione itidem aer externus nimis frigidus, ut & fumosis particulis inquinatus vietur. Omnia similiter, quæ irritant hæc narium membranam, ut sunt externa omnia acia, odores fortes, fumus, medicamenta acia inspirata, v. g. Nicotiana, Majorana, Helle-

bor. Vitriolum album, omnia purgantia & venena sunt fugienda. Contra radios quoque solares se muniat laborans. Potus ne sit nimis spirituosus, vitentur & cibi acres aromatizati. Animus sit tranquillus.

In Odore abest, vel imminuto, vel depravato Odor ab omnia respondeant nature, & odores peregrini vel in aere, vel undecunque advenerint, nullatenus sunt admittendi.

§. 13. Superest nunc Curatio Pharmaceutica & Chirurgica, quam Galenicus in Hemorrhagia Narium sequenti modo aggreditur: In Anæstomosi omnem impendunt operam, ut vasa reclusa obturentur, in Diætes, ut uniantur, in Diapedes, ut desentur. Impetus ruentis sanguinis si adit, eundem sistunt revellendo, derivando, repellendo & refrigerando. Sanguinem copia peccantem minuant, calidum refrigerant, tenuem incassant, flatulentum discutunt, habito imper respectu ad calidam hepatis intemperiem, quam hepaticis frigidis volunt corrigendam. Phlebotomiam in sanguinis copia & impetu magnificiunt, & quidem in venâ cubiti è directo profusum respondente celebrant. Cucurbitulas etiam è directo naris affectu aut hypochondro dextro super jecinore, aut sinistro super liene, aut fluxu ex utraque nare erumpente super utroque viscere imponunt. Nec frictions partium inferiorum, maxime pedum, nec ligaturas dolorificas omittunt. Ex Pharmacia medicamenta eligunt humores peccantes preparantia, purgantia & alterantia, acrimoniam humorum attenuantes sero lactis, syrups de cichor. viol. Papav. rhaad. aliisque decoctis alterantibus. Purgationem instituunt pro diversitate humoris peccantis, evacuando bilem decocto myrob. citr. cum syr. ros. multipl. infus. aut mannâ cum rhubarb. Melancholiam decocto epithym. sen. myrob. Ind. cum syr. epithym. de fumar. Pituitam oxymel. prius incitiam decocto agar. myrob. cheb. cum syr. diacarthami. His præmissis ad refrigerantia & constringentia progrediuntur, interius exhibentes medicamina ex aqu. plantag. nymph. burf. past. Solan. syr. myrtin. ros. papav. nymph. conserv. ros. nymph. oxal. trochisc. terr. sigill. Lenn. ebore. Externe fronti & temporibus anacollegata adhibent ex argil. bol. annen. acac. hypocist. cum album. ov. & aceto excepta, vel epichemata ex succo plantag. lactine. buri. pastor. semperviv. portulac. bolo amon. gall. hamait. aq. rosar. acet. & album. ovi fronti & sutura coronali imponunt. Fovent etiam frontem impongia aqua frigida vel rosacea, vel succo caudæ equi, cum acet. madida. Ipsis naribus indunt sistentia, eaque vel adstringentia, ut acet. iucc. cydon. myrrh. mallich. bol. arn. cort. granat. alun. gall. hypocist. vel refrigerantia, ut lactucam, papav. opium; vel glutinastia, ut thus, guai. Arab. albus. ov. vel cauterisantia & crustam obducentia, ut calx. viv. vitriol. arsen. vel occulta proprietate agentia, ut sterc. rec. porc. alin. can. rad. nigellastr. urticam tritam, portum. hamaitem, lanugines salicis, populi, ulmi, &c.

In Coryza curanda ad ipsam respiciunt caput & cerebrum, ejus intemperiem calidam perfrigulam corrigentes, humores pec-

Coryza.



cantes evacuant, facultatem concoctricem & recentricem corroborantes, expultricem verò sedantes, ne humores crudi ulterius ad nares transmittantur, tum materiam ipsam nares obstruentem educunt, attracto in nares succo ex castoreo in aceto macerato, vel liquore ex melanthio pulverisato & oleo vetustissimo, vel succo betæ, anagallidis, cyclaminis, vel medicamento ex rad. pyrethr. ieros, herb. puleg. calamenth. origan. serpill. stachad. flor. anth. sal. agar. trochisc. verat. alb. per diem & noctem in aqua commun. maceratis, hinc coctis & colatis, additis mell. anthol. & Oxy-mel. squillitico. Naribus etiam olfascienda præbent serpillum, polypum, thymum, calamenth. melanth. castor. aliquantisper in aceto prunis macerata. Nec omittunt apophlegmatismata ex mastich. Zinzib. piper. alb. & pyrethr. in forma pillulorum parata & ore masticanda. Capiti imponunt exsiccantia ex thure, Gum. Junip. bacc. cypress. caryophyll. Mac. Nace Mosch. beton. melissa, majoran. sal. orig. flor. lavend. stachad. &c. Suffumigia quoque ejusdem exsiccationis gratia accedunt quo humor superfluous eo facilius absumatur, & Nares ab eo liberentur.

*Sternutatio* nimiam & molestam propulsare student remotis & vitatis omnibus, quæ forinsecus eandem concitare valent, avertendo materiam Nares petituram ad occiput, tum contrahendo nares & supprimendo anhelitum, quo magno impetu detrudunt nares alioquin infestantes, quo fine etiam aures & oculos fricant, ac venas in oculorum angulis existentes comprimunt, quin tumorem & horrorem repente conticant. Si penitus cohiberi nequeat, lenire tamen aggrediuntur oleo dulci vel rosaceo, & unguento nardino naribus infuso, olfactu panis, aulsi, flor. nymphaeæ, rad. mandragopii & similibus.

*Olfactum immutatum* aut *abolitum* ab intemperie capitis frigida vel pituita collectione ortum resistere satagunt cephalicis calefacientibus & exsiccantibus, evacuata prius pituita minorativis ex agar. trochiscat. myrob. Cheb. cum elect. diacarth. & cephalicis quibusdam forma decocti paratis, post purgationem verò exhibent theriacam veterem cum conserv. rosinar. aut anth. majoran. lavendul. Nuc. moschat. cond. spec. diamb. diamosch. dulce. diagalang. Capiti etiam corroborantia imponunt ex rad. arist. rot. Cypet. Ir. Flor. Herb. Majoran. beton. pol. mont. flor. lavend. anth. &c. Ad obstructionem naturam tolerandam succum betæ & majoranæ naribus ex vola manus præbent exsiccandos. Pulveres etiam sternutatorios, erthina & apophlegmatismos abhibent ex castor. rut. nigell. majoran. verat. alb. aliisque supra in Coryza jans nominatis, nec suffumigia mittunt ex thur. mastich. succin. benzoin. styrac. calami. macis. caryoph. similibusque convenientibus parata. In *Odore depravato* ad causam respiciunt, eximentes aut corrigentes quancunque materiam foetidam, sive in naribus hæreat, ubi vaporem aque, calide naribus immittunt commendant, sive in alia quâdam corporis parte, capite videl. aut inferiore ventum aliquo viscere lateat, quam educi volunt evacuantibus, pilulis aut apozemat. & partem corroborari, hinc ad fontem corrigendum intus exhibent Electnar. aromaticum nardinum *Mss.* Naribus autem ejusdem

Oleum Nardinum, tum simplex, tum compositum vel per se insillant aut illinunt, vel additis rad. Cypet. Ir. Flor. rosar. Cheyr. lavand. myrrh. aliisque turandâ illitum naribus insinuant.

*§. 14. Paracelsi* in curatione *Hæmorrhagiarum* Paracelsi. ritè administrandâ etiam ad causam attendunt, quâ sanior sanguinem facilius sibi affirment. Animadverti proinde volunt ad complexionem & sanguinis constitutionem, ad ebrietatem aliaque externè obvenientia, & his correctis aut sedatis tandem ad sanguinem sistentia procedunt, inter quæ laudant Crocum Martis optime reverbaturum, & usum, cinerem ex ramis adustis. Speriola compositum *Crolli* internè ad 3. vel 4 grana in aq. burs. pastor. exhibitum & forinsecus etiam naribus impositum, ejusdem pulverem dysentericam, essentiam Croci Martis, Syrup. Corall. & sequentem potionem ditioribus exhibendam.

℞. Ol. croc. ʒi  
Essent. Corall. aa. ʒj  
Cum aq. sperm. ranar.  
F. Potio.

Pro pauperibus vero talem.

℞. Croc. ʒi ʒi  
Calc. test. ov. ʒj  
Syr. myrrh.  
Deros. succ. aa. ʒj  
Cum aq. flor. Papav. errat.  
F. Potio.

Externè sequens linimentum aut unguentum naribus vel per se spissius, vel turandâ illitum intrudunt, aut forinsecus naso imponunt.

℞. Croc. Martis ʒj  
Calc. test. ovor.  
Calcar. aa. ʒss.  
Ciner. ran. ust. ʒij.  
M. & excip. cum ol. visci pomor.

Lapidem Carneolum ad collo suspendunt, aut manibus detineri jubent.

In Coryza eodem modo procedunt ut in catarrhis reliquis, tartarum enim resolutum denuo volunt coagulandum, & superfluum educendum & consumendum, ventriculorum simul & cerebri corroborandum. Coagulatur tartarus sacrocoll. mastich. sal. gemm. Educitur hermodactyl. colocynth. euphorb. agar. pyrethr. ʒo. Q-lato. Consumitur essent. meliss. lunar. Spiritu Qi, ol. sulphur. terebinth. bugloss. ros. Ventriculus corroboratur granis Junip. rad. ari. zinzib. cubeb. rosinar. Cerebrum verò & caput caryophyllat. acoro. euphtal. & succino, cuius oleum etiam vertici, temporibus & naribus illinunt.

*Sternutatio* nimia sistitur corrigendo sal illud *Sternutatio* acre, ne posthac aures ita stimulet, quod omnium optime præstari censent laudano opiato, oleo violar. vel mucilage quadam diluato & naribus illinito.

*Olfactum depravatum* & *abolitum* restaurari *Olfactum* posse asserunt, correctis primum salibus quibus nares morbosè detinentur, sive exilibus, sive aliis causis illa exsurgant & corrumpantur, quod si pulver. elaterii, pyrethri, aliisque medicamentis superius in Ulceribus, narium indicatis, quibus subjungunt confortantia spiritus & odorem suaviorem conciliantia, ut ambram, moschum, Zibetham, castoreum, extractum majoranæ menthastræ & similia, quibus fœtor supprimatur,



tur, & vis illa salium corruptivorum domatur.

*Helmontii  
opinio de  
curatio-  
ne Haem-  
orrhagiae.*

§. 15. *Helmontius* in *Haemorrhagia* respicit ad diuinvitatum, confortando imprimis stomachum & cohibendo, ne degeneret quaedam fiat generatio, sed vitium fermenti digestivi corrigatur, quatione laudanum opiatum maxime laudat intus exhibitum, exterius verò axillis apponit bufonem exsiccatum, & naribus indit fungum betulae, aut succum millefolii.

*Corz.*

*Corz.* am sedari posse promittit providendo ne ulterior mucus ex latice progeneretur, digestionem stomachi corroborando, & custodem partis sedando, hinc latice peccantem educendo sternutatorio ex helleboro albo & facaro.

*Sternutatio-  
nis.*

Ipsam etiam *Sternutationem* nimiam sedari credit, si os ethmoides à mucro liberetur, unde sternutationem saepe cessare faciat, provocans post mucum simul latice, impetum verò musculorum educto latice optime sedari docet opiatis convenienter adhibitis.

*Ossibus  
depravati  
& aboliti.*

*Ossibus depravationem & abolitionem* correcto mucro illo restaurari posse confidit, dum *Archeus* corroborantibus quibusdam erroris admo-  
nueratur, qua virtute præ aliis pollere ab ipso existimantur majorana & mentha caballina.

*Willis me-  
thodus cu-  
randi Ha-  
morrhagi-  
am.*

§. 16. *Willisus* in curatione *Haemorrhagiae* rite obeunda tres advertit indicationes, curatorium, vitalem & praeservatorium, quarum duarum priorum respectu symptoma urgens listen-  
dum, ultimae verò causa, ne insultus haemorrhagiae redeat, tollenda. non neglecta animad-  
versione, ut haemorrhagia alio modo in febre, aliò verò absque illa tractetur. In hac igitur sanguinis turgentia est compescenda, fluxus ejus à naribus alio divertenda, & vasorum ora intra nares de hiscentia sunt occludenda, qua de re non omittit ligaturas artuum in agro quieto instituendas, nec venae sectionem contemnit, quamvis non ulque adeò semper tandem juvare no-  
verit; topica concedit fronti, temporibus & nuchae applicanda, ubi & genitalibus spon-  
giam aceto madidam, & aqua frigida in faciem subiam inspectionem ad terrorem incutiendum, cucurbitas hypochondriis, femoribus internis & plantis pedum admoventes. cum incurvatione digiti minimi ejusdem lateris, in quo fit sanguinis fluxus, quin à lypothymia excitata haemorrhagiam sisti ratione adductus affirmat, ipsa quoque remedia per sympathiam quandam o-  
perari observata adhiberi permittit, qualia sunt pulvis sympatheticus, Lignum fraxini virginici, Bufo siccatus, lapis haematites, usnea, nec non topica vasorum oscula dehiscentia occludentia, aquas nempe vitricolicas varias, turundas iisdem intinctas, usueam cranii humani; tandem ad elschæretica, turundam videlicet colchotare caustico in summum imbutam & naribus altis-  
sime immixtam devenit. Externis verò hisce simul jungenda vult interna remedia, & quidem duplicis huius obtinendi gratia, tum ut sanguinis effervescencia sive incitativa, sive fermentativa suppressa, liquor ejus intra vasa coëctus placide circuletur. tum ut cordis motus impetu-  
osior sanguinem nimis rapide impollentis per sustamina idonea deprimat. Primi scopi cau-  
sa ejusmodi praescribit remedia:

℞. *Aq. plantag.*

*Papav. Rhoad.*

*portulas.*

*Sperm. ramar.* aa. ʒiij.

*Syrup. myrrh.* ʒij.

*Sal. prunell.* ʒj.

*M.F. Julap. Dos.* ʒiij. ter ant quater in die.

Secundum scopum sequentibus obtinere labo-  
rat.

℞. *Conserv. ros. rub.* ʒib.

*Pulv. sem. hyosciam.*

*Papav. alb.* aa. ʒij.

*Syrup. Papav.* q. l.

*F. Opiata. Dosis quant. Nuc. Moschat.*

*sexta vel octava quaque hora.*

Vel:

℞. *Laudan. cydoniat.* ʒi.

*Dos. gr. xv. bis in die in vehiculo idoneo.*

In *Haemorrhagia* febrili seu critica eo potissi-  
mum indiget curam, quo haemorrhagia in dia-  
phoresin commutetur, confiditque iudore blan-  
do excitato fluxum sanguinis esse sponte cessa-  
turum, quâ de causa tale praescribit remedium.

℞. *Rad. bistort.*

*tormentill.* aa. ʒj.

*fol. Ulmar.*

*pimpinell.*

*linum.* aa. Mj.

*C. C. ust.* ʒij.

*Raf. ebor.*

*C. C. aa.* ʒij.

*Cog. in aq. font.* lbij. ad. ij.

*add. circa primum Conserv. ros. rub.* ʒij.

*F. Colatura. cuius Dos.* ʒiij. saepius in die.

Indicatio vitalis victum ordinat tenuem, car-  
diaca temperata & ægotantia curationem ido-  
neam, pro diversitate ejusdem temperamenti,  
ratione cujus vel extra lectum, vel in lecto pro  
majori sanguinis halituositate est detinendus.  
Indicatio praeservatoria causam aggreditur tol-  
lendam, ut sanguinis eruptiones velinhibean-  
tur, vel rariores & mitiores reddantur, idque  
duplici sub intentione, quarum prima est, ut  
sanguis ad temperiem & mixtionem debitam  
restitutus, intra vasa absque turgentia & eru-  
ptionibus placide circuletur; secunda, ut vasa  
sanguifera quoad osculorum conformationes &  
fibrarum muscularium tenores in statu legitimo  
contineantur, quapropter nimiam sanguinis co-  
piam venae sectione, impuritatem verò purgatio-  
ne instituta praecavet & *luxuriantia* ejus sequenti-  
bus conservat.

℞. *Conserv. ros. rub.*

*Cynorrhod.* aa. ʒiij.

*Pulv. santal. omni.* aa. ʒib.

*Corall. pp.* ʒj.

*Croc. Martis rubicundiss.* ʒij.

*Sal. prunell.* ʒiij.

*Cum. s. q. Syrup. e Corall.*

*F. s. a. Eleutherium. Capiat æger primò*

*mane & hora somni q. nuc. castan. vel per se,*  
*vel superbibendo aq. destill. seq. ʒiij.*

℞. *Summitat. Cupress.*

*samarisc.* aa. Mviij.

*Hyperic.*

*Equiset.* aa. Miiij.

*santal. omni. contus.* aa. ʒj.

*Mic. pan. alb.* lbij.

*Munne. concis. affund. lact. recent. lbviij.*  
*Destill.*

# CAP. XVII. DE HÆMORR. NAR. CORYZ. STER. &c. 151

Defillitur organis commun. edulcoratur quæ doſis inter ſumendum cum ſ. q. ſyrup. & ſucco planag.

In caſu quodam, ubi ſanguis non ob plenitudinem aut turgelcentiam & vasis erupit, ſed econtra rivus ejus admodum depreſſus & tenuis, viz circulationis fluente ſuſtinendo par viſus fuit, cum ſtatibus modo ſuſum, modo deorſum obrepentibus, & vaſorum ſanguiferorum fibris motricibus ipſo affectis, ſequentia felici cum ſuccellu præſcribit remedia.

R. Pulv. rad. pæon. mar.  
Corall. rubr.  
margarit. aa. ʒj.

ebor.  
ocul. ʒ.  
lapid. hæmatit. aa. ʒß.

prunell. ʒi.  
F. Pulvis, Deſ. ʒß. in ſequenti Julapio aſumenda.

R. Aq. Ceraſ. nigr. ʒviiij.  
melleſi.  
cinamom. hordeat. aa. ʒij.  
ſherical. ʒi.  
Syrup. & corall. ʒiß.  
M.

**Coryza.** Coryza curationem peragit ſedando ſeri afſumum, ejusdem nimiam copiam evacuando, & fibras ſenſiles narium laſas in priſtinum integritatis ſtatum reducendo, miſtitur interdu venæſectione & purgatione per pilulas de ſuccino, reſina Julap. & ſcammon. ʒat. vel pro diſpoſitione ægri apponit veſicatoria cervici vel poſt aures, non omiſſis diureticis & diaphoreticis, ſeroſitates ſuperfluas blande evacuantibus, ut de docto Guajac. Salſaf. Sarſap. rad. bardan. Caryophyllat. herb. beton. ſalv. roſmarin. verben. veron. Laudat quoque uſum potus Coſtæ tanquam pro erſicatione ſeſotitatum iſtarum maximè proſicuum. Spiritum æticum ſuccino vel corallis imprægnatum magnipendit. Maſticatoria ex malliche, pipere, eruc. & ſimilibus etiam approbat. Fibris deinde ab acrimonia ſeroſa ſeſis illiunt unguentum pomatum vel ſalminum cum axing. caſtor. & ne à copula quidam exploſiva ex ſeroſitatibus egrediente, & ſpiricibus animalibus communicata nimium agitentur, antiſpalmodica ſub, unguit ex aq. epilept. & Spir. Corn. C. aut ſulph. quibus linæum humectatum nariſus admovetur.

In **Sternutatione** nimia poſſimum ad erit motum iſtum convulſivum fibrarum & tubulorum, quem ſedare præcipit adhibitis nervinis & antiſpalmodicis exploſionem illam ſedantibus, hinc materiam illam heterogeneam exploſiones excitantem eliminandam ſuadet, provocato in ſubjectis diſpoſitis aliquando vomitu, appoſitis ſcapulis cucurbitulis, & inſtitutis frictionibus artuum extremorum, peſtinatione capitis, velli-catione aurium & conſtrictione oculorum, quo copula illa exploſiva diſcutiatur, & ejusdem impetus in fibras coërceatur, narium fibras oleo amygd. dulc. & caſtor. illinit, ut ita aliquantum relaxata eo fortis impetum materię irritantis liſtineant, nec ab ea convellantur.

**Oſtium depravatum** pro diverſitate cauſarum variam curationem expoſcere novit, & ſi colluvies ſeroſa huiusmodi particulis corruptentibus ite inſarcta, hæſce corrigi aut eliminari

credit eadem evacuata & correctæ modo ſuperius in Coryza relato: ab ulceribus nali aut aliarum partium ortum eorundem curationem requirit. **Imminutum aut abolitum Oſtium** ab obſtructione pororum membranæ Narium à colluvie ſeroſa inductum, eorundem reſeratione & lymphæ nimia evacuatione reparat, uſurato aliquandiu ſequenti Decocto minus aſumendo.

R. Rad. Caryophyllat.  
Cicareſol.  
Ir. Florent.  
Imperat. aa. ʒi.  
ſol. beton.

majoran.  
ſalv.  
hyſſop.  
Orig. Cret. aa. Mj.  
ſem. ſanic.

danc. aa. ʒj.

paſſular. ʒij.  
Coq. in aq. font. lbijj. ad tert. part. coct.  
ſumpt.  
Ald. vin. alb. lbß.  
F. Colatura edulcoranda  
Syr. de ſ. radic. ʒij.  
Calaminih. ʒi.

Deſ. ʒijj. biſindie non ſtatim à cibo. Conſervas roſmar. majoran. ſalv. cum ſpecieb. diamb. non ſine commodo in uſum duci exiſtimat. Externè nariſus ſpirituſoſa adhibet, penetrantia & poros à materia peregrina liberantia, ut baſamum majoran. ſuccin. ſpir. C. C. Caput corroborat externis quibuſdam bregmatibus impoſitis, emplaſtro de beton. cum ſuccino aliſque convenientibus.

§. 17. **Sylus** in cuiusvis **Hæmorrhagie** Narium curatione ſtatim ad ſanguinis ſuppreſſionem accelerat; quam obſervari promittit par-tim evacuando ſanguinem, ubi eſſluit, quo reliquo eſſluenti non pateat amplius exitus; partim temperando acrimoniæ bilis ſanguinis nimium attenuantis, quo minus aptus ſit ad af-fluxum hinc & eſſluxum Prius peragit medica-mentis adſtringentibus nariſus applicatis, ut pulvere lapidis hæmatit. & alium aceto & album ne ovi ſulceptis, & in ſorram linimenti redactis, quo linteum obductum nariſus intrudatur, vel pulvere extert. ſigill. Spod. iarn. volv. & nucib. cupreſſi, nariſus inſuſtato. Poſterius fit medica-mentis auſteris aliſque bili corrigendæ deſtina-tis interius aſumendis, ut ſucco berber. gran-nator. omphac. alum. hypociftid. Spiritu nutri-tis; vel viſcidioribus, ut emulſione amygd. dulc. in iis præteritum, qui ab acidis abhorrent, aut eadem peſſere nequeunt, quibus & ſequens conducit miſtura.

R. Aq. Plantag.  
portulac. aa. ʒi.  
Spiritus ʒis dulc. ʒß.  
Diſcord. ʒiß.  
laud. apiat. gr. ij.  
Syr. portulac. ʒi.  
M. D. cochlearium.

In **Coryza** curanda cerebro imprimis facien-dam vult medicinam, roborando & in priſti-nam integritatem reſtituendo glandulas in af-fectu hoc ſemper male affectas, quod cito, tutò & jucunde fieri promittit inſtitu ſolo & ſolius ſuc-cini, ore patulo & nariſus ſapius ac lenius ex-cepto,

cepto, quo saepenumero una vice usurpato Gravedinem satis gravem se mox in principio suo curasse affirmat, ne ultra noctem duraret. Si magis composita desiderentur, ad pompam, augendam succino isti addi permittit mastichen, thus, benzoinum, Syracem, ex quibus pulvis pro suffitu parandus, prunisque inspergendus, & ne quid fumi pereat, sed integer ore & naribus excipitur, caput pallio aut alio quodam operimento studiosè est obtegendum.

*Sternu-  
tione.*

*Sternutationem* ab externis causis originem ducentem, illis sublatis vel vitatis mox cessaturam certus est. Ab internis autem, tum à cerebro delabentibus, tum ab inferioribus partibus asurgentibus inductam curare docet tum corrigendo in Coryza humores acido-salvos, iplisque terere conjunctos pituitosos viscidos, medicamentis oleosis & spirituosus aromaticis, tum eosdem educendo partim per alvum hydragogis & phlegmagogis, partim per nares aut os sternutatoriis blandioribus aut masticatoriis; tum corrigendo humores vitiosè in ventriculo ac imprimis tenui intestino effervescentes, atque halitus acres sursum ad nares propellentes modo spirituosus & oleosis, non neglectis vel omittis opiat; tum eosdem, si redundarint, educendo deorsum potius, quam sursum, medicamentis iisdem hydragogis & phlegmagogis, quibus addit sudorifera, tanquam plurimum collatura, quatenus non modo sursum protrudent humores vitiosos, sed eosdem simul emendent.

*Oscula  
depravata,  
abolita  
& immu-  
tata.*

*Osculum depravatum* curari ait emendando materiam in corpore halitus foetidos ad nares propellentem, aut impediendo cohibendoque effervescentiam vitiosam similes halitus promittentem, & tandem curando partium variarum putredine affectum morbos varios. *Osculum abolitum vel diminutum* curat humectando paratim nares siciores tum per interna, tum per externa medicamenta. Cum Gravedine vero conjunctum curare aggreditur exsiccando humiditatem superfluum nares occupantem, evacuandoque per vias universales, hinc & nares ac os serum in corpore redundans, aut copiosius saltem in cerebri glandulis secretum, maximè verò restituendo dispositionem vitiosam in glandulis cerebri, ab exteriori frigore inductam per suffumigia ex mastiche aliisque in Coryza jam notatis parata, & cum naribus excepta, tum linteaminibus simul calefactis capiti & cervici afficta.

*Carisefia  
noris mo-  
das cu-  
randa Ha-  
morragi-  
am Na-  
rium.*

§. 18. *Carisefiarum* modus curandi *Hæmorragiam* Narium hic est, ut fermentum sanguinis impetuosius corrigatur & sedetur medicamentis absorbentibus & precipitantibus, & hinc sanguinis simul vehementia mitigetur, & ad quietem reducat, ne oscula arteriarum ulterius adeo late aperiat, quod præstant medicamentis internis omnem impetum in massa sanguinea sitentibus, & particulas acriores dissolutas hebetantibus & compingentibus, qualia sunt ponderosa & austeriuscula, corallia, margaritæ, lap. hæmatites, sapphirus, smaragdus, ceratites, sang. dracon. magister. alum. nitrum cum papav. ercat, insuccatum, terra sigillata, & similia in vehiculis convenientibus adhibita. Sit pro exemplo sequens mixtura.

℞. *Aq. plantag.*  
*millefol. aa. 3vj.*  
*fol. pyrr.*

*querc. aa. 3℔*

*cinam. quoniam. 3℔.*

*Magister. Corall. rosat. Myrr. 5℔.*

*lapid. ceratit. 3℔.*

*alum. crud. 3℔.*

*Syr. Papav. rhaad. 3℔ss.*

*Julep. rosat. 3℔ss.*

*M. D. coctileatum.*

Vel in forma solidiori.

℞. *Conserv. ros. 3℔.*

*for. Papav. rhaad. 5℔.*

*fol. querc. primo vere dum prostru-  
pere incipiunt & adhuc tenerissima  
sunt, parat. 3℔ss.*

*Confect. Hyacinth. 5℔.*

*Ebor. f. Δ 5℔.*

*Nitr. perlut. 3℔.*

*sang. dracon. 5℔.*

*Syrup. ex succ. artie. mort. q. s.*

*F. Electuarium Dos. quantitas nucis ma-  
juscule.*

Ut vix angustentur & canales non adeo patuli permaneant, remoram injici approbant, institutis ligaturis artuum, & appolitis epithematis adstringentibus ex succis austeriusculis & teris argillaceis paratis fronti & temporibus applicandis. Frictiones dolorificas, frigidorum applicationem ad pubem, caute tamen instituant, ne gravius hæmorragiæ malum accerfiant, cucurbitularum appositionem in mammis, scapulis & hypochondriis, in tantum prodelle judicant, quatenus sanguinis impetum ad partes superiores & consuetam viam revocant, eundemque aliò divertunt. Valorum texturam nimis teneram, osculorumque & pororum dilatationem corrigunt adstringentibus, coarctantibus & angustantibus ipsis naribus insertis, qualia sunt fuligo pulverisata albugine ovi mixta & turunda illita, vitriolum albumi succo granator. acid. vel folior. querc. vel in eorum defectu sola aqua fontan. recenti & frigida vel etiam pluviali dissolutum, & linteolo naribus insinuatum, attramentum scriptorium gossypio fasciis & eodem modo adhibuit, mucus in tegulis adificiorum repertus, & ex placito *Plateri* idus adhuc naribus adhibuit, stercus suillum recens eodem modo usurpatum, pulvis ranarum multarum naribus insufflatus, vel cum succo uricæ mixtus, & mediante torunda iisdem insectis liquores stiptici aluminosi & vitriolici, ex quibus injectiones in nares commodè instituuntur.

In *Coryza* corrigenda eò simul respiciunt, ut *Coryzam* particulae acres in aëre aut coequeantur, ne corpus contingant, aut si hoc non semper obtineri queat, aut tentare liceat, easdem corrigendo (suffumigiis convenientibus, aut gummi animæ prunis injecto, aliisque à Domino *Sylvio* modo laudatis pulveribus semper aliquod de succino continentibus, quibus lymphæ effusa simul exsiccatur, cujus rei gratia etiam tacamahacam vel solani, vel cum aliis quibusdam lympham superflue evalatam abluimentibus & caput corroborentibus vertici inspergunt, qualia sunt rad. Cyper. Calam. aromat. Ir. flor. aristol. rotund. fol. majoran. saly. beton. mont. sabin. flosmar. flor. stachad. Arab. ros. rub. bacc. laur. rasur. Xyloaloes; Xylobalsamum, in vulnere redacta & in cucupha capiti imposita, vel cerati de beton. aut aliud quoddam emplastrum cephalicum adhibent, quibus spiritus animales ad officium revocantur,

vantur, quo facilius à lymphâ se valeant extricare, ejusque æquam distributionem promovere. Nares obstructas referant spirituosas, ut essentia majoran, sem. nigell. Spiritu camphoræ, aliisque naribus adhibitis, & si lymphâ nimis sit inspissata, respirationem impediens, sequente linimento nasum internè & externè ad oculos usque iungunt, quod non semel repererunt proficuum.

℞. *Asurg. Capon.* ʒiʒ.

*Castor.* ʒʒ.

*Ol. Irin.* ʒij.

*Ol. d. majoran.* gr. iij.

*Camphor.* gr. ij.

*M.D.*

Membranam Narium à lymphâ acri erosam illunt butyro infuso, vel sevo hardino & ol. amygd. dulc. nec improbant usum herbæ Nicotianæ, si convenientia quedam ex succino, gum. anim. mastich. styrac. herb. majoran. rosmarin. flor. rosar. lign. Junip. Rhod. sem. anis. eidem fuerint admista.

*Sternut-*  
*idia.*

*Sternutationem* auterri dicunt dentis illis omnibus, quæ fibras membranolas narium irritant & convellunt, diducto agro è loco luminoso & splendore Solis in tenebrosam, contraque lymphâ acriori modo in Coryzâ jam annotatam, posthac fibras in sicutum debitum repouunt, & spirituum impetum sedant incutitotore, & aquæ frigidæ in faciem ægri tale quid minime expectantis inspectione, agitatione oculorum circa narium radicem, retentione aut validâ attractione spiritûs, frictione aut titillatione plantarum pedis, & inunctione narium butyro recentio, oleo papaverino, mucilaginis sem. psylli, tucto folior. salicis extracta, vapore decocti balilici naribus hausto, & pectoris inunctione cum nervinis & antispasmodicis, vel fontentis ex camomull. fol. basil. menth. salv. & fursuribus paratis, & tepide thoraci impositis, quibus si repugnet, ad narcotica progrediuntur, naribusque acetum rosaceum vel violaceum, in quo partium opii dissolutum est, admoveere consuecunt.

*Officium*  
*depravat-*  
*um immu-*  
*nium &*  
*abolitum.*

*Officium depravat*um corrigunt particulas illas lymphæ alterando vel eliminando per medicamenta sudorifica. reliquosque affectus inferiorum partium aut nali sanando, sic corruptæ particula exis uterius exsurgant odoriferarum motum placidum turbantes, quare & Naribus benè odorata ex cal. fœnal. citrin. ros. rub. cort. citr. lavand. camph. in petua locata, & aqua flor. Namp. & spiritu tolar. adspersa, vel ex myrtha, cinamom. amom. anis. admoveere solent. In *Officium immunito & abolito* fibras nervorum liberant ab omnibus recrementis easdem in crassantibus, eorundem obstructions referant & spirituum transitum promovent spirituosos & volatilibus cum intrò assumtis tum foris adnotis, ut essentia majoran. rotis mar. nigell. ambr. spir. lil. convall. balsam. apoplect. rut. citr. majoran. vel graveolentibus sed foriter penetrantibus, ut Essent. Castor. Al. foetid. & cinamomif. aut succinat. Sal. volat. ☐, quod essentia nepeithæ additum & naribus ad motum egregie credunt utis, nec non liquorem ex felibus animalium & al. foetid. per retortam destillatam, fides nimis rigidis existentibus adhibent ol. destill. ceræ, vel balsamum ex oleo nucistæ expresso, oleo ceræ & majoran. vel unguento vitæ potabili cum pluma easdem aliquoties iungunt.

§. 19. *Nobis in Hæmorrhagiâ* Narium duplex instituitur curatio, una in paroxysmo, altera extra paroxysmum. In paroxysmo plerumque in subsidium vocantur opiata, stiptica, & sic dicta specificæ; sic & ab alius, quam tamen potius ob imminens periculum omittendam censentis, V. S. tentari potest: ad sanguinis etiam acrimoniam corrigendam ejusque compagem nimis vilcidam incidendam, varia ex lactuca, endivia, portulacâ, lymphito, bistorta, flor. ros. balauft. papav. rh. parari possunt remedia: serum lactis cum harum succis egregium est remedium lapsius datum, quia diureticum est.

Conveniunt etiam Tinctura Corall. Terr. Japon. omnia Martialia, & quæ antiscorbutica vocantur, quorum plurima in ipso paroxysmo ad sanguinis acrimoniam corrigendam ac denulcendam propinari possunt, quâ ratione laudem meretur mixtura ex sequentibus parata, ut aq. scolopendr. capilli. ʒis & lupul. cum Syr. Scelotyrbic. ad mentem *Sal. Alburni de Scorbuto*. §. 25: Huc pertinent omnia quæ sanguinem omnem admittunt acrimoniam ex. gr. Tinctura Martis adstringens, &c.

℞. *Pulv. rad. pæon. mar.*

*Corall. rub.*

*margaritib.* aa. ʒi.

*Ebor.*

*ocul.* ʒss.

*lap. hamatit.* aa. ʒʒ.

*prunell.* ʒi.

*M. P. Pulvis.* Dosis ʒj. ad ʒij. in vehiculo seq. vel simili.

℞. *ʒ. Ceraf. mgr.*

*Papav. Rhoad.*

*plantag.*

*meij.* aa. ʒij.

*aq. cinamom. hordac.* ʒi.

*Syr. ap. Corall.* ʒij.

*M. D. ad vitrum.*

Optimo cum successu sequentem dedi potius inen.

℞. *ʒ. plantag.*

*Charjol.* aa. ʒij.

*liq. stiptic. n. d. gr. xj.*

*Camphor.* gr. ij.

*Teriac. cast.* gr. iij.

*Syr. Papav. errat.* ʒij.

*M. D. ad vitrum.*

Vel seq. ad mentem Dekeri & Sylvii.

℞. *ʒ. plantag.* ʒij.

*Cinamom.* ʒj.

*Consect. Hyacinth.* ʒib.

*Cor. d. rubr.* ʒj. ʒʒ.

*Fl. balan.*

*Sang. Dracon. pulv.* aa. ʒʒ.

*Laudan. opiat.* gr. iij.

*Syr. Myrtin.* ʒi.

*M.*

Sic & omnia ea, quæ motum sanguinis accelerant, eumque ab omni acrimoniam liberant exhibenda sunt, & ea quæ vasa simul constriungunt.

℞. *Pulv. lap. hamatit.* ʒj.

*ʒerniol. Croll.* gr. xv.

*Laudan. opiat.* gr. iij.

*F. P. divid. in 2. partes. & detur in seq. vel simili vehiculo.*

U

℞. *ʒ. por-*



℞. *∇ portulac.*  
*semperviv. maj.* aa. ʒj.  
*Succi plantag.*  
*urtic.* aa. ʒij.  
*Syr. plantag.* ʒʒ.  
*M.*

Sequens verò pulvis sit instil lar omnium.

℞. *Pulv. lenient. m. d.* ʒʒ.  
*Temperant. m. d.* ʒj.  
*Sem. plantaginis* ʒj.  
*Rad. bistortæ* ʒʒ.  
*Croc. & probe edulc.* ʒʒ.  
*Cort. granat.* ʒʒ.  
*Terra catechu* ʒij.  
*M. Dosia* ʒj. ad ʒj.

Sed debet ex tempore aliquod anodyni, vel Tinct. catechu addi, item Tinct. ☿ & li sequens:

℞. *Cap. Mort. ☿ li Martis* ab omni Sale edule. *Spir. Salis* vel *Nitri q. f.* digere aliquandiu. & inde abstrahere *Spir.* ad consistentiam mellis, hinc cum *Spir. vini Tinct. elice aurei* coloris. *Dosis* à gr. xx. ad 40.

Vel detur succus stercoris asinini vel suilli cum aquâ plantag. expressi ʒʒ. cui addantur *Syr. myrtill.* ʒv.

Maximè quoque conveniunt pulveres testacei, item emulsiones cum aquâ urticæ paratæ, ex *sem. 4. frigidi* valde profunt. Ex. gr.

℞. *Amygd. dulc.* ʒʒ.  
*Sem. 4. frig. maj.* aa. ʒij.  
*Papav. alb.* ʒij.

*Cum aq. urtic. & herdi F. Emulso.*

Laudatur Tinctura ʒis ☿ ii ad vij. gutt. exhibita. Omnia medicamenta ex ☿ lo desumpta hoc in affectu conducunt, ut & omnia Temperantia, ut sunt Tinct. bellid. rosar. Tinctur. Vitriol. Martis *Zzz. lss.* Sequens Mixture valde erit pro-ficua.

℞. *∇ plantag.*  
*semperviv. maj.* aa. ʒʒ.  
*Tinctur. flor. bellid.* ʒij.  
*Syr. Papav. alb.* ʒj.  
*Spir. Mart. Vitrioli q. f.* Detur pro tribus vicibus.

à D. Helvetio Patiensii in omni Hæmorrhagia laudatur seq. prout in peculiari libro commen-dat.

℞. *Alum. oc.*  
*sangu. dracon.* aa. ʒj.  
*detur bis vel ter de die in ∇ plantag.*

Tandem adopiata, tanquam ad anchoram sa-cram, fugiendum, hinc *Sylvius* notissimæ sue mixturæ stipticæ addit laudandum. Sequens quo-que proderit.

℞. *Aqua plantag.*  
*rosar.*  
*tormentill.* aa. ʒʒʒ.  
*Mum.* ʒij.  
*Trochisc. de camph.* ʒj.  
*Magist. corallor.* gr. x.  
*Laud. opiat.* gr. iij.  
*Syr. Corallor.* ʒʒ.  
*M.*

Extra paroxysmum præservandi gratiâ pos-sunt varia demulcentia exhiberi, quales sunt in-perius dicta, vel detur tantum Conserva rosarum cum rad. symphyt. vel sequens electuarium.

℞. *Conserv. hered. terrestr.*  
*ros. rub.* aa. ʒʒʒ.

*Torr. sigillat.*  
*Sem. hyoscyam.*  
*papav. alb.*  
*Trochisc. de carab.* aa. ʒj.  
*Ocul. ʒpp.* ʒi.  
*M. cum Syr. myrtill. F. Electuarium.*

Hic V. S. improbamus, quia sanguis revelli non potest; nisi vasa nimis turgant, in quo casu conducit V. S. quia inde vasa deplentur, & re-jiciuntur omnia purgantia, quæ à Practicis solent præservandi ergò ægris præscribi, quia plus ob-sunt quam profunt, & sic magis aniam dant huic affectui. Sequens ad consolidanda vasa egregi-um est.

℞. *Rad. bistortæ.*  
*Tormentill.* aa. ʒij.  
*Consolid. maj.* ʒvj.  
*Sem. plantag.* ʒi.  
*Cog. in aqua saporum, adde sac-*  
*char.* ʒij.  
*Infus. edulc. Croc. Mart.* ʒʒ.  
*sangu. dracon.*  
*Torr. sigill.* aa. ʒj.  
*Cort. granat.* ʒij.  
*M. Dosia* ʒj.

Internis hisce præmissis ad externa topica transeamus: hoc certe in foro mille & mille commendantur, & vix decem ex his probam sustinent, imò aliquando ne unum quidem satis-faciat, prout sæpe id tristis cheu! observavi, nam nonnunquam docta plus valet arte malum.

Sunt qui magnificum fungum coriaceum in medio quercus reperibilem, cuius particula dis-ficillæ, vel in manu detentæ, vel regioni cordis appositæ pro cohibendis narium hæmorrhagiis laudantur. Plurèstantant cum maxima teme-ritate curas magicas, inscribendo nempe cum sanguine regioni frontis sequentes literas: OIPULU, fronteque dein obligando. Cu-rationem Homericeam itidem superstitionis re-am, quæ sanguinem catuinibus certis & verbis listi posse præsumit, tanquam magicam reji-cimus; amuleta tamen non semper rejicienda, sic in hunc finem optime sub axillis gestatur bu-fo terico incisus, aliaque commendantur a-muleta, quæ non semper superstitionis argui debent, dum juvare possunt eo, quod certam ali-quam materiam æthericam transmittant sanguini in motu placido conservando magis amicam; nolo tamen illuc, quoad hæc juvare empiricæ, quod ægrotantis imaginationem corroborent, & sic spiritibus animalibus peculiariter & alium influxum efficiant, ut enim mundus regitur opi-nionibus, sic ipsi ægri plures committunt fallacia non causæ & causæ. Melius verò & absque ulla superstitione applicantur ipsis naribus sul-lantibus vari pulveres flegnotici, ut pulvis sympatheticus *Dryas. Spemiola Crolli*, Tertia Vitrioli dulcis *Haliacea*, Vitriolum Martis, muf-cis crani humani pulverizatus ac naribus instil-latus, vel pareatur turunda ex ulnea in fimo porcino cum mucilagine tragacanth. per aquam spermi. ramar. facta. Laudantur quoque penicilli ex charta emporetica albugine ovi imbutos & pulvere flegnotico adspersos. In vivam araneam cruor derivetur, quo remedio stilletur hæmorrhagia contumacissima, nulli alii quam hunc remedio obediens. Vid. *Ala Haffa.*

*Haffn. Ann. 3. Obs. 18.* Sæpe & fronti & testibus cum comodo applicari solet epithema ex aq. fol. quercus, sperm. ranar. acet. ros. cum lap. hematit. sed hæc & alia plura experientia falsè adscribuntur.

Ad constrictionem osculorum vasorum tesselorum instillantur varia, ut pulvis ex stercore porcino cum flor. rosar. & balaustior. distemperatus, optimo verò successu instatur sequens pulvis à *D. Hecetod.* communicatus, & in *Ephem. Germ.* summis laudibus evelatus, constans ex alumine & pauco lacca pictorum, q. s. pro incarnato colore, quo pulvere plures Amor ab orci faucibus liberavit. In eadem linea etiam profuit vitriolata, huius solutio vel pulveris forma, ad albedinem sc. calcinati, & cum turunda naribus intrata, coagulando sanguinem & adstringenda crassicia vasorum egregia sunt, vel croc. Mart. adstring. instat. tabaci narib. adsumatur. In hunc finem ab aliis laudatur atramentum ita naribus intratum. Sic Tinctura Olii *Li* naribus immixta eandem sortitur effectum. S e quoque pliegma Olii cum albu. ovi subactum potentissime sanguinem inspissat & coagulat, huiusque reprimunt vasa costringendo. Laudatur a pluribus radix eichor. flore albo ore masticata, sed nunquam mihi satisfecit, sed semper effectum me frustravit. Alii utuntur, nescio an meliori effectu, pulvere ranar. calcinat. & urine cranii humani. Nonnulli urticas manu contatas naribus sanguinem instillantibus immittunt, quo collinare videtur. *Emilius Macer* sequenti modo cancis:

*Quod si manantem cupias retinere cruorem,*

*Urtica succo frontem line, repprimis illum.*

Arteriosis sanguis spiritibus turgidis sæpe difficulter reprimitur, hinc generosa & plura remedia excogitavit ars *iatrica*, servavit enim hominem, sanguinem qui servare didicit; & recenserunt quidem à pluribus remedia sanguinem sistentia, quæ tamen semper & ubique non satisfaciunt; sic usnea manu decanta buto, collo appetitus vel sub axillis detentus, item d. ns equinus, mentha, aliaque magnopere laudantur, quæ tamen cum infinitis aliis ineffectuere sapimus.

Totum sanguinis sistendi mysterium consistit in ejus coagulatione momentanea, & ejus vasorum constrictione, quod re ædium austerum esse debet: hoc pertinent alumina, vitriolata, colchocor. vitrioli enim quantum jus sit in coagulando sanguine, superflue indicat famigeratissimus pulvis Sympatheticus, de cuius admiranda vi in sistendo sanguine pleni sunt libri Practicorum. Nunc verò usus ipsius serè exolevit, & liquor stipticus palman aliis præcipuit, hinc non unica huius liquoris exstitit descriptio, sed quot auctores, tot repetiuntur descriptiones; In gratiam tyronum aliquot hic notabimus & quidem 1. *Vetkeri*, ab ipso in Anchora laiciatorum p. 124. descriptum.

*Li Ungar.*

alum. aa. libb.

phlegmat. *Li*. libij.

*Cog. tandem, donec omnia fuerint dissoluta, liquorem frigidatum filtra, & à crystallis*

*subinde natis separa, add. singula librae liquoris.*

*Oli* *Li* 3j.

*& serva pro usu.*

Naribus turundam hoc liquore madefactam institue. Liquor stipticus *Bartholini* sequens sedit: Imbibet terram sigillatam cum Oo vel aceto, donec pulvis consistentiam acquirat, post exiccabis in lapideam duritiem, hic lapis tritus super porphyritide in loco frigido lacculo inclusus ponatur, donec liqueat in liquorem intingit adstrictivum, laporis aluminosi. Ulius ejus tum internus, tum externus. Sequens tamen nobis magis arridet ab Amico communicatus.

*Li* *Li* *Li*

lap. hematit.

*Oli* aa. p. xq.

*Solve in cella liquorem non vomitendi*

*usus.*

Liquor stipticus sequens etiam egregie sedit.

*Li* *Alum.*

*Oli* aa. 3j.

*Cog. in aqua pluviali, & inspiss. parum. F.*

*Aqua seu Liquor stipticus.*

*Vel quis melior est?*

*Li* *Terr. Hass.* q. v.

*Cog. in aq. ferrarior. vel pluviali.*

Terræ Hassiæ ex alumine, & Vitriolo constans in cella in liquorem soluta est egregius liquor stipticus, & non te fallit. Alum novitius parare ex solo vegetabili. Nota est aqua stiptica *Biddiz.*

Nonnulli lignum sympatheticum ex fraxino certo tempore decitum naribus adnotum magis faciunt, a quo etiam *D. Emmellius* stupens felicem observavit effectum: sed sit fides penes auctorem. Hæmatites vel Jaspis genuinus manu detentus à pluribus magnè penditur. Filix 13. annorum laboranti, omnia, etiam nobilissima remedia frustra adhibita fuere, accedit empirica & nuche apponit expam manibus prius comminutam, & fluxus sanguinis statim sistebatur. In aqua communi solv. Vitrioli alb. q. l. quo turunda madefacta, & intoducitur naribus: raro hoc te fallit remedium. Vel affundatur lapida ignito & fumus excipiat naribus.

In contumaciiori malo alii cauteria actualia, & quidem plantis pedum admovent, quo cautecio curavit plures *Zacutus Lusitanus*; sed nolo author elice huius crudelis remedii.

Spirituum quoque acrimonia quantum possibile topiatur. *Cl. D. VVedelius* sequens cataplasma commendat fronti applicandum.

*Li* *Bol. Armen.*

terr. sigillat.

sang. dracon.

spod. aa. 3j.

alum.

gallar.

musc. cran. human. aa. 3j.

succ. vel aq. solan.

busf. pastor. aa. q. l.

alum. ov. No. l.

acetis parum.

M.

Ventri quoque admoveatur cæruleum lineum immectum liquori stiptico, vel stercore similibus calefactum. Vel

U

*Li* *Aq.*

℞. *Aq. Plantag.*  
*herf. paffor.* aa. ʒiſſ.

*acet. roſac.* ʒi.

*lap. hamatit.*

*Croci Martis* aa. q. v.

*F. Epibema*, vel mammis, vel epari, vel ſcroto applicandum. Ad iſta epichemata pertinet Frontale *Proterii*, ex croco Martis, bolo Arm. & opio cum oleo roſarum miſtis & temporibus applicatum, quo ipſe hæmorrhagiam pertinacem curavit. Sic nuchæ ventofæ magnæ à nonnullis in pertinaciarum hæmorrhagiâ apponi ſolent, quo pertinent cucurbitule ſupra pedes adnotæ, quæ auctore *Foreſto* miraculi inſtar hæmorrhagiam uariarum ſolunt: ſed fides ſit penes auctores.

In Hæmorrhagiâ ex lãguinis nimia acrimonia ortâ opiata cum abſorbentibus ſeu præcipitantibus niſta omnem abſolvunt paginam, vitando ſcil. volatilia Ex. gr.

℞. *Bd. Armen.*

*Terr. ſaſſil.* aa. gr. viij.

*Camphor.* gr. ij.

*Theriac. cal. ſt.* gr. j.

vel laud. opiat. gr. j.

*M. F. Pulvis.*

Vel deur Tinctura Nepenth. Si morbus enim producatur ab acerbis impetuoſis & sanguinis nimia craſſitie, tunc camphorata optima ſunt. Conſerva rolar. cum theriaca ſapinis aſſimatur, egregium eſt certe remedium. Si ſanguis acer, tunc conducunt lenientia, oleum, lac, &c. Nitri ʒiſſ. in aq. papav. err. vel frigida ſolvatur & propinetur, quod remedium eſt ſæpe præſtan- tiſſimum. Decoctum millefolii cum cort. aurant. immatur. vulgare, ſed optimum audit remedium. In ſanis aqua frigida etiam intro ſumta conſert, quæ ſimul in faciem ſparſa conducit. Si potenter aſtingere velis, vitriolum album ſolvatur in aquâ, & hac tinguantur turundæ naribus ſtillancibus intrudende. Item fungus bovis, ſive crepitus lupi ſub formâ turundarum intru- ſus etiam ſoluit.

In Narium fluxu ubi præcedit capitis gravitas, dolor & faciei inflammatio, & ſanguis ſponte ſua non fluit, ſæpe cum penna aſterina, vel alio modo venula, vel magis arteriola in naribus irri- tanda ſunt, poſtquam irritationem ſanguis fluit. Si plura exempla novimus, quibus hæmorrhagia narium adeo familiaris eſt, ut ſingulis ſepti- manis recurrat, ac jam quaſi ordinaria ac naturæ conſueſcit eſſe videatur, ob ſcorbutum, quo la- borant ejusmodi homines.

*Coryza* optimè noſtro ſenſu curabitur inhi- bendo ultorem falſis lymphatici præcipationem ad partes narium factam, & exſiccando lympham majori abundantia p. n. evaſatam, cui ſcopo præ aliis convenire judicantur diaphoretica ſeroſitates nimias abſumentia, & per poros cutaneos evacuantia, quæ parantur ex ʒio diaphoretico, pulv. ſpalmodi, qui egregius eſt, C. C. ligne ☉ Card. bened. ſcabioſ. torismae. camph. liq. C. C. ſuccinat. eſſent. lignor. electuar. Orvietan. electuar. ex relinâ ſantal. rubr. *Schneider.* Mixture ſimpl. Tinctura bezoardica, quibus medicamentis internis idoneæ ſubjunguntur externe ſuſtinentia, ex quibus ſequens nobis præ aliis placet, quo ſolo juvenis robuſtus magna gra- vedine cum opthalmia tetra & hordeolis labo- rans, poſt diaphoreſin citò ſuit reſtitutus, ut po-

ſtero die hordeola arida fuerint reperta, & brevi evanuerint.

℞. *Gumm. ſandarab.* ʒiſſ.

*anim.*

*Succin.* aa. ʒj.

*maſſich.*

*benjoin.*

*M. F. Pulvis Agroſſus prunis inſpergendus*, à quo excitatus fumus aperto & obſecto capite ab agro eſt excipiendus, ejusque uſus aliquoties in die repetendus. Sunt qui opiata commeh- dant, quæ tamen cautè exhibenda ne nimis in- craſſando ſeviores & aliud incommodum tibi contrahas, quod ſæpe factum fuiſſe noſtra con- ſtat experientia. Nares obſtructæ etiam ſunt reſeranda vel pulveribus ſternutatoriis modicè in- ſuſſatis, vel ſpiritibus externè adhibitis, ut nodulus herbis majoran. origan. flor. lil. convall. anth. ſem. nigell. & caſſoreo repletus, Spiritu lil. convall. & aqua ſerpilli humectatus, vel fumus ex aceto roſaceo ferro candente inſperſo nares ingreditur. Sic etiam globulus odoratus con- ſici poteſt ex pulveribus rad. Ireos Flor. raſur. ſantal. citr. herb. majoran. baſil. flor. lavendul. rolar. rub. odorat. ſem. nigell. macis, Sapone Veneto in aqua roſar. & nampâ. diſſoluto ex- ceptis. addiſſis liquidam. oleo ſaſmin. camphor. ol. d. lavendul. Nuc. moſchat. cort. aurant. qui manibus eſt geltandus & ſæpiuſcule naribus ad- movendus. Vertex aliquando, maxime ante cu- bitum, oleo ſuccini eſt illinendus, aut empla- ſtrum aliquod ſulpenſorium, vel potius ſucco- rum acrimoniam corrigens, ex ſuccino, gumm. ſandar. maſſich. ſem. nigell. fol. majoran. flor. lavendul. rolar. fermento acri immiſtis, & cum aceto rutaceo malaxatis eidem eſt apponendum, quod ſiccatum cum alio recenti eſt coimmutan- dum. Quando ex coriationarium facta eſt, illi- nantur eadem oleo monord. vel oleo amygd. dulc. cum aliquot guttulis olei deſtill. anil. & camphoræ, vel etiam unguento alabaſtrino, vel aureo, cui oleum d. ligni Rhod. guttaram adipe- ſum eſt. Lymphæ ad ſauces ruens ob vaſa poſt diſtenſionem nimiam diſrupta, maſticatoriis, ali- iſque ſalivationem quandam mediocrem exci- tantibus eſt exhaurienda, quo reſertur fumus tabacalis, quem modicè uſurpatum cum *Carte- ſiani* non omnino vetamus, ſed ut proſuicuum aliquoties repetitum, hac addita admonitione u- ti. commendamus, ne quod ſummiſſe correxit nimia potius ingurgitatione denuò pervertatur quod tamen ſummiſſus & philocapsiſtis hodie nimis eſt frequens.

In *Sternutationum* nimia paroxyſmo ſtatim in- quirendum, à quam cauſa internæ, an ex- ternæ, oriatur, vel an à ſanguinis acrimonia, vel à cacoſymia ſeu ſtagnatione ſuccorum in inferiore ventre, vel ab ipla lymphæ acrit & valis ſuis effuſa ſuſcitur, ſecundum cauſæ etiam va- riationem & curatio variat, ſed ſemper ad acri- moniam reſpiciendum, ſtaim ergo ager per na- res attrahat ſolum lactepidum, vel oleum amygd. dulc. cum mucilag. ſem. cydon. addito momen- to opii. Omnia antiepileptica dicta hic conve- niunt, imprimis cinabarina, pulvis cephalicus *D. M.* vel pulv. ſpalm. aliquoties exhibitus, liq. C. C. ſuccinat. item caſſioria & quæcunque in Epileſia conveniunt. Velicatoria vel Spiritus volatiles nuchæ, & cucurbitæ ſiccæ ſenioribus applicentur, frictions palati cum pan- no aſpero parentur, quo calefacta pars hu- mores

*Curatio*  
*Coryza.*

*Sternuta-*  
*tiones na-*  
*ma.*

# CAP. XVII. DE HÆMORRH. NAR. GRAN. &c. 157

inores diffipet, ut ii divertantur à nati-  
bus ad palatum, præprimis tanquam eupori-  
on remedium communicamus fermentum pa-  
nis cum succino & mastiche, ut in Coryza  
paratum, & vertici impositum. Rarum est  
quod legitur apud *Barolinum Ail. Hassienf.*  
*Obs. 1. Volum. 5.* de puella 14. annorum post fe-  
breu tertianam singultu ac sternutatione per  
aliquot menses graviter afflicta, & ab empirico  
exhibito solùm spiritui æruginis, feliciter ab his  
symptomatibus liberata; acida enim mihi hic  
suspecta sunt. Eligerem potius sudorifera. san-  
guinem dulcificantia & serum corrigentia. &  
clysteres imprimis Cinarina succinata, ca-  
storia, vii. crina cum opiatiss remixta.

*Cura de-  
dria de-  
praviat,  
immunit  
& ablati.*  
In cura *Odoris depraviat* causa amovenda,  
& Organa hujus sensus quocumque modo  
conservanda sunt. In *immunitate* ejus aut  
ablatione semper etiam ad causam respiciend-  
um est, & si fistula vel ulcus adsit, illud prius  
curandum, si verò à catarrho obornatur malum  
hoc conveniunt varia nervina & aromatica,  
v. gr. lil. convall. majorana, rosmarinus, pule-  
gium, imprimis Aqua Reginae Hungar. sæpius  
naribus excipienda, vel cum linæolo intruden-  
da, nec non Essentia viperina. Internè con-  
ducit præ alijs balsamus meus nervinus, vel li-  
quor C. C. succinatus. Utatur & æger  
potu Theæ, nam plures curavimus  
continuo moderato tamen ejus usu. Bal-  
samus rutilæ, succini, majoranæ, vertici ca-

pitis, nuclæ & ipsi naribus sæpius illinatur,  
vel fiat sulcus ex gum. animæ, succino & ma-  
stiche. Cinarina item & castoria internè  
& externè hic medentur. Omnibus iucastum  
tentatis ad acidulas Martiales confugiendum,  
quarum usu plures oblectavimus relictos;  
non verò ad inensuras potarunt. Affectus hic  
curatur ut Epilepsia, & omnia in morbo illo lau-  
data remedia & hic conducunt.

Si odor ablatus sit à Coryza vel gravedine, il-  
la prius curanda est, hoc in casu conducit oleum  
linum per infusionem paratum, vel solùm,  
vel additis guttulis nonnullis olei destill. ma-  
joran. quod potenter promovet lymphæ efflu-  
xum. Semen nigellæ cum majorana consu-  
ctum naribus applicetur sæpius pro restauran-  
do olfactu in obstructiõibus narium & coryza,  
vel solùm vel cum camphora. Oleum nigellæ  
per infusionem paratum cum tantillo olei ma-  
joranæ idem præstat. Vel allimatur sequens  
mixture interuè, & naribus applicetur ex-  
ternè.

*Hy. 7. benedict. serpill.  
majoran.  
Lang.  
ceph. c. vin. aa. ʒj.  
Tinct. castor. ʒij.  
M. D.*

Hic etiam ea conveniunt remedia, quæ supe-  
rius in Coryza fuerunt exhibitæ.

## C A P U T XVIII.

*De Lingue Morbis, Freno, Tumore seu Crassitie, Ranulâ,  
Nigritie, & Fissuris, Pustulis, Verrucus, ejus substantia  
portionis ablatione, Aphonia, Blasitate, item  
de Gustus lationibus.*

### §. I.

**L**ingua *πελοδιδάλο* illud instrumentum,  
quo nature & artis arcana panduntur, ex-  
positurus cum Parmenone apud Terentium  
inussio: Lingua hæret metu! Difficile enim  
ex tot diversarum sententiarum congerie sem-  
per colligere verum, aut ubique rectâ ingredi  
viâ, nec extra orbitam desistere, cum tamen  
audentes fortuna juvet. In hac meâ Ency-  
clopædia semper annitar veritatem, & sic me-  
liorem eligere sententiam in omnibus, ideo &  
hic de Lingue morbis. Lingua ceterâ ad men-  
tem *Jacobi in Epist. c. 3. v. 5.* est pusillum mem-  
brum & magnâ pactat: Ecce exiguus ignis,  
quantum materiam sepe incendit. *Proverbo, 8. 21.*  
dicitur Mors & vita in organo lingue sunt: ac  
suo more docet id exprimit *Jac. Pon. l. 1. Miscell.*  
hæc veritas:

*Hanc lingua membrum est homini præstantiss-  
imum,  
Atque iterum nullum plus nocuum est ho-  
mini.  
Lingua gerit mistum dulci cum melle vene-  
num,  
Percutit, & blandam, si luseret, addit  
opem,  
Quod ferrum nequis, quod non potuere cohortes,*

*Sæpius effectum lingua disertâ dedit.  
Quod ferrum potuit, nec non potuere co-  
hortes.  
Sæpius insectum livida lingua dedit.*

Ideo nature Artificis sagacissimâ providentiâ *Lingua*  
videtur factum, ut lingue in medio corpore *Frenum*  
adnascatur ligamentum validum & membranoso-  
sum, cujus extremitas *Frenulum*, aliis *Frenum*,  
nonnullis *Ligamentum*, quibusdam *Vinculum*  
dicitur, quod non duntaxat ad robur & stabili-  
tatem, item ad insertionem propriorum mu-  
sculorum inservit, sed & ut munimentum ita  
habeat homo ad linguam suam retinendam. Sic  
quoque impedimentum loquelæ à solo hoc vin-  
culo sæpe dependet. Cum ergo homini lingua  
magis soluta sit, ac ceteris animalibus, nihilo-  
minus sæpe accidit, ut antèius proglossis iusto  
arctius lubus adhaereat, cum frenum istud il-  
lam adeo dein impediât, præsertim in recens  
natis, ut hi non possint sugere, imò maxime  
in adultioribus Loquela impeditur, aut saltem  
depravatur, quod malum quibusdam dicitur  
*τὸ ἀρκελόλωσος*. Rarum est quod quis  
in Gallia sine lingua locutus fuerit, hinc legi  
meretur iste tractat. in Append. Eph. Germ.  
Ann. 5.



Porrò quod linguae quantitate concernit, tantae magnitudinis secundum naturam existit, quae oris capacitati respondeat, figurâ pyramidem imitatur, nam pars anterior, quae *Prologlossis* sive *Apex* dicitur, acutior dentibus alliditur, posterior latior in sinuoso faucium antro, *Rajis* sive *Hypoglossis* dicta, absconditur. Superior a superior palato vicina *Epiglottis*, evacuationes utrinque obvia *Cirama* & *Parastira* vocantur ab Anatomicis. Lingua haec tanquam ad bene, non verò ad absolute vitae esse data saepe prae ter naturam tumescit, adeo ut Leida pueri quaedam linguam manus magnitudine amplam grossamque habuerit, ut ore vix contineretur, testante *B. artholno Histor. Anat. l. 2. c. 22.* hinc dicitur *Tumor*: non solum verò Tumor hic à Linguae inflammatione indicitur, sed & à causis externis, prout inferius dicemus. Distincta tumoris species ordinati vicina est *Ranula* sub lingua, quod hoc linguae vitio correpti coarctando magis, quam loquendo enunciant, mollescent ejusdem partem tantum occupans, pueris admodum familiaris, Graeci *Βουβαλον* dicta, alii *Ranucula*, inter abscessus à *Cisto* relatur, & saepe duram compactamque suo folliculo materiam includit, ut ferri levi vulneri non cedat, sed ferro cand. me sit absumenda, interdum mellea materia inde exit, accedique ad mellecidiis naturam; modo materia est nigra, modo candida, ovi albumini non abnihilis. *Ranula* quoque vocatur in ductum salivalem extremitas occurrens laxa, mollis & alba coagulata substantia à saliva crassiore copiosius cauita. Venarum rammarum *Ranula* etiam dicitur à sanguine p. n. in iis collecto imprimis crassiore dependens intumescencia.

Tumor.

Ranula.

Ranula Homonyma.

Nigredo, Asperitas &amp; Fissura.

Substantia perditio.

Calculi, Vermes, Tophi, Pusula.

Aphonia.

Præterea Lingua redditur aspera, sicca & nigra, cum scabritie atque scilura vel *Fissura* à particulis acidis & acribus od delatis, & saepe ex primis viis exortus, ut plurimum verò à lymphæ acrimonia erosio, & hinc stagnantibus.

Quin & Linguae substantiam deperdi historiarum certissima fides testatur, & nostra quidem observatione constat; deperditam verò regeneratam esse quidam sunt qui asserunt, ut *Horsius*, *Bartholinus* & ex eo *Sachsus* in *Gammærolog.* Sunt & *Calculi*, *Vermes* & *Tophi* sub lingua, qui ægros quoque vexant.

Interdum etiam *Pusula* in extremitate Linguae existit dolorem pariens, dum dentes offendit, quam vulgus, nimis aliquando superstitiosus, induci credit, si alius quidam mendacio aut calumnia eundem hominem commaculaverit; sed verè à succo crassiori & particulis acidis sub parvulo quodam Linguae cornu, collectis, & papillam nerveam sub ea comprimentibus dependet.

*Aphonia* dicitur à *Anaphia*, Aphoni enim *Hesperati* idem ac *Apoplectici*, cum Aphonorum nomine intelligat eos, qui ne motum ullum voluntarium retinent, hodie verò confunduntur.

Porrò *Motus* Linguae variis lœditur modis: primo *aboleitur*, conformationis vitiatæ à primordio contractâ culpâ, vel denegato spirituum animalium influxu tum ob subsidientiam cerebri & compressionem principii spinalis medullæ, uti in *Apoplexia* 2. In *Hæcitate* deprava-

atur motus linguae, dum homines non possunt initium capere loquelæ, nisi linguam aliquoties moveant, aut postquam loqui inceperunt, non possunt in sermone progredi, sed sæpius eandem vocem repetunt. Illud symptoma dicitur *Lygopædia* Linguae *Hæcitantia*, sive *Timbanta* & *Barbarismus*. Non minus depravatur motus Linguae quando una syllaba pro altera profertur in *Barbarismo* & *Babylone*, quarum hæc literas aut syllabas quasdam inter pronuntiandum abiorbet, vel quasi supprimit; illa literarum unam pro altera vitiose effert, imprimis literam R & L.

Tandem nec Gustus organum speciatim à præternaturali morboſa dispositione immune est; pariter enim & *Glossitis*, *aboleitur* in *Glossitis nullitate*, quam *Αγωγία* Graeci verunt. 2. *Immutatur* Gustus, quo minus apores percipiuntur. 3. *Depravatur* Gustus, quando alii saporis ac ipsi sunt, percipi solent.

§. 2. *Sub ætium* horum affectuum merito dicitur Lingua, cujus substantia est membranacea-nervosa-glandulosa-carnæ, venas, arterias, nervos admittens, liquorem in exteriori ejusdem parte, superiore scil. regione, quam aperto conspicimus ore, notabis extin. an membranam porolam in cornu quadam fibrosa elevatam, quæ modo mobilia & flexilia sunt, inter hæc cornua dein quadrato ordine disposita videbis primi generis papillas nerveas, mox detractâ priori illa membrana substantiam in modum crassioris retis extensam conspicies, quæ examinata papillares secundi generis globuli quamplurimum visui se exponunt, & circa has reliquæ graciliores conicæ conspectui sese dahuunt. Tandem sub papillaribus istis corporibus Lingua carne maculosa, multiplici fibrarum carnolarum rectarum transversarum, obliquarum sibi invicem superequantium & velut tegetem efformantium concursu intertexta constat. Glandulae ex conglomeratarum generis basin occupant, aliae minuz & molliores fibris interioribus hinc inde dispersæ interperant. Præterea inferius in medio centro ligamento valido membranoso firmata est, cujus extremitas frenulum constituit, impediens ne lingua nimium excurret, aut inordinatus moveatur. Hoc in quibusdam recens natis adeo totam alligat linguam, ut divelli obstetricis ungue, seu Chirurgi scalpro incidi solet, ne suctioni vel loquelæ impedimento sit, de qua operatione inferius dicemus. In Lingua ergo non tantum Gustus organon, sed & vocis est, hinc teste *Aristotele* homo linguam absolutam, molliissimam & latam præcipue habet, ut commoda ad utrumque officium sit, ad saporis nempe excipiendos, & ad literas exprimendas. Hoc quoque hic asterisco notandum, quod lingua semper madida existat. & semper humor quidam ex glandulis papillaribus effluat, & flaccidas habeat fibrillas, hinc si ceram sigillarem, (*Stegivados*) vel alind resinofum, & quidem cum flamma inponas linguæ, statim extinguntur absque ullo incommodo, quod quidam nescio cui humori linguae ultio hæcenus adscribere histiones, luci ergo pro vita sustentanda tale quid exercentes: quod tamen quilibet, inseniet experiri potest: & inde oritur, quod lingua habeat fibrillas flaccidas & minus extensas, seu dictum. Pro affectus ergo diversitate

sitate

litate diversâ quoque & peculiares afficiuntur Linguae partes, de quibus infra in paragrapho de causis pluribus agemus.

*Diagnosif  
Treni.*

§. 3. Si *Frenum* sive ligamentum niquis arcuê constrictum aut longius exporrectum sit, ex eo cognoscitur, quod recens nati non recte papillae fugere possint, & impediuntur, quo minus ritè deglutiant, quia motus atque volitatio linguae ad deglutitionem alimentorum valde necessaria, redduntur etiam morosi, extenuantur atque debilitantur. In adultioribus loquela vel impeditur, aut saltem depravatur.

*Tumoris  
Ranula.*

*Tumor* & *Ranula* saepe ovi columbini magnitudine apparent, durus ille, rotundus, rubensque cum dolore molesto. Lingua retrorsum protrusa est, loquela & deglutendi facilitas impediuntur: quando suppuratur, pallida est *Ranula*, digitisque utrinque appositis deprehenditur mollis, & in tunica crassa saepe fluctuat.

*Vitiorum  
Ranula  
Gustus.*

*Vitia Loquela & Gustus* per se innoteant, hoc solum notandum, quâ ratione discernenda sint: illud palam fit quando reliquae functiones animales minime laeduntur; hæc verò quando illa simul coasciuntur.

*Ætiologia  
secundum  
Galenicum  
Treni.*

§. 4. *Causam* horum affectuum, & quidem primo ipsius *Freni*, imputare solent *Galenici* vel male conformationi, ob quam in infantibus membrana seu ligamentum illud linguae aut nimis breve sit, aut nimis longa extremitate polleat, unde lingua palato arcibus annexatur; vel affectibus aliis ætate grandioribus obvenientibus, & cicatricem solidioreni post se relinquentibus, linguam similiter in motu impediunt, ut sunt ulcera aut vulnere denuò consolidata.

*Tumoris.*

*Tumoris* causam statuunt vel substantiæ incrementum, vel humorum influxum, quos lingua imbibens ita excrecat, ut in munitione mercuriali aliquando contingit, vel sanguinis plenitudinem & phlegmonis abundantiam, vel calculorum sub lingua collectionem, aut materiam venenatam coactam linguam in molem istam distendentem, quod cognoscitur ex mole nimia, loquela defectu vel difficultate aliisque signis.

*Ranula.*

*Ranula* produci credunt ex materia quadam frigida, humida, crassa, lenta, viscida & pituitosa, calore & consistencia albumen ovi referente, & ob facultatis concoctricis debilitatem in cerebro collectâ, ab expultrice verò cerebro expulsa, & ob laxitatem substantiæ sub lingua eo prolapsæ, ibidemque retenta partem illam mollem adeo latè extendente. *Nigrities*, *Ariditatis*, *Aphrenitidis* & *Fovearum* Linguae originem adscribit vaporibus fuliginosis, sevientibus & acris ab sanguine in febribus potissimum causticis & malignis, tum & inflammationibus internis, peripneumonia scilicet & pleuritide, aut ex ventriculo male affecto allurgentibus, humiditatem linguae exsiccatibus & continuitatem ejus dissolvantibus.

*Pustula  
varicæ  
varicæ  
varicæ.*

*Pustula* & *Verruca* pronasci volunt ab humorum fœnore & acrimonia quadam cuticulam percutiunt & in vesiculas illas attollente, quibus postmodum affluit humor crassius vel melancholicus, vel pituitosus, vesiculas illas in ipas decedere verrucas.

*Substantia  
periculis  
alluvionis.*

*Substantia* portione *ablationem* contingere cum reliquis fatetur, vel à causis externis violentis & vulnerantibus, sectione nimirum, abruptione, aut promotione, vel ab internis acri-

bis corrodentibus humoribus, in ulceribus & cancribus ita degenerantibus.

*Aphonia* vel à primâ nativitate esse norunt, *Aphonia.*

à mala nervorum in utero conformatione, vel ab Apoplexiâ aut Paralyfi, sicque facultatis animalis defectu, aut voluntatis certâ constantiâ, nihil lingua proferendi, ut à phreneticis & melancholicis fieri asoler, vel ab organorum voci intervenientium ineptitudine, ut pulmonum, aspera arteria ac gutturis obstructione aut compressione à pluribus causis, tum externis, lapsu, percussione & hinc oboriente luxatione vertebrarum, tum etiam internis humoribus crassis inductâ.

*Blasphemia*, *Balbutium* & *Battarismum* fieri judicant tum à lingua breviori, tum ab ejus imbecillitate ob intemperiem humidam, aut etiam siccam, frigus, iram aut calorem, tum à fœno aut membranula subjacente linguam nimis adstringente, & liberum ejus motum impediente.

*Gustus* immutatio nem aut *abolitionem* tantquam causam sequi putant modo nervorum gustatorum obstructionem, compressionem aut perfrigerationem, modo spirituum defectum, sicque facultatis debilitatem, modo Linguae intemperiem humidam aut siccam, modo vulnere aut ulcera: *Depravationem* verò fieri dicunt, quod Gustus organum, membrana videlicet linguam & palatum succingens, pravo quodam humore, eoque vel putrito, vel viscido, vel melancholico copiosius sit imbutum, unde pro diversitate istius humoris peccantis, diversimoda etiam existit Gustus illa depravatio.

§. 5. *Paracelsus* quoad *Freni* causam nihil habet à reliquis peculiare, sed illud, quod curvis homini naturale esse debet, in quibusdam natum morbi induere putat, vel in matrice seu utero ita formari ob torturam aberrantem, vel postmodum ab insortuito quodam contingere, ut fœnum illud linguam ori strictius alligat.

*Tumorem* Linguae originem fœnetæ putat à *Tumore* sale resoluto per substantiam linguæ diffusio, & eandem in tantam excrecentiam expandente.

*Ranulam* dicit immaturum plurimam, vel apostema quoddam esse ex omnibus venis, quæ sub lingua sunt, accumulatum, ex radice lingue sumens originem, unde cum latè, ac lingua fuerit, extendatur, eticque sal resolutum ejusdem sanguinis, ex debilibus venis tantum, quapropter in ætate provecctæ ejusmodi resolutionis minime fieri posse.

*Nigrities* ex colore Linguae emortuo. *Aphrenitidis* tatem verò & *Fistulas* ex sale cruoris, vel car. *Aphrenitidis* nis sine ulteriore corruptione promanare censet.

*Pustula* & *Verruca* procreant ex saleentali, cui nutrimentum Linguae occurrit; *Substantia* vero *ablatis* aut sit ab externo quodam instructum, aut à sale corrosivo, linguam successivè substantia ablatis.

*Aphonia* à defectu synoviae pendere contendit, quod ex separata linguam deferat; *Balbutium* verò & *Blasphemiam* ex peculiari quadam materia oriri, ad genus salinum resolutorum ex sanguine accedente.

*Gustus depravationem* à sale liquoris corrupto deducit, sed non dum corrosivitate adeptus, pravo *Immutatio* nem verò & *Abolitionem* tum ab eo. *Immutatio* nem verò & *Abolitionem* tum ab eo. *Immutatio* nem verò & *Abolitionem* tum ab eo.

*Blasphemiam  
balbutium  
& Battarismum.*

*Gustus immutatio  
nem aut Abolitionem  
tantquam causam  
sequi putant  
modo nervorum  
gustatorum  
obstructionem,  
compressionem  
aut perfrigerationem,  
modo spirituum  
defectum, sicque  
facultatis debilitatem,  
modo Linguae  
intemperiem  
humidam aut  
siccam, modo  
vulnere aut  
ulcera: Depravationem  
verò fieri dicunt,  
quod Gustus  
organum,  
membrana videlicet  
linguam & palatum  
succingens, pravo  
quodam humore,  
eoque vel putrito,  
vel viscido, vel  
melancholico  
copiosius sit  
imbutum, unde pro  
diversitate  
istius humoris  
peccantis, diversimoda  
etiam existit  
Gustus illa  
depravatio.*

*Secundum  
Paracelsum  
causam freni*

*Ranula.*

*Substantia  
vero ablatis  
aut sit ab  
externo quodam  
instructum,  
aut à sale  
corrosivo,  
linguam  
successivè  
substantia  
ablatis.*

*Aphonia  
pit, quod ex  
separata  
linguam  
deferat; Balbutium  
verò & Blasphemiam  
ex peculiari  
quadam  
materia  
oriri, ad  
genus salinum  
resolutorum  
ex sanguine  
accedente.*

*Gustus depravationem  
à sale liquoris  
corrupto  
deducit, sed non  
dum corrosivitate  
adeptus, pravo  
Immutatio nem  
verò & Abolitionem  
tum ab eo. Immutatio  
nem verò & Abolitionem  
tum ab eo.*

resoluto quodam per nervos influente, & in iisdem coagulato, à quo gustus perceptio impeditur actandem plane tollitur.

**Helmentis** *Helmentis* Linguae *Frenum* ex nimia extensione membranae sublinguae in utero aliquando obortum, aliquando ex cicatrice relicta post vulnerationem abbreviari, & motui Linguae impedimento esse cum aliis agnoscit.

**Humoris.** *Tumorem* Linguae induci retur à mucilagine ex latice relicta, & sub tunica ejus latente, eandemque in tantam magnitudinem distendit.

**Ranula.** *Ranulam* similiter saliva mucida & tenaci è latice prodeunte, & in venis raninis sub Lingua nimia copia collecta deducit, quam peculiariter quodam fermento *Archeus*, peractus quodam alio distribuere nequeat, in huiusmodi excrecentiam convertat.

**Nigredinis** *Nigredinem*, *Aperitatem* & *Fissuras* Linguae induci vult à defectu laticis deturbati, vel egestate penuriosi, dum in stomachi hospitio inperit evalit pro suo manere, ut per venas nequeat transire debito instructus viatico, quare crudata illa foras non satis abluuntur, sed accumulantur in lingua, ideoque nullatenus sunt indicium exhalationis è stomacho sicutum elata, sed soli latici inepro adscribenda.

**Pustularum** *Pustula* eidem latici fermento quodam salino acri infecto adscribit, à quo illae facile excitentur; *Verruca* verò excrecere ab eodem crassiore & copiosiore ad linguam tunicam fluentem, ejusque humbris in tubercula huiusmodi attolente.

**Aphonia** *Aphonia* fit, dum Lingua ab impuritate quadam ita vitiatur ut munere suo debite frangi nequeat, & ab ejusdem impuritatis impostura anima simul seducta organi vitiati conjugium parem debilitatem contrahat, quale quid etiam in *Balbnie* & *Blasitae* contingat, in quibus impuritas non est tanta atque in Aphonia, adeoque & Lingua aliquantum, at non totaliter vitiatur, ut sic vel initium loquelae sit difficile, vel licet quaedam certè non satis clare enuntientur.

**Gustus** *Gustus* *Depravatio*, *Imminutio* & *Abolitio* pro ratione laticis impuri aut deficientis contingit, à quo vitiato *Archeus* fallitur, quamvis praeter Gustum linguae alius sit in stomacho, vel in archi extremo, unde fiat, ut quae linguae sunt insipida, praecordii odore suo specifico vel horrorem incutiant, vel aliquam offerant delectationem.

**Wistis** *Wistis* in recensendis Linguae *Freni* vitiis causis à prioribus suis non abludivit sententia, sed ligamenti vel magnitudinem aut breviter in utero acceptam, vel ab externo infortunio inductam Linguae motui obstat, eandemque arctius aut longius annexere & freni instat retrahere facit.

**Tumoris.** *Tumorem* linguae oriri retur ab humiditate quadam nimia, aut aliis quibusdam particulis incongruis poros ejusdem occupantibus, & texturam fibrosam ita dilatantibus, ut in non fibrosam quandoque vastitatem expandatur, oris cavitati saepe minus respondentem, & proinde ab ea satis convenienter tegi aut contineri necessiam.

**Ranula.** *Ranulam* ab humore viscido sub lingua col-

lecto exoriri credit, dum partes salivae falsae & fixiores eidem tractu temporis immixtae eundem inspissant, & innumescentiam illam producant, quae assidue novi humoris facile augatur.

Linguae *Nigredinem* & *Aperitatem* cum *Fissuris* ortum habere contendit à calore & fuligine ex ventriculo & pulmonibus æstu flagrantibus exhalata, & sicut in febribus putridis pleurumque fieri consuevit, unde humiditas Linguae naturalis non modo consumatur, sed exarescat, decoquatur & à calore torrido velut elixetur, sicque scabra evadat, prout idem à jussulo calido aliquando contingat, ab humore autem bilioso Linguam vel introsum suffusam, vel extrinsecus unctam flavedine colorari, & à calore adeo intentio, ut Linguam adurat, & ignem solito ardentem accendat, aliquando fieri, ut è cordis foco per pulmonum spiracula tanto incendio ventilandum vix sufficiens, fuligines quaedam suscitentur, quae ad palati fornicem alitae linguam quasi reverberio feriant, & Nigredine quadam inficiant, in medianis ejus partibus ideo magis conspicua, quod exteriores ambitus frequentiori ad gingivas & palatum attritu detergeantur.

**Pustulae** Linguae adscribit particulis salinis co-  
pustulae  
pustulis in humore linguae & salivae, vel è  
glandulis maxillaribus, vel ab humore tonsil-  
larum èo allatis, & inter fibras linguae cutaneas  
stagnantibus, easdemque attollendo huiusmodi  
pustulas, & succo nutritio crassiore imposterum  
ad deductas fibrillas affluente & indurato  
etiam *Verrucas* excitantibus.

**Substantia** Linguae *ablationem* vel humoris acti  
torrodenti & alimenti, vel violento morsu  
præter voluntatem in convulsis & epilepticis  
hominum contingenti, vel externo infortu-  
nio, seu instrumentum scindentibus aut secan-  
tibus adscribit.

**Aphonia** à defectu aut debilitate spirituum  
animalium, & sic paralyti Linguae sapissimè  
dependere tradit, nonnunquam à copula ex-  
plosiva in fibras linguae mortices è sanguine  
suffusa, & motum ejus impediende, ut in ter-  
tore subito aliquando contingit: *Blasitatem*  
verò & *Balbnie* à nervorum partis quintae aut  
linguae vicio obtingere, dum spiritibus via  
adimitur, ne lingua fibras sit copiosae distendant,  
sed paucæ tantum quantitate, unde lingua spiri-  
tibus morticibus destituta cuilibet vocis expecta-  
tioni minus sufficit.

**Gustus** *depravationem* à saliva glandularum  
maxillarum variis salibus aliisque particulis im-  
prægnatâ contingere autumat, dum fibre ner-  
volae tum linguae, tum palati & partis gulæ su-  
perioris iisdem magna copia repletae alia cor-  
puscula sapida non satis discernant, uti in  
*Imminutione* & *Abolitio* Gustus corpuscula ista  
non sentiuntur, quod ab humore linguae cras-  
sore, viscido & insipido poros linguae ante-  
occupante excludantur, ut nullo modo poris  
insinuari & fibrillae nervae ab iis affici queant,  
interdum & nervos partis quintae & non in culpa  
esse, ut obstructi particulas sapidas non ex-  
cipiant, neque communi stant sensorio.

**Sylvi** in assignandis causis horum mor-  
borum èo sua vergit opinione, ut quoad *Freni*  
causam motum linguae impediens nullum cum  
reliquis motum distidit, sed unanims quædam  
fovea-

*Nigredinis*  
*Aperitatem*  
& *Fissuras*  
tum.

*pustulas*  
& *Verrucas*  
tum.

*Lingua ab-*  
*lationem*.

*Aphonia*  
*Blasitatem*  
& *Balbnie*.

*Gustus de-*  
*pravatio-*  
*nem, im-*  
*minutio-*  
*nis &*  
*Abolitio-*

*Sylvi*  
*epi-*  
*borum*  
*causa-*  
*Freni*  
*causa-*  
*Tumore,*  
fovea-

foveatur sententia; *Tumorem* verò ortum habere putat vel à substantia Linguae nimium au-  
cta, vel ab humoris, præsertim glandularis ef-  
fusione linguam in maiorem illam molem ex-  
tendente.

*Ranula.*

*Ranulam* similiter à succo pituitoso & lymphæ glandulari sub linguam effusis, intra membra-  
nam venas raninas tegentem collectis, eandem-  
que distendentibus, dependere credit. quibus  
si autem & terrestre quidpiam accedat, mas-  
sam ita aliquando inspissari, ut in calculum abeat.

*Nigredinis  
Aphonia  
& Fissura*

Linguae *Nigredinem* produci vult ab acrimo-  
nia quadam salia lixiva vel succi forma linguae  
assula, vel halituum potissimum per ventricu-  
lum ad os assurgente, prout ejusdem *Aphoniae*  
& *Fissuræ* ab halitibus similibus, tum salis,  
tum lixivis, è pulmone cum expirato aëre  
emanantibus, & uni cum faucibus linguam & pa-  
latum maleficiantibus ortum habere contentum.

*Pustula-  
rum & Per-  
forationum.*

*Pustulas* excitari credit à partibus succi pan-  
creatici acrioris tum humoris forma ad linguam  
delatis, tum halitibus instar per oesophagum ad-  
scendentibus & lingue communicatis, uti *Verru-  
cae* à partibus salivæ spissioribus ab acido coa-  
gulatis.

*Substantia  
ablatis.*

*Substantia* Linguae vel instrumento acuto, vel  
morbo violento, vel humoris acribus eroden-  
tibus ex progenie succi pancreatici oriundis de-  
curritur.

*Aphonia  
Blephitis  
& Balbu-  
ti.*

*Aphonia* causam vel musculorum, vel nervo-  
rum Linguae ab humore pituitoso obstructio-  
nem, & spirituum animalium influxum prohibi-  
tum, sicuti *Blephitis* & *Balbuti* à vicio  
quodam Linguae organico, vel musculis, vel ner-  
vis inherente & plerumque connato, aut den-  
tium defectu pendere existimat.

*Gustum  
aboli, di-  
minuti,  
prævari &  
nulli.*

*Gustum* aboleri, aut plus minusve *diminui* do-  
cet, tum sensorii lingue & palati vitio, dum in  
morbis variis imprimis febribus ardentibus illa  
exliccat, arida sit & omnis usus expers, tum  
salivæ deficientis & potissimum spiritus acidi  
contemperati in ea latantis defectu, tum spiri-  
tuum animalium & nervorum culpa: *Depræ-  
vari* verò eundem ob vicia salivæ aliorumque hu-  
morum vel halituum ad os delatorum, dum saliva  
vel aciditate, vel fæsedine abundat, aut bilis, vel  
succus pancreaticus, vel pituita, vel mistura di-  
versa ex hisce pronanziat, vel aliud quid ex in-  
testino tenui per ventriculum ascendit, vel pi-  
tuita multiplex à cerebro ejusque glandulis de-  
scendit, vel humor multifarius ex pulmonibus  
prodit, vel ex variis partibus sanguis, pus & fa-  
cies promanant, vel halitus quidam ab intestino  
terui aut ventriculo per oesophagum, aut pulmo-  
nibus per asperam arteriam, aut naribus male af-  
fectis per palatum exsurgunt. *Aut* *Gustus* cau-  
sam addit sensorii constitutionem valde tene-  
ram, linguam delicatam, & salivæ temperiem  
exquisite.

*Cartilagi-  
norum  
concrepitu  
de causa  
Freni.*

§. 9. *Cartilagin* Linguae *Frenum* eam acutius  
retinens, à Ligamenti lingue brevitate nimia in  
prima conformatione obtinere itidem videtur,  
ut non minus quoad cicatricem post vulnera vel  
ulcera inducam præcedentibus adjungitur.

*Tumor.*

*Tumor* Linguae obvenire solet vel ab abun-  
dantiâ succi nutritientis, fibras ejus distendente,  
vel à materia venenatâ per fermentationem  
quandam cum reliquis succis in Lingua conten-  
tis institutum, easdem fibras distendente, & ma-  
jorem succorum affluxum alliciente, vel ab ob-

structione pororum membranae papillaris, aut  
succu glandularis viscositate, nervorum extremita-  
tes & papillas ipsarum superinfusis corni-  
bus in maiorem molem augente, quâ simplicius  
linguae magnitudo intenditur.

*Ranula.*

*Ranula* exoritur à liquore glandulari sub lin-  
gua spissiore multis particulis ramosis, glutino-  
sis & chylois adhuc constante, & proinde haud  
facile apto à vasibus resorberi, aut in foliis glandulis  
contineri, sed subter membranam illam glan-  
dularum lingue subsistente, avolantibus particu-  
lis salinis volatilibus in gelatinam abeunte,  
quæ tamen ab accedentibus particulis acutis lan-  
ceolatis aliquando dissolvitur, & similem par-  
ticulatum suarum nanciscitur configurationem,  
unde membrana nonnunquam eroditur & li-  
quor contentus instar abscessus effunditur; in-  
terdum partes quædam terrestres lanellis suis  
sibi invicem foriter adherent, & in calculi  
substantiam sola quiete diuturniore conden-  
santur.

*Nigredinis  
Aphonia  
& Fissura-  
rum.*

*Nigredo* Linguae oritur à particulis acutis ra-  
pidissime motis, & vel ex nimia massa sangui-  
nea ab æthere agitatione, vel in febribus arden-  
tibus & malignis fieri allolet, vel ex pulmo-  
num inflammatione aut anginâ egredientibus,  
& lingue fibras & cornua ita divellentibus, ut  
magnos & sulcosos efformet poros, in quibus  
radii lucis suffocantur. *Aphonia* à particulis  
austeris & multis angulis aut hanulis præditis  
inducitur, cornua cum papillis adstringentibus,  
& aliquantulum rigida efficiuntibus, unde illa  
obdurata & rigida asperitatem inducunt, vel  
à saliva multis particulis rigidis & bicuspidatis  
aut tricuspidatis imbuta, quarum unus quid-  
em mucro poro membranae lingue exterioris  
inhardt, reliqui verò minus subsequuntur, sed  
supereminentes asperitatem illam fibris nervo-  
sis præbent. *Fissura* sunt à particulis illis acutis  
fibras planas discindentibus, & vel ex lymphâ  
intra corpus, vel extra illud ab aëre ipsi lingue  
in damnum illud communicatis.

*Pustula-  
rum &  
Verruca-  
rum.*

*Pustula* excitantur dum liquor nutritio im-  
miscetur una vel altera particula salina rigida,  
quæ intet papillam & cornu quoddam consti-  
tuta eam comprimit, sicque dolorem & liquo-  
ris affluxum inducit, unde cornu humectatum  
emollitur & augetur, & hinc reliquis cornibus  
maior existens pustulam quandam refert; vel  
peregrinum aliquod acidum per cibum & po-  
tum, aut etiam aërem illatum particulas quas-  
dam salinas in lympham linguam humectante præ-  
cipitat, quæ fibras rodendo & distendendo ejus-  
modi pustulas provocat. *Verrucae* emergunt  
ex liquore nutriende per disruptas à particulis an-  
gularibus papillas copiosius fluente, unde cor-  
nua pariter dilatantur, vel fibræ papillares ex-  
tra cornua per poros membranae egrediuntur,  
& succum nutriendem alliciunt, sique nova  
virescentiam produciunt.

*Substantia  
immunita  
tiorum.*

*Substantia* Linguae immunita vel ab instru-  
mentis acutis, vel morbo, vel erosione quorun-  
dam succorum acrimia obortis, cum aliis una-  
nimiter concluditur.

*Aphonia  
Balbuti  
& Bleph-  
itis.*

*Aphonia* oritur aliquando ab obstructis ner-  
vorum tubulis à materia viscidâ ab acido coa-  
gulatâ, ut in terrore contingit, unde fit, ut nulli  
spiritus per illos in linguam influere eamque  
movere possint, aliquando verò à suffocatione &  
constrictione faucium, ut in Angina & Catarrho  
suffo-



suffocativo contingit, in quibus larynx simul afficitur, & epiglottis opprimitur, ut pro voce effrendā satis hiari nequeat, vel nimis aperta aërem absque ulla voce emittat. *Balbuties & Blesura*, vel à spirituum nimis agitatione dependet, unde inordinatè turbulorum mulcorum lingua ingreditur, vel ab eorundem copia minore, ut non sufficiant motui linguae perficiendo, respectu inconcinna linguae conformatione, respectu ejusdem molis, tubulorum & nervorum.

*Gustus aboliatur & immittitur potissimum à lymphâ limosa poros membranz linguae investientis replente, obducente & sic particulas lapidas hebetante, ne fibras membranas & papillarum nervearum satis moveant & afficiant, abs qua etiam lymphâ diversis particulis acidis aut salis aliisque repleta eadem fibra jam mota reliquarum extrinsecè adventantium particularum impetum non satis suscipiunt, sed spiritus animæ priorem & fortiozem motum, à particulis lymphæ aliisve sæpe à sanguine aut partibus aliis corruptis egredientibus & fibras præoccupantibus suscitatum offerunt, & sic Gustus fit Depravatus, dum alius percipit à mente, ac vera existit in re pota aut manducata.*

*Nosstra sententia est, Frenum in ipsis infantibus idèo existere adeo molestum, & linguae motui incommodum, quod membrana seu ligamentum illud sub lingua aut longius sit diductum, linguam proluxis inferioribus oris muscularis & sic maxillis alligans, aut nimis breve linguam debite attolli aut huc illuc diduci non permittat, quæ formatio inconcinna vel in utero in elaboratione factus ita contingit, vel à vulneratione vitiosius curata, & hunc superinducta cicatrice crassiori membranulam breviorē reddente, & linguam strictius alligante.*

*Tumor sæpe oboritur solet in febris contumacis, malignis, ardentibus, angina, quando sanguis & succi per ductum & acres per arteriarum carotidum propagines influens valorum & fibrarum ordinem turbat, nec per venarum jugularium furculos promte refluit, sed subsistit hinc lingua aut tota intumescit, aut in particularem tumorem elevatur, qui sæpius in abscellum degenerat. Non verò duplaxat tumor à jam dicta inflammatione inducitur, sed & à causis externis, ut inunctione hydragryi, seu non ita pridem in matrona quotidie cosinetico Galii faciem inungente tumorem linguae observavi. In alia eundem ab esu fungorum venenatorum notavi, & in quodam à morsu canis in ductum vidi, qui & producitur à vermibus sub lingua stabulantibus, & omnibus humoribus ibidem stagnantibus.*

*Tumor alius Ranula dictus causam agnoscit ut plurimum massam chylosam crudam, indigestam, à sanguine in transitu ibi relictam, unde si aperiat, mucus albumini ovi similis effluit, haud raro etiam cum Cariesianis oblongiore moram ex mucosa illa materia calculos concretos observavi, qui aliquando priusquam sectione tollantur, acerbissimos dolores excitare solent, nec sub lingua tantum, sed in apice ejusdem similes papillos genitos fuisse alii Auctores, imprimis Zacchus Lusitanus, scriptis suis annotantur. Vide de lapillis sub lingua Ephem. Germ. Ann. IX. & X. Obf. 144.*

Sæpe etiam Tumor ille præternaturalis est,

à mala conformatione hujus organi, & succi nutritivi nimia congestione, abs qua in immensum quandoque concrevit. Sic vidi puellam bilinguem & tamen elinguem, hoc est, quæ habuit duas linguas sibi invicem incumbentes, quæ totam cavitatem oris fere implebant, de qua historia vid. Ephem. Germ. Ann. IX. & X. Sic Celeberrimus Hannemannus in Suedia fecit videri, cui lingua ex ore instar canis venatici propendebat, quam abscindendo superfluam partem rite formavit Chirurgus & vulnus feliciter consolidavit.

Lingua sæpe laborat Prænulla, id est, aspera Asperitatem redditur, sicca & nigra cum Scabritie atque Nigredinis, Scissurâ à fuliginibus aliis subsistentibus, vel acerbis particulis epimus vis illuc delatis, aliquando ab humorum feroforum lymphaticorum acrimonia eroditur atque exulceratur lingua, hinc ipsius substantia fere ablata visa est in puero variolis laborante, & cum portio quædam in imis faucibus cum glottide & gargareone remanserit, ita articulata loqui poterat, ut omnes adstantes puerum admirarentur. Confer Riolanum, dum narrat Enchirid. Anat. lib. 4. cap. 12. quosdam fuisse, qui sine lingua satis distinctè loquerentur, quod & confirmat Slegelius, ubi loquitur de quodam, cui linguae ex intempestiva inunctione Galii in immensum intumescit pars abscissa fuerat, absque loquelæ impedimento. Notata digna est historia Marcelini: Rex Hunericus, ait, unius catholici adolescentis, vitam à nativitate sua sine ullo sermone ducentis, linguam præcepit abscidi, idemque mutas, quod sine humano auditu Christo credens fide didicerat, mox præcisâ sibi linguâ locutus est, gloriamque Deo in primo vocis suæ exordio dedit. Confer appendicem Eph. Germ. Ann. 3.

*Auferetur ergo Substantia linguae ab hujusmodi causis internis acerbis erodentibus, ut plurimum tamen à causis externis violentis, gladio videlicet, aliisque instrumentis vulnerantibus, vel etiam à morsu proprio fed illibent, ut in epilepticis contigisse aliquoties observavimus.*

*Pustularum causa est res quædam acris in lymphâ contenta, fibras membranas diffidentem, & sæpe unum vel alterum cornu in maiorem atollens protuberantiam, præsertim quando ad vellicationem illam fibrarum simul accurrit lymphâ, aut liquor quidam spissior glandularis, unde cornu ita repletur, ut instar cucurbitulæ aliis præmineat, seu in extremitate linguae ipso visu facile percipi potest, ubi hujusmodi pustulæ aliquando cum dolore excitantur, ob compressionem fibrarum & attractum linguae ad dentes. Verruca à diruptione papillarum, earumque extra cornua per poros tunc lingue dilatatos expansione oboriuntur, nutriendæque à communis sicco nutritio per fibrarum & papillarum tubulos, seu per radices quasdam sufficerent affluente, & hujusmodi excrecentiam instar plantulæ sustentante.*

*Aphonia muscularum vel nervorum vitio ut plurimum fit, & sæpe nihil aliud est, quam obmutescencia ex vitio laryngis. Sin vitio linguae sit, dicitur loquela amissa, & linguae motus tunc deficit; vel ex vitio paralytico, vel convulsivo, sive spasmodico, denegato scilicet spiritu animalium influxu, vel consumitis aut ad alia loca avocatis spiritibus, in syncope, uteri suffocatione agone,*

*Gustus aboliatur & immittitur potissimum à lymphâ limosa poros membranz linguae investientis replente, obducente & sic particulas lapidas hebetante, ne fibras membranas & papillarum nervearum satis moveant & afficiant, abs qua etiam lymphâ diversis particulis acidis aut salis aliisque repleta eadem fibra jam mota reliquarum extrinsecè adventantium particularum impetum non satis suscipiunt, sed spiritus animæ priorem & fortiozem motum, à particulis lymphæ aliisve sæpe à sanguine aut partibus aliis corruptis egredientibus & fibras præoccupantibus suscitatum offerunt, & sic Gustus fit Depravatus, dum alius percipit à mente, ac vera existit in re pota aut manducata.*

*Nosstra sententia est, Frenum in ipsis infantibus idèo existere adeo molestum, & linguae motui incommodum, quod membrana seu ligamentum illud sub lingua aut longius sit diductum, linguam proluxis inferioribus oris muscularis & sic maxillis alligans, aut nimis breve linguam debite attolli aut huc illuc diduci non permittat, quæ formatio inconcinna vel in utero in elaboratione factus ita contingit, vel à vulneratione vitiosius curata, & hunc superinducta cicatrice crassiori membranulam breviorē reddente, & linguam strictius alligante.*

*Tumor.*

*Ranula.*

*Substantia aboliatur.*

*Pustula.*

*verruca.*

*Aphonia.*

agone, &c. ab obstructione nervorum enim  
lingux frequentius produciunt, sæpe à catarrho  
insubidante à cerebri ventriculis in nervos. Sic  
Affectus hic à paralyfi musculorum laryngis &  
ut plurimum vitio nervorum recurrit enim acci-  
dit. Interdum quoque à nimia humiditate, &  
per consequens resolutione musculorum laryn-  
gis, qui flaccidi redduntur, fit Aphonia, hinc  
illi, qui rancine laborant, aphonii sæpe red-  
duntur, hinc quoque *Tulpius* ob abundans  
phlegma evasatum puellam aphoniam vidit. Ex  
irâ vehementissima, terrore, (qualem vidit  
*Bartholinus*) gaudii nimio & spiritibus sic in-  
crassatis affectum hunc observavi, item à cra-  
pula ex concussione cerebri per idem vehementi-  
orem factâ. *Etmüllerus* observavit Aphoniam  
in puella ob extinctam lampadem ex oleo con-  
structam A mœnore & luctu ob obitum Con-  
juncti. Principium aliquot septimanas aphon-  
iam reddidit, novi, quæ simul ipsa modicis af-  
fectibus doloribus, erat enim scorbutica & ob  
sanguinis & aliorum succorum crassitiem circula-  
tione erat tardior. Accidit plerumque loquelâ  
amissâ, ut ægi linguam quidem movere possint,  
sed non articulate loqui, quod videtur indicare,  
quod omnes fibræ lingux non eodem  
modo sunt dispositæ, verum quod cum spiritus  
huic per hunc nervum inter has fibras, linguam  
hoc modo moveat, per alium nervum iterum  
alio modo, quod si ita fiat, potest accidere, ut  
nervi vel tubuli isti, qui loquelam efficiunt,  
sint obstructi, & alii aperti maneant, & sic lo-  
quela salvo motu lingux sæpe aboleri potest, hic  
à succo nervos nimis spisso & viscido non satis  
valide influente aphonix oriuntur, ut videre est  
in moribundis, ubi succus iste nervus stagnare  
incipit.

Diximus superius ex motu convulsivo fieri aliquando Aphonia, quod probamus per lystericas, quæ sæpe in paroxysmo aphoniae permanent. A veribus obtumescentiâ observavit *Forestus*. Rara est illa obtumescencia ex improviso affligens, quod notatur *Ephem. Germ. Ann. 3, p. 193*. Aphonium consignavit lysteris *Zach. Lusitan. lib. 1. Prax. adn. Obs. 77*, ex retenta gonorrhœa virulentâ, fonticulis in virgine curatis, inde enim circulatio succorum impeditur.

Subitanea spirituum a<sup>2</sup>o<sup>2</sup>gia in nervis recurrentibus facta ad aphonium multum facit, hinc ex terrore aliusque animi passio nibus plures ob-  
rumbescere solent, hic curiosum est exemplum in  
*Eph. Germ. Ann. 2. pag. 229. & Ann. 3. pag. 348.*  
*item Ann. 3. pag. 454.* Rara itidem illa est ob-  
servatio aphoniae paralyticae ex globulo plum-  
beo per vomitum modo undique recurrentes  
nervos comprimente.

Ipsius Linguae vitio fit Aphonia, quando  
interperant se habere, vel nimis aspera & hu-  
miditas sit; illud accidit in febris ardentibus  
in ipsis puerulis. Linguae etiam tumor, lin-  
guae amputatio, ejus vlnus & ulcus, ut & li-  
gatura, impedit loquelam. Nervorum linguae  
motoriorum tubuli obstructi, vel compressi, vel  
vulnerati, vel in ipso utero male conformati,  
unde muti nascuntur. Lingua quoque in motu  
suo impeditur ratione palati, quod vel tunica-  
tum ulceratum, vel vulneratum; ratione den-  
tium, qui vel desunt, vel vitiosi sunt; ratione  
baccarum, quae vel tumidae, vel exulceratae  
sunt; ratione gingivarum, quae nonnunquam

in prodigiolum excreſcunt magnitudinem; ratione partis, quæ lingua ſubjacet, in qua Rannula ejuſdem motum impedit; ratione maxillæ inferioris, quando ea eſfringitur, vel laxatur. Rara eſt illa hiſtoria Jacob. Rolandi de Beſchad, ubi oſ alicuius perfectè loquebatur, & reliquis ſuis functiones naturaliter exercebat ſine Lingua, à Carolo Reigero in Epiſt. Germ. Ann. 2. deſcript.

In *Hafnatomis* igitur vitium partim consuetudinis, partim inordinatae spirituum influxui assignamus. Fauces malis hīc occasione praebent, cum praeccluduntur, vel coarctantur à tumoribus & inflammationibus tum laryngis, tum faucium ipsarum; tum etiam columellae & tonsillarum; arctantur iidem à polypo, qui quandoque ita excrevit, ut per foramina palati ad ipsas quoque fauces decendant.

*Blefaritis & Balantriviciu* dependet utplurimum à fibrarum carnearum in muculis invalidiore robore, & ob præsentiam copioſiſſe humiditatis nimia relaxatione, cui conformatio lingue inordinata inuulſet freti ſuppætiæ. *Phla-*  
*ſia* & cauſæ remotæ ſunt nimia in loquendo feſtinatio, defectus dentium, laboriorum mutilatio, palati exſilio, lingua juſto longior aut brevior, craſſior & indecenter formata.

Restant nunc *Gustus*, tum *abolitus*, tum *immutatus* in  
nisi ac depravatus causæ dicenda. Antequam  
verò ad morbosum hunc accedamus statim; vi-  
deamus prius sanum, cum enim *Lingua* habe-  
tur pars organica, ex pluribus partibus con-  
stituta, merito quæritur, cuiusnam hanc principa-  
liter *Gustatio* sive saporum perceptio assignanda  
sit? *Galenus* *Tunicæ* per linguam expan-  
tæ hanc conferre videtur. Alii propius ad *Scopum*  
accedentes, Nervum gustatorium eo nomine  
adducunt, propterea quod eo *læso*, *Gustatus*  
quoque lædatur. *Baninus*, *Capricornius*, *Pa-  
rolus* & alii internam lingue carnem *spongio-  
sam* verum & proprium *Gustatus* esse organum  
existimant, ad quam tunicæ instar medi interni  
sele habeat.

Rectius verò à *Malpighio & Carolo Fracassato* papillares eminentiæ nervorum per totam linguam disperse assignantur, de quibus ipsos videlicet Auctores, ubi invenientes, papillas seu papillaria capitula, vel fungulos istos nervos in lingua, itenique palato, quoprius ac genuum Judicij organum esse. In Gutture & nostro judicio filamenta nervea linguar, seu funguli isti nervi, vel papillaria capitula tanguntur & pulsantur à corpculis plus minus rigidis salivæ innatantibus & fibrarū interstitia divellentib\*, unde papillasive cupulas istas nervosæ *capitula* digitulos appellare poteris, qui alimentorum saporès mollior palpando immittis sentiant ac percipiant, ut ita tenet Guffus excutitur, quando alijmta ab aëris vi pressioria & elastica paitun ab intermedia ad palatum allifione, papillas nervosæ diversimode tangunt ac sinuati alijmunt.

*Gustus* ergo aboletur obstructis penitus papillarum nervolorum meatibus, vel obstructis vicidua materia quadam, aut ob omnimodiam abentiam & defectum spirituum, papillis illis carentibus plane flaccidis & concenctibus; ob hanc causam Gustus aboletur in apoplexia, paralyti aliisque morbis torporosis. Latet & causa aliquando in organo lentius a navitate male conformato vel aliquando vitio; & late etiam malum hoc exortum fuit ex primis vitis

ab acido ibidem latente, & spiritus higente & coagulante. *Gustus immixtus* oritur ex iisdem causis sed levioribus, itera quando papillae deficiente humido irrigante nimis aridae & siccae factae se contrahunt, aut ipsarum capitula muco obducta sunt, quo minus vapores penetrare possunt, ut & fieri solet in catarrhis, coryza, &c.

*Gustus depravatus*

*Gustus Depravatus* fit saepe culpa salivae, alieno sapore corruptae, vel alienorum humorum excrementorum affluentium sensorio peregrinum saporem perpetuo imprimitivum, poculosque papillarum invertentium, quo minus oblata sapida discernere recte queant, sicut in ictericis videmus, in quibus gustus ferè amarus est, quo ferè picantium gustus refecti potest.

*Prægnatus*

§. 11. Quid de morbis hisce sperandum vel timendum sit, nunc paucis quibusdam præcognoscamus. *Frenum*, quod alias naturale est, si brevis sit, linguam ori fortius alligans, non est ut leve malum penitus negligendum, sed in tempore arte solvendum, ne motum linguae impediatur, & sic tunc suctioni in infantibus, tum loquelæ & masticationi in adultioribus sit impedimento. A cicatrice quod contigit, difficilior est curatio præ illo, quod fortius ex utero affert, cum hoc non ita difficile in instrumento à perito Chirurgo aut obstetricæ ad justam mensuram sectari, sicque reïolvi valeat & extremitates convenienter callo obducitur, illud vero in adultioribus non sine gravioribus doloribus denuo discinditur, & molestius novâ cicatrice curatur.

*Tumores*

*Tumores* Linguae valde sunt molesti, & pro diversitate causæ aliquando difficiles curati, quorum tamen curatio minime differenda, ne respirationi sint impedimento, præsertim quando simul sunt anginosi, qui citra signa disparentes periculosi sunt. Qui Tumores non sunt ex materia cujusdam vitiosæ collectione, quæ interdum in abscessum mutatur, sed ex substantiæ augmento, & in ipsis jam infantibus existunt, nullius ferè sunt curationis, & sermoni magno impedimento, tarda enim fit loquela, & hæsitant ob molem linguæ à spiritibus difficulter mobilem. In quibus tumoribus acidum corrosivum commixtum est, si facile abeunt in cancrum.

*Ranula*

*Ranula* curari potest, si in tempore Medica ei adhibeatur manus, quod in pueris cito fieri debet, ne periculum suffocationis incurant, cum fistula pneumonica ab ejusdem incremento facile possit cluendi, & tum inors præ fortibus maneret. Quæ cum febre & dolore conjuncta est in adultis, vitæ periculum asserere potest, cum haud raro in anginam degenerare solet. Nec periculo caret illa, quæ nigra, aut fusca & dura est, ob acidum furiosius ibidem domans, & hinc timendum carcinoma, cuius ferè remedio obmurmurans: Noli me tangere.

*Nigredinis Asperitas & Fissura*

*Nigredo, Asperitas & Fissura* nihil sunt portendunt boni, & semper propemodum pedisseque sunt febrium urentium & malignarum, in quibus interna ustulatur, ut flamma exurgens etiam linguam prehendat ejusque fibras destruat. Lingua quæ in principio quidem inhorruit, in

colore verò permanet, progressu autem temporis exasperatur & livescit, & rumpitur, lethalis est: Si verò valde nigrescat, in quarta decima die judicationem fore significat; periculosissima autem est nigra & χαλκή, seu cum virore pallida. Quibus cum cibi fastidio, sudore frigido, ex alvo nimis laxâ & vomitu inordinato linguae sunt denigratae, in iis celerem mortem significant. In Peripneumonia si in principio Lingua nigrescat, citius morbus finitur, sin posteriùs, tardius, observante hæc nostro Hippocrate *Coac. prenot. & de morb. lib. 2. §. 16.* Lingua asperæ & rellicatae phrenetici sunt, teste eodem in *Coac.*

*Pustula* nullum quidem gravius denunciat periculum, nisi quod dolore suo admodum summo moleste, imprimis quando in extremitate Linguae existunt, ut dentibus læpius allidantur, facilem tamen admittunt curam, & quandoque per se evanescent repetita quadam imputatione. *Verruca* verò ut majorem creant molestim, ita studiosiorem sollicitant curationem, quæ tamen feliciter obtinetur, si dextræ adhibebitur, alias ne reliquæ valetudini, nec sermoni valde sunt incommodæ, modo non sint copiosæ, aut nimis magnæ, tum enim utrique nocent, & singulari sunt impedimento.

*Substantiæ ablatio* per instrumenta & violenta manu facta tam facile reparabilis non censetur ac illa, quæ à succis corrosivis in puerulis variolis laborantibus contigit, de qua cum tempore sepe dimidui anni reparata historiarum fidem tribuunt.

*Aphonia* omnes sunt periculosa, quæ verò *Aphonia*.

tum singulari & exolutione sunt, pessimæ sunt teste Hippocrate, & quæ ex dolore oriuntur, doloris iam mortem inducunt. In febre convulsorio modo contingentes, quæ ad mentis demotionem cum silentio deveniunt, periculosæ sunt. Spiritus velut in his qui strangulantur, præ manibus expositus, malus est. Rigentibus lethales sunt Aphoniae, quæ tamen per se & solitarie obvenientes successivé curabiles sunt. Frequentes autem sub soporata Aphoniae consistentes, tabem præsignant. Ex ebrietate si quis voce privetur, & statim ipsum etiam febris corripit, sanus fit, si verò non corripuerit, die tertia moritur, ex effato Hippocratis lib. 2. de morb. §. 22.

*Blephas & Balbuties* nullum vitæ periculum inferunt, aut raro curantur. Balbi & celeri lingua præditi melancholici sunt, alvique tin, profluvio longo maxime corripuntur, teste eodem Hippocrate. Natiua vitia Linguae, quæ in magnitudine & conformatione consistunt, vulnera item & rupturæ nervorum, immedicabilia sunt. Ab Apoplexia vel Caro relicta raro & difficulter curantur, ex confirmata Paralyti omnes obmutescunt; dum tota Lingua resolvitur, gravis impendit metus Apoplexie.

Affectus qui *Gustum* concernunt, si hæc catarrhis sint, sine periculo sunt, iis enim curatis cessant, si verò sint ab Apoplexia aliisque gravioribus malis, tunc periculum vitæ portendunt, ut & illa quæ inveterata sunt, difficilia sunt curati.

§. 12. *Diatra* respicitur in *Frenulo, Tumore & Diata*.

*Ranula*

*Regula* eligatur siccior, temperatus, nullis inquinamentis turbatus, vitetur humidior, pluviosus frigidus. In *Nigritia* & *Asperitate* cum *Fissuris* & *Pustulis* paululum humidior est eligendus, omni tamen carens acrimonia, & si naturā ita non exilat, arte procuratur, ab acido autem acriori est depurandus. In *Aphonia*, *Blasphate* & *Gustus vitius* nimia ejus humiditas exsiccaanda suffumigis convenientibus, quibus etiam subtilisatur, ut spiritibus animalibus fiat accommodatior, atqueque purior succus corporis ingreditur, fibris nervosis & membranosis minus molestus.

*Cibus* in affectibus istis parandus est levis, qui facile deglutiri potest, neque multa afferat recreamenta, ut sunt juncula hordeacea, avenacea, pullorum & juniorum animalium, additis foliis endiv. lactuc. rad. Cicior. taraxac. &c. Alii minus convenientibus, uti & qui aciores sunt, qui maxime vitandi sunt in prioribus Linguæ affectibus, in *Aphonia* verò & *Gustus* difficultatibus concepi possunt, maxime ii, qui maciem, eremmarium, salivam, fœculum in se recipiunt. *Potus* sit cerevita tenuis, pitana, decoctum C. C. impramis potus Coffee & Thee Vinum spirituosum in *Aphonia* & *Gustu debili* aliquando permittitur, sed modicè & medicè adhibetur.

*Quies* inagis studeant ægri, quam corporis exercitiis, in *Aphonia* corpus movere conuenerunt, sicut in *Blasphate* & *Balbutio* ægri sealiqventes exercebunt, ut Linguam commoveant, & ad vocis expressionem disponant, cum *Demosthene* aliquando ad litus aquarum mediocrem declamationem peragendo, ut continuato hoc exercitio linguam sibi comparent liberiores.

*Somnus* concedatur prohibitus, quia per hunc liberior fit circulatio sanguinis & reliquorum succorum, succedat tamen *Vigilia*, præterquam in *Aphonia* & *Gustu laeo*, in quibus affectibus somnus est longius protrahendus.

*Alii* adstrictio nullatenus est permittenda, sed curandum, ut promptè ista suo respondeat officio, ne curationi ulla iniiciatur mora, vitetur tamen & hic nimium, quod semper & ubiuis naturali dispositioni existit iniuriam.

*Animus afflicti* in ordinem redigendi sunt, neque iracundia laxanda habena, maxime in Tumoribus & *Nigredine*, cum alias in finis aliquando ora tuncantur & nigrescant sanguine venæ. Odium omne deponendum est cum tristitia & metu, gaudium verò mediocrius semper in sinu gerant, sanitatem pristinam ferio desiderantes: hæc enim omnia coagulant sanguinem, & reliquos succos, ad circulationem inidoneos.

§. 13. *Curatio Pharmaceutica-Chirurgica* enaratorum modo morborum ita peragitur, ut uno omnium ore Frenum nimis auctum sectione liberetur & laxius reddatur, cujus operationis modum, additis cautelis in ea observandis inferius, ubi nostram sententiam liberius proferendi assignabitur locus, pluribus dabimus enodatum.

In Tumore verò Linguæ curando *Galenicorum* in Tumore Linguæ mos est, ut substantiæ incrementum minuat, præter victum tenuem & frequentem Linguæ motum, exsiccantibus & consumentibus, ut frictione cum sale communi vel Ammoniac, cucurbitularum applicatione ad dorsum, scapulas, nates, cum scarificatione, medicamentorum densantium & constringentium adhibitione, decocto cortic. granator. gallar. rosar. balauft. alum. oxymelle simplici, & similibus; à naturæ tamen primordiis, existentem nullis medicamentis corrigibilem existimant. Ab influxu humorum ortum habentem tractant ut intemperiem cum materia, repellendo, derivando & exhauriendo humores superfluos. Prius præstant succis lactucæ, portulac. plantag. lentisc. palustr. rob. rib. nyrchin. diamor. linguæ illius; secundum crithinis per nares attractis, & hirudinibus isdem applicatis, cucurbitulis cum scarificatione occipiti adhibitis, sectione venarum post aures; ultimum vel obscure per medicamenta digerentia, decoctum scenigræci, glycyrrhiz. sem. fenic. carcar. hyssopi, baec. lauri cum pastulis, hordei cum sinapi & pauco salis ammon. myrrha cum croco & nitro permixta, vel aperit per sectionem venarum sub lingua ad aliquem sanguinis effluxum. Abcessum apertum, & pus vel calcis eximunt & sinum nullā cum uelle rosarum purata repurgant.

*Regula* curationem aggrediuntur derivatione & evacuatione, ut in præcedente Tumore jam dictum, subunctis postmodum topicis digerentibus, incidentibus & interdum suppurantibus, decocto alth. malv. agrimon. marrub. stor. melilot. farin. fabar. sem. lini, &c. Materiam suppuratam, vel si suppurari nequeat, & lacti coagulato similis existat, crudam præmissa sectione vel in ore, si fieri potest, vel sub mento instituta eximunt & locum vulneratum decocto balusticorum cum melle rosato aliquoties abluunt.

*Nigredinem, Ariditatem, Asperitatem & Foveas in Nigredine*, medicamentis refrigerantibus, lenientibus, dulcibus & emplastis, omni vi detergendi dunt, & carentibus, ut sunt mucilagines psyllior. cydonior. succus portulac. lactuc. lent. palustr. julpium violar. tiaz. ord. diatagacanth. frigid. lac. bubul. butyrum recens elotum, oleum amygd. dulc. rec. expressum, anisum, ova torbilia, lyrtupus nymphææ, glycyrrhizæ.

*Pustulas* eodem penetrant modo, inungendo illis mucilaginosa, quibus adhibitis si non dissolvantur & parent, easdem aperiant, & aqua plantag. cum melle rosato & pauco vitrioli abstergunt. *Foveas* filo sericeo arte ligant & tandem abiciunt. *Substantia* portionem ablatam instrumento factam arte reparare nesciunt, in variolis verò à succis acerbis aliquando contingentem, sponte natura restitutam fuisse observant, adhibitis remediis putredini resistentibus, ist decocto flor. malvæ, balauft. cum alumine & melle.

*Aphonia* originalem simpliciter incurabilem pronunciant, ab Apoplexia verò aut paralyti inductam isdem curatione remediis, quæ apoplexiæ & Paralyti convenient, proinde venam secant, vel in brachio, vel sub lingua, pituitam ex capite



capite evacuant agarico & cithamo, additis convenientibus humorem frigidum & viscidum digerentibus, incidentibus, attenuantibus & calefacientibus. Intemperiem frigidam & humidam corrigunt masticatoriis & gargarisinis ex salvia, ma'orana, roremarino, stachade, cinamomo, croco, cubeb. Zingib. Nuc. Moschar. pip. mastich. euphorb. castor. Oxymel cum theriaca propinquant intus sinuendum, ut & varia decocta ex specificis quibusdam cum vino, vel succum flor. paralyt. cum specieb. dianth. diagalang. diatr. piper. Linguam theriaca. mithridatio, melle anthosato, Aurea Alexandrina post frictionem inungunt, vel aceto lavendulato cum pyrethro aliquoties abluunt. Pireneticos & melancholicos ad meliorem mentem reduciunt, & reliqua vitia organica corrigere student, ut quantum fieri potest, iis in naturali statu reductis, vox & sermo recuperetur.

*In Blepharite, Balbutie & Baturismo.*

*Blepharitem, Balbutiem & Baturismum* difficultis esse curationis fatetur, Lingua enim vitiatum naturalem arte prolongare nesciunt, imbecillitatem vero ab intempere humida ortam corrigere conantur siccantibus, à frigidâ, calefacientibus in Aphonia à Paralyti orta modò relatis, ab ira cessari volunt, calorem quiete & refrigerantibus mitigant, atque strenuam sectionem relaxant.

*Gustus, laesio & abolitio.*

*Gustum laesum aut abolitum* corrigere & restituere tentant aperientibus nervos obstructos, intemperiem humidam vel siccam corrigentibus & evacuantibus humores peccantes, in genere laudant mel rosatum cum foliis salviae pulverificatis, & farina sem. sinapi linguae saepius illunt.

*Paracelsi modum curandi Linguam Tumorem.*

§. 14. *Paracelsus in Tumore* Linguam aliquoties radii præcipit, & tunc oleo vitrioli vel liquore centaureæ cum sale gemmæ illini.

*Ranula.*

In *Ranula* venulis apertis elicit sanguinem, & postmodum illini aquis brassicæ, ag. imoniae, alchimillæ, diapensæ, vel oleo hypericonis, aut oleo de floribus centaureæ. Si post curam hanc Ranula redierit, iterum incipere mandat.

*Nigrities, Aphonia & Effusum.*

In *Nigritie, Aphonia & Effusa* ad materiam mortem in Lingua facientem eliciendam, Linguam assiduò radii jubet, sicut in Primella, & gargarisari etiam ad sanguinis effluxum, tum eandem abluit compositione prunellæ sequente.

℞. Aq. prunell. ℥j.

Laudani puri ʒss.

M.

*Pustulas, verrucas & Substantia ablutionem.*

*Pustulas* illini liquore salis armoniaci & carabis, *Verrucas* autem filo artemicalis abscindit, vel oleo ardenti inungit. Circa *Substantia ablata* restitutionem, ut arte haud impetrabilem, nullatenus occupatur.

*Aphonia, Blepharite & Balbutium.*

In *Aphonia* ad recuperandam loquelam præaliis commendat sal & oleum margaritarum orientalium intus adhibita, Lingua vero infillat guttulas olei castorei destillati, lavendulæ, bacchar. lauri, aut Spir. lil. convallium, quæ remedia simul in *Blepharite & Balbutio* usum habere possunt ad sal resolutum corrigendum.

*Gustum depravatū & abolitū.*

In *Gustus depravatione & Abolitione* sal liquoris corrigendum, ejusque coagulatio resolvenda remediis penetrantibus, ut spiritu vitrioli & spiritu vini mixtis & linguae i. liti.

*Helmontius de morbis*

§. 15. *Helmontius* in curationibus horum morborum pauca admodum monstrat remedia,

omnemque operam latice corrigendo & mucositate abstergendo impendendam esse sibi aliisque persuadet, quæ virtute in *Tumoribus, Ranula, Nigrities, Aphonia, Pustulis & Verrucis* præ aliis saltem iuncti perquam polleere existimat.

In *Aphonia & Gustus lesione* ab impuritate eliminandas apprimè laudat vomitoria, & potissimum vitrioliata, ut vitriolum album à sulphure suo liberatum, vel sal vitrioli fixum, posthæ ad Archeum roborandum, & ad officium debitum excitandum sal perlatum singulare credit allaturum juvenem esse.

§. 16. *Willisio* curatio *Tumoris* Linguae à venæ sectione, purgatione, & cucurbituram affixione aspicanda videtur, quò humor superfluous evacuetur & avertatur, hinc linguam scilicet pro abradit, & decocto ligni Guajaci cum hyssopo & veronica saepius abluit, nec salivationem aliquando absque fructu tentari posse persuasus.

*Ranulam* tollere tentat evacuantibus, sudoriferis & abluentibus discutientibus ex decocto martubii, hyssopi, salviae, flor. rosar. melilot. rad. pyrethr. hermodactyl. scyllæ, caricarum, &c. quibus si non cedat, suppurationem instituit, & aperto tumore materiam purulentam aut spissam eximit, ulcus mundantibus & subadstringentibus ex decocto plantag. rosar. cum melle & pauco olei vitrioli aut sulphuris studiosè abluit atque ad sanitatem & consolidationem perducit.

In *Nigritie, Aphonia & Effusa* ætium interiore diligentè vult observari, ut eo sedato vitia externa facilius curentur, Lingua verò mucilagines refrigerantes ex sem. cydon. ptyll. cum aq. prunell. rosar. semperviv. & addito nitro præparat. illini, vel gargarisinata adhibet ex decocto glycyrrhiz. alc. lactis, portulac. papav. Rhaz. cum diamoro & nitro præparato.

*Pustulas & Verrucas* consumere tentat masticatoriis salivam elicientibus ex foliis nicotianæ, pyrethri, sale armoniaci, quibus si non dispareant, aperire suadet *Pustulas* & decocto balaustrorum cum alumine abluere *Verrucas* verò constitutione optimè tolli fatatur.

*Substantia ablutionem* ulteriorem præveniens dam vult remediis sanguinem & reliquos humores ab accedente liberantibus, decoctis videlicet fumariæ, scabios. endiv. prunell. ligni sanctal. citr. ebor. & abluentibus Lingua cum decocto hordei cum inelle rosarum, addito pauco alumine, ab infortunio autem & instrumentis jun factam cum aliis omnino censet irreparabilem.

*Aphonia* à defectu spirituum ortam iisdem remediis curat, quæ in Paralyti commendat, qualia sunt decoctum salviae, beton. rad. Imperator. Conserv. lil. Convall. Spec. diamb. dianth. vinum viperinum, &c. intus usurpanda: externè linguam fricat melle anthosato cum pulvere sem. cruceæ, succo nasturt. & oleo succini. *Balbutiem & Blepharitem* vitio nervorum ortam & originalem arte non putat corrigibilem.

In *Gustus lesione* humores superfluos evacuat purgantibus, vel salivatione, & interdum siccant diureti & diaphoretici pro lymphæ peccantis dispositione, deinde linguam frequentius abluat gargarisatis ex decocto rad. Imperator. angelic. galang. herb. hyssop. saliv. beton. rosmarin. flor. pæon. stachad. cary. phyll. cubeb. castor. &c. Salia etiam volatilia cum speciebus diagalang. diambri.

*curandi Aphonia.*

*Lingua Tumor.*

*Ranulam.*

*Nigrities, Aphonia & Effusa.*

*Pustulas & Verrucas.*

*Substantia ablutionem.*

*Aphonia, Balbutium & Blepharitem.*

diambre aut dianth. interius fumenda non omittenda esse monet, ut ita nervi obstructi citius aperiantur, spiritibusque animalibus debitus pateat transitus.

*Sylvestri* 17. *Sylvestris* in *Tumore* Lingue ab ejusdem substantiæ augmento proveniente difficilem curationem agnoscit, si verò idem ab humoris glandularis nimia copia oriatur, eundem minuit hydragogis, diureticis & diaphoreticis.

*Ranula*. In *Ranula* pituitam spissorem attenuat spirituosus & volatilibus, feri copiam itidem evacuat, materiam sub lingua collectam emollit, & dissecta membrana eximit.

*Nigredine*. In *Nigredine*, *Ariditate*, *Aperitate* & *Fissuris*, habito morbi primarii respectu, linguam abluunt humectantibus & lenientibus, ut aqua pura, succo vel aqua destillata vel etiam decocto acetosæ, semperviv. majoris, lactuca &c. quibus & gargasium instituit, & mucilag. sem. cydon. & psylli eidem Lingue illinit.

*Pustulis*. In *Pustulis* acidam acie corrigendum luadet salibus volatilibus oleosis, & si succus pancreaticus copiosior in intestinis deprehendatur, eundem acrimoniâ prius correctâ hydragogis vult minuendum. *Vermicis*, ut reliqui, filo constringit & postmodum planè abscindit. De *Substantia* portione amilla restituendâ idem fovet judicium tum cæteris.

*Alphonia*. *Alphonia* si sit ab humore pituitoso nervos obstruente eundem salibus volatilibus vult attenuandum, Spiritu potissimum Salis armoniaci; *Bulbiticis* & *Blasphaticis* connotam correctionem non admittit, sed à defectu dentium advenientem artificialibus alixis aliquando temerari posse saterur.

*Gustum abolitum* & imminutum pro diversitate causæ variam ait reposcere curam. Ab ariditate Lingue productæ curam in ariditate jam manifestam accommodat, pituitam capitis & salivam ab halitibus in febribus ardentibus inspissatam incidit acidis & humectat, si vero universa saliva existat viscosior, eandem emendat iisdem acidis, sed cum spiritu volatili contemperatis, in specie spiritus salis dulci cum aquis aromaticis sceniculi & similibus soluto. & subinde parvâ quantitate allungo. In *Gustu depravato* corrigendo idem causam advertendam esse monet, atque si saliva peccet acidior, non tantum ab acidis præcipit abstinendum, sed aciditatem quoque vitiosam temperandam spiritibus volatilibus, oleo, & sale lixivo, imprimis volatili & oleoso. Ex spirituosus & volatilibus sequentem commendat mixturam.

*Ag. majoran.* vel *sanic.* ʒij.  
*vi.* Matthiol. vel *Anapoplect.* vel *Antiparalyt.* ʒij.  
*Syr. Siachad.* ʒi.  
*M.*

Monentem, ut spirituosâ huiusmodi per vices & minori quantitate assutantur. Saliva existente falsa eadem in specie conducenda vult adhibenda per experientiam cognita, ut sunt pilule decoctæ agrostidis, vel hytracæ, gummi tragacanthæ, malthæ, thus, masticulæ & similia. Serum salinum in sanguine redundans per hydragoga minuendum. Ade autem ob volatilitatem potentius

ad os elevata, ab omnibus spirituosus, ipso etiam vino & spiritu vini abstinendum præcipit, & bilis excellentem amaritudinem medicamentis acidis temperat, maxime verò spiritu aluminis: si copia peccet, educit eam vel emeticis antimonialibus, vel deorsum cholagogis, ut R habarbaro, tamarindis & sim. Succu pancreatici aciditatem volatilem curat salibus volatilibus oleosis & aromatibus; Salsedinem iisdem, quibus salivam falsam corrigit; abundantem succum prius correctum hydragogis evacuat. Humores mixtos & halitus ex iis exsurgentes, prout magis de uno vel altero participant, diversimode curat, acidosis videl. salibus volatilibus, potissimum Spiritu salis armoniaci; dulcedinem nimiam corrigit acidis & subinde amaris & acido-salis, ut Coqto, Elix. proprietatis, &c. Pituitam in capite entinnis educit, in pulmonibus alterat & expectoratione promovet. Sanguine ad os fluente vasâ aperta consolidat, & os cum vino, aceto, aquâ, aut similibus eluit. Pus & sanies ad os si deducita sint, affectum, à quo procedunt, curat & os emundat. Halitus è ventriculo & intestino tenui affurgentes & gustum vitiantes discutit, acidosis quidem sale volatili oleoso, nidorosos vero spiritu nitri, insimul novam ipsorum productionem impedit. Halitus è pectore, faucibus, narium vel ulceribus & carie manantes corrigi quodammodo putat per aromatica, illorum tum odorem, tum saporem integrum obliterantia, tum noxam emendantia. *Gustum autem* alimentis subpinguibus obtundit posse non improbabile illi videtur, tum quod salivam reddant aliquanto spissioram, tum lingue sensum exquisitum obtrundant.

9. 18. *Cartesiani* pro varietate causarum *Tumoris* Lingue curationem variè instituunt, si enim à succi nutritientis abundantia ortum habeat à primâ origine, difficilem fore curationem pronunciant, & molis ejusdem immutationem sectione perficiendam cautè vult tractandam, & non nisi à perito artificetentandam; si verò alio tempore productus sit, victu tenui, ratione & scarificatione Lingue, repetitis sudationibus, succi nutritientis abundantiam, & per consequens ipsum tumorem minui posse penè sunt persuasi. Lingue simul impostis aut illis subadstringentibus austeriusculis, fibras complementibus & succum in porulis contentum ita exprimentibus, ut sunt portio alumnis, lapis prunella Lingue imposita, vel Linimentum ex syrupo de agresta. Rob. diamor. flor. balauit. & lap. prunellæ, vel sale geminæ, vel phlegmate alum. paratum eidem illitum. *Materia venenata* si sit in causa, ut in febribus malignis, mortu vel ictu itacundo contingere potest, præmissis diaphoreticis bezoardicis Linguam Spiritu theriacali camphorato frequentius abluunt, vel succo rutæ, vel etiam, succo allii in vino macerati, & in mortario lapideo contusi expresso; pororum obstructionem & succi glandularis viscositatem corrigunt aperientibus, incidentibus & attenuantibus volatilibus, decocto. fol. majoran. & rosæ marini tepide adhibito, vel foliarum rosæ marini cum portione quadam rad. pyrethri masticandâ præbent, ut partes subtiles volatiles horum medicaminum sese lingue immiscendo, eandem moveant & fluxiliorem reddant. poros linguæ aperiant, & fibrulas stimulent ad efficiendam materiam noxiam; quæ postmodum ipsa cum saliva exipuit.

*Gustus*  
*ancila*

*Cartesiani*  
*norma*  
*curandi*  
*Lingue*  
*Tumorem*

expulsiuit, & tumor evacuata materia distendens imminuitur.

*Ranulam.*

*Ranulam* abigere student dissolvendo congeriem illam à variis particulis liquoris glandularis collectam, remediis itidem volatilibus, quorum potos singularis quidam æther benignus & activus inhabitat, ut sunt collutiones ex decocto ligni Junip. baccar. lauri, fungi sambucini, thuris. Linimentum ex melle anthosato, additis nucibus juglandibus combustis & pulverisatis, sale gemmæ, paucis myrrhæ & camphoræ, vel frictionem instituunt leviorem cum pulvere ex rad. ireos, hermodactylor. pyrethri, fol. salv. saturej, orig. majoran. & sale communi invicem multum. Si materia itius contenta fluctuet, & membranæ durities ejusdem obiles effluxu, eandem lancetta dissecant, ut materiae illius effluxus ita facilitetur. vel lapilli concreti eximantur, quo peracto, si vultus hac ratione instructum iterum consolidetur, collutiones patiente ad extrahentibus, hanulhis suis fibras sejunctas denuo unientibus & compingentibus, ut decocto flor. balaustror. ligustri, folior. quercus, pyrorum, argentinae, pyrol. cum paucis aluminis, addito saccharo canthio albo, vel mel rosarum cum phlegmate aluminis & sanguine draconis adhibent instar linimenti.

*Nigredinem.*

In *Nigredine* Linguae internæ prius sanguineæ massæ furiosiore agitatione sedant benignioribus fixantibus subacidis, quorum anguli interstitia pororum occupantes impetum ætheris sustineant & viam ejus mitigent, ut sunt Conserva citri, acetosellæ, Syr. Rib. Id. arcan. duplicat. oculi es. crud. corall. rub. subtilissimè pulverisati. hinc Linguam obducunt humore ex semperviv. maj. canceror. mucilag. sem. psyll. & lapide prunellæ, ut sulci expleantur, ulterior ætheris violentia inhibeatur, & particula acuta lacerantes ex sanguine egredientes inviscentur & hebetentur, vel linimento seguente:

*℞. Pulp. Tamarind. ʒij.*  
*Rob. di. mar. ʒij.*  
*Succ. canceror.*  
*portulac. aa. ʒb.*  
*Tinctur. rosar. ʒij.*  
*Essent. citr. ʒj.*  
*Nutr. perlæ ʒb.*  
*M. & cum s. q. Syr. fragor.*  
*℞. Linimentum.*

*Aphritem.*

*Aphritem* Linguae tollunt medicamentis aliquantum pinguibus, quibus anguli hebetentur & rigiditas cornuum flectatur, ut sunt lac caprinum, butyrum recens, emulsiones sem. 4. frigid. maj. aq. senec. & sol. borag. extractæ, mucilag. rad. altheæ cum sacculis bryoniae, aqua lardi, & similia particulis oblongis, teretibus & aliquantum ramolis prædita. *Fissuras* corrigunt medicamentis particulis habentibus teretes, lubricas, vim angulorum elidentes, quæ fibris linguae irreptentes & silluras replentes efficiunt, ut vis illa angulorum scindentium valde minuat, & benigniores particulae succi nutritii admittantur, fibras denuo glutinantes, quod præstant succo raparum addito saccharo canthio, vel linimento ex aquilegia aut cremore hordei.

*Pustulas.*

*Pustulas* in extremitate Linguae aliquando existentes abigere docent comprimendo eandem aliquoties dentibus ut saliva cum particulis salinis effluat, vel admovento salem armoniacum, à quo sal illud rigidum sequitur & pariter cum

saliva elicitur, si verò effectus non respondeat voto, & Pustula diutius sit molesta, ejus quandam portionem forfice abscindunt, ut liquor vitiosus intus contentus ita facilius exprimat. *Verrucas* filo ligant, ut nutrimento destitutæ flaccescent.

*Substantia ablationem* instrumento vel morsu factam ne quidem tentant restituere. ne operam perdant, cum res hæc sit impossibilis, ab erotione autem productam in Variolis mitigatione partium acutarum, & demptione portionis corruptæ reparari aliquando norunt sponte naturæ, accedente denuo laudabiliore chylo nutrente per tubulos, & à fermento in Linguae portione relicta inhaerente benigno in similan substantiam disposito.

*Aphoniam* tollere & vocem amissam restituere tentant admodum volatilibus, motu velocissimo omnes corporis tubulos pervadentibus, & obstacula quævis remouentibus, ut ad spiritus animales penetrant, eosdem excitent & eorum in nervos influxum promoveant, quibus viribus sequens consistat et creditur mixtura.

*℞. Aq. majoran. ʒij.*  
*rosmarin. ʒij.*  
*Spir. cerasor. nigr. ʒj.*  
*Lavendul. ʒij.*  
*Spir. ʒiij \* ac. cum caryophyll. impregnat. ʒj.*  
*Syr. flor. Parahys. Fenic. aa. ʒj.*  
*M. D. 2. vicibus.*

Linguam iisdem spirituosius aliquoties abluunt, Gargarismate videlicet ex decocto rosmarin, salv. thymi, rad. angelic. levistic. pyrethri, bacc. Junip. sem. erucæ, sinapi, macis, caryophyllor. Oleum destill. lavendulæ linguam instillant, eamque essentia calore & pyrethri frequentius solent fricare. Ab epiglottidis oppressione ortam tum diaphoreticis curant, tum expectorantibus, imprunis spiritu Guaiaci Annoniaci cum aqua Asthmaica, vel Gargarismatis cum sale Ammoniaco, aliisque morbo primario convenientibus. *Balbutium & Blasphemiam* ab agitatione spirituum nimia dependente corrigere student non tantum remediis motum nimium sedantibus, eundemque æqualem iis conciliantibus, qualia sunt Spir. cerasor. nigror. rosar. Tinctura flor. Tunic. Elixir. vitæ, aqua lavendul. flor. Paralyt. saliva volat. &c. sed debita quoque præmeditatione verborum effereendorum, quo spiritus ad mentis imperium ordine colligantur, ne tanquam servi fugitivi è studio suo transcurrant & linguam prius ad motum cieant, quam rem plenè conceptam debite susceperint eidem ad publicationem effereendam. Si sufficiens spirituum copula desit, & Lingua plenariè nequeat commoveri, eosdem adaugent plenariè spirituosius & volatilibus, spiritu nimirum lavendulæ, essent. ambræ, aliisque ex superioribus jam cognitis. Vicia conformationis originalia vix ullam correctionem admittere censentur.

In *Gustum immunito* & *Abolito* limum abstergunt poros obstruentem remediis incidentibus & retolentibus, succo nempe raphani, essentia seu tinctura baccar. Junip. Zedoar. at sitenacior existat, alia adhibent, quorum particula gladiolorum instat acuta omne viscidum abscindunt, abradunt, & papillæ ab eo liberant, quibus remedia acidi-

*Substantia ablationem.*

*Aphoniam*

*Balbutium & Blasphemiam.*

*Gustum immunito & Abolito.*

Gustum  
deprava-  
tum.

acidiuscula prædita esse adserunt: hinc linguam fermento veteri fricant & aceto lavendulato sedulò abluunt, interius  $\Theta$  Si adhærent  $\Theta$  latum cum conserva acetosellæ & rad. cichor. condit. vel Rob. Ribium cum paucis Spiritus  $\Theta$  li Martis, quibus non minus *Gustum Depravatum* corrigi posse promittunt, ita ut pro diversitate causæ etiam varientur remedia; Gustum nimis dulcem aut amariusculem subacidis, acidum verò spirituosius & alcalicis temperando, præmisso aliquando vomitu, si ventriculus succorum crudorum & vitiosorum copia sit oneratus.

Nostrafen-  
tentia de  
Curatione  
Linguae  
Freni.

§. 19. Fuerunt hæc aliorum de Curatione morborum istorum sententiæ, in sequentibus nunc *Nostram* pluribus exponemus & cum prioribus conferemus. Quod si ergò *Frenum* impediatur præcipue in recens natis ut sugere non possint, & in adultioribus ut loquela vel impediatur aut depravetur, vel deglutitio prohibeatur, tunc affectus hic Chirurgiam exposcit. In recens natis si obstetrices observant nimis exporrectum esse vinculum istud, tunc abscindunt plerumque digitorum ope. (*Sie streichen mit dem Finger unter der Zungen ber.*) *Hoffmannus* iurabit, se ex Aquapendente audivisse, obstetrices in quibusdam Italæ locis gerere ungues pollicis dextri longum, sed in apicem cultri conformatum, quo subito ac natus est infans, abrumpunt vinculum. Ungue obstetrices aliqua ex parte divellere frenum notat *Bauhinus*, quod tamen rectè improbat *Barbette*, *Scultetus*, *Johann*, *van Horne*, *Bartholin*, *Camerar.* alique plurimi. Ridicula quoque est ex parte ratio improbationis apud *Louis Boergoisium* *Hebammen* Buch: Sie soll mit nichten sich unterstehen das Band zu zerreißen, denn die Nägel an den Fingern seind giftig / und möchte dem Kinde ein freßend Geschwür / als Krebs oder anders im Munde verursachen. Nescio quale & Chirurgi unguibus venenum adscribunt, quod credant unguis posse inficere aut malum inducere, verum magna est differentia inter venenatum esse & noxium. Illud planè denegatur unguibus, posterius potest interdum concedi. Imò contingere potest, ut aliunde inficiantur, aut sordibus quibusdam coquinaentur, & tunc per accidens, non ex se sunt noxii, sed infontes ut reliquæ partes. Ad hanc ergo operationem nullatenus admittuntur unguis, quia faciliè vicinas partes lacerare ac planè disrumpere possunt, hinc sæpe dolor ac inflammatio, aliaque gravissima mala oboriuntur. In quibus proinde hoc *Frenulum* malè est conformatum, (alias nunquam) hanc sectionem aut divulsionem alii instituunt non unguibus, quod improbamus, sed aliis instrumentis. Nummi acie hoc sæpe obstetrices tentant, quod rectè improbat *Sennerius* dicens in *praxi de Infant. curat.* p. 2. c. 15. Solent interdum obstetrices statim edito infante vel unguibus rumpere, vel nummi acie dissecare hoc vinculum, sed sæpe hoc sine necessitate agunt & in operando errant, commodius ergò perito Chirurgo rescommitteretur. Alii hoc volunt frenulum discindere phlebotomo vulgari barbitoniforum, quod itidem rectè improbat *Joh. Scultetus* l. a. p. m. 67. quia ineptum est, nec certò possumus illo secare, alii propterea hoc administrant scalpello.

Curationem per sectionem suadet & *Barbette*

te *Chirurg. part.* 1. cap. 13. si scilicet modo transverso vulnere vinculum hoc ope forficis incidatur, hinc melle rosato sæpius de die pars laxa innungatur. Totam operationem hinc verbis describit *Fabr. Hildanus Cent.* 3. *Observat.* 28. ita inquit: Vacat omni periculo operatio hæc, dummodo rectè administrata fuerit, præcipue autem perspicuum est, ne nimis profunde incidatur. Ego elevata Linguâ apice forficum ligamentum ut plurimum in duobus, nonnunquam in tribus locis incido: sic enim difficilius coalescit iterum, quam uno tantummodo in loco incisio facta esset; incido autem tantum quicquid nervum est, ita ut carnem vix attingam, quod si prima vice non satis effecissim aut iterum annexum fuerit, poterit postea eadem operatio denovo administrari, inciso ligamento jubeo ut nutrix sæpius digito melle rosato aut communi madefacto linguam blandè eleve, sic enim agglutinatio aque consolidatio impeditur. Alii post sectionem, si labra vulneris non statim coeant, adhibent linimentum & farina hordei, melle desumat, vitell. ov. thure, mastich. alum, ut. cum melle rosato factum.

In nostra aulâ etiam in consuetudinem abiit, recens natis Principibus vinculum hoc solvere, quod efficit Chirurgus forfice Parisiis allatâ, unâ cuspidè obtusa & capitulum habente, alterâ verò acutâ; quâ fibras ligamenti abscindit: quandoque sanguinem stillat, quandoque non, quam operationem hæcenus improbamus, & cum *Aquapendente* aliisque credimus, ex centum vix unum infantem nasci cum tali ligamento, quod Chirurgiam possinet, si enim ultra dentes & gingivas & labra linguam potest exserere, non teneri hoc malo signum est, ait *Horne* in *Microtechnie* p. m. 123. admodum proinde improbat, si promiscuè omnibus applicetur. Confer instar omnium *Camerar. Syllog. memor. cent.* 6. part. 24.

Cautè verò, si opense, in operatione est procedendum, sive id obstetrix, sive Chirurgus, aut alius peritus homo faciat, ne venæ aut arteriæ vicinæ, ductus salivales sub linguâ, partesque adstæ aut nervuli lædantur. Novimus exinde ptyalismum continuum inductum, disiectis extremitatibus ductuum salivalem, quod & observarunt *Riolanus* & *Horne*. Sic quoque ex nervorum illorum latione Linguæ convulsio supervenire solet, hinc moneo, ne temerè & absque necessitate ad hanc operationem quis se accingat.

*Tumor* si oboritur à sanguine & succo *Tumoris*, acriori ibidem congesto, ei imminenti occurrendum collutionibus oris ex gargarismis resolutentibus & inflammationem sedantibus, sæpe ergò os eluatur sequenti.

℞. Ag. Plantag.  
Card. bened.  
liqñ. Heracul. 2a. 3ij.  
Essent. viperin. ʒv. vcl. ʒij.  
theriacal. ʒi.  
M.

Tumori quoque inspergatur pollen ex card. bened. nicotian. & trochisc. è viperis, vel illinatur essentia vel axung. viperar. vel adhibeatur cataplasma



ma ex sacch. canthio, flor. Ais & theriacâ, cum oleo ligni Heraclini, vel imponantur ficus, semper enim de resolutione cogitandum est, quare illinatur lingua sæpe spiritu ligni Heraclini vel Guajaci; alias sæpe Tumor Linguz in supurationem transit, de quo vide *Ephem. Germ. Ann. 4. & 5. Obs. 109.* Si apostema ergo ruptum fuerit, per essentiam rosar. scabios. ac faniculæ saccharatam, & inspersos similiter oculos can. facile curabis omnia. Si verò est Tumor hic ab iunctione Gali, tum utendum antidotis Gii, talia sunt sudorifera, imprimis spiritus theriacalis, & scabios. spir. vin. camph. anrum quoque ore detineatur. Dum hæc scribo, virgo mihi offertur, quæ à cosmetico Gali à barbitonfore portico incidit in tremorem Linguz adeò frequentissimum, ut serpentem lingua vibrantem eam imitari dixisset, in quo casu ipsam tractavi ut epilepticam, & simul antidota Gii admiscui, & Linguam cuius generis illi curavi aqua Langii cum spiritu xci succinat. & sic brevi feliciter convaleuit & cosmeticum neglexit. Si verò ab alia causa venenata tum externa, tum interna, exhibeantur sudorifera theriacalia, volatilia. Si Tumor hic sit à nativitate præternaturalis, particule superfluz in extremitatibus ope manûs Chirurgicæ abscindendæ sunt, donec ad consuetam pervenit molem; quâ operatione curavit celeberrimus *VValerus* puellam Leidensem Linguz manus magnitudine amplam habentem.

*Ranula.*

*Ranula* verò quæ oritur à materia crassiore & viscidiorè difficilior est curatu, ob metum inflammationis vel cancri. Si ergò Tumor hic adhuc durus ac renitens est, topicis collutionis forma inprimis insurpatis attenuare, atque dissipare materiam studeat Medicus, ubi Fungi sambuci laudantur in hunc finem. Si his non obediat Tumor, sed mollior & sequax sit *Ranulæ* materia, (quod facillè actu dignoscitur,) excidatur duntaxat summa ipsius tunica, & effluet sponte, vel exprimatür saltem digito limpida ac viscida materia (similima albo ovi, recens ex effracta testa excidenti. Si verò materia fuerit nimis indurata, ut scalpello vel alio instrumeto tumore aperto non exeat, annitatur Chirurgus, ut consumat eandem ferro candente, quod & impediatur, ne identidem revertatur, si enim apertura cauterio actuali facta fuerit, minus à recidiva metuendum erit, quam operationem sic peragas: Laminam ferream, incurvam concameratam, & foramine in sui medio perviam compara, eamque diducto ægri ore tumori ita adapta, ut ejus, ei parti, quæ aperiendus, foramen respondeat: Hoc candente ferro pertunde, sic enim nullam oris partem, quæ sana sit, violabis. Instans verò appressio sub mento pollice tumorem altius proferes, quo sic certior sit ictus; apertione facta, contentam materiam effundes, os ægri colluatur hordei decocto cum flor. sambuc. melle & sacch. ros. addito spiritu vini camphorato, sic enim tutò & citò ulcus sanabitur.

*Ranula* venarum raninarum curatur facile sanguinis eductione, etiam ex loco affecto, dein usurpentur varii gargarisimi, collationes, atque illutiones ex aq. prunell. ei specificis, fol. querc. scabios. cum lap. prunell. item decocto ex herbis emollientibus & disuentibus parato.

*Ranula* ductum salivarium à salivâ crassiore producta curatur attenuantibus & præsertim phlegmatizantibus. At verò ubi ductus li

aperi sunt, conveniunt adstringentia linctus collutionisque forma usurpata, vel fricetur ulcusculum *Se xco* & melle ros.

Sæpe ex Tumore aperto *Fistula* eboritur, *Fistula* quale exemplum habemus in *Ephem. Germ. Decur. 2. Obs. 52.* in Equite Gallica lue infecto, immò ejusmodi fistulæ sæpe omnem respuunt consolidationem; eò ergò incumbendum, ut effluxio sistatur & mundificetur Lingua, dein applicentur sarcotica, ob ductus salivales, qui sæpe causæ sunt, ut fistulæ hæc sint insanabiles. Rarum est, quod legitur in *Ephem. Germ. A. 8. Obs. 100* quod lingua subito intumuerit & nigrore infecta fuerit à vermiculo vivo in venâ sub Lingua subsistente, & per V. S. erupit exorta; hic proderunt anthelmintica Linguz illita. Si verò Tumor sit à calculo sub Lingua latente, is removendus est ad motus variis cataplasmatibus emollientibus, & si hisce non cedit, excidendus est. De calculis feliciter sub Lingua excisis, meretur legi *Observ. 1. Eph. Germ. Ann. 3.* Ex Tophis & Tumore Linguz eboritur potest, quale exemplum quoque in prædictis *Ephem.* annotatum *Observ. scil. 43.*

Ad acres particulas ad Linguam delatas eam *Nigredini* que *Nigram*, *Asperam* & *Fissam* reddentes de *Asperis* mulcendas, conveniunt varia mucilaginosâ. im. *in & Fissuram.* inprimis mucilag. sem. psyll. cydon. cum aq. sem. perviv. factæ, vel  $\nabla$  temp. viv. cum succo  $\omega$  & xco destillato, quæ egregia est ad os sæpe coluendum. Conveniunt & blandè acrimoniam corrigentia, ut phlegma  $\phi$ licum aq. sem. perviv. mixtum, item Tinctura rosar. violar. lap. prunell. in aqua appropriata dissoluta & mixta. Candidum ovi cum lentore psyllii, cum sem. portulac. spod. & ocul. can. mirè convenit illitum, inprimis in scabritie Linguz. Ad *Rhagades*, *Scabritiem* & *Fissuras* lardium pinguis utiliter adhibentur, præsertim lardum salitum & fumo induratum si ore detineatur & combustioni & nigredini Linguz resistit. Singulare remedium *VVitichii* est lequens:

*℞. Ol. Olivar. Cochlj.*

*℞li quant. Nuc. avellan. magnit.*

*M. & inunge Linguam.*

Unguentum nostrum ad fissuras labiorum.

Ad Linguz scabritiem laudatur etiam lequens.

*℞. Sem. citrull.*

*portulac.*

*papav. alb. aa. 3j.*

*Rad. dulc.*

*Tragasanth. aa. 3j.*

*Cum mucilag. sem. cydon. aq. rosar. extract.*

*F. Globuli in ore tenendi.*

Nitrosâ hic maxime conveniunt, propter vim nitrosam rusticis egregium remedium. Fabricantibus labia erysipelatis scabritie incurrantur, hoc fit non raro in febrium diffusis, cum post sanguinis restitutionem, glandulæ quædam salivales adhuc materia acri ac obstruente laborant, labia inflammantur, pus effundunt, ac crustis labia obducunt, quæ lactis cremore & creta facillè medentur.

*Pustula*, quæ paucæ numero, & sæpius una *Pustula* solummodò Linguz extremitati innascitur, *rum.* optimè tolluntur eductione lymphæ acrioris, per leviorè quandam institutam salivationem, ut hinc

ut hinc vulgaris illa curatio superstitiosa non sine effectu perficiatur, dum illas ex mendacio falsò de persona, cujus linguæ innascuntur, à calumniatore quodam dictò inductas sibi imaginantes, abigere suadent effendendo similiter mendacium aliquot de calumniatore ignoto, & cum indignatione quadam ter expiando, ubi compressio fibrarum & salivæ ejectio juvant; proinde ad motu salis armoniaci suau *Cartesianorum* non inconueniens æstimanda pro eliciendâ lymphâ acciori & rumpendâ pustulâ, quæ si densior existat, lancetâ aperiendâ, ut sic liquor contentus effluat.

Vertice-  
rum.

*Verticem* in Lingua eodem modo, sicut in reliquis partibus, tolluntur. optunè autem constrictione fili sericei interdum in sublanatâ macerati, ita enim tubuli ocululi non peritunt alimentum, sed efflorescentiæ illa prima in herbâ suffocantur & edificantur decidunt. Caeteri cujusdam potentialis applicationem minus censleo conueniens, cum saliva allecta inhaeretet & adjacentes partes laderet, insinuat remedium illud facillè abluetur.

Substan-  
tia abla-  
tibus.

Nonnulli sunt, qui credunt, *Substantiam* Linguæ à Natura ipsa, optima nimium medica- trice, relaxati: interim quum præter balsamicus sanguinis, maxime vero chyli nutrientis particulas vix acne vix quidem intellectu concipi possit, quid decantata illa morborum medica- trix, Natura videlicet, sit & ubi locorum in corpore humano existat, ad auferendam mate- riam noxiâ, & angendum liquorem illum bal- samicum, ejusque activitatem facilitandam; non omnimodò contemnenda sunt bona remedia: sed si Linguæ portio à materia venenata ulcerolâ sit ablata, ut in Variolis aliisque mor- bis malignis, item Lue venerea & Scorbuto or- tis sæpius contingere solet, adhibenda varia alexipharmaca tum interna, tum externa, mix- tis simul antiscorbuticis: Deur ergo sequens vel similis portiuncula.

℞. *Card. bened.*

*scord. aa. ʒi.*

*El. diaſcord. ʒi.*

*M. Fiat Potiuncula pro una vice.*

Vel:

℞. *ʒii dysphoret. ʒi.*

*Pulv. Angl. ʒʒ.*

*M. F. Sudoriferum, quod exhibeatur ali- quoties.*

Vel in forma Essentiæ guttatim sæpius exhi- bendæ.

℞. *Essent. viperin. Zvelf. ʒij.*

*trifol. febrin. ʒiij.*

*M. D.*

Vel Tinctura Animonii ad gr. 20. sæpius exhi- beatur.

Os eluatur antiscorbuticis & mundificantibus, inter quæ sequens palman aliis præcipit.

℞. *Decoct. ſcord. lb ʒ.*

*Succs beccabung. ʒiij.*

*Mell. rosat. ʒib.*

*M.*

Tandem ad Sarcotica accedendum, quæ acrimoniâ tollunt & vitale magis roborant, ac citra acrimoniâ adstringunt, glandulæ enim papillares Linguæ facillè ichorem stillant, hinc

exsiccantia maxime proſunt, conueniunt quæ vitriolata & aluminosa constrictiva; in hi- externis & celebrantur alcalina ex pompholyge & cerullâ parata, sæpe sufficit solus pulvis ex foliis aristolochiæ longè paratus. Nec negli- gantur varia balsamica inter Traumatica satis laudata. Olea verò & pinguis, quod acidum foveant, non conueniunt in ulceribus. Quod si Lingua maxime exulcerata fuerit, siquidem hæc non tarò putrefcit. eroditur & exspuitur, contra hanc exulcerationem Linguæ euphoriston re- medium est sequens.

℞. *Flor. Malv. arb. ʒʒ.*

*balanſt. ʒi.*

*Myrrh. elect. ʒi.*

*alum. ʒb.*

*Cum f. q. mellis despumat.*

*F. Linimentum molle.*

Vel:

℞. *Mell. ros. ʒʒ.*

*Ongu. Agyptiac. ʒij.*

*M. D.*

Si Linguæ portio notabilis sit reſecta, quæ nullo modo renascitur, neſermonis usus plane interci- dat, sed ager cogitata ſua voce intelligibili aliis aperire queat, *Paras* docet instrumentum li- gneum parare. figurâ ovali, cujus pars superior crassitie ſelquicapitati argentei inter dentes in- cisorios ita continenda, ne ab ore promineat, nihilque præter naturam ore haberi videant, inferior autem ejus pars tenuior & tantum minus capitati argentei crassitie Linguæ tenaci adhæſu rectâ ad ligamentum membraneum sub Lingua componenda eſt, & interior pars ſcalpta & non- nihil excavata eſſe debet, quod ſic adhibito Lin- guæ defectus in ſeruitone eſſendo reſarciſti po- teſt, quale experimentum caſu inventum, & commodè adhibitu in adoleſcente, cui Lingua fuerat amputata, ipſe hic Auctor recenſet ſig- ſarſque addit utriusque instrumenti lateris Opp- ſuorum *lib. 22. cap. 5. p. m. 489.*

Cura *Aphonia* in eo ſita eſt, utrad primarium *Aphonia* aſſectum, cujus ſymptoma eſt Aphonia, reſpi- ciatur, imprimis verò ad paralyſin nervorum recurrentium, unde ſæpiſſime naſcitur, tollen- dam cura dirigenda eſt, quæ obtineri poteſt per volatilia, & omnia ea quæ circulationem tum ſanguinis tum reliquorum humorum promo- veant, adjectis herbis & rad. cephal. item ſalibus; inſiciantur & cyſteres in delicatioribus. Aliquando ad motum convulſivum ſeu ſpaſmo- dicum ſiſtendum animus dirigendus, in quem ſinem omnia conducunt Antiepileptica, nervina, Antipaſmodica dicta, ut ſunt volatilia aroma- tica, caſtorina, cinabarna, ſuccinata, imprimis quæ ſimul ſudorem conciliant, hq. ſcil. C. C. ſuccinat. cum aquâ theriacali miſtus, Baſam. nervin. noſt. ſpir. C. C. Tinctur. ʒii volar. ſpir. cephal. aromatic. &c. pulv. ſpaſmod. n. In con- tumaciori malo prodeſt decoctum lignorum. Omnia quoque conducunt ſpirituosa, ut ſpiri- tus vitrioli cephal. Extr. Theriac. ſpir. ceratill. convall. ſem. eruc. cum conſerv. flor. Timæ. Conſect. Alkerm. ambrat. & molchat Ambrata enim cum ſpiritu roſar. ſolut, maxime ſpiritus re- creant, quorum influxus in nervos recurrentes impeditur. Ex. gr.

℞. *Aq. Carbunc.*

*Spir. ceratſor. nigr. ʒi.*

*Apopleſt. Lang. aa. ʒi.*

Y 2

Liq.

*Liq. CC. succinat. 3j.*  
*Confect. alkerm. 3j.*  
*Sach. perlat. q. s.*  
*M. D.*

Curatur ergo hic affectus, qui consistit ut plurimum in obstructione tubulorum nerveorum Linguae, tanquam alius partis corporis Paralyticus, quare exhibeatur saepius spiritus.  $\Theta$  succin. & C. C. antiepilept. cum specifico cephal. manè & vespere cum Rob. sambuci. Imprimis pyralismus plegmatizantibus masticatoriis excutetur, & Enemata injiciantur, & si malum ex primis viis ortum suum habeat. incidentibus plus efficias, quam corroborentibus. Si à sanguine subsistente & nervos comprimente, foris sub Lingua propediem instituitur, & varia sanguinem dissolvencia exhibeantur.

Externa omnia nervina, spiritus, oleosa, quae in aliis affectibus cephalicis conducunt, & hic proderunt. Possunt etiam in hunc finem parari sacculi herbis & radicibus nervinis & aromatibus repleti, collo & capiti apponendi. Essentia Castor. cum spiritu lumbic. vel formicar. aqua Apoplectica permixta maxime confert, praeter aliis vero conducit Astrinum cephalicum, quod componitur ex oleo succini & camphora; vel illinae aqua apoplectica cum spiritu  $\chi$ ci succinato. Essentia castorei in Aphonia seu loquela amissa intra linguam circa frenum linguae illita frequentius confert, & egregium experimentum est in affectibus apoplecticis & similibus. Exterius etiam Tempora, Nucha & Nares frequentius obliniantur balsamo apoplectico, rut. succin. &c. Ubi Aphonia oritur à capitis ulceribus manantibus & subito exsiccatis conducet pulvis seq. quo in Ephem. G. curabatur puella 9. annorum.

$\chi$ . 2. *Plat. gr. xv.*  
*Trochisc. alband. gr. v.*  
*3 ani diaphor. diagryd. aa. gr. iij.*  
*Ol. corv. gr. iij.*  
*M.*

Lingua fricetur sequenti vel simili mixtura.

$\chi$ . *Theriac. Andr.*  
*Confect. Anacardin.*  
*Conserv. f. Anih.*  
*lil. convall. aa. 36.*  
*Ol. succini gr. iij.*  
*Syr. de Stachad. 3ij.*  
*M.*

Maxime quoque laudatur sequens mixtura in Ephem. Germ. Ann. 6. & 7. Obs. 92.

$\chi$ . *Mithridat. 3j.*  
*Extrall. aror. 3j.*  
*Rad. aron. pulverisat. 3ij.*  
*Essent. castor. gr. vj.*  
*Ol. Carbone. gr. iij.*  
*M. Illinatur lingua.*

Vel Theriac potest addi gutta una aut altera olei alicujus stillatici & spiritus  $\Theta$ -is  $\chi$ ci succin. & sic in ore teneri. Vel detineantur in eo spiritus oleosa, ut aq. vit. *Mathiol.* aq. antiepilept. *Lang.*  $\Theta$  volatil. aromat. aq. & spiritus lil. convall. spir. ceras. nigr. Variè in hunc finem praescribi possunt collutiones oris & gargarismata. Sequens non contemnendi erit usus.

$\chi$ . *Rad. bryon. 3vj.*  
*Enul. camp. 36.*  
*Fol. rorismar.*  
*salv.*  
*beton.*  
*rut. aa. M8.*  
*Flor. lavend. Pij.*  
*Cog. in f. q. vin. & aq.*  
*Colatur. libb. add.*  
*Mell. anthos.*  
*seylis. aa. 3j.*  
*Theriac. vet. 3ij.*  
*Salis  $\chi$ ci 3j.*  
*Card. bened. 36.*  
*M. D.*

Velfolo decocto salv. in vino colluatur os. Applicentur quoque Vesicatoria & setacea.

*Blesuatis & Balbutie* curationem quod concernit, si vitium hoc fuerit à nativitate & organi vitiatio, haec à conformatione Linguae inordinata, sere incurabilis existit, si verò dependeat ab inordinato & intermisso spirituum animalium influxu, & reliquorum succorum, curatur ut paralyticis hinc conveniunt omnia nervina, cephalica superius jam dicta, tum interna, tum externa, ut robur hbris carnis in musculis & nervis concilietur. Speciebus hic laudatur spiritus cephal. cum aq. theriacali mixtus, eoque lingua saepius fricetur. Si frenum fuerit impedimento, illud solvendum, prout superius diximus.

*Gustus Abolitus & Imminutus* si sit ab obstructis papillarum nervosorum meatibus, curatur aliter uti affectus paralyticus, imprimis ubi papillae nervosae sunt flaccidae, hinc conveniunt omnia ea, quae diximus superius in Aphonia, cephalica, castorina, cinabarina, succinata, theriacalia, quae omnia Linguae motum restitunt. Si verò vitium latet in organo à nativitate male conformato, eò incumbendum, ut id vitium curetur, quod tamen difficile obtinebitur. Sin ex acido in primis viis latente malum hoc fuerit productum, varia conducunt praecipitancia & acidum absorbentia, pulv. scilicet Marchion. Cordial. pret. & imprimis oculi cane. saepius exhibit; nec negligenda sunt amara, inter quae reliquis palmam praecipit Elixir, antisebr Myn. omnium sensuum vitus appropriatum remedium, sed per temporis spatium continuatum. Si ab arozia spirituum animalium, viscidum incidentia & volatilia non negligenda, & cephalica, seu dictum, usurpanda, ut sunt  $\nabla$  Reg. Hung. Ball. Apoplect. noster faucibus & Linguae illinendus. Fiant quoque & hic suffitus ex gum. animae, succin. Essent. viperar. majoran, rorismarini, egregia sunt remedia.

In *Gustus depravato* eò semper respiciendum, *Gustus de-* ut causa prius removeatur, hinc si Gustus est sal- *pravatus.* fus à salivà per ductus salivales eò delatà ita factus, illa prius corrigenda, & si simul addit catarrhus, ille corrigitur optime per pilulas de cynogloss. vel de styrace, antiscorbutica quoque interponantur varia. Si verò Gustus fuerit amarus, prout in ictericis solet fieri, vomitus eum in finem instituitur & curetur icterus, in quæ finem & conducet Tinctura Martis per temporis spatium quotidie assumpta. Sic quoque raphanus ante pastum usurpatus & masticatus à *Hespero* Gustum acutere dicitur. Succo acetosae vel acetosellae os saepius colluatur.



## C A P. XIX.

## De Labiorum Morbis, Tumore, Tremore, Perversione seu Spasmo Cynico, Fissuris, Labii Leporinis &amp; Ulcere.

## §. I.

**L**abia non tantum os & dentes partesque teriores oris tumentur à frigore & externis injuriis, hincque externum oris munimentum dicuntur, sed & ad edendi & bibendi commoditatem & deglutendorum assumptionem, item ad vocem & loquelam, imò ad ornatum mulcum conferunt, hinc ipsorum affectus Meditationem merentur.

**Labiorum  
Tumor.**

*Tumor* itaque Labiorum dicitur, quando p.n. illa sunt tumentur à serosis interdum humoribus ibidem p.n. collectis & stagnantibus, & ab acido coagulatis, partes has distendentibus. Alius verò est natus & familiis quibusdam qualipropius, de quo Phylonomorum varia extant auguria, quæ tamen rerum veritati sæpius minus respondent, unde fit ut virtuosii existant, qui omnibus vitiis dediti ex adpectu censentur, & vitioli, qui omnibus virtutibus creduntur ornat, mens enim sui interdum obhiscitur officii, quandoque vero exercitiis & virtutum contemplationibus assiduus generositatem sibi comparat, ergastuli sui corporei exteriorem fortuam & dispositionem longis paralangis post se relinquentem.

**Tremor.**

*Tremor* Labiorum dicitur, quando ea citius, quam par est, vibrantur, ab *aragile* & acrimonia scorbutica Spirituum animalium inductus. qualis observatur in vomituentibus, in quibus inferius labium tremat.

**Pervessio.**

*Pervessio* Labiorum dicitur, quando Labia convulsis musculis contrahuntur, & sic pervertuntur, quod vitium ab *aragile* & coagulatione ac stagnatione spirituum animalium utplurimum producit.

**Spasmus  
Cynicus.**

Huc pertinet *Spasmus Cynicus* dictus, sive canina convulsio, quæ est contorsio oris in quam musculi oris à suo loco disorquantur, ita ut labris prominulis canum venariorum consimiles videantur, estque paralysis seu resolutio musculorum oris & annexorum mandibulis, in qua os in alteram faciem partem retorquetur, ac naturalis constitutio oris valde vitatur ac deformatur, ut ita *Spasmus cynicus* describi possit, Musculorum faciei in alterutro latere contractio involuntaria, stabilis & dolorosa, speciem ringentis canis referens, ab intimo nervorum partium irritatione & convulsione dependens. Alio nomine etiam appellatur *Risus Sardanius*, ab herba *Sardoe*, cujus elus solutionem ejusmodi causare solet, pervertunturque in eo Labiorum musculi abutrate parte, ita ut figuram ridens referant, quo morbo sæpius laborant infantiuli in cunis à spirituum motu inordinario & spasmodico, & ab eorum coagulatione, ab acido quodam suscitata, qui tamen ab ignavis vetulis & superstitionis mulierculis, nescio ob quod interius colloquium cum Angelis habitum, & gaudium inde conceptum, ridere pronunciantur; sed revera motus sunt convulsivi potius cum commiseratione, quam applausu conspiciendi.

**Risus Sar-  
danicus.**

*Fissura* Labiorum est continuitatis Labiorum *Fissura*, à nimia rigiditate & tensione solutio, quò pertinet *scissura* & *Vesicula* & *Aspreto*. Vesiculæ abortiuntur sæpe in inferiori & superiori Labio, in quibus clara lymphæ continetur, quæ disrumpit vesiculis effluit, & crustam super vesiculis relinquit, quæ tandem ascescit & cadit.

*Aspreto* sive *Asperitas* Labiorum est, quando pellicula Labiorum ex nimia asperitate squamata se à Labiis separat, deglubique ac detrahi potest. *Scissura* & hic, ut in aliis corporis partibus, Lingua, volis manuum, &c. provenire solent.

*Fissura Labii nativa* imperfectum id, & alia qua parte sui delituitur fere insert, *Leporinum* à figura vocatum, utrumque maxime autem superius, solum aut cum maxilla ipsa hiatu laborare faciens.

*Ulcera* Labiorum ab humoribus acerbis producta solutionem Labiorum continui indicant, & nihil notatu dignum habent præter aliarum partium ulcera.

§. 2. *Pars affecta* sunt Labia, tum superius, *Pars affecta* inferius cum suis musculis, nervis, venis & arteriis, quibus purpureus ille Labiorum splendor debetur, pulchritudinis & sanitatis nota. Labia hæc contant ex carne in digesta & fungosa, quorum cutis adeo cum musculis miscetur, ut cutis musculosa, vel cutaneus musculus esse videatur, testante *Bartolin*, lib. 3. anat. c. 11. sed meo iudicio Labia ex innumeris glandulis constant.

§. 3. *Tumor* facile innotescit, inquirendum *Diagnosis* verò, num sit natus, an adventitius, uti in *catarrhis*, scorbuticis, hypochondriacis, hæcticis, ejusmodi Labia tumentur & obervantur.

*Tremor* itidem Labiorum ex ipso aspectu vel relatione rigi patet, præcedit aliquando affectus cephalicus, & sic percipitur stidor dentium, si quid convulsivi subest, simul adiunt torpor, metus, ira, hinc nervi obstruuntur, & spiritus circa Labia in *aragile* & stagnationem vertuntur, si verò adest nausea & dolor ventris, malum ex primis viis oriri solet, ubi chylus præparatur nimis viscidus.

Sic quoque *Pervessio* Labiorum facile patet, Labiorum ut & *Spasmus Cynicus*, qui ipse oculis explicitus *pervessio* prolixa indagine opus non habet, oris figura depravata tantum ringentium speciem refert, pars affecta dura est, plerumque dolet, sana ad tentam trahitur, cutis in una parte quandoatenus rugosa, in altera densa, nonnuquam sibi simul musculi convulsi, oculus alter ride claudi nequit; æger expirare iustus, altera solum parte id facit. Sin vero ex paralytici lateris lacerata fuerit canina oris contorsio, pars affecta laxa erit, & sensus obtusioris, atque ad sanam trahitur, Palpebræ oculi ex parte decident, facies sine rugis extensa continuo ad inferiora inclinet. Quibus ex causis inducta fuerit convulsio, temperiem, habitum corporis, dietam & morbos antegressos inspiciant.



tanti erueri non erit difficile. *Risus Sardonius* inde cognoscitur, quod musculi faciei cum Labiis in utraque parte contracti os ridens exhibeant, quod visu facile percipitur.

*Fissura* Labiorum, item *Labia Leporina*, *Pustulae*, *Asperitates*, *Ulcerata*, &c. in sensus nostros similiter incurrunt, unde & lippis consoribusque nota sunt hæc omnia.

*§. 4. Causam* Labiorum *Tumoris* constituunt *Galenus* vel influxum humoris calidi biliosi vel sanguinei in musculos harum partium sæpe ab externis causis provocatum, vel congestionem humoris frigidi, melancholici scilicet vel pituitosi ex debilitate facultatis coctricis non satis elaborati, & expultricis ibidem retenti, vel etiam materiarum copiam & crassitatem in semine à facultate formatrice imbecilliore minus jussu distubutam, unde labia istiusmodi tumida nascuntur.

*Tremor.* *Tremoris* Labiorum causam proximam ponunt ipsius facultatis animalis imbecillitatem, labia pro voluntate movere aut continere non valentes, remotiores internas humores acres membranam & nervos vellicantes, vel inanitionem nimiam & vomitum, vel vermes intestinorum, ventriculi, & per consensum ipsam Labiorum membranam convellentes; externas aërem acrem, venena, ebrietatem, Venerem nimiam & similia.

*Perversio* *Perversio* & *Spasmi Cynici* causam accusant distentionem & convulsionem nervorum & musculorum, vel unius lateris, & resolutionem antagonistarum in Perversione & Spasmo Cynico, vel utriusque in *Risus Sardonius* ab excitatione nimia inductam, ut in febribus ardentibus contingat, vel ab excedente frigore spiritus coagulante, quale in veniens quibusdam existat, & ab ipso etiam aëre rigidiore partibus hinc communicatur.

*Fissura.* *Fissura* Labiorum causam proximam ponunt solutionem continui in membrana Labia investiente, remotiorem verò siccitatem nimiam membranam illam debito fortius distendentem & tandem rumpentem, uti vel ab internis vaporibus ex sanguine in febribus aliisque morbis calidioribus, adscendentibus, vel ab aëre externo ficciore contingere solet.

*Labium Leporinum* causam vel defectum materiam, ex qua corpus factus in utero formandum, vel formatricis aberrationem propter imaginationem fortiori ipsius pragnantis, vel externè vulnera & ulcera portionem quandam absummenta, & fissuram illam magnam excantia constituunt.

*Ulcera* & *Pustulae* causam ponunt humores acres erodentes, eosque vel pituitosos, vel biliosos, vel serosos, vel atrabilarios ab inferioribus corporis partibus ad superiores hæc transmissos.

*§. 5. Paracelsus* singularem in Labiis *Tumorem* observans eundem *Alveolam* vocat, carnis videlicet quandam superfluitatem, insurgentem ex venis Jovialibus per Marcis regionem transcurrentibus, ubi primo in Labiis nascuntur pori, qui postmodum cum emittunt sanguinem vel per se, vel per incisionem, enascitur caro quædam spongiosa & foraminibus indurque repleta, cujus finis est, indies magis crescere, donec locum suum penitus occupans, os obstruat, ut comedi nequeat, impolterum phrenesin atque

maniam excitet, originem inde habens, quod Spiritus Jovis, qui duntaxat in alopeciam transire debet, alio se recipiat, ad Martis regiones videlicet, ibidemque in generationem excesscentium transmutetur, & pro natura Jovis fiat alkola.

*Tremor.* *Perversio* & *Spasmi Cynici* causam primariam ponit sal quoddam mistum ex sale mercuriali spirituosum & spiritu salis, per venas Martiales transcurrentes, humoresque in quibus spiritus motivus continetur, exsiccat, quare acetositas spiritus salini, modo à vento, cibo & potu externè, modo ab ira & colica internè proveniens, tacto sibi dominio, nervos & musculos hinc inde violententer instat ventum commoveat, donec tandem profligato omni spiritu motivo, in procella naturam conversis, eosdem vel ad unum vel utrumque latus prosterneat, hinciusque eidem affigat.

*Fissura* progenerari dicit à sale alopecie seu fissurarum vittiolato scilicet per venas Martiales effluente, in Labiis separato, & cutem eorum quandoque cum carnis portione rumpente vel plane abluente, ut in *Labia Leporina* contingat, quæ tamen imaginationi matris nonnunquam originem debeat, cum factus in utero in formatione politus sit in manu & voluntate matris, ut argilla in manu figuli, & ita facile huiusmodi impressionem suscipiat.

*Ulcera* causam ponit sal resolutum & separatum, vel æruginem quandam salis ex martialibus exurgente, in superficie Labiorum sedem figentem & cutem cum carne erodentem.

*§. 6. Juxta Helmontium* Labiorum *Tumor* oritur ab influxu laticis à spiritu quodam, seu syna occasionali provocati, qui deinde in musculis Labiorum aliquandiu subsistens magnitudinem eorum adauget.

*Tremor* excitatur à vita Labiorum musculorum peculiari, qua fit, ut Archeo à causa peregrina acida injuria quidam immixta, musculi illi motu proprio tumultuantur ad excutiendum peregrinum illum hospitem Archeo satis molestum.

*Perversio* Labiorum & *Spasmi Cynici* fit, perversum dum hospes ille peregrinus adeo immorigenit, ut & Spasmi est, ut nec indignationi Archei, nec motui immo- Cynici.

sculorum cedere velit, unde musculi invitæ voluntate & animæ imperio se subtrahentes, motu suo proprio seu blas vitali violentius versum unum locum feruntur, & per temporis spatium ibidem fixius contrahuntur.

*Fissura* producitur à latice sal quoddam asperum sibi copulante, quo cutem Labiorum dirumpit, quodque illi sæpius ab externo aëre communicatur.

*Labia Leporina* ex principio seminali, & imagine seu idea quædam à pragnante conceptu formata, nonnunquam exurgere credit, aliquando verò à causa externa violenta labia dividente & portionem aliquam auferente.

*Ulcera* causam agnoscunt singulare quoddam fermentum virulentum acre, quo latex simul inficitur, & cruor alimentarius corrumpitur, ut ad nutritionem fiat inopius, hinc caro devallatur & defectu alimenti relinquatur cavitatis.

*§. 7. VVillisi* mensit, *Tumorem* Labiorum visum fieri à viscositate laticis feroli poros cutaneos obstruente & majori copia circa glandulas col-

*Tremor.*  
*Perversio*  
*Spasmi Cynici*

*Labia Leporina*  
*Tumor*

*Ulcera*  
*Spasmi*

*Labia Leporina*  
*Tumor*

*Tremor*

*Ulcera*  
*Spasmi*

*Fissura*

*Labia Leporina*  
*Tumor*

*Ulcera*

*Ulcera*  
*Spasmi*  
*Tumor*

lecto, cutem distendente, & Labiorum molem augente: In utero vero à succi nutritis copia ad partes has fluente eorum substantiam incrementare.

*Tremor.*

*Tremoris* causam statuit inordinatam spirituum animalium in musculis & nervis Labiorum agitationem à copula quâdam heterogeneâ suscitam, unde fibræ musculosæ variè concutiantur, & inordinatè commoveantur.

*Perversio-  
nis, Spasmi  
Cynici &  
Risus Sar-  
donii.*

*Perversio*nis, *Spasmi Cynici* & *Risus Sardonii* causam eorundem spirituum animalium violentiorem statuit explosionem & adulterationem, vel à materia morbifica ad genus nervosum suffusâ concitatam, ut in febribus malignis aut male iudicatis aliquando contingat, vel ab ipsius liquoris nervoli longo quodam temporis tractu facta corruptione, ut ita à debita crasi in liquorem acrem, aut acidum, aut alio modo præternaturalem & spasmodicum degeneret, vel denique à venenis liquorem illum depravantibus, sicuti comestione cicutarie, apii risus, aliarumque herbarum noxiarum horrendæ istiusmodi contractiones sequantur.

*Fissura.*

*Fissuram* produci asserit vel à defectu humiditatis benigni & aliquidum oleosi, unde cutis fatis comode flecti & distendi nequit, sed ad quemvis motum, etiam leviori facili dirumpitur; vel ab humore salino cutem erodente.

*Labiorum  
Leporina-  
rum.*

*Labia Leporina* oriri credit à defectu materie nutriticæ, interstitium illud inter dextram & sinistram Labii partem non satis explente, tum à spirituum & virtutis plasticæ aberratione ab imaginatione matris potissimum causatâ, quâ fit, ut vel ab operecepto desistat, vel quod quam disposuit ante debitam consolidationem iterum destruat.

*Vicium.*

*Ulcera* causam constituit particulas salinas acres latici cutaneo vel succo nutritio immixtas, & cutem non modo, sed ipsam etiam carnem muscularem erodentes.

*Sylvii  
iudicium de  
causa La-  
biorum  
Tumoris.*

§. 8. *Sylvio* Labiorum Tumor, ut aliarum partium, oritur, vel ab augmento substantiæ carnez, vel ab humorum extra locum naturalem & intra substantiam Labiorum effusione.

*Tremor.*

*Temor* produciturtum à spiritibus animalibus à flatibus & halitibus inordinatè agitatiss, tum à nervorum continua irritatione, minus tamen gravi, & vel ab humoribus acidis, vel halitibus similibus excitata.

*Perversio-  
nis & Spas-  
mi cynici.*

*Perversio* & *Spasmus Cynicus* oriuntur à spirituum animalium nimia copiâ in fibras musculorum Labiorum huius vel illius, vel utriusque lateris, citra & contravoluntatis decretum impulsu, à causâ quadam præternaturali, maxime humore vel halitibus acidis acerbis excitato; sæpius autem ex alterutris maxillæ labiorumque musculis paralyticis, musculus nempe oppositis cæterum sanis, ob defectum retentitiæ & æquilibrîi paralytin consequentem, partem sanam mox nimium contrahentibus & convellentibus.

*Fissura &  
Labiorum  
Leporina-  
rum.*

*Fissura* fit vel ab halitibus acidis acerbis, vel à nimia siccitate, unde cutis Labiorum dirumpitur, *Labia* autem *Leporina* sive huiusca, causam potissimum agnoscunt matris imaginationem, vel casum aut ictum, à quibus latera eorum disjunguntur, fiuntque divisa & hiantia.

*Ulcera.*

*Ulcera* etiam in hisce partibus ab acido quodam acri producentur, continuitatem earum dissolvende & carnem quandoque exedente.

§. 9. *Cartesiani* in Tumore magnitudinem Labiorum secundum longitudinem, latitudinem & profunditatem quandoque argeri dicunt in ipso adhuc utero, fibris musculosis adhuc tenerioribus à copiosiore succo chyloso nutritente ductis, & spiritibus obrutis, ut eundem ad alias partes commode nequeant remittere, unde particula nutrites sibi arctius adherentes ad fibras quiescunt, pluribusque sequuturis viam sternunt, sique partem hanc in sua magnitudine conservant. Extra verò uterum quovis tempore Tumorem oriri dicunt à particulis spissioribus cum succo nutritio chyloso ad labia delatis, quæ cum per poros nequeant exhalari, viscositate sua retinentur, fibris & glandulis cutaneis tenacius adherent, poros ipsos occludunt, ut subseqentes liquores intra cutem subsistant, & molem Labiorum adaugeant, cui incremento sæpius quoque externum quoddam fermentum heterogeneum ansam dare, solet, spiritus & fibrillas nervæ exagitando, ut succussione hac liquorum affluxus promoveatur, quale quoddam ab aculeis vesparum aliisque insectis aut rebus venenatis præternaturaliter communicetur.

*Tremorem* Labiorum suscitari docent ab indifferenti & nullatenus impedito spirituum animalium influxu ex uno musculorum labiorum pari in aliud, propter valvulas in tubulis eorum intermedii vel in contrarium difforas aut revulsas, tum compressione aut contusione nervi, tum ab impetu spirituum regurgitantium, vel breviores factas ab exsiccatione & defectu humiditatis, quare spiritus hac de causa redditus quasi effrenas fibrillas Labiorum varie concutiant. Sed à defectu spirituum in senibus quoque contingere possedmittunt, quatenus musculi Labiorum ita satis nequeant inflari, sed fulcris suis destituti tremant atque vacillant.

*Perversiorem* verò, *Spasmodicum cynicum* & *Risum Sardonium* induci monstrant à spirituum animalium quâdam incarceratione intra tubulos unius vel alterutris Labiorum musculi, eo quod valvulæ, quæ exigui meatus inter musculos istos existentes donantur, à causa quadam violentâ in situm revellantur contrarium, ut ita spiritus ex uno musculo venientes in alterum liberè amplius nequeant moveri, sed in hunc vel illum musculum impetuosius irruentes, ibidemque detenti eundem adinflant & nimium distendunt, unde in ipsis infantibus huiusmodi convulsiones sæpiissime prodromi sunt insultus epileptici, in agonizantibus verò signum mortis instantis, quod spiritus animales non amplius subsunt imperio mentis, sed tumultuaria in hos vel illos nervos irruant, qui tumultus à particulis etiam nervosis inducitur, spiritibus animalibus & nervis quam maxime infectis.

*Fissuram*, *Pustulam* & *Asperitatem* Labiorum cum *Vulso* ferè fieri censent à defectu humoris benigni particulis suis teretibus fibras cutaneas irrotantibus, sique tunicam mollem reddentis, ut citra noxam distendi possit, quem defectum aliquando causant particula rigidiores terrestres in aère existentes stante borea exsiccante, vel à calore interno ustulante omne humidum consumente, quare tunica illa Labiorum humiditate privata & ob siccitatem rigida, ad leviori quamvis tentatione facili dirumpitur, nonnunquam etiam à particulis angularibus

*Cartesia-  
norum opi-  
nio de cau-  
sa Labio-  
rum Tu-  
moris.*

*Tremor.*

*Perversio-  
nis, Spas-  
mi Cynici  
& Risus  
Sardonii.*

*Fissura.*

bus acutis fibrillæ illæ discinduntur aut variis in partibus transfodiuntur.

*Labiorum  
Leporinum.*

► *Labia Leporina* in utero ideo formari volunt, quod spiritus animales ipsius fœtus in diducendis filamentis musculorum labiorum, & aptandis iisdem corpusculis novis ex sanguine alatis occupati, à spiritibus matris forti imaginatione agitati in operatione illa impediuntur, & ab opere cepto cessare cogantur, quare filamenta in utroque latere, dum spiritus alio recurrunt & nulla corpuscula interstitia illorum sustentant, statim connivent & sibi arctius in extremitate adherent, priusquam cum aliis alterius lateris filamentis connecti possint, sicque rimam illam relinquunt; interdum quoque à vehementiori spirituum prægnantis influxu filamenta valde adhuc tenera denno credunt dirumpi, & heterogeneam quandam formationem contingere, quod in his partibus facile fieri possit, quæ longè tardius quam reliquæ in fœtus formatione elaborantur. Vulnèra & Ulcera continuitatem solventia ut causas in adultioribus harum rimarum aut sulcorum cum reliquis placide admittunt.

*Vicium.*

*Ulcus* originem, uti in reliquis partibus, à continuata verberatione fibrillarum à particulis primi elementi rapidioribus facta, dependere putant, dum pori ab humoribus aliisque particulis heterogeneis angulosi aut viscidis ita fuerint obstructi, ut nullis aliis, nisi subtilissimis & violentissimis huius elementi particulis via patula concedatur, à quibus fibræ non modo cutaneæ, sed etiam musculosæ rumpuntur, & continuatas consuetæ resolvitur.

*Nostra sententia de  
causis Labiorum  
Tumoris.*

§. 10. *Nostra* calculo *Tumor* Labiorum præter allatas jam à *Cartesiano* fiendi rationes sæpe dependet ex primis viis, ex mala chyli seu lactis præparatione, ex qua inexplicabiles atque innumeri morbi suppullulant, item ex ferolis cruditatibus conglomeratis & coagulatis, & latice seroso, ex infima corporis regione post varias cum sanguine circulationes, ex arteriolarum ostiolis ad sapientiam arcem, & dein ad labia elevatis, hæc omnia ex ventriculo languido & torpido, reliquorumque viscerum obstructionibus, unde & terositates & tartareæ humiditates ortum suum habent, hinc in his personis sæpe scorbuticus latet character, atque cachexia illa producit catarrhalis, & *anæmia* sanguinis, unde balsamica sua salsedine destituitur, sed redditur sæculenta & effœta, ut circa has partes subsistere, & sic affectum hunc excitare cogatur: circulatio enim lymphæ hic impeditur & succi nutritii, in glandulis enim ipsis labiorum ab aëre frigido acido stagnatio lymphæ fieri potest, hinc *Tumor* seu in aliis partibus fieri solet.

*Tremor.*

*Tremor* Labiorum sæpe producitur à spiritu debili influxu, facilius enim viscidum acre penetrare, facilius recipi in copiam spirituum, ipsisque intimè combinari potest, hinc ii, quibus constitutio spirituum à prima nativitate crassa & humida est, hoc affectu vexantur, spiritus enim crassi & humidus non duntaxat rationis imperio minus ritè præsidere possunt, verum ad quasvis impressiones externas recipiendas sunt aptissimi. & hinc, juxta *Paracelsum*, Lunaticis spectris uplurimum vexantur, quæ laxissimè nihil aliud sunt, quam entia quædam imaginativa, quæ phantasia ob spiritus crassos firmiter citra voluntatem sibi imprimi, ut spectrorum

apparentia præsupponat nonnunquam insomnium vigilantis, seu leve delirium. Et hinc omnes illi, in quibus rationis imperium ob spiritus crassos cellat, ut melancholici, senes, mulieres, febricitantes, timore correpti, tempore nocturno facile spectris vexantur, illorumque phantasia cruciatur, adeoque non immerito *Paracelsus* nonnullos, quid à spectris continuo cruciantur, per medicamenta, quæ in debitam activitatis sphaeram spiritus ponunt, hoc est, ad motum incitant, restituere conatur. Sic novi civem Limburgensem à terrore concepto statim in Tremorem Labiorum incidisse, quia terror spirituum cursum inhibet, delicatamque nervorum compagem irritat. Terroris enim, uti omnium animi affectuum, idea per totum systema nervosum, non aliter ac sonorus tremulus motus per terram, propagatur ac disseminatur, imo tanquam per tubam, cuius ope in distans cum alio colloqui possumus, qualem curiosus monstrat Celeberrimus *Waldschmidtus* Collega & Fauctor meus honorandus; Terror coagulat succum nervum, à cuius stagnatione plurima terribi oriuntur affectus.

Porto multum ad hunc affectum excitandum contribuere potest ira, à qua spiritus nostri maximè irritantur, illorumque influxus in labia languidus redditur. Sic quoque in primis viis sæpe latet acidum acre, succum chylolum inficiens & per consequens systema ibidem nervosum & labia afficiens, & tremorem hunc in iisdem excitans, cui videmus in vomituentibus aliisque morbis, in quibus non ritè sunt constituti, sic malum hoc sæpius ex verminibus in infantibus productum obviavi. Rarum est, quod vidit *Janoviz* in puella pro libitu hunc tremorem producente, hinc patet, à spiritibus animalibus esse hunc motum tremulum Labiorum.

*Perversio* Labiorum fit ab effectu nervorum *Perversio* tertii paris, convulsis scilicet musculis, quod evenit à spiritibus animalibus in his aliisque annexis musculis confusissimis insigniter irritatis à particulis heterogeneis acerbis densius ipsis agglomeratis, & circa has partes imperium sibi rapiuntibus; hinc non potuit non sublevari animali regimine influxus sanguinis & spirituum vitalium acrimia in has partes, qui ob fibras immaniter contractas ac distensas muscululos Labiorum contraxit, partesque annexas simul pervertere aptus extitit.

Ab hoc affectu non parùm abludit *Spasmus spasmus* *Cynicus*, symptoma certè horrendum & detestabile, quippe quod faciem deturpat, labia contorquet, utque canem ringentem quali representet, facit, cuius causa aliquando latet in cerebro, hinc apoplectici, paralytici faciliè hoc morbo infestantur, quia spirituum animalium ratione acrimonia scorbutice insultu ramos tertii paris nervorum oris nec non faciei musculis insertos contrahunt, quæ contractione musculi unà tracti convelluntur, ac in alterutram partem reorquentur, abrepti eorum propria configuratione ac deturpata. Contingere etiam potest à vulnere ac transversa dissectione nervorum musculorumque oris, malaque curatione aliorum vulnèrum; sic eundem observavi ab hernia secutum.

Ab usu herbe *Sardoes*, seu *Apii* risus affectus *Risus Sardonicus* dictus oriri solet, eo quod *denis* herba hæc multas particulas nervis commu-

nice

nict spiritibus animalibus inimicas, & coagulantes acres vellicantes, unò toti generi fibroso, quod varè convellunt. Et contusione violenta circa regionem diaphragmatis similiter produci observatur, ob consensum fibrarum musculosarum & generis nervosi, quæ cuncta hoc modo valde convelluntur.

**Fissuræ** ab acerbis acidis falsisque particulis cutem dissecantibus & corrodentibus originem habent, hinc videmus tempore hyberno ab acido aëris fissuras oboriri, sic etiam sæpe ab acerbis, uti tempore æstivo à calore & siccitate, item ab iisdem particulis acerbis in febris per motum ad has partes delatis, sæpe ab eadem causa in morbo Gallico aliisque affectibus venenatis oriuntur ejusmodi fissuræ labiorum.

**Labiorum Leporinum.** Labia Leporina causam, ut nativi morbi omnes, agnoscunt seminis defectum aut pravitatem, vel spiritus plastici errorem, maxime si terror aut imaginatio primo conceptus tempore accesserit, à quibus spiritus plasticus in operatione hac valde confunditur, consternatur & ad erroneas divagationes seducitur. E quibus apparet, quod anima ex aspectu alicujus objecti conqualata & vehementer afflicta, spiritibus animalibus similem jungit imaginem, live sitid incassando, live coagulando ac stagnando. Vidi in puella labium leporinum in utero matris ab aspectu alicujus labio leporino laborantis contractum. Fissura etiam illa, vel hiatus in labio præterim superiore, tum quoque inferiore, nonnunquam oriri potest à vulneribus malè curatis.

**Ulcera.** Causa Ulceris Labiorum est eadem, quæ aliarum partium, quæ vel oriuntur ab humore corrosivo à sanguine & lymphæ aliisque succistransmisso, vel ab humore acri in ipso ulcere corrupto & nato; ut plurimum verò oriuntur hæc ulcera à lue Venereâ, & sunt sæpe signa luis Venereæ, si tamen alia non adsunt signa, huic soli non est omnimodò fidendum, facile enim in glandulis labiorum ab acido vel frigido obstructio fieri potest, hinc stagnando succi aciores redduntur.

**§. 11. Tremor Labiorum** si est à nativitate, vix curabilis est, imprimis si familiaris est solennis; si accidat in juventute, incrementum ætate sæpe sponte decrevit. Si adest status lymphæ viscidus, Medicum maxime fatigat, ac sæpe optima remedia frustra adhibentur. Tuberculum in labiis non vilipendendum est, sic vidui rusticum tuberculum tale negligentem quod in cancerum exulceratum incurabile definit aspectum, certè horrendum.

**Tremor Labiorum**, uti omnium aliorum affectuum tremulorum, semper periculum involvit, eo majus, si accidat viribus debilibus, in febris continuæ malignis, sanguine & reliquis succis, impiiis nerveo crassis & viscidis existentibus. Periculo aliquando vacat, si enim vires sint validæ, & actiones sibi consistent, spes adhuc refuset optimæ curationis, beneque sperate jubet ægrum artas juvenilis calore vegeto adhuc pollens, spiritusque habens fortes, circulationemque humorum vegetam, porrò si morbus est recens nec inveteratus, adeoque etiam facilius dissipabilis.

**Perversio.** Perversio Labiorum & Convulsio Cynica cum particularis sit, non tam periculosa, quam

universalis, nisi phrenitidis vel febris ardenti & malignæ, vel maximo vulnere nervoso jungatur, quo in casu Hippocraticum metuendum fulmen, IV. Aph. 49. Perversio Labii, supercilii, oculi vel nasi in febre continuâ, lethalis, periculosior quoque, quæ ab evacuatione quacunque excessiva hypercathartis, sanguinis profusione, &c. oritur, item si cum virium & spirituum aliorumque succorum coagulatione & prostratione jungatur. Terminatur ad salutem discussa materia acri nervos vellicante vel motu quodam spontaneo, vel medicamentorum ope, vel etiam febre superveniente, juxta Hippocr. IV. Aph. 57. quæ febris quomodo comparata esse debeat, si salutaris inde eventus sperandus, docet Rolsine, de affect. cap. partic. diss. XI. qui videatur. Ad mortem vergit coagulatis omnibus succis & affectu graviore, Epilepsia vel Apoplexia superveniente, aut etiam viribus resolutis.

**Risus Sardonius**, cum à veneno oriatur, periculo plenus est, & difficilem admittit curationem, venenum enim fibris sæpius fortissimè inhaeret, ut præstantissimis etiam remediis vix expelli possit. A contusione diaphragmatis non minus exultat periculosus, comitem enim sæpius nanciscitur epilepsiam, quam ipsa mors frequentius excipit.

**Prognosis Fissurarum & Labiorum Leporinum** sic se habet, quod Fissuræ Labiorum in febris ardentibus & intermittentibus bonam spem denuntiant, particulis scilicet acerbis à massa sanguinea circa has partes emissis; & si fissuræ nimium profundæ fuerint, nullumque frigus vel alia causa præcellerit, infectionem Luis Venereæ indicant.

**Labia Leporina** præter deformationem etiam suctionem in infantibus impediunt, aut difficultiorem reddunt, & si Labia maxillæ fuerint annata, majori cum dolore & difficultate curantur, quam si ab eisdem sint libera, attamen obtinebit tandem curatio sectione & constrictione, si à perito artifice dextre peragatur.

**Ulcera Labiorum** Prognosis cum aliarum partium ulcerum prognosi coincidit.

**§. 12. Præmissis his, necesse est, Dieta quodammodo exactam habere rationem.** In Tremore ergo, Perversione, Spasmo Cynico & Risu Sardonio aër sit temperatus, ad caliditatem magis inclinans & serenus; crassius, frigidus & nebulosus suffusus ex odoratis cephalicis, vel solo juniperino frutice alterandus.

**Cibi** quoad qualitatem sint eulymici & eupepti, non salis nimis, acres, muriave vel acidis acrioribus conditi. Ab acidis, generi nervoso inimicis, abstinendum, quæ de causa non desunt, qui omne vinum tanquam acidum, interdicunt. Existimamus tamen, concedi illud posse aliuscum cum moderatione & cephalicis alteratum, vel simplex salivatum, vel roremarino confectum, ad virium tantum instauracionem, nisi alia circumstantiæ id dissuadeant. Similiter quoque cerevisia mediz ætatis nervinis medicata, ex gr. salvia, roremarino, chamædr. rad. caryophyll. helen. &c. in usum tum nutritivum, tum alterativum commendanda. Potus Thee his in affectibus cum commodo assumitur.



*Somnus & Vigilia, Motus & Quies* omnia moderata sint.

*Veneri*, ne ulterius enervetur corpus, ad tempus dentur induciæ, quia à nimia venere inspillantur omnes succi, imprimis nervus.

*Alvus* ingestis quotidie respondeat, sin minus, enemate vel jusculis lubricantibus, aut etiam pilulis aloëticis sui admonetur officii.

*Mensum* quoque & *Hæmorrhoidum* in assuetis ratio habeatur, ut iustum observent ordinem, tempus & mensuram.

*Ira, Terror & Tristitia* exulent, contra si ad hilaritatem componatur animus, blandis compellationibus erigatur, & omnia præscripto modo peragantur, additis simul medicamentis infra dicendis, brevi molestæ Contractiōnis & Tremoris speramus optatum affore finem.

Sic in *Tumore, Fissuris & Ulceribus* Labiorum prædictis observatis ante omnia frigus amovendum, & causæ nonnaturales & præternaturales quæcumque, quæ aptæ sunt hos affectus producere aut fovere abigantur, quam Diætam facillè quilibet Medicus peritus & exercitatus pro circumstantiarum ratione potest præscribere.

*Curatio Pharmaceutica* Chir. Therapejam quoque subjungamus, & quidem priusquam nostra aperiamus cogitata, aliorum Affectibus hisce medendi rationem præferemus, inter quos ob antiquitatem *Galenicus* primus conceditur vota sua proferendi locus. Hi verò in *Tumore* Labiorum ipsum advertunt humorem, cujus influxus vel congestio labia reddit tumenta, eumque pro diversitate suâ prius correctum idoneis, ut putant, remediis evacuant, biliosum nempe cholagogis; melancholicum melanagogis; pituitosum verò phlegmagogis, omnibus ex superioribus jam cognitis, sanguinem copiâ peccantem ipsa venæsectione emittunt, & ne ulterius fiat humorum affluxus, eosdem revellunt frictionibus, cucurbitulis, fonticulis & setaceis: facultatem concoctricem debilem roborant, in suo in coquendis humoribus bene fungatur officio, remediis imprimis stomachicis & cephalicis ex rad. calami arom. acori, vulg. ltr. Florent. Emplast. galang. herb. hyssop. majoran. beton. salv. rut. polio, thymo & similibus, ex quibus decocta, vel pulveres, vel electuaria mediante melle parare solent, & humore vicioso jam collecto, sed ob facultatem expultricem debiliorem non satis expulso, facultatem hanc sui admonent officii, pilulis vel aloëphanginis, vel assajereth, vel de fumaria pro ratione humoris evacuandi. Externè humore tenuiori bilioso in causâ existente interdum repellentia adhibent, eodem vero crassiore attenuantia & solventia, ut Unguent. Apostol. Emplast. diachyl. parv. Mes. Cerat. Oclyp. *Philagrii*. Scarificationem in ipsis etiam Labiis interdum instituunt, præsertim si humores sint pertinaciores, ut in Tumore à nativitate, quem tamen plerumque incurabilem pronunciant, & si cura nihilominus sit tentata, eandem ab evacuatione humorum peccantium, sique debita, ut sibi persuadent, corporis preparatione & depuratione adinchoant.

*Tremor.*

*Tremorem* Labiorum curare intendunt roborando facultatem animalem, demtis prius causis malum hoc foventibus, unde humores acres

corrigit, imprimis remediis nervoso generi amicis, ut decocto salviæ, centaur. minor. fol. rorismar. rad. calam. arom. & similibus, copiâ verò simul peccantes idoneis cathartics evacuant. Ab inanitione & Venere nimia prodeunt analeptics emendare student, ut cibis boni succi, jusculis restaurantibus, cum medicamentis etiam corroborantibus ex conservâ antheros, flor. salviæ, acori, secac, electuario de hyacinth. Aut. Alexandr. Speciebus diamb. confect. liberant. diaxyloaloe, Alpalach. castor. Syr. de Stæchad. de Pæon. Vermes intestina vellicantis enecant amaris & Rhabarbaro, vel aloëticis ejiciunt. Aërem acrem vitæ dum præcipiunt & suffumigiis corrigendum. Ab ebrietate si ortum habeat, pediluvia instituunt nervos corroborantia. Venenum si fuerit assumptum, præmissio vomitorio evacuant ex rad. alari, & decocto anethi, theriacam propinant vel diacordium aut mithridatium. Externè loco affecto inungunt oleum Irimum, in quo aliquid theriacæ fuerit dissolutum, vel oleum Sulinum cum oleo de Castor. & unguento Martiato *Nicolai*.

*Perversionem & Spasmodicum Cynicum* eodem modo curare sulpiciunt, observatis nempe causis, à quibus morbus iste producatur, hinc in febribus ardentibus intemperiem sanguinis ad convenientem reducant statum, Julapiis humectantibus, aliquantulum refrigerantibus & corroborantibus ex Aq. Endiv. cerat. nigr. flor. Til. cum Syr. viol. & rub. Id. A frigore verò natales si habeat, corpus ab eodem præmuniunt, ab aëre acriori cavere jubent, & intus confortantia exhibent ex decocto beton. salv. Hyssop. pol. chamapith. flor. Stæchad. antheros, in quo dissolvuntur elect. diacor. diacastor. & Syr. de Stæchad. In *Risu Sardonio* Theriacam præalix exhibent & Mithridatium. Externè fotum adhibent cum lineis in decocto rad. ltr. malv. narciss. Cyper. calam. arom. sem. lin. aneth. & c. humectatis & calidiuclule adnotis, posthæc illi nitonem instituunt oleo castor. laurino, crocino & rutaceo.

*Fissuram* Labiorum curare tentant linimentis vel unguentis emollientibus, quibus cutis à siccitate nimis tensa reddatur laxior, & unitas soluta refarciatur, qualia parantur ex oleo amygd. dulc. nucum, olivar. levo hircino, axung. caponis, gallin. mucilag. sem. cydon. psyll. In profundioribus unguentum adhibent de cerulla vel lithargyrio, & vaporum acrium ulteriorem productionem impediunt remediis sanguinis æstum sedantibus, ubi nec venæsectionem interdum omittunt.

*Labia Leporina* ad convenientem formam reducunt uniendo labia divisa, & ut eo facilius hoc præstari possit, separando prius eum utroque in latere rimæ, ut caro denudata sibi invicem adducta absque ullo impedimento concresecat, ob quam causam acu transacta partes divisa adducunt, & filo per tempus aliquod servant unitas, donec superimposito emplastro planè concresecant.

*Ulcerata* Labiorum evacuatis prius humoribus peccantibus curare solent remediis acrimoniam corrigitibus, & mitigantibus, quapropter ulcerata abluunt decocto aristoloch. agrimon. & absinthii cum parte quadam aluminis, in quo mel rosatum dissolvunt, hinc linimentum ex lithar-

*Ulcus.*

lithargyrio inungunt<sup>1</sup>, & unguento Apostolorum vel emplastro griseo ad plenariam consolidationem perducunt.

Paracelsi  
Cura in La-  
biorum  
Tumore.

§. 14. Paracelsus ad curationem *Tumoris Labiorum*, sive *Alcolæ* commodè obtinendam, ductis venarum atque meatus per transverium præcipit descedens secundum regionem, postmodum verò Tumorem sequenti inungi vult unguento ne frustra nec curetur.

R. Realgar. pp.  
Succ. chelidon. q. f.  
Formetur Unguentum.

*Tremor* In *Tremore*, *Perversione* & *Spasmo Cynico* ad sal mercuriale eliciendum sudorem provocandum esse retur, quocumque id fieri possit modo ac tempore, exhibita ægro vel theriaci, vel mithridati, post hunc verò locum affectum sequenti inungi vult unguento, ad quemcumque tremorem & spasmus convenientissimum.

R. Pingued. excoctæ ex vulpe lbb.  
Castor. destill. ʒiib.  
Terpentini. destill. cum pipere, cantharidibus  
& bacca lanci aa. ʒiij. ʒvj.  
Ad. ad ignem, & F. Unguentum.

*Fissura* *Fissura* ut ritè curentur, eo in opere sedulum esse vult Chirurgum, quo sal illud corruptens extrinsecus auferatur, quod tale urinæ optimè fieri posse promittit, adhibito postmodum emplastro de lithargyrio, ut ad pristinam consolidationem debite reducantur.

*Labiū La-* *Labiū Leporina* non per suturam, sed emplastro & pulveres glutinosos secundum Auctorem hunc curantur, detracta prius cute, ut labii partes divisæ aptè queant conjungi.

*Ulcera* *Ulcera Labiorum* curari asserit, si sal ille exterior erodens humiliter extrinsecus auferatur sale metallorum & aquâ bituminis invicem mixtis, quo remediò ulcus aliquoties in die abludendum, & more postmodum vulgato emplastro oppodeltoch vel alio convenienti claudendum.

§. 15. *Helmontius* curationem *Tumoris Labiorum* instituit aliorum revocando laticem, ne Labia ulterius extendat, & magnitudinem eorum adaugeat, quod mercurio sudorifero iuncto exhibito facillè præstari posse asseverat: externè verò cataplasma quoddam ex farina fabarum haud inconveniens habetur.

*Tremor* In *Tremore Labiorum* ad motum musculorum tumultuosum sedandum & Archeyum corroborandum, ut ab acido peregrino se facile liberet, & ab omni insultu violentiori abluatur, yix ullum præstantius novit auxilium, quam opiatum aliquod intus allatum, & axungiam humanam foris illitam, quam iidem in *Perversione* & *Spasmo Cynico* singulariter commendat.

*Fissura* In *Fissuris Labiorum* levioribus, cremprem lactis aut serum hominum sufficere putant, profundioribus verò linamentum de Thutia aut cera, nulla in usum dicit. *Labiorum Leporinum* curam peculiarem non novit, sed aliorum modo & operationi acquiescit.

*Tlora* In *Ulcere* etiam Labiorum colcothar à sale suo noxio liberatum, commodè adhiberi posse censet, adeoque vel vino, in quo maceratum sit colcothar, ulcera illa abludenda, vel mediant

oleo lini, in unguentum redactum iisdem adhibendum. Conferre quoque hisce ulceribus existimat balsamum ascensum fuliginis, seu Realgarium per nitrum, & cum respectu spiritui vini in sulphur adtingens edulcoratum sive mitigatum, quod pluribus ulceribus salutare existit.

§. 16. *Valsius* iuxta fundamenta in *Tumore Labiorum* viscositas laticis est corrigenda attenuantibus & sudoriferis, decoctis videl. lignorum cum rad. lapath. caryophyllat. herb. card. bened. salv. flor. sambuc. C. C. & similibus, nimia etiam abundantia pilulis vel aliis medicamentorum formulis ex Jalappa est imminuenda. Externè totum ex decocto bacce Junip. flor. Camomill. sambuc. herb. agrimon. & majoran. additâ parte quadam spiritus vini camphorat. tumor est discutendus, qui tamen in utero contractus vix ullam æstimat admittere curationem.

In *Tremore*, *Perversione*, *Spasmo cynico* & *Risus Sardonicus* spiritus animales à copula heterogeneâ prius liberati ad motum ordinatum sunt reducendi & sibi musculorum debitus tonus est reconciliandus, quod fit vomitorio quodam vel cathartico convenienti materiam venenatam ejiciendo, hinc instituendo sudorem, & postea specificâ contra motum convulsivum exhibendo, quales sunt lap. bezoar. Cranium humanum, Corallor. Spir. C. C. sanguinis humani. Decoctum Serpentar. virginian. & pœn. Externè locus tremens aut convulsus linimento ex ol. nucist. Capivi, castor. succin. rut. & sim. est inungendus.

Ad *Fissuras* commendantur mucilagines & unguenta pomatum, nec non butyrum recens infusum. Si sint paulo majores sequent unguentum probatè ex illorum usus.

R. Litharg.  
Thun.  
Zanzib. albi. aa. ʒj.  
Cera. ʒiij.  
Mellus aa. q. f. ut  
Fiat Unguentum.

*Labiū Leporina* manuali operationi committuntur, quæ inferius pluribus communicabitur.

*Ulcera* aquâ Nicotian. & melle rosato probe mundantur, hunc emplastro diapalme vel griseo ad integrum deducuntur sanitatem, non omnis aliquando remediis internis laticem terosum acriorem corrigentibus.

§. 17. *Sylvius* ad *Tumorem Labiorum* potissimum ab humorum effusione productum auterendum denique sua commendat remedia hydragoga, & diaphoretica, quo evacuatis humoribus peccatibus etiam tumor ille dispareat.

Ad *Tremorem* tollendum status & halitus sunt discutendi, & spiritus aquales ab iisdem liberandi, medicamentis subtilissimis, volatilibus & spirituosius, ut spiritus Ois. & c. essent. calorei alisque, quo peracto iidem spiritus ad motum placidum & ordinatum reducendi sunt anodynis, & narcoticis, quantitate minori & vicibus parvis adhibitis, inmixtis etiam prædictis, ut opus utrumque ed abfolvant felicius.

In *Perversione* & *Spasmo Cynico* humores & halitus acidi acres corrigendi sunt medicamentis sale volatili, lixivioso, atque oleo prædictis, quo spirituum impetus sedetur, itque liberius ad quamvis laborum partem inqvendani per musculos influant, internè quidem sudoriferis po-

netrantibus, ut essentia valerianæ, aqua hirundinum, & n. xci succinati; externæ verò axungia humanâ vel anguillæ, & fota herbarum & seminum calefacientium, id est, multo sale volatili præditorum ex majoranâ, roremarino, menthâ, lil. convall. lavand. sem. cumini, feniculi.

*Effusio.*

*Effusio* tollitur remediis vel acidis halitus acres mitigantibus, ut linimento de cerussa, creta & similibus, vel cutem à siccitate rigidam emollientibus, & unguento pomato, axungia caponis, mucilage traganthæ, & id genus aliis remediis.

*Labiis Leporina.*

*Labiis Leporina* arte curari vult Chirurgica cordata, liberando eadem nunc plus, nunc minus à partibus subjacentibus, quo adduci queant & conjungi labia huius, deinde excoriorum partes labiorum uniendas, mox adducendo ad invicem dictas partes, hinc continendo easdem contiguas; denique conglutinando ipsas simul & unâ cum partibus sub eâs. Separatio cruenta labiorum à partibus subjacentibus aliquando tanta instituenda est, ut tota maxilla superior carne sua & labiis denudetur, excoriorio facienda scalpello in labiorum lateribus, n. hiantibus, & partes uniendæ ad invicem adducendæ emplastris tenacissimis ex terebinthina, mastiche, sanguine draconis, thure aliisque paratis, & labiis prius applicatis, ipsisque arcu adhaerentibus, in extremis per fila fortia munitis, quorum scilicet ope ex parte, digitis verò potissimum adducuntur & uniuntur; in contiguitate post hæc artificiali retinentur nodis in filis istis emplastrorum factis, & tandem conglutinantur balsamis, inter quos reliquis præstantior iudicatur Peruvianus. Per vulnus transversum hiantia minori censetur opus habere artificio, in iisque sufficere labiorum per emplastra modo rotata adductionem, illique subnexam consolidationem.

*Ulcera.*

*Ulcera* curanda præcipit acrimoniam acidam in illis obtundendo, post hæc eadem à puris foribus mundando, & denique eadem consolidando & cicatrificando, ubi in mundificatione præ aliis convenire censetur mel rosatum, addito nonnunquam spir. Bli, ad aliquot guttas, non ad acidum acre obtundendum, sed ut ulcera à puris viscositate mudentur, quin in finem acida conducere existimat, & quidem non pura, sed mellitis & saccharatis addita, nec non in parvâ quantitate, cum aliis aut puris aut quantitate notabili usurpata, non tantum dolores producerent intolerabiles, verum ipsa insuper ulceraprofundiora adeoque pejora efficerent.

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

*Caristis.*

§. 18. Ad Cariesianorum mentem Tumoris Labiorum in utero contracti ipsis in infantulis, quamvis difficilium fore agnoscant, tentandam tamen aliquando curam sinant remediis fibras comprimentibus, & tubulos musculorum angustantibus, ne succum nutritium tantâ ulterius admittant copiam, quod fieri potest tota ex decoctione nucum cupressi, gallar. cydonior. fol. pyror. flor. balauft. sem. myrtill. cum paucis aluminis in vino rubeo, vel linimento ex albumine ovor. cretâ, borace & camphorâ. Reliquos Tumores unoquoque tempore quibusdam obvenerentes imminuere solent remediis particulis spissiores resolutentibus, attenuantibus & succum nutritiorem subtiliorem reddentibus, ut spirituosos & volatilibus, ipsisque diaphoreticis

fale C. C. volatili, essentia ligni salisfr. chamædr. aliisque, quibus simul pori dilatantur, ut partes inconvenientes attenuatz & comotæ per eosdem eliminentur, quod & medicamentibus foris adhibitis præstari potest, præprimis fermento quodam extrinsecus poris cutaneis illato, aut fibris morli & punctura quadam læsis & irritatis, quâ in re Tinctura cruci cum spiritu theriacali, rutaceo & camphorato tepidè labiis adhibita opem singularem præstitura planè confidunt.

*Tremorem* Labiorum abigere solent spiritibus, seu liquori nerveo motum ordinarium & consuetum in tubulos musculorum reconciliando ipsis remediis spirituosos, fibras simul irritatas blandè demulcentibus, qualia sunt Tinctura succini, castorei, essentia cranii humani, spiritus C. alc. lavand. sal. v. vinicamphorat. aqua hirund. picar. lunar. lil. convall. Partes laboranti foris adhibent penetrantia spasmotica, qua virtute sequens præstat linimentum.

*Tremor.*

℞. Sev. hircin. 3j.  
Axung. Custer 3℔.  
Ciner. picar.  
cran. corvor. cum  
cerubr. usq. aa. 3j.  
Ol. d. lavendul.  
nigell. aa. gr. vj.  
pitr. 3℔.  
sem. pæon. express. q. s.

M. F. Linimentum.

Defectus spirituum in senibus generosioribus remediis ambratis & volatilibus reticitur, maxime sequenti Mixturâ.

℞. Aq. sal. 3vj.  
lil. convall. spirituos. 3iij.  
Eluxir. vit. Marshial. 3j.  
Essent. ambr. 3℔.  
Spir. ros. 3j.  
lavand. 3℔.  
Syr. flor. Paralyf. 3j.  
de cinam. aut  
flor. arant. 3j.  
M. D. cochleatim.

Iisdem penè remediis Labiorum Perversorum Labiorum & Spasmodicum Cynicum curare sulpiciunt, quum tubulos optime permeent, spiritusque incateccatos ad liberiorem transitum reducant, valvulis insimul sumum convenienter reconcilient, quod internè Spiritus xci succinat, cum aqua hirundinum compos. exhibitus, externè verò balsamus spalinat. vel nervinus, vel antedictum linimentum egregie perficitur. Risum Sardonium Spiritu imprimis theriacali, camphorato & essent. diaford. tum intus, tum foris adhibitis emendare aggrediuntur.

*Fissura* Labiorum prius vel spiritu vini, in quo fol. malv. & flor. sambuci per horam unam aut alteram macerata fuerint, vel decocto flor. chamomill. in lacte ablutis, illinum mucilaginosâ & blandiora ramosa, particulas acutas inviscantia & hebetantia, unguentum nempe de aquilegia, linimentum ex butyro recenti insulso, cum creta & camphora, vel si paulum sunt profundiores, unguento aureo, quo brevi curari promittunt, etiamsi plures iisdem junctæ fuerint Pustulæ & Asperitates.

*Fissura.*

**Labia La-**  
**forma.** In curatione Labiorum Leporinorum ritè per-  
agendâ cum Sylvio Nobisque unanimiter con-  
veniant.

**Vlcera.** In Ulcerebus Labiorum præmissis diaphoretici-  
cis succos impuriore in sanguine cortigentibus,  
& tubulos obstruendos reterantibus ex deco-  
cto lignorum & Tinctura Zij fatâ, forinsecus  
adhibent remedia acidum noxium vel abfor-  
bentia ex Saturno, thutia, aliisque, vel miti-  
gantia & hebetantia, ut Spiritum vini campho-  
ratum, in quo sal Saturni fuit dissolutum, hinc  
fibras læsas denulcent & ita disponunt, ut blan-  
diore succo nutriente per tubulos easdem alu-  
ente denuò connectantur, soluta uniantur, &  
fovea particularum aptâ congerie repleatur, sic-  
que ulcus omnimodè consolidetur, quod præ-  
stant ipso unguento aureo vel citrino, vel empla-  
stro diachylo, aut, quod reliquis præstare cen-  
sent, emplastro Manus Deidicte, hæc aliaque  
ulcera optime perferant.

**Nostram-**  
**thodum cu-**  
**randi La-**  
**borum**  
**Tumorem.** §. 19. Jam demum & nostram de curandis hisce  
Labiorum morbis liberè proferamus sententiam,  
secuturi in omnibus veluti regulam Lesbiam  
usitatum methodum medendi non veterum, sed  
nostram, novis & veris hypothesibus super stru-  
ctam. Materias præsidiorum Chirurgicæ & Phar-  
maceuticæ fons abunde suggerit. Tumor proinde  
Labiorum si sit à mala conformatione &  
à nativitate, difficile admodum admittit cura-  
m, quamvis Borelius Ouf. Med. Phys. cent. 4.  
obs. 47. statuatur, labia magna in quodam pristin-  
um habitum acquisivisse, sola aquæ cum lin-  
teis frigida admotione, confer etiam Severi-  
num de effluac. med. pyrotechn. Chirurg. lib. 2. p.  
1. c. 51. de Labiorum everſa carnulentiâ & de-  
pendentiâ. Ab humore verò in Labiis collecto,  
vel lapsu, ictu, dolore, inflammatione, &c.  
humores in labia affluere facientibus, si sit pro-  
ductus, varia conveniunt deobstruentia, anti-  
scorbutica, chalybeata aliaque serum acre cor-  
rigentia; si verò serum nimis abundet, id blan-  
dioribus purgantibus educendum, pulverescil.  
Jalap. Quod dulci combinato, vel in delicatulis  
& pueris paretur decoctum ex fol. fenn. flor.  
genist. serpill. Se Zij & sem. dauci Cret. ut ita  
massa sanguinea à sero superfluo, vel ipsa vasa  
lymphatica ichore sua seroso depleantur. In  
facile vomitibus & signis ruminantibus vomito-  
ria blandiora ex Vomético etiam cum cere-  
visia exhibita, magnum sæpe afferunt emolu-  
mentum, præsertim si vitium in primis viis cor-  
rectum fuerit aqua beton. beccabung. & oxy-  
saccharo. Dein vomitibus & per hanc produ-  
ctæ peregrinæ qualitates in acidum exaltatæ la-  
bilibus volatilibus corrigantur. Sic etiam con-  
ducet sequens vel simile destillatum per tempus  
usurpandum ad humiditatem nimiam consu-  
mendam, & sanguinis & lymphæ falsedinem  
corrigendam, partesque affectas ab obstructio-  
ne liberandas.

Rad. Salsaparill. 3vj.  
chin.  
Scorzon.  
cappas. aa. Zij.  
Rasur. lign. box. 3ß.  
fol. lauri Mij.  
Herb. ceterach.  
rut. murtar.  
apiithym. aa. Mss.

summit. serpill.  
flor. scabios. aa. p. iij.  
El. diascord. Zij.  
Cum aq. scabios. vin. & succ. beccabung. F. l.  
à Destillatum ex organo vitreo.

Interponantur varia Martialia, aperitiva salina,  
ut Spiritus aperit. Mæbi, Essent. hypo-  
chondr. item conducunt omnia amara diu ulu-  
rata, ut Elix. antifebr. Myns. Optima Mar-  
tialia sunt acidulæ, præsertim si malum ortum  
suum habeat ex primis viis, quæ acidulæ non  
tantum ope Olii viscerum æstum placant,  
& obstructions quascunque reterant, sed &  
serosum laticem superfluum per urinam & sudo-  
rem evacuant, absque ulla læsione ventriculi,  
quam sæpe acidulis utentes timent, modò non  
nimia fumantur copia, vel harum loco Tinct.  
Olii & usurpanda, vel acidulæ artificiales.

In scorbutico caractere varia antiscorbuti-  
ca conducunt, in quem finem proderit cura læ-  
dis asinini vel caprini, vel etiam vaccini, cum  
Thee usurpati, interpolatâ Aquâ antiscorbuti-  
câ à Celeberrimo Bonteko amico nostro dum  
viveret intimo, in tractatu suo Belgico idioma-  
re scripto. Sudorifera remedia aliquoties re-  
petita hic sæpe omnem abolunt paguium, ape-  
riendo poros & liquorem contentum ita rarefa-  
ciendo, ut per aperta ista foramina facile exha-  
let, quæ proinde ipsâ venæsectione, quibus-  
cunque cucurbitulis, tum siccis, tum scarificatis,  
longum anteponimus. Habeant itaque junio-  
res sibi commendatam sequentem mixturam  
diaphoreticam.

Æ. Ag. rot. smar.  
flor. sambuc. aa. Zij.  
Spir. lumbric. 3ß.  
Essent. viperin. 3ß.  
Syr. diascord. simpl.  
de scabios. aa. Zij.

M. Propinetur una vice: nec negligantur  
diuretica varia Salina, quæ sæpe serum abundans  
per vias urinarias educunt.

Externè varia applicantur exsiccantia & deob-  
struentia, illinatur Tumor Spiritibus volatili-  
bus, ut aqua Regin. Hung. essent. viperin. ma-  
ritata, instituitur focus & humus ex resolventi-  
bus.

In curatione Tremoris Labiorum ritè præstan-  
dâ Chirurgica inter præsidia merito in prima  
acie collocamus vesicatoria brachii vel nuchæ  
apponenda, ubi tamen frictions etiam conve-  
niunt, dropacæ & sinapismi ad materiam tubu-  
lis infixam & nervis illapsam rarefaciendam &  
evacuandam, in quem finem nobis magis pla-  
cent blanda paregorica & resolventia nervina  
ex fonte pharmaceutico defumenda. Affectus  
hic si ab inopia & coagulatione existat spiritu-  
um, uti sæpe in moribundis observamus, tunc  
varia spirituosâ infundantur atque volatilia, &  
quidam cephalica, quæ diximus in Encyclope-  
dia Medicâ capite de Paralyſi, non enim aliter  
curandus venit hic affectus, quam paralyſis. Sin  
affectus est à coagulato chylo vel aliorum succo-  
rum, tum & eo cura dirigenda, & semper ad  
causas obvrienda est, nempe si sit à vomitu,  
vomitum sistendus, si ex inopia spirituum, illi  
spirituosus recreandi sunt.

Externè varia topica ad spiritus animales  
Z 3 coa-



coagulatos resolvendos applicentur, in quem finem conducunt Aq. Apoplect. Lang. Regin. Hung. Spirituosa item castorina ac volatilia, de quibus alibi.

*Perversio-  
nem.*

In *Perversione* Labiorum 1. Spirituum ac humorum in labia influxus tardior ac spasmodicus irregularis promovendus & demulcendus est; 2. Spiritus lununa *arvensis* ac dyscrasiam laborantes confortandi ac corroborandi sunt; 3. Lymphæ *gæcis* ac vappescencia impedienda ac copiosa eliminanda. Spirituum verò atque humorum tardiorum influxum ac motum promovere debemus, *Zecch. in consult. pag. 851.* Clysteres quoque ex variis herbis nervinis emollientibus ac stimulantibus parati applicari possunt, singulari enim vi pollent partes inferiores tanquam fotu fovendi, & sic succos viscidos resolvendi, ut inibi sese liberent ab irritantibus peregrinis humoribus; & hinc clysteres in omnibus motibus convulsivis ac affectibus capitis sunt convenientissimi. Præ aliis commendo diaphoretica.

Ut materia ex alto ad superficiem alliciat, sed & humores corrigantur, velicatoria, aliis incallum adhibitis, tentari possunt, sicuti quoque non incommoedium foret, in recidivæ metu fonticulum in brachio excitare. Frictiones, dropaces & sinapismi etiam adhibentur à pluribus.

Adhæc anomalum & tardiorum spirituum & humorum in partes musculosas Labiorum influxum blandè demulcent ac detinent medicamenta sulphureo anodyno delibuta, blandisque particulis paregoricis & suavi *arvensis* gaudentia, verb. gr. Laud. opiat. *Langolotti.* Theriac. coelest. n. d. item Effluat. anodyna ex Laud. opiat. p. iij. bals. apoplect. p. j. cum Spiritu vini Plato, acuat prius cum Spiritu Oxi dulci, parata. Spectant quoque huc ex vegetabilibus Vitæ, ol. destill. buxi, famulosi Heracleum, Aq. Regin. Hungar. in omnibus convulsivis morbis internè & externè remedium cupitissimum.

Potro spiritus dyscrasiam, imprimis crassitie insigni laborantes resolvunt ac nervos consolantur medicamenta sale volatili blando sulphureo pollentia, quæ spiritibus convenientem schein acrasiam seu motum iraducunt, ipsique maxime amica existunt; laudem hic merentur Spir. æci urinofus, cum V Apoplect. vel lil. convall. spirituosus mixtus, ac externè applicatus, item spiritus nervin. volat. ex succin. castor. croc. bals. Peruv. cum Spir. vin. additâ f. q. Salis Qi & æci destillatus, item Essentia castor. cum Spiritu cephal. & hoc nervino penetrantissimo parata, aliaque epileptica & cephalica jam alibi ad nauseam dicta remedia, ut sunt cinabarina, volatilia, urinosa & sulphurea, pulv. spasm.

Visceribus quoque minerali foventibus prospiciendum, infarctus eorum tollendo, motum restituendo & dyscrasiam M. S. corrigendo, quod optime præstabunt acidulæ, Martialis & aperitiva, vulgo splenetica dicta, aliaque absorbentia.

Tandem lympham stagnantem ac vappescentem acido charaginate notam in ordinem redigunt, corrigunt ac noxium evacuant salivantia, quæ specificè spiritus animales movendo lympham movent, ob hanc causam divinas medentibus porrigunt manus in desperatis quibusdam morbis à lymphâ spirituosa stagnante incurabula agnoscentibus. Omnem huc supe-

rant laudem Ius dulce. Dastro imprimis exaltatus, item Ius cum O & N amalgamatus, & Δ fortiter per diem administrato, in pulverem rubicundum egregiè lympham moventem, qui vera panacea de la Vigne, Medici Regis Parisiensis existit, redactus, cujus dosis est à gr. 2. ad 3. Nec inferioris energiae quoque est amalgama Iii; O bene per lotionem I scorii nigricantibus depurato, & frequentiori aquæ abstractione in pulverem rubicundum fixatum.

Si verò ab inanitione, seu nimia acrimoniâ, seu evacuationibus immodicis inductus fuerit *Spasmus Cynicus*, conveniunt medicamenta & diata analeptica atque humectans. Laudantur hunc in finem Tinctura corallor. Confect. Alkerm. analept. *Rolfinc.* Spiritus cordal. balsamicus, balsam. nervin. m. d. & alia.

Si malignitas, h. e. nimia visciditas acris sanguinis & reliquorum succorum ad motum ineptorum conjuncta est in *Risu* imprimis *Sardamo*, unaranda cum cephalicis antedictis Bezoardica, Tinctura vel Pulv. Bezoard. Essent. viperar. theriac. Convulsiones enim epidemicæ & malignæ bezoardicis potissimum mitigantur.

Si scorbutica sanguinis depravatio addit, antiscorbuticis agendum. Si vulnere aut puncturâ producat, iis prospiciendum.

Sequens balsamum externè hoc in casu mira præstat, & incantamentis instar spasmodicos innotus sinit: R. Ol. Hyoscyam. exp. & destill. q. v. quod cum ol. N. M. ol. castor. Zibeth. bals. Peruv. addito momento cinnab. nativ. & gutt. ol. rutæ, salv. rorismar. M. F. Balsamum, quo illinantur Labia convulsa. Celebre quoque est linimentum *Pemsi*, quod tale est:

R. Ol. terebinth. 3℔.

caryophyllat. gr. vj.

Mucilag. bryon. q. f. ad consistentiam Linimenti.

Inunge locum affectum cum insertione & origine nervorum. Miscei quoque possunt olea succin. Junip. Lavend. anthos. angelic. cum aq. apoplect. Regin. Hung. vel Anhal. & tantillo Spir. æci pro balsamo liquido nervino externo penetrantissimo, quæ sale suo volatili, quo prædita sunt, penetrant, & stagnantes succos ad motum incitant. Speciatim ol. Lavendulæ specificum est in convulsionibus nervorum à vulnere & punctura, tam internè, quam externè. Ante inunctionem balneum vaporosum ex decocto lavendul. salv. rorismar. origan. & lapidibus ignitis affuso ad porosulos & tubulos laxandos, & levem sudorem proliciendum conducet. Post balneum verò & inunctionem partem convulsam studiòse à frigore præmuniendam monet *Septalius*. Hinc *Riverius* pelle atietis adhuc calente partes convulsas ab inunctione tegit. Nobis faciliè cephalicis refecti calefacti impositi placent. Nec incongruum forte foret Theriacam vel Elect. Orvietanum tantillo Spir. lavendulæ vel Juniperin. subactum alutæ indutæ applicare. Sidelor urgeat, focus ex anodynis & paregoricis instituendus. Inter emplasta excellent diaphoreticum *Myrs.* nervinum, de galbano; inter olea succinum & lavendulæ. In contumaciori malo ad thermas *Æneas* mittendū sunt ægri.

Ad *Fissuram*, *Romas*, *Rhagades*, in Labiis vel à *Fissura* frigore

frigore, calore, siccitate, particulis acribus & salis contractas curandas conveniunt varia serum corrigentia & eductantia, in malo diuturno purgetur nodulo serum salis educante, vel detur pulvis Gialappæ cum Mero dulci, item prorenata dentur varia antiscorbutica serum id falsum corrigentia. Si malum est à lue venerea hæc prius curetur; si à febris, ad eas cura dirigenda est.

Externè conveniunt varia blanda demulcentia, ut sunt mucilagines sem. cydon, psyll. quibus addi potest saccharum. Si parum camphoræ & Mero dulc. præsertim si quid luis Gallicæ subest. Illinantur Labia Unguento de sevo hircino *Mysf.* quod excellens, vel imponatur emplastrum de carne bubulâ ejusdem, vel illinatur tantum axungia anseris. Raro Medicus vel Chirurgus hisce in calibus consulitur, quia vulgus utitur pomato vel alio simili unguento, delichargyrio sc. vel de cerullâ cum camphora. Si à frigore malum fuerit contractum, omnia ea quæ de Pernionibus habemus, conducunt, ut acidum æris infringatur. In Fissuris Labiorum quibuscumque optimum remedium est, quod paratur ex oleo amygd. dulc. cerâ & mastich. vel ex litharg. myrrh. & zib. aa. p. æq. cum melle & oleo olivatum sequens unguentum in fissuris labiorum est optimum.

℞. Ol. olivar. vel papav. ʒvj.  
cera alb. ʒij.

Cernis. ʒiij. ʒxv.

M. Unguentum nostrum rubr.

Fissuræ quoque sæpe saliva propria illinantur. Laudantur ab omnibus pinguedo ex cochlearibus lignis exfiliatis, vel serum cervinum illitum sufficit vel ol. ovor.

In Labiis Leporinis curatio non est alia, quam Chirurgica, licet Cap. Nosocom. Infantil. c. 19. ad Labia Leporina infantum statim secundò die post partum imponere jubeat ter in die cum linteis sequens unguentum.

℞. Ol. oliv.  
pic. commun.  
pingued. canis,  
taxi aa. ʒi.

Liquefiant ad ignem, dissolv. in iis  
mastich.  
oliban.  
Galban. aa. ʒiij.  
F. l. a. Unguentum.

Sic & Sydenham mentem esse jam percepimus, ut Labium Leporinum absque acubus sanetur, solâ ope emplastrorum, Hæst-Plaster atque Chirurgum in Batavia nonnullos hoc pacto sanasse meminit D. Mayi Prax. Rational. p. m. 313. Accedendum tamen aliquando est ad ipsam operationem Chirurgicam, modò vires & ætas permiserint, Chirurgia enim in Senioribus & cachecticis subiectis, v. g. Scorbuticis, vel in quibus ulcera non facile coalescunt, eo quod inter reliqua corporis membra labia quoque cancerum facilius admittant & conceptum difficilius dimittant; in junioribus vero corporibus & infantibus felicior hujus operationis successus est præprimis lactantibus, quamvis Guillemeau p. 415. contrarium asserat testatur, nihilominus Ronhyfen P. 2. Obs. 2. Petrum Roliesie aliquando in persona 28. ann. labium leporinum felicissime sanasse: & si in infante hæc operatio fiat, inutilis erit cautela Dn. Ronhyfen, sc. ut is per 10. vel 12. horas vigilet, quo post operationem

felicius somnum capiat, & diutius quiescat, quia inde & facilius alia incommoda oboriri possunt. Hiatus, præsertim in osse, non sit nimis magnus, & auferri callositas maxillæque prominentia, si adit, possit; hic caput laborantis, si infans fuerit, viri alicuius femori impositi & involucris debite, ne manus movere queat, ligati, ab alio à tergo adstante convenienter detinetur, mox cultello incisorio labium utrinque à maxillâ osse celeri manu separatur, hinc fornice acutâ extremitates labii callosæ auferuntur, imò forcipe simili particulæ maxillæ protuberantes. Hoc facto ab eo, qui caput tenet, labium utrimque quoad hiatum coarctetur, quod dum fit, Chirurgus acustre tripides, posteriùs globos insigni præditas ordine, primò superiorem, tunc mediam, inferiorem ultimò per utriusque lateris extrema hiantem in spatio certo trajicit, floreticeo rubro, quo omnes instructæ sunt, cruciatum ea constringendo, curiosè ad delibitum & decentem figuram respiciendo, unde in principio conveniens est, spongiâ vino tepido humefactâ locum affectum mundare. Sericeum filum acubus circumductum balsamo vulnerario vel Capaiva calefacto madescat, imò emplastrum eodem humefactum cum alio sicciore imponatur, quæ ut firmius retineantur, & confusæ ipsæ partes non faciliè iteum separantur, linteum forte extremo utriusque emplastro validè adhærere valente inunctum, adeoque utrique malæ agglutinatum apponatur, & ligamentis aliis rite omnia convehentur, bene observando, ne nares claudantur, & hinc respiratio inhibeat. Sequentibus diebus 1. 2. & 3. prore nata filorum dictorum aliqua portio indies auferitur, imò acus mediâ tertio die intotum ferè auferri potest, semper extremitates acûs forcipe simul demendo, superior quarto, ultima quinto, nisi vagitus infantis impedit. Semper Chirurgus operationem hanc instituitur aquâ cordiali Vol. carbunculi instructus esse debet, ad lipothymiam auferendam, in quam sæpe incidunt ægroti, & dum deligatio fit manu ministri, buccæ anteriora versus assiduò premi debent, ne solutio nova oriatur, omnia hæc testante D. Blasio, Confer. Hieron. Fabricii in tract. de operat. Chirurg. pag. 30. quomodo Labia curta resarciantur, item Severinum lib. 1. de Efficac. Medicin. Chirurg. p. 2. de Sectionib. c. 125. de Scissura Labiorum Leporinorum, &c. item vide operationem hanc p. 71. Microtechn. Hornii. In infantibus semestribus operatio hæc Chirurgica plerumque exercetur, nam juniores si sint, carnem adeo mollem habent, ut illâ minimâ de causâ laceretur ab acubus inhaerentibus, ac in ætate magis maturâ labii fissi extremitates tam promptè non coalescunt, ut optumè monet Cl. Mayi Chir. Rational. p. 517. In eo etiam totius curæ cardo vertitur, ut utraque labii fissi extremitas sufficiens excorietur, ac uniat, unitaque servetur vel emplastro glutinantibus vel tribus acubus argenteis, vel melius chalybeis, quæ non facile tanguntur rubigine, circum quas filâduci debent, ut acûs in situ suo retineantur & cuspides acuum instrumento idoneo abscindantur ne noxam inferant. Ipsæ acûs in diem quintum tantum relinquuntur.

Ulcera Labiorum curatio ab aliarum partium ulcerum curatione nihil differt, si malum est ex ipso ulcere, tum internè neque purgantia, neque stomachica puid profunt. Si verò ab aliis humo-

humoribus acerbis stagnantibus, conveniunt absorbentia, quibus semper addatur aliquid *Œii* dulc. ad gr. v. præstant tamen sudorifera, imprimis *Œata* & *Œata*, quæ præ aliis medicamentis hic maximè conveniunt.

Inter topica magnificimus emplastrum Saturni cum croco Martis impositum, unguentum diapomphol. deliquirit. &c. Fonticuli in serofa colluviei abundantia quandoque conceduntur. Sequens mixtura in puero Labiorum Ulceribus scorbuticis cum multis crustis divexato, post interna sanguinem depurantia à visciditatibus acerbis ventriculum & intestina roborantia, & antiscorbutica, singularem præstitit opem, quæ labia ulceroſa & crustata aliquoties in die fuerunt illita, & bene mundata.

*℞. fol. saliv.*

*veron.*

*aquileg. aa. M℞.*

*rasur. lign. Guajac. ʒij.*

*In f. q. aq. simpl. F. Decoctionem, cuius*

*Colatur. ʒij. add.*

*Tinctur. salut. ʒij.*

*Terr. ʒi. dulc. ʒij.*

*Spir. Sal. gut. vi.*

*Syr. de torm. mill.*

*scabios. aa. ʒj.*

*M. Illinatur pluma*

*Vcl :*

*℞. Tinct. af. farid.*

*myrrh.*

*benzoïn. aa. ʒij.*

*Campbor. ʒj.*

*Ol. ovor. ʒj.*

*sabin. ʒ℞.*

*Elix. vit. ʒij.*

ablatur exulceratio, dein utere sequentul, nuper Empiricus curavit ejusmodi ulcus cum *Œiort.*

*Spir. vin. dulcif.*

*℞. ungu. Basil. ʒ℞.*

*Tinct. benzoes.*

*myrrh.*

*styrac. liquid.*

*ſperm. ceti. aa. ʒ℞.*

*ocul. ʒ℞. pulv. ʒj.*

*bals. Peruv. ʒij.*

*camph. ʒ℞.*

*Elix. vitæ. ʒ℞.*

*M.*

Ulcus labiorum nuper curavi seq. linimento.

*℞. butyri majal. & cum duobus cancriſiſturvialibus viv. confusis frix. ʒj.*

*Tutia ppt. lap. calaminar. aa. ʒ℞.*

*lytharg. ʒ. ʒij.*

*Grubr. ʒ℞.*

*ʒ. dulc. ʒj.*

*M. exaltè sup. porphyry.*

Moneo enim hic Chirurgos, ne ulcera ista contumacia leviter curent, cum magna acrimonia sæpe adit, & cancroſa qualitas, quæ ab unctuosus & emplaſticis exasperatur, abſtergentibus autem exſiccantibus & abſorbentibus cinnabarinis, aliisque volatilibus & Antimoniatis, convenientiſimè corrigitur. Naſo exuroſ. labiisque & facie exefoſe eſſe ab ejusmodi conſortium perverſo curandi modo manifeſtum eſt, teſte celeb. Curioſorum Præſide, doct. Traſſaun de Scorzonæ. p. 87.

## C A P. XX.

### *De Faciei Morbis, Gutta Roſacea cum & ſine puſtulis, Inflammatione ejusq; ſcil. Phlogiſi, Varis & Maculis.*

§. I.

**H**abet Facies mirum & inexplicabilem cum animo conſenſum, quo nomine nuncia, imago, exemplar, ſpeculum & theatrum animi audit, pictura item conceptum, & à *Cicerone* & *Pifone* tacitus quidam ſermo appellatur, quoniam in facie indoles, ingenium, mores atque affectus animi, ſecretioraque mentis arcana elucet, ut haud immeritò *Momi* damnata ſit ſententia, qui ut animi pathemata paterent, fenestra optabat corda. Hinc illud *πολυδιδανον* ortum fuſſiſſe videtur: Pulchra facies muta commendatio eſt. Facies enim bona & laudabilis (*Eccleſ. c. 1.*) eſt veſtigium boni cordis. Facies quoque ſi ſit pulchra, tantam habet gratiam, ut deformitatem cæterorum membrorum facile tegat. Contra ſi in quantitate aut qualitate turpiſſit, ac virioſa, reliquum corpus, quantumvis ſit venuſtum, dupliciter ſolet: unde faciem pletique omnes, imprimis verò ſexu ſeqtior, tanti faciunt, ut de nullius partis cultura magis ſint ſoliciti quam faciei, hinc vitia ejus ſuco, ut *Plautus* in *Captiv.* loquitur, occultant, variisque pigmentorum, & quod pejus eſt, veneratorum generibus colorem, quemadmodum *Quintilianus* ait, mentiuntur. Facies namq; prima viſum movet, prima placet, prima allicit, prima animum lubet, prima amoris ſemina ſpargit. Hæc hominis facies medendi artificii-

bus ad dignoſcendam ſanitatē & ægrotudinem haut parum conſert, etenim quibus illa florida eſt, vividoque colore prædita, & mediocriter corpulenta & figuram habet naturalem, ſanitatē eſt nuncia; quæ verò contrario planè modo eſt affecta, hominem ſiniſtra premi valetudine ſignificat. Videmus enim ut ſaveat facies in Ictero ſtavo, ut nigricet in Arquatq; nigro, ut palleat in affectu *ſeputiſ* ſeu amatorio, ut liveat plumbeumque colorem referat in obſturbatione menſium, ut albiceat in morbo virgineo & Cachexiâ, ut ardeat in phreneticis, in phlogiſi, ut cadaveroſa appareat in lyncope, ut torva, triculenta, minax & horrida conſpiciatur in Maniâ, ut punctulis notetur variis in Variolis & Morbillis, ut tota contabefcat, exareſcat & conſumatur in Phthiſi & Marafmo, ut pilorum, palpebrarum & menti patiatur jaſturam, variisque labeculis, nævis & puſtulis deformetur in Lue Gallica, ut vividum deponat colorem, denſior, durior, aſperiorque evadat, verruſis atque tuberculis lividis conſpurcetur, pilis exuatur, & calloſa glabraque ſupercilia, reſinas & obſtructas nares, cralla, fiſſique labia, & auriculas tumidas valdeque denſas acquirat in Leptrâ, Elephantiaſi Arabum; quàm denique horrenda ſit illa, quam *Hippocrates* in limine ſuorum prognosticorum, in animam agentibus deſcribit.

Non

Non minori fœditate deturpatur facies in illo vitii genere, quod vulgo *Guttum Rosaceum* vocant, & inde *Rosacea* dicitur, quod facies guttis quibusdam roseis sit conspicua. Dicitur & *Rubedo* faciei, quoniam facies in eâ rubore suffusa, Arabes *Abeladseum* dicunt, cum facies hoc in affectu cupio seu æri Cyprio polito colore haud ab similis sit, Germani eum, ein roth sinnicht und rûpffern Angesichte appellat, sicuti *Veros & Pustulas* illi non raro associatas dicunt die *Gutten des Angesichts*: item quod Rabinus limiles sunt pustule, Et handelt mit Rubis nen. Describitur vulgo, quod sit Rubor p. n.

Guttarosa facie quid:

Phlogose.

*Phlogose* in facie apparentes, quæ & dicuntur *Vaga Escandescens*, rarissime in Medicorum scriptis exposte, Practico frequentissime tamen obvix, describi possunt, quod sint obstructiones minutissimorum faciei tubulorum ab acido volatili factæ. Hinc acidum illud volatile frequens ac subito totum corpus pervadit, & in facie obambientem ætrem poros angustantem intra fibras subsistit, easque motu quodam vibrante exagitat.

Vari.

*Vari*, Græcis *torbo* dicti, & vulgo signa Venerica credita, quod indicent hominem Veneris facis idoneum, sed abstinentem, unde & Germanis die *Venus Blumlein* audiunt, rubecula sunt dura & parva à particulis pinguioribus spiritu turgidis ad faciei mulculos delatis, & ab acido ibidem præcipitatis & coagulatis, ut nec in vasa resorberi, nec per poros cutaneos exhalare queant, sed ibidem diutius morantes fibras distendant, & faciem reddant cum aliqui rubedine tuberofam.

Macula Variæ &amp; Navi.

*Macula* sunt quoque faciem defædantes, hinc dicuntur quædam *Leuægines*, *Synes* seu *Macula Salæes* (Connen) *Gleden* quædam *Navi materni*, qui variorum sunt colorum, nigri nempe, fulci, flavi, rubri, viridiusculi, diversarum etiam figurarum, pro diversa imaginatione matris factum gestantis.

Differentia Guttæ Rosæ.

§. 2. *Differentia* Guttæ Rosææ vulgo tres statuuntur: 1. est, quando rubedo absque pustulis & ulceribus faciei adest, vocaturque absolute *Facies rubra*. 2. Cum adsint etiam pustulæ vel vesicæ, dicitur Rubedo faciei pustulosa vel vesiculosa. 3. Quando ulcera quoque faciem obfident, & Rubedo faciei ulcerosa nuncupatur. Sed hæc distinctio inanitas est, sufficit, quod Guttæ Rosææ suos gradus habeat, & tantum differat secundum magis & minus, hinc in primo gradu acidum non adeo acre existit, atque in posterioribus.

Phlogose.

Brevitas, frequentia ac subitanea *Phlogoses* in vasio ab aliis corporis fervoribus ac caloribus ipsam differre monstrant. Aliæ etiam sunt vage illæ volatiliz maculæ, *Slugæ* vocatz. *Phlogotes* vocabulum quidam cum *Phlegmone* malè confundunt, quamvis & hi affectus secundum magis & minus differant. Notum enim est omnibus Practicis, ejusmodi coagulationes effrenesque obstructiones in corpore humano absque febre se prodere posse, si considerent Maniacorum feroces iatationes, epilepticorum turgescientes convulsiones, hysteriarum vagabundos impetus, hypochondriacorum subitos dolores, hæmorrhoides, murrura, scorbuticorum, icte-

ricorum, cachecticorum asthmata, Arritides, Cardialgias, gulæ ardores, purgantium actiones & similes affectus, qui cuncti à ferocientibus, scorbuticis acribus, & coagulatis fucis oriuntur, quod dubium etiam refellit celeberr. *Waldschmidt* in *Disp. de Morbo anlico*, ajens 7 h. 23. alterum dubium, quod scil. sanguinis fermentatio sæpe sæpius cum tumultuoso particularum motu incendatur, nulla tamen subsequente febris, pari facilitate refellimus: quandoquidem probe hic distinguere debemus effervescentiam à turbata mixtione. Illa enim est in aqua ebulliente & in acidulis actu frigidis notatur, neque tamen est, qui dicere audeat, ipsam quoque mixtionem ibidem lasam & turbatam esse. Hæc enim præsupponit insensibilem particularum immutationem, quâ alii foimentur pori, aliæque & nova inducitur textura, id quod in vino fulmine tacto videre est.

Locus Guttæ Rosææ.

§. 3. *Sed* seu locus *Guttæ Rosææ* cutis faciei est cum suis tubulis & vasculis, nonnumquam subdix quoque partes, in quibus sanguis stagnat & coagulatur, si enim jam diu malum protrahatur est, fieri vix potest, quin & contiguæ afficiantur partes. Subiectum verò causæ est ventriculus & primæ viæ, in quibus ipsa hujus mali causa frequentius solet latere, ex acido enim & spisso talis inaguis fit.

Phlogose.

Subiectum *Phlogose* in genere est totum corpus, modo enim hæc, modò illam partem occupat, hic verò imprimis petit faciem, nec ab ipsa immunes sunt os, gingivæ, fauces, gula, ventriculus, intestina, thorax, caput, brachia, crura. Tota quoque Massa sanguinea & alii humores faciem alluentes subiectum constituunt causale, nec spiritus, nec viscera cum glandulis excludenda sunt.

§. 4. Cum *Guttæ Rosææ* se foras proferat, *Diagnosi* omniumque oculos incurrat, *Signa* ut tradimus, necessarium non est, quis enim visû deprehendit roseis istis guttis faciem commaculanti, aut in eâ extuberare pustulas, aut ulcuscula ejus cutem dilacerare.

Phlogose.

Signis quoque ad *Phlogoses* detegendas opus non est, ætri enim sentium ac referunt, intò & adstantes plerumque, cum adsint, easdem cornunt in facie aliarumque partium exterioribus. Scorbutum produnt gingivæ languinolente, saniose, tumidæ, albescentes, maculæ cruræ & brachii tingentes. Si verò à sulphure, salis, acribus, pungentibus & acidis particulis, ex siti, ardore ac siccitate gulæ, hæmorrhagiæ, narium, urinæ flammæ, &c. signa petantur.

Macula Variæ &amp; Vagæ.

Reliquæ *Macula*, *Pustulæ* & *Vari* ipso etiam adpectu cognosci possunt, nec non tactu, *Vari* enim duri sunt & interdum callosi, pro majori fucis peccantis sub cute collecti & ab acido coagulati spissitudine & renacitate.

§. 5. Progredimur ad *Ætiologiam*, quam veteres *Galenicis* instituant, ut in *Guttæ Rosææ* tanquam causam proximam acculent sanguinem crassum & fervidum ad faciem delatū, & ibidem ob crassitatem istam hærentem; procatardicam verò intemperiem hepatis, imprimis calidam, vel naturæ vel diætz vitio inductam, sicque causam proegumentam intemperantiam constituunt in potu admixtam, & alimentis calefacientibus vi præditis, ut aromaticis frequentius & copiosius in cibo usurpatis, præ aliis verò vino generoso hepatis valde accendendi.



**Phlogosis.**

*Phlogosis* causam statuunt vapores multos, crassos & acres, interdum per sanguinis ebullitionem, vel in febribus ardentibus aut malignis, vel in scorbuto à corrupto in liene sanguine, vel in Hepatis intemperie calida commotam ad faciem aut alias quoque corporis partes transmissos calorem & roborem in iis accendentes.

**Variorum.**

In *Varis* ut causam acculant sanguinem seu succum & nutrientem ab humore atrabiliari sibi admisso crassiores, quam ut à facultate nutritrice partibus vitæ aptari queat, unde in poris hæreat & quandoque quendam profundat ichorem, sæpe ulcera excitantem.

**Maculæ.**

*Macularum* causam frequentiores statuunt sanguinem biliosum adustum cuticulam occupantem, & ibidem in humorem melancholicum degenerantem: illarum verò varias species facti impressas & *Neuorum materiarum* nomine insignitas ab imaginatione matris originem habere sentitur, licet veram ejus ortus rationem sufficienter nequeat explicare.

**Paracelsi  
judicium  
de causâ  
Guttae Ro-  
saceæ.**

§. 6. *Paracelsus* proxima à Galenicis vestigia premitens, *Guttam Rosaceam* provenire docet ex croco, Martis habente naturam, qui in carne Marti subiecta per totam cutem circa poros expulsi, & crocæ tinctura sit Martialisque, sine tincturâ sanguinis aut carnis, unde caro in suæ minere naturam transcat, pro augmento mineralium eo loco sanguinisque metallici, quo fiat ut color faciei primò flavus appareat, deinde rubicundus, indices magis absque bullis vel pruritu, donec vocantem colorem cutis & caro simul acquirantur.

**Phlogosis.**

*Phlogosis* causam in Mercurio quærit stabulante in quibusvis corporis membris, dum agitur ille incenditur, quod ex satietate frequentius contingat, & per totum corpus sursum deorsum fertur, ut in pellicano variè & exquisitè circuletur, unde sublimatus ad superthiam corporis pervenit, eadem cum calore unum ex coloribus propriis imprimit, maxime ruborem, donec præcipitatus graviores morbos aliquando inducat.

**Variorum.**

*Variorum* causam consistit liquorem nutrientem tincturæ Martis immixtum, ad superficiem carnis delatum, & ibidem subsistentem, unde cum robore tuberculum excutitur.

**Maculæ.**

*Macularum* varias novit species, ex quibus *Panni* proveniant colore emortui, ubi id, quod moritur, in corpore fixum maneat: *Lentiginis* liquoris dicit esse Mercurii, qui vergat in sui regenerationem; *Nevis* ab imaginatione matris produci statuit, à quâ alia interiora citissime commoveantur, ut fortui hæc vel illa macula imprimatur, pro diversitate rei externæ imaginationem agitantis.

**Secundum****Helmontium****causa****Guttae Ro-****saceæ.**

§. 7. *Helmontius* secundum principia *Gutta Rosaceæ* causa ad exandescendum Archæi referri potest, quatenus à re molestâ, vel è larice, vel è cruore emergente irritatus furoris ideam concipit, & roborem, ut signum illius indignationis, in extremitas faciei partibus exponit.

**Phlogosis.**

*Phlogosis* ortum habet à cruore in venis mela-ræis non satis depurato, sed uni cum sale volatili multum acidi in sanguinem inscrescente, quod dum spiritus sanguinis à volatilibus partibus separare necesse habet, magis in se accenditur, unde & cruoris salvolatilis majori vi accensus, notu violentiori totum corpus pervadit, & ipsum Archæum ad aliqualem commovet exandescentiam, quæ tamen propterea non diutius durat, quod Archæus à peregrine hospite non adeo

violentam, sed leviorē tantum patiatur invasionem, quam brevi tempore à se valet depellere.

*Varis* ab eodem cruore laudabili scimento destituto oriuntur, dum in externâ faciei parte quædam ejus cruoris portiones inepte sunt ad nutritionem, nec sensim ad volatilitatem transponi possunt, sed remanentes istiusmodi tubercula producant.

*Macula* ab impuritatibus sextæ digestionis relictis & translocationi ineptis oriuntur, sæpe etiam ab imaginatione matris perturbatâ alimentum fœtis, ei ut ramulus arbori inseri, inficiet.

§. 8. *Wilsius* ex principiis causâ *Gutta Rosaceæ* adscribitur aciditati liquoris cutanei & recrementis sanguinis sibi invicem junctis, & effervescentiam in glandulis excitantibus, unde pori cutis obstruuntur, transpiratio particularum impeditur, & à fervore succorum diversorum calor & rubor in cute suscitatur.

*Phlogosis* oriuntur illi à succi nutritii degeneracione, ob quam cum sanguine non ritè miscibilis effervescentia quasdam concitat extemporaneas, quas aliquando à materiâ quâdam extraneâ cum succo nutritio sanguini illatâ similiter excitari novit.

*Variorum* originem imputat concretionibus acido-salinis in massa sanguinâ contingentibus, quæ subigi aut dissolvi nescientes in cutem faciei depellantur, dum per unum vel alterum ramum faciem respicientem eò convehantur.

*Macula* provenire vult à portionibus sanguinis secretis & ab eo penitus derelictis, adeo ut nihil illis cum sanguine circulato deinceps commercii fuerit, unde nec in molem accrescant, nec suppurentur, nec faciliè evaporent. *Lentiginis* & maculas citrinas aut obscuras exilimat portiones quasdam esse bilis flavæ aut atræ & sanguine in cutem suffusas. *Nevis* verò portiones sanguinis aut cruoris corrupti ab imaginatione matris fortissimè agitas, ut arteriarum foras oculos extrule in cute ejus defigantur.

§. 9. *Sylvius* de causis horum morborum judicium est, quod *Gutta Rosacea* oriatur à bile ab acido corruptâ, accedente igne quodam externo vel ælesti, vel sublimari, & concretum illud nocentius reddendo, unde faciei cutis eo facilius hisce maculis notetur rubris, quoniam præ aliis corporis partibus igni illi exponatur.

*Phlogosis* causa est vitata bilis cum pituitâ, aliisque succis eadem immixtis effervescentia, ex quâ halitus exsurgunt cum sanguine faciliè in totum corporis habitum dissipabiles, qui dein ante plenariam dissipationem & resolutionem aliquem cum calore ibidem excitant roborem.

*Variorum* causa est acidum quoddam minus acre in sanguine la itans, cum eo ad faciem cutem delatum, & ab externo calore suscitatum, unde tubercula ejusmodi cum robore & aliquali interdum dolore attolluntur.

*Macula* à simili quodam acido depinguntur partem quandam faciei corruptente sua acrimonia, & hinc maculæ ab acido productæ ad roborem inclinant, atra verò ab acrimonia dependent salinalixiva. *Nevis* fortui ab imaginatione matris imprimuntur, eò quod mater & fœtus sibi arcte sint uniti, & fœtus à matre faciliè aliquid patitur, sique nota rei imaginationem graviter occupans imprimatur.

§. 10.

*Cartesia-  
norum opi-  
nio de cau-  
sa Guttæ  
Rosæ.*

§. 10. *Cartesiani* causam *Guttæ Rosæ* quan-  
tunt in particulis acutangulis subtilioribus ex  
massa sanguinea per arteriolarum poros cum suc-  
co nutritio percolatis, fibris musculorum faciei  
cutaneisque adherentibus, & easdem variè agi-  
tantibus pungentibusque, quapropter globuli  
ætherei cò propulsi circa fibras à particulis ante-  
dictis tremule moras variè circulantur, unde co-  
lor ille ruber emergat, & quum in vino alioque  
potu generosiori ejusmodi spiculæ acutæ late-  
ant, ab ejusdem frequentiori haustu morbum hunc  
facile provocari experientia teste pronunciant.

*Phlogosæ.*

*Phlogosæ* causam asserunt subitaneum confl-  
ctum particularum ramosarum seu pingvium,  
cum particulis angularibus seu acidis, cò quod  
particulis ramosis non facile commisceantur, quin  
ramosæ ab angularibus coægulentur, & pori adeò  
recludentur minuti, ut globuli secundi elementi  
excludantur, & soli materia æthereæ transire  
concedatur, quæ subito quarumcunque corporis  
partium poros transgreditur, & calorem iisdem  
infert, circulantibus simul globulis circa fibras à  
materia æthereæ, tum interna, tum externa, for-  
tius commoratur, unde rubor, donec coagulationi-  
bus istis resolutis etiam secundi elementi parti-  
culis transire concedatur, & tum phlogosis ces-  
sat, quod in scorbuticis succis acidis & salibus fi-  
xioribus abundantibus frequentius contingit,  
quòd cum cibo & potu ramosæ, angulares &  
salis particulæ ventriculo & intestinis inferantur,  
à quibus nova in chylo aliisque succis oritur coa-  
gulatio, sed à porioribus angulares abforben-  
tur, & coagulatio resolvitur.

*Variæ.*

*Variæ* oriuntur à coagulatione istâ, dum in  
Guttâ Rosæcâ non tantum subtiliores particulæ  
per arteriolas in musculos & cutis glandulas, sed  
crassiores quoque & terrestriores influunt, quæ  
ibidem permanentes fibras musculares & cuti-  
neas distendunt, unde tubercula produunt, à  
distensione verò nimia eorum interdum dirum-  
puntur, & in sulculis partes chylosæ colliguntur,  
hinc pustule emergunt.

*Macula-  
rum.*

*Maculas* produci docent à particulis angulari-  
bus & lamellatis poros arteriarum magis dilatan-  
tibus & aperientibus, ut particulæ simul ovales,  
crassæ, viscosæ & terrestres ejiciantur, quæ ob  
crassitiem suam circulationem absolvere neque-  
ant, sed exhalato eorum vehiculo in faciei parti-  
bus diutius hærent, diversorum colorum, pro  
diversitate partium commixtarum poros cutis  
vel occluduntium & superficiem asperiores red-  
duntium, ut radii lucis repellantur, unde albedo;  
vel eosdem distorquentium, dilatantium & ra-  
dios suffocantium, unde nigredo; vel particulis  
cuspidatis fibras variè commoventium, ut tre-  
mant & radii luminæ plus minus circuleptur,  
unde color flavus & ruber præsentetur, quæ ma-  
cularum causæ ab imaginatione matris, median-  
tibus spiritibus animalibus in fœtu excitatæ in  
eodem maculas originales seu *Nævi* efformant,  
partibus fœtus tenellis multifarias eorum figuras  
admittebant.

*Nævi sen-  
tentia de  
etiologia  
Guttæ Ro-  
sæ.*

§. 11. Perceptis ita aliorum de causis senten-  
tiis nostram nunc paucis ordine subnectemus.  
Quantum proinde ad Rubedinem faciei & *Gut-  
tæ Rosæcæ*, solet vulgo accusari nescio quæ  
hepatitis intemperies calida, vel contradistionem  
involvens *arrigens* viscerum. Verum cum vi-  
scera nunc amplius eo fungantur munere,  
prout quidem ab antiquis fuit creditum, nec di-

verso alantur sanguine, utpote qui uno idemque  
ad corporis partes solidas dispensatur, meritò  
has causas ad aniles referimus fabulas. Vera au-  
tem & constans causa occasionalis est in ven-  
triculo, & non tam in calore, quam chylo  
acido vitioso plus minus volatili consistit,  
quippe horum hominum sanguis ad coagu-  
lationem semper pronus est, quod facile ex  
juvantibus & nocentibus desumi potest, si  
enim affectum hunc hepaticis dictis refrigeranti-  
bus curare velis, julebos, acidulas, serum lactis  
exhibeas, malum tantum auges, quia hæc aci-  
dum augent, motum ventriculi labefaciunt, di-  
gestionemque turbant, e contra acidum hoc ab-  
sorbentia magnum commodum asserunt, prout  
in curâ vela nostra latius pandemus. In tubulis  
enim faciei sanguis stagnare cogitur ab acido  
ibidem hospitante, à quo sanguis in hisce valcu-  
lis detinetur, hinc fibræ extenduntur & quan-  
doque dilacerantur, ut exsillent lymphæ, quæ ab  
acido nitroso externo aëris induratur in epysem  
materiam, quæ maximè faciem defædat.

*Phlogosæ* causam acculo particularis acidas vo- *Phlogosæ.*

latiles, sanguinem ut plurimum circa faciem in  
suis tubulis, & vasculis coagulantem, à qua coa-  
gulatione ab acido isto volatili facta rubor, &  
reliqua symptomata suum habent ortum. Ac-  
cidum hoc volatile generatur sæpe in primis vis-  
cus, ejusque causa itidem non tam in calore, quam  
chylo acido vitioso multum volatili consistit,  
hinc & chylus, liquor gastricus, intestinalis,  
pancreaticus, vesiculæ fellis succus acidioris red-  
diti sanguinem depravant, imò si instrumentum  
ventriculi, sicque spiritibus debitis destitutum,  
alienis influentiis à sanguine degenerante inficia-  
tur, à lymphæ particulis heterogeneis corrup-  
tetur, aut ob glandulosam tunicam disruptam,  
corrugatam, exesam, aut nimia viscositate ob-  
ductam suo non ritè fungatur officio, aut liquor  
intestinarum à debito deviet munere, sanguini  
illabitur chylus minus elaboratus & proinde aci-  
dior, qui lege circulationis deferatur ad faciem,  
ibidemque coagulatur existit. Lymphæ quoque  
diversis heterogeneis & materię & efficientis vi-  
tio tincta moleculis, acidis maximè jam accusa-  
tis, phenomenis istis exhibendis aptissima est,  
quapropter & hæc causæ rationem huc facile  
subire potest. Particulæ enim istæ aciores valde  
sunt impetuosæ, ut fibrillas partium solidarum  
variè exagitant, & globulorum cælestium im-  
pressionem variè modificent, iisque ad circula-  
tionem ansam præbeant; ad quas causas & re-  
motæ referri solent, aër videlicet austrius mul-  
tum acidi nitrosi in se continens, item cibi pejo-  
ris notæ, imprimis acidi sulphurei, carnes salis-  
tæ, fumo indurata, lardum rancidum, pisces  
maritimi sole vel frigore indurati aut muris con-  
diti, potus aquæ crassæ, cridæ, impuræ & cor-  
ruptæ, aut cerevisiæ ex his aquis parata, sic &  
vinum nocet, ubi frequentius & copiosius pota-  
tur, acidum enim maximè auget, & sic humo-  
ribus scorbuticis alas addere solet. Sic & de reli-  
quis rebus non-naturalibus non bene se habenti-  
bus judicium ferendum est. Frequentes ergo &  
subitæ oboriuntur Phlogosæ cum rubore ac  
fervore faciei, cum sanguis in facie stagnare in-  
cipit, acidum augetur, hinc fibrillæ agitantur  
& irritantur & tota facies quasi accenditur. Ori-  
untur tamen ab acidis acutius particulis, quæ  
dum subriles canales, fistulas & nervos faciei

corrodunt, aperiunt, perforant, non potest aliter esse quin inter diverfos hos existentes, & quasi stagnantes succos morus inordinatus succorum oriatur, uti videmus in preparatione *Qi Mori*. Frequentius autem in primis viis occurrentes humores, alias confecti & ordinarii hinc tamen peccantes, liquor gastricus, chylus, bilis, succus pancreaticus, &c. tum sibi invicem, tum cibo aut potui acidum istiusmodi communicant, quod per laborem illum, qui semper antea factus redit in orbem, faciei communicatum. nec per poros ab ambiente aëre actus, quam in aliis corporis partibus vesibus obductis oclusos tam cito avolans, eidem fervore suo inducit ruborem hunc aliorum oculis ita expositum, ut simul ipsis ægis obminuissimarum in succis particularum motum varium aliquem accendat calorem. Sanguis enim talis non tantum copiosius, sed impetuosius quoque in hanc vel illam partem moveretur, ruit ac stagnat. Hinc frequentius vultus, imò totius corporis phlogosin mox à vini potu, ab animi affectibus, pudore, irâ, amore oboriri observamus. Stagnans ergo nimis ille sanguis partes hæc & interdum totum corpus fervore isto perfundit, ubi serosis fluidis particulis, in glandulis subcutaneis ad lectionem dispositis pariet vel copiosior quidam odor per poros à calore expansos & dilatatos emergit. Sæpe & occurrit, *Inflammatio* faciei ut & *Erysipelas* cum Tumore, de qua videatur capite generali de Erysipelate.

Varorum.

*Varorum* causa existunt particule quædam pinguioribus spiritibus plene, cum succo nutritive ad faciei partes delatæ, sed ab acido ibidem præcipitate & coagulata, quæ spissitate suâ fibras extendunt, iisdem dissolutionem aut rptionem minantur, sicque interdum dolorem excitant, & cum liber transitus reliquis particulis ab iisdem inhibetur, illæ stagnant, fibras variè agitant & calorem cum rubore circa tubercula ista producunt.

Macula-  
rum. Len-  
tiginum &  
Navorum.

*Maculæ* quoque variz & *Lentiginis* in extremis corporis partibus, & ipsa etiam facie conspicuæ sanguinis sapius acculati, ad arteriarum capillarum araneata vascula, oscilla & tenuissimas lineas moti, sub & per tenella integumenta, offlorescentiæ aut recrementa sunt, quæ interdum in ipso matris utero ipsi inducuntur sætui, quod spiritus tum sætus, tum matris, ab imaginatione hujus fortius agitati, totam commoveant sanguinis massam, ut crassiores ejus partes non minus ac leviores fortius excidentur, & fluxu ad partem hanc vel illam, cujus tubuli ob fibrillarum tenuitatem quorumvis corpusculorum transitui haud irâ difficulter accommodantur, propelluntur, & à spiritibus amadatis per profundam imaginationem officii sui in æquitate consistentis immemore diutius detinentur, donec per quietem fixiores, extrematibus vasculorum inter glandulas cutaneas vasculares artè ad hæreant, nec tractu temporis solidiores redditas fibras ad regressum sui in reliquos succos debite dilatare, & aptè queant disponere; & hanc ob rationem ut ejaculamenta quædam ex succis aliam particularum extra canales natæ configurationem, per omnes sæpe vitæ dies in homine permanent *Nevi* illi *matris*, nec disparant aut delentur, cum ex glandulis illi aliqua fruantur humoris portione, qui pilis educendis in æconomia animalis aliis desinatur, adeo ut & in

ipsis quandoque maculis longiores & crassiores provenire videamus pilos, quam in aliis partibus, quod fibræ glandularum istarum, quin ipsorum vasculorum, figuram & plicam quandam à pristina violentiore dilatatione retinuerint, in quam liquor ille per ductus consuetos facilius & copiosius influit.

§. 12. *Custa Rosacea* in primo gradu curatur *Prognosis*  
difficilis non est, in secundo verò & tertio, cùm *Gusta Ro-*  
altiores egerit radices, eò ægrius curatur, sic *sacea.*  
etiam quum hæreditaria est, vix curationem admittit; quæ namque vitia à primo ortu in ipsa generatione ex feminibus parentum impressa sunt corpori atque inusta, arte elui nequeunt. Reliqua adventitia majorem curationis spem nobis relinquit. Quæ à causis externis profecta & minor est, paucioresque partes obidet, recens quoque emergit, facilius longè extirpatur eâ, quæ in hisce contrario planè modo se habet, quæ enim conjuncta cum gravibus symptomatibus, malique moris est, ea deterrima videtur, nec exiguum periculum minatur.

*Phlogosis* nullum vitæ periculum involvit, at- *Phlogis.*  
tamen petinax & diuturna est, & Medicum maxime fatigat, raro enim penitus tales remittunt affectus, hinc nullum faciliè proponant prognosticum Medici, ne fama maculam inuram. Affectus hic faciliè transit in cachexiam & hydropem imò scorbutum, qui sæpe conjunctus est, sed juvenes aliquando idoneis adhibitis medicamentis ab hoc morbo liberantur.

Sic & *Pari. Macula*, aliz quæ vesiculæ in fa- *Varorum*  
cie non semper negligendæ sunt, ex illis enim si *& Macu-*  
malignitas, hoc est, acrimonia adest, faciliè gan- *larum.*  
græna & sphacelus oboriri potest, qualia nonnulla novius exempla. Confer. *Ephem. Germ. Ann. IX. & X. Obs. 16.*

*Lentiginis & Navi* materius medicamentis diffi- *Lentigi-*  
cilem semper negligendæ sunt, ex illis enim si *num &*  
mellæ vix certum adhibitis cosmeticis ab illis li- *Navorum.*  
berantur, sed toties frustraneos se inisse labores conqueuntur, interim finituri non obfunt, quin vegetioribus ut plurimam atque candidiore pelle superbiensibus obvenerint.

§. 13. *Dietæ* in morbis hisce observetur talis, *Dietæ.*  
quæ aërem vitat indementiorum, ne ab externo calore fibras cutaneas urente particularum acidarum acrium influxus promoveatur, nec venus borealis iisdem est proficiuus, quia asperiores particulas ad cutem pellit & poros occludit, ut ideo aër temperatus sit eligendus, & facies contra ejus excessum munienda. In *Cibo* variis usurpentur acida & salsa, sanguinem & succos magis coagulantia, & particulas acidas aut volatiles & aciores aut fixiores reddentia, & in causis antea enumeratis; adhibeantur verò frequentius succosa aliquantum mucilaginosi & amariuscula, qualia sunt eichorææa & intybacæa, necnon lactuca, ex quibus juscula cum pulvis gallinarum, agnorum & similium carnum animalium juniorum parari solent. *Potus* sit cerevisia tenuis, vinum enim & omnis potus generosior & acidior valde nocet, quod potiores vini damno percipiunt, qui tamen flosculis illis potius superabire volunt, quam falsâ illâ potus dulcedine carere, hinc solum frequentius irrigatum fertilitate sua Dominum brevi solet ditare. Caveant proinde à frequentiore & copiosiore vini haustu, quos pulchra facies commendare debet, maxime lexus mulieris, ne ab externo colore prodantur, & potius



potatorum aut potatricum numero inscribantur. Hic præ aliis conducet potus Thee hodie fere ubique receptus, & Caphec. *Morbus* vehementior nocet, præsertim tempore æstivo, quo lentiori gradu incedendum. Somnus conceditur longior, ut sanguinis acrodo acida imminuatur. Inter *Affectus* Ira & Excandescencia vitentur, cum amore nimio & quocunque reliquorum animi pathematum excessu, cuncta verò recta rationis normâ dimittantur. *Excretionis* libertas sint, ne recrementa inutiliora diutius retineantur, quare alvus officii sui est admonenda, & re postulante, ad illud etiam excitanda, nec conjugalis amplexus nimium protrahendus.

*Cura*  
*Galenici*  
*nam in*  
*Gutta Ro-*  
*sacea.*

§. 14. Sequitur Curatio *Pharmaceutico-Chirurgica*, quam *Galenus* in *Gutta Rosacea* ita instruit, ut ad sanguinis fervorem restinguendum, ejusque copiam minuendam venæsectionem in brachio celebrent, & cucurbitulas cum scarificatione applicant scapulis non omittis purgantibus chologogis, si humor biliosus sanguini sit immixtus; posthæc intemperiei hepatis calidæ temperandæ, & obstructioni referandæ incumbunt, usque remediis hepaticis dictis refrigerantibus, ex endiv. echor. acetos. tarax. Nymph. Scariol. sem. 4. frig. maj. & min. ex quibus vel decocta parant, vel succos cum fero lactis caprini assumendos. Externe remedia applicant ex succo heder. terrest. limon. portulac. solari, borac. sulphure, camph. lithargyrio, farinâ fabar. lupin. ol. laurin, rosac. hinc sequens unguentum *Elides* magnis evehunt laudibus.

℞. Cori. rad. lapath. acut. ʒij.

farin. fabar.

ʒiis viv. 22. ʒj.

borac.

campb. 22. ʒb.

succ. heder. terrestr.

plantag. 22. ʒb.

Cum axung. porc. q. f.

F. f. a. Unguentum.

*Phlogosi.*

*Phlogosi* curam peculiarem vix adhibent, sed eandem ad morbum primarium, febres videlicet ardentes, vel scorbutum, vel hepatis intemperiem primario dirigunt, quibus morbis curatis & istam cessatam confidunt, in genere tamen laudant refrigerantia, & leviter aperientia, ut lactucam, nymphæam, omnia echoracea, fumariam, Julep rosaceum, violaceum, syrup acetos. simpl. de lupulis, de limon. margaric. corall. & similia, ex.gr.

℞. Aq. endiv.

sumar.

lupulor. 22. ʒiij.

Syr. sumar.

cicbor.

violar. 22. ʒj.

M. F. Posio, duabus vicibus assumenda, & ter in septimana repetenda.

*Vari.*

*Variorum* curationem aggrediuntur venæsectione, aut cucurbitularum aut hirudinum applicatione, in corpore plethorico, sanguinem purificant remediis superius indicatis & hepatis intemperiem corrigentibus, hinc ad topica accedunt emollientia & discutientia, vel etiam aliquantum erodentia, ut sunt axung. anser. ursi, ol. itin. laurin. scorpion. succ. lapath. cepar. limon.

farina lentium. sal. armon. commun. sulphur, lithargyrium, emplastrum diachylum ireatum, unguentum in *Gutta Rosacea* jam manifestatum.

*Maculis & Navis* varia adhibent topica, sæpe tamen voto minus respondentia, ut sunt semen sinapicum aquâ calidâ in formam pulvis redactû & illitum, vitellus ovi allatus tritrus & maculis impositus, costus cum aquâ & melle adhibitus ex præscripto *Galenus* 7. de simpl. medicam. facult. semen brassicæ, alysson, succus arthanitz, fel gal. lin. sapo albus, sanguis menstruus vel secundinæ, calidè navis adhibita, quas illinitiones cunctas vesperi ante introitum lecti institui præcipiunt, & manè decocto sem. lupin. iterum abluerè.

*Maculis.*

§. 15. *Paracelsus* curationem *Gutta Rosacea* solummodo sitam esse vult in citrinulâ & fabiollâ, nec non in re bonâ destillatis in aquam, istamque curam vocat ex tincturis, cui substituit sequens destillatum externè adhibendum:

*Paracelsi*  
*modus cu-*  
*randi Gut-*  
*tam Rosa-*  
*ceam.*

℞. Album. ov. coll. No. x.

Calc. ovor. ʒvj.

Destilla in aquam, & adde

sol. argen.

stann.

plumb.

veneris 22. ʒj.

sol. auri,

marshasi. argent.

aurea,

Chimolea, 22. ʒij.

F. Digestio ad mensem & destillatio.

Ad *Phlogosin* emendandam remedia suadet *Phlogosin*, ea, quæ Mercurio conveniunt ratione volatilitatis, ejusque coagulationem impediunt, qualia parantur potissimum ex ligno Guajaco, flor. nampth. & sale armoniaco.

*Vari* extrinsecus abluuntur, aut potius aliquoties leviter tanguntur liquore sequenti:

*Vari.*

℞. ʒiis ❖ci

❖li Roman.

virid. ar. 22. ʒij.

alam. rub. ʒj.

Calc. viv. ʒb.

Destill. in alembico vitreo.

Primus liquor rejiciatur, secundus servetur ad usum.

*Macularum* curationem ita instituit, ut primo cutis medicamento corrosivo avellatur, quo postmodum nova, pura & immaculata generetur, & ut eo facilius hoc contingat, carnem suâ cute nudatam sequenti lavat medicamento.

*Macularum.*

℞. Balsam. ad ulcera,

ei add.

terebinth. lot.

lumbrie.

ol. avor. 22. part. xq.

M.

Balsamus ad ulcera est sequens.

℞. Bals. ad vulnera.

Bals. ex rubigine similiter facti, prout ex Samach 22. 1b), simul his permixtis add.

al. ferri. 1b.

M.



Balsamus ad vulnera ita paratur:

*R. Samach optimè combustum & in albedinem calcinatum, cui circulatorum adde minus. Destilla postmodum, ut sicissimum caput maneat in fundo mortarii, neque vitrum omnino candeat. Postea recens affundes iterum ut prius: tandem id foveris, donec circulatorum ab eo dulce prorsum redeat, ut esset seipso: tandem resolvi sinas per seipsum.*

*Naves maternas unicè curari intendit, si res, quæ imaginationem matris movis, macula eadem die, horâ & momento, quibus mater percussa est, adhibeatur, & infans vel re appetitâ fatietur, vel terrore aut timore afficiatur, ut res illa exsiliptur, & cum ut extra cutem prodeat, cutis aquâ aliquâ forti aut Regis lavetur, prout hanc curationem prolixius exhibebimus lib. 5. cap. de Navis.*

*Helmontiana cura in Gutta Rosacea.*

§. 16. Secundum *Helmontium* Cura *Gutta Rosacea* peragitur ipsum Archeum vel sedando, vel in levem aliquam fugam vertendo, ut ita signum exandescens ab eo dulce prorsum redeat, cui scopo admodum convenit liquor vel ex menstruo virginis, vel ex indusio aut linteo sudore morientis imprægnato per retortam destillatus, si Gutta eo nonnunquam abluatur.

*Phlogosi.*

*Phlogosis* auratur promovendo crucis elaborationem & acidum corrigendo, quod fit ipsum ventriculorum corroborando per salia alcalia volatilifata apprimè penetrantia & abstergentia sordes, easque eliminantia, ut cruor purior in sanguinem distribuat, quâ virtute pollere præ aliis æstimatur Sal *Qi* volatile stomacho debilitato & succorû depurationi maximè conveniens.

*Vari.*

*Vari* dispareant, eosdem inungere sinadet oleo bufonium vel smegmate mercuriali, quo nutrimentum corruptum absorbitur, quod aliâs planè erat incorrigibile.

*Maculis.*

*Maculas* & ipsos etiam *Naves* spontè evanescere promittit, si iisdem manus cadaveris longâ tabe extincti, omnique vitæ proprietate exuti admoveatur, donec frigus partem maculatam penetraverit.

*Willisiana Cura in Gutta Rosacea.*

§. 17. *Willisius* pro *Gutta Rosacea* curanda hanc suadet methodum, quâ liquor glandularis à fermento corruptivo depuratur, & in debitum reducitur quâsim, remediis potissimum catharticiis & simul sanguinem mundantibus, ex rad. polyod. lapath. acut. herb. fumar. epythym. sem. cartham. fol. fenn. turbit. lig. santal. citr. sub juncta venæ sectione, hinc pori curanei ab obstructione liberantur & cutis color debitus restituitur unguento maximè mercuriali.

*Phlogosor.*

*Phlogosi* ut curetur, ejusque invasio ulterior inhibeatur, succus nutritius est corrigendus, & ut perfectius ille elaboretur, ventriculo prospiciendum, reliquisque visceribus chylosi inservientibus, quod medicamenta digestiva scorbuticis mista optimè præstare creduntur, utpote quibus dyscrasia sanguinis simul auferatur, imprimis Tartar. chalybeatus, tinctura & sal Tartari, Sal fumar. card. bened. ocul. *Q. Spec. diatr. fœneol. rad. ari.* cum aq. fumar. cochlear. & Syr. limon. quibus per vices substituenda sunt diaphoretica, ut pulvis è chelis caneror. bezoard. min. Ebur Philosoph. pp. & id genus alia.

*Variarum.*

*Variarum* curatio perficitur resolutione concretæ illius acidæ salinis in poris cutaneis hærentis, internè quidem assumtis remediis diaphoreticis ex lignis aliisque (sanguinem purificantibus paratis, externè verò cosmeticiis lixiviosis, ut lixi-

vio è sale tartari, cum oleo amygd. amar. ex quibus liquor lactescens paratur, quo Vari manè & vesperi sunt abluendi; quo tamen præstantior æstimatur sequens liquor cosmeticiis mercurialis in Macularum curatione mox describendus.

*Macularum* proinde curatio obinebitur Macula tum aperiendo poros cutis arque cuticulæ, vel etiam excoriando hanc, ut humor viscosus exteriorius attrahatur & procius evaporet; cum maculæ maculosam è cute repercutiendo & intus adigendo. Prius præstant medicamenta detergentia, & imprimis sequentia.

*R. Rad. ari.*

*bryon.*

*Sigill. Salem, recent. aa. ʒj.*

*Pulv. sem. fennigr. ʒj.*

*Campb. ʒʒ.*

*Simul confusi affund.*

*Ol. ʒi per deliq. ʒij.*

*Fiat expressio.* Applicetur cum petiâ tinctâ bis in die. vel:

*R. ʒu viv. pulv. ʒj.*

*Sapon. ʒij.*

*Liquor in pet. suspend. in acer. ʒij.*

*per ix. dies*, dein in usum adhibeatur, loca affecta bis in die abluendo & confricando. Ad alterum scopum, repulsionem videlicet, obtinendum, lac virginis ab aliis commendatur itidem in usum duci permittit, vel simile medicamentum ejusdem etiam virtutis ex solutione minii vel corallæ in aceto destillato facta, & cum aq. alum. aut sal. gemm. præcipitatur, quo facies bis in die similiter abluenda. In eundem usum etiam sequens commendatur.

*R. Virid. ar. ʒij.*

*affund. acer. vin. alb. ʒij.*

*Cucurbitula vitrea induta defillatur in calore arena: phlegma primò exstillans ad usum servetur, quo itidem facies bis in die illinenda. Eundem etiam in sinè rosæ aut phlegma *Q. li* per se destillati egregiè convenire promittit. Quæ verò semina hæ nequeunt esse contentæ, sed curiosiores munditiei & pulchritudini nimium student, ut nullam turpitudinem in facie tolerare queant, iis sequentem commendat liquorem cosmetici mercurialem humores omnes intra poros & foraminula, utut minutissima, impactos expellens, salium aut sulphurum combinationes invetratas & pertinaces dissolvens, totamque cutim quoad meatus ejus malè conformatos restituens & iuxta faciem, ut proinde ad ipsas etiam pustulas, Varos & Ruborem auferendum commodè adhibeatur, hæc tamen observatâ cautè, ne usus ejus nimis sit familiaris, aliâs non modo particula hydrargyri unâ cum salibus materiam noxiam & desudatricem poris excutere & depellerent, sed eandem intus repercutiam insequerentur, & sanguini & liquori nervo se insinuarènt, unde verrigo & affectus spasmodici & paralytici oboriri solent. Liqueoris autem descripti sequens est.*

*R. ʒi sublimis. ʒj.*

*pulverisat. ponatur in vase stanneo cum aq. fontan. ʒij. stent per xxiv. horæ cum spatula lignea subinde agitando, donec totus liquor ingreſcat, qui tamen per chartam emporeticam colatus limpidus evadit; cum petiâ aut pluma huic intrinctâ facies semel intra diem novum aut alterum blandè obducat.*

*Sylviana  
curatio  
Gutta Ro-  
sacea.*

9. 18. *Sylviana* curatio *Gutta Rosacea* eo vergit, ut bilis ab acido corrupta corrigatur salibus volatilibus lixiviosis, sed blandis, ut spiritu salis dulci, vel copiosior evacuetur idoneis medicamentis chologogis, hinc externè etiam cosmeticea quædam adhibeantur, potissimum sulphurea & camphorata, ut illinatur vel per unguento albo camphorato, & manè denuò aqua sol. fraxini, in qua aliquid lactis sulphuris & salis armoniaci fuerit dissolutum.

*Phlogosis.*

*Phlogosis* curatur corrigendo vitiatum bilis cum succis acido-pituitosis, effervescentiam & halituum exinde productorum resolutionem promovendo, quod itidem volatilibus peragitur temperatis, ut spiritu nitri vel salis dulci, tum pituitum viscidum incidentibus, ut sale tartari vitriolato, aqua ment. fenic. elixirio vitæ *Marthiola*, aliisque remediis succo primario peccantii accommodatis & temperatis, quæ pariter ex aqua multa & pauco oleo, sed ita sal volatile immisto, ut aque simul coniungi queat, ea enim remedia in huiusmodi affectibus ab autore hoc æstimantur præstantissima, cum utrumque acre tum acidum, tum lixiviosum, non modo demulceant, sed etiam diluant & enervent.

*Varorum.*

*Varorum* cura aliquando acido plus minus peccantis correctionem reposcit, plerumque tamen per sola externa insinuitur, idem extra cutem profluentia, qualia sunt, succus ceparum, oxylapathi, tritina orobi, Borra, Sal armoniacum, myrrha & lythargyrium.

*Machulorum.*

*Machulæ* pro diversitate causæ variis abluere aut ungere suadet remediis, rubras & flavas videlicet lixiviosis, ut farina orobi, sale ammoniaci, melle, succo cepar. & selle animalis cuiusdam in linimentum redactis, vel oleo tartari, nigras vero subacutis, ut succo linonum, fimo columbino cum aceto subacto, lacte virginis & similibus, quibus & *Navi materni* illini possunt.

*Corrosivorum curatio  
Gutta Rosacea.*

9. 19. *Corrosivorum* videtur curatio *Gutta Rosacea* omnium optimè insitui posse particulas acutangulas tum hebetando, cum poros aperiendo, ut exhalare aut ejci queant, aliquoties per vices adhibitis sudorificis, quorum virtus si pervenit ad poros cutaneos, particule illæ heterogeneæ primo ad morum disponuntur, deinde commoventur, & locis collectæ protruduntur & eguntur, quæ ratione sese invicem tangentes culpidius suas frangunt & nihil nanciscuntur situm, ut sibi ulterius non a loco arcè cohereant, sed liquoris lymphico immixti per poros simul dilatatos & lubricos redditos expellantur, quare & illa & camphorata diaphoretica propiunt, ut l. ineuram Qi & Glaram, Spiritum theriacal. camphoratum cum aqua sumri, flor. sambuc. scabios. helen. & Syr. Cardibend. vel decoctum lignor. & rad. taraxaci. Post hæc ipsa topica ducunt in usum, quæ cuticulam penetrare, poros cutaneos distendere, & reliquias acutas ulceris frangere, absorbere, & adeo commovere possunt, ut facie per poros egredientur, hinc hbris & extremitatibus vasculorum congestis convenienter conciliant situm & configurationem, proinde ramola & porosa esse debent ista remedia, ut angulos hebetent, quibus simul aliquando arrorendia substituenda, ut penati erant, poros dilatent, & recrementa in iis contenta destruant, hunc merito laudatur unguentum citrinum parti rubenti illitum, vel quod paratur ex lithargyrio, aceto fortissimo aliquoties abluto, camphora in eodem dissoluta &

unguento pomato. Nec rejiciunt olea licetiarum & binonum, cum particulas istas angulosas in poris contentas valde destruant, & fibras ad earundem ejectionem disponant, quod præstari etiam potest unguento communi ex æxung. Gallii, farin. lupinor. bacc. lauri & fiovii & is paratp. Absterisiones post litum instituendæ sunt ex succo bionis, aqua hyperici, taraxaci, lacte & is & myrrha, quam mixturam sapius profuisse observant. Quin trichiones utiliter adhiberi dicunt cum pannis sulphureis & thure sustinigiatis. Fortiora si deliderentur, ad & alia nonnunquam accedunt, quibus tamen præferunt essentiam Benzoin cum elixirio camphoræ guttis aliquot mixtam, & loco affecto aliquoties illitam, nec non pulverem cosmeticum album ex marcasitâ argentea per aquam fortem solutâ, hinc aqua frigida præcipitata paratum, & studiosè edulcoratum. Reliquia si quæ observentur in sanguine & lymphâ relictæ, easdem per diuretin, si eo vergunt, per vices expellunt, cui scopo sequens convenire putatur mixtura ad guttas 40. in vehiculo quodam communi usurpata:

℞. Essent. sumar. ʒij.

Tinctur. flor. bellid. ʒij

Tinct. Oli Maris ʒss.

M.

*Phlogosis* curam ut rectè aggrediantur & optatò perficiant, ipsi ventriculo & intestinis prospiciunt, ne in iisdem noxia quædam fiat coagulatio, sed tum particule tamoliore, tum angulares ita disponantur, ut sine conflatu graviore cum chylo in sanguinem deferantur, quod paucis sed selectis remediis haud ita difficulter obtineri posse confidunt, modo scorbutici sibi ab elix. pinguiorum & acidiorum, unâ in mensâ sæpe malè conjuncturum, noverint cavere, ita enim solo pulvere ex cremore Qi, lap. Cancror. & flor. sal. & mon. compilato molestam hanc chulionem profligari posse asserunt, vel si liquidior placeat forma, sequente mixturâ post pastum cochlearum assumenda

℞. Ag. Cicbor. ʒi.

Succ. seu. laeym. vit. ʒvj.

Ag. menth. ʒij.

Liq. terr. solut. Tartar. ʒ. ʒij.

Spir. & ci anisar. ʒj.

Syr. Eumar. ʒʒ.

M.

*Varorum* curationem eadem scilicet ratione peragunt, quæ superiorem *Gutta Rosacea*, port enim similiter sunt dilatandi, ut particule crassiores ejciantur, & quando fibra nimis tensæ dolorem creant, emolliendæ sunt emplastro diachylo, vel unguento citrino aut etiam auro, quo peracta aporiri possunt, ut liquor contentus crassior & transpirationi ineptus exprimatur, sin tui culgrandiores & densiores sunt, & tam flavæ, quam rubri, eo quod acidum magis in iis contineatur corruptivum, cantharidum usum proficuum esse ducunt, quo curis aperitur, & liquor noxius ad effluxum promoveatur, eodem penè modo, ut in fontanellis fieri solet, proinde pulverem cantharidum miscunt cum æxungia porcinâ & nodis istis imponunt per noctem, hinc liquorem per diem unum vel alterum effluere sinunt, postmodum unguento *Ægyptiaco* correcto abstergunt, vel

vel spiritu theriacali camphorato, & forami-  
cula unguento albo vel thuriâ consolidant. In  
Sulphure, myrrha, & camphora singulare cre-  
dunt existere remedium, ad hujusmodi faciei  
morbos communè abigendos.

*Maculis & Lentiginibus* faciei topica potis-  
simum adhibent eaque fortiora, ut cuticulam  
abradant, nam leviora vix aliquid præstare cum  
aliis nobisque fuerunt experti, hinc fucum for-  
micarum tubearum expressum maculis illinunt,  
vel eadem cum Platero abluunt vino generoso  
albo, in quo aurum ignitum & candens aliquo-  
ties fuit extinctum, addito Tartaro vini albi  
pulverisato. Aquam cosmeticeam *Mysiciti* plu-  
ribus aliis præstare censent, potissimum propter  
mel, boracem, salem Tartari & camphoram,  
quæ cum aliis compositionem ejus ingrediuntur.  
Aquam Satyrni maculosi cum sale ex cineribus  
caulium ab *Hartmanno* laudatam etiam in usum  
aliquando adducere solent, sed si, quod sæpe fit,  
incassum hæc alique cosmetica fuerint adhibita,  
præstantissimum remedium fore promittunt,  
quando maculæ attinguntur bacillo acuto Spi-  
ricu  $\frac{1}{2}$  madido, ut ita erodantur, & partes in  
poris cutaneis contentæ una cum fibris penitus  
destruantur, sic relinquuntur foveæ, quæ un-  
guento de thuriâ successu temporis occludi &  
denuò sanari possunt, superveniente cicatriculâ  
albâ & maculis nunquam redeunt; sed hoc ten-  
tare tantum licet, si maculæ non adeo sunt copio-  
sæ, & personæ de foeolis sequuturis sed  
temporis tractu sanabilibus præmoneantur. Ad  
hunc etiam modum *Nevis maternos* tractari posse  
existimant, si sanguine menstruo calido, vel  
aquâ ex sanguine & lacte humano destillatâ ne-  
queant deleri.

§. 20. Nos quod concernit, diximus superius,  
latere in primis viis acidum plus minus volatile,  
ad quod reserandum varia exhibenda sunt præ-  
cipitantia, vel rectius absorbentia dicta, v. gr.  
oculi  $\frac{3}{4}$ , ebur, C. C. corallia &c. Cinabaris,  
quibus conjungenda diaphoretica fixa, ut sunt  
gum diaphoræ. antihæticum Poteris, Stoma-  
chicum cjus, Bezoardicum Martiale *Ludovici*,  
ex gr. sit formula.

*R. Ebor. pp.*  
*mandib. Luc. 22. gr. v.*  
*Antihæc. Poter. gr. iij.*  
*Sal. abfinib. gr. j.*  
*M. F. Pulvis. Detur per vices.*

Salina & fixa his aliquando addenda sunt, proxi-  
de sequens pulvis detur per mensem.

*℞. Bezoard. min. 3℔.*  
*Salu abfinib. gr. vj.*  
*M.*

*℞. Ebor. f. Δ*  
*smaragd. pp. 22. 3℔.*  
*cinab. nat. M. F. pulv.*

Interim ad acidum illud volatile reserandum  
conducunt etiam salia volatilia, hinc Sal. C. C.  
volac. frequentius adhibetur, uti usu receptum  
est in aulis ad mentem *Hontekoi* illud in mensa &  
alibi pro libitu assumere, in quem finem novi  
& liquorem volatilem parare, qui adeo potens  
est, ut ex paucis ejus guttis instillatis vinum al-  
bum rubrum induat colorem, quod & C. C. vo-  
latile vino albo infusum facit. Sic quoque po-  
tus Thet in acido reserando non contemnendi  
nisi est, modò non in nimia quantitate aqua

hauriatur, & tonus venticuli inde labefactetur,  
cruditatesque augeantur, Vengæ sectio, scarifica-  
tiones frequentius instituta, fonticuli & scaræa  
à præcticis vulgaribus multum quidem commen-  
dantur, sed cum hæc planè nihil præstent com-  
modi, quin obstructions magis augeant quam  
tollant, mihi hæcenus persuadere non possum,  
quod aliquid opis ab iis sit expectandum, cum  
hæc remedia, quantumvis generosa ab ignavis  
habeantur, ne guttulam quidem evalati sanguinis  
in sugillatione resorbere vel extrahere possint,  
cui id in generali capite de Inflammatione latius  
deducturi sumus.

Externa topica Cosmetica dicta in Guttâ  
Rosacea vix famam sustinent, sed plerumque suos  
deserunt Magistros, qui ut aliquid lucentur, fu-  
catis his aliis fucum faciunt, & Salibus sæpe  
plus noxæ inferunt, quam commodi. Magni-  
penduntur illa, quæ ex talco & marcesita paran-  
tur, sed cuncta sæpe frustra adhibentur, vel si  
prodesse videntur, id non tam cosmetico,  
quàm frictioni excrementa testis coctionis  
vulgo dicta tollenti, in acceptis ferendum,  
sic enim humores antea restagnantes iterum ala-  
terius per tubulos & vascula capillaria circulan-  
tur, in qua totius rei cardo vertitur. Quod si  
opinionis aliquid dare velis, ad ruborem faciei  
adhiberi possunt sequentia. Facies ungatur un-  
guento de cerull. camphorat. vel paretur lini-  
mentum cum aqua Regii. Hung. thure Masti-  
che & camphora. Sequens à pluribus magni æsti-  
matur.

*R. Salis & ei 3℔.*

*Camphor. 3j.*

*F. Pulvis, qui consociatur in vitrum, affundatur*  
*aquarosar. ut transversum digitum supereminet,*  
*insolentur donec exaruerint, postea frangatur vi-*  
*trum, eximitur pulvis & addatur ceruss. 5j. Hic*  
*Pulvis levigetur cum panco ol. olivar. & faciei il-*  
*linatur.*

Inter arcana habetur sequens.

*℞. Persell. lassant. mundat. & eviscerat. con-*  
*cis. & contus. inde cucurbitæ vitree, affund.*  
*vini Hispan. Mens. iij. adde Cochlear.*  
*Mens. j. Pem. citr. No. iij. Sacch. cantib.*  
*3iv. Destill. f. a. & receptaculo impon. sol.*  
*℞i No. iv. post exponatur radiis solaribus*  
*per 5. septimanas.*

Meliorem effectum ex sequenti expertus sum.

*R. Thur.*  
*massich. 22. 3j.*  
*alum. 3i.*  
*Cog. c. aq. flor. sambuc. & rosac.*  
*Colatur R. 3vj.*

quâ mixturâ lavetur vespri cubitum ituris facies  
tepidè. Lavetur quoque facies cum spiritu vini  
camphorato prius aq. flor. sambuc. temperato,  
hic enim omnia conducunt, quæ commenda-  
mus in Erysipelate & Inflammatione, affectus  
enim hi tantum secundum magis & minus differ-  
runt. Sic quoque externè salia volatilia in liquo-  
ribus solvi & applicari possunt: instituatursus-  
fus ex mastiche, thure. Pannum sanguine men-  
struo imbutum & exsiccatum imponere quidam  
jubeant in aquam calidam, ut coletur, quâ Gut-  
ta Rosacea per triduum lavetur & per se exsicce-  
tur, faciem dealbare dicunt, quod tamen non-  
dum expertus sum. A *Parignanâ* sequens maxi-  
mè laudatur.

*℞. Aq.*

*nostra me-*  
*thodus cu-*  
*ram Ros-*  
*aceam.*



Rx. Ag. rosac. ℥j.  
flor. lil. calest. ℥ss.

M. tunc

Rx. Uiu viv. ʒj.

Camphor. ʒij.

Off. sepia ʒB.

Medull. vitul. ʒij.

Terantur omnia, & cum aq. supradictis misceantur, ponantur in Sole quotidie agitando, & eo liquore facies illinatur.

Meliori notā sunt commendata sequentia.

Rx. Ag. flor. fabar.

lil. alb.

figill. Salom.

rosar. aa. ʒj.

Cosmetica. Clavii ʒj.

Qu. dulc. gr. xv.

Camph. gr. x.

M. D.

Sequens Tinctura Cosinetica nostra in Gutt. Rosacea egregia.

Rx. Storac. cal. g. Benzoe. ʒ ʒj. aff. 2. vin. C.

ʒviij. diger. & add. Mosch. q. v. Huius

Tinctur. infill. gutta aliquot aq. salina

q. s. lavetur facies.

vel:

Rx. ∇ flor. omnium,

stern. ranar.

ros.

flor. fabar.

pulp. citr.

figill. Salom. aa. ʒB.

Ol. Uiu per dilg. ʒij.

facebar. ʒi ʒj.

borrac. ʒenct.

Cerniss. aa. ʒB.

Qu. asat. dulc. gr. iv.

M. D.

Sequens hinc probatissimum D. D. Michaelis.

Rx. Unguent. rosat. ʒij.

Flor. Uiu ʒij.

lact. Uiu ʒj.

Sacch. ʒi ʒB.

Ol. rosat. q. s.

F. Linimentum.

In faciei Erysipelate seu Inflammatione cum Tumore sequentibus non ita pridem vidi Ducem Saxoniæ curatū. De cur ad motum lymphæ si ligantū conciliandum sequens nuxtura intus sumenda.

Rx. ∇ Card. bened.

bor. sambuc. aa. ʒB.

Mixt. simpl. ʒB.

Syr. papav. errat. ʒij.

M.

Et cum hanc inflammationem plerumque sequi soleat febris catarrhalis, interponi possunt varia absorbentia cum anodynis, ex. gr.

Rx. Pulv. cordial. pret. ʒj.

Theriac. calest. Hanov. gr. j.

M. F. Pulvis.

vel:

Rx. ʒis diaphoret.

Specif. cephal. aa. gr. viij.

Bezoar. or. gr. iv.

Qu. Card. bened. gr. iij.

M. F. Pulvis.

Externæ faciei tumidæ & inflammatae imponatur sacculus sequentibus speciebus repletus.

Rx. Pulv. Erysipelat. Myrs. ʒj.

Qu. commun. test. ʒvi.

flor. sambuc. ʒij.

F. Pulvis. aspergatur ~ theriacal. camphor. Instituiatur etiam sequens vel simile suffumigium.

Rx. Gum. anim.

oliban. aa. ʒj.

M. F. Pulvis profuso.

Os etiā colluatur sequenti vel simili gargarismo.

Rx. ∇ flor. sambuc.

lil. convall. aa. ʒij.

Spir. theriacal. camphorat. ʒB.

Mell. ros. ʒj.

M. D.

Quantum ad Phlogosæ curationem, si mali Prygma.

sedes est in massa sanguinea, à particulis sulphureis. acidis ac salis acrioribus, scorbutico charactere imbutis, varia antiscorbutica vulgo ita dicta laudantur medicamenta, quæ particulis & salibus volatilibus suis penetrantibus, incidentibus & attenuantibus enervant scorbuticum falsicium, ac eliminant per duos glandularum subcutaneorum, ut sunt trifolium fibrinum, becabunga, quæ non tam acris & activis moleculis pollent, quàm cochlearia, in quem finem & hoc in affectu conducunt acetosa, quæ profunt ægris particulis a quibus & acidis, temperando, resoluendo, diluendo, immutando & educendo; & hic asterisco notandum, quòd acetosa, acetosella, becabunga aliis antiscorbuticis palmam præcipiant, in tali enim scorbutico acris, si cochlearia, raphanus silvestris, sinapi & similia frequenter ac copiose exhibeantur. concitant quiescentem sepe causam, Narium hæmorrhagias, arthritides, altimata, phlogoses, &c. excitant, hinc becabunga præfertur. Sin cochlearia ardeant, additæ acetosa vel acetosella frenum injici potest, præ aliis conducet sæpius laudata aqua Antiscorbutica Dni Bontekoë. Sic quoque nasurtium aquaticum & hortense scorbuti antidota, lentā illā nec nimia coctione in juscula penetrantes transferunt particulas, quæ acrimonia suā salinā volatili, salinis scorbuti malitiā tinctā infringunt, emendant, expelluntque. Fumaria viguadet acres humores mitigandi, per glandulas subcutaneas sensibilibiter educendi, Eudivia verò non tam decantatā bilis scivorem resoluendi, quàm diuretica suā virtute inigne præstat commodum, & medicamenta hæc vel in formā Electuarii, vel Essentiar, vel pulverum, adjectis absorbentibus exhibenda sunt, in quem finem etiam acidule Sclerenfes conducunt, quæ omnia motum sanguinis & humorum ac spirituum promoveant, vel potui ordinario infundantur. seq.

Rx. Rad. endiv.

Scorzoner.

Tarax. cich.

ras. lign. santal. citr.

sassafras.

C. C. eboris. aa. ʒij.

herb. fumar. endiv.

fragar. violar.

flor. belid. aa. P. ij.

Dentur incisa.

Si verò Phlogosæ sint ex acido volatili in primis vis latente, tunc conveniunt absorbentia dicta, quæ acidas imbibunt in corpore aromas ac enervant, ac non harum solum, sed & laxiosorum, enixarum acrium sulphurearum, dum ipsæ coherent, crasin, texturam, ordinem, agnationem, immutare valent, & quidem etiam in massa sanguinea, non cum inligni, seu quadam acida, verum lentā refractione, vi infusimul diaphoretica & partes firmandi gaudentia, qualia



qualia sunt hoc in casu C. C. Ebor, oculi ☿, corallia, mater perlarum, perlæ, unicornu, bezoar, antihæticum Poterri, ejusdem stomachicum, bezoarticum solare & martiale, item joviale, salia citrina, ut sunt. Quis ☿-laus, sal absinth. Card. bened. arcan. duplicat. acidus salinos in primis viis latentes humores eliminant, destruant, dissipant, ligantque. Ex. gr.

℞. Arcan. duplicat. ☿.

Camphor. gr. j.

Oculi. ☿. gr. v.

Detur cum aquâ acetosa. Vel liq. terr. soliat. ☿. vel Tinct. Vitioli Mart. Tartarizat. Zvvelf.

Eundem promittunt effectum salia volatilia tum liquida, tum forma salium solidorum exhibitâ, quæ potentem habent vim in refizando acido, ut spir. ☿ \*i anitat.

De Externis Topiis idem sciendum judico, quod paulo superius dixi in Gutta Rolacæ. Impiis hic applicari possunt salia volatilia in liquoribus temperatis soluta, unâ cum camphora, sed cum hac lexus sequior obingat. modorem raro admitrat, et eligenda sunt, quæ superius attulimus, nec adeo tunc ingrata instituantur sufficiens ex massicæ, thure & succino, impostatur spir. vini Camphorat.

Variæ & Benigniss.

In Variæ & Benignissimâ sequens certum dicitur experimentum, penetrando enim subito viscosas aciditates sub cute latentes absorbet, & eas ex tubulis quasi elicit.

℞. Qu. viv. q. v.

Subiq. cum succ. limon. & cum pingu. viperar. redig. in formam Linimenti.

Saliva quoque spiritu acido & alcali turget, cujus ratione cosmetica est, & contra serpignes jejunâ illi utilitissima, imo contra maculas faciei à variolis relictas valere saepe illata, & cum ☿ flor. omnium tandem abluta, quæ aqua attenuaret valde acidum in cute latens. Liquor, qui fixæ cochleæ, conulis & Sc. Tart. inperstis in loco singidiuiculo, ubi in liquorem egregie cosmetici m. defluunt, qui in ardoribus & doloribus ex acido viscido omnidus singulariter est anodynus.

Hic tamen asteriscus notandum, quod cosmetica hibeant hæc incommoda, nempe quod sint tantum præ furo, rugas quoque cutis contrahant, & citò senescere faciant, dein inimicissima sunt gingivis, inprimis ☿ alia, tonillis, dentibus & partibus circa palatum exilissimis, hinc ulcera oris & fauciorem, into vacillationem dentium inducant, quare puellis suadeo ut cautè hæc mecentur.

In Lentiginibus (Commersecken) mirapreat ad mentem Michæus aqua leucop. bulbosâ, item aqua taryni maculosa, Decoctum cosmetici Myrsicis, unguentum nobile ejusdem, liquor mercurii saccharinus, vel lequens.

℞. Camph. 3j.

oliban. alb.

ceruss.

myrrh.

Qu. viv. 22. 3ib.

axung. gallin. q. l.

M. F. Linimentum.

Vel ☿ citinum si in linteolo ligetur & infundatur per 24 horas in loco calido, omnes lentiginis pullere quidam pro certo affirmant. Camphora in spiritu terebinth. soluta ab aliis commendatur, ut & sanguis gallinæ calidè illinus. Oleum ceræ destill. cum oleo Tart. per deliq. plures laudant, ut & pinguedinem uris, quæ tamen omnia saepe fallunt, & non saepe aliter curari possunt, quam si cautilico vel instrumento eximantur quod tamen difficile, si non impossibile.

In Epithelibus gravidis familiaribus, quæ magnæ sunt maculæ & post partum sape evanescent, profunt medicamenta superius dicta, specifice verò aqua lingorum cum maculis à Michæle laudatur.

Maculas quascunque faciei tollunt præter alia Tinctura Benzoes cum aquâ rolar. in laqueam misturam redacta, quæ optima est, si faciei maculis illinatur purificat, & cutim nitidam reddit, hic conducit lac virginis.

℞. ☿ 3ij.

☿ libj.

Cog. ad 3.

℞. Lithargyr. ☿ 3ijj.

\* 3ix.

Cog. ad lib.

Cola & melle cum priore quod laqueat.

Liquor quoque myrrhæ ab Ettmullero descriptus egregium est cosmeticum contra maculas, in specie solares (die Sonnenflecken) rugas faciei & cicatrices delendas. Alias fucus muliebri est sequens. R. Pat. litem ferream novam, candefiat prope ignem, huic ex ore vinum adspersum, & vapor inde surgens facie probè manita similiter excipiat, tigarur facies, & hoc per septimanam continuetur, rugas seniles abigit, ut juventutem mentiri queant vetula. Urina quoque propria rusticis cosmetica est faciei illita. Axungia viperarum faciei illita maculas delet, unde & misceri potest balsamo Penotiano, qui contra rugas faciei elegans est remedium. In Maculis faciei spiritus vini animatus cum salibus volatilibus, ut & sacchar. Hi ac spiritus vini myrrhatum non frustra adhibentur, ut & Oleum Tartari.

Næsi materni optimè abluuntur lochii & secundinæ matris statim a partu, vel si tam citò non fuerint observatæ, medicamentis aliquantulum corrodentibus absumentur, prout lib. 5. illud pluribus sumus observatum.

## CAPUT XXI.

De Oris Vitiiis, Ejus Apertione, Coalitu, Scirrho, Tortura, male affectis ductibus salivalibus, Ptyalismo ☿ Fatore.

§. I

Os quoque suavitæ prænas, & meritò, quia ex eo, loco benedictionum & celebra-

tionum Divini nominis, saepe prodeunt blasphemiz aliæque calumniz, aut per id ingreditur gimus

nimis lenta & majori copiâ ab illis deglutita, qui parafitiorum & gulonum more interdum omne suum abligurunt patrimonium, ut ossa vix nunquam tantum valeant lucrari, quantum ora abstumunt & devorant, quæ peccata Deus O. M. juxta præscriptam legem variis & molestissimis quandoque punit affectibus, quales sunt 1. Oris inordinata & indecora *Aperio*, quando scilicet, quod ordinariè claudi debebat, præter decorum & voluntatem manet apertum. 2. *Coarctum*, quando id inconvenienter coaluit & ita unitum est. 3. *Scurbum*, quando id à tumore duro fuerit occupatum. 4. *Tortura*, si id vitiosè invertitur. 5. Quando ductus salivales vel à tumore compressi, vel aliter obstructi, vel in *Ptyalismis* nimis aperti existunt, vel fistula suborta fuerit. 6. *Fætor* oris, quando ex eo odor frigidus atque terreo expiratur, quâ graveolentiâ oris Medi Perfr laborant.

§. 2. *Locus affectus* sunt partes externæ & internæ oris, os enim constat ex partibus partim ossis, ut maxillâ superiori & inferiori cum dentibus, partim carnis, ut labiis musculisque labiorum, buccarum & maxillæ inferioris. Oris tota interna capacitas succingitur crassâ tunica, quæ gingivæ & labia ambir, & reduplicari putatur, quando uvulam constituit. Hic potissimum agimus de harum externarum partium affectibus, de internarum vero malis paulò inferius tractabimus, exceptis ductibus salivilibus à *Warthone*, *Stenone*, *Ratholino* & *Nuckio* inventis, post aures, propè oculos & per genas internè ad os decurrenibus, unde & varia nomina hic ductus acceperunt, quorum affectus prioribus hic subnectimus.

§. 3. Vitia hæc oris omnia vel ex ipsius ægri relatione, vel ipso Medici visu cognoscuntur. *Scirrhus* oris iisdem signis cognoscitur, quibus *Scirrhus* in genere. Ità Ductuum quoque salivallium vitia per se facillè patent, & ex sequente ætiologiâ clariùs innoscuntur.

§. 4. *Galenicis* ipsius *Aperitionis* & *Hiatûs* Oris causas varias enumerant, nempe luxationem maxillæ inferioris, distensionem cervicis ex vulnerum nervorum, consuetudine malam, Narium obstructum, vaporem ex febris adscensum, læsam in lethargo memoriam, à quibus omnibus os apertum vel plane nequeat recludi, vel ab ægri quid decorum sit, minus advortatur.

*Ofecitationis* causam statuunt vapores halituosus & excrementitios maxillarum & labiorum musculos occupantes, & facultatem expultricem ad excernendum stimulant, provocatos interdum à frigore aut excitatione à somno nondum absoluto, retentos verò à cutis densitate & paucâ perspiratione, ut ita ofecitatio secundum *Avicennam* languida quadam & invalida sit vaporum istorum expulsiô.

Oris *Coarctum* à naivitate vitio facultatis plasticæ frequenrius contingere fatetur, labiis ita inconvenienter unitis, vel ab ulcere aut vulnere malè curatis, aut tumore foramen illud occludente. Maxillarum vitia etiam accusant, à quibus in diductione impediuntur, ut ita os aperiri nequeat.

*Scirrh* causam etiam hic, ut in aliis partibus humorè putant esse melancholicum vel pituitosum, aut partibus tenuioribus à calore dissipatis

incrassatum, aut medicamentorum repellentium, adstringentium vel discutientium applicatione immoderata in tantam duntaxat redactum.

*Tortura* oris causam adscribitur musculus faciei vel nervus tertius & quintus conjugationis, cum cervicalibus malè affectis, imprimis à spasmo seu convulsione, vel ab inanitione, vel à repletionem subnato.

*Ductus salivales* cum planè ignoraverint, sed earum invenio hujus seculi felicitati sit adscribenda, priores & antiquiores de eorundem morbis nullatenus fuerunt solliciti, possunt tamen morborum eorum causæ secundum consuetudinem Galenicis principia explicari, ita ut *Salivæ* à continui solutione à causa secante vel pungente externa, *Ulcera* ab humoribus acerbis erodentibus, & *Tumores* à variis humoribus vel per affluxum, vel congestione in vasis hinc collectis oboriantur.

*Ptyalismis* causam proximam constituunt ipsius salivæ copiam, facultatem expultricem ad sui excretionem stimulantem. Remotiores vero internas accusant humoris serosi & pituitosi abundantiam, sive ille à cerebro ad fauces defluat, sive in toto corpore cumulat, sive ex ventriculo, intestinis, liene, pectore & pulmonibus proveniat. Externas autem inunctionem hydragryi, cibos humidiores & potum nimium, omnes salivam nimis augentes.

In Oris *Fætor* ut causam agnoscunt vapores foetidos vel à cibis ipsis per se foetidis ut allo, cepa, &c. vel in ventriculo & dentium interstitiis corruptis, vel ab excrementis intestinorum propter orificium ventriculi inferius minus clausum, vel humoribus foetidis aut in ulceribus diversarum partium corruptis, vel vermicibus in intestinis stabulantibus, adeoque ipsa putredine provenientes & vitiose per os exhalatos.

§. 5. *Paracelsus* proximè accedens non verbis sed silentio suo de *Aperitionis* Oris causis primum se subscribet & sententiæ facillè annuit.

In *Ofecitatione* quoque eò vergere videtur, ut causam ejus approbet humorem resolutum & in vapores fuliginosos abeuntem mercuriales, qui musculus & juncturis maxillarum tantam moveant molestem, ut *Archeus* per vim expulsi-vam eodem diductis maxillis adeoque ore dilatato ejicere opus habeat.

Oris *Coarctum* iisdem cum aliis vel in utero ex formatione deficiente, vel extra illum à materia glutinante ex vulnere vel ulcere productâ oriri posse concedit.

*Scirrhum* etiam in ore, uti in aliis corporis partibus, vel à sale nitroso in parvis oris dejecto, ibidem alienam naturam inducente, & tumores hocce inducente, vel à vitriolo in diuturnum abeunte produci putat, quorum posteriores taniores ob vitrioli corrosivitatem nonnunquam in ulcera abeant.

*Torturam* oris ad eos refert morbos, qui in spasmus & tetanum abeant, quamvis horum non habeant principia, nec ab ipsorum membris oriantur, sed in ipsis tamen generentur, quia tandem virtus crescitiva spasmis & tetani lædatur, & spasmus vel tetanus fiat, ejus verò causam vult spiritum esse Mercurii non subtilem, sed frigidum cursum peragentem, & ad musculos oris pertingentem tarditate suâ eos distorquentem.

*Ductum salivarium vitium & Ptyalismum*

*Ductum salivarium* vitia & *Ptyalismum* non minus liquori Mercurii adscribit, qui à sale & sulphure divortium faciens reliquos succos dissolvit, hinc sal extra reliquorum consortium constitutum, subtilissimum & conditionem expellendi sabiens vasa erodit, & eorum ulcera suscitatur, induratum verò & coagulatum tumores. Vulnera à causâ externâ contingunt vi quâdam vasa ista dividenda. Resoluti à spiritu mercuriali liquores impetuosè ad linguam ruunt & per salivam effluunt.

*Tortura.*

Oris *Factorii* causam imputat tum stercorei intestinorum etiam per os foetent, tum propriis excrementis oris, post digestionem ciborum in co factâ relicti, & aliquando spuo rejectis.

*Hæmonia oris causa Oris Apertionis & Osecationis.*

§. 6. *Hæmonia* eadem mens est de causâ *Apertionis* oris cum prioribus; *Osecationem* verò non tam à fuligine vult oriri, quam ab eâ faculare & parte, quæ imaginationi parit, ore videlicet stomachi, ita ut à segni stomacho dormitionem postulante, libido oscitandi musculos subter dormiendum inrequietos excutiat, tendat, & musculos buccarum & tracheæ in clientelam vocet, nullatenus verò osecationem esse musculorum mandibulæ, cum compressis etiam dentibus, adeoque noctu mandibulis proflus contrario, nihilominus possit oscitari.

*Crallum, Scirrhi & Tortura.*

De *Crallum* oris causis ultra priora ab aliis prolata nihil addit, *Scirrhi* verò à cruore ad os effuso & ibidem ad volatilitatem facto inepto produci credit, sicuti *Torturam* oris, ut reliqua spasmodorum genera à musculorum oris propriâ vitâ reducit, musculus istis proprio motu tumultuantibus.

*Ductum salivarium vitium & Ptyalismum.*

*Ductum salivarium* morbos & *Ptyalismum* à latice vel corrupto vel aucto originem fumere credit, quatenus in viâ varia sibi assumit salia aliaque digestionum excrementa, & inter ea etiam fermentum quoddam alienum, quod vasa exedit, vel lingua & faucibus cum amygdalis, quibus opificium salivæ à latice proprium esse credit, à morbis affectis ad vocacionem Archæi ex venis pronitè accurrit, sed morbis istos extinguere non valens per copiosam sputationem effunditur.

*Factorii.*

*Factorii* causas quod attinet, silentio suo proprio opinionis placidè videtur annuere.

*Intra Wilisium causa Oris Apertionis.*

§. 7. *Wilisii* non minus quam cæteris *Apertionis* Oris causæ variz existere posse videntur, potissimum verò præter malam consuetudinem Luxatio Mandibulæ inferioris, abs quâ magnum oritur impedimentum in ore debito tempore recudendo.

*Osecationis.*

*Osecationis* causam credit tum spiritus animales multis particulis crassioribus infectos, à quibus in transitu per tubulos musculorum maxillæ & buccarum impediuntur, quasque distensione fibrarum & angustatione tubulorum subsequente eam oris diductione tali modo exprimere & excurrere conentur; vel easdem particulis heterogeneas tubulos occupantes, quas spiritus animales minus vegeti tam promptè nequeant ejicere, nisi suscitato quodam impetu fibras istas musculares sive motrices aqualiter concutiant, & ad explosionem rei moleste excitent, quod & impulsu proprio peragere soleant.

*Crallum.*

*Crallum* causas easdem ipsas accusat, quas priores jam retulerunt.

*Scirrhi.*

*Scirrhi* in Oris partibus existentis causam eandem ægerit, quam aliorum membrorum

*Scirrhi* agnoscunt, corpuscula videlicet terrestria particulis salinis juncta, & post spiritus depressos longiore stagnatione in tumorem istiusmodi congelata.

*Tortura* oris causam, uti aliarum convulsionum particulariâ, copiam quandi heterogeneam statuit explosivam, spiritibus animalibus immixtam, & medullæ oblongatæ caput cum nervis musculos oris prospicientibus potissimum occupantem, unâ cum relaxatione interdum alterius lateris musculorum, unde oppositi fortius agant, & partem, quæ inter utrosque velut in æquilibrio consistere deberet, versus se totam corripiant & diutius detineant.

*Ductum salivarium Tumorem* à liquore salivari seu humore seroso à glandulis parotidibus, maxillaribus & sublingualibus effluente crassiore & stagnante, *Ulcus* ab eodem salino acriori corrodente; *Pulsus* verò ab externis causis scindentibus, pungentibus aut rumpentibus originem habere contendit.

*Ptyalismum* à nimia humorum serosorum *Ptyalismum*, crassiorum copiâ & superfluitate à glandulis modò dictis ad ductus nominatos profluente causari asserit, eò quod ob crassitiem tam facile nequeant vel per diuresin, vel diaphoresin fecerri; lapsiuscule verò ab argento vivo salibus subacta & vel inus adsumto, vel foris illito hoc propterea contingere, quoniam illud à particulis corporis humani salinis minutissimè dissolvatur, & in involutum penitissimè immisceatur, quas salium & Mercurii concreciones per omnes humores inque omnes totius corporis partes diffusas, dum molestiam pariunt, natura expellere moliarur, & quidem sanguine & forsan aliquatenus liquor nervoso recrementis istis mercurio salinis eadem omnimodo excurrere fatagentibus. In febrium etiam malè judicatarum declinatione crasseos loco salivationem hanc succedere observavit, humore excurrendo non tantum apertioribus ductuum salivarium foraminibus, sed & articularum oculis ubique confluxit exundante. Similem sputationem in Scorbuto inde excitari docet, quatenus in sanguine depravato salis ac sulphuris enormium recrementia plura & crassiora congeruntur, quam ut diaphoresi vel per urinam aut sedem satis excurrere possint, quæ tum ad oris emunctoria, quibus saliora sanguinis purgantia exire solent, deferantur, & sero diutè à vasis salivalibus exundantia sputationem hanc crecent copiosam.

*Factorii* causam statuit particulas salino-sulphureas, partim humoris per salivationem excreti, partim ciborum in dentium interstitiis aut ipsarum gingivarum ab humore corruptarum putrescentium continuò expiratas.

§. 8. *Sylvii* causam *Apertionis* oris potissimum accusat luxationem maxillæ inferioris, aut musculorum temporalium paralytin, vel viduus transversum.

*Osecationis* causam statuit halitus copiosiores ex ventriculo erumpentes, & ad sui exhalationem majus spatium postulando, musculos maxillarum & buccarum diducentes, ut per apertum os faciliorem habeant exitum.

Oris *Crallum* ab erosionè aut ulcere Labiorum aliquando contingere docet, partibus læsis ob glutinositatem succi ex ulcere effluentis sibi invicem concretescentibus, aliquando etiam os manere constrictum, aut musculorum temporalium convulsionem.

*Tortura.*

*Ductum salivarium vitium.*

*Ptyalismum.*

*Crallum, Scirrhi & Tortura.*

*Factorii.*

*Sylvii opinio de causa oris Apertionis.*

*Osecationis.*

*Crallum.*

*Scirrhi.*

*Scirrhi.*

*Scirrhi* causam statuit humores tenaces & spiritum acidum in oris aliqua parte collectos & condensatos, vicio imprimis glandularum.

*Tortura.*

Oris *Torturam* fieri vultu paralyti musculi oppositi, & alterius sani naturali & continua contractione, unde dum hæc ab opposito musculo paralytico non impeditur nec cohibetur, musculus sanus videatur torqueri & convelli.

*Ductum  
S. à variis  
morborum.*

*Ductum* Salivarium *Tumorem* oriri docet à saliva crassa viscidior, ductus hosce non modo obstruente, sed etiam in tumorem attollente. *Ulcus* verò ab eadem acidà acrior ductus erodente, & *Pulnus* à causa externa violenta scindente vel pungente, vel à rptione à saliva copiosiore & imperuosa in ductus influente.

*Pyralismi.*

*Pyralismi* seu Salivationis nimix triplicem statuere solet causam, nempe 1. Materix salivaris redundantiam, nunc ex ubere usu alimentorum liquidiorum, vini præsertim acidifculi, vel remedium vi sua peculiari salivationem moventium, imprimis mercurialium; nunc ex urinae aut sudoris confecti excretionis parciore proveniente. 2. Viarum sanguinem spiritusque animales ad glandulas salivares deferentium amplitudinem aut multitudinem, propter quam plus materix in salivam mutantæ affertur dictis glandulis. 3. Glandularum ipsarum salivam conficientium vitium, propter quod salivaris materix plus, quam decebat, excipitur è sanguine, mutaturque in salivam; licet illud vitium, quale sit, aut esse possit, nequeat determinare.

*Fætoris.*

*Fætoris* causam adscribit parti alicui in faucibus, ore, pulmonibus, vel alibi corruptæ & putrescenti, vel reliquis ciborum in dentibus corruptis & putrescentibus, ex quibus omnibus ejusmodi fætor erumpat.

*Cartesiani  
sententia de  
causa oris  
Aperitionis.*

§. 9. *Cartesiani* ipsius *Aperitionis* Oris causas itidem cum aliis seie communes statuunt, malam scilicet consuetudinem, luxationem maxillæ, & narium obstructionem, unde pro respiratione ægri os perpetuo fere apertum servare cogantur.

*Ofcitationis.*

*Ofcitationis* causam recensent particulas quasdam mucronatas acres, in musculus maxillæ inferioris hærentes, leniter fibrillas nervorum vellicantes, & spirituum versùs oris musculos influum promoventes, à quibus motus ille violentior producat.

*Coalitio &  
Clausura.*

Oris *Coalitum* vel labiorum accretioni in utero, vel extra eum ab ulceribus malè curatis, succo nutritivo glutinoso existente, contingenti accensent, uti diuturniorem ejus *Clausuram* maxillarum musculus paralyti laborantibus, aliisque morbis convulsivis aut soporosis, in quibus tum nervi, tum liquor eorum variis modis afficiuntur.

*Scirrhi.*

*Scirrhi* originem succo cuidam adscribunt tubulos musculares parium oris aliquantum obstruenti paulatim indurato, vel simplici condensatione, avolantibus nempe partibus subeioribus, relictiis terrestrioribus, vel coagulatione ab angularibus acidis particulis prioribus commistis inducta.

*Tortura.*

*Tortura* Oris causam potissimum valvulis adscribit in tubulis muscularum contentis viscosè dispositis, ut spiritus animales satis promptè & æqualiter nequeat ex musculo contractore in appositum extensorem transire, sed in contractore diutius detineantur, unde partes reliquæ musculum contractum sequi cogantur, nanciscuntur valvulis musculi contractoris eum si-

tum, ut spiritus per apertam quasi viam facilis in hujus, quam alterius tubulos influant. & partem ejus ad hoc vel illud latus distorqueant.

*Ductum* Salivarium *Tumorem* à salivâ multis particulis ramosis & angularibus acutis repletâ in tantum provenire censent, dum ramosæ illæ particule ab angularibus coagulata stagnationem inferunt, circa quam humor salivaris tenacior diutius subsistens, fibras vasorum distendit & intumescere facit; *Ulcus* ab angularibus illis particulis valde acutis & ab aliis liberatis produci contendunt, illæ enim sui juris factæ, & à solis materix æthereæ fortius agitata, fibras vasorum horum facile rodunt, frangunt, hisque ruptis foramen aliquod constituunt, per quod liquor contentus ab iisdem similiter corruptus assiduo emanat. *Pulnus* ab externo quodam instrumento scindente & dissecante, violentâ manu vasis hisce adhibito, induci cum reliquis fatentur.

*Pyralismum* oriri docent à nimia feri à sanguine præcipitatione, unde lymphâ copiosa per vasa lymphatica oris salivalia in os ipsum detraditur, existentibus simul glandulis nimis laxis, quod utrumque mercurii tum externo, tum interno usu frequentius oboriri solet, qui tamen accedant simili (sâ potentia) particulæ angulares acutæ & rigide, sive acidum in melancholicis sputaribus dictis, illud enim sanguinem coagulando tantum efficere credunt, ut verum præcipitatum à sanguine liberalius per vasa salivalia ad os doretur. Ventriculi cruditatem morbo huic eatenus aniam præbere concedunt, quatenus multi ab ea humores serosi & picuissimi generantur.

*Fætoris* causam esse existimant vel particulas ciborum in dentium interstitiis, vel poris, vel cavitatibus hærentes, & per lenem quandam digestionem putrescere incipientes, dum particule constituentes à se invicem secedunt, eumque fætozem à tartaro circa dentes hærente valde angere & foveri; vel vapores & halitus ex intestinis per ventriculû ingulant supremam ascendentes, & ibidem cum aëre à pulmone per aetieriam asperam expirato se mifcences; vel purulentam materiam in pulmonibus collectam & fætozem in os exhalantem, uti & particulas salivæ copiosiores à mercurio præcipitatas, quæ non modo fætozem hunc excitant, sed & gingivas corrumpunt, & ad putredinem disponunt.

§. 10. *Nostro* judicio Oris *Aperitio* à pluribus *Nostri* oritur causis, à tumoribus nempe circa juncturam maxillarum in inflammatione maxillæ & tonsillarum obortis, item quando oris cardo, in quo gena vertitur, obrigescit, & os redditur strictius, quo minus in rictu queat expandi, ab acido viscido humore in juncturam illam & vincula aliis imbibito. Ex vulnere quoque nervorum hiatus oris prodicitur, nec non à luxatione inferioris maxillæ, narium obstructione, lésione memoriæ, ut in lethargo fieri solet.

*Ofcitat* ortum habet à particulis acidis acrioribus stagnantibus, musculos maxillæ inferioris stimulantibus ac irritantibus. Ad ofcitationem proni post eam sæpe experiuntur os salivâ abundare, quod non aliunde est, quam quod musculi, quibus ofcitatior peragitur, simul & glandulæ & glandularum ductus salivales comprimentur, unde omnis quæ in iis continetur, saliva os versus demandatur, à simili seu potius gingivarum tumore & inde factâ compressione. Quod verò



officinate uno officiter & alter, inde oritur, dum à diſtinctione maxillarum fortiori ſpiritus in altero ſimiliter ita diſponantur, & determinantur, ut verſus eandem proturpant partem, & eandem ſerme diſtinctionem inſtituant, quâ in re mens faciliè occupatur.

**Caſitis.** Cauſa *Caſitis* ſeu Coaleſcentiæ Oris ſæpius à nativitate dependet, ob errorem formationis in utero, quo partes diſſolvendæ uniuntur, interdum verò extra uterum tum in parvulis, canero in adultioribus à malè curatis ulceribus, canero & hyperſarcoli obſiſſe experientia mihi com-monſtravit, diſruptis prius cutis & muſculorum fibrulis, quarum extremitates ab utraque parte ſe tangentes interveniente chylo gummoſiore faciliè glutinantur, coque modo partes, quæ diſtare debebant, viſoſè uniuntur. Oris occluſio etiam à maxillarum vitio dependet. dum deduci nequeant, ſed vel inferior capii ſit annata, vel humor viſcidus circa juncturam earum hæreat, vel nervi cicicis ſint vulnerati.

**Scurbi.** Cauſa *Scurbi* Oris eſt liquor evaſatus in tubulis ductus reſectus, tubulus obſtruens & avo-lantibus particulis volatilibus condensatus, vel ab acido quodam aſteriori coagulatus, partem non modo tumidam, ſed ob inſpirationem aut coagulationem illam etiam duriorē reddens.

**Tortura.** *Tortura* Oris eandem agnoſcit cauſam, quam Spasmus ſeu Convulſio, quæ cum in proximè præcedente capite pluribus jam ſit explanata, eò leſtorem noſtrum remittimus, ne cramben bis coctam proponendo aliquam moveamus nauſeam.

**Saliva ſa-rasin/ana.** Ad *Saliva* ſtatum morboſum antequam accedamus, more ſolito, quomodo in ſanis ſeſe habeat, prius contemplantur. Per ſalivam verò hic intelligimus humorem illum limpidum, qui per ductus ſalivales in os ſluit, non vero illud ſputum, quod cum exſecratione rejicitur, vel quod è naribus ſupra palatum è cerebro in os aſſurgit, quod quandoque circa fauces bivias aut iſthmum oris tenax & viſcidum adhæret, propterea & ſecreatu rejici ſolet; uti neque mucus tonſillarum, qui ſecreatu à tonſillis & ſucco iis proprio expimitur ex ſinu communi in os & fauces aperto. Quod enim ore ordinariò rejicitur, ſputi & ſalivæ mixtura eſt, non tamen dicendum, ſimplicem liquorem & phlegma eſſe inutile ſalivâ ſed varii generis particulas in ſe continet, quæ præter particulas alcalicas oleoſas, particulaſcintillantes etiam ſalem in ſe continere nos docent; præterea quod q̃ ii mortificationem eadē promovemus, particulas oleoſas acidis permixtas eſſe necceſſe eſt. Lac vaccinum dum excoquant ancillæ, ſi inter coquendum illud guſta-verint, & dein cochlear lambant, & ſalivâ adhuc madidum iterum laſti inmiſerint ebullienti, obſervatur lac hocce ſecedere non aliter, ac ſi liquor planè acidus fuiſſet admixtus, certo indicio, ab acido in ſaliva contento hoc proveniſſe. Salivam & habere adhuc alias particulas præter flexiles, patet ex canibus rabie hydrophobicâ laborantibus, quibus adeò eſt venenata ſaliva ut etiam alios inſiciat. Siplura huius rei cupis experimenta, adeas Cl. Dn. *Nuck* tractatum de *Anatomia Saliva* à p. 90. uſque 60.

**Diſſinum Salivæ.** Salivæ huic ejuſque ductibus varii accidunt affectus, præterquam, quod hi ductus aut *Pul-vere* aliquando læduntur, aut materiâ acri exeduntur, unde tranſitus Salivæ verſus os impedi-

tur, quod idem accidere poteſt à *Tumoribus* du-Tumoribus hiſce partibus ſubortis, quemadmodum aliquando obſervavimus à *Tumoribus* ductum ſalivarem ſiniſtri lateris tam ſuperiorem quàm inferiorem in tantum comprimi, ut tranſitui ſalivæ via præcluderetur & ægri os in totum ferme aridum habeant, adeò ut ſalivæ paucillimum tantum ventriculo per deglutitionem tradi poſſet. Si ductus ſalivales in glandula ſurculi concurrentes & pelvim quaſi facientes lædantur ex vulneribus harum glandularum faciliè *Ulcerâ ſiſtuloſa* ſuboriri ſolent, imprimis ſi vulnus ſit majusculum, aut tranſverſum abſciſſus ductus, aut materiâ acri eroſus; rarius tamen hoc accidit in vulneribus per exiguis aut ſecundum longitudinem ductum fibroſorum læſis, tunc enim leviori compreſſione ductum laterâ ſæpe coaleſcunt & priſtino ſtatu reſtituantur.

Cauſa proxima *Pyaliſmi* omnium Doctorem Cauſa *Pyaliſmi*. conſeſcit eſt ſaliva redundans, lymphæ enim in vaſis cumulata & à glandulis dictas delata, ſi quantitate immoſcit aut qualitate pravâ inbibita ſit, & ſæpe à glandulis tumefactis tanquam meſaria & ſuperflua exſpuetur, inde neceſſum eſt in os ut regurgitet, copioſamque excretionem conſtituat. Quomodo verò ſecreſcit hoc in glandulis fiat, diverſæ ſunt Auctorum ſententiæ. Nonnulli mediante fermento quodam hoc peragi putant, quod à ſucco nervoſo expectant, conſiderantes, quod nervi numeroſi plures glandulis inferantur, quàm quidem ad motum illarum & ſenſationem requirantur. Alii à varia particularum & pororum proportionē id deducunt: Nos verò ſequenti modo ſecreſcenti hanc ſeci ſumus perſuaſi. Sangvis namque arterioſus variæ magnitudinis & figuræ particulas conſtans, in glandulas has delatus, (ſive id fiat à ſubſequentis ſanguinis protrulione, ſive partium ambientium preſſione) ulterius propellitur, donec ad anguſtiſſimos glandularum venerit canaliculos, ubi dum potuli occurrunt diverſæ ab invicem figuræ & diametri, quorum hi unus, alii alterius generis particulas ſuſcipere apti nati ſunt, ſalivæ humor porulos ductuum ſalivalem, lymphaticum verò particulis magis flexilibus conſtans, ductus lymphaticos ſubit, reliqua autem maſſa per patentiores vias, venas ſcilicet, transmittitur. Rei huius veritas peritioribus Anatomicis cognita eſt, venis enim jugularibus ſubducto filo in cane arctè ligatis, non duntaxat lachrymas copioſius prodire obſervabis, ſed & ſalivam tam copioſè profluere, ac ſi q̃io aſſumpto fluxus è concitaretur, quod non aliunde, quam ab impediò ſanguinis ab arteriis in venas circuitu. Separatio verò hæc ut legitima fiat, requiritur particularum & pororum proportio, conſuſa enim miſcella ſeminis milli & frumenti per cribrum ſeparari poteſt, ſic Ori poroſitas q̃um admittit, quæ tamen aquam, oleum & aërem arceat; ſangvis itidem cum non conſiſt ex particulis indiviſibilibus, ſed ex corpusculis quantis & figuratis, quæ per proportionata tantû foramina permeare poſſunt, hinc in cerebro ſpiritus, in mammis lac, in hepate bilis, in renibus ſerum & in venis ſangvis tranſit. Magna ſalivæ quantitas in glandulis ſalivalibus ſecernitur, adnatum nempe in ſtatu ſano 12. horarum ſpatio uncias x. aut libram integram huius ſalivæ exſpuendo reddere poſſe, experientiâ conſtat, quæ verò non omnis ad os mittitur. Quidam non niſi ſingulis bichoriis unciam unam dunda-

ducatur deglutunt, aliis plus quam 2. uncie in ventriculo tradunt: hinc constat, tantam salivæ quantitatem præter quam ori, etiam ipsi stomacho, ut & toti intestinali tubo, virtutes suas communicare.

Sed & diverticulo, in viam. Salivæ ergo secretio aliquando copiosa adeo, ut *Ptyalismus* inde oriatur, & præsertim à quibus medicamentis aut infusione, aut fumigatione, vel etiam interne adhibitis, & tum frequentissimè ulcùcula in ore & lingua adsunt, os dolet, lingua tumet, dentes vacillant & os fetere solet, quia cum sero copiosus sal præcipitatur, qui suâ acrimoniâ os, linguam, & per vasa salivalia inter dentes ad dentes delabens gingivas affecere solet. Mercurius namque vel maximè exiguis glandularum canaliculos & tubulos in tantum aperit, ut excretio fiat satis copiosa. Sanguineæ enim massæ communicatus Quis, & in innumeras particulas orbiculares divisus ad omnes pororum configurationes sese accommodat, salumque aciculas, ubique hærentes confingit, quibus locomotis, plurimæ obstructions tolluntur, iisque sublati, tota materia morbifica per tubulos glandularum salivalium delata, patentiores jam invenit vias, quibus facilius in os fluat & foras amandatur. Sic quoque in Quartanâ aliisque affectibus vulgo melancholicis dictis *Ptyalismus* iste oriri solet, ob sanguinem crassie hujus pecanem, & tardius per glandularum salivalium canaliculos motum, qui acidum in melancholicis sanguinem coagulat, hinc necessariò in valorum extremitatibus stagnare debet, & copiosorem salivæ materiam suppeditare. In Scorbuticis & sputo sanguineo hoc symptoma non rarum est. *Ptyalismus* hic etiam oritur à nimia præcipitatione feri à sanguine, quare enim multa lymphæ per vasa lymphatica redit, per ductus salivares in os detruditur, quia etiam pori glandularum sæpe sunt nimis laxi. Ventriculi crudities anasim dat huic affectui, quatenus multum chyli serosi & mucosi generat, nam non faciliè ab aliis causis tam copiosum serum à sanguine separari solet. Salivatio etiam est aliquando salutaris. Phebisin *Ptyalismo* per septem dies perdurante restitutum legitur *Eph. Germ. Ann. t. Obs. 122.* Febrem ardentem ejusmodi critica salivatione judicatum fuisse testatur *Zed. Med. Gall.* quod & non ita pridem hic Castells in Matrona nobili à febre maligna *ptyalismo* laborante observavi, quæ & à me diu rectis brevi curatâ fuit. Sic quoque salivationem hanc promovere omnivaria medicamenta masticatoria dicta, imprimis herbæ Nicotianæ usus, partes namque hujus herbæ subtiliores & magis volatiles in vasa glandularum excretoria penetrantes, eas ipsas irritare, particulasque viscidas hinc illinc hærentes incidendo salivæ secretionem promovere valent. In pluribus cum salivæ & alii humores excrementitii externi solent cum comodo, quamvis in aliis adeo nocivus est ejus usus, ut continua hac salivatione massam sanguineam reddant non tantum in moru nimis tardam sed & exsuccam, uti sæpe hæcicam & ob acrimoniâ hujus summi phebisin inductam novimus, imò à Tabaci usu appetitus destruitur, quando scilicet in ventriculum abliguntur, hinc herbæ hujus amarores nihil vel parum appetunt; dyspnœa aliis oboritur, imò innumera alia mala inde orta observavimus. Saliva etiam ipsa vel acris est, vel verminalis, qualem nos in civi Hamburgensi vi-

dimus, cui sæpe tanta vis est, ut ab hac dentium intervallis aliquamdiu conclusâ mox colorem sanguinemque mutant, imò ab hac rubedo vini ore detenti prolixius peccat.

*Factor* Oris ut plurimum oritur ex primis viis, h. e. chylo fætido, vermibus, pure aliisque in ventriculo aut ejus annexis intestinis contentis corruptis, inde acres & fœtidæ hæc elevantur particule nares adstantium vellicantes, quod in ipso etiam Volvulo sive Iliacâ passione ex retentis fecibus contingit: hoc etiam fit quando Chylus non ritè à recementis suis liberatur. Quandoque materiam in ore corruptam, aut partem quandam oris pro causa habet. Huc caries dentis, gingiva tonsillarumque ulcus, fistula, &c. pertinent. Nonnunquam corruptum in pectore aut pulmone hærens tetrum spirat odorem, item in Ozœna, novimus enim quandam Ozœna laborantem, quem ob tetrum halitum nemo ferre poterat. In Gravedine sive Coryza nimis maturè & imprudenter suppressâ & materiâ inspissatâ. Imprimis ab opiat, hujusmodi factor produci solet: sic nuper quidam in Coryzâ assumptis statim ab initio pilul. de cynoglossi, à quibus materia in crassata in ventriculo cerebri ob stagnationem putrida reddita maximum factorem aggroto conciliavit, ut factorem hunc in excreta materia ipse vix ferre potuerit.

§. 12. Oris illi affectus si cum magnis morbis, imprimis cephalicis sunt stipati, magnum portendunt periculum. *Prognosis.*

Oris *Aperitus* seu Hiatus à mala consuetudine, præter dedecus nullum luetit timendum periculum, sed à luxata maxilla, convulsione, aliisque causis producta, pectus quidpiam timendum esse subinnuit.

*Ofuscatio* sapius nulla indiget curatione, sed discussa materiâ maculis molestâ faciliè cessat, si nix, verò sit frequentior, diuturnior & in nixu accidat, curatio ferè nulla est, dubia autem, si maxillam inferiorem luxet, utplurimum etiam febrium existit prælidium.

Oris *Coarctatus* à natiuitate obortus longè curatust difficultior illo, qui est à tumore vel alia causa, labia vel alias oris partes coagulando. *Coarctatus.*

*Scirrhus* in Oris partibus majus periculum infert, quam in aliis corporis locis, & si tumores hi imprudenter tractentur, in ulcera cancrofa facile abeunt, *Ulceræ* etiam oris non bene tractata in seipentia degenerant. *Scirrhi.*

*Tortura* Oris eandem admittit prognosin, quam superiori dedimus capite de Laborum viniis. *Tortura.*

*Ductuum Salivalium* affectus, ut *Fistula*, *Ductuum* Tumor, Cancer, Ulcus, magnam involvunt periculum, & postulant expertum Chirurgum, quare ductuum horum cognitio Chirurgis admodum est necessaria. Ductus salivæ lætus non semper est curabilis, sed aliquando in fistulam transit. In Saliva quoque vermes conspiciuntur, seu exemplum communicavimus curiosis. *Fistulam.*

*Ptyalismus* seu immodica Salivatio aliquando magnorum & multorum morborum exhaustit scaturigines, quod monumenta Medicorum hinc inde testantur. In Cephalalgia nempe, Odontalgia, Gravi Auditui, Phthisi, &c. sæpe levamen attulit. Eadem salivatio prodest infantibus dentientibus, quando scilicet corum os irrigat, relaxat enim gingivæ & hinc eruptionem faciliat. Improbandum verò est nimium, & quidem à quibus

bus excita us in morbis visceribus labe quadam infectis & scorbuticis, quale exemplum non ita pridem in milite observavi, miserè inde vitam cum morte commutante. Siccitiam malum est, si Ptyalismus fluens in morbis subito deficit. Periculi non est expers, si magnis & serosis evasationibus conjungatur, quia cerebrum saepe à sero inundatur & diuturnum fluxum, quem glandulae absque dispendio non ferunt, significat. Malus, si glandulae simul inflantur, ex glandularum enim tumoribus febres omnes male sunt, teste Hipp. S. 4. Aph. 55.

**Emetici.** In *Fatorem* Oris quo causa deterior, eo & affectus incurabilius haberi solet, & pro varietate causae & prognosin dicenda est.

**Diala.** §. 13. *Dieta* ratione in his affectibus Oris recensitis ante omnia *Aer* vitetur multis particulis acidis repletus, vel corrigatur variis suffragiis ex junipero accenso, thure, mastic. &c. *Ovis* sunt euehymii, eupepti & polyotij hi, exulenti difficultoris concoctionis, qualium saepe mentionem iniecitimus, & redet saepius hac repetere, cum & ipsi aegri hodie non amplius in huc Medicorum praescripto obediant, nec monitis salubribus obtemperent. In laesio Ductibus Salivalibus dixta sit exsiccans, potu parca solummodo manu assumo, & his bis convenientibus, ut salvia, scolopendria, betonica, melissa, rad. enul. caryophyllat. & similibus vulgo cephalicis dictis & vulcratus medicata. *Somnus* etiam si moderatus, imprimis in Ptyalismo illi indulgendum, necesse enim minus fecerit saliva, quod à variis dependet causis, quia circulatori sui nec tardior est, subsequenter secretio minor, motus mulcolorum, praeterit linguae, feriatur, hinc & glandularum pressio minor, sic & animi motus cessant. Quod attinet *Motum* & *Quiescent* iis tantum indulgendum, quantum videtur sufficere. Siccitiam in reliquis *Excretis* & *Retentis*, item *anymis Parhematibus* quid tenendum, superiora facit docerunt.

**Curatio Pharmaceutico.** §. 13. *Curatorem* Pharmaceutico-Clinici *Apertione* Oris *Galenici* ad causam varietatem referunt, maxime consuetudinem regulis criticis corrigendam suadentes, in reliquis vero speciebus humorum correctionem & evacuationem pro more suo imperant, per venesectionem, purgationem, cucurbitularum applicationem, potus ex herbis cephalicis, & illinitionem maxillae circa juncturas cum oleis & unguentis calefactis & discutientibus, Unguento Agrippae, Arcegon, ol. flor. alb. sampluchino, bacc. laur. croci, castorei & styracis.

**Ofsatione.** *Ofsationis* curam tum ad materis vapores suppeditantis, seu humoris statulenti exclusionem, tum ad vaporum ipsorum disquisitionem vel revulsionem dirigunt, adhibito prioris scopi gratia interdum levi quodam minorativo ex sol. len. additis carminantibus; posterioris vero ratione suadet *Avicenna* vel Iben Sina vinum aequa lymphae portione dilutum & epotum, alii vero acori vel aliorum carminantium masticationem commendant.

**Coalitiu.** Oris *Coalitiu* à raritate solâ sectione corrigibilem cum aliis pronunciant, à reliquis vero causis ortum, iis dentis itidem corrigi, & in formam debitam restitui posse consentiunt.

**Scurbiu.** *Scurbi* curam difficilem esse fatentur, tentandam vero aliquando volunt eductis prius humoribus, peccantibus, per medicamenta valde emollientia, ut emplastrum de Gummi Ammoniacum,

vel suppurantia, si ad suppuracionem vergere videatur.

**Tortura.** *Tortura* Oris curationem non aliter atque *Tortura* ipsius Convulsionis aggrediantur, quare non opus est remedia ad morbos convulsivos alibi propolita hic absque commodo repetere.

**Ductuum Salivalium** viorum curatio ad *Ductuum* communem methodum dirigitur, quae in mor- *Salivalium* bis istis generalioribus erit conspicienda.

**Ptyalismo** curare auspiciantur evacuatione *Ptyalismo* vel exsiccatione humoris serosi vel pituitosi copiam peccantis, adhibitis pilulis Alajareth, Cochii vel Aleophanginis; caput in caratilis confortant, & siccant remediis cephalicis calefacientibus intus & foris usurpatis, ut speciebus diagalang. anihos, diacor. herb. majorana, salvia, beton. rad. calam. aromat. aristol. cassia lignea, nuc. moschata, thure, mastiche, in species pro cucupha redactis & capiti impolitis; tum ipsas confillas oboliunt, decocto ex adstringentibus, ut tol. plantag. myrti, querc. flor. rosar. balaustior. alum. in ore sine gargariatione detentum.

**Fatorem** Oris emendant cum causarum extrin- *Fatorem* satione, tum medicamentis fragrantibus & suavolentibus ore detentis & masticatis, qualia sunt Nux moschata, rad. Ir. florent. Zedoar. Cort. citr. caryophylli, Galia moschata, ambrola, pulveres dentificii odorati, cum flor. lavendul. spic. rosar. anih. fol. majoran. saliv. basilic. Ventrículum etiam roborant & officium moribus adstringunt pulvere post pastum, Morulis Imperativis, Confect. cardamomi, Cuiandri. cinamom. Cydon. & Nuc. Ind. conditis, Confec. menth. rosar. vino medicato salivato caryophyllato, & similibus.

§. 14. *Paracelsus* in curandâ *Apertione* Oris *Paracelsus* nullam praestabit methodum diversam ab eâ, quam Galenicis superius demonstrarunt, quare & eius sequaces eidem sine obmurmuratione ullâ acquiescunt.

In *Ofsatione* vix medicamenta adhibet, *Ofsatione* quoniam per se expulsi vaporibus molestis cessare solet, si vero hominem diutius & gravius inflicto, medicamentis in rebus mercurialibus convenientibus etiam hanc eorum speciem abigere suadet, videturque Elixirum Juniperinum hic commodè in usum duci posse.

Oris *Coalitiu* non alia cura corrigere novit, *Coalitiu* quàm a prioribus jam annotata.

In *Scurbi* hoc curando medicamenta ex ter- *Scurbi* bina & lithargyrio parata aliis praeterea, adhibito simul studio, nec in canem abeat, nec diversum quid hic *Scurbi* ab aliorum partium *Scurbi* curatione reposit.

Ad *Torturam* Oris non alia adhibet remedia, *Tortura* quam quibus in reliquis spasmi speciebus uti solet, praepriis singulare juvenam sibi promittens ex quinta perlarum essentia, aliisque remediis spiritum mercurii corrigentibus.

**Ductuum Salivalium** morborum & *Ptyalismo* *Ductuum* curationem similiter ita morbosum esse retur, ut *Salivalium* tum salis, tum mercurii diversa habeatur ratio, in *Anteriorum* Ulceribus & Vulneribus praeter aliis balsamum ar- *Ptyalismo* senicalem commendans vel potius oleum ex mumiâ arsenicali, liquore myrrhae & borin confectum. In *Ptyalismo* Spiritum Mercurii corrigendum suadet remediis tubulicari ejus maxime conformibus, imprimis quae ex ligno Guajaco & buxo comparantur.

**Factoris.** *Factoris* Oris abigendo ablationem oris ab Eremitis, ut putat, introducam singulariter inferre iudicat, ut eidem corrigendo odorata in ore detenta.

**Hibemontia.** §. 15. *Hibemontium* in claudenda Oris *Aperitione* non est adeo sollicitus, sed eandem operam reliquis committit, nec *Ofuscationem* cuius statim medicas adhibet manus, quin stomachum se-  
**na cura in**  
**Oris Ape-**  
**ritioe &**  
**Ofuscatione.**  
**ne.**

**Coaltum.** *Coaltum* curationem alius peragendam relinquit, *Scirrbum* per gummatum resolvit, & in *Tortura* axungiam anguillæ eidem ut in aliis spasmis serid commendat.

**Ductum** *In Ductum Salivarium* vitii & *Ptyalismum* curandis ad laticem respicere jubet, & affectas fauces, nec non ipsam stomachi digestivam, quibus omnibus remedia antimonialia maxime convenire sibi alii que persuadet.

**Factoris.** *Factoris* curationem tum odoratis, tum stomachum & digestivam facultatem roborantibus percipere videtur, ad quod Elixir proprietatis ab eo correctum non parum confert.

**Willisimod.** §. 16. *Willisimod* in Oris *Aperitione* cum reliquis ad causas respicit, pro quarum diversitate etiam curationem variantam esse admittit, nec quidpiam peculiare aut ab aliis nondum manifestatum hic locorum in medium profert.

**Ofuscationem.** In curanda *Ofuscatione* spiritus animales à cras-  
**Ofuscationem.**  
**Ofuscationem.**

**Coaltum.** In *Coaltum* curando ab aliis nullatenus recedit.

**Scirrbum.** *Scirrbi* Oris curationem iidem uti reliquarum partium Scirrhorum emollientibus peragit & resolutivis gummosis, ut alibi pluribus percipitur.

**Tortura.** In curâ *Tortura* Oris eod præ aliis respicere solet, ut spiritus animales à copula aliena liberentur, eorumque æqualis in utriusque lateris labiorum musculos promoveatur influxus, quod spirituosus & antiepileptici ex succino & castoreo peragitur, nec non Balsamo Capivi & fuccini foris inuncto.

**Ductum** *In Ductum Salivarium* Tumore stagnationem humoris serosi resolvit medicamentis sudoriferis ex lignis & C. C. additis herbis Card. bened. fumar. scabiof. rad. serpentar. virgin. aliisque. In *Ulceris* humore salinum acriorem corrigit remediis similibus, hinc ipsum ulcus mundat & abstergit decocto hordei cum melle rosarum, & tandem unâ cum *Pulvere* adstringit & cicatrice claudit gargaris & decoctis herbis vulnerariis & alumine.

**Ptyalismum.** *Ptyalismum* curam ita instituit, ut humores serosos à crassitie liberet & subtilifet, quo postmodum facilius vel per diuresin, vel diaphoresin possint eliminari, nec tantâ copiâ ad glandulas & ductus salivares deferantur, quod ipsis remediis tum diureticis, semine dauci, baccis junip. heder. rad. chærefol. petrosel. fœnic. ering. millep. flor. sal. armon. sal. succin. tum diaphoreticis, ex rad. petasit. Contrayerv. sem. Card. bened. herb. fumar. rut. bezoard. min. ceruss. & ii, &c. peragit,

additis simul in scorbuto remediis eidem propriè dicatis.

In *Factoris* Oris particulas salino-sulphureas ex *Pulverem* corporis corruptis & puriscentibus productas corrigit & emendat collutionibus ex rad. Imperat. helen. Ir. Florent. lign. fantal. odorat. herb. sal. ment. fol. lauri, flor. rosar. in aq. coctis, & frequentius adhibitis, non omisiss fortioribus, si gingivarum caro corrupta putrefcat, ut decocto rad. gentian. arithol. rotund. herb. centaur. min. ablinth. Pont. farurej. aq. leq. in aq. calcis, aut liziviali, addito melle. *Factoris* urgentem aliquando cum reliquis odoratis in ore detentis aut masticatis solet obpalliare.

§. 17. *Sylismum* curationem *Aperitionis* ad causas itidem dirigendam præcepit, quarum respectu maxilla luxata in debitum situm & locum est restituenda, musculorum temporalium paralysis salibus volatilibus tollenda, & vulnus debite sanandum.

Ad *Ofuscationem* curandam halitus discuit *Ofuscationem* salibus volatilibus oleosis interius assumtis, & un. potissimum ex plantarum partibus halitum dis-  
*Ofuscationem*  
*Ofuscationem*  
*Ofuscationem*

Oris *Coaltum* curari vult incidendo & diducendo partes concretas, hinc earum novam concretionem impediendo interpositâ laniellâ quâdam convenienti, ne se invicem immediatè attingant, & tandem in utraq. parte debitam suscitando cicatricem, quod facilius obtineri novit exsiccatis humoribus illis acerbis in ulceribus contentis.

In *Scirrbo* humores ab acido condensati resol-  
*Scirrbi*  
*Scirrbi*

In *Tortura* curatione eadem adhibet remedia, quæ in reliquis convulsionum & paralyfium speciebus in usu habere solet, salibus videlicet lixiviosis ratione convulsionis, & unguentis nervinis ex castoreo, roremarino, succino, &c. loco paralytico foris inunctis & illitis.

*Ductum* *In Ductum Salivarium* Tumorem curat remediis attenuantibus & incidentibus, tam collutionis, quam fomenti formâ usurpatis; *Ultera* remediis salivam acido-acriorem corrigentibus, ut lap. hæmatit. canceror. sangu. diacon. tum subadstringentibus & blandè aromaticis, quæ simul in *Pulveribus* convenire existimat, exceptâ eorum dissectione, quam nullo modo curari novit.

*Ptyalismum* seu copiosiorum Salivæ proven-  
*Ptyalismum*  
*Ptyalismum*

q. Mass. Pilular. masticin. ʒj.  
Resin. Jalapp. ʒj.  
Ol. succin. gr. iiij.  
M. F. Pilula No. xx. Invenitur.

Sumat æger cubitum iturus tres quatuorve, ut bis aut ter ad summum inde purgetur. Inter diuretica & sudorifera præ aliis remediis commendat Decocta minus ingrata aliquoties in die, aut potius ordinarii loco usurpanda; Ex. gr.

q. Rad. Chin. in caliculis.  
Apri an. ʒj.

C c

Ref.





figill. &c. copiosum verò jam præcipitatum ad conveneriores vias, uncteres scil. derivando, & cum urinâ simul effundendo, quod promtè & jucundè præstari potest spiritu Salis Armoniaci, terebinth. lumbic. Tinctur.  $\text{Qi}$ , liq. terr. fol.  $\text{Qi}$ , spir. Oli Martis  $\text{Q}$  ididic. Salis dule. Tincturâ flor. cyani, calcatripp. lap.  $\text{ss}$ . percartestis ovar. subtilissimè pulverisatis. A Mercurio prædoctam salivationem nimiam sistere aggrediuntur vel remediis poros cutaneos aperientibus, ut particulâ mercuriales lubricitate suâ per eos elabuntur, ut decocto rad. Chinæ, vel remediis angustos poros habentibus, ut iisdem arctius ob similitudinem pororum adhaereat, dum à materiâ subtili ad eadem propellitur, qualia sunt numerus aureus ore detentus, & folia auri intus assumpta. Si opus sit, poros etiam vasorum salivalium nimium apertos replent & obturant decocto fol. plantag. flor. rosar. balaustior. in aquâ ferarior. addito bolo Armen. quod in ore tantum retinendum, absque agitatione, ut vasa salivalia eò melius coarctentur.

*Tumor.*

In *Tumore* Oris ad ipsas respiciunt causas, mundando dentes à quibusvis ciborum reliquiis, ne eadem vel in eorum interstitiis, vel poris, vel cavitatibus diutius hærentes putrescant, hinc post unamquamque cibi assumptionem os jubent eluendum, & dentes pulvere dentifrico ex ossè sep. Corall. rad. Ir. Florent. fol. rorismar. myrrh. & paucò alum. ust. probè purgandos & abstergendos: vapores autem & halitus ex intestinis per ventriculum ascendentes emendant medicamentis aromaticis, & suaveolentibus, digestionem simul promoventibus & halitus in intestinis discurrentibus, ut Elixir. menth. Tinctur. Cass. lign. Essent. citr. Claret. moschat. *Myrs.* Marmelad. cydon. Pulvere stomachali ex rad. Zedoar. acor. nuc. Moschat. macis, cinam. & cubeb. cum paucò Ambr. Materiam purulentam in pulmonibus contentam corrigunt balsamicis terebinthinatis & anisatis, nec non balsamo Peruviano albo. Particulas salivæ à Mercurio copiosius præcipitatas & gingivas corrumpentes diaphoreticis ex ignis eliminant, ipsasque gingivas decocto ligni lissit. cort. Guajac. fol. sal. veron. flor. rosar. & myrrh. à putredine præservant. Quando verò in rotum deleri nequit ista otis graveolentia, eandem moschat. & ambrais remediis ore detentis solummodò succedere suppressere aut palliare, ne aliorum confortio ægritales reddantur odiosæ.

*Nostra Cura in Oris Apertione.*

§. 18. Nos itidem existimamus curationem *Apertionis* Oris pro causæ varietate diversimodè esse instituendam, ex pravâ enim consuetudine si fiat, obviandis sunt juniores, atque sectio admonendi, quo ad figuratâ decentiorem omni studio & maxillas cum labiis component, nec cuius vento os patulum opponant, non enim semper allâ columba per eum venit deglutienda; si verò à maxillæ luxatione dependeat, illa restituenda manu Chirurgi: vulgo dicitur, alapâ inflectâ restitui posse maxillam luxatam, sed audius est, si restituitur magis sollicitè manu Chirurgi. Si à Tumoribus vel Inflammationibus ronsillarum obortum fuerit malum, illi potissimum resolvendi & discutiendi sunt tum diaphoreticis intus exhibitis, tum sacculis ex flor. Camomill. sambuc. herb. aneth. parietar. betonic. spec. pro eucuph. & similibus forissecus impolis. Si à spasmodicis affectibus vel vulnere

nervorum, tunc conveniunt antispasmodica tum interna, tum externa, imprimis ol. lavendulæ cum balsamo nervino externè illinatur.

In *Occlusionis* diuturniore humores acres in *Occlusionis* musculos delati demulcendi & discutiendi sunt, quod spirituosus seu volatilibus diaphoreticis peragitur, & potissimum spiritu C. C. essentificato, sale volatili succini, essentia fœniculi, aliisque spiritibus amicis. Ab aliis morbis si dependeat, ad eos cura primariò est dirigenda, iis enim victis symptoma illud sponte cessat. Externè illinantur muscoli variis itidem spirituosissimis anodynis, maximè verò hic convenit balsamus meus arithriticus externè illitus.

In *Qualitate* Oris partes vitiosè connexæ separandæ sunt ferro, interpositâ postmodum lammellâ quidam eburneâ, donec cicatrice obductâ partes arte sejunctæ ulterius non concresecant. Si est ab hyperfarciosi, conducet aq. viridis, alum. vel fortius  $\text{q}$  rub. præcip. Ad ipsa ulcera oris convenit sequens:

*R. Ag. burf. pastor.*

*plantag.*

*fol. quere. aa.  $\text{ʒi}$ .*

*Syr. de Symply. Fern.  $\text{ʒij}$ .*

*M. Vel spirit. vin. Camph. cum Decocto  $\text{ʒ}$*

In *Scirrhis* Oris tumoribus conveniunt internè, quæ vim volatiliandi habent, ut Salvolat. viperar. Tinctur.  $\text{ʒij}$ , spir.  $\text{q}$  aromatic. Externè emollientia & dissipantia adhibenda, ut Emplastr. diasulph. Vul. malax. ol.  $\text{Qi}$ , cui quoque *Gia* volatilia addi possunt.

Ad *Torturam* Oris eadem adhiberi possunt *Torturæ* remedia, quæ superius cap. 19. de Labiorum vitiis, Spasmo Cynic. &c. in medium protulimus. In hac præter Dietam exsiccantem commendat *Barboulanus* in *Art. Hæff. Volum 3.* cephalica, vesicatoria in occipite & post aurem partis affectæ applicata, quæ tamen remedia non semper probamus, sed calore extractum ejusque spiritum sæpe sufficere existimamus, cum aliis volatilibus cephalicis dictis *vis* Anticongulvis.

*Vulnus Ductum Salivarium* prudenter tractandum est, & quidem omni modo annictendum est, ut consolidetur hinc prodest compressio horum vasorum manu, vel inposito emplastro, ex compressione enim ductus litera facile coalescere possunt, & hisce in vulneribus apprimè conveniunt remedia acidum insignientia, ut sequens vel simile emplastrum.

*R. Resin. pin.  $\text{ʒvi}$ .*

*Terr. Japon.  $\text{ʒij}$ .*

*Ol. Mestich.  $\text{ʒi}$ .*

*Cog. ad Consistent. Emplastri.*

Si vulnus est majus aut transversum factum, aut ex materiâ acri corrolum, plurimi sunt qui cauterium applicant, sed hic cautela *D. Nukii* observanda, dicentis, non hoc à ferro ignito semper expectandum, sæpe quidem hoc mediantè vulnerati ductus osculum clauditur, sed si non longe ab extremitate ductus, ubi in os hiat, contrigat, sublequi solet, quod à salivâ continuè secretâ à ductus glandulâ versus cicatricem quotidie extendatur & sacculum facere incipiat, qui cum sese extendere amplius non queat, humorem collectum os versus interne aut externè

Cc 2

evomit,

evomit, & fistulæ infansibilis causa evadit, quod ipse exemplo uno & altero confirmat. Non ergo, ad mentem prædicti Autoris, prope osculum ubi in os hiat, ductui salivæ cauterium applicandum, ne ductus extendatur & facci formam induat. Prope glandulam autem ipse ductus, aut per glandulam dispersi ductus minores urantur, quoniam hi parum salivæ excipientes ita extendi non possunt & saccum formare, quo necessario ipse salivæ canalis usum suum amitteret, venæ & arteriarum adinstar umbilicalium. Sed etiam aliquando hoc in casu tuto cauterium potentiale vulgo dictum ductui hæc applicare licitum est. Sic clariss. & prælaudatus D. Nuckius ipse vidit superiorem ductum salivalem Stenonianum læsum, & continuò salivam fluantem, admoto caustico ex oleo Vitrioli cum melle rosato permixto, brevi temporis spatio aliis incassum tentatis curatum, cum hoc subsequente incommodo, quòd hic ductus salivæ in totum usu suo fieri ita destitutus. Antequam verò id fiat, tentari possunt varia remedia modicè resolventia, ut sunt resin. pini, Emplast. stict. *Croal.* Internè detur potio vulneraria cochlearum, quæ salivæ acrimoniam maximè temperat, pauca verò herbe vulnerariæ coctæ in cerevisiâ vel vino sufficiunt, & singulis tribus horis interpositis detur cochlear eunum vel alterum. Esto in juniorum gratiam formula.

*R. Pyrol.*

*Virg. aur.*

*Sanicul. 2a. Mj.*

*Rad. saraparil. 3ß.*

*Pulveris.*

*R. hujus Pulv. Cochl. j.*

*Coq. cum vin. alb. lbj.*

*Interponatur Essent. nostra Vulneraria.*

Externa omnia hisce vulneribus tepidè applicentur. Eodem modo paululum mutato in ulceribus fistulosis procedendum est, adjicietis nempe Mercurialibus & Saturninis, prout videre poteris capite de Vulneribus & Fistulis.

*Ulcus.* In *Ulcerebus* Oris ut non abeant in serpentina, collutionibus semper instillari possunt aliquot guttæ spiritus Vitrioli, spirit. salis. Sequens Tinctura in ore deserta etiam maximopere conveniet.

*R. Raf. lign. Guajac. 3ß.*

*Jussaff.*

*Rad. Chin.*

*Saraparigl. 2a. 3j.*

*pyreth.*

*Alum. crud.*

*Gum. lac.*

*Salis \*ci*

*mirri pp. 2a. 3ß*

*Herb. Hyssop.*

*rmo.*

*virg. aur.*

*orig.*

*serpill. 2a. 3j.*

*Croc. orient. 3ß.*

*Lucif. & centuf. M. inde vitro & superfund.*

*Spir. vini & acer. vin. 2a. lbjß.*

*Sicut in Infus. per triduum pro extrahenda tinctura, ut est artus.*

Vel aqua viridis seq.

*R. mellis 3j.*

*sulph. aluminis 3j.*

*alb. grac.*

*sabin. 2a. 3ß.*

*fol. hyper. verisimar. ruta plantag. salu. pulg. 2a. Mß. Coq. in vin. alb. & aq. lbj. ad consumptionem diges unum, sub finem addendo virid. er. 3j. dein coletur. confect. ulceribus oris, palatum ac faucis aphthæ si in forma pargarismi cum decocto Tabaci & solani aut veronica datur, mundificat enim & consolidat ipsa quoque ulcera venerea.*

In *Ptyalismo* ad serum copiosius educendum aliquando conducunt hydragoga, frequentius tamen diaphoretica & diuretica, quibus lymphæ copiatè peccans optime educitur, & à ductibus salivalibus ad renes, ureteres & vesicam derivatur aut revellitur.

Interdum humoribus lentor & crassities est concilianda, cujus rei gratiâ exhibeatur gumm. tragacanth. Arab. &c. vel detur pulvis boli Armen. 3j. Camphor. gr. iij. Ore detineatur decoctum adstringens ex fol. plantag. flor. ros. balaust. in aq. ferrarior. factum & quietè servatum, ut tantò melius adstringantur ductus salivales. Si Salivatio à quolibet fuerit producta, uti solo decocto Chinæ cum rad. scabios. & herb. Veron. & cum *Carthagenis* nummum aureum ore detinere jubeo, qui semper igni impositus iterum dealbandus est. A sero evalato ortum si habeat, conveniunt pilulæ de Succino *Craon.* Rob. Nucum cum  $\nabla$  plantag. item opiatæ, quæ optima sunt. In primis viis si vicium hæreat, convenit Elixir propr. uti in Scorbuto convenit Elix. antiscorbuticum. Si sit pueris tempore matutino cum genarum rubore, signum est vermium, & anthelmintica conveniunt.

Ad *Fistulam* Oris à carie dentium productam auferendum, eo ante omnia annitendum est, ut ipsa caries auferatur & dens evellatur, sin minus, gallia moschata cum rad. Cyperi & mastiche mixta denti cavo imponatur, vel sæpius eluatur os aquâ Ducis Candale, egregio certè remedio; in hujus verò defectu abluantur dentes aquâ, in qua  $\odot$  cum fuerit solutum, & hoc repetendum post prandium & cœnam. Si verò est ab ulcere narium. vel ex putredine, vel ex ulcere occulto, illa sunt prius curanda, quæ tamen difficillimæ sunt curationis. Internè præmissis aliquando absorbentibus conveniunt hoc in casu Elix. prop. item antiscorbutica, aciculæ quoque conducunt, ut & decoctum Theæ & liquor. Externè pulvis pro suffumigio *Barbette* convenit. Simul ex primis viis & intus latente visioso acido vel ulceribus aliisque malis ibidem hærentibus ociatur, omni ope annitendum, ut isti curentur morbi, quorum curatio aliis in locis sufficienter detegitur. Sic quoque in cura palliativa ad molchata confugiunt & ambrata; in quem finem variè excogitantur trochisci ad detinendi.



## CAPUT XXII.

*De Dentium Morbis, Odontalgia, Corrosione vel Carie, Fistulis, Mobilitate, Casu, Nigredine, Lapide dentali, Sorditie, Stridore, Hemodiâ & Vermibus.*

## §. I.

**D**entes in maximo semper fuisse æstimo non duntaxat sacræ sed & profanæ testantur paginæ, imò Deus Optimus Maximus tanti eos in lege Mosaica æstimavit, ut *Exodi* 21. servum cui Dominus dentes effregisset, manumittendum mandaverit. Eandem dignitatem dum Peruviani considerant, dentes Diis sacra facturi, sibi eximunt, & summi cultus nomine offerunt, ea potissimum ratione inducti, quod Diis optima quævis offerri debere, homines autem dentibus nil præstantius aut necessarium magis habere videntur. Et id certe non immerito, qui enim ipsorum munus in masticatione ciborum solidorum perperdit, quis eos non magni penderet, præprimis cum probe factam masticationem proba sequatur digestio ad vitam nostram maximè necessaria, ita ut Arabes prudenter statuerint, qui masticationem negligunt, vitam oderunt. Eò etiam collimant plures Medicinæ Proceres, à dentium pluralitate longevitatem, paucitate vitæ brevitem prædicentes, teste *Coo* nostro 2. *Epid.* §. 6. dicente: Longævi plures dentes obtinent. Idem etiam fortitudinem denotant, & novi quendam hortulanum duplicem dentium scricum habentem fortissimum. Non minor dignitas dentibus accedit à loquellâ, dum ad sermonem articularum magnum conferunt adjumentum. Exemplis infancum hoc liquet, imò eorum certa conformatio vocum articulationi mirificè favet, hinc Hamerius in *Salutis* Lingg. Or. P. à Chirurgi sibi diversimodè dentes radi carabat, quo aptiores fieri pronunciandis quibusdam literis Hebraicis. Certe dentes suo nitore & pollice insigni seipsos omnibus & singulis commendant, nigritie verò aliisque vitiiis hominem dedecorant. Utriusque alveolis inserti sunt dentes in homine 28. vel 32. Prædictio & futurorum à quibusdam ex dentibus desumitur, hinc Marona quædam Lipsiæ matrimonii tempore tres tantum filios peperit, & quoties unum enixa est, toties cum eo dentem sapientie ut vocant simul accepit, qui quoque dentes morientibus hisce filiis exciderunt, hinc sarmina filius semper mortem prædixit, prout testatur Mcellenbroccius in *Eph. Germ. Ann.* 1. *Obs.* 100. Hæc tamen non tantum regulæ stricte sunt observanda. Quanto verò majorem usum toti œconomiz præbent & digniores sunt partes, eo pluribus & atrocioribus sunt obnoxii morbis, hinc magnitudo vel à violentiâ externâ, vel à defectu alimentii periclitatur. Modò exerti & justo longiores prominent, modò vacillare & mobiles fiunt, modò excidunt & planè deficient, modò plures numero sunt quam par est, modò nigrescunt & fædo lentore tophisque obducuntur, modò carnosi & fistulosi sunt. Singula licet satis gravia hominiquè molesta sint, attamen nullum est symptoma dentium, quod crudeliùs & crebriùs afficere solet, quam Odontalgia seu Dentium dolor, qui licet sæpe primò fronte levis videatur, non raro tamen cum gravioribus aliis

comparandus corpus affligit: ordine ergò in illorum affectuum indolem inquirere constituimus.

*Odontalgia* Græcis dicitur, ab ἀλγος dolor, & ὀδὺς dens, factâ derivatione, hinc Latinis dicitur *Odontalgia*, seu *Dolor dentium*, appellatur à *Scribelbergero* *Dentium dolor* *Odontalgia*, interque Guttarum species refertur, quia guttatim in dentium gomphosin humores pro excitandis doloribus defluere existimat, nominat quoque dentium podagram, meliore potius jure potuisset appellari arthriticis, vel Spasmus aut Convulsio dentium, quia fibrillæ ab acido ita convelluntur ac dolorificè contrahuntur. Sed ad quem usum ejusmodi nomina fiunt, an non sufficeret appellare unico verbo Dentium dolorem?

Sub hoc dolore & comprehendere libet *Sten. Stenporum* dentium, iterà dolorem ipsis dentibus, quoad nervosas & membranosas fibrillas eventem, quando jam in loculis suis existunt, nec ab extraneo acido superficiei tenus affecti sunt.

Describitur vulgo *Odontalgia*, quod sit tristis sensatio partium membranarum in dentibus, proveniens à solutione continui, introductâ à re acri & acida, continuum violentior & cum impetu solvenre. Adest enim tristis sensatio, quia plures sunt, qui vitæ ac animæ sepe cum periculo eadè laborant, quippe præ dolore sæpius ad infantiam laborantes nequeunt quæ faciant, se ipsos gladio interficere, jugulare, vel capite partibus incurfare conantur, quale exemplū de muliere Aemarianâ adducit *Forestus*, item *Salmon* l. 3. *Obs.* 32. iniquis, novi quosdam præ ædicia ejusmodi dolorum vehementiâ penè exanimatos, alios ad insaniam fere redactos fuisse. Ad quam actionem pertineat hic affectus, relinquimus Scholasticis disputandum, cum non libeat cum his in arenam descendere, nam ipsi res relinquunt & de verbis tantum sunt solliciti.

Sæpe *Odontalgia* causa existit causa *Corrosio* *Corrosio* dentium seu *Carie*, quæ describi potest, quod sit *Carie* pororum dentium corruptio, ab acibus vel aliis tartareis acidis; reliquis ipsi adhærentibus, vel vermibus, producta, dolorem maximū inferens.

Sic quoque in his dentibus præcedente corio. *Erum* *Foramen* ita excavatum, ut *Fistulam* in carnosioribus partibus merito diceret, à particulis acibus improporionatis ita excavatum.

*Mobilitas* dentium dicitur, quando digito ita *Mobilis*, moveri possunt, ut facili Marte eos eximere possis, vel à gingivarum vicio, vel ipsarum radium excisione dependens.

Quo pertinet & *Casu* dentium, quando scilicet *Casu*, ab eadem causâ sed atrociori planè ex suis aveolis excidunt, caries enim incipit à parvo puncto, ab acido scilicet quod primitus nigrescit, hinc fenestra aperitur, & sic dens excavatur, corrosio verò si penetraverit ad densis radicem nervæam, oritur dolor.

In *Stridore* dentium tremulè movetur maxilla, unde nascitur sonus ex dentium crebriore collisione.



*Sordiditas.* Sic & *Sordiditas* vel *Tophi* & *Nigrities* dentium interdum conspiciuntur, quando scilicet dentes ita sordidi & nigri sunt, ut hominem planè dedecorent, & adstantibus nauseam faciant, ab acido corrosivo ita facti.

*Hamodia.* *Hamodia* dicitur, ubi dentes dulcia acidaque ferre nequeunt, ab acido salino producta.

*Vermis.* *Vermis* etiam in cavitate dentium reperiuntur, ab ovulis ibidem producti.

*Parti affecta.* §. 2. Principalem *Partem affectam* ipsa nominis ratio insinuat, & sunt Dentes utriusque maxillæ & superioris & inferioris. Hi quidem potissimum afficiuntur secundum membranofas partes eorundem cavitates succingentes, quæ nervo tertie conjugationis irradiantur, & pullantur à particulis heterogeneis, tumque dolor acerbissimus percipitur. Dolor nunc in fibrillis nervæ dentium cavitatem cingentibus, nunc in gingivis. Disputatur inter Medicos, num dentes in substantia sua dolent? & plurimi sunt, qui hoc statuunt: alii sententiam hanc, & quidem iure, impugnant, permoti, quod dentes tanquam ossa sine dolore frangi, secari, limâ atteri possunt, unde omnem ipsi sensum denegant; nos persuasi sumus, nullum sensum fieri posse absque fibrillis nervæ & in iisdem constitutis spiricibus animalibus. Si enim accuratè examinemus, in quâ parte dentium dolor fiat, extra omnem dubitationis aleam inveniemus, 1. tactûs organum genuinum esse membranas, in quas nervi infinitis fibrillis sunt expansi, 2. tanto exquisitiorem sensum vel obtusorem iisdem contingere, quo magis vel minus nervi easdem irradiant; 3. Ossa subtili membranulâ vestita, quæ acutissimi est sensus periosii nomine veniens. Ut igitur Deus Optimus Maximus nudos dentes effecerit quoad basin seu partem extra alveum prominentem, ut concisioni ciborum citra molestiam vacarent ullam, neque quoad hæc partem sensus æquè manifestus sit; non minus tamen ac alia ossa membranulâ pollent tenuissima, internam cavitatem succingente, nervis item ex tertia conjugatione instructi sunt, ac circumcirca parietibus gaudent membranosis seu nervæ succo repleti, vel cavitatem eorundem, vel ipsos dentes succingentibus. Et sane istæ membranulæ satis capaces sunt ad suscipiendum dolorem, quippe quæ maximâ subtilitate gaudent, maximamque affinitatem habent cum nervis, à quibus tanquam parvi funiculi dependent, quibus irritatis & irritantur ipsi nervi, & succi stagnare coguntur. Dolor hic dentium quandoque infallibile est signum conceptionis, quod plurimæ confirmabunt mulierculæ. Singulatim & gingivæ afficiuntur imprimis in dolore dentium, quando ipsæ inflammationem patiuntur, interdum etiam in Odontalgia ipsæ consuecuntur maxillæ, totumque caput. Quamvis verò dentes omnes & singuli obnoxii sint doloribus, magis tamen id experiuntur, qui profundiores habent radices, quod molaribus præcipue competit, unde ad hos potissimum mali labes derivatur, ibique contumacius urgent cruciatus & diuturnius ut plurimum. Dentes mutæ vitæ & nutritionis sunt participes, non dumtaxat per propria sua vasa, arteriolas, venas, nervulos, sed & ex adjectâ gingivâ firmiter

dentibus annexa, unde & dentes crescant, nisi continuâ attritione immineantur.

§. 3. Assignata jam ritè affectûs parte affectâ, devolvimur ad morbi *Cognitionem*, quippe quæ ad curationem ex legibus artis insinuendum, ut citò, tutò & jucundè morbus curetur, summè necessaria est, testè *Hipp.* dicente: qui morbum cognoverit, facile poterit medicamenta ad istum curandum invenire. Quoad Odontalgiam dolor ipse inhærens se manifestat ipso sensu, satis vehemens, acutus, punctorius, tensivus, circa dentium radices præsertim torquens, ex sequentibus varia sequuntur symptomata, appetitus imminuit, pavores, vigilæ, delirii, motus convulsivi, inquietudo, gravativus capitis dolor cum pulsatione temporum, siquens salivatio, pallor vel rubedo faciei, sapor in ore saluus, stridor dentium, tumor genarum, aliquando inflammatio gingivarum cum tumore, rubore & calore, quin sæpius ipsa febris hunc affectum tanquam comes vel pedissequa sequitur; hinc interdum dolor est adèd acutus, tensivus & intensus, ut ægri manus violentas expetant. Quo aciores letum habet cuspidem, eo dolor est vehementior. Interdum dolor est vagus, interdum fixus, prout humores crassioribus, vel acrioribus acidis particulis referti sunt, vel quo vermes in cavitate dentium plures vel acidum corrosivum excedat. Visu etiam percipi potest, qui dentes afficiantur, an sint excavati, an verò circa radices, ubi maximè inferuntur nervi, afficiantur, nam spinâ non ablata dolor vix remittitur, qui sæpe adèd vehemens est ut ægri delirantes manus sibi inferant, quale exemplum novimus.

Sic & *Caries* dentium, *Fissile*, *Mobilitas*, *Cassus*, *Nigredo* & *Hamodia* ipso visu & ex ipsius ægri relatione patent.

Inspectenda etiam est gingiva, in quâ si vitium hæret, dolor, inflammatio, tumor, corrosio & putrefactio aderit, sin minus, dolor erit obtusus & non ita profundus, sed secundum latitudinem dentis extendetur, & sine omni dubio denserit cariosus veniâ nosq. materia scædens. In nervis & membranis si sit, dolor profundior est & vehementior, in funiculo si dolor sit, secundum longitudinem maxillæ extenditur magis, quam secundum longitudinem dentis, & in superficie observatur. Si ex primis vis originem habeat, id cognoscitur ex repletionem, dolore & conturbatione in venticulo præexistantibus. Si *Vermis* adsint, maximus est pruritus dolorque interpolatus, exiguis intervallis desinens & rediens, imò motus vermium interdum percipitur.

§. 4. Quoniam casusatum cognitio est morborum exploratio admodum necessaria, ita ut *scindimus* absque eâ morbi nec præcaveri, nec feliciter curari queant, nobis etiam incumbit in affectuum dentium causas inquirere. Ut verò eo melius veritas eruatur, aliorum sententias nostræ pro more præmittimus. Veteres itaque *Galenus* in *Dolore* dentium vel intemperiem quandam simplicem, vel humorem è cerebro, aut venticulo, aut hepate ad dentes ob loci debilitatem irruentes accusant, dum iidem nervos eorum alveolis insertos premant, quorumque intemperies calida & copia major præ aliis dolorem huncce adaugeat, maximè verò quando in dentium radicibus jam sint obfirmati.

**Dentium** In *Singapore* dentium interperiem frigidam  
**Singapore,** nervos antedictos infestare autumant, quam frigidam etiam externa occurrentia adaugeant, ad quæ etiam acida referunt & austera.

**Corrosione & Carie.** Corrosionis & Cariei causam acculant humores putres erodentes dentium essentiam invadentes & perterebrantes, quæ exciso si profundius penetret, *Fistulam* dentium dicunt oriri.

**Mobilitas.** *Mobilitas* dentium causam recensent gingivarum laxitatem aut erosionem, ab humoribus quantitate peccantibus inductam, ut ita dentes non facis arcte & firmiter à gingivis detineantur.

**Cafu.** *Cafum* dentium oriri dicitur vel ob eandem gingivarum laxitatem & corruptionem, seu putredinem, vel ob ictum violentiorem, quo ex ipsis gingivis expellantur.

**Stridor.** *Stridor* dentium causis annumerant imbecillitatem musculorum maxillarum à frigore indutam. vermes in cerebro membranas vellicantes, & vapores copiosos ad musculos prædictos delatos, à paroxysmis morborum quorundam, & in primis febrium intermitrentium incipientibus

*Sordite,*  
*Tophu &*  
*Nigredine.*

*Verminibus.* Vermes propullulare credunt ab humoribus in cavitate dentium corruptis & putrescentibus.

*§. 5. Paracelsus* Dentium hocce morbos ad unum omnes à Mercurio exoriri docet, qui singulari sua vi modò dolores, modò laxationes seu vellicationes, casus, putredines, stridores, fordities, nigredinem & vermes per modum influxionis inducit.

§. 6. *Helmontius* rigidus ille Scholarum cen-  
sus pro *Dolorem* Dentium non d. catari: his originem  
habere statuit, sed quod dens hic aut ille vel de-  
fecta gingivā nimium sensiblis factus sit, vel aliā  
male digesta ultimi alimenti sui materia circa ra-  
dicem dentis putrefact. Differre enim vult diges-  
tionem parium alarū in hoc, quod hæc in culi-  
nis fiat libi internis, illa verò in culinis radicis  
lorum continguis, hinc frequentem esse dici  
odontalgiam, dum gingiva decreuit, & dens ef-  
ficilior.

**Corrosionis & Cariei.** Corrosionis & Cariei causam adscribit excremento gingivarum, quod in senio dentes nimium accrescit, dum dente crescere desinit, & alimento vix indigo, gingiva pusculum alimentum rapit, cruenta fit & tumida mox minuitur, ac velut cariosa evadit, quæ carie, cavitate & putredine simul dentes inficiuntur, præcipuè quibus in juventute mox tempestivè accretionem suspendunt.

*Mobilisatio & Casus.* Denium *Mobilisationem* & *Casum* ab eadem gingiva decretescente, nec dentibus utantè continguam habere poter, eoquod dentes debito suo vinculo ita deficiantur.

*Stridoris*, *Stridoris* causam nullam novit peculiarem, sed hac in re aliorum sententiae faciliè adstruere videtur.

*Superis.* Stuporem dentium oriri existimat à spiritu vitali peregrino quodam caractere in cerebro imbuto, & errore quodam ad gingivas & dentes ipsos deducto, quo dum dentium radices in gingivâ existentes intemptivè irrorentur, molesta huncce scâsum percipiunt.

*Dentium Sordidum; Tophos & Nigredinem*, nec non ipfos eorum *Formas* quod attinet, hocce morbos dentibus pro diversitate eorum aetatis Auctor hic obvenire statuit; uti enim dentem post octennium hominis candorem vitri opaci vel lapidem limacis referentem, adolescentem, deinde sensim pallentem, mox surde albescentem tanquam ebur, juvenem, postea vero obscure pallentem, ut in lyncipizans & defunctis virginibus spectatur, in aetate virili constitutum, & tandem pallide flavescens instar ossis, ad aetatem senilem vergere existimat; ita cadum ejus putat esse aetatem, quando cariosus, cavus, niger, verminosus & olidus est. Inimul ipsas etiam acculat gingivas, dum cruentae vel minus sanae dentibus non apte cohaerentes, & carvae sive fossilis, ad dentem male nutritum abinde ab lux indispositionis exordio relinquentes, dentem nigrore extravenati sui cruoris tingant, siveque excrescentum gingivarum, ubi praeparato cruore pro nutritione dentis fuisse concordit, ita & aliqualem suscipere determinationem sive potentiam dentalis duritiei. & ubi mucaginem ciborum & potuum combibat, mox quoque festinare ad destinatum duritiem & decedere in lapidem, quatenus semel sigillum coagulati semenque lapideitatis pro dente suscepit, quod, etsi recrescentum jam factum esset, adhuc retineatur, non quidem ut tartarus proinde esset. sed à determinatione Arcei, quâ jam ad destinationem destinatum fuerat, adeo ut insolitum non sit putandum, dentes proferre excrescentum, hocce olidum & putidum cruore resolutum cadaver, mucaginem verò linguae à cibus impectam siccatâ nec perire, hui admista fuerit excrescento, quod inter dentem & gingivam insensibiliter prorumpit, hocque ut dentis sit excrescentum, ita duritiei determinationem hausisse ab initio, adeoque crustae lapideae specie illud esse dentem adnotatum. Hanc itaque ob causam juxta lesionem gingivarum & dentium lesionem, ab excrescentis scil. pluralitate & feritate docet æstimandam, & non secus atque cerebrum obstruam plurimum muci, & quavis alia pars incommodata foras multas accumulet, ita dentes horumque mutices partes si sine oblatâ, non nodicum lapidescentis, ac puridi recementi obtrudere, quod quia non tam ciborum exuvium, quàm humanum sit excrescentum, ideo omnibus Nationibus peraeque putidum contingere lapidem dentalium, qui Paracelsum circumvenit, & Tartari suspensionem in nobis auxerit.

§. 7. *Wilksium* causam *Oedentalgia* constituit quodvis incongruum & improporionatum sensibile, cum humoribus serolis per ductus salivales gingivis communicatum & fibras membranaceas nervas in iisdem sub demibus contentas ob invicem dividens & divellens, ob quod spiritus animales ibidem placide alios hospitantes simul abemanaone sua confusa repellantur, distrahantur & in fugam veitantur, ad continuata eorum serie repulsus iste ad *πρωτον αιθρησιον* communicatus spiritus ibi degentes in parem confusionem cieat, sicque doloris five molestie ejus efficiatur preceptio.

*Cariæ, Corrosivæ & Effulæ* causam putat particulas falsas acres dentibus diutius adherentes, & substantiam eorum non modo erodentes, sed profundius quandoque perterebrantes.

Carici,  
Corrosionis  
• Effluvia

- Dentium Mobilium & Causæ**  
*Mobilis*  
*Causæ*
- Sordidum.** *Sordidum* dentium ab agitatione nimia maxillæ inferioris originem habere existimat, dum vel à motu explosivo spirituum animalium in affectibus spasmodicis, vel aliis habitibus in febribus nimium concutitur & dentes invicem alliduntur.
- Sordidum, Tophos & Nigredinem** dentium à corrupto gingivarum nutrimento produci iudicat, & sæpe ab externis causis, ut cibus minus convenientibus.
- Hæmodia & Vermium**  
*Hæmodia*  
*Vermium*
- Hæmodia* ab acidis austerris fibras nervosas nimium constringentibus, & *Vermis* ex putredine humorum in dentium cavitate facta deducit, principii ætatis foras detrulsis vetus hospitium affectantibus, coëuntibus & invicem conjunctis corpora hujusmodi videntia producentibus.
- Sylviopiniæ de causa Odontalgia.**  
*Sylviopiniæ*  
*de causa Odontalgia.*
- Sylviopiniæ* humorem acidiorum in *Odontalgia* ut causam accutat, à succo pancreatico in corpore abundante ad dentes derivatum.
- Dentium Cariei & Fistulæ.**  
*Dentium Cariei*  
*Fistulæ.*
- Cariei* & *Fistulam* dentium ab eodem acido aërio ad dentes delato originem sumere docet, quod singulari sua vi adeo profundè solet penetrare.
- Mobilis & Causæ.**  
*Mobilis*  
*Causæ.*
- Mobilis* & *Causæ* dentium à gingivarum majori vel minori laxitate ab humoribus copiosis eo profusus inducta deducit.
- Sordidum & Suppurum.**  
*Sordidum*  
*Suppurum.*
- Sordidum* ab agitatione maxillæ oriri cum aliis statuit, & *Suppurum* ab austerris nimium constringentibus & spiritibus torpidos reddentibus.
- Sordidum, Tophos & Nigredinem** item ab acido substantiam dentium corrumpente, & succos viscidiores circa eandem coagulante exoriri contendit.
- Vermium.**  
*Vermium.*
- Vermium* etiam in dentibus proventum contingere putat à ciborum, imprimis carniarum, in cavitate dentium diutius retentorum corruptione.
- Cartesiani de causa Odontalgia.**  
*Cartesiani*  
*de causa Odontalgia.*
- Cartesiani* de causa Odontalgia ut causam accutant particulas angulares acutas vel cum succo nutriente ex arteriis, vel cum lymphâ ex ductibus propriis in anteriorem dentium cavitatem illatas, quæ inordinatâ suâ mixtione & motu irregulari cum aliis ibidem jam contentis fibras nervosas & modulares dentium vellicunt, pungunt, distendant & ruptionem earum adinchoent, quam spiritus animales ad commune referentes sensorium, in mente ideam excitent doloris. Hujusmodi verò particulas acutas vel cum cibo & potu, vel etiam cum aëre dentibus communicari dicunt, præsertim dentibus jam erosâ & cavitate ad medullam interiorem & ipsos nervillos prolongatâ, in quâ nonnunquam coagulationes particularum ramosarum cum angularibus acutis, & hinc valde pressiones & digestiones in fibrillis illis obveniunt.
- Corrosionis seu Cariei causam** similes constituant particulas acutas valde pungentes, & dentium poros ingredientem interstitia illorum tandem dissolventes, maxime si dentes antè cibis calidis & potu frigido illis mox superhausto redditâ fuerint friabiles, quæ caries si profundius pertrebretur, *Fistulam* dentium inde formari ostendunt.
- Dentium Mobilis** contingere norunt, quando gingivæ vel relaxantur, sive copiosiore
- nutriantur succo, & magis idèò expandantur, ut in pueritia & juventute contingit, in quibus dentes minores non respondent dilatatis alveolis, sive ab affluente liquore lymphatico & salivari humectentur & distendantur, quod ab inundatione mercuriali aliisque salivantibus dictis obvenit; vel quando gingivæ à salibus erodentibus consumuntur, ut satis altè dentes nequeant invellere & obfirmare, quod in scorbutico contingit, eò quod saliva ista scorbutica fixa nutrimento gingivarum minus sint accommodata, eaque propter arescant. Quo verò laxior vel magis absorta sit caro illa gingivarum, eo facilius ipsum dentium *Casum* subsequi nullatenus dubitant, quæ tamen & à violentis causis externis, ut casu, ictu, &c. contingisse, fucunt experti.
- Sordidum** dentium causam ab agitatione maxillæ dependere cum reliquis adferunt, quatenus fibræ membranæ & nervosæ à peregrino quodam vellicantur, & spirituum animalium æqualis per tubulos confectos denegatur transitus, sed hi obstacula non pauca inveniunt inordinatè hinc inde transcurret, & ubi vis penè fibrillas offendant, unde maxillæ & dentes neque constanter conjungi, neque ab invicem detineri possint, sed frequentius allidunt, & hoc sæpe in paroxysmo febrili obtingere ajunt, quoniam à crudiore & crassiore succo aurâ fibræ comprimantur, & tubuli angustentur, quin & ab angularibus & cuspidatis quibusdam particulis ipsæ fibræ convellantur, quod & præ iracundiâ nonnulli ex professo faciunt, aut quod mens eorum officii sui obliâ violentiorem spirituum agitationem non satis compescat.
- Sordidum & Tophos** dentium inde produci credunt, quod vel ciborum particulæ ob figurarum & magnitudinum suam convenientiam cum dentibus, intercedente sola quiete, iisdem fortius adhaereant, vel ob viscositatem & ramositatem à particulis quibusdam acutis lamellatis in ipsis dentibus jam contentis coagulentur & inspissentur, ut ita non modo in lapideam quandam abeant duritiem, sed dentibus etiam ob particulas cuspidatas eorum poris unâ inhaerentes firmius annexantur.
- Nigredinem** dentibus idèò obvenire censent, quatenus eorum pori, quos alias habent minutissimos, à particulis acutis perterebrentur & amplificentur, ut radii luminæ in iis suffocentur, quibus particulis instar salis cujusdam volatilis saccharum maxime constare prohibetur.
- Hæmodia, sive Suppurum** dentium causam constituant particulas non modò acutas, sed & hæmatas, fibrillas medullares & nervosas valde compingentes, ut spiritus simul comprimantur, nec libero suo motu ob fibrarum tubulos efformantium rigiditatem ulterius fruantur, hinc nimis tenæ ad quemcumque leviorum etiam contactum moleste moventur & vi quadam flectuntur, quam molestiam dum spiritus communi sensorio offerant unâ cum ideâ quadam ineptitudinis ad motum, perceptionem stuporis hujus in eodem excitant; ejusmodi verò particulis abundare dicunt succos quosdam valde acidos & acerbos, ut prunorum sylvestrium, citriorum, berberum, ribesiorum, pomorum aliorumque fructuum immaturorum, quorum comestione aut haustum hæmodia ista facili sublequatur.
- Vermium** progeniem etiam in dentibus ex ovulis egredi mente sua concipiunt, dum mediante cibo

cibo à muscis aliisve infectis ovulis suis conspurcato dentium cavitati inferuntur, & animalcula hæc à mediocri illo calore putredinoso à reliquiis ciborum fuscitate ibidem excluduntur, qualem Odontalgiam à vermic productam notavit. cl. Clauderus, Eph. G. D. 2. A. 7.

*Notra sententia de causa Odontalgia.* §. 10. Nos cum Cartesians in Odontalgia pro causâ immediatâ habemus solutionem continui, quæ est vel vellicatio, vel rosio, vel tensio, vel irritatio, vel quæcumque commotio violenta membranosarum & nervosarum partium dentibus adjacentium, quæ sunt potissimum à particulis cuspidatis angularibus salinis acerbis in humoribus hospitantibus, & circa dentium partes membranosas imperium sibi rapientibus. Sic in nimio fluxu humorum, ubi sæpe simul regurgitant humores & ad dentes decumbunt, non legitime factâ circulatione, sed ibidem inducâ stagnatione, hinc tum in aliis individuis consimilibus Odontalgia oboriatur, tum hujus rei exempli præbent scimitæ, si vel ob graviditatem, vel ipsam obstructionem mensium, fiat redundancia. In gravidis sine doloris dentium sunt frequentissimi, hinc rarum est, quod notavit Bartholinus in *Ad. Hæst. Vol. 3. Obs. 17.* in propriâ uxore, quæ Odontalgia laboravit, quando non gravida fuit, gravida verò factâ dolor hic evanuit, neque prius rediit, quam quando peperit. Serosi etiam, viscidî & salii, acres, caecochymici & scorbutici humores ibidem accumulati auctores sunt hujus affectus. Serosi, viscidî coagulando & tendendo, acres, salii & ejus farinæ frindendo, rodendo, pungendo, &c. singuli particulis inæqualibus angularibus acutis fibrillis membranaceas rodendo sensum tristem inducere apti. Non tamen æque effectus dolorificus confurgit, nisi vellicetur motus duplex generationis & localis, uterque circulum sanguinis & lymphæ turbans, unde velut spina infigitur pari, quod simile fuit Helmontianum in ejusmodi dolorum speciebus aliquoties usurpatum, & dolores hinc oborti necellum est. Si enim serum acerbis, erodentibus & acidis particulis referuntur est, dolores dentium & mobilitates sunt. Latet & causa in alimento proprio & innato depravato, & in excrementum aliquando acre, mordax, causticans, pungens & corrodens degenerante. Gignuntur hi vitiosi liquores in ipso loco per stagnationem ab obstructione factam; huc faciunt jactus, casus, ictus, percussio, contusio, alique, quæ doloris hujus generationem promovere possunt, vel ob errorem externum, hinc ob congesta observantur & dentes cariosi redditi, & sæpenumero in horum cavernulis producuntur vermes, pungendo & vellicando molesti.

Frequentissimè verò particulæ vitiosæ huc stagnant per evasationem seu sanguinis, seu seri acrioris, unde à sero & insolenti catarrho intolerabile patiuntur homines odontalgiam. Sic in hypochondriacis & scorbuticis non solum gingivæ sensum exprimunt lutosum, acetolum, corruptum & tartareum serum, verum etiam dolores dentium fat atroces toto die sentiuntur. Exemplum hujus rei quoque præbet insigne lues Venerea, quæ ut serum viscosius & acius conjunctum habet, ita doloribus capitis & dentium juxta ac tumoribus partium glandulosarum in facie infamis est, imò arthritici quoque divagari ad mandibularum incolas salinum rodens & urens inquinamentum frequenter pergenscuna.

Ex primis viis ex digestionem viciatâ Odontalgia oboriri potest, non bene digesto chylo, sed crassiore facto. Cerrè nihil ita præter aciores particulas in serum & sanguinem transmittitur, quæ auctores sunt hujus morbi.

Causæ remotiores, quæ ansam vel occasionem & materiam præbent priori eandemque excitant, desumuntur vulgò ex temperamento, ætate & sexu. Itâ scemînæ, quæ seroiores sunt, prævisis Odontalgia pluries afficiuntur. Aer etiam affectui huic plurimum favet, hinc frequentius judicantur incolæ maris Balthici & alii populi septentrionales carie & doloribus dentium affici ob aerem inclementiorem; & contrario autem in Ægypto, ubi aeris clementia insignis, vel fortè ob aquæ Niloricæ saluberrimæ porum, rarius vel dentes dolere, vel decidere, vel cariosis evadere scribitur. Sic & Odontalgia maxime ferax est autumnus & hyems flante Boreâ; obstruuntur enim tubuli ab acido seu frigido aëre, unde stagnatio humorum facilius ab aëre acido nitro'o. Sicut exemplum in viro quodam dum hæc cibo observavi, qui tempore æstivo Odontalgia correptus ob doloris vehementiam pavimento frigido faciem suam imponit, exinde humor totius faciei adeo accrevit, ut magis faciem bovis quam hominis repræsentaret, durante suppuratione deliria maxima passus est, & cultrum petiit ad apericiendam genam, inflammatione accedente ad meningas cerebri, mortuus est.

Cibus ad producendum malum hoc facit non solum immodicè lutosus, sed vitiosus etiam qualitate prædixus. Hinc nocent nimis salina, insu-mara, allia, cepæ, alique pravisucci edulia, acrimoniam sero conciliantia, præprimis dulcis dentibus ipsis insensibilissima, ut saccharata, quæ eosdem corrumpunt, lutosum enim sanguinem generant; quo & referri potest historia ultima ab *Henr. ab Heer* allegata de muliere quadam, quæ sicibus improvidè adhibitis dolores adauxit.

De Potu idem sentiendum, upotere qui copiam suâ digestionem interturbat, fuscipiens imprimis intensè frigidus, glacie potissimum itâ redditus, quippe adeo notum, quam quod notissimum est, frigida, ob coagulationem quam faciunt, dentibus esse inimicissima, tantoque magis id fit, si v.g. jusculis calidioribus assumtis desuper frigidus hauriatur, unde, quod adversissimum est ventriculo, ab uno extremo ad alterum subitaneo facto transitu & fibræ relaxantur, & coagulo æ stagnationi humorum serosorum aperiantur fenestræ. Nocet & potus intensè calidus dentibus, hinc & ipse potus Theæ fervidus dentibus dicitur insensus. Quies etiam, somnus & vigiliæ, excreta & retenta si minus ritè se habeant, dolori huic producendo vel augendo operam haud parvam contribuant. Ad animi pathemata tandem referimus Iram & Terrorem; illam, quia spiritus in corde & arteriis ad motum citatiorem provocat, nervos irritat ac convellit, humores exagitat, morbosque sæpe inducit lethales: Terror verò coagulando humores mil-lenos morbos inducere potest.

Causa dentium Cariei est acidum corrodens, *Causa Dentium* quod sæpe generari solet ex pravi nutrimenti *Assimilatione*, & imprimis à dispositione scorbutica, hinc scorbutici cariem dentium ut plurimum patiuntur, & sicuti dentes niveo colore sup-purbientes perfectam digestionem ventriculi

D d iadi



indican, ita caries dentium imperfectam & diminutam chylificationem comprobant, hinc canes habent dentes elegantissimos, ob fermentum ventriculi potentissimum, & in quibus digestio ita peragitur, ut fenum cuique tribuatur, & chylus fit tenuior & bene separatur.

**Fistula.**

Huc & pertinent Dentium *Fistulae*, quarum causa est acidum magis corrosivum. Caries enim in parvo incipit puncto, quod ob acidum vitriolaceum primitus nigrescit, hinc prima Cariei & Fistulae aperitur fenestra, siquidem acido magis ac magis reddito corrosivo, dens profundius excavatur, & si corrosio hac ad dentis radicem nerveam penetraverit, oritur dolor intensus.

**Mobilis.**

Causa *Mobilis* & *Casu* dentium ut plurimum laet in carne gingivae, cum qua vita communi pro ratione spiritus influi gaudent dentes; hae enim quando nimis redditur flaccida, aut absumitur, dens non jungitur amplius gingivae, sed ab hac separata facilius excidit, hinc omnia, quae gingivas laxas flaccidasque reddunt, aut absumunt, ad hunc affectum disponunt, ut sunt frigida saepius assumta, quae senium dentium accelerant, ut & nimis calida, quae dentes & gingivas quasi comburunt; item plura acida actia in odontalgia admodum nocent, a quibus dentes sluppunt & infensiles redduntur, eorum fibrillae & ipsi dentes sensim ac sensim coriolduntur ac tandem decidunt. Huc & pertinent omnia ea, quae superius in Odontalgia enumeravimus.

**Nigredinis****& Sordidus**

*Nigredo* ac *Sordidus* dentium est nil nisi pronductum morbofum ex depravata dentium nutritione enatum, & ut plurimum a dulcibus saccharatis & viscidis, a masticatione tabaci aliarumque rerum sordidarum, male colorati dentes suam habent originem; ob cruorem gingivae extravasatum, & serum corruptum stagnans & malum hoc oritur, hinc feorbuticis dentium nigrities & sordities solennis est, ipsi enim semper ferè flacciditatem cruentam contingunt. Ab inunctione etiam Mercuriali pro curâ Luis Venereae non tantum vitiatur gingivae, sed & nigrescere solent. Sic etiam a tartaro illo, sive calculo, seu lithodonte, dentes non tantum coriolduntur, sed & ab acore hoc nigri ac sordidi redduntur.

**Stridoris.**

In *Stridore* dentium tremulè movetur maxilla, unde nascitur sonus ex dentium crebriore collisione; tremulè verò movetur maxilla a spasmo reciproco musculorum in genis abductioni & adductioni mutuâ operâ intervientium, & hic motus convulsivus in febrilibus malignis saepe funestus exsistit. In infantibus hic affectus saepe oboriri solet à frigore externo, vel lumbricis in testinorum convulsivos motus excitantibus, qui stridor dentium communis est in febrium rigoribus propter fibras communes partium membranolarum circa praecordia agitaras.

**Hamodia****su Pupa-****ria.**

*Hamodia* sive *Stupor* dentium ab acore peregrino prodici solet, sic & saccharata, quae occultum in se habent acorem, facili hunc affectum excitant, ut & omnia acida. Sic & affectus hic, quod mirum, à terreo & aspero sono saepe oboritur, hinc egomet nullum sonum asperum ob haemodiam, quâ statim affligor, ferè possum.

**Causa Ver-****minum.**

In dentium cavernulis saepe putredo concipitur, & quidem animato seminio sceta, quod sufficienter testantur *Vermes*, ut plurimum à putrescente nutrimento dentis geniti, vel aliunde ibi-

dem congesti, quo modò plures, modò pauciores, magnitudinis diversi dolorum dentium atrociorum aliorumque symptomatum fabri existunt, unde apud *Salmon.* *Cem.* 3. *Obf.* 32. extat historia Odontalgiae à verme sesquiarthrum longo excitate; & sunt, qui suffimentis certis adhibitis ad oculum tales vermiculos proleptos demonstrare fatagunt; prout patet ex *Obf.* Cl. *Pechlini*, *Eph. Germ. Ann.* 9. & 10. *Obf.* 24. qui notavit peripicillomunitis, vermiculos illos non illepidè figuratos, multo saltem concinniores, quam quos in ovium hepate quotidiana comperit experientia, vulgusque lanionum in Italia Brisciolii vocat, nuper à Domino *Francisco Redi* libro de *Insestis* depictos. Hae vermes dentium aquâ ablutos vidit & *Scholium Obf.* 167. *Eph. Germ. Ann.* 9. & 10. qui latum pollicem ferè omnes aequabant, tenuissimum neritricum filum crassitie vix superantes; coloris, dum vivebant, incarnati, mortui verò & arescentes magis rufescebant, per microscopium inspecti egregiè insectinorum lumbricos referebant, utrimque in acutum rostrum desinentes, corpore ex annulis innumeris evagamentato pellicido, rubello instellulo per cutim transparente. Quo ovo, aut semine, aut putredine enascantur hi vermiculi, à pluribus disquirunt; an superstitis escæ ramenta seminio antè aliquo aut ovo animata? an ex scorbutico dentium tartaro, spiritus volatilis accessu, unde raptae vivaces ampullataeque vermium vesiculae, tandem etiam rostrata & pedata emergunt? Hi vermes sensum doloris inferunt mordendo & vellicando fibrillarum nervearum, quae ex cavae cavitatis fornici impendunt, extrema, vel rependo, seu membrorum pedumque circa dentium membranas mobili jectigatione, qualis esse motus videtur vermiculorum, qui pustulis faciei ocululuntur, importuna prugine graves.

Quod concernit *Lapidem dentalem*, ejus causam existimamus nutrimentum ex gingivis depravatum, ubi simul quicquid mucilaginis ciborum ac potuum fuerit appositum, in lapideam hanc indurefcit materiam. Flaccidae ac laxae cruentaeque gingivae, non verò quae cuspidali figura ad dentis medium affurgunt huncque firmant, lapidem istum producant dentalem.

§. 11. Signis *Prognostici* si prudens Medicus *Prognosis* *Odontalgia*.  
instructus fuerit, plura subinde hariolari potest de eventu morbi. Hae prognostica dispeccunt Medici in tres classes, praedictionem nempe eventus seu salutis & mortis, temporis, quod breviteratem & longitudinè morbi, & modi eventus; quae distinctio tamen non semper in praxi locum invenire solet. Quamvis autem *Odontalgia* non simpliciter & per se sit morbus lethalis, affectus tamen non nauci faciendus, ne lethalitas inde sequatur. Experientia quippe testante plures ob vehementiam hujus morbi incomparabilem mori maluerunt, quam diutius cum eadem confictari, imò ad infaniam saepe redigit ægros. Ratione subiecti, periculosa est Odontalgia, si partes ipsae membranaceae, ceu magis nervosae, circa radices, ubi nervi inferantur, affliguntur, praepriis à vermicibus, & particulis acris acidis aliis ibidem latentibus, easdem indefinenter vellicantibus, unde facili spiritus animales, imò totum corpus in consensum trahi possunt, imprimis cum ob diuturnam moram stagnantium humorum acerbitate sua, vigiliis,

vigiliis, inquietudine, similibusque vires infingitur profligantur.

Ratione causæ, curatio facilis est, quæ ab errore externo, difficilior, quæ a veribus vel rheumatismo ortum habet; curatio autem difficilissima, si inflammatio adfuit, caput obideat, & nervosum genus ab nimis acerbis irritetur, unde facile convulsiones oboriri solent.

Longitudinis & brevitatis dignotio est necessaria. Subita doloris dentium sedatio nunquam est promittenda, maxime in principio & augmento, deinde celerius terminantur dolores ex lero acri, quam viscido. *Columbum* notat alicubi dolorem per totam vitam perennantem.

Quoad modum eventus, vel integrè solvitur correctâ & discussâ materiâ morbifica & doloribus consopitis, quod ordinarium magis est, vel mutatur in alium morbum, ut in maniam, vel in febres, quod utique nihil boni indicat; sæpe cum magno fructu terminatur gingivarum & genarum tumoribus, indicio, humores dente derelicto ipsam partem, in quâ tumor colligitur, invasisse. Et hic quidem tumor itidem paulatim expirat & imminuitur, si gravior sit affluxus & inflammatio, interdum in abscessum abir, rumpi solitum vel inus, vel exteriora versus, qui à me vilis fuit ab ægro admissio frigore in tumorem scirrhum tandem terminatus. In solenti quoque modo aliquando terminatur lacrimis dolor noster dentium, cuius exemplum proponit *Timmus à Guldengklee*, de Nobili quodam, qui inter acerbissimos cruciatus plorare cepit, adeo ut ultra horam à fleru sibi temperare non posset, quo factum, ut dolor sublati per lachrymarum effusionem largam causâ, remiserit. Ad mortem tendit, ubi cum stridore & febre ardente seu malignâ conjungitur.

**Cariis & Fistula.** *Caries* Dentium fetorem oris infert, & hoc ex nutritio dentis carioli proprii corruptione, aut ciborum masticationum in iisdem cavernulis dentium retentorum & corruptorum putredine. In totum quoque curari nequit, uti nec *Fistula*, siquidem quod in Dente consumptum est, nulla arte potest restitui, sed præcaveri solummodo, ne ulterius corruptatur.

**Mobilitas.** *Mobilitas* Dentium non est parvi habenda, denotat enim magnam gingivarum corruptionem, cui si in tempore non occurratur, ipse *Casus* facile subsequitur, qui extra tempus illud, quo pueris vel adulescentibus ordinariè obvenire, & novum in priorum locum succrescere solent, non modo pulchritudinem imminuit, sed loquelæ & masticationis etiam maxime incommodat.

**Nigredinis & Sordiditatis.** *Nigredo* & *Sordiditas* præterquam quod nitorem dentium obfuleant, & pulchritudinem eorum adimunt, ulteriori eorum corruptioni, carici & casui quandoque animum præbent, si dentes ab iis in tempore non liberentur, quod pro copiâ vel paucitate sordium citius vel tardius aliquando obtineri potest, siquidem morbus hic non est penitus incurabilis.

**Stridor.** *Stridor* dentium absque manifestâ causâ superveniens in adultis malum portendit, vel Apoplexiæ vel Epilepsiæ prodromus est, sic & in febribus pessimus est, juxta *Hippocr.* enim *prænot.* §. 4. & *Coac.* §. 2. Dentibus stridere in febribus, quibus non familiare id est à pueris, furiosum ac lethale censetur.

**Stupor.** *Stupor* Dentium admodum est molestus, sed non semper difficilis curatur, sæpe enim sponte cessat absque ullo ulteriori damno dentibus illato,

*Vermis* si dentibus ita excavatis medullam & fibras nervosas attingere valeant, easdem mordendo intolerabiles aliquando inducunt dentium dolores, & tumum in dentibus abortit corruptionis indicium præbent, atramen si commodâ iis adhibeantur medicamenta, non modò enecari, sed ex hospitio suo etiam penitus queunt eliminari.

**Lapis dentalis** non semper æque facile depellitur, sed aliquando fortius adhæret, & dentium substantiam erodit, ac tandem penitus consumit, aut ita reddit friabiles, ut ad fortiorem tactum frustulatum decidant, in tempore verò si malis hiis præveniantur, antequam nimia ejus collecta fuerit copia, diligentia & frequentiori dentium ablutione & emundatione abstergi, & novus ejus proventus commodè poterit præcaveri.

§. 12. Theoriâ affectuum dentium præmissa, *Dietæ*, restat ut curationem aggrediamur, & quidem ordine semel proposito à *Dieteticâ* incipiemus.

*Aer* sit temperatus, angue pejus vitetur frigidus nebulosusque, qui semper corrigendus iustumigiorum beneficio.

*Cibus* sit boni succi & digestionis facilis, in quem faciem condiri possunt mace, Zinzib. cinamomo, caryophyll. Carnes non sint nimium tenaces, fibrosæ, ne particule adhæreant dentibus. Omnino relegantur cibi flavelenti, crassi, viscidii, fructus horarii, fugiantur dulcia, saccharata, mellita. Sic nocent & acerbæ & acida. *Potus* sit temperatus, purus, non frigidus vel glacie frige factus, vel acidus.

*Motus & Quies* iustis temperentur mensuris, motus magis instituendus ante cibum, ut sensum arque sensum incalescat corpus, tubuli aperiantur & particule acres disculantur. Quies quoque maximo erit solatio dolentibus.

*Semina* itidem omnium dolorum est levator; *Vesigia* nimiz spiritus absumentes & humorum acrimoniam augentes ab odontalgico exulcent.

*Excreta & Retenta* quotidie suo fungantur officio, alvus adstricta est laxanda, sudor in assuetis non facile est coercendus, sed potius promovendus. Sic conjux mea sudore inhibito statim in dentium dolore incurrit.

*Animi passiones* retrahantur, incandescentiæ alique perturbationes sanguine viperino cautius vitentur.

§. 13. Reliquos nunc curationum fontes, *Phar.* *Cures* *macentis* scilicet & *Chirurgicæ* aggressuri, aliorum sententias nostræ faciemus præcurrere, & quidem omnium primò Veterum *Galenicorum*, & *Chirurgicæ* quorum opera in curandâ *Odontalgia* ad id potissimum locatur, quo intemperies omnis, sive similitudo locatur, quo intemperies omnis, sive similitudo, plexa sit, sive cum materiæ & humorum influxu, corrigatur, & humor superfluus evacuetur, quare purgationem instituunt tum totius corporis per Hicram fortissimam *Galenii*, vel Hygiam Græcam, tum in specie solius capitis per erhina, ut succum rad. betæ, & gargari (mata apoplegmatisantia, ex tædarum ramentis, malicorio & alumine in aceto ad tertias coctis & ore contentis, quo si os salivâ fiat rofretum, eandem ore hiant effluere volunt; nec venæ sectionem interdum omittunt, si magna humorum addit acrimonia calida, potissimum verò ad urgens symptoma respiciunt & dolorem leniunt vel oleo lentissimo calidiusculè ori indito, & diutius super dente dolente retento, vel lacte asinino, vel decocto rad.

D d 2 albæ,

*altheæ, glycyrrhizæ, flor. melior. sem. malv. &c.* In causâ calidâ refrigerantia & adstringentia in usum ducunt, ut decoctum rosar. fol. plantag. myrt. flor. hyoscyam. in aquâ & aceto, vel vino austero, in quo rad. pentaphyll. fol. heder. sal. falic. summit. lentisci, cort. myrt. & gallæ immaturæ cocta fuerint, os frequentius colluere jubent. Si digestionem & resolutionem opus sit, totum instituunt ex decocto altheæ, camomillæ, melior. sem. lini, fœnigr. quo spongiam imbuunt eamque calidè admovent, aut malas inungunt oleo anethino, lilior. camomill. Irino, vel sequens iisdem imponunt emplastrum.

*R. Picis, Mastich. aa. ʒiij. Thur. Ladan. Gum. Ammon. aa. ʒiv. Ol. lentisc. Nardin. q. l. F. Emplastrum.*

Ut citius sedetur dolor, suadent ut decoctum ranae in aquâ & aceto, vel dentis canini ussi & triti in aceto calido factum ore continetur, vel gingiva cum dente ungatur vel theriaca, vel mithridatio, vel Auræ Alexandrinâ, vel sequens proponant masticoatium.

*R. Sem. rorismar. ʒij. Orig. pip. alb. aa. ʒj. Uvar. pass. pinguis. sextar. ʒ.* Redigantur in massam; post cuius usum os vino colluatur. Si vero dolor sit contumax, sensum obtundunt stupefacientibus, ut opio in aceto soluto, vel radicibus mandragoræ & hyoscyami cum vino, aceto, aut mulso contulis & illitis, nec non ipso philonio, aut requie *Nicolas*; Medicamentis vero in cassum adhibitis, ipsum dentem evellere suadent, ut gingivæ ita relaxentur, circumciso prius dente scalpello angusto, ac dein forcipe, vel tenaculis, vel instrumento alio contulso & eruto, quo facto locum sale conrito suffragare jubent, ut carunculae laceratæ absintantur, & gingivæ laxatæ condensentur, vino vero rubro vel posca sistunt sanguinis fluxum. Qui chirurgiam hanc horreant, iis cotrumpentia & dentes mobiles reddentia commendant, ut facile manu eximi queant, qualia sunt pyrethrum aceto acerrimo dies quadraginta maceratum, tritum ac repositum, usus vero tempore reliquis dentibus cerâ obductâ præmunitis, & dentis eximendo præmundato, illinitum, quo facto interjecto unius horæ spatio dens digitis extrahi poterit. Huic subjungunt sory cum aceto acerrimo pluribus diebus illinitum, aut succum tithymali & sory unâ cum galbano impositum.

*Dentium Empora.*

Ad *Stimulorum* dentium specifica quædam commendant remedia per experientiam affectui huic depellendo commoda observata, ut sunt portulaca viridis crebrius masticea, oleum dulce, amurca, butyrum recens dentibus torpidis illita, collutio ex lacte asinino recenter emulso, caseus pingvis modicè assatus & diutius masticeatus, nux avellana, sal. scilla, grana lauri & similia.

*Caries & Fistula.*

*Cariem & Fistulam* dentium commodè abigere & dentes integros reddere nequeunt, sed ne nimium doleant, aut graviter oleant, & necesse est troscio prohibeatur, foramini induunt yera-

trum nigrum erui magnitudine melle coctum, vel sal fossile melle subactum, assatum & tritum, admixtâ myrrhâ, vel piper coctum cum melle & diligenter tritum, vel etiam sequens:

*R. Lacrym. Papav. Myrrh. Syrac. aa. ʒij. Pip. alb. Galban. aa. ʒj. Uv. pass. q. l. ad comprehendendum.*

Ut dentes adhuc integri à carie præserventur & nunquam exedantur, eosdem alumine cum modico myrrhæ jubent conficari.

In *Mobilitate* dentium, ut hi in alveolis suis firmarentur, & à casu præserventur, humores peccantes evacuant, & tunc adstringentia commendant, maxime verò sequentia.

*R. fruct. terebinth. torrefacti. ʒviij. alum. scissil. cremat. flor. punice. sylvestr. succ. uv. acerb. aa. ʒij. Gallar. Croci, myrrh. aa. ʒj. Terantur.*

vel:

*R. Corn. Cerv. ʒviij. Rhoeo rub. balauft. aa. ʒiij. Cort. pini, Gallar. Croci, myrrh. aa. ʒj. Terantur.*

Dentes jam elapsos, & diutius extra alveolos existentes aut plañe amissos reparare nesciunt, nisi artificiales iisdem inserantur, ad loquendum impedire exercendam & ornam, quando vero modò elapsi sunt & integri, vitio solius gingivæ nimium relaxatæ, eosdem statim pristino restitunt alveolo, & prædictis adstringentibus gingivas roborant, quo pacto dentes deinde firmari & arctius credunt retineri.

*Stridorem* dentium tum demum curari dicunt, cum causæ, à quibus originem sumferit, abigantur, & ipsi morbi præcedentes curentur, in Maxillarum imbecillitate à frigore corroborantia & calcescientia adhibentes, ut forum ex decocto majoran. sal. rorismar. Inunctionem cum oleo lauripo, rutacco, moschel. Unguento Aregon. Ab aliis morbis si dependeat, ad eosdem primariam curationem dirigunt.

In Dentium *Sorditie, Tophi & Nigredine Sorditie*, humores peccantes exicant & à dentibus abstergunt variis masticoariis ex mastiche, thure, terebinth. rad. pyrethri, Cyperi, &c. vel lanas succidæ lintcolis illigatas urunt, hinc salis tertiam partem addunt & trita dentibus affricant, vel pulveres parant dentifricos ex testis ostrear. oculis cancri. lap. punic. rad. Ir. aristol. ciner. capil. leporin. origani, myrrh. & similibus, quas species interdum quoque cum melle, vel oxymelle in linimentum redigunt, quo dentes fricare jubent, & quando tophi fibræ adhærent, & dentes reddunt asperiores, eosdem limâ quâdam abradunt.

Ad

Vermis.

Ad *Vermes* è dentium cavitate ejiciendos radicem pyrethri laudant, si ejus portio quedam ipsi cavitati inferatur, vel dentem, in quo vermes continentur, semine hyoscyami fumigare fudeant.

*Paracelsus*  
mo in cu-  
randi Den-  
tium Do-  
lorum.

§. 14. *Paracelsus* in *Dentium Dolo*re duplicem proponit curationem, unam Physicam, alteram Chirurgicam. Physicis sequens est.

R. *Tormentill.*

Staphysag.

sem. plantag. aa. ʒß.

Rad. ext. Jussiquim.

succ. papav. aa. ʒß.

Reduc in decoctionem cum aceto.

Fiat Lavamentum calidum.

Præcipit etiam ut emunctoriū sanguinis fiat, & similem effectum præstari promittit, si fūthex acuta, quæ alias oxylapathum & melioca nominatur, in orbiculos incidatur, qui aceto imbuti dentibus admovendi sunt, aut si radix crassius contusa & aceto humectata per horæ quadrantem aut diutius dentibus imponatur. Aquis etiam fortius & pulveribus dentalibus eos abigi posse ait. Chirurgica cura peragitur materiam peccantem auferendo, videlicet vermem, cuius abactio inferius patebit. Quando cruciatus ex punctiōibus & repentinis fluxionibus oritur, vulgaribus compositis non vult instare, sed arcanis, cum usu phlebotomiz & scarificationum, si necessitas requirat, os brachii basionis attractu odontalgiam fidat.

Putredinē  
& Cariem.

In *Putredine* & *Cariē* dentes eluit aqua mellis & postea inungit melle & aloëpatico mixtis per aliquot dies, hinc in destillatā & præparatā aqua aluminis ponit plantaginem, sal, consolidam, serpentinam, & illā aqua quotidie bis dentes proluat, ut ita putredo desinat. Novit etiam arcanā, per quæ dentes erosi & putrefacti ex alveolis fuerint extrahi, & novæ dentium radices fuerint regeneratæ, sed ea non patefacit.

Mobilitatē  
scu Vacilla-  
tionem.

In *Mobilitate* & *Pacillatione* dentium nihil superare asserit ipsum oleum de Croco Martis, si eo inungantur.

Cisum.

In *Cisum* nihil plane aliud esse affirmat, quod vim mercurialem tollat, quam oleum Nucis Muscatæ.

Stridore  
& Stupore.

In *Stridore* oleum Succini, & in *Stupore* decoctionem panis calidi commendat.

Sordidum  
& Tartarum  
& Nigredinem.

Ad Dentes à *Sordiditate*, *Tartaro*, *Nigredine* depurgandos spiritum Oli modicè & non diu usurpatum valere promittit, si dentes abstergantur linteis, cui guttula una vel altera ejus spiritus sit instillata, postea alios pulveres admittit ex dentalibus lap. calaminar. sale gemm. margarit. alum. & similibus paratos.

Vermis.

Dentium *Vermes* eodem modo occidendum esse annuit, quo scabrum & panarium occidere solent, videlicet per spermiolum, quem tamen & mori novit, si aerem sentiat. Si putrescat ille & fœtcat, os colluendum præcipit gargarismo ex melle & aceto, quo adhibito fœtor vaneat.

Helmentii  
remedia ad  
Odontalgiam.

§. 15. *Helmentii* in *Odontalgia* curanda alicui sunt os brachii aut pes busonis probè selectus & denti dolenti applicatus, qui primo statim contactu quasi per incantationem quandam omnem abigat dolorosam molestiam; dens canis aut hominis non violenter, sed extinctis viribus emor-

tui, cujus attractu dens marefcet, & excidat; quod pariter præstari vult à pulvere lacerti denti dolenti imposito, nec non à pelle anguis.

*Cariem* dentis, cum per lenium eam fieri putet, medicamentis abigere minime tentat, sed si dolores producat, eundem superioribus ejiciendum esse approbat.

Ad *Dentium Mobilitatem* & *Cisum* similiter nulla peculiaris excogitavit medicamina quæ gingivam decreascentem restituant, unde ex aliorum placitis defectus hic est refarciendus.

In *Stridore*, *Stupore*, *Sordiditate*, *Tophis* & *Nigredine* remedia ab aliis proposita facile approbat, quin ad *Vermes* etiam enecandos succum hyoscyami admittit.

§. 16. *Willisus* eò in *Odontalgia* curatione respicit, ut incongruum illud fibras nervas sub dentibus molestè afficiens omni ato amoveatur, quæ ratione humores serolos nimis evacuat piulis illis in catarrhosa colluvie communibus, ex luteo videl. & resin. Jalapæ; nec vesicatoriis & tonicis improbat, & ad serum in gingivis copiosius existens eliciendum gargarisima ex rad. lapath. & ligno Guajaco in vino coctum, ad dolorem verò valde urgentem sedandum adhibet, quæ fibras placare & spiritus in pristinam viam revocare queunt, decoctam videl. C. C. aut Camphoræ, olea destill. aneth. caryophyllor. hyoscyam. cum bombace denti admoda, vel pilulum ex laudano opiato; temporibus etiam applicat emplastrum ex pice Burgundicâ cum Nuce Moschatâ, vel de Gummi Carannæ mastiche, uti & instillationes oleorum calidusculorum, ut amygdal. dulc. Camomill. scorpon. &c. in aures admittit.

In *Cariē* particulis salinas corrigit, ne dentem ulterius erodant, pul. eribus dentificiis ex C. C. ult. Corall. myrrh. & similibus; ubi verò profundius & *Fistula* jam existit, ne levi occasione ne vi lædantur & dolor augeatur, cautero actuali ulationem illiuit, & cavitatem implet malsâ quadam ex melle rosato, cin. rubis dentis cauii & thure confectâ, vel dentis eradicationem promovet sale armoniaco cum succo elule eidem cavitati inditis.

In *Mobilitate* ad dentes firmandos & *Cisum* Mobiliteatordendum inhihendum, adstringentibus gurgivas nimis laxas corroborat, ut gargarisimæ ex decocto sol. salv. prunell. me. pilor. rad. plantag. pentaphyll. sem. myrrill. vino rubro facta, vel l. nimento ex rad. tormentill. prunis sylvestr. immatur. Corall. sang. dracon. & alum. ult. inelle rosaceo exceptis.

In *Stridore* Dentium ad causas respicit & *Stridorem*, morbos, quibus superveniat, iis enim correctis, & hucellare existimat.

In *Sordiditate*, *Tophis* & *Nigredine* Dentes frequentius mundari jubet ablutioibus & pulveribus dentrificiis, ex crustâ panis correctâ, crysallidis tartari, lap. spong. putam. ovor. abisque compositis, vel oxymelle quillit. cum guttulis aliquot spiritus salis, rarius tamen usurpatis, quâ mixtura linteolum imbutur & dentis fœdâ fricantur.

Ad tollendam *Hæmodyam* eâ approbat remedia, quæ acidum aulterum corrigunt, & fibras nervosas blandè commovendo reficiunt, ut Decoctum salv. majoran. bacc. lauri, vel balsamus Peruvianus cum gossypio denti affecto applicatus.

D d j

Vermis



*Vermes.*

*Vermes* dentibus cum reliquis vel fumo seminis hyofcyami, vel succo absinthii & tanacetum cum aloë dentium cavitati inditis, eiecere co-natur.

*Sylvii mo-  
dus curan-  
di Odontal-  
giam.*

§. 17. *Sylvium* in curatione *Odontalgia* ad duo potissimum advertit animum suum, humoris nempe acidioris temperationem, & temperati blandam educationem. Prius præstat mixturis convenientibus, qualem sequentem paradigma-tis loco proponit:

*R. Ag. beton.*

*fenic. aa. ʒij.*

*theriacal. simpl. ʒiʒ.*

*Laudan. opiat. gr. iij.*

*Ol. caryophyllor. gr. iijj.*

*Syr. Stachad. ʒi.*

*M.*

In dolore lancinante regioni dolenti applicat theriacam recentem emplastri formâ corio illi-tam. Humorem ita temperatum hydragogis educit, formâ ægris acceptâ & minori dosi, sed vicibus iteratis exhibitâ, quibus dolores feliciter aufertur promittit, quam li potentissima ctiām purgancia minori dosi seculi assumantur.

*Caries.*

Ad *Caries* dentium omnimodò tollendam multam requiri operam, & vix ejus medelam possibilem esse judicat, laudat tamen ad acidum illud acrius corrigendum & temperandum salia volatilia, nec non omnia idem concentrantia & à dentibus avertentia, ne serpendo eosdem ulterius corruptat, qualia sunt Corall, pp. C. C. usti, testæ ostrear, ulit, borac. ust. thut. mastix, cineres origan. rosmarin. & id genus plura. Dentem verò omninò corruptum, excisum & fistulosum, ne doloti ob sordidum collectam fre-quentius ansam præbeat, penitus suadet evelli.

*Mobilita-  
tem & Ca-  
sum.*

In *Mobilitate* Dentium ne *Casus* subsequatur, humores superfluos per selecta quædam salivania elicit, ut masticatione rad. pyretkri, vel decoctione ejusdem in aqua gargarismare; ipsas deinde gingivas nimis lexas adstringit decocto cupular. gland. bacc. foib. flor. balaustror. fol. myrrhi & alum. in vino rubro aliquoties in ore detento, ut gingivæ eo probè colluantur.

*Stridorem.*

In *Stridore* Dentium ad ipsos itidem respicit morbos, quos agitatione maxillarum symptomati-cè subsequitur, & quibus abactis, hæc facile cessabit, qui cum diversarum esse possint specierum, ideo curatio hæc certa describi nequit.

*Stuporem.*

Ad *Stuporem* tollendum ea commendat, quæ acidum austerum temperent, imprimis terrea & aliquantum oleosa, ut sunt terra sigillata, unicorn fossilis, sulphur viv. vitell. ovi ad duritiem co-ctus, pineæ cera, & similia frequentius masticata.

*Sorditium.**Tiphos & Nigredines.*

In Dentium *Sorditio*, *Tiphos* & *Nigredines* non minus ad acidum respicit corruptivum, & proinde absorbentibus admiscet abstergentia, quibus interdum mel rosarum, vel tincturam lac-cæ, aut Elix. propr. adjungit, ut sic liquidior, formâ adhibita tephos & sordidies tenacius adhæ-rentibus citius emolliant, quo facilius abstergeri pos-sint, qua virtute pollere novit testes cochlearum usts, ossa dactylor. ust. ebur. ustum, lap. crystall. Salustum aliaque à præcedentibus jam prolata, quæ cuncta, vel aliqua ex iisdem in pulvere sunt redigenda, eoque dentes frequentius, potissi-mum verò manè & ab assumto cibo sunt frican-di, & vel aquâ communi, vel vino rubro abluen-di, insimul interstitia eorum stylo convenienti à quibuscumque ciborum reliquiis liberanda.

Ad *Vermiculos* enecandos & è dentibus ejici-endos omnia laudat amara, item fumum bacca-rum halicacabi, & decoctum prun. sylvestr. cum rad. angelic. & sem. Zedoar. in aqua commun. pro gargarismate sedulo usurpatum.

§. 18. *Cariesis* humorum modus curandi *Odontal-giam* in eo consistit, ut particule illa angulares auctæ tum educantur cum humoribus, in quibus domicilium quoddam locarunt, & per ductus fa-livales ad dentes deferantur, tum hebetentur & ita corrigantur, ne fibroso & nervoso generi ul-terius existant molestæ, quod simul roborandum & aliquantum emolliendum est, ut tensioni & punctationibus cedat, nec adeo facile periculum so-lutionis continui sustinere opus habeat. Edu-cuntur humores spiculas istas in se continentes omnium optimè medicamentis sudoriferis, quæ à calore, id est, minimarum particularum motu vario, tum in succis corporis nostri, tum in aëre illud ambiente concitato ducuntur in actum & ad particulas istas acutas pervenientes iisdem se adloquant, easque tum mitigant & domant, qua-tenus in conflictu, quem ineunt invicem, multæ ex cuspidulis franguntur & deperduntur, tum per interstitia fibrarum & poros cutaneos dilata-tos secum auferunt, qualem effectum sequens mixtura præ aliis præstare solet.

*R. Ag. flor. sambuc. ʒʒ.*

*Spir. theriacal. camphorat. ʒʒ.*

*Essent. saliv. ʒi.*

*Ess. volat. Succin. gr. iijj.*

*Syr. Hyssop. ʒij.*

*M. Detur una vice.*

Ad eundem obtinendum scopum etiâ ma-licatoria post sudorem commendant, ut rad. py-rethri, &c. nec fumum tabaci cum mastice, succino & gummi sandarachæ, aliisque conveni-entibus speciebus commisti abhorrent, quò cum salivâ acutâ angulari ista corpuscula ejaculentur. Residuum eorum in partibus fibrosis adhuc hærens, & laniando dolorem fovens hebetant variis gargarismatis ex decocto ligni Guajaci, rad. uretic. lapath. Ireos. Flor. fol. saliv. sabin. origan. Cret. sorpill. saurej. in quo camphoram dissolvunt, vel Spiritus, Tincturas & Essentia Odontalgias cum bombase denti dolenti adhibent, quales sunt Essent. thymi, caryophyllor. Castor. Spir. lumbri-cor. & ❖ci camphorat. quibus subjungunt par-ticulis ramolis constantia, ut particule angulares iisdem involvantur, & partes nervosæ obductæ tam facile attingi & perfodi nequeant, ut sunt olea destillata camomill. caryophyllor. croc. myrrh. origan. Cretici: Fibras nimium tensas relaxant decocto fol. malv. rad. alth. & flor. Camomill. in vino dulci parato, & frequenter in ore circa regionem dentis dolentis detento, quâ de causa & venesectionem in vicinia institutam aliquando admittunt, ut depletis venis fibræ ten-sæ non ita comprimentur. Veficatoria parotidi-bus imposita magnopere laudant, ut affluxus lymphæ eò provocetur, & cum particulis noxiis per apertas vesiculas emanet. Emplastrum itidem fibris convenientia ex gummi. tacamahac. carann. mastich. terebinth. &c. malis super maxillam, cui dens dolens inferri est, prope articulatio-nem imponunt. Ad opiatâ aliquando, sed rariùs & non nisi in dolore vehementissimo, progredi-untur, dentibus dolentibus applicanda, quo se-quens *Fallopius* referunt secretum.

*R. Op.*

Op. 3b.

Salis gr. v.

Ol. rosat. 3j.

Cera alb. 3b.

M. F. *inftar Unguenti*, de quo aliquid fuscipiatur gossypio, & loco dolenti imponatur.

*Dentium, Cariem & Tifulum.* Cariem Dentium in totum curare nesciunt, imprimis si & latior & profundior ea sit, vel in *Fistulam* conversa, cui ne quid forium in ea colligatur, globulos ex mastiche retentant, & cerâ confectis inferunt, vel dentem integrum inquam masticationi inutilem & doloribus commovendis apprime idoneum vel instrumentis præcipiente evelli, vel medicamentis convenientibus friabilem reddi, ut facile in frusta comminui & sic per partes educi queat, ubi tamen evulsionem præstare notant, ne ex radicibus quidpiam in alveolo relinquatur, & gingiva adstringentibus minus occludi queat. Quando verò caries non valde accrevit, ne illa incrementum capiat, sedulo prospicere jubent, adhibere absorbentibus & particulis acutas arodescentes frangeatibus, dentificiis nempe pulveribus ex ciner. lumbrior. cancor. sal. rosar. mastic. dentibus canis, lupi cervi uistis & camphora compositis, vel ferro candente eosdem exurunt.

*Mobilis-  
tem.*

Dentium *Mobilisatem* in pueris tempore convenienter & succedentibus aliis, à quibus gingivæ dilatantur, obvenientem non modò non agrediuntur curandam, sed si difficilius elabuntur priores, eorumdem etiam casum promovere, vel digito, vel filo, vel, si opus sit, instrumento, & ut absque graviore hoc fiat dolore, gingivas etiam emolliunt lacte tepido in ore aliquamdiu derento. A salivatione nimia si accidat, diaphoreticis lymphæ superfusitatem evacuant, vel si ad tantum subtilitatis gradum reduci nequeat, ad ureteres & vesicam derivant, medicamentis diureticis satis cognitis, & fumum Nicotianæ permittunt, ut gingiva exsicceat. Pro adstrictione verò gargarisata commendant ex rad. tormentill. filic. mar. symphyt. Herb. centurmod. sal. equiset. fol. querc. vit. flor. ros. ba. laust. acac. cydon. ligno fantal. nuc. moschat. mastic. thur. in vino rubro flicico coctis vel maceratis, addito nonnunquam pro majori adstrictione porriuncula quâdam aluminis, vel Tincturâ Lacce, aut sequenti linimento dentes & gingivas frequentius illinunt, quod & in scorbuto convenit.

R. Ebor. ust.  
off. olivar. combust. 2a. 3j.  
gumm. lac. 3ij.  
ibur.  
sang. dracor. 2a. 3b.  
myrrb.  
alum. ust. 2a. 3j.  
Spir. Sic gr. vj.  
Mell. rosac. 3j.  
Syr. de Tormentill. q. l.  
F. s. a. Linimentum.

His Gingivæ non modo adstringuntur, sed ulterior earum inhibetur corruptio, simul & Dentium Casus præcavetur.

*Sordidum.* Sordidum Dentium curationem pro diversitate causæ varie instituunt, vel enim dentis particulis vellicantibus spirituum per tubulos promovere transitum remediis nervinis in spasma & paralyti aliis usitatis, ut Spir. sal. lil. convall. \*ci fuscinar. essent. Castor. vel succum crudio-

rem in febribus corrigunt & discutiant antifebrilibus & sudoriferis; iracundos verò adhortationibus ethicis & objurgationibus ad meliorem mentem revocant.

A *Sorditis & Tophis* dentes liberant variis dentificiis, quæ tum ex superioribus satis jam cognita sunt, tum in sequente paragrapho pluribus adhuc innotescunt, maxime verò farinam virgineam innotescunt, & si Tophi fortius adhaereant, eorumdem remotionem promovere melle rosato, vel anthosato, vel salviato, cui Tinctura lacce, & aliquot Guttulæ spiritus salis fuerint admittit. A pastu etiam dentes jubent studiosè ablucere, & quascumque ciborum reliquias ex interstitiis eorum eximere.

*Nigredinem* similibus abigunt, per pulveres enim asperiores dentes ita credunt poliri, ut abrasis eminentiis pororum majusculorum superficies eorum fiat planior, & in poris subjacentibus radii luminare non ita suffocentur, quare farinam virgineam in hoc casu itidem laudant, modò gingivæ non nimium eâ fricentur, vel sequentem pulverem dentibus & gingivæ corruptæ maxime proficuum,

R. Corn. C. ust. 3b. aristol. rotund. 3j.  
Off. sep. Cort. citr. 3j.  
Corall. alb. ligni alic. 3b.  
margar. 2a. 3j. Macis 3.  
pumic. Mofch. gr. iij.  
rad. Ir. Flor. Ambur. gr. ij.  
sal. gemm. 2a. 3b. Pulverisata M.

*Hæmorrhagiam* curant remediis particulis acutas & hæmatas non modo hebetantibus, sed emollientibus & flexiliores reddentibus, ne fibræ ulterius ita constringant, ut spiritu Theriacali, essentia salviae, rorismar. Tinctur. Junip. masticatione amygdalar. amarar. aliarumque rerum à prioribus jam indicatarum.

*Vermes* in Dentium cavitate hospitantes ejiciunt amaris, aloëticis & liquore myrrhæ, vel fumo absinthii, & ne novum isdem denuò nidulentur, cavitatem globulis vel pilulis ex therbinth. mastic. myrrh. & cerâ confectis occludunt.

§. 19. Nos denique ad duo summa capita sensus nostros dirigimus ad felicem curationem obtinentiam, ad causarum nempe remotionem, quæ expetitur evacuando atque alterando; & ad ipsius doloris mitigationem, quam præstant anodyna. Si corpus sero multo abundet, exhiberi possunt hydragoga miora, quæ simul sal cum sero educunt, quod hic sæpe peccare solet, conducet ergo pulvis Jialappæ, seu radix laxativa, quæ semper tuta, agaricus & Cuius dulcis, interdum pro re nata dentur enemata. Si in primis viis lateat sabura, leue vomitorium concedendum. Pessimè verò consulunt sanitati, qui confectionem vomitorii purgantibusque instant, morbum nascentem in ipsa herba se ita oppressuros imaginantes, quâ temeritate sæpe gravius redditur malum, & affectus efflascit, hinc cautius ubique purgantibus incedendum, quippe pori purgantium admodum abluunt à poris sanguinis, hinc isdem commixtis eadem, ac si oleum Qi & Spiritus Qi commixta essent, lucta concitatur; dein id quod in doloribus dentium plus quàm Vatiniano prosequimur odio, est Acidum: ast in quâ patria natum est purgans illud, quod hunc intensissimum hostem fugare audeat. Diapho-

*Nostri methodus curationis randi Odontalgia.*

Diapho-

Diaphoretica omnium morborum à sero ori-  
undorum optimum præbent remedium, quorum  
beneficio tota massa sanguinea purificetur, vitio-  
sa colluvies humorum serosorum per insensiles  
cutis tubulos profligatur, ejusdemque reliquæ  
in corporis peripheriâ & glandulis subcutaneis  
hæsitantes discutiantur atque exterminantur, in-  
de verò à loco affecto sit diversio & abactio;  
conducunt in hunc finem Tinctur. bezoard.  
*Mich.* lignor. cum essent. anodyn. vel:

℞. C. C. Phil. pp.

℞ ii diaphores. aa. ℞℞.

Bezo. Chacabell. gr. vj.

M. F. Pulvis.

vel:

℞. Rob sambuc. vel Junip. Zij.

Extracl. theriacal. gr. v.

Bezoard. min. ℞℞.

M.

Conducunt & omnia alia theriacalia & volatilia,  
sed semper eò respiciendum, ne quid nimis, ne  
sanguinem nimium agites, & plures particule  
effluat eò detrudantur, & sic dolores majores  
erunt, quia particule hæ silvestres & aculeatæ  
acrimoniâ suâ seu cuspidibus fibrillas nervorum  
vellicando dolorem denti atrociorum inducunt.  
Sic aliquando diuretica, quæ & amuream scor-  
buticam educunt, unaque serum heterogeneum  
& salum acre corrigunt præcipitantque, ut fa-  
ciunt Tinctura antimonij Tartarizat. cum essent,  
succini maritata, & absorbentia non negligenda,  
quæ sæpe totam implent paginam, eapropter  
multo usu comprobata habeo pulv. cephalic-  
um *Mich.* acidum valde compescentem, vel  
nostrum spasmoticum. Si serum est acre & te-  
nuè absorbentibus, vulgo incrassantibus uten-  
dum, ut massich. thure, nuc. mosch. papav. s. &  
errat. glycyrrhizâ. Præprimis hæc conveniunt pi-  
lule de cynoglossâ & styrace, vespere cum aq. ad  
gr. 5. exhibitz, vel sequentes magis compolitz.

℞. Oliban.

Myrrh. aa. Zij.

Succ. liquorit.

Styrac. calamit.

Gummi. ladan.

Opii,

Spec. diamb. c. aa. Zij.

M. C. cum Syr. de Stachad. & papav. err.

F. Massa, ol. fenic. irroranda, ex cuius sin-  
gulis ℞℞. formentur pilule No. vij. pro unâ  
vice assumendæ.

Si verò serum vel lymphæ crassior & tenax, tunc  
attenuandum variis incidentibus & attenuanti-  
bus, tum internis, tum externis. Hic conveni-  
unt salia volatilia, sal volatile oleosum *Sylv.* &  
nostrum, quod constat ex spiritu vini rectificat-  
iss. ☞ ☉ & alcoholizat. & ol. anthos, succini,  
lavend. &c. Si salia & acres particule in malsa  
sanguineâ aliisque humoribus hospitentur, per  
antiscorbutica & alexipharmaca corrigenda veni-  
unt. Si dolor à vermibus, per amara, myrrha-  
ra & absinthia curandus est, de quo inferius  
plura addemus. Cura eò dirigenda est, si dol-  
or à novo dente membranulam perfodiente  
alia cura observanda, quàm si est à dente carioso,  
alia si dentibus bene se habentibus à catarrho sal-  
so dolor exoritur, quod in praxi asterisco no-  
tandum est.

Sic quoque si malum radices suas habeat ex  
stomacho, tunc conducunt varia stomachica, &  
carminativa, ut sunt pulv. stomachica, *Burckm.*  
*Quere.* & aliorum, Elixir. antifebrile *Myns.* propr.  
stomachal. nostr. Essent. carminat. Si malum ex  
capite ortum habeat, tunc conducunt varia ce-  
phalica, nervina, cinabarina, ut specific. cephal.  
Balsam. nervin. Si ab utero, conducunt varia an-  
ti-hysterica, ut sunt castorina, succinata anody-  
nis mistæ. Est, si dolores maximè urgeant, ad  
ipsa opiata, tanquam ad sacram anchoram con-  
fugiendum est, in quem finem nota sunt laudana  
varia, theriac. celest. pulv. anodyn. Theriac. &c.  
quæ opiata in omni odontalgia à quacunque  
etiâ causa productâ, conveniunt. Ex. gr.

℞. Conch. pp.

Pulv. ceph. D. M. aa. ℞℞.

Laudan. opiat. gr. i℞.

M. F. Pulvis.

Hujusmodi opiatis per annum & ultra usurpatis,  
ex. gr. Laudan. gr. iij. cum confect. Alkerm. usa  
est cum maximo emolumento Nobilis & hone-  
sta femina, cujus mentio fit *Eph. Germ. Ann.*  
8. *Obf.* 62. Duobus enim remediis omnes meos  
ægros odontalgia laborantes feliciter curavi,  
Tincturâ sc. Nephenthes m. d. ad 30. & plures gut-  
tas tradita & in ore detenta, & Tinctura odon-  
talgica; si addere velis externum sacculum genis  
impositum ex anodynus herbis & floribus res in  
vado erit.

*Chirurgica præsidia* ut paucis nunc attingam,  
ex fonte hoc primo in ordine se sistit V. S. quæ  
an hic locum inveniat, hinc inde à veteribus &  
recentioribus, maximè Helmontianis contro-  
vertitur. Nos autem existimamus, in tali affectu  
non esse vitæ thesaurum pretiosum effun-  
dendum, quia stagnantes & irritantes humores  
non adeo faciliè resorberi possunt, nec circula-  
tio humorum promoveri. Hic asterisco notan-  
dum, quod in Odontalgia nova mordendi mo-  
dus est, peculiarem incidere venulam, vel ar-  
teriolam in auris externâ parte, (Chytrilapp  
lein!) à quâ incisione nunquam æger, ut di-  
cunt, Odontalgia amplius afficiatur; credat ve-  
rò Judæus Apella, ego non, usum tamen ejus  
magni æstimat præ aliis, & compertis se scribit  
probatissimum *Riolanum*. quando lib. 4. cap. 5.  
*Anthropograph.* dicit: *Notandum ille diligenter*  
*surculum a carotide deductum, qui auris antista-*  
*rum perperat maxillam superiorem irrigantem, ut*  
*singulis dentibus spiritum vitalem suppediet, per*  
*eum ramum fluxionem in dentes fieri puto, quia*  
*eo resello miraculè inflat sedatam vidi odontal-*  
*giâ, propter commentum serosi & acris humoris*  
*interceptum.* Sed si *Riolanus* novisset circula-  
tionem sanguinis ex nos, aliter forsitan nobiscum  
sensisset. Melius forsitan succedet inusitio noxæ  
super arteriam Carotidem prope aurem, de qua  
operatione lege Observat. expertiss. Dn. à Ge-  
hema.

Vesicatoria nunquam in doloribus dentium  
negligenda, maximum enim afferunt commo-  
dum parti cervicis vel ponè aures adnotæ, non  
tantum enim humores serosos acres potentissimè  
educunt, sed & fibrillas concutiendo juvant. Sic  
refert *Parent*, se dentium cruciatu intolerabiles  
sæpe sedasse vesicatoriis remediis sub aurem ad-  
motis, in eâ sc. cavitate, quâ maxilla inferior  
superiori dearticulatur: subiungit enim vena,

arteria,

arteria, nervus, quæ ad dentium radices distribuuntur. Cauteria etiam plures adhibent denti affecto, sic enim exurit nervus, omnique sentiendi potentia exiit, utpote de quibus scribitur, applicata antitrago autium, seu antice parti, sæpius incantamenti instar profuisse, attamen cautela opus est propter exquisitum sensum nervorum, præsertim de potencialibus vulgo ita dictis notandum, ne incautè adlubeantur, alique dentes tangantur vel affricentur, siquidem facili exinde edentuli evadere possunt. Et scribitur de rustico quodam, qui cum dolore dentium acerbissimo premeretur, suavis alter, ut elleborastro dentem conficicaret, ille improvidè utens repudio, majorem partem dentium maxillæ afflicte conficivit, & intra paucas horas omnes propemodum deciderunt. Vid. R. ver. p. m. 262.

Fonticulos, friciones extremorum, ligaturasque in discutendis humoribus plures Medici magnifaciunt, sed nihil ad rem faciunt & tantum pro fuso sunt. De extractione dentium paulo inferius dicemus.

Nunc ad topica transeamus remedia. Inter hæc referimus masticatoria seu apoplegmatica, quippe serum in cavernulis ipsis latitans fluxile reddendo, ejusque superfluitates per salivales ductus educendo, efficacissima se præstunt, efficiuntque ne serum illud dentes amplius acrimonia sua lædere possit. Commendantur verò præprimis pyrethrum, mastiche, sinapi, caryophylli. Refert *Mæbius* de vitillæ odontalgia laborantes, in quibus à solâ mastiche masticatione unius diei spatio serosa materia: ibi fuerit evocata. Nicotiana masticando & fumando doloribus dentium infervire, lippis & tonforibus notum est.

Inter Topica sunt & illa externa, quæ genis apponuntur, quæ sunt roborantia, discutientia & anodyna seu dissolvenda, ut sunt omnia cephalica, nervina, stomachica & carminativa, eaque comprehendunt species pro cucuphâ cum florib. camomill. sambuc. summit. aneth. & sem. carminat. sîndoni inclusa & aquis spirituosissimis irrorata genis apposita. Nos cum successu applicamus Theriacam Andromachi vel Diacordium. Sequens in lacte coctum, ubi simul tumor genæ conjunctus fuit, rarè me sefellit.

℞. Pulv. rad. alth. ʒi.

liquirit. ʒi.

Herb. Camomill. cum fl.

flor. sambuc.

flor. melidor. aa. ʒß.

Farin. bord.

sem. lin. aa. ʒvj.

M. F. Pulvis, qui in lacte coctus calide in linteo duplicato de die ter tumori applicetur. vel seq. Tr. Odontalgica conducet.

℞. lign. Guajac. ʒvj.

Sassafr.

rad. iroas aa. ʒß.

pyr. ʒvj.

cum vin. rectif. q. s. stent per aliquot dies, fîlre-tur &c.

Vel genæ illinantur variis liquoribus spirituosiss & calidioribus, ut sunt Aq. Reg. Hung. Lang. spir. vin. camphor. cum balsamo arthrit. nostr. spir. lumbricor. formicar. iusur. arthrit. &c. Et cum necessitas urgeat, ut dolores mitigentur, eo semper incumbendum, ut citò curentur ejus-

modi ægri, quare semper ad anodyna consi-giendum, in hunc finem & temporibus varia emplastra applicantur. Sequens multa expe-rientia nostra comprobatum est.

℞. Mastich. ʒiij.

Ladan. ʒi.

Bol. armen.

Sang. dracon. aa. ʒi.

Op. Thebaic. ʒj.

Camphor. ʒß.

Cum Terebinth. f. Massa.

Vel applicetur emplastrum de tacamahacâ, vel de mastiche, quæ emplastra videntur juvare, quatenus spiritum aliquem gummosum expi-rant, qui per poros corporis in nervos penetrat, & per illos ad dentes delabens particulis suis ra-mosis particulas acres involvit, & sic acrimoniâ leniendo dolorem sedare solet, ut acutè more so-lito dissent Cl. Craan. Celeberrimus Dn. Clau-derus contra hos dolores pugnat Tinctura ☿ Oli, quæ de capite mortuo ☿ li summiè edulcora-to ~ta salis & vini paratur, dum 40. ejus gut-tas aque appropriatæ instillat, & loco gargaris-mi utitur, iudat etiam ~ ☿ ❧ci volat. Essent. de sale fuliginis, Mumæ ad octa potunculâ opii vel extracto hyoscyani. Alii gingivis illinunt aquam cœruleam alii Tr. Laccæ.

In ore detineantur variis liquores, decocta aliaque liquida, ☿ Regim. Hungar. præprimis aqua asthmatica absque lactaro, vel intrabilis, vellii, convall. triplici infus. flor. recent. parata in ore detenta egregiè sedat dolorem. Vel:

℞. ☿ asthmat. non edulc. ʒß.

flor. sambuc. ʒi. ʒij.

Tinctur. Odor. alg. M. ʒj.

Ess. diascord. ʒij.

M.

Vel Tinctura Odontalgica ☿ Vid. lii, quæ fit ex ligno sancto, rad. pyrethr. & caryophyllis, per se detineatur ore: vel sequens nostra. Vel iuxta D. Hogend. ortium Massapilularum Russi in aceto solut. cum polysipio indatur denti doloro-so, mirè enim dolores hos sopiè dicit, test. Ephem. G. Dec. 11. A. 6. 2. f. 146.

℞. Rasur. lign. sanct. ʒiij. sem. staph. agr. rad. pyrethr. santal. circ. aa. ʒi. ʒiij. Zzib. piper. caryo-phyll. aa. ʒß sem. organ. ʒi. fol. serpill. saly. nicotian. aa. Mß opii ʒß. Capur. ʒj. Spir. vini q. s. destillentur ex cucurbita; tollit dolo-res dentium ore detenta. Vel spiritus vini cam-phoratus in ore detentus & naribus attractus, vel etiam intro assumtus, vel aqua Anhal. Vul-gò spiritus vini in ore detinetur, alii acetum vi-ni extollunt, sed hoc rectius improbat. Aqua Ducis Candalæ est præsentissimum remedium in quavis Odontalg. à quacumque causa turbata, quod sæpius cum admittatione vidi Eadem aqua conducit ad gingivas putridas, fistulas, & cancrû. Nonnulli frustulo lardi fricant dentem dolen-tem seu gingivas. Quæcumque olea aromati-ca dentibus cariosis, unde sæpe dolor oritur, im-missa dolorem propediem solunt, ut sunt ol. caryophyllor. macis, carvi. tabaci, Junip. chartæ, spicæ, lavendul. petroleum, quod aque efficax est ac ol. caryophyll. ol. camphoræ vel Peruvian. item oleum coryli & oleum hyoscyami tanquam anodynum in doloribus dentium scorbuticis maxime conducit, imò in quacumque odontalgia radix ejus gingivis affricata, vel dentibus inserta, certissimum dicitur remedium. Confert & maxime herba & radix pericaria,

Ec cum



cum rad. lapath. acut. in aceto cocta, in casu, ubi salix particulæ peccant. Spirituosa cum camphoratis maximo cum emolumento induntur dentibus, Spir. scil. vin. ʒij. cum camphor. ʒj. calide cum bombace denti inditus. Gumm. tacamahac. cum camphor. dentibus applicetur & ore detineatur, vel sequens.

℞. *Herb. salu.*

*beton.*

*origan.*

*Caryophyl.*

*N. M. aa. ʒß.*

*Rad. pyrethr. ʒj.*

*Consus. bulliant in cerevis. pro collutione oris.*

Item opiatæ ex variis anodynis & sacculis inclusa vel per se dentibus erosio indita, mirificè aliquando dolorem sedant. Sic & pilula *Herkii* in ore detenta omnem dentium dolorem mirificè placare scribitur, quæ conficitur ex semine apii, hyoscyam. opio & syrup. papav. Sequens noster Balsamus Odontalgicus dentibus immisus mille experimentis comprobatus est.

℞. *Laudan. opiat. ʒj.*

*Ol. camphor.*

*caryophyllor. aa. gt. v.*

*M. pro Balsamo.* cum bombace denti dolenti applicando. Vel :

℞. *℞. li. ʒß. ʒj.*

*opii correct. ʒij.*

*corr. mandragor.*

*ol. philosoph. aa. ʒß.*

*M. pil. Russiq. i. pro consistentia.*

Sequens præmissis iudocifero raro te fallit.

℞. *Opii gt. v.*

*Camphor. gr. iv.*

*Ol. fabin. gt. j.*

cum spir. vini sit vel Essentia ore detinenda, vel formâ pilularum denti immittenda.

Alii extollunt pinguedinem tanarum, nos vero viperinam huic præferimus.

Omnia frigida, omnia fervida, ut & saccharata. præsertim verò acida in omnibus dentium afflictiibus nocent. quodjam olim novit *Salomo* Regum sapientissimus, qui Dei Spiritu actus inquit in *Proverb. cap. X. vers. 26.* quod acetum dentibus, quod fumus est oculis, hoc piger est iis, qui eundem emittunt.

Si dentis dolor oriatur à dentibus emergentibus, non statim cum Italis ad incisionem transiendum, excitant enim facile febris ac vigiliæ, & aliquando accedunt deliria, tandem furor, & ultimò mors, quale exemplum legi meretur *Obs. 36. Tulpii.* Rarum est quod ex relatione celeberr. *D. V. Vedelii* obtinuit *Cl. D. Lucas Schröckius, M. D. & Phys. Aug. S. R. I. Acad. N. Adjunctus, Amicus noster,* in Tract. suo de Moscho, quo Gregorius quidam Belga Odontalgiam per aquam moschacam auri lateris affecti insulam sapissimè curaverit.

Transplantatio in multorum versatur ore, & censetur à pluribus maximi momenti auxilium esse, si nempe quis corticem exteriorem salicis, sambuci vel coryli cultello nonnihil aperiat, & segmento ligni ab arbore abscissi dentes dolentes scalpat usque ad sanguinis profusionem, segmentum sanguine tinctum postmodum parti abscissæ arboris iterum inserunt, & foramen luto recenti optimè claudunt; sed hæc ridicula sunt & voto nunquam respondent, credas mihi tanquam experto Roberto. Sic dicitur de an-

cillâ, quæ in gravi dentium dolore Milesum domesticum catellum noctu apponere genis & levamen sensit, sine dubio à calore temperato; sed ille canis dolorum in eum translatorum perceptione, uti ipsa existimabat, agitatus, electo prostrabat, latrabat & ægrè habebat. Sic & saltatio, seu subsultus, cum corpus nimium agitur, conducit in Odontalgia, prout id confirmat *Bartholin. in Asi. Hospit. vol. 5. Obs. 108.*

Laudatur etiam inter sexcenta illa, quæ diximus, vilissimum illud caput mortuum post olei pini destillationem resitans. nigricans & austriusculum, per chartam bibulam, vel linteum colatum, & ad consistentiam extracti inspissatum, quod cum paucâ farina denti imponatur doloroso & sæpius repetatur. Sed quis omnia recenserebit.

In curatione dentis *erosi* ob annitendum, ut acidum illud corrodens corrigatur, & si potest fieri, in totum auferatur. In hunc finem varia conducunt absorbentia. inter quæ sunt corallia & ossa sepiæ cum camphorâ denti cavo indita, quæ ulteriorem cariei progressum inhibent; alii pulverem corall. alb. cum melle rosato, meo iudicio melius cum Elect. discord. ad consistentiam linimenti crassioris edigunt & dentibus illinunt, ad cariem inhibendam. Nonnumquam dentes valde excavati sunt, & hinc cum commodo, ut in memet probavi, implentur mastiche emollita in ore salivâ propriâ? Ad acidum illud corrosivum demendum, indantur dentibus cavis varia olea aromatica superius de Odontalgia jam enumerata. Internè possunt exhiberi varia salia volatilia.

Cariei dentium occurrit per inunctionem dentis cariosi in loco carioso cum cauterio actuali vulgò ita dicto, sive ex ferro, sive ex ʒj, sive ex ʒ facto, dein cavitas dentis expletur myrrha cum cerâ subacta, melius seu diximus cum mastiche masticata. Attamen in hac iniectione cautela opus est, propter exquisitum sensum nervorum, quia inde sæpius tristitia exemplavimus. Alii, ubi ferum abhorrent ægri, ad potentiale sic dictum confugunt cauterium; sunt qui denticarioso Aq. fort. indunt, alii spiritum ʒli, nonnulli Zzib. in exymelite coquant, ac denti immittunt, alii spiritum ʒli, quæ tamen non approbamus, cum hæc sint acida & corrosiva, quæ superius jam culpavimus cum *Salomone*, & parum vel nihil sæpe juvant. Potiùs in curatione dentis erosi ob incumbendum, ut densevellatur, aliàs acrimoniam suam acidum illud corrodens gingivas infestat & varia excitat tubercula, quæ tandem desinunt in fistulam & cancerum, ut factum vidimus in filia *Hannovien.* Nullum ergò certius remedium corrosi dentis est, quam evulsio, quæ idoneo peragitur instrumento; optimum & tutum Pelicanus dictus, forcipes, & aliud, pes caprinus, seu *der Genssen-Fuß* dictus, majus incommodum asserere possunt. Forcipes varii generis videantur apud Auctores, imò vix ullus est, qui non habeat aut excogitaverit aliquod sibi proprium, aut familiare instrumentum certè in excogitandis tot instrumentis vetustas nimis sollicita fuit. Suxtex Agyrtis qui jactant se absque dolore dentes extrahere, sed falso. In extractione instituendâ cautela opus est, ne fiat in gravidis. Sic refert *Salminus* de gravida quadam Consulis *Servestani* uxore, quæ cum ingentes pateretur dentium sinistræ maxillæ supe-

*Ratio curandi dentium cariem.*

superioris dolores, moræ impatiens ocularem maximè dolentem evellendum curabat. Sed quid sit? Paulo post enititur factum oculo sinistro profusus destitutum. Aliam novæ matronam, quæ etiam extrahi curabat dentem molarem, infanti excludo loco dentis tuberculum in eodem spatium, quo matris erat dens evulsus, nascebatur. Sic nota est Observatio 316. *Ephem. Germ. Ann.* 3. ubi nobilis persona curavit sibi evelli dentem, unde maximus sanguinis fluxus, cum hic sisteretur, ortus est tumor circa genam & collum, & mortua est, forsitan propter aneurisina, à qua strangulata vel suffocata fuit, & ejusmodi fluxus provenit ut plurimum ex arteriâ gingivæ subdita.

Senibus etiam non temerè extrahendos esse dentes, monet exemplum Bononiense cujus meminit *Forestus*. Sic in insula Delphos ob extractum dentem molarem accidit mors Philosopho cuiusdam.

Dentium demum maxima habenda est ratio. Sic primores incisores & gelasini dicti, ob primum usum, quem præstant in cibis dividendis, locutione articulata, & quòd in risu denudentur, non temerè sunt eximendi, nam, ut dicit *Martialis*.

*Hand grata eff. fac. est, cui gelasinus abest.*

Nec caninorum, ob communionem nervi oculis moventis, tutalèmpèr censenda est extractio, à quâ nupèr quis torum accepit oculum. Molares tutius ferro eruantur, modo non frangantur; videndum ergò semper, num radices eorum sint incurvatæ, quod tamen oculatissimus Chirurgus haud percunctari potest, videat tantum ne frangat, vel maxillæ partem incautè simul abruptat. Dum hæc scribo, dentem molarem superiorem erosum usque ad radicem Frater meus Johannes Fridericus Dolæus Pelicani mihi exemit cum radicibus, cui denti eroso frustulum maxillæ adeò firmiter annexum fuit, ut vix abradi potuerit, absque ullo verò meo incommodo, & immunis factus sum à doloribus, quibus antea sæpe atrocioribus, modò mitioribus, diu vexabar. In extractione etiam sedulo est prospiciendum, ne dens sanus loco malè habentis apprehendatur, cujus exempla quàm plurima nobis sunt nota, æger enim sæpe non discernerit, quòd vicinæ jure doloris acerbitas æqualiter in omnem maxillam diffundatur. Quapropter veteres difficultatem extractionis maximam agnoscetes, *idortæ*, *uic* plumbeum in templo Apollinis suspenderunt, quo significabatur, dentem non esse tollendum, nisi vacillet, & corruptus sit, ut facile excidat, ac ceu plumbeo forcipe sine magnâ & temerariâ violentiâ eximi possit. Sed ad quid dolor ægros non cogit, sæpe ipsis placet dubia, quam nulla salus. Exemplum dolorum ejusmodi vehementissimorum observavimus in viro, qui sibi dentem eximi curabat, Chirurgus autem non ritè instructus, vel ob violentam extractionem institutam fregit simul maxillam, ubi dens hæserat, & hinc licet dens ei et extirpatus, attamen dolores multo atrociores fuerunt reddit. *Galenus* alios, qui ob dentem extractum convulsi perierunt, notavit.

Si verò æger & Medicus à ferro abhorreant, & tamen extractio sit necessaria, plurimi Chirurgi, quamvis sæpe frustra, per medicamenta acida, spiritum vitrioli, *Ætis*, aliaque denti cavo indita, dentis per frustra tentant ejectionem. Alii nescio quam extrahendi vim possidere dicunt medicamenta quædam, quibus dens extrahendus sit illinendus, & sunt, qui sequens commendant.

*℞. Salis Armon. ʒj.*

*Succi hyoscyam.*

*dent. corp. hum. mort. pp. aa. ʒß.*

*pingued. rana viridis q. l.*

*F. Unguentum.*

Alii denti cavo indunt succum thymalli, nonnulli dentem cariolum cum dente emortui hominis attingunt, & sic dentem excidere volunt, plures *Θ* cum cum farina in globulos redigunt, & sic denti indunt. In colleg. *Estimul. sequeus* commendatur.

*℞. Gummi. Ammon.*

*Sem. hyoscyam.*

*Succi ejusd. aa. ʒß.*

*Mell. addatur pingued. ran. virid. q. l.*

*Cera parum.*

*F. Unguentum.*

Sed hæc & alia fidei non sustinent, alia habemus remedia tutiora & certiora, quibus uti possumus.

Ad *Tophos* & dentium *Sorditiem*, ne ab his *Tophos* & præmaturo dentium casus mobilitasque oboriantur, præcavendum, eò incumbendum, ut sordēs istæ abstergantur, & vitiosus acor gingivis & dentibus hostilis corrigatur, & blandâ adstrictoria vi gingivæ tonus roboretur, in quem finem conducent omnia incidentia & dissolventia, & quoque exedentia. In leviori malo conferunt inter externa olla sepiæ, C. C. testæ ovorpanis ustis, cinis rosæmar. tabaci, *℥* calcinati, vel sequens compositum.

*℞. Mastick.*

*Tbur.*

*Alum. roch.*

*℞i alb. aa. q. v.*

*M. F. Pulvis.*

Vel:

*℞. Mell. ros. ʒj.*

*℞. Matric. ʒij.*

*M.*

quo fricentur sæpius dentes, & materia ista lapidea dentibus adhærens idoneo instrumento auferatur.

Si *Mobilitas* & *Casus* dentium à vicio gingivæ factus, gingivæ roborentur, acrisque humor, eas ablumens corrigendus per varia blanda astringentia, ut sunt, quæ desumuntur ex *Terrâ Japonicâ*, quæ simul balsamicâ quadam gaudent virtute. Ex. gr. ex Tinctur. gumm. lace, spiritu cochlear. & ol. Tartari paretur mixtura, quâ quotidie tangantur gingivæ ac laventur. In cura cardo rei vertitur in remotione causarum, & hinc egregium est remedium externum Balsamus Peruvianus, vel sequens Linimentum polychrestum, & gingivarum putredini simul accommodatum.

*℞. ℞i Roman. ʒj.*

*Solvatur in aq. fontan. lbj.*

*℞. Amyl. ʒj.*

*Mell. rosat. ʒß.*

*M. F. Linimentum.*

Laudatur etiam muria olivarum, si os frequentius ea colluatur.

Dentium *Casum* quod concernit, ex semine *Casum*, in alveolo latente restituantur, alveoli impletur & defectus ita restituitur; quamvis enim

E c 2

semina

semina intra gingivas restitant recondita, novi dentes post priorum defectum renasci facile possunt, hinc & in senectute dentes renasci solent. Artificiales dentes ex ebore, vel dente hippopotami fabricatos in illorum locum substituunt, non verò in alium finem, quam pulchritudinis & loquelæ gratia. Mobilitati dentium conveniens est sequens vel simile corroborans & firmans.

℞. *Gland.* ʒi.  
*Gallar.* ʒß.  
*Alum.* uʒß.  
*Succ. acac.* aa. ʒß.  
*Flor. ros. alb.* p. ij.  
*Cocq. cum. vin. rob.* ad Colat. lbß.  
 add.

*Tinctur. terr. Japon.* ʒi.  
*M.*

In hunc finem paratur & Tinctura Laccæ, & optima est, quam habet Decker in exercit. præst. circa medendi methodum p. 15. Hinc:

℞. *Tinctur. Lacc. Decker.* ʒij.  
*Spiritus Cochlear.*  
*beccabung.* aa. ʒß.  
*Ol. ʒiper deliq.* ʒj.

*M.*

Ad dealbandos & firmandos dentes sequens commendatur.

℞. *Salis nŕ.*  
*Vitr. Venet.* aa. ʒj.  
*Rad. Cyper. nŕ.*  
*Cann. combust.* aa. ʒß.  
*C. c. nŕ.* ʒij.  
*Corall. alb.* ʒß.  
*M. F. Pulvis,*

Vel:

℞. *mel. rosar.* ʒij.  
*farin. N. M.* ʒj.  
*Elix. vitæ.* d. gr. xxvj.  
*M.*

quo fricentur dentes cum gingivis singulis horis ma utinis. Sequens ab *Estimillero* Beato tanquam egregium ad vacillationem dentium scorbuticam commendatur.

℞. *Rad. bistort.* ʒij.  
*flor. ros. rub.* ʒiß.  
*baln. nŕ.* ʒj.  
*alum. nŕ.* ʒij.

*M. & impregnentur largiter Spiritus Cochlearis*, qui ad oris scorbutum egregius est. Decoctum salviæ vel cochlearis in vino rubro cum camphora egregius etiam est gargarismus in omnibus dentium vitiis.

*Nigredinem & Lapidem dentalem.*

Ad Dentium *Nigredinem* & *Lapidem dentalem* nullum melius reperi remedium, quam Cum crudum cum mastiche, si quotidie dentes eo fricentur. Tartarifata enim optima sunt remedia ad dealbandos dentes, & ad firmandos eos styptica ex lacca & terra Japonica commendamus, aluminosa nobis sunt suspecta, ut & Glata. Sunt, qui malè oleum Oli ad dealbandos dentes nigredinem, attamen dentibus nocet, quia sal volatile corrumpit, quod magnà copiat in dentibus est: qui ergo dentium nitore delectantur, semper post passum os suum aquâ purâ eluant, semelque in septimanâ dentes pulvere terræ porcellanæ fricent, cum enim à sordibus istis sæpius oriuntur dolores, serio videndum, ut à cibis sumis dentes mundentur, unde hoc

faciunt etiam externa, dentiscalpia ex ligno lentiscino, juniperino, vel pennâ anserum parata, ablutio oris cum vino, vel etiam confectio cum dentifriciis, ex. gr.

℞. *Silic. fluviatil.* pp.  
*lap. pumic.* aa. ʒß.  
*Conch.* pp.  
*ecul.* ʒ. pp. aa. ʒij.  
*Corall.* pp. ʒj.  
*Rad. Irid. Flor.* ʒiß.  
*Ol. lign. Rhod.* ʒß.  
*M. F. Pulvis.*

Vel:

℞. *Tinctur. Terr. Japon.* ʒß.  
*D.*

Vel in formâ Linimenti nostrâ in aula usitati.

℞. *Nuc. Moschat.* uʒß. ʒj.  
*Off. sep.* ʒiß.  
*Qi crud. alb.* ʒij.  
*Mell. ros.* q. l.  
*M. F. Linimentum.*

Sed & complures hodiernarum virginum ad nitorem dentibus conciliandum fricant eosdem pulvere Cossæ tostæ vel panis tostî; alii volunt ut dentes quotidie semel inungantur butyro.

In *Stridore* Dentium conducunt omnia antispasmodica, cephalica, nervina, cinabarina, castorina, spirituosâ, tum externè tum internè usurpata, maximo enim cum emolumento usus sum externè aq. Regin. Hung. Lang. infuso arthritico; & balsamo arthritico meo externo.

In *Hemodiâ* ad acidum illud dentibus infestum corrigendum conducunt præter jam dictâ, in hac affectu singulari vi portulacæ & nasturtium, cochlear. beccabung. & alia antiscorbutica dentibus affricata & masticata, & succus ex his expressus ore detentus & internè etiam usurpatus. Curat stuporem hunc & caseus recens & vetustus, alcali præditus. Omnium optimum dicitur urina hominis propria calidè dentibus applicata, vel  $\Theta$  xcurin in  $\nabla$  portulacæ, solutum & applicatum. *Algorem* dentium curat  $\nabla$  Regin. Hungar. vel mirabilis dentibus affricata, item eleoaur. Dialcord. vel Theriaca dentibus illita.

Ad *Vermes* Dentium n candos optimè conducet decoctum fabinæ, vel abinth. vel tanacet. in vino, quod in ore detentum copiosius vermes elicit. Sic & alii funum seminis hyoscyami per infundibulum ore exceptum unicè deprædicant, ut superius jam percepimus, nonnulli Spiritum ʒis, alii Tincturam myrrhæ, nos liquo rein C. C. succinatam dentibus cavis cum lanâ vel bombaris indimus. Sic quoque plures pulverem Nuc. gallarum cum succo rad. pyrethri in formam pilularum redigunt & dentibus imponunt. *Bartholinus* laudat seum cervinum contra dentium Vermes. Omnia amara, ut abinthium, myrrhæ, aloë, &c. optima sunt remedia. Ad illos eliciendos & fallendos quandoque conducunt dulcia; sic fœmina Lugdunensis, cujus mentio injicitur *Ephem. Germ. Ann.* 9. & 10. mel imponebat denti carioso & sic eliciebat vermem. Celeb. *Schultzius* commendat mucum seu chyli reliquias interiori tunicæ ventriculi fuilli adherentes, qui licet sordidum quadantenus, & delicatioribus abominabile sit remedium, vulgo tamen crebris experimentis commendatissimum. Mucus hic linteolo exceptus & formulâ noduli dolenti & verminoso denti imponatur.

CAPUT

## CAP. XXIII.

## De Gingivarum Morbis, Excreſcentiâ, Parulide, Eroſione, &amp; Fiſtula.

## §. I.

**P**erſpectis præcedente capite affectibus Dentium, nunc & gingivarum morbos paucis perſpicimus. Gingivæ ſunt illæ portiones duriuſculæ carnez, quæ dentes inſtar valli cingunt, eoſque in ſuis alveolis ſtabiliunt; vel ſunt carnes illæ ſuigeneris, totum dentium ordinem obſepientes, eoſque oppletis illorum intervallis firmantes. His gingivis accidunt variæ morbi, ut *Excreſcentia*, *Parulis*, *Eroſio*, *Ulcus*, ſive *Fiſtula*.

Gingivarum  
Excreſcentia quid?

*Excreſcentia* Gingivarum vulgò deſcribitur, quod fit protuberantia nimia carnis ſpongioſæ & laxæ gingivarum, vel à proprij nutritimenti vitio, vel uberiore ſanguinis & ſucci nutritii vicioſi eſſluxu dependens.

Parulis  
ſive Epulis.

*Parulis* ſive *Epulis* dicitur inflammatio gingivarum, ad dentium radices intus & foras adeò prominens, ut etiam vicinæ partes diſtendantur, caleant, & rubeant, ab obſtructione inflammatoriâ in hiſce locis producta.

Eroſio.

*Eroſio* Gingivarum eſt earum carnis abſumtio à particulis acido-corroſivis vel proprii nutritimenti, vel aliorum humorum eo alluentium producta.

Ulcus &  
Fiſtula.

*Ulcus* vel *Fiſtula* Gingivarum eſt earundem profundior quædam excavatio ab acido itidem corroſivo continuitatem earum ità diſſolvante producta.

Pars af-  
fecta.

§. 2. *Pars affecta* ſunt Gingivæ dictæ, caro laxa illa dentes obtegens, & inſtar vallicingens, in edentulis ſæpe ipſorum dentium officio fungens. Idem ita indureſcit, ut cibi eadẽ comminui poſſint, multis ad latera ornamẽta glandulis, liquorem lymphicum in ſe continetibus, & per ductus ſingulares eundem variè diſtribuentibus, ne quid ipſis gingivis deſit humiditatis, nec ob nimiam ſiccitatem corruerentur & malè habeant.

Diagnos  
Excreſcen-  
tia.

§. 3. *Signorum* tanta eſt ad medicinam rectè faciendam vis, ut iis ſubtilis fundamenta ſæpius ſenſum collabacere neceſſum ſit. Illa quippe in morbi cognitione nos manu ducunt, & quidquid vel in præſens ad illius dijudicationem, vel fauſti inſauſtive eventus prædictionẽ in futurum ſpectat, graphicè nobis præfigurant. Cùm verò in externis affectibus non adeo neceſſaria ſint, quam in internis, ſciendum tamen, quod indocti ſæpius excreſcentiam gingivarum pro cancro exclamant, & contra alii cancerum pro excreſcentiâ, quare Medicus oculus eſſe debeat, ut bene diſtinguat cognoscatque morbum. *Excreſcentia* ergò gingivarum cognosceſcit ex eo, quando caro excreſcens eſt laxa, forſida & flaccens, cruorem etiam, ſi paulatim attingatur, de ſe fundit, interdum dentes molares ab eâ in totum obteguntur, nonnunquam caro hæc putredine corripitur, aliquando ejus eſt expers, in maſticando & tangendo dolor percipitur.

*Inflammationis* Gingivarum, ſive *Parulidis* ſigna eadem ſunt, quæ aliarum partium inflammatarum, ut rubedo, calor, & vicinæ partes propter obſtructionem adeò diſtendantur, ut maxilla ſuperior & inferior aliquando compatiuntur.

Signa *Eroſionis*, *Ulceroſis* & *Fiſtulæ* ex ipſa inſpectione noſci poſſunt; adeſt ſæpe Hæmorrhagia gingivarum, quæ interdum adeò larga eſt, ut 14. libræ ex gingiva emanaverint, quam notabilem gingivarum hæmorrhagiam annotavit Cl. Sorbait *Ephem. Germ. Ann. 2. Obſ. 48.*

§. 4. *Cauſas* horum morborum quod concernit, veteres *Galenicis* accuſant in Gingivarum *Excreſcentiâ* ſpongioſam earum laxitatem *Gingivæ* nimiam, & ſanguinis bene nutritientis *Excreſcentiæ* etiam majorem, à præcedente victu valde ſanguificante inductam, & ad gingivas delatam.

In *Parulide* cauſam tribuunt ſanguini intemperato ſerventiori ad gingivas influenti, unde hæ non modo diſtendantur & tumeant, ſed valde etiam rubeant & dolore prehendantur ingenti.

*Eroſionem*, *Ulcus* & *Fiſtulam* originem ſumere credunt ab eodem ſanguine corrupto & humoribus acribus erodentibus intermixto, carnem hanc gingivarum mollem, & ſpongioſam vel depaſcentibus, vel profundius nonnunquam perſodientibus.

§. 5. *Paracelſus* Gingivarum *Excreſcentiam* à ſecundum *Paracelſi* reſoluto ſale aluminis originem ſumere creſcunt cauſa dir, à quo caro earum ita extendatur & augetur excreſcat.

*Parulidem*, *Epulidam*, *Eroſionem* & *Ulcera* potiffimum natales ſuos habere cenſet ex catarrho lui Venereæ complicato, non modo reliquas palati & faucium partes, ſed gingivas etiam inflammante, quandoque etiam penitus erodente & exulcerante.

§. 6. *Helmontius* exiſtimat *Excreſcentiam* Gingivarum contingere ex prodigalitate Archei, ipſum cruorem nimia copiâ intra gingivarum foramina transfundentis, unde caro earum in majorem molem excreſcat.

*Parulidem* à peculiari quâdam ſpinâ Gingivis infixâ pronalci credit, dum Archeus ab eadem irritatus ex iracundia quâdam ſanguinem eò transmittat, & gingivas hæc ſigno ſuo iracundia obvelet.

*Eroſionem* & *Exulcerationem* harum partium ſequi putat ipſam inflammationem aut abſceſſum ruptum, quoniam cruor à peculiari quodam acido ſit corruptus, qui poſtmodum omne earum nutritimentum ſimili quodam fermento inſiciat, & ipſas hæc partes exedat & deſtruat.

§. 7. *Williſus* vult, *Excreſcentiam* hanc Gingivarum à ſanguine, vel ſero, vel liquore nutritiente

Inflammationis ſive  
Parulidis.

Eroſionis  
Ulceroſis &  
Fiſtulæ.

Ætiologia  
ſecundum  
Galenicum  
Gingivæ  
nimiam, &  
ſanguinis  
bene nutritientis  
Excreſcentiæ.

Parulidæ.

Ulceroſis.

Secundum  
Paracelſi  
creſcunt cauſa  
dir, à quo  
caro earum  
ita extendatur  
& augetur  
excreſcat.

Parulidæ  
& Ulceroſum

Helmontii  
opinio de  
cauſa  
Excreſcentiæ.

Parulidæ.

Ulceroſis.

Williſi  
opinio de  
nutritiente



*sa Gingivæ  
Excreſcen-  
tia.  
Parulid.*

triente copioſius ad molles hæſce carnes affluen-  
tibus progenitari.

*Parulid.* Parulidum verò à ſero copioſiori ſalis qui-  
busdam recrementis ſcorbuticis imbuto, & cum  
ſanguine per arteriolas ad gingivas adveſto, à  
quo ichoroſo ſanguine pori earum nimis im-  
pleantur, ſicque cum dolore inflammatorio, ob  
admiſtam acrimoniam ſalſam, caro hæc ſpongio-  
ſa ſupra modum intumeſcat.

*Exulcera-  
tionis.*

*Exulceratio* ab ejuſdem materiæ ichoroſæ &  
corroſivæ diuturniore affluxu induci putatur, à  
quo gingivarum hæc caro profundius exedatur,  
& planè tandem corruptatur.

*Sylvi opi-  
nio de cau-  
ſa Excreſ-  
centiæ.*

§. 8. *Sylvius* à ſanguine multo & multum nu-  
triente *Excreſcentiam* Gingivarum oriri pu-  
tat, per arteriolas gingivarum ad easdem largius  
fluente, interdum etiam ab aliis humoribus in  
easdem effuſis.

*Parulid.*

*Parulidum* à ſanguine quidem excitari ſibi  
perſuadet, ſed ob ſtagnationem diuturniorem  
corrupto, ita ut exhalatus paribus volatilibus  
acidæ & ſalinæ dominium ſibi arripiant, & par-  
tes hæc tendant, inflammant & dolorem in iis-  
dem ſuſcitant.

*Exulcera-  
tionis.*

*Exulcerationes & Fiſſulas* ab acidis iſtis par-  
tibus valde acerbis produci docet, à quibus caro  
hæc gingivarum erodatur, & quandoque  
etiam profundius excavetur.

*Carteſia-  
nerum ju-  
diciu de  
cauſa Gin-  
givarum Ex-  
creſcentiæ.*

§. 9. *Carteſianus* videtur *Excreſcentia* ſeu in-  
tumeſcentia hæc Gingivarum vel à ſucco nu-  
triente copioſius in ſubſtantiam hanc gingiva-  
rum diſtributo oboriri, vel à lymphæ aut ſa-  
livæ ex tubulis glandularum inter fibrulas gin-  
givarum illabente, à quibus fibrulæ iſtæ nimis  
diſtenduntur, imprimis, quando liquoribus  
hiſce multæ particulæ angulares & lamellatæ  
ſint intermiſtæ, quæ in conveniente ſitu,  
& tandem firmiori ad invicem adhæſione  
in tubulis varias ſuccorum pariunt obſtru-  
ctiones.

*Parulid.*

*Parulis* ipſi huic ſtagnationi primam ſuam  
originem debere videtur, dum particulæ an-  
gulares & acutæ reliquis potentiores fibrulas  
non modo valde diſtendunt, ſed etiam pungunt,  
& ſanguis in compreſſis arterioliſ contentus  
per extremitates earum translucet, unde ru-  
bedo in gingivis hiſce inflammatis facilè per-  
ſpicitur.

*Eroſionis.  
Exulcera-  
tionis &  
Fiſſulæ.*

*Eroſio, Exulceratio & Fiſſula* tandem ipſa in-  
flammationem ſubſequi exiſtimatur, quatenus  
fibrulæ iſtæ nimis tenſæ & punſtæ rumpuntur,  
& à particulis acutis & culpidatis, ſive acido-  
ſalinis perpunguntur & diſcinduntur, unde fi-  
brulæ ruptæ abeunt in cincinnos, & majores  
elaborantur ſulci, in quibus ſemper acrior col-  
ligitur ſuccus eroſionis ſuæ pergens, & foramen  
reddens profundus.

*Noſtra ſen-  
tentia de  
cauſa Gin-  
givarum Ex-  
creſcen-  
tiæ.*

§. 10. *Noſtra ſententia* eſt, quod in Tumore  
ſeu *Excreſcentia* Gingivarum relaxantur fibrillæ,  
unde textura fiat amplior, & relaxata caro uberi-  
us in ſe recipiat cruorem, qui ſtagnans ita, fi-  
brulas valde diſtendat, hæc verò nimium tenſæ  
ad quemvis leviorem attactu facile rumpantur,  
& cruorem contentum emittunt, uti vi-  
demus excreſcentes hæſce gingivæ digito leviter  
attactas ſanguinem facile plorare, diſponuntur  
enim ita arteriolar, ut oſcula inordinate dilatata  
ſuccum illum rubicundum promitt nimis ef-  
fundant.

*Parulid.*

*Parulidum* verò ſeu inflammationis origo

contingit, dum vaſa capillaria Gingivarum fue-  
rint obſtruſta, unde neceſſario ſanguis reſtagne-  
re debet, in qua ſtagnatione ipſa conſiſtit in-  
flammatio, imprimis ſi ſimul cum ſanguine ſil-  
veſtres, improporionate, craſſæ, & ac ſcor-  
buticæ particulæ eo perſtingant.

*Eroduntur & exulcerantur* Gingivæ ab acri-  
bus ſalibus, vel cum proprio nutrimento, vel  
cum ſanguine eò delatis, à quibus & ipſa vaſcu-  
la ſanguinea ſæpe corroduuntur, ut ſic ſangui-  
nem fundant. Sic & exulcerantur ſæpe hæc gin-  
givæ à ſalibus illis corroſivis in ſanguinea maſſa  
præxiſtentibus, ut in ſcorbuticis, vel ab intem-  
peſtivo xii uſu, tam in ſalivatione excitanda,  
quam in ablutione faciæ, pro uſu coſmetico in-  
ductis, hinc & corruptuntur adeò, ut ad gan-  
gram fiat acceſſus, quod malum vulgo dicitur  
Mundſäule dicitur.

§. 11. Quod *Prognofis* attinet, Affectus Gin-  
givarum non ſunt vivipendiendi, facile enim *Ex-  
creſcentia* in ſcirrhoſam duritiem abeunt aut can-  
crum, ceu exemplum novi in filia Hanoviænſi à  
Chirurgo Fay curata.

*Exulcerata* Gingivæ facilè in Gangramam  
tranſeunt, & ſæpe propter infeſſiſſimum ſoro-  
rem nemo ægrum ferre poteſt. Ob dolorem  
quoque vehementem vigilas & deliria excitare  
poſſunt, unde gravia ſatis eas comitantur ſym-  
ptomata.

In *Eroſione* Gingivarum, ubi ſimul ſanguis  
ſtillat, res non eſt extra periculum, prout non ita  
pridem obſervavi in virgine 17. ann. quæ ſingu-  
lis menſibus fluxum ſuum per gingivas paſſa eſt,  
non ſine maximo incommodo. Utplurimum  
ſcorbuti nimium increſcentis præbent indicia;  
à quo tota ſanguinea maſſa jam penitus occupe-  
tur, quæ mala Veteres lienofis ſuis adſcripſerunt,  
quare *Hippocr. Prorrh. lib. 2. §. 42.* magnos  
ſplenes habentibus, neque ſanguinis eruptione,  
aut oris graveolentiâ laborantibus, ulcera prava  
in tibiis vaticinatur & cicatrices magnas, in ha-  
bitibus verò tabeſcentibus cum febre fluxiones  
ad gingivas comparantes omnes malas pronun-  
ciat, *Coac. cap. 3.* Abſceſſum circa Gingivam fa-  
ctum dentis corruptio ſolvit. *Coac. cap. 2.* quod  
particulæ corroderent gingivam relinquant, &  
dentem apprehendant, aut poſt diſruptionem  
gingivæ dens demum invadatur, ſicque dolores  
& inflammatio in gingivis planè ceſſarint.

§. 12. *Diaeta* hiſce omnibus affectibus propor-  
tione reſpondeat, quæ niſi ritè obſervetur, aliis  
auxiliis parum efficitur, cum nullum efficaciſ-  
ſimè eſſe remedium, cui *Diaetæ* ratio contraria  
reſiſtit.

*Aer* eligendus eſt, qui cauſæ horum affe-  
ctuum ſemper contrarius eſt, imprimis vitetur  
frigidus & humidus.

*Cibus* ſit ſucci laudabilis & in pauca quantita-  
te adſumatur, vitentur nimis ſalita & omnia,  
quæ vetavimus in cap. de ſcorbuto, quia horum  
affectuum ſemper ſerè comes eſt dyſcracia ſanguis-  
nis ſcorbutica. Sic & *Potus* ſit apprinnè congru-  
us, potus Theæ hic non negligendus.

*Somnus & Vigilia* mediocritatem haud ex-  
cedant.

*Animi Paſſionem*at graviora omni ſtudio ſunt  
vitanda, maxime ira, ne acriorum humorum  
concitetur motus nimius, omnes itaque vitæ  
leges *placit. 2250* reſpicere debent.

§. 13. *Curationem Pharmaceuticam Chirur- Curatio  
gicam Therma-*

*Chirurgia secundum Galenicum in Gingivarum Excreſcentia.* Veteres Galenici ita inſtituunt, ut in Gingivarum Excreſcentiâ nimiam earum laxitatem corrigant adſtringentibus & humiditatem ſuperfluum conſumentibus, quapropter frictiones inſtituunt, ſequenti vel ſimili pulvere ab *Athena* rio valde æſtimato.

℞. Herb. Syderit. ꝥxvj.  
Sal. candidi & tenuis,  
mell. aa. lbijß.

Contund. & in maſſa formam redig. qua in ollam conficiatur, & operculo probè obturetur, in medio verò operculi ſit foramen, per quod maſſa rudicula agitur, donec nihil amplius ſumi aut vaporis exhaleverit, dehinc, ubi ab igne ſublatus fuerit, ac refrigeratus.

℞. huius maſſa ꝥxiij.

pip. alb. ꝥv.

pip. nigr.

pyrethr. aa. ꝥvj.

alum. ſciſſil. cremat. & vino auſtero extinã. ꝥij.

pumic.

myrrh.

hyſſop.

ſem. apii,

puleg. aa. ꝥij.

menth.

rad. Ir. aa. ꝥij.

Contundantur omnia & cribrentur, quo pulvere Gingivæ aliquoties abſtergantur.

*Paralide.*

Ad *Paralidem* præmiſſa nonnunquam venæ ſub lingua ſectio, ut ſanguis corruptus evacuetur, præcedentem pulverem itidem deprædicant, vel ſi maior adit corruptio, ſequenti utuntur linimento.

℞. Miſc. cremat. ꝥij.

Irid. ꝥß.

Croc. ꝥj.

M. terantur & cum melle ſuſcipiantur.

*Eroſione.*

*Ulcerebus*

*& Fiſtulis.*

In *Eroſione Ulcerebus* & *Fiſtulis* ad humores acres corrigendos, præmiſſis aliquando univerſalibus, venæſectio & purgatione, exſiccantia exhibent & præ aliis ſequentia.

℞. Nitri,

Cyper,

borã. aa. q. v.

Combusta M. cum melle, & fermentur in Unguentum.

Ubi magna ſimul adeſt putredo ſequens priori ſubſtituunt.

℞. Irid.

ſandarach.

Cyper. aa. ꝥiij.

alum. ſciſſil.

myrrh.

Croc.

Crocomagmat.

ſor. roſar.

gallar. aa. ꝥij.

M. & pulveriſata excipiantur melle.

F. linimentum.

His ſi putredo domari nequit, cauterium adhibent ex ferro candente, munitis partibus circumjacentibus, quod tamdiu in parte exulceratâ & putrida detinent, donec humiditas ſit conſumpta & locus evicſus, quibus peractis, prioribus eundem colluunt, aut melle illinunt, ad cruſtarum uſque deciſionem.

*Paracelſi morbi.*

§. 14. *Paracelſus* ad morbos hoſce Gingivarum omnes curandos ſummè proſicua laudat

medicamenta ſubadſtringentia & putredini reſiſtentia, præ aliis verò ea, quæ ex lap. calaminar. litharg. rad. ſupior. bulbos. & alumine parantur. *Ulcera* ſi ſint profundiora & nullis aliis remediis domari queant, oleum & pulverem auripigmenti præparari commendat, hunc quidem ulceribus adſperſum, oleum verò in fiſtulis injectum aut panno applicatum.

§. 15. *Helmontii* ex ſententia in Gingivarum Excreſcentiâ Archeus ad parſimoniam in cruoris diſtributione ſervandam eſt admonendus, & Gingivæ aliquid ſtringenda, ne tam facile cruorem admittant, cui operi mel roſatum cum paucis alum. conveniens eſſe pronuntiant.

In *Paralide* totus eſt in exemptione ſpinæ, ut Archeus ſedetur, in ſpecie verò laudatur hic gargarismus ex decocto flor. malv. arbor. cui aliquid nitri pp. additum eſt, ut gingivæ eodem aliquoties gargarizando abluantur.

In *Eroſione* & *Ulcerebus* etiam Gingivarum curandis ſingulares obtinere putat ipſum colothar, & remedia à *Paracelſo* jam laudata, maxime fumigationem arſenici & auripigmenti.

§. 16. *VVilſus* curationem Gingivarum Excreſcentiæ peragit eadem à ſanguinis & ſerâ præſertim corrupti, majori influxu liberando & exſiccando, gargarismis maxime ſubedſtruentibus & ſanguinis corruptioni reſiſtentibus, additis etiam illis, quæ in ſcorbuto habentur ſpecifica, quibus ſequens conſtat formula.

℞. Cort. Med. ſambuc.

ulmi aa. Mß.

ſol. ſaturej.

ſalv.

eryſim.

naſturt. aa. Mj.

rad. pyrethr. ꝥij.

Cog. conſuſa & conſiſa in aq. Calc. lbij. ad tertiam partis conſumptionem, pro edulcoratione ſi lubet add.

mell. roſar. ꝥij.

F. Gargarismus.

Laudat etiam liquorem ex Oli comprobati ꝥi in aq. fontan. lbij. in vitro mixtis & conquaſſatis per ſubſidentiam clareſcentem eodem modo adhibendum. Aliud etiam parat collivium ex lixivii cinet. genſt. vel roſiſmar. vel Qi & Oricalcinat. lbij. quibus incoquantur ſol. iaturej. thym. ſalv. roſiſmar. aa. Mj. Colatur. ſuperfundit ſol. Cochlear. Mij. F. infuſio calida per horas tres, iterum colatur & ſervatur ad uſum. Unguentum de Aquileja noctu adhibendum non minus quam alii ſerîo commendat.

Ad *Paralidem* eadem adhibere ſolet, cum *Paralidem* cauſæ horum affectuum ſæpe parum differant, & iisdem remediis depellantur, maxime verò liquorem ex vitriolo huic affectui convenire exiſtimat, aut ſequens linimentum.

℞. Mell. roſar. ꝥij.

Oli. & ßß.

M. & illinantur gingivæ.

In *Eroſione* & *Ulcerebus*, in quibus Gingiva adhuc magis corrumpitur & putreſcit, ad fortiora accedit medicamenta, putredini valde reſiſtentia, infuſionem videl. Oli camphorati, vel lapidis

lapidis medicamentosi, vel sequentem adhibet collutionem.

℞. Rad. gentian.  
aristol. rot. incis. aa. ʒß.

fol. centaaur.  
abynth. Pont.  
saurvej.  
aquilej. aa. Mj.

Cog. in aq. Calcis aut lixivialis, modo etiam sfer-  
rati, modo aluminos. lbiii. adteri. part. consumpti.  
Colatur. add.

Mell. crud. ʒij. vel iij.  
M.

In fistulosis ulceribus præter antedicta Un-  
guentum Ægyptiacum in usum refert, quo in  
spiritu vini dissoluto, vel loco ejus lapidis me-  
dicamentosi aut sublimati infusione imbutam  
petiam loco affecto aliquoties solet applicare.

§. 17. Secundum *Sylvium* curabitur Gingi-  
varum *Excrecentia* remediis subadstringenti-  
bus & aliquantulum acidis, ut ulterior nutrimenti  
accessus copiosior inhibeatur, quo sine lau-  
datum aluminosa & lapidem prunellæ, si vel in  
aqua plantag. collutionis, vel cum melle rosato  
linimenti forma usurpentur.

In *Parulide* omnem sanguinis in Gingivis  
stagnationem resolvit, tum internè diaphoreticis,  
tum externè remediis ex decoctione plan-  
tarum scorbuticarum, studiosè tamen & cautè  
paratæ, ne sal earum volatile deperdatur, in quibus  
dissolvit rob dianucum, & parum nitri p.  
addit, vel ex sola aqua nascitur. aquat. cum lap.  
prunell. oris parat collutionem, quæ hoc in ca-  
su valde æstimatur proficua.

In *Exulcerationibus* & *Fistulis* ad acidum acre  
corrigendum primariam dirigit operam, me-  
dicamentis adhibitis, vel volatilibus, vel sub-  
acidis aliis temperatis, ut spin. Bli. cum melle  
rolato illitum, vel unguent. Ægypt. à quibus  
acidum in ulceribus existens valde domatur,  
quo facto tandem ulcera mundat & conso-  
lidat.

§. 18. *Cartesiani* nimiam Gingivarum Ex-  
crecentiam imminuunt remediis cum adstri-  
ctione fibrularum etiam succum copiosiore,  
sive sit nutritius peccans, sive lymphæ aut sali-  
væ, elicientibus, ut eo ejecto fibrae arctius jun-  
gantur, & tubuli fiant angustiores, quæ de  
causa locum tumentem aliquoties fricant pul-  
vere quodam ex nucibus cupress. capil. gland.  
myrrh. sale armoniaco & camphora parato,  
vel sequenti mixturâ linteum lumentatum ap-  
ponunt.

℞. Rad. pentaphyll.  
lapath. acut. aa. ʒiib.  
salsaparigl. ʒij.  
lr. Florent. ʒj.

fol. Querc.  
ligustr.  
salv.  
chelonid. min. aa. Mß.

Malicor. ʒß.  
summit. rub. Id. Mj.  
Cog. in vino rubro Colatur. ʒiiij.  
add. Spir. sberiacal. camphorat. ʒß.  
M.

Formant etiam placentulas sequentes, quasiis-  
dem gingivis excrecentibus apponunt.

℞. prunor. slyvestr. immatur.  
exsiccatior. ʒj.

thur. ʒij.  
Gum. lacæ. ʒß.  
alum. ust. ʒj.

Pulversificata excip. mucilag. gummi. tragacanth.  
in aq. fol. querc. facta.

F. s. a. Placenta seu Trochisci non signati,  
teneantur aliquamdiu digito super loco tu-  
mente.

*Parulidis* curationem inchoant internis dia-  
phoreticis, quamvis stagnationem in quibus-  
cunque corporis partibus facile resolventibus,  
Essentiâ nimirum ligni Guaiaci, vel sassafras,  
cum spiritu C. C. vel ʒio diaphoret. & C. C.  
& camphora, tum externè aquam adhibent cal-  
cis vivæ cum spiritu vini, aut theriacali cam-  
phorato, quibus Parulidem & quemvis locum in  
gingivis inflammatum aliquoties in die attingunt,  
vel spirit. vini camphorat. ʒij. addunt spirit.  
flor. sambuc. ʒj. & eodem modo procedunt.  
Tincturæ lacæ convenienter præpara-  
tæ etiam in hoc affectu debitas relinquunt  
laudes, attamen mixturas prænominate eidem  
ferè præferunt.

In *Erosione* & *Ulceribus* Gingivarum toti sunt  
in domandis particulis illis acutis profundius  
erodentibus, quæ virtute itidem aquam calc.  
viv. constare affirmant, uti quoque aq. virid.  
Hartm. vel sequens colluvium, quo ulcera ab-  
luenda, vel illinenda sunt.

℞. Rasur. lign. Guajac. ʒij.  
Rad. aristol. rotund. ʒijj.  
tormentill. ʒj.

fol. salv.  
aquilag.  
veron. aa. Mß.

flor. ligustr. Pj.  
Cog. in aq. simpl. q. l.  
Colatur. ʒijj. add.

Tinctur. myrrh. ʒiij.  
~ ~ Dulc. ʒß.

Cap. mort. vitrioli ʒj.  
Camphor. ʒß.  
Syrup. de tormentill. ʒv.  
Rob diamor. ʒijj.  
M.

In *Fistula* profundiori Unguentum Ægyptiacum  
approbant cum myrrhæ, vel liquorem  
myrrhæ, & si malum medicamentis hisce non cedat,  
cum aliis ad ipsum auripigmentum præpara-  
tum progrediuntur, quod vel per se fistulæ  
inpersunt, vel melli rosaceo admiscunt & ulceri-  
bus fistulosis insinuant.

§. 19. *Nostro* judicio in hisce Gingivarum af-  
fectibus semper ad humorum acrimoniam re-  
spiciendum. Sanguinea ergo massa ante omnia  
à particulis istis acris salinis corrosivis libe-  
randa, in quem finem præprimis conducunt  
decocta illa ex lignis & rad. Chin. salsaparill.  
consol. &c. parata, salia quoque volatilia,  
aliaque, quæ cap. de Scorbutico in Encyclop.  
Med. commendavimus, proderunt, neque in-  
terna negligenter vulneraria, decoctum scilicet  
heder. terrestr. & veron. cum syr. ejusd. pa-  
rum edulcoratum.

Præmissâ internâ curatione ad externâ nos  
conferamus. In omnibus gingivarum affecti-  
bus sequentem aquam ad gingivas commenda-  
mus nostra experientiâ comprobata.

℞. Herb.

℞. Herb. cum tot. cruciat. M. iv.

Cochlear.

massur. rec. aa. Miß.

flor. balaut. ʒi.

fol. querc. Miß.

rad. angel.

pyrethr. aa. ʒj.

Alum. crud. ʒiib.

Cori. granat. ʒij.

Incis. & contus. affund.

acet. vin.

brod. olivar.

aq. nicotian. aa. lbj.

† scyllit. ʒij.

Stent per d. & n. post deßill. in MB. ad remanent. Ment. j.

In Excreſcentiâ. Parulide, Eroſione & Ulceribus medicamentum hoc eſt euporiſkon. Sic & aqua illa Ducis Candalæ ſuperius laudata & hic egregia eſt. Medentur quoque gingivarum huic Excreſcentiæ decocta chalybeata & vulneraria. In Excreſcentia gingivarum ſcorbuticâ ſuccus cochleariæ cum alumine uſto egregius eſt, ſic & decoctum ſalviæ in vino rubro cum Vitrioli de Cypro huic non cedit, item decoctum herbar. vermicularis cum alumine & melle Batavis ſoleme eſt. Aqua Calc. viv. in metu gangrænæ cum Tinſturâ lacæ optimum eſt remedium.

In eo affectu, ubi gingivæ ſanguinem ſtillant cum ptyaliſmo, conducit ſequens decoctum, noſtra experientiâ ſæpiſſime comprobatum.

℞. Cori. rad. prunor. ſiſveſtr.

Rad. gent.

Irid. Florent. aa. ʒij.

Summit. rub.

cupreſſ.

ſaturej. aa. Pj.

Incis. coq. in vin. rub. & aq. ſexies chalybeat.

Colat. ℞. hujus ʒvj.

add.

Mel. roſar. ʒijj.

M.

quo decocto oſeluatur ſæpius. Flaccidæ Gingivæ, tumide accurrentæ adſtringendæ ſunt decocto ſalv. tormentill. roſ. rub. ac flor. balaut.

In Parulide, Epulide, Inflammatione & dolore Gingivarum præmiſſo interno abſorbente ſæpius repetito, aliſque ſudoriferis ex ſalibus volatilibus, ut his acidum corrigatur, & humoribus ſtagnantibus motus debitus reſtituatur, ſequens vel ſimile decoctum propinetur, quo patiens oſ ſæpius eluat.

℞. ♀ Aſthma. non edulcorat. ʒiib.

flor. ſambuc. ʒj.

Tinſtur. Odontalg. ʒj.

Elect. Diaſcord. ʒij.

M. D. ad vitrum.

Vel ubi ſimul internæ oris partes inflammatae ſunt.

℞. Aq. roſar.

flor. ſambuc. aa. ʒiib.

Spir. flor. ſambuc. ʒij.

Aq. theriacal. ʒijj.

M. D.

Quando in Epulide caruncula in exteriori gingivâ ita prominere, ut digitis vel forcipula prehendi queat, ligetur pilo equino, vel filo ſericeo rubro, ut ita denegato nutrimento flacceſcat, & exſiccata aut ſpontè decidat, aut forſicula innoxie abſcindatur.

Eroſæ & exulceratae gingivæ abſorbentibus emundandæ ſunt, ne acres ſalæ & acide particulae eaſdem ulterius corrumpant, & hinc conſolidandæ, in quem ſinem conducunt Unguentum de aquileg. Decoctum flor. roſ. aquileg. biſſort. malv. ſalv. Poſtunt & pulveres dentiſſicii ex ebore, C. C. uſt. corall. & Qo adhiberi, quopertinent omnia edulcorantia acidum, mel roſar. ſuccus hermes, ſuccus beccabunga, cochlear. apii, brodium olivarum, aq. theriacalis, aſthmatica, aq. ad gingivas ſtata. Tinſtura lacæ cum eſſentiâ myrrhæ egregium eſt purificans. Aqua & decoctum ſalviæ cum ruta faciunt hic pocula tuta. Huc pertinent Eitmulſeri Dentiluvium, & Gargarismus de tormentilla Myſ. Et cum ut plurimum in iſtis eroſionibus gingivarum acidum corroſivum peccet, ſequente uti ſolemus unguento, quod acido corroſivo multum reſiſtit.

℞. Elect. Diaſcord.

Theriacal. aa. ʒij.

Unguent. Aegyptiac. ʒiib.

Gumm. Lacæ.

Spir. xci. aa. ʒij.

Cochlear. ʒj.

M. F. Unguentum.

Ad Ulcera cum putredine Gingivarum ſananda elegans remedium eſt mel roſaceum cum ſpiritu ſalis, ad gerarum tantum acorem imprægnatum. Vel quod melius cum ſemina matricali. Si Gingivæ nimis exulceratæ fuerint, ut inde inectatur gangræna & ſphacelus, (Mundfäule) tunc abſque omni cunctatione ad ſpir. vini Camphorat. vel ad Unguentum Aegyptiacum in melle roſato præmixtum accedendum eſt, ubi enim in atrociori malo miſoria non juvant, ad fortiora accedendum: ex. gr.

℞. Virid. ar.

Vitrioli de Cypro aa. ʒb.

Auripigment. gr. iij.

Alum. roch. ʒj.

Elect. diaſcord. & mell. q. l.

F. Unguentum.

quo gingivæ illinantur; vel ♀ virid. Hartmanni frequentius abluantur, vel ſeq. quod optimum eſt.

℞. Muria limon. ʒij.

Elix. vitæ ʒb.

Myrrh. ʒij.

Spir. vin. reſtiſ. ʒj.

Tart. Viridat. ʒij.

M. & laventur partes affectæ, gingivæ nempe.

Si conſumantur in totum gingivæ à proprii nutrimenti vitio, prodeſt præprimis aqua ad gingivas in aula Anglorum uſitata, (das Engliſche Mundwaſſer) vel noſtra, vel decoctum ſalv. vel cochleariæ in vino rubro, addito momento Vitrioli de Cypro. Si adſit comes hæmorrhagia gingivarum, omnia ea proſunt, quæ in medium protulimus capite generali de Hæmorrhagia Narium, præprimis autem laudatur liquor ſtypticus gingivis applicatus, vel pulvis calcanthi, vel adhibeatur cauterium in caſu deſperato. A Tulpio in tali caſu maxime æſtimatur ſequens.

℞. Bol. Armen. ʒijj.

Calc. viv.

Vitrioli uſt.

Alum. uſt. aa. ʒiib.

Lapid. hamat.

Ff

Alci



*Aloes lucid.*  
*Sangu. dracon.*  
*Terr. Lemn.*  
*Croci opis.*  
*Mumia*, aa. ʒb.  
*Mastich.*  
*Thur.*  
*Oliban.* aa. ʒj.  
*M. F. Pulvis.*

Fungus iste, si crepitus lupi applicetur gingivis, vel lineæ vitriolo albo soluto, vel liquore styptico imbuta. Mixture sequens Etmüller pro dentibus & gingivis à variis affectibus præservativa est.

*R. Ag. plantag.*  
*Sedi minor.* aa. ʒij.  
*Sal ꝑci.*  
*Sal Tart.* ʒb. adaa. ʒj.  
*M. Filtra.*

## C A P. XXIV.

## De Maxillarum Morbis, Immobilitate, Luxatione &amp; Fistula.

## §. I.

**C**apitis osseam partem, quæ Facies dicitur, complent duæ Maxillæ, Superior & Inferior, quarum affectus tum theoreticè, tum practicè nunc considerabimus. Ipsæ maxillæ, imprimis inferiori contingit aliquando *Immobilitas*, ut ægri os aperire nequeant. Sic & interdum *luxatur* Maxilla inferior à causâ violentâ, inde os nimis hiat. *Fistula* Maxillæ dicitur ulcus cavum, angustum & callosum, cavitatem juncturæ maxillæ occupans.

*Maxilla immobilis.*  
*Fistula.*

*Parti offi-  
 Ba. 1*

§. 2. Facilius in morbi notitiam & curationem pervenimus, si prius *Sedem*, & quæ circa illam observanda veniunt, ostenderit. Subiectum igitur denominationis constituitur Maxillam, ut plurimum verò inferiorem, in quâ, & quidam circa juncturam, conspicuus est fistulosus sinus. Maxilla superior antè orbitis oculorum & dentium superiori ordine circumscriptur: posterius sphænoide, & temporum ossibus duodecim, vel ad aliorum opinionem, undecim, quorum utrumque sex numerantur, de quibus videantur Anatomici. Maxilla inferior est os durum & solidum, figurâ literæ Græcæ (v) suis alveolis dentium inferiorem ordinem recipiens, duobus utrinque processibus adscendens, quorum anterior & acutus pontis Zygomatici arcum subintrat: posterior obtusus lineâ ossis petrosi inarticulatur.

*Diagnosis  
 Maxilla immobilis.*

§. 3. Morbi internotio rectæ curationis fundamentum est. Igitur de Signis *Diagnosticis* paucis agamus. Cognoscitur ergo *Immobilitas* Maxillæ inferioris, si os clausum manet, & æger id aperire nequit rectâ ratione utens, & quando adest maximus tumor genarum, & sic motus ipsius impeditur.

*Luxationis*

In *Luxatione* Maxillæ os hiat, & præcessit vel causâ violenta, vel oscitatio vehementissima, locutio depravatur, masticatio tollitur, & si luxatur processus rostræ similes, qui subjugali ossi inferitur, ipso ossi jugali humilior sit, & aliquando extrâ ipsam fertur.

*Fistula.*

Cognoscitur autem *Fistula* Maxillæ ex aliârum signis, quæ capite generali de fistulis dicta sunt, si ulcus sit scilicet profundum, angustum & callosum; dein signum est ulceris diuturnitas, tunc enim necesse est os maxillæ abscedere, quia ob continuum contactum os madet & remollitur, juxta illud Hippocr. *Secl. 6. Aph. 45.* Quæcumque ulcera an-

nua sunt, aut longiore tempore durant, in iis os abscedere necesse est & cicatrices cavas fieri. Item quando immisso specillo os reperitur asperum, cariosum & inæquale, dein si conspiciuntur ad os *Fistulae* frequenter caro livida, flaccida, & corrupta, atque si humores sunt tenues, & fetidi, qui remanant.

§. 4. Ad *Causarum* investigationem & enodationem ut me accingam, ordinis ratio postulat, sicut enim nullius rei ita neque morborum accurata cognitio perfectaq; sine harum notitiâ haberi potest, & ita consequenter neq; præservatio, neque curatio legitima institui: capropter ut tantò profundius in causarum horum Maxillæ morborum cognitiōem perveniamus, aliorum prius de iisdem percipiēmus sententias, & quidem omnium primò *Galenicorum*, qui in *Immobilitate* tanquam causas allegant, solent ipsum coactum Maxillæ cum capite, distillationem & capite in ejus radicem, luxationem & rupturam ab ictu vel telo inductam.

*Luxationis* verò causam communissimam proponunt nimiam maxillæ apertionem, siue ex oscitatione, siue ob bolum majorem capientem contingat, unde musculi nimium tendantur, & maxilla inferior vel ex uno latere, vel ex toto elabatur, sed hoc rarius, prius autem frequentius contingere adverteunt.

*Fistulam* ex ulcere antiquo circa Maxillarum *Fistula*. articulationem morante provenire docent, dum humores corrupti acrimoniâ suâ musculos non modo, sed osseam quoque substantiam cum cartilaginibus profundius erodunt & quasi pettebrant.

§. 5. *Paracelsus* Maxillæ *Immobilitatem* tum à causâ prioribus jam relatis induci concedit, tum à discessu Synoviae, & crescentia quadam veteri circa juncturam maxillæ inferioris cum superiori pronasci recenset.

*Luxationem* contingere statuit à motu quodam violento per ictum, lapsum, aut apertionem nimiam, à quibus omnibus musculi ita queunt distendi, ut Maxillam inferiorem in loco suo pristino exire permittant.

*Fistulam* Maxillæ oriri putat ex morte salis nutritivi & excrementorum, quam apostematâ & vulnerationes vel fodicaciones circa hanc partem facillè accerant.

§. 6. Hel.

# CAP. XXIV. DE MAXILLARUM MORBIS 227

**Ex Hel-**  
**montius**  
**principii**  
**causa Ma-**  
**xilla Im-**  
**mobilitatis**

§. 6. *Helmontius* in denominandis causis Maxillæ *Immobilitatis* precedentibus absque ullâ metâ controuersâ ad stipulat, saltem Archeon suam subiungens delatatum, aut alienis occupatum negotiis, ob quæ de motione hac Maxillæ minimè sit sollicitus.

**Luxationis**  
**causa**

*Luxationis* ortum eundem agnoscit, quem reliqui Autores, & *Fissulam* Maxillæ vel ex ulcere, aut vulnere malè curato, aut apostemate quodam produci fatetur, acido vitioso omnem crurem fermentationis sui corrumpente, & in virus profundius rodens exedensq; conuertente.

**Uti**  
**mens de**  
**causa Ma-**  
**xilla Immo-**  
**bilitatis,  
**Luxationis**  
**causa****

§. 7. *Villifius* Maxillæ *Immobilitatem* præter antedictas causas etiam à convulsione frequentius induci arbitrat; uti *Luxationem* à nimia cris dilataatione, aut laxatione ligamentorum utrumque maxillam connectentium; & *Fissulam* ex abscissa aut ulcere diuturno, in quibus materia purulenta nimiam adeptæ acrimoniæ partem istam profundius exedit, & instar cuniculorum longius perfodit.

**Sylvii opi-**  
**nio de cau-**  
**sa Maxilla**  
**Immobili-**  
**tatis, Lu-**  
**xationis**  
**causa**

§. 8. *Sylvius* ad causas Maxillæ *Immobilitatis* refert ipsam ejusdem *Luxationem* & musculorum temporaliū paralytic, vel vulnus transuersum. *Luxationis* verò originem eandem existere concedit, quam Antecessores jam manifestarunt. In *Fissulâ* denique acidum in ulceribus, vulnere aut abscellu temporis tractu acris redditum itidem cum aliis pro causâ venditat excavante.

**Cartesii**  
**opinio de**  
**causa Ma-**  
**xilla Im-**  
**mobilitatis**

§. 9. *Cartesius* in Maxillæ *Immobilitate* placet ab anterioribus allegatâ causâ ad unum penè omnes, siquidem & à *luxatione*, & fracturâ, & coailitu eandem oriri posse concedunt, nec non à musculorum vel omnium maxillæ inferientium, vel temporalis solum vitiiis organicis, tum convulsione & paralyfi motui quarumcumque partium maxime aduersis.

**Luxationis**

*Luxationem* sæpius contingere nôrunt ab oris apertione nimia aut violentâ, lapsu, concussione, ligamentorum laxitate, & interdum, quamvis rarius, ex musculorum debilitate ob spirituum animalium parciorē influxum, quo fit, ut musculorum fibræ non satis tendantur, sed flaccescentes ad leuem quamque causam maxillæ protuberantias expristino suo loco excidere permittant.

**Fissula.**

*Fissulam* ex ulcere aut abscellu tandem emergere profitentur, dum particulæ acutæ vel partes musculosæ, vel etiam osses profundius excavant, & ab aliis quibusdam hamatis in motu impeditæ quiescunt, & quiete hæc solâ sibi invicem circa interiorem ulceris superficiem annexæ crustam quandam instar tunicæ cujusdâ constitunt, quâ fistulositas hæc diutius sustentatur.

**Extra**  
**sententia**  
**de**  
**causa Ma-**  
**xilla Im-**  
**mobilitatis**

§. 10. Præmissis aliorum de morbis hîscæ opinionibus, nunc & nostram apponamus. *Immobilitas* inferiori Maxillæ ut plurimum accidit vel ob *luxationem*, fracturam. maxillæ cum capite coalescentiam, vel ob humoris serosi copiosam in juncturâ collectionem & stagnationem, subsequentem dolorem & tumorem durum ac conspiciunt. Huc & scorbutica maxillarum rigiditas pertinet, in scorbutico enim contingere solet, ut aliquando lentus acidusque humor juncturam illam Maxillæ cum ossibus temporum repleverit, adeoque motum libentim illius impederit. Sic idem malum obvenire solet hysterics, aliisque motibus convulsivis vexatis, ubi maxillæ quâsi ligantur & immobiles redduntur,

debili existente siccò spirituosò, & imprimis à stagnatione & coagulatione humorum ab acido, uti plura ejusmodi exempla novimus, & non itâ pridem in Principiis quadam observavimus.

*Luxatio* Maxillæ inferioris, ubi os hiat, ut plurimum à causâ violenta externa oboritur, quando scilicet caput maxillæ à sua cavitate violenter moveatur, interdum etiam fit ex oscitatione vehementiori. quâ caput maxillæ itidem è sua junctura depellitur. Dividitur in eam, in qua altera tantum parte maxilla depellitur, & tunc à parte illa in anteriorem magis prominet, in adversum ipsâ & mentum inclinatur, os distorquetur, & ordo dentium inferior & superior itâ sibi non respondet. ut sub incisivis sint canini & in eam, in qua utraque depellitur, & tunc series dentium sibi respondet, os magis hiat, & balbuties insequitur. Maxilla inferior cum superiore non potest committi, sed illa magis prominet, ob quatuor musculorum maxillæ sursum trahentium, & nervorum ipsius infertorum affectum, unde sæpe intensus dolor, maxima inflammatio cum febre acuta, stomachi doloribus, &c.

Oritur *Fissula* ex abscellibus, est autem *Fissula*. Abscessus seu apostema hic, ut in foro Medico receptum est, puris seu purulentæ materiæ in partis alicujus cavitate collectio. Abscessus si vel ob corporis impuritatem, & humorum pravorum copiam ex tubulis laceratis effusam, vel ob Medici vel Chirurgi negligentiam vel impericiam nimis diu partibus inhercant, aut non benè curentur, facili Marte in fissulam degenerant, pure cuniculos agente & spiritus intus abigente. Plerumque enim cavernosa ulcera fissulam præcedunt, à quibus corrosivis particulis circa hanc vel illam partem imperium sibi rapientibus oritur fissula; de quibus omnibus vide latius caput generale de *Fissulis*.

§. 11. Pulchrum & ex Medici dignitate est, *Prognosis* mortem ipsam aut vehementes dolores prædicere. Si ergo *Immobilitas* Maxillæ dolor & tumor durus ac conspicuus accidit, malum est, item si inflammatio oboritur, aut si accidit malè adhibita salivatione cum sio non ritè preparato institutâ, facile enim gangrenâ & sphacelus accedit, prout nuper in multis vidimus. Confer Obsêrv. m. curiosis communicatam Decur. 4. Obs. 4. Eph. m. Germ.

Si rigiditas est à scorbutico aliisque convulsivis motibus, pessimum est, & si morbo acuto aliisque febribus & vulneribus conjungitur, lethale signum, uti nuper in herniâ male lectâ maxillam rigidissimam in rustico agonizante observavi.

Quod attinet Maxillæ inferioris *Luxationem*, *Luxationis* si sit à leviori causâ, facile illa restitui potest manu experti Chirurgi, & quia restitutio hæc interdum absque singulari labore obtineri potest, hinc Chirurgi gloriantur, se alapa inflicta ipsam posse restituere, sed hîscæ non jocandum est, cum musculi affecti ob ramos nervorum quinti paris cerebri in consensum trahunt, & sæpe animam de sede suâ regiâ præcipitant. Si enim non restituitur, periculum mortis circa diem undecimum cum febre continua & sopore minatur. Propter enim nervorum infertorum vellicationem ac crispationem sæpe dolor, inflammatio, febris acuta, cardialgia, aliaque symptomata oriuntur, unde sæpe mors præ foribus est.

*Fistula.*

*Fistulae* sunt curatu difficiles, faciliores verò, quæ in mollibus ac carnosis partibus exstunt, hinc notatam maxillæ fistulam in carnosa parte existentem non tam difficilem curatu esse iudicamus, quam illæ, quæ in cartilaginosis, nervosis & ex carnis oriuntur partibus. Sed difficultatem implicat nostra *Fistula*, quando articulum seu iuncturam maxillæ occupat, item quando os vel nervum, vel musculos lædit, si enim *fistula* ad os usque decumbat, curari hanc absque manus opera impossibile est, nisi temporis spatium sua sponte squama vel os abscedat. Difficiles & longæ curationis sunt *fistulae* inferioris maxillæ, præsertim quæ post dolorem dentium accidunt. Reliqua peti possunt ex superius jam allegato capite generali de *Fistulis*.

*Diat.*

§. 12. Investigatâ igitur & cognitâ morbi conditione, curationi quoque aliquot pagellas tribuimus, non enim sufficit omnia hæc nosse, nisi etiam quomodo illa profliganda compertum habeamus. Ante omnia ergo in curatione ne horum affectuum tota victus ratio conveniat est instituenda, quia supervacaneum est, illis præscribere medicamenta, qui rectam victus rationem servare nequeunt. Hæc consistit in regimine æris, cibi potusque, motus & quietis, promotione exercitiorum, vel retentione retinendorum, moderatione somni & vigiliarum, nec non ipsorum animi affectuum, quæ cuncta à Medicorum vulgo rerum non naturalium nomine quondam, quanvis non ita sapienter, fuerunt indigita, cavendum etenim ne ulla harum rerum vel excessus, vel defectus noceat. In specie verò observatum fuit, electionem alimentorum glutinosorum & siccorum in tempore consolidationem promovisse, humidorum impedivisse, excandescentiam noxiam fuisse, nimium motum seu exercitium vehementius detrimentum attulisse; deinde alvus aperta semper est aservanda.

*Curatio*

*Chirurgica* det, veteres *Galenici* soliti fuerunt in Maxilla inferiori *Immobilitate* pro causarum varietate diversam instituere curationem, coalitum enim maxillæ cum capite in omnimodò incorrigibilem transferunt, à destillatione verò producta si fuerit immobilitas, facculos ad moverunt discutientes ex herbis salv. beton. agrimon. flor. camomill. sem. lini, fenigr. & sale, insuper locum affectum inunxerunt unguento alth. Agripp. ol. Camomill. rutæ. fusi. & similibus; in *Fracturâ* ad inflammationem præcavendam venæsectionem celebrant, catharticum exhibuerunt, cucurbitulas admoveunt & partium inferiorum frictionem, tum parti affectæ repellentia imposuerunt & emplastra vulneribus aliis destinata, uti quoque lintea vino & oleo madefacta, tum partes junctas debite unierunt, unitæ ut continerantur, dentes proximos seta vel auro alligant, & tandem partes callo consolidant, ægro præcipientes, ut in parte sanâ decumberet, & cibos molles & liquidos assumeret, non omnibus quandoque habentibus ab *Hippocrate* inventis, tres digitos latis, & ex molli corio eâ parte confectis, quæ cute tangunt, quarumque una inferiori maxillæ parti mentum complexura, altera superiori aurem comprehensura, agglutinatur, & utrimque super tergum alligatur.

*Luxationis*

*Luxationis* curationem ita aggressi fuerunt, ut primo statim tempore id, quod exciderat, resolverint, & quo facilius hoc obtinerent, par-

tem affectum prius relaxant fortibus convenientibus ex hydrelxo aut decocto sol. & rad. malv. & alth. sem. fenigr. & inunctionibus, hinc extenderunt, quo spatium sit liberum, ubi articulus queat agitari & in sedem pristinam compelli, & quo citius & commodius hoc peragatur, ægrotum resupinarunt subiecto pulvinio scorteo, maxime facto, ut quam minime cedat, tum minister caput tennit immotum, & Medicus pollices digitosque obvoluit in os coniecit, reliquos extrinsecus admovit, maxillam fortiterprehendit & deorsum ad guttur adduxit, imperans simul ægroti, ut modicè hiet, ad musculos claudentes relaxandos, quo pacto maxillam hinc inde agitavit, & e regione sinu sui aptè collocavit, in quæ tùm Medici aut Chirurgi, tum musculorum Crotaphitarum ope facile compelli potuit, eoquæ obtentio os arctè ut claudatur præceperunt, ut musculi maxillam ulterius in sedem adducerent, & in eâ obfirmarent ne verò rursus exciderent, quietem injunxerunt, ita ut homo nequæ loqueretur, nec cibû comederet solidiorem, nec maxillam dimoveret. insimul vinculum admoveverunt, pannos & fascias loco affecto imponentes, & super loco eodem fortius adstringentes. Ad propulsiandam inflammationem venæsectionem instituerunt, catharticum exhibuerunt, in ediam injunxerunt, & pannum cerato liquido aut oleo rosaceo madidum imposuerunt; tandem maxillâ satis confirmatâ vinculum resolvunt, maxillam foverunt, leniter dimoverunt, & medicamento quodam molliente illiverunt, ad duritiem residuam omnimodò discutendam. Hanc curam utrique lateri adhibuerunt, si luxatio ab utroque fuerit inducta.

*Fistulam* Maxillæ ut aliarum partium *Fistulas* *Fistula.*

curatur medicamentis callum amolientibus & agglutinantibus, veratro videlicet nigro eidem imposito, quo duorum aut trium dierum spatio callum elidi proutunt, hinc auricula coctâ, affusa & fori crude aut ulto cum paxillo vini diluto, aut elaterio terebinthinâ excepto, & in collyrium redactò adhibito, aut, si ad os usque pertingat, nec squama aut os sua sponte abscedat, manuali operâ eandem separant, aut cauterio absumunt, luxu luvio ex samentis vitis, in quo mel rosatum fuit dissolutum, abluunt, & emplastro conveniente consolidant.

§. 14. *Paracelsus* Maxillæ *Immobilitatis* curationem aliquando difficilem esse agnoscit, laudat verò ad eandem perficiendam, imprimis Synoviae vitii & excrescentis destruendis interius assumenda arcanum sulphuris, oleum auri, & aquam Qi; externæ axungias animalium quorundam, ut taxi, murmenti, vulpis, seuum cervinum, ol. lumbricor. & balsamos ad membra contracta, potissimum qui paratur ex terebinth galban. & gummi. elemi destillatis, quo iunctura maxillæ calide est inungenda.

*Luxationem* per restitutionem partis luxatæ curari posse aderit, & quo facilius curatio impetretur, partes emollit balsamo ex axungis parato, ne verò maxilla restituta denud elabatur, ligamenta obfirmat emplastro suo oppodeltoch.

*Fistulam* Maxillæ eodem modo, ut reliquas curare nititur, medicamentis nempe tum internis, tum externis, quæ libro quinto sunt evolvenda & quia hæc fistularum species non æquè ut reliquæ emplastra & alia medicamenta topica admittit, ea propter abluções præ aliis hic commendat,

*Fistula.*

# CAP. XXIV. DE MAXILLARUM MORBIS. 229

mendat, de quibus gutturæ quædam, si fieri commode possit, per syringam fistulæ ad fundum quovis die bis sunt inmittendæ, qualia sunt: aqua mercurialis, oleum Saturni, vel sequens destillatum.

℞. Ol. lateris. ℥iij.  
terebinth. ℥vj.  
caryophyllor. ℥i℥.

Destillentur simul per alembicum, & postmodum cum sequenti additione destillatio denno repetatur.

℞. mastich.  
myrrh.  
thur. aa. ℥ij.  
Mum. ℥iij. M.

Ablait etiam intermissis vicibus vino vel aqua falsa, ut nulla putredo remaneat.

**Helmonti** §. 14. *Helmontius* in Maxillæ Immobilitate curandâ præter alias intentiones etiam respicit ad Archeum delatatum, quæ excitat & corroborat lumentis quibusdam specificis, potissimum verò auxingia humana in quibuscumque tendinum debilitatibus valde proficiu ab eo observari.

**Luxatione** *Luxationis* restitutionem committit Chirurgis, de qua operatione nihil peculiare admonet, sed aliorum placitis lubenter album adjicit calculeum.

**Fistula.** In *Fistulâ* Maxillæ medicamenta edulcorantia commendat, & omnem corruptorem domantia, quæ in ulceribus vetustis aliis commode adhibentur, præsertim arsenicum cum vitro fixatum per colloquationem, in hisce aliisque ulceribus præstantissimum, sed non nisi externe adhibendum.

**Willisii** §. 16. Secundum *Willisium* Maxillæ Immobilitas curabitur correctione tum vitiis organorum, prout à superioribus jam fuit commemoratum, tum ipsius convulsionis, cujus respectu spiritus animales à quacumque copula heterogenea sunt liberandi, & influxus eorum in musculos maxillæ est promovendus per fucus ex herbis cephalicis in aquâ & vino ardente coctis, linimenta & emplastra convenientia.

**Luxationis** *Luxatio* tollitur restitutione partis elapsæ, ubi obstacula prius sunt removenda, & musculi cum tendinibus post restitutionem roborandi, quam administrationem superiores satis jam edocuerunt, quibus in hoc casu Autor hic omnino adfentit.

**Fistula.** *Fistula* Maxillæ curatur domando tum nimiam acrimoniam & cavatatem destruendo, tum expletione ejusdem per novam carnis aut cicatricis generationem; quorum prius impetratur pro præcipitato, qui vel per se, vel cum melle rosaceo, aut unguento aureo ipsi cavitati est inserendus; posterior vero unguento de tutia & lichargyrio, aliisque emplastris ulceribus profundioribus dicatis, maxime Saturninis.

**Sylvii** §. 17. Ex *Sylvii* sententiâ Maxillæ Immobilitas curabitur restituendo luxationem, aut musculorum paralytiam, vel vulnus sanando medicamentis morbis ejusmodi in genere amolendis accommodatis.

**Luxationis** *Luxatio* vero ipsa curatur reponendo os Maxillæ elapsum in locum & situm pristinum, quod manibus hic potissimum peragitur, dein-

de retinendo & confirmando illud ipsum, ne denuo elabatur, quiete videlicet, abstinentiâ ab oscitatione, pulvinis & fasciis, nec non emplastris subadstringentibus ex mastiche, colophoniâ, thure, resinâ & oleo rosaceo, vel emplastro communi ad fracturas etiam hoc in casu convenientissimo.

*Fistula* curatur cavitatem carne laudabili replendo, quod cum demum impetrabitur, quando tunica fuerit ablata, quo peracto ulcus abstergendum & consolidandum, cui scopo in universum satisfacit mel rosatum cum oleo aut spiritu salis vel ℥li, vel unguentum Egyptiacum in lixivio quodam dilolutum, quibus succedunt unguenta & emplastra ulceribus sanandis idonea.

§. 18. *Cartesiani* in Maxillæ Immobilitatis curatione commode peragenda ipsi advertunt causas, à quibus fuerit inducitur, has enim remor estudent, si possibile est, ne quid remaneat obstaculi, quo minus muscoli maxillarum opus sum valeant exercere, quapropter os luxatum restitunt, *Fracturam* iterum sanant reponendo ossa fracta, & postmodum eadem glutinando sequenti vel simili emplastro.

℞. Cera t℥ij.  
Resn. t℥j.  
terebinth. ℥vj.  
Ol. lin. ℥ij.  
Pulv. rad. consolid. maj. ℥viij.  
M. F. Emplastrum.

Coalitum in ipsa fetus formatione factum, ubi ossa maxillæ inferioris ossibus superioris planè sunt connata, incurabilem pronunciant, musculorum verò vitia corrigunt, siue ulcera sint, siue vulnera, siue convulsiones, siue paralytes, quibus in casibus remedia convenientia sunt seligenda, potissimum enim succinata, caustoreata & nervina in posterioribus sunt proficua nec non fucus ex fol. rosmar. salv. majoran. origan. flor. paralyt. anth. bacis lauri, mace, lumbricis, in vino coctis, quibus tepide adhibitis spiritus etiam limacum, lumbric. \* ci, essent. castor. & succini sunt illinenda, & interne mixtura ex aq. mirabili hirund. cum castor. Spir. C. C. Syr. flor. Paralyt. aliquoties cochleatum est exhibenda.

*Luxationem* curant Maxillam ad partem oppositam manibus propellendo, & ita in locum pristinum reponendo, si ab uno latere tantum contingerit; ex utraque verò parte inducitur, si sit, caput à ministro fortiter jubent teneri, & maxillam duobus pollicibus ori insertis huc illuc, deorsum nempe, retro & sursum trahunt, donec in situm & locum debitum protuberantiæ ejus restituantur, & ne succi crassiores interstitiis illapsi sint impedimento, tum diaphoretica interne, tum spirituosâ externe adhibent, ita enim illi expelluntur ad musculos non modo maxillarum, sed etiam buccarum, & tandem aperis poris sub specie vaporis eliminantur, & penitus discutuntur, quod fucus præstant ex herbis majoran. salv. chamædr. flor. sambuc. anth. Quis in spiritu vini maceratis tepide adhibiti, nec non spiritus vini canphorat. aliquoties illitus; restitutam maxillam quiete & emplastro nervino jubent corroborare.

FF 3 *Fistulam*



*Fistulam.* *Fistulam* Maxillæ ita curandam aggrediuntur, ut omnium primò tunicam ainovent vel callum medicamentis aliquantum erodentibus seu cauteriis, uti fero ignito, vel butyro Zii, aut Zio sublimato nielli intermixto, & cum turunda adhibito, vel fistulæ illico, nec omnino rejiciunt ab *Helmontio* jam commendatum arlenicum, si ritè sit præparatum, prout *Platerum* in *Praxeos Tm.* 2. cap. 17. id describit, cautè tamen adhibendum, & simul usurpatis internis depurantibus & diaphoreticis, imprimis sequenti mixturâ.

℞. Aq. Ulmar. ʒi.  
flor. sambuc. ʒv.

Essent. vincetox. ʒij.

Tinctur. ʒi ʒssat. ʒj.

Syr. borrag.

scabios. aa. ʒij.

M. Detur cochleatum ter in die.

Unguenta abstergentia quoque in usum ducta, imprimis ex succis api, centaur. min. chelidon. melle rosato & terebinthinâ paratum, vel unguento, *Ægyptiacoad* sunt spiritum vini camphoratum, & cum turunda fistulæ infinuant. Ulcere sic debite emundato siccantia subjungunt & sanantia, ut linimentum ex vitell. ovi ad duritiem cocto, melle rosâ, terebinth. olib. & myrrhâ, vel balsamum de Capai-bâ eidem immitunt, & emplastro stiptico ad perfectam deducunt consolidationem.

*Nostræ cu-  
ra in Ma-  
xilla im-  
mobilitate.*

§. 19. Nos in curatione morborum horum ita procedimus. Si *Immobilitas* Maxillæ ab ipsius luxatione fuerit orta, Maxilla elapsa prius manu Chirurgi restituenda est in suam juncturam; si verò producta fuerit à succorum corporis stagnatione colluvie, illa amovenda est variis resolventibus, vel dissolventibus, & ducuntibus medicamentis, in quem finem sacculi ex herbis aromaticis, flor. sambuc. camomill. sem. aneth. vel sal. tostum cum sacculis linteis sæpius tepide parti affectæ applicentur, vel varia volatilia oleosa applicentur, proinde conducet balsamus meus volatilis anodynus externus, mille experimentis comprobatus, sæpe illitus, ut & aquæ spirituosæ variæ, aqua nempe mirabilis, epilept. Lang. Hungarica, Anglica, vel potius Angelica ob vires egregias, quas possidet. Interna sudorifera aliaque balsamica interponenda, decocta lignorum, salia volatilia, liquor C.C. succinat. Si à Scorbüticis salinis tartareisque particulis in cavitate hæc collectis malum fuerit natum, prædictis medicamentis variâ antiscorbütica adjiçienda sunt, ut sic una fidelia plures dealbemus parietes, ipsis quoque topicis semper antiscorbütica admiscenda erunt. Ubi verò malum ab hysteriis aliisque convulsivis motibus ortum habet, egregie conferunt internè cinabarina, imprimis pulv. spasmod. castorina, volatilia, succinata, balsamus meus nervinus: externè item conducunt varia antispasmodica; omnibus Pal-mam præcipit balsamus supradictus volatilis anodynus, spiritus enim huius valde delectantur & ad motum incitantur. Cum verò aliis in locis de remediis huius latius egerimus, eo Lectorem remittimus, ne cramben bis eorundem proponamus, & repetendo toties nauseam pariamus.

Cura *Luxationis* maturanda est, ne cavitæ re-*Luxatione.* pleatur viscidis humoribus, tum enim difficultè restituitur. Restituitur verò eodem plantæ modo, uti à *Galenico* superius fuit indicatum manu Chirurgi fieri debet, pollice scil. maxillæ imposito, & manu reliqua in suam restituitur juncturam, à qua fuerat remota. Dein pars firmetur variis impositis blandè resolventibus, Emplastro scil. nervino, ad rupturam, imprimis stiptico nostro.

Cura *Fistulæ* Maxillæ est eadem ac aliarum *Fistula.* partium, porciones vulneratæ, quæ acrimoniam corrigunt, & fistulam ad consolidationem præparant. Sint in juniorum gratiam formulæ aliquot.

℞. Herb. Heder. terr.

Agrimon.

Plantag. aa. Miß.

sol. oliv. Mß.

Rad. liquorit. ʒij.

lign. Guajac. ʒß.

Conservantur minutiss. & contundantur, postea in vino albo coquantur, & fiat Colatura, de qua singulis diebus manè & vespèri capiantur ʒ. cochlearia plena.

Vel :

℞. Herb. Osmond. Mij.

Rad. Gentian. ʒß.

Summit. centaur. min. Mj.

Caricar. No. v.

Coq. in vino albo & fiat Potio,

quæ & valde efficax est in ossium corruptionum expulsiõe. Spir. vini Camph. fistulæ etiam indatur.

Interponenda sunt varia diaphoretica ex Zio & Zio dulci parata, diaphoreticis enim & diureticis internè ejusmodi fistulæ curari debent.

Topica verò quod attinet auxilia, procedendum est eodem modo, ac in cura aliarum partium fistularum, de quibus vide caput generale de *Fistulis*. Et cum Gangrænâ faciliè circa Maxillam & Genam in Variolis accedat, & non tantum *Fistulam*, sed *Isphacelum* & certissimam pedilequam mortem causari solet, prout multa habemus exempla, in huius casibus plurimi Chirurgi saccharum ʒi vino incoctum cum fructu loco applicant affecto. Huius ulcerosis partibus majori cum fructu applicari potest ad mentem *Sylvii* Spiritus Ois vel Oli melle rosaceo ad sufficientem aciditatem permixtus, & loco ulcerofo illitus, & ne variolæ nimis confluant, illinatur facies Spirit. vini myrrhisato ad aliquot dies repetitis vicibus, vel ∇ rosarum saccharo huiusmaritata pennâ illini potest facies, vel Spir. vini Camph. vel decoct. calcis vivæ.

Curam *Fistulæ* inferioris Maxillæ ab extradento productæ vide *Observ. Chir. Centur. 3. Hildani.*

¶ ( ) ¶

3

## CAP. XXV.

## De Morbis Uvulae &amp; Tonsillarum. De Uvula Laxatione, ejusdem &amp; Tonsillarum Inflammatione, Ulceribus &amp; Palati ossis Erosione.

## §. I.

**I**ntra Oris cavitatem & Fauces continentur & Uvula, ita dicta, quia acinum uvæ refert, aliàs & *Gurgulio* vocatur, seu *Gargareon*, à sono illo, qui in gargatinate auditur! item *Columella* quod parvulam veluti columnam, seu columellam constituit. Est autem caro fungosa ex palato in fauces instar glandis propendens, ac tunc inspirato infringendo, vocisque tono formando dicata, hinc non adeò ineptè audit *Vocis plectrum*, & *D. Braunius* hominem novit, qui ex amilla in morbo uvulæ nunquam dein potuit voces articulatas proferre, quamvis uvulam absq; incommodo in puella à nativitate abentem observavit *Cl. Hagend. Eph. Germ. Ann. 2. Obs. 239.* contra *Dr. Volgnadium* Columellam duplicem, imò potius divisam vidit in puella, qui labio leporino ita deformatus erat, ut simul palatum ad imas usque fauces fissum conspiceretur.

Circa Palatum glandulæ considerandæ veniunt *Tonsillæ*, nonnullis *Amygdalæ* dictæ, quarum unaquæque in homine 3j. pendit, hæ in faucibus inflammatis tumidæ aliquando videntur, & in magnam molem excrecentes, quas Chirurghi imperiti subinde minus cautè excindere solent, nonnunquam eadem ulcerosæ conspiciuntur, potissimum in iis, qui morbo Gallico afficiuntur.

*Uvula Laxatio*, quod Germanis audit *der Zappen ist gefallen* describitur vulgo, quod sit ejus inconcinna & molesta extensio, à serosis humoribus eam nimium humectantibus & fibras ejus distendentibus inducta.

*Uvula & Tonsillarum Inflammatio* deservit communiter, quod sit earum partium tumor cum rubore ac deglutiendi difficultate, à sanguinis in vasculis suis ac humorum in tubulis Tonsillarum ac Uvulæ stagnatione dependens.

*Ulcus verò Tonsillarum ac Palati Erosio* est continuus earum partium dissolutio ab humoribus serosis acidis acerbis, & interdum scorbuticis salis erodentibus, & fibrulas dirumpentibus inducta.

*§. 2. Pari affecta* horum affectuum sunt *Uvula & Tonsilla*. Uvula est illa caro fungosa intra fauces in palatum propendens, cujus membrana subiecta habet nervos plures, qui tacti deglutiitioni inferiunt, contra cum musculis.

*Tonsillæ* sunt glandulæ, quæ congeries sunt plurimorum acinorum, naturaliter punicosæ, cavernosæ, & glandularum manualium adinstar flaccidæ sunt, è quibus dum alimenta lingua premuntur, multum humoris elicitor, sed cum reliquis per palatum dispersis glandulis ejusdem conditionis non sunt, plurimum enim tum respectu molis tum respectu humoris, quam

copiosius reddunt, ab illis differunt. Hæ glandulæ sunt contiguae, quæ acinis constant majoribus & à palatinis reliquis facile possunt deglubi. Amplum insuper utraque hæ glandula ovalis figuræ habet sinum, intra cujus oram, sedulo majores, & in majoribus plures minores sinus & ostia triplo quadruplove reliquis palatinis majora conspiciuntur. Hujus glandulæ accuratissimam delineationem vide in *Celeb. Nuckii* figurâ sextâ *Tract. de Anatomia salivæ p. m. 69.*

*§. 3. Laxationis Uvulæ Signa* ex ægri & instantium relatione, vel ex ipsius Medici inspectione patent, nempe quando in longitudinem fuerit extensa, ut quasi super linguam jaceat & ægri cum difficultate deglutiunt, quam uvulæ relaxationem comitatur tumor partium circumjacentium, quia tunc catarrhus, non duntaxat uvulam occupat, sed & musculos aliasque partes obstruit oppletque, & ob glandulas obstructas & tumidas à catarrho suffocatio aliquando adest, cumque à lymphæ crassiori coagulata sit Uvulæ obstructio, eadem albet; si à sanguine, rubet, & febris eam sæpe comitatur.

*Inflammatio Uvulæ ac Tonsillarum* cognoscitur ex earum tumore, dolore rubore ac deglutiendi difficultate, quamvis ægri ad deglutiendum assidue impellantur.

*Ulcus verò Tonsillarum ac Palati Erosio* ipsi visui patet, ac eadem adstant signa, ut in aliarum partium ulceribus & erosionibus.

*§. 4. Causæ* quod attinet, Veteres *Galenici* *Uvulæ Laxationem* oriri putant ab influxu humoris sive pituitosi sive biliosi, live ipsius sanguinis ex vicinis partibus, maxime cerebro debilitato & destillationibus obnoxio oriundo, atque simul à peculiari illa dispositione & propria imbecillitate, qua Uvula apta existat ad suscipienda excrementa, & humores prava paulatim contrahendos; quo referunt causas remotiores, aërem nempe humidiores & frigidum, vel calidum excedentem, & alimenta vel medicamenta iisdem prædita qualitatibus, frequentius & copiosius usurpata, ut intemperiem quandam humoribus facili inferant.

*Uvulæ & Tonsillarum Inflammationem* oriri docent ab humoribus acerbis, potissimum verò sanguine bilioso in partes hæc influentibus, & non modò tumorem, sed ruborem etiam cum dolore in iisdem producentibus, tum quoque externè ab aëre calido acri, cibis valde atomatis & asperis, vini meraci copiosiore ingurgitatione, in faucibus verò interdum ab obstructione mensorum, sanguine ita ad loca illa regurgitante, incalcescente & acriore reddito.

*Uvula & Tonsillarum Ulcera & Palati Erosio* viciniorum & nem excitari volunt ab humoribus salis, acerbis, putridis & erodentibus, vel à vaporibus iisdem præditiis

prædictis qualitatibus & cum aëre per inspirationem absorptis, tum cibis aut medicamentis erodentibus, exulcerantibus aut vehementer exasperantibus, à quibus omnibus ejusmodi in partibus hiſce contingere ſoleant continui ſolutiones.

*Paraceſi  
opinio de  
cauſis ho-  
rum mor-  
borum.*

§. 5. *Paraceſis* hœſce Uvulæ, Tonſillarum & Palati morbos ab arſenico reſoluto & catarrho ad partes hæſce fluente deducit, liquorem enim quemvis ſciſſum & à vera origine deſcendentem in eunctorium externum tranſire aſſerit, unde primo *Tumor* in Uvula & Tonſillis producat, dein *Inflammatio*, *Exulceratio* & oſſis Baſilialis ad Palatum *Eroſio*, deſiciente magis balſamo naturæ, quod frequentius contingat in lue Gallica, cum quâ catarrhus iſte complicatur, & eroſio illa Palati tantum capit incrementum ut ad nares ulque pertingens cauſa ſit, ut cibus potuſque per nares quandoque redantur.

*Helmontii  
opinio de  
cauſis ho-  
rum mor-  
borum.*

§. 6. *Helmontio* etiam in morborum horum Uvulæ & Palati cauſis denominandis ad ſpinam reſpicere placet, quæ ſi Uvulæ ſit infixæ, laticeſcem proritari inquit, hoc verò copioſius influente, *Laxationem* tum Uvulæ, tum Tonſillarum. ſi temporis vero tractu acrimoniam ſimul acquirit latex, iſtam ſequi Uvulæ & Tonſillarum *Exulcerationem*, & oſſis Palati *Eroſionem*, maxime ſi latex iſte ex primis culinis egrediens in via ſalium diſſolutorum copulam admittat, à quibus ad hujusmodi exulcerationes proutè diſponitur.

*Williſii opi-  
nio de cau-  
ſis Uvulæ  
Laxationis.*

§. 7. *Williſius* Uvulæ *Laxationem* oriri vult à ſanguine multis recrementis ſerolis & viſcidis onuſto in partem hanc influente, & ſubſtantiam ejus ſpongioſam nimium diſtendente, unde uvula aucta & quali prolapſa in faucibus perſentitur.

*Uvulæ &  
Tonſillarum  
Inflammationis.*

Uvulæ & Tonſillarum *Inflammationem* originem ſumere aſſiruat à ſanguine in partibus hiſce ob lentore ſeu viſciditatem obſtructo, aut extravato, & ob turgelcentiam quandam copioſius ageſto, unde rubor, & ob tensionem fibrarum earumque continui ſolutionem, dolor ſuſcitur, cui cauſæ proximæ ſupetias ſerant remotiores, ut aëris conſtitutio intemperata, adeoque caloris aut frigoris exceſſus, pororum in partibus hiſce conſtipatio ciborum calidorum & potuum ardentium uſus quæ cuncta ſanguini intemperiem ejusmodi ſoleant inferre.

*Exulcerationis pa-  
tium harum  
& Palati  
Eroſionis.*

*Exulcerationem* partium harum & Palati *Eroſionem* à ſaliva aut latice actiori corrolivo deducit, partium harum continui ſolutionem penitus diſſolvente, non modo in tenuioribus Uvulæ & Tonſillarum fibris, ſed in iſiſetiam Palati partibus durioribus & ſubſtantia ejus oſſea, quæ ab acrimonia hæc liquorum eroditur.

*Sylvii opi-  
nio de cau-  
ſis Uvulæ  
Laxationis.*

§. 8. *Sylvio* placet Uvulæ *Laxationem* oriri à pituita aut ſero per arteriolas ad partem hanc delatis, prævia quidam in arterioliſ aut vaſis lymphaticis obſtructione. unde ſubſtantia hæc laxa citra majorem calorem, rubedinem aut dolorem, magis ſolummodo dilatetur, ita ut tumore quodam abſque inflammatione laborare videatur.

*Uvulæ &  
Tonſillarum  
Inflammationis.*

Iſtam verò Uvulæ & Tonſillarum *Inflammationem* contingere putat à ſanguine in ſpongioſam & glanduloſam eorum ſubſtantiam ex vaſis obſtructis, mox & ruptis influente; & ni brevi, præveniatur, in apoplethæ abeunte, &

tandem pus effundente. Obſtructionem iſtam fieri exiſtimat, quoties toto corpore, aut capite ſaltem cum partibus maximè vicinis ab æſtu Solis, foci, balnei, vel potu generoſo, vel aromatiſco, corporis motu vehementi, aut febris ardente &c. incalcſcente ſolvitur ſolito magis pituita & quaque verſum tranſfertur, etiam in exigua faucium, Uvulæ & Tonſillarum vaſa; per arterias nempe & venas cum ſanguine, per vaſa verò lymphatica vel cum lymphæ propria, vel liquore proprio iſdem præparato, & à ſuper veniente conſeſſum frigore nunc aeris ore patulo inſpirari, nunc potius imprudenter magnâ ingurgitati copiâ, denuò coagulat.

Uvulæ & Tonſillarum *Exulcerationem* & iſſius Palati *Eroſionem* ab acido valde acri produci docet, ſive hoc ex lymphæ acceſſu, ſive ex obſtructione diuturniore acceſſu, ſive ex abſceſſu & pure poſt inflammationem ſubſequentem, *Eroſionis*, & partes non modò molles, ſed duriores quoque erodente.

§. 9. *Carſeſiani* lymphæ copioſioris in Uvula Obſtructionem cauſam pronunciant ejusdem *Laxationis*, quatenus ſpongioſa iſſius ſubſtantia ab eâ nimium diſtendatur, hæcque ita diſtenſa & relaxata prolapſum quandam mentiantur, dum fauces iſſas attingat.

Ab eadem etiam lymphâ & ſanguine extravato in Uvulam & Tonſillas effuſis, in iſdem ſtagnantibus & corruptis *Inflammationem* excitari ſtatuunt, dum pori ita anguſtantur, ut ſola primi elementi materia tranſgreſſum per eosdem reperiat, quæ ignea ſua diſpoſitione ſtatim calorem, ruborem & dolorem producat, in quibus præter tumorem iſſa inflammatione conſiſtere ab omnibus creditur.

*Ulcera* Tonſillarum & Palati *Eroſionem* pro-  
nateſci dicitur à particulis valde acutis in lymphâ aut ſanguine exiſtentibus, iſſasque fibras diſſolv-  
ventibus, non modò partium glanduloſarum, ſed etiam oſſearum, quod in Scorbuto ſimul & Gonorrhæa frequentius contingere cum *Paraceſi* unanimis ſententia.

§. 10. *Noſtra ſententia* eſt, Uvulam laxari ut plurimum ab humoribus ſerolis & viſcidis catarrhis circa hanc fungoſam carnem impe-  
ventibus, ſibi ſapienſibus & ſtagnantibus, ſicque tioneſ.  
fibras carneas dilatantibus & parte hanc exten-  
dentibus, unde ſuffocatio aliquando oritur, quia glandulæ ſunt obſtructæ & tumide, nec non catarrhus in faucibus hæret, eaſque obſtruit, & deglutitionis difficultas in hoc affectu eſt, quia muſculi œſophagi & laryngis ſunt affecti, & ita incipientem Anginam producut, & febris ſæpe adeſt, ob turbatam ſanguinis mixtionem.

*Inflammatio* harum partium ut plurimum ori-  
tur, quando ſanguis in vaſculis ſuis ac humores reliqui in tubulis tonſillarum & Uvulæ ſta-  
nitrolum per inspirationem admiſſum, qui humores circa has partes coæſervantur ac accellunt, unde exoriuntur tumor, dolor, rubor ac deglu-  
tendi difficultas, ſæpe enim in aëris, imprimis in infantibus, obſervavimus frequentem ad deglutendum impulſum, cum tamen nihil deglutiverint, hinc exiſtimo, membranam uvulæ ſub-  
jectam habere nervuloſos, qui ab uvulâ inflammata vel relaxata ac incumbente tacti cauſa ſunt, quod ſuccus nervus majori copiâ deſer-  
tur

tur in musculos deglutitioni diratos. Ab ob-  
structione Oesophagi & deglutitio in totum abo-  
letur, quale exemplum habemus *Ephem. Germ.*  
*Ann. 4. & 5. Obs. 6.*

Ulcera  
& Erys-  
ipelas.

Ulcera & Erysipelas oriuntur ut plurimum à  
particulis acris liquorum, fibrulas dilacerantibus  
& super fauces ruentibus, qui succi salini &  
corrosivitate sæpe sunt acrimonia, ut Uvulam  
cum Tonsillis corrodant ac sæpe in totum aufe-  
rant, quorum exempla plura existant in monu-  
mentis Medicorum, & nostrâ experientia con-  
stat; hinc illi ut plurimum rauca voce & submis-  
sa, non clara loqui possunt, ut rectè dicat *Ros-  
lanus lib. 4. Embrid. Anat. cap. 11.* quibus deest  
gargareon, (uvula) vox rauca evadit, quod &  
confirmat tanquam testis omni exceptione ma-  
jor Cl. Dn. *Sc. rorckius Eph. Germ. Ann. 6. & 7.*  
*Obs. 128.* Sic & Oesophagus quandoque corro-  
ditur, & homines cum inpossibilitate degluti-  
endi contabescere & tandem mori coguntur,  
cui exemplum annotavit Cl. *Bike-1, Epis. Germ.*  
*Ann. 3. & 4. Obs. 67.* Deglutitio aboleri & de-  
pravari potest in apoplecticis, quando scilicet mu-  
sculi deglutitioni inservientes resoluti fuerint,  
qui ne guttati quidem bibere possunt sine metu  
suffocationis præsentissimæ.

Pneumonia  
horum  
morbo-  
rum.

§. 11. *Pneumonia* omnium optimè & fidelissimè  
fidelis eorum pronus condus *Hippocrates* hinc  
inde tradidit, unde commodè peti possunt.  
Insuper regulantur iuxta symptomatum atrocio-  
rum & idronem maxime variantem. Quod Uvu-  
læ *Laxationem* attinet, per se minùs periculo-  
sum malum est, nisi in maximâ obstructione &  
tumore Tonsillarum, ubi suffocatio facile acci-  
dere potest. *Inflammationem* verò & *Ulcera*  
omni vacare periculo. absolute pronuntiandum  
non est, cum sæpe vitæ filium præcindant, quo-  
tidiana suffragante experientia. Modus even-  
tûs Medico omnia symptomata acque circum-  
stantias probe consideranti non potest esse igno-  
tus, constat enim ex hæcenus dictis, omnia sym-  
ptomata à dolore seu face accensa, vel spina inhi-  
la dependere. Hinc falsæ prædicenda, si dol-  
or, rubor ac tumor aliaque symptomata spas-  
modica remittant, sui Uvula ex Inflammatione  
nigrescit, & vel nimium albet & stupet sensu,  
facile putrescit & sphacelatur, ceu nuper id in  
filia 12. annorum observavimus, & id abscindi  
curavimus, ne partes vicinæ viciarentur. *Ulcera*  
verò Tonsillarum aliquid in recessu habent, quia  
difficilima sunt curata, confer *Obs. 37. Tulpii.*  
Si rubescit Uva cum aliqua nigredine, indicat  
aliquid cancerosi adesse. *Inflammatio* ac *Tumor*  
Tonsillarum, ut & musculorum Pharyngis aut  
Laryngis suffocationem inferre possunt.

Dietæ.

§. 12. *Cura Dietetica* & in his affectibus ad-  
modum est necessaria, cum nisi vires suppetant,  
Pharmacia & Chirurgia sine exitu ausis. Sit  
igitur *Aër* temperatus, ad calidum vergens, vi-  
tetur angue pejus pluviosus ac frigidus, acidus  
scilicet à quo ut plurimum oritur Inflammatio Uvu-  
læ & Tonsillarum, item Laxatio, quia ab acido  
aëris stagnare coguntur humores, sic & frigi-  
dum attestante *Coo. 5. Aph. 20.* Ulceribus mor-  
dax est doloremque insupputabilem facit. *Vi-  
tus* in statu inflammationis sit tenuissimus, in  
statu autem tumoris plenior, confer *Aph. 7.*  
*8. 9. & 10. S. 1.* Pro cibo exhibentur juscula,  
cremor hórdei aliaque hujus fariæ: caveat æger  
à crudis, & crassis, acidis, viscidis, acris, fa-

litis, infumatis, &c. *Potus* sit decoctum hordei  
cum passulis, veronica, rad. liquirit. herb. he-  
der. terrestr. Cerevisia sit alluetis tenuis, vite-  
tur vinum tanquam noxium in Uvæ inflammato-  
ne. *Somnus* sit solito largior. *Excrementa*  
alvi quotidie respondeant, quod si obstructio  
sentiat aut alvus segnior sit, primis laxativis  
vel clystere leniente injecto sui officii admonetur.  
Cumque sanguis cæterique humores  
facile stagent, ubi animi motibus concitantur,  
eorum proinde excellis qualiscunque modere-  
tur, ira præsertim cane pejus & angue fugiatur,  
cæteraque pathemata, ne ægrum in transvet-  
sum rapiant, rationis freno cohibeantur.

§. 13. *Curatio Pharmaceutico-Chirurgica* nunc *Cura Phar-*  
restit explananda, quam *Genici* in Uvulæ *La-*  
xatione seu Procidencia ita instituit, ut prohi-  
bito morbi incremento ad caput ipsam respi-  
ciant, à quo humorem pituitosum descendere, *lenies in*  
& in Uvulam prolabi suspicantur, medicamen-  
tis nempe in catarrho alias adhibendis, potissi-  
mum evacuantibus & escificantibus humori pec-  
canti dicatis, tum ad ipsam uvulam, ut partem  
suscipientem se convertunt, cui remediis esci-  
cantibus & adstringentibus prospiciunt, liquore  
videlicet ex origano & hyssopo cum posca con-  
tulis, & adjecto caricarum succo exprello & per-  
colato, quo Uvam frequentius jubent colluen-  
dam, nec non alio, qui sit ex foliis lauri & apii  
contritis, & in vino vel decocto lentium distil-  
latis. Nonnulli eandem, sed minùs tuto, ad-  
spargunt pulvere piperis longi tenuissimo bis vel  
ter repetito, ut ita pituita copiosior expuatur,  
Uva contrahatur, & adjustata redeat magnitudi-  
nem, quod alii similiter tentant pulvere gal-  
lar. alum. scissil. & Sal. ammoni. cochleario ei-  
dem adhibito; aut sequenti *Aselepiadis* reme-  
dio.

℞. Myrrh. ʒi.

Gallar. immatur.

Alum. scissil. aa. ʒij.

Pip. alb. ʒi.

M. terantur subtilissime, & Uvulæ proci-  
denti cochleario adhibeantur.

Lapis Ageratus ab iis valde etiam finit existima-  
tus, quem vel solum derauam adhibuerunt, vel  
aliis convenienter admixtum, quibusque se-  
quens constat formula.

℞. Lap. Agerati,

Flor. lap. Asii,

Terr. Sam. aa. ʒb.

Alum. scissil.

Croc. torrefact.

Gallar. immatur. aa. ʒij.

Terantur omnia in Pulverem tenuissimum.

Non minori tamen efficaciam prædictus esse vide-  
tur pulvis sequens eodem modo, quo priores,  
Uvulæ relaxatæ adhibendus.

℞. Rosar. rub.

Balaust.

Myrrhor. aa. ʒiv.

Cort. thur.

Gallar. immatur. aa. ʒij.

Piper.

Cinamom. aa. ʒj.

M. F. Pulvis.

Ne verò acidis istis in faucibus & palato asper-  
tas quadam susciatur, post eorum usum par-  
tes

G g

tes



Inflam-  
mations.

*Exulseta*  
*signif.*

*Irid. sicc.*  
*Acac.*  
*Sang. dracon.*  
*Bol. Armen. aa. ʒj.*  
*Rhois, ʒij.*  
*Adorcus ʒj.*

Paracelsi  
cum not-  
tione bo-  
rum.

*Pyreth.* ʒj.  
*Succ. Hypericon.* ʒij.  
*perficar.* ʒiij.  
*Oxymell. scyllit.* ad pondus omnium.  
*M.*

℞. Liqueor. Mith. ℥i.  
Succ. Persicar. ℥ij.  
Acet. commm. ℥iij.  
F. Mixtura.

*Helmonstii*  
cura I. Vis-  
la Laxa-  
tionis.

In *Ulcerebus* partium harum & Palati *Erosione* *Ulcerrum*.  
 terram vitrioli edulcoratam singulariter com-  
 mendat, quæ vel gargarismis, vel linimen-  
 tis addi potest & ita ulceribus adhiberi; vel per  
 se pulveris formâ inspergi.

# CAP. XXV. DE MORBIS UVULÆ & TONSILLAR. 235

Uvula &  
curam in  
Uvula La-  
xatione.

§. 16. *P. Villisus* in Uvulæ Laxatione curandâ, non parvam catarrhi rationem habendam esse suadet, qui pilulis succinatis immittendus, aliisque decoctis & destillatis ex lignis & herbis cep. halicis. delinice. Uvula ut nimiam assumentem humiditatem reddat & pristinum requirat magnitudinem, eidem subadstringentia & exsiccantia quædam pulveris aut gargarisum formâ admovet, qualia sunt pulvis ex myroholanis citrinis ustis, gall. immatur. C. C. ust. & alum. saccharin. gargarismus ex decoct. saly. pyrol. rad. bistort. flor. balauit. & Nuc. cupress. in vino & aquâ factio. Capiti etiam emplastrum imponit catarrhum exsiccans, quale est de betonica & mastiche.

Uvula &  
Tonsilla-  
rum In-  
flammati-  
one.

In Uvulæ & Tonsillarum Inflammatione ad sanguini conciliandum fluorem, & à lentore eundem liberandum, venæsectionem admittit, & interdum, ubi simul alii peccant humores, laxationem & purgationem, quibus præmissis ipsi parvis debita adhibet remedia, qualia sunt gargarismata ex decocto rosar. liquirit. & passul. addito nitro & rob. dianuc. vel aq. plantag. & veron. cum ꝯco, sicch. ꝯi. & oxymell. simpl. si verò major timeatur continui solutio, herbas vulnerarias, ut fœnicul. pyrol. plantag. &c. in lacte coquit, & pro collutione aut gargarisatione exhibet.

Uvula rubra.

In Ulcibus partium harum & Erosione Palati præter antedictâ infusionem lapidis medicamentosi, aut vitrioli camphorati in usum ducit, tanquam remedia morbis hisce sumopere proficua.

§. 17. *Sylvius* tam in Uvulæ Laxatione, quam eisdem & Tonsillarum Inflammatione sudorifera laudat ex antimonio diaphoretico, & salia volatilia intus assumta, deinde collutiones ex decocto fragor. & fol. salicis, cum paucis ꝯci crudi in eodem dissoluti, vel Spiritu ejusdem guttatum addito, quibus obstructio quævis faciliè reseratur, cuius rei gratiâ & foris varia adhibet unguenta & cataplasmata dissolventia.

Sylvius mo-  
di curan-  
di Uvula  
Laxatio-  
nem & In-  
flammati-

Tonsilla-  
rum Ule-  
ra & Pa-  
lati Erosio-  
nem.

Ad Ulcera Tonsillarum & Palati Erosionem gargarismata itidem commendat ex decocto aut emulsionem hordei cum melle rosato & paucis spiritibus Oli, ne acrimoniâ suâ partes hæc aliasque circumjacentes plus lædat, sed acrimoniâ in ulceribus existentem corrigit, ulceraque emundet, delinect & exsiccet: ad acidi verò in Erosione Palati acrioris existentis majorem concentrationem pulverem sangu. dracon. cretæ & simil. syrupo aut melli rosato admista laudat linimenti formâ adnota.

Caricifor-  
morum  
methodu  
curandi  
Uvula La-  
xationem.

§. 18. *Caricifor-* in Uvulæ Laxatione sudorifera magno habent in pretio, & gargarismata non modò subadstringentia, sed quæ particulis etiam volatilibus stagnationi occurrunt, qualia sunt decoctum salvia, alchimilla, flor. acac. malv. arbor. rad. tormentill. & in quo ꝯcum fuit dissolutum, vel spiritus ejus ad ꝯi. & ultra instillatus, quem singulariter prædicant. Quando quoque simul adest inflammatio, in decocto hordei dissolvunt nitrum vel sal prunellæ, vel aq. fol. querc. & fragar. addunt saccharum ꝯi & mixturâ hæc pro gargarisatione utuntur. Quin pulverem nuc. cupressi cochleari adspargunt, & si hujusmodi remedia aliquoties adhibita non juverint, aquâ sublimatâ eandem quandoque tangunt, vel putrefactam abscondunt, ne vicinæ partes simul corumpantur. Tabaci fumum non temunt, si lymphâ tenacior existat.

Similem curam etiam adhibent Tonsillis inflammatis, in quibus etiam pro faciliori pororum aperture sequentem exhibent mixturam gargarizando, aut potius in ore calidiuscule detinendo usurpandam, præsertim si morbus nondum egerit radices.

ꝯ. Aq. Malv. ꝯij.  
flor. sambuc. ꝯi.  
Spir. vin. camphorati. ꝯi.  
Mell. Q. s. ꝯj.  
M.

In statu verò decoctum altheæ cum sicibus in lacte paratum egregium promittunt præstaturum esse juvenem.

In Ulcibus Tonsillarum mundificantia usurant, hinc abstergentia & consolidantia, quæ sunt præter decoctum altheæ in principio adhibuit, decoctum de Tormentillâ, de Veron. & fol. querc. cum nitro rosat. & melle, in fordidioribus verò utruginem æris cum melle rosato, vel aquam viridem *Harimanni*, in usum ducunt, quam in Erosione quoque Palati maxime laudant, in qua & decoctum ligni Guajaci, aliaque Lini Veneræ convenientia substituit, si malum morbo huic sit conjunctum. in profundiore verò carie linimentis ex melle rosato aliisque convenientibus paratis, etiam salis Saturni & olei ꝯi paululum admiscere consueunt.

§. 19. Nos denique existimamus, in Laxatione Uvulæ eò respiciendum esse, ut humores viscidilic stagnantes ac coagulati resolvantur, in quem finem conducunt varia gargarismata & topica quædam convenientia. Sic Celeb. *Morgagni* Uvulam relaxatam in semetipso sæpius restituit, dum apice digiti solo spiritu ꝯci madefacto eandem blande tangebatur. Vel detur sequens vel simile decoctum pro gargarismate.

ꝯ. Herb. Uvular.  
prunell.  
plantag.  
beton. aa. P. ij.  
Gallar. ꝯj.  
flor. rosar.  
bulauit. aa. P. j.  
Decoq. in Aq. Colat. add.  
Mell. rosar.  
Rob. nuc. aa. ꝯj.  
M.

Et quia interdum principium inflammationis adest, leniter adstringentia admitti possunt, v.g. ex rosis rubris, balauit. &c. Sic

ꝯ. Fol. plantag.  
liquitr.  
peruvulac. aa. M. ij.  
bord. mund. P. j.  
flor. ref. rub.  
sambuc. aa. M.ß.  
Cort. mal. granat. ꝯj.  
Sem. cydon.  
malv. aa. ꝯi.  
Cog. in Aq. Colat. add.  
Spir. prunell. ꝯi.  
Rob. dianuc.  
diamor.  
Mell. rosar. aa. ꝯi.  
M.

Vel in decocto hord. dissolv. uitr. pp. Vertici alii applicant ovum recens adductum coctum

Gg 2 per

Uvula &  
Tonsilla-  
rum In-  
flammati-  
onem.

Eadem vi-  
ta in Uv-  
la Laxa-  
tione.

per medium diffectum, pulvere thuris confpersum; alii emplastrum suspenforium ex fermento panis cum thure, succino, & mastiche superiori capitis parti imponunt. Uvula tangatur sapis spiritu vini, vel aqua Regin. Hungar. & mirabil. sed cavendum sedulo, ne fiat incommodum uvæ ab instrumento, quare non male illinuntur ejusmodi instrumenta, qualia describit *Barbolinus Observ. Anat.* hodie utimur communi spatula. Si enim vis infcratur Uvulæ, facile Gangræna oritur, Uvula verò sphacelata abscindenda est, ne partes vicinæ inficiantur. *Aquapendens* forcipe exiguo abscindit, & peractâ abscissione ferrum calens non candens applicat: confert *Barbolin. Act. Hæst. Vol. 2. Obs. 13.* aliis non est pars hæc abscindenda. In causa pituitosa non tantus oritur metus Gangrænæ ab adstringentibus, quam si est à causa salina, ubi ergo adstringendum, convenit decoctum granator. vel aliis additur Tinctura lap. hæmatis. Cura relaxatæ uvulæ mira est, quam describit *Hannemannus Decur. 2. Ephem. Germ. Obs. 56.* qui una manum ægri manum apprehendit, altera fricat brachium duos digitos supra pollicem altum, illic etiam tempore Prociditæ Uvulæ exiguos nodulos sub cute percipere & tangere licet; & plures hoc modo à malo isto liberatos novit.

*Uvula & Tonsillarii Inflammatione.*

In Inflammatione Uvulæ ac Tonsillarum totius rei cardo in eo vertitur, ut coagulati humores dissolvantur, ac obstructions recludantur, Ipecacutoria applicentur, dein ad sudorifera confugiendum. In Inflammatione Gurgulionis convenit præ alias Quin fixum, saccharum Hi, V prunell. &c. Ex. gr.

℞. V prunell. ʒiv.

Orixi ʒj.

Syrup. Semperviv. ʒj.

M. pro Gargarismo.

Topica enim lapidis sola sufficiunt, imprimis Gargarisinata, quæ acidum temperant, coagulatos humores dissolvunt, ac obstructions reserant. Sequens experientia multâ comprobata est.

℞. V flor. sambuc. ʒiv.

Asthmat. sine sacch. ʒj.

Spir. vini ʒij.

℞ci gr. xx

flor. sambuc. ʒb.

M. D. ad vitrum.

In faucium affectibus Sal æ cum vires habet singulares in liquoribus solutum, & instar gargarismatis usurpatum. In faucium æstu succus sedi optimus est, imprimis cum Sale æ coillitus, vel ut gargarismus adhibitus. Sic & prunella propter vin vulnerariam conducet sequenti modo.

℞. Herb. prunell. Mj.

Summ. ejus. Mij.

Alb. grac. ʒb.

Coq. in aq. & vin. & add.

Spiritus vin. ʒj.

Mell. ros. ʒij.

M. pro gargarismate.

Vel phlegma æci, vel nitrum addi potest, cum ingenti ægroti levamine. Vel:

℞. Herb. succif.

scabios.

beron. aa. Mj

Alb. grac. ʒb.

Mell. ros. ʒij

*Cog. in V q. f.* & hoc crebrius utere per gargarismo. Sic & in Tumore Uvulæ ac Tonsillarum vinca pervinca decoquatur in vino, quo crebrò os eluatur, quod egregiè juvat. Sal æ cum in Inflammationibus Tonsillarum est egregium, quia solvit & dissipat, idemque efficit in prunellâ febrili cum succo semperviv. maj. vel succo s. fluv. adhibitu instat gargarismatis. Nidus hirundinum usitatissimè est remedium contra Anginam & Inflammationem Tonsillarum, verum nidus nil valet, sed potius excrenenta nitrosa, quæ in eo reperiuntur, vi enim hæc nitrosa ardorem compescit & maturationem promovet. Fiat ergo cataplasma cum V simpl. hunc in modum.

℞. Nid. hirund. No. j.

flor. sambuc. Mij.

Capar. integr. (quæ tamen in delicatioribus omitantur) vel Rapar. No. ij.

Conscind. contund. & coq. in V simpl. decoctum ad molliem subigatur cum ol. camomill. F. l. a. Cataplasma, quod regioni Tonsillarum applicetur.

Tumorem faucium præservat frequens lingua scalptio, testante *Hornio in Area Mosu.*

Inflammationi harum Tonsillarum optimè quoque conducit ol. amygd. dulc. externè illitum, item emplastrum de meliloto. & gargarismus ex magnate pini cum aqua fontan. paratus & debite adhibitus. Abicellus si fuerit in partibus hisce collectus, lancettâ venit aperiendus, ut materia purulenta exitum reperiat, eâ enim ejectâ tumor & dolor facile cessabit, ulcus verò antedictis mundandum est & sanandum.

In Ulceribus enim Uvulæ & Tonsillarum, nec *Plena & Palati Erosione & Erosione & Erosione* non ipsius Palati Erosionibus acrimonia corrosiva tum lymphæ, tum aliorum liquorû est corrigenda & mitiganda, hac enim correctâ ulcera ista facilius sanantur, eâ de causâ præ aliis hic in usu ducenda veniunt sudorifera, ut decoctum ligni Guajaci, cassiæ, rad. sarlapparill. scabios. personæ. herba veron. card. benedict. scord. &c. Tinctur. ʒij. Gum diaphoret. & similia Præter interna vulneraria ad topica etiam transfundendum: ubi ergo adstrictione opus est, convenit Rob diamorum, in exulcerationibus hisce optimum remedium. Sic & succus ligustri ejusque aqua destillata, vel decoctum in exulceratione faucium sub gargarismatum formâ usurpata, egregia sunt remedia, vel succus ejus cum melle illitus euphoriston est remedium. Pro exulceratione detergenda sequens conducet.

℞. Unguent. Egypti. ʒij.

Mell. ros.

Diamor. aa. ʒb.

sacch. ʒi ʒb.

M.

Dein os eluatur sequenti.

℞. V Ψ ʒiiij.

succ. solan.

chelidon. aa. ʒj.

ʒii sublimat. ʒj.

M.

Scorbuticus semen mespili in gargarismis ad faucium exulcerationem & inflammationem cum commodo usurpatur, item semen cucumerum, quia in hoc multum alcali latet.

Ulcera tum Uvulæ tum Tonsillarum curantur uti lues Venerea, salivatione scil. instituta, vel aliis

aliis sudoriferis; confer caput generale de ulceribus, item *Zodiac. Med. Gall. Ann. 4. & 5.* Si ulcus externam simul occupat maxillam, injiciatur sequens decoctum raro fallens & mille experimentis comprobatum.

*Hy. Herb. Card. bened.*

*Scord.*

*Veronic. 22. Miß.*

*rad. aristol. rotund. 3ß.*

*Ocul. 3j.*

*Myrrh.*

*Alois.*

*Mastich. 22. 3iß.*

*Coq. f. a. in vino, ac Colatura pro injectione ad usum servetur.*


In ulcere cancroso ora occupante proficius est pulvis ex ranis aqualibus, gammariis & C. C. ulso compositus.

Ulcera Palati os occupantia insanabilia sunt, quia os Palati est maxime porosum, & cum sit pars declivis, & madida. Partes *cariose* debent separari oleo cinamomi mixto cum oleo sublimato, quo remedio in segregandis celeriter ossibus non vidit nec legit præstantius Celeb. *Tulpius Obs. 37.* Laminam argenteam cum annexa spongia hisce partibus imponendam suadet modo laudatus *Tulpius*.

*Prolabitur* quoque nunquam Palatum, quod fit ab humore seroso illic concluso & ab acido stagnante. Vidit hunc tumorem idem *Tulpius* in Palato adeo celeri ac pernici cursu aliquando exortum, ut vix licuerit cogitare de gargarismate, nedum de aliis remediis, præterquam de sola scalpelli incisione, quæ dextrè & festinanter instituta vidit non inodo effluxisse inde multum aquæ, sed detumescere palato protinus ad se rediisse hominem morti proximum. Si ex quacunque causa contingit, ex. gr. gangræna uvulæ quandam partem corrumpi, aut illam absque inflammatione ita elongari, ut ad fauces propendens has assiduas irritationibus adtussim stimulet, vel suffocationem minetur, exstirpatione opus est illius, quantum vel magnitudinem naturalem excedit, vel ita corruptum, ceu in lue venerea accidere solet, ut nulla arte aliâ curari queat. Ad hanc operationem ad-

ministrandam uti solent Chirurgi vel filo, vel instrumentis secantibus vel adurantibus. Filum applicatum in subiectis delicatis, & ad hæmorrhagiam vitandam applicando hoc vel median-te instrumento, quod *Hildanus Cent. 2. Obs. 21.* delineat, vel quod *Guillemeau. pag. 303.* commendat. Sic quoque uvula constringi & nodo firmari valet, ut ejusdem extrema extra os propendeant, & uvula secundo vel tertio decidat die. Instrumenta secantia vel forficula communis, vel staphylotomum magis appropriatum. Illa qui utuntur columellam vellela comprehendunt, eam aliquando protrahunt, & sub hac quantum convenit, resecant: quamvis Aquapendens vellelæ usum negligat, & deprellâ saltē per speculum oris lingua, uvulam præcidat. Singulari verò & huic negotio aptissimum est instrumentum à Bartholino C. 1. *Obs. 88.* delineatum. Abscilla portione ad hæmorrhagiam impediendam nonnunquam sufficit collutio vel pulvis adstringens instrumento applicatus: Vel saltem liquore styptico nostro applicato. Ferrum ignitum rejicimus tanquam crudele remedium, licet Aquapendens minus ignito sed probe tantum calefacto utatur ne caruncula hæc exilior sub igniti ferri contactu magis quam par est absumatur. Cauterium pro exstirpanda uvula à pluribus adhibetur: pro actuali utuntur instrumentis ex Hildano & Scultero modo allegatis. Potentiali verò inservit can-nula eadem ab Hildano delineata à cujus foramine extremitas uvulæ excepta caustico medicamine immissa aduri solet, cujus ne aliquid super linguam decidat, speculo oris hic prius tegi & muniri debet sufficit Ol. @ li aut simile, quod mediante stylo bombace instructo applicatur: aut cochleari Tantillum caustici seu fluidæ seu solidioris formæ imponatur, hocque uvula contrectetur. Si ad primum statim corrosivi contactum columellæ extremum nigrum evadat, sufficiens hoc cauterisatum est: sin verò colorem haut mutet, repetatur caustici applicatio, quo factò vel 7a communi vel plantaginis, vel vino rubro eluatur.

## FINIS LIBRI PRIMI.





JOHANNIS DOLÆI  
ENCYCLOPÆDIÆ  
CHIRURGICÆ  
Rationalis,

LIBRI SECUNDI  
DE MORBIS THORACIS.

CAPUT I.

De Faucium Morbis, Anginâ & Glandularum  
Colli Tumoribus.

§. I.

**L**Ustravimus hætenus præmuni-  
menta Metropolis Microcosmetoris,  
nunc pergitur ad externa præmuni-  
menta Regiæ sedis Cardimelechis, hoc  
est, ne Oedipo opus sit, ad externos Thoracis  
Affectus, inter quos primâ acie stant morbi  
*Juguli & Faucium*, quæ fauces quantæ necessi-  
tatis & ad mortalium vitam continuandam uti-  
litatis sint, *Respiratio* nos docet, quæ vitæ adeo  
est necessaria, ut ejus fructu carere ad tempus  
aliquod nemo queat. Respiratione enim spiri-  
tus reficiuntur, & circulatio sanguinis promo-  
vetur, cumque ad actionem aliquam exercen-  
dam in machinâ instrumenta necessariò requi-  
rantur, non ab re erit, si paulum circumspectum  
quædam instrumenta ad respirationis  
actionem perennandam concurrere debeant.  
Sunt autem illa Oris & Narium patentes hia-  
tus, Larynx & Aspera Arteria. Verum enim  
verò quam insignia respirationis in statu sano  
continuatio libera hominibus adfert emolumenta,  
tam infinita e contra impedita in statu mor-  
boso parit incommoda. Quid enim molestius  
est in apoplexiâ, quid periculosius in suffoca-  
tione hypochondriacâ, in asthmate scorbutico,  
in dyspnœa, quam respirandi difficultas? Atta-  
men omnia hæc incommoda ab ægris facilius  
feruntur, à læsis quia proveniunt pulmonibus  
& thorace, neque subitam minuantur suffocatio-  
nem, sicut læsa Larynge in Angina accidit, quo in  
casu horrendum & visu miserabile suffocationis  
periculum acceleratur, crudeliorem trucidatio-  
nis speciem, strangulationem æmulans, quâ  
nulla violentior, ut nisi maturè remediis ægros  
subleventur, omninò Cardimelechis nostri,  
Regis Thoracis, extinctio subitanea (quia fa-  
tellicibus suis destitutus propugnaculis hisce  
cordis prospicere nequit) metuenda sit. Or-  
dine ergo semel proposito affectus potiores Fau-  
cium, nempe *Anginam*, & Glandularum adja-  
centium externarum seu jugularium morbos exa-  
minabimus. Dicitur autem prior affectus La-  
tinis *Angina*: sic legitur apud *Plantum Mossell.*  
*Ad 5. Scen. 3.* Vellein in *anginam* verti, quo  
huic veneficæ fauces præoccuparent; & *De-*  
*mosthenes* cum à legatis Milesiorum pecunia cor-  
ruptus dicere contra eos, quod pridie fecerat,  
postredereculasset, Anginam se pati dixisse fer-

tur, sive, ut *Cælius N. A. lib. 11. cap. 9. p. m. 259.*  
recenset, Synanchen, cui tamen ex populo qui-  
dam lepide contradicens, eum argyranthen po-  
tius pati exclamavit. Dicitur autem Angina ab  
angendo, vel Græce ab ἀγγελλο strangulo, suffoco,  
vel ab ἀγγελλο laqueo derivari videtur. In hoc  
quidem affectu quasi laqueo collum constringi-  
tur, liberaque spiratione prohibita miser homo,  
nisi opportune occurratur, derepente suffoca-  
tur ac strangulatur. Græcis verò audit ἀνάγγη,  
aliis ἀνάγγη, sed male plura nomina excogi-  
tarunt Medici, cum inde nullum commodum  
resularet, sed potius confusio Medicis pariat.  
Barbaris Squinantia dicitur, quibusdam Ger-  
manicè die Bräune / Petunella, sed perperam,  
cum sit diversus ab hac affectus & linguæ saltera  
symptoma, conjungitur tamen aliquando cum  
hac, melius Hals-Geßindr / oder rothlauf-  
fische Entzündung des Halses dicitur: Latinis  
Inflammatio musculorum aliarumque partium  
in isthmo faucium existentium. Reperiuntur  
in monumentis Medicorum plures, quam in  
praxi semper observari possint, affectus hujus  
differentiæ, illam enim, quæ est ab Inflamma-  
tione musculorum interiorum faucium & La-  
ryngis sine tumore ἀνάγγη, quæ in externis  
hæret, ἀγγελλο; quæ cum tumore internos  
musculos prehendit, ἀνάγγη; quæ externos,  
ἀγγελλο vocarunt, ad quas insuper alii ut  
quintani speciem eam referunt Anginam, quæ  
à luxatione vertebrarum colli oboritur, & quam  
nos in aliud caput reponemus. Distingunt etiam  
tam veteres, quam recentiores Medici Anginam  
in exquisitam & notham. Notha, quam alii al-  
bam dicunt, febris expers est, & occupat fauces  
orisque interiora, & hanc speciem Germani  
den ireissen Anfsatz dicunt. Rara est illa species  
Anginæ, cujus mentio fit *Ephem. Germ. Ann. 2.*  
*Obs. 14.* uli amygdalis membrana quadam &  
petiolum longum accrevit, & tandem in ræmo  
similem extremitatem, quæ tamen remediis  
per tempus adhibitis decidit, tamque dura fuit,  
ut cultro vix scindi potuerit. Sed ejusmodi dis-  
tinctiones nobis habentur inutiles, melius dicitur,  
species illas differre secundum magis &  
minus.

Glandularum Colli seu Juguli Tumor est ea Glandula-  
runden tum

Angina.

rumdem nimium incrementum, à majori lymphæ aut liquoris nervi collectione, & ab acido plus minus aucto in eodem vel in glandulis restante coagulatione seu inspissatione pronatum. Tumor hic quando ob acidum acris immittit varias fermentationes præter porum obstructionem inducens, cum dolore, calore & rubore est conjunctus, vocatur *Inflammatio*, quam in superioribus lib. 1. cap. ultimo, adeoque huic quàm proximo in Antiadibus, seu Tonsillis inflammatis sufficienter jam reddidimus cognitam, quum nulla inter hosce affectus existat differentia, nisi ratione partis affectæ, quod maxime sequens paragraphus clariùs enucleabit.

*Par. aff. à Angina.*  
§. 2. *Par. itaque affecta ipsius Angina* est larynx cum suis musculis, tam communibus, quàm propriis. Larynx est Tracheæ arteriæ caput, principio Oesophagi superjaceens, quinque cartilaginibus suis musculis instructis compositum: acri in Pulmones adnascendo, vocisque modulatur dicatum. Cartilaginum, ex quibus componitur, prima Thyroides dicitur, seu scutiformis, eo quod scutum quadratum antiquiorum referat. Secunda Cricoides seu annularis instar annuli rotunda totum ambit laryngem. Tertia & quarta Arythanoides seu Gutturales dicuntur, quia processus earum ita uniti sunt, ut in medio rimulam, per quam aer intrat & exit, relinquunt, quâ conjunctione Gutturum referunt. Quinta Epiglottis figurâ suâ Linguam refert, & saepe rimulam à priorem conjunctione efformatam, porrigit versus gulam, ut cibum potumve ab eâ rimula arceat, dirigat contra in oesophagum. Musculi laryngis sunt præterea brevesque, ab insertione sua & ortu denominantur, suntque varii, de quibus videantur Anatomici. Nec tamen excludendi hic sunt musculi in radice Linguae ossis hyoidis, Gargareonis, Tonsillæ & Amygdalæ, vel Parilomia & Antides dicti, qui omnes oris communis tunica teguntur atque venas à jugularibus accipiunt. Partium interim harum à gutture longius distantium inflammatio Anginam non parit, nisi malum faucibus hæreat, id est, parti ex gutture & guli constitutæ communicatum respirandi impedimentum afferat. *Paracelsus* & ejus affecta hoc subjectum latius extendunt, septemque membra principalia constituent. In Angina ergo Pharynx cum summis gular, Larynx cum aspera arteria, ac denique Tonsillæ, uno nomine partes omnes in Faucium isthmo contentæ inflammantur, imprimis verò ea pars, quæ Pharyngem & Laryngem constituit, (Tonsillæ verò in Anginâ notbâ afficiuntur,) ac imprimis partium harum musculi, tam interni, quàm externi superius dicti; hinc & sobinde glandulæ harum partium, tam Antides seu Tonsillæ, quàm Thyroidæ circa Laryngis sedem humiliores, & ad latera cartilaginum thyroidis, cricoidis, & primorum aliquot arteriæ asperæ annulorum sitæ, partibusque hisce immediate incumbentes, compatiuntur.

Abque Faucium verò hac inflammatione seu Anginâ, solius Glandularum Colli Intumescentia sedes seu pars affecta sunt ipsæ juxta Glandulæ Colli, seu Jugulares Cl. *VVaribono* ita dicit, quod juxta vasa jugularia sitæ sint, racematim quodammodo crescentes, & in utroque

latere aliquando quatuordecim observatæ, aliæ aliis minores, dum magnitudo earum ab exiguitate feminis coriandri ad fabæ usque molem variare solet, in anteriores & posteriores, superiores & inferiores quidem Anatomicorum solertia distinctæ, sed membranarum & vasorum connexionem inter se & cum parotidibus ac maxillaribus mobiliter junctæ, molles & fungosæ, colore diverso, inferiores nempe juxta latera glandularum thyroidæarum, inter spinam, vasa thoracica & thymum in thoracem descendentes, rubicundiores, superiores ad glandulas maxillares & parotides pertingentes, pallidiores. Omnes hæ glandulæ humiditatem superfluum à nervis vel aliunde collectam in venas & lymphæductus reducant, adeo ut totum eorum officium sit reductorium, cum vase excretorio penitus destituantur.

§. 3. Antequam ad causas hujus affectus transeamus, animum ærigamus ad signa diagnostica, quæ scilicet imminet & præsentem denunciant morbum. Signa ergo imminet anginam significantia sunt, quando deglutitæ ac respirare difficulter ager incipit, quando dolor præcipue circa Fauces molestus sit, calor inuetus, sive dolor ardens faucium percipitur, collum sine causâ manifestè vix moveri potest, si ex *Aph. 6. §. 3.* assidui imbres præcellerint; aut *Aph. 20. §. 3. & §. 5.* verum tempus fuerit, si rigor adfuerit, capitis dolor, maxillarum intumescencia, ægrè lippum deglutitur, saliva dura & viscidæ expuatur, & in imis faucium stertor percipitur.

Ipsius verò Angina præsentia innotebit, quando deglutienti ac respiranti summa adeest difficultas, absque aliquo thoracis ac pulmonum vitio, quando potulenta ipsa per nares rejiciuntur; quando Lingua apprehensa Gurgulionem quidem non magnam, sed mollem videmus, fauces interiores salivâ implentur, respiratio fere abolita est. & non nisi cum summa difficultate repente, subinde quasi suffocatio imminet; quando ægrotus neque excreare potest, neque decubium sustinet, sed si decumbat, suffocari videtur, venæ in facie manifestè tument, Lingua, in qua sunt mucidæ, salivæ, amaræ aliæque tenaces ac viscidæ particule salivæ, livet aut nigricat tumentque, facies ipsa calet, roseo colore suffunditur, febris est acutissima propter turbationem sanguinis astuantis, differt tamen quo Angina est vel major vel minor: in acutâ saepe lenta febris conjuncta esse solet, circa vesperam exasperatur; duplicem enim observavi febrem, unam continuam, alteram periodicam, in maligna scilicet Anginâ, dolor ardorque faucium intensissimus, tumor plerumque internas gutturis partes obsidet. Accedunt sitis, oris amaritudo, delirium, oculi velut in vis, qui strangulantur, prominent, & per eos intentè ager intuetur, cerebrò se jactat & exilit, pulsus est instar peripneumonicorum, nudo scilicet parvus & rarus. Quæ pars verò potius afficiatur, ex lationibus respirations & deglutitionis, item loco doloris, Medicus facile prospicere potest.

Tumor vel Inflammatio Glandularum Colli facile visu & tactu cognoscitur, præterea pueri pallidi sunt, de tensione in parte colli exteriori conqueruntur, & expuunt multum salivæ viscidæ & glutinosæ, nonnunquam atrophia

Tumor  
Glandula-  
rum Colli.

Tumor  
Glandula-  
rum Colli.

phii simul laborant, quoniam glandulae ex lymphæ stagnatione tumefactæ tubulos & vala comprimendo distributionem succi nutritii impediunt.

*Ætiologia.* §. 4. Nunc ad generationis modum & causas progredimur, de quibus antequam nostram cyponamus sententiam, aliorum colligemus vota, eaque candidè communicabimus. Prodeant itaque antiquitatis ratione omnium primo in medium Veteres *Galenici*, qui unanimi consensu eò inclinant, *Anginam* exquisitam oriri vel à sanguine puro, vel cum humore bilioso mixto; eam verò, quæ est absque inflammatione, sed cum tumore, vel ab humore putridi pituitoso, vel melancholico, ex aliis partibus, maxime capite, à facultate expultrice irritata transmissio, & à faucibus ob partis & expultricis in ea debilitatem, dein viarum laxitatem, largius recepto; tum paulatim ejusmodi humorem vitiosum colligi credunt ob facultatis imbecillitatem propria partis recrementa expellere non valentis, vel autrati eundem ob calorem aut dolorem. Causis remotioribus inferunt tum languentem dietam, copiosorem sanguinem progentem, immoderatorem vini usum, meningium & hæmorrhoidum suppresionem, vel etiam hæmorrhagiarum narium aliàs certo tempore quibusdam subjectis consuetam consensum cessantem, aliarum evacuationem intermissam, ætatem juvenilem, temperamentum corporis calidum, frequentiore faucium commotionem in cantibus, venatoribus & præconibus, aërem frigidum & humidum, vel calidum & humidum subito ingruentem, destillationesque à capite procurrentem, adeoque tempus vernum auginæ suscitandæ aptissimum, fructus horarios, cerasa, pyra, poma, &c. stranguantia.

*Glandularum Colli Tumoris.* *Tumoris Glandularum Colli* causam constituunt iidem humores antedictos in glandulis istis collectos, & eadem nimium distendentes, ut in Tumore inflammatorio sanguinem; in erysipelaceo bilem, in œdematoso pituitum, in scirrhoso melancholiam: fieri verò potissimum in pueris ejusmodi tumores œdematosos ob nimiam eorum humiditatem, & cili frequentiore ingurgitationem, quâ multi humores crudi colligantur, qui propter facultatem expultricem apto tempore non eliminati, sed diutius retenti in molles & laxas istas partes influant, easque in tumorem cum tensione partium vicinarum extollant.

*in iuxta Partem Colli Tumoris.* §. 5. Chymicorum Antesignano illi *Paracelsi* hoc in consensu post *Galenicos* proxima locanda est sella, qui in *Angine* seu *Squinnantia* causis enarrandis hoc dæstatum, produci affectum hunc à liquore scisso descendente & in faucibus eentrum ponente, sed situ suo totam colli & capitis circumferentiam occupante, unde collum in nuchæ circulo tumet cum rubore cacuminis ejus ac folii. caput inflammetur & tumor iste ut apollinea maturet, hinc retro cacumen foramen incidat, & inglutitio cum sputo prorsus auferatur, tandem verò balsamo naturæ in gutture deficiente externis putrefcat, & uvulam atque solum sinu inficit.

*Glandularum Colli Tumoris.* *Tumoris Glandularum Colli* originem esse ait ab humore in partibus hiis mollioribus collecto & in iisdem coagulato, qui cum pro ulcere excitando adhuc immaturus sit, partes hæc solum extenat, & protuberare faciat.

Secundum Helmerstorium causam. §. 6. Presso nunc sequitur pede Adeptorum ille Coryphæus, & famigeratus per ignem Philosophus *Helmontius*, ipsam *Anginam* non à cerebro, sed à latice corrupto natales suos nascisci asserens, dum ille in viâ partium fordes nimium eluat, easdem assumat atque a d fauces quantitate excedente apportet, quæ ibidem à facultate attractrice debili fortius detineantur, unde *Atcheus* ab iisdem excitetur ad peregrinam excudendam ideam, & solum quoddam viscidum à faucibus fabricandum, sive maciginem quandam fortentem, quæ fauces non modo constringantur, sed & ipsa tandem exoritur exulceratio.

Ab eodem quoque latice spissiore *Tumorem Glandularum Jugularium* vult excitari, quatenus ad glandulas hæc deductus, in iis ob pororum interclusionem aut tractricis languorem diutius hæreat, nec per sudorem egeratur, aut à pelle alliciatur ob alienam labem, quâ inquinatus est; hinc glandulas copîa sua nimium repleat, & in majorem magnitudinem extendat.

§. 7. Succedit *Conterraeo* suo diligentissimus ille causarum Indagator *VVilksus*, qui non procul à seculo aberrans *Anginæ* causam constituit sanguinem multis particulis sulphureis & terrestribus refertum, ob quas in musculis faucium obstructionem faciat inflammatoriam, eò quòd massa ejus strictior inter circulum recrementa sua non dimittat, sed potius in crassitate & lentescat, ideoque in viis faucium angustioribus diutius hærens, non modo effervescentiam quandam subeat, sed musculosas fibras distendat, arteriam pulmonalem & tracheam comprimat, sicque respirationem cum depletionem quàm in dispositione sana fieri debeat, longè reddat difficiliorem.

*Glandularum Colli Tumorem* suscitari opinatur, quando liquor nervos ob heterogeneas quasdam particulas terrestres aliquantulum spissior effusus, tam citò ad venas transfunditur nequeat, sed in glandulis citra effervescentiam diutius hæreat, harumque substantiarum laxiorum nimis replendo faciat protuberare.

§. 8. Pergimus ad *Batavorum* illum *Apol-Sylvii* opinionem de *Boc Sylvium*, cujus nobis dicitur *Oratione de causa Anginæ*. *Anginam* oriri à bile tumacriore, tum pinguiori, sed saliva imprimis atque glanduloso faucium liquori infestâ, ipsisque & faucium musculis artius adherente, unde hi non modò tumeant, sed frequentius etiam inflammentur, dum sanguis in iisdem stagnans cum bile oleosa effervescat, & ita corrumpatur, ut tandem etiam in materiam abeat purulentam.

*Glandularum Colli Tumorem* induci ab eodem discimus, tum quando ipsæ in statu optimo copiosius aluntur, tum quando in substantia sua sanguinem continuo alluentem præter naturam coæcant, qui per eandem substantiam molliorem atque flaccidiorem facilius dispergitur, quàm per carniū firmitorem ac solidiorum. Sanguinem verò in glandulis hiis coagulatis ita coæcantur docet, propter impedimentum illius refluxui positum, & potissimum obstructionem in venis capillaribus, canalibus, arteriis & venis interpositis à pituitâ conrescente frequentius, sanguine verò coagulato rariùs contingentem, & quid em quoties vel ab aère tum naturâ, tum arte assuante, vel

# CAP. I. DE FAUCIUM & COLLI AFFECTIB. 241

vel ab alimentis condimentisque aut spiritibus, aut aromaticis, aut volatili sale abundantibus, vel à corporis aumme motu, hâ præsertim vehementi, vel à vigilis solito magis soluta & fluidi facti in corpore unâ cum sanguine humores omnes, maxime pituita, quaqueversum abundantius deferantur, hinc superveniente aëris aquæve frigore, vel usurpatis alimentis, condimentis, vel medicamentis actu frigidis, aliave coagulandi vi præditis, vel ad quietem summam devoluto corpore, vel tributa extrema, inextinguibile panico inexpectatoque homines opprimente coagulentur, unde ad motum inepti facti in vas, vel intermedus canalibus hæreant, & sanguinem, ne per vias impeditas ulterius pergat, sistant, qui deinde per glandularum harum subilitatem vicinam ita densius, eandem in molem majorem distendunt.

*Curiosum notandum in dictum de causa Anginae.*

§. 9. Restant adhuc tententur in dicturi Viri illi acutissimi, secundum subtilissimam & in veritate eruenda diligentissimi illius Philosopher, Curæ principia Physica fundamenta Medica quæcumque dirigentes, qui Anginam exoriri pronuntiant, quando vel liquor ex communi illa massa sanguinea per arteriorum poros, vel lymphæ per proprios suos ductus in tubulos musculorum faucium in sedentes particulas suis rigidioribus angularibus poris eorundem fortius adhaerent, eosdemque obstruendo liquorem diuturniorem inter fibras retentionem eant, unde fibræ hæc distenduntur, & musculi gule cum glandulis adjacentibus non modo intumescunt, sed quia solummodo materia æthereæ subtilissima transitus per poros obituclos conceditur, hæc igitur solum particulas isdem infer, à quibus ipsa producitur inflammatio, & si huic brevi non subveniatur, à celerissimo & vehementiori patienularum igneum motu fibræ ipsæ tandem rumpuntur, & generantur sulci quidam, in quibus liquor chylosus, nutrimento aliis tubulos partium harum subinfluent, majori copia colligitur, & à particulis angulosis inficitur & corripitur, ut in materiam abeat plane purulentam, quæ acrimonia sua membranas dirumpens, ipsam ita inducit exulcerationem. Ab aëre vero corrupto, multis particulis illi usmodi angularibus acutis, & pungentibus aut hænatissimis præditi, quali in constitutione tempore autumnali & verno potissimum perscitur, eandem pororum obstruentionem facile produci posse, & hinc anginam suscitari asserunt, nec non ab aëre calidiori liquores glandulares coagulantur, ut illi celerius & copiosius partes inundatione quadam ampliant, postea verò mutato æthere, & sublequenti frigore à particulis illatis angularibus coagulentur, & frigidiore in tubulis stagent, fibræ tendant & poros obstruant, quod aliquando contingit, si ex lesto calido vel balneo homines le lubricano frigori imprudenter exponant; cibum quoque, potum & medicamenta quædam ejusmodi particulas asperiores faucibus inter se polleantur.

*Glandularum Colli Tumoris.*

Tumorem Glandularum in Collo exteriori originem suum deinde ex lymphæ glandulari insipulata aut copiosiori, & lymphæ ductuum obstruentione, ut ab isdem cito nequeat excipi, tum pororum quoque cutaneorum interclusione, à qua liquorum resolutorum evaporatio impediatur, quare hi denno coagulati & in glandulis hæc detenti easdem in molem majorem

soleant extollere.

§. 10. Fuerunt hæc aliorum de causis judiciorum verò & Nos cum tangat ordo loquendi, in causa Anginae quæ de isdem priorum dictis censuamus.

necessario adjungenda. Præter generales equidem causas inflammationibus quibusvis communes, in specie ear, quæ faucium & partium vicinarum inflammationem excitant, sunt vel internæ, vel externæ. Inter internas primum obtinet locum non sanguis, sed lymphæ acris acida, salina simul plus minus glutinosa, obstruentionem in tubulis musculorum vel aliarum partium adjacentium producents, hinc sanguinis circulatio impeditur, unde inflammatio & tumor; quo & referenda saliva viscosa per ductus suos salivares ad fauces delata, quæ nimis salia vel acida, prout ea existunt morbis catarrhalibus, acrimonia sua & aciditate rodendo & fauces excoçando facile hanc inflammationem inducere potest, prout hodie, dum hæc scribo, acenitate hoc in filio mercatoris observavi, in quo à pyralisimo faucium calor, rubor, dolor cum aliquo tumore, & per consequens deglutitio impedita iuit. Epidemice quoque malum hoc oritur, quando inspiratum acidum copiosius cum aëre in transitu suo non tantum fauces lædit, sed succos etiam coagulando ad faciem sui in faucibus stagnationem, quæ & febrilem fermentationem disponit. U plurimum verò Angina hæc acrimonia teri, quod vulgari nomine salivæ vel defluxionum catarrhalium insignitur, hinc & ædenatosa tumefactio istarum partium ab acris ista lymphæ glandulas faucium afficiente, loca vicina rodente & excavante, sicque junctam phlogosin producente, circulationem sanguinis plus minus impediende, & Cardimelcehem irritante aliquando excitatur, & hæc dicitur vulgo Angina alba seu notha, de qua satis periculosa confert Ephem. Germ. Ann. 6. p. 218. item huic pertinet rara Angina quali membranosa species, de qua vid. Ephem. Germ. Ann. 2. p. 11. Externæ causæ sunt plures, primò enim le offert aer, liquidum, teste Hippocrate, assiduis imbris præter alios morbos sunt etiam anginae, conf. Sect. 3. Aph. 20. 22. Inter cibos malo hinc ausam præbent omnia acris, ut sunt aromatis & pipere condita, quæ fervorem & acrimoniæ augent, ita refert Hildanus Cent. 3. Obs. 27. de inepto Chirurgo, qui ægro pustulis affecto quod diceret aut quater pulverem pipetis & croci gule faucibusque inspersit ac insufflavit, unde dolor mox auctus est, nec non inflammatio & febris, per intervalla quoque hypothyrim supervenerunt. Inspirata ergo immediato contactu loca hæc facile excoariare & Anginam producere valent, vel coagulando succos obstruentionem parere possunt. Huic pertinent varia inepte deglutita, sic nuper inflammationem faucium observavi ab officulo aviculæ incongruè deglutito, quod faucibus inhaerens irritando ad fibrarum contracturam, & hinc ad successivam inflammationem disposuit. Sic & alii à spina piscis, à clavo ferreo, ab aculeis deglutitis, & frustulis vitri devoratis & faucibus intus, inflammationem & tandem abscessum notatur Practici, & Hildanus in Obs. Chirurg. p. m. 51. dicit, quod imprimis frigidi potus in gargatio anstante per hunc malum præbeat. Quo & pertinet

Hh

potus



potus liquorum corrosivorum, aquæ fortis, aliorumque *Ætialium*, nec non unctio *Ætæ* imposita instituta, à qua acrimonia caustica faeces non tantum excoarantur, sed plane sphaculantur, uti exemplum notavi in *nalice Curiosi* communicatum, de quo vid. *Eph. m. Germ. Dec. 4.*

**Glandularum Colli Tumoris.**

**Glandularum Colli**, live **Jugularium Tumor** oritur à nimia lymphæ copia & in glandulis hæc stagnatione. dum potissimum à vasis propriis live lymphæ ductibus non relorbetur, & in oceanum microcolonicam reducitur, sed ab acido quodam inspissatur & in glandulis jugularibus racematum sibi junctis retenta fungosam & mollem hauri substantiam expandit, unde simul fibræ musculorum collo ad acetum premuntur & distenduntur, & hinc dolor ille oritur tenuis. Fit autem stagnatio ista modo in paucioribus. modo in pluribus glandulis, & in quibusdam major, in aliis vero minor, ut aliquando globus quidam appareat major, minoribus quibusdam stipatus, quod itidem ab ipsa glandularum diversâ magnitudine dependet. Puerulis verò & junioribus itequentius hæc glandularum tumores obveniunt, quod majori abundant lymphæ aliorumque liquorum copia, hique citius ab occurrente quodam acido coagulatur, & poro cutanei obstrui possunt, unde videmus à retrocedente tinea vel scabie capitis glandulas hæc intumescere, eo quod lymphæ ipsæ & salivæ tum ad parotides, tum ad glandulas hæc priores contiguas subter cutem adfluant, in his stagnet & tumorem producat, quod itidem obvenit ex vitio chylo in primis viis, & tempore augmentationis, dum pro lubricitate & humectatione partium extendendum liquor ille in glandulis aservatur, sed ante fin in membrorum subiectorum tubulos distributionem copia auctus, fungosam hæc lubricitatem extendit eandemque reddit protuberantem.

**Prognosis Angina.**

6. 11. Quamvis *Signis prognosticis* non semper fidendum, & Denis O. M. solus morbi exitum novit, tamen non plane sunt rejicienda, cum sæpius vel salutis spes, vel mortis pericula denunciantur. Ea vero optime annotavit prudentissimus ille *Cens* in *Aphorismis* suis, & quidem *Sect. 1. Aph. 34.* prohibetur si febrem habenti suffocatio repente superveniat, nullo tumore in faucibus existente, lethale hoc esse malum. Eandem sententiam stabilit in *Cons. Prænot.* Angina, inquiens, gravissima est & celeritè interimit, quæ neque in cervice quicquam conspicuum facit, plurimum vero dolorem exhibet, & difficultatem spirandi, quæ erecta cervice obitur, inducit, hæc enim eodem die, & 2. & 3. & 4. strangulant. At Angina, quæ in reliquis quidem dolorem exhibet, in faucibus vero tumorem ac ruborem excitat, admodum quidem exitialis est, priore tamen longè duratior, si ingens rubor fuerit. Tumores faucium in Angina sine ulla ratione evanescentes, lethales sunt. Quod si neque diebus judicatoris erysipela dispereat, neque tuberculum ad externam sedem se vertat, neque pus per tussim rejiciat, facileque & absque dolore ferè le habere videantur ægri, mortem indicat, aut ruboris resolutionem. Huc pertinet *Aph. 10. Sect. 5.* Quibus ex Angina in pulmonem mali sit conversio, intra septem dies moriuntur, si vero has effugant, empyici evadunt, inflammatur enim

sæpe ab hac materia acti pulmo, hinc peripneumonia, aut plane suppuratur pulmo, unde empyema. Angina exquisita & maligna est periculosior notha. Si febris diu durat, est pessimum. Si cum maxima & difficili respirazione in anginosi spuma circa os appareat, est sumum lethale, prout in strangulatis & suffocatis. Sic quoque si Abies luteus tuerit & patiens non exspuit, le l in pectus ruit, sæpe inde suffocatur ægri. Angina laborantes nisi celeriter corda exspuant, perniciosi habent. Securitas tamen est, tumorem & ruborem ad externam converti. Sic etiam ex Angina, ubi non solum fauces, sed cervicem quoque rubor occupat, evadunt, imprimis si pectus etiam rubor detineat, neque ad internam erysipela revertatur, quod etiam approbat *Hippocr. Aph. 4. Sect. 7.* Ab Angina detento tumore & rubor in pectore superveniens, bonum, foras enim morbus vergit. Hæc tamen inflammationes finiuntur tribus modis, aut citò evanescent, aut discutiantur, aut suppurantur, & si suppurantur, abeunt interdum in ulcera durantia & difficiliter sanabilia. Anginosi suffocati intereunt, si moriuntur. Aliquando Angina in pleuritidem transit, interdum critico itatu per hæmorrhagiam curatur, cons. *Forc. hum. 15. Olf. 14.* Aliam per mentium fluxum criticum curatam observavi. Omnium gravissima vulgo dicitur *Cyanice*, quæ ante quartum diem sæpius jugulat, hinc *Paracyanice*, levior est *Synanthice*, levissima *Parasynanthice*, quia affectus hi in gradu inferiori sunt constituti, cum ut superius jam annotavimus, alias secundum magis & minus differant. Vulgo nothæ sunt quidem tutiores, sed longiores trahunt moras, sæpiusque terminantur vel per insensibilem resolutionem, vel suppurationem, vel indurationem, quæ aliquando in gangrenam abit, vel per metastasin ad alias partes debiles secedit. Si undè cerebrum fuerit delata, statim gravissimus dolor capitis, deliria & phrenitis subiequitur. Asthenico notandum, quod semel anginosus, facile eodem denso contrahitur morbo, quia semel apertis vasis & fibræ ad flexibilitatem dispositi succi aciores redditi vias priores repetere, & vasa ad apertionem jam promissa levi operâ iterum poterunt releare.

**Glandularum jugularium Tumor** non omnino aspernendus est, cum ex stagnatione Lymphæ diuturne tubuli valde comprimantur, & distributio liquorum impediatur, ut atrophia partium reliquarum inde sequatur. Oritur etiam ex inde tandem inflammatio, si lymphæ existat acrior, majorem fluxum ad tubulos fibræ irritatis concitans, si venaciore & viciata, validiorem obstructionem & diuturniorem liquorum detentionem inferens. Ex scabie aut tinea capitis retrocedente inductus, non caret periculo, cum circulationem liquorum impedire facile possit, unde succorum quies omnimodo, & totius machinæ destructio impendit, quæ ex reverte scabie humidioris tumores glandularum dispariuros esse certò sperari poterit. Tumores & non adeo frequenter periculo juncti sunt, qui tempore augmentationis in pueris & adolescentibus exurgunt, denotant enim solummodi materię nutritiæ copiosiores in glandulis, ceu & tumis hujus rei promissis conditis, allevationem, quæ si ab æthere subtilissimo utroque, tunc corpus ambiente, tum intus jam existeret, in tubulos partium ad opus hoc satis jam adaptatos commode

**Glandularum Colli Tumoris.**

commodè distribuat, & glandulæ aliquantum exhauriantur, sicque ex repletionem earum productus ille tumor sufficienter imminuetur.

In ætate gravioribus instante febre catarrhali nonnunquam suboriuntur, & majorem Medicis facessunt laborem, quam in puerulis & adolescentibus, quod fibræ existant duriores, & materiæ vehementiam labemque spirituum majorem manifestent, hinc potius citò nequeunt aperiri nec tubuli dilatari, quare tardior expectanda est curatio.

*Dietæ.*

§. 12. Cum verò sit periculosi hi nostri se offerant affectus, maximè Angina, curationem non tam postulant, quam urgent citam atque præsentaneam, cui pede faustiori conciliandæ non parum ipsa tribuit *Dietæ*, nunquam non cum Pharmaciâ studiosè simul observanda, *Aer* ergo sit temperatus, quem æger corpore erecto, si fieri potest, hauriat, faveatque respiratio transpirationi; vitetur pluviosus, fumosus, frigidus, acido austeriori prægnans, maximè enim hic nocet coagulando siccans, qui ad valetudinem prosperam semper requiruntur apprimè fluidi. *Cibus* sit eupeptus, tenuis, parcus, liquidus, liquida enim fauces facillè transeunt: prosumt jussula alterantia. *Potus* sit decoctum horð. cum Scorzonæ. C. C. Syr. Papav. errat. vel viol. edulcoratum, cerevisia tenuis potest concedi. Si verò æger deglutire planè non possit, ad præscriptum *Capitæ* eius plures vesiculæ bubulæ situlæ instar clysteris alligata succum nutrientem in œsophagum dimittendum censent, alii ægros reficiendos esse jubent panis & carniū vaporibus, quæ cura tamen nostro judicio tutò omitti potest, plures enim novimus, qui per novem dies nihil deglutire potuerunt, attamen fame non periere, sed pristinam recuperârunt sanitatem. Post hæc si moderatas *summus* conciliandis emulosisibus ex feminibus 4. frig. maj. papav. alb. & aq. flor. sambuc. mala enim est ex 3. *Aph. Sect. 2.* alterutra res, si modum excellerit. Præ *motu* corporis, ne succi nimis agitentur, *Quies* ægro suadenda, eique silentium imperet Medicus. *Exercendorum* & retinendorum quoque consuetudo tam per alvum, quam per vesicam aut uterum ritè ut peragatur prospiciendum, consuetæ enim evacuationes suppressæ, ob acidum, quod stagnando acquirunt, stimulantur sunt, imprimis verò opera danda, ut transpiratio sit liberissima. Tandem & *Animi pathemata*, quibus magna vis est in Microcosmotorem & Cardimelech, rectæ rationis compede sunt coercenda, imprimis verò ira est moderanda, ne ferocia Cardimelechi concilietur, sed tranquillius habeatur, ne spiritus animales sive succi subtiles nimis concitentur & impetuosius effervescant.

In glandulosi colli obstructionibus *Dietæ* in omnibus sit aliquo modo calidior & fluidior, ut eo melius obstructio tollatur, in quem finem conducet potus Theæ vel Caffæ.

§. 13. Post *Dietam* ad ipsam accutrimus *Pharmaciam* & *Chirurgiam*, ut in morbo tam periculoso citò satis ægris auxiliariis porrigantur manus, & ut eo melius hoc fieri possit, a iorum quoque Medicinæ Antistitum consilia de curatione hac feliciter instituenti percipiemus, omnium verò primo *Galenicorum*, qui antiquitatis jure primatui sibi vendicant, eorumque scopus in *Angina* curatione eò collimant, ut causâ ejus quam citissime

fieri potest, removeatur, ea enim abadâ & ipsum morbum, faucium nempe angustiam colli, & symptomata quæcumque simul profligari promittunt. Eapropter si ab inflammatione morbus hic ortum habeat, sanguinis influxum & minuunt, & ulteriores præcavent institutâ tenuissimi victus ratione & sanguinis educatione, tum per venam aliquam sectam, sive ea sit humeraria, sive sublingualis, tum per evacuationem ejusdam aliâs conflietur suppressionis refectionem, ut sunt hæmorrhoidum fluxus per hirudines ano admoias provocatio, mensium per venæ poplitæ aut malleolorum sectionem evacuationio, hæmorrhagia narium, quæ si malo abigendo non sufficiant, sed morbus augeri & tumor accrescere videatur, ut suffocationis imminet periculum, parti tumori oppositæ cucurbitulam affigunt, loco scalpello prius conciso, ut sufficiens sanguinis copia effluere possit, quam curam vehementè observant, quando ab inflammationis vehementiâ vertebæ colli quasi convelluntur, ubi vertebæ loco laboranti oppositæ cucurbitula ista inicitur, alvum obstructam liberant clystere mitiore, vel, si opus sit, acriori etiam stimulant. His autem ratione partem nudantis, sanguinem effundentis, sive caput sit, sive aliud quoddam corporis membrum, ita studiosè observatis, non minorè operam impendunt parti accipienti, gutturi nempe interno, aut œsophagi capiti, quibus constringentia & constipantia adhibent remedia, ut ita corroborentur, nec humores aut sanguinem affluentem tam promptè admittant, quare intrinsecus potius quam foris eadem admovent, ne materia intus compellatur, sed foras ejiciatur, cui scopo sequentè collationem apprimè judicant idoneam.

✶. Fol. plantag.  
lenisici,  
seu myrsi, 22. Mj.  
flor. rosar.  
acac.  
balanst. 22. P. j.  
Cort. granat. 3ß.  
leni. Misß.  
Coq. in l. q. aq. pluvial.  
In Colatur. lbj. dissolv.  
Rob. diamor. 3ßß.  
Sir. rib.  
vel granat. 3ßß.

M. F. Gargarismus.

In progressu morbi prioribus admiscunt resolutiva ex sem. sænigr. horð. rad. glycyrrhiz herb. hyssop. capill. Ven. rad. Irid. pallulis, palmulis, caricis, quibus sequens gargarismus est compositus, quo os frequentius colluendum.

✶. Hord. integr. Mj.  
Rad. Glycyrrh. rad. 3j.  
Herb. Hyssop.  
Capill. Ven. 22. Mß.  
Cort. granat. 3j.  
Flor. rosar. P. j.  
Pissular. 3ß.  
F. Decoctio in aq. pluvial.  
In cunjs Colat. lbj. j. dissolv.  
Rob. diannæ. 3iv.

M.

Sedatâ sic inflammatione ad materiæ collectæ aut suppuratæ extractionem linimenta propinant & relaxantia, qualia sunt lac capillum, decoctum pissularum, caricarum, aqua nulla, in qua & hyssop.

Hh 2

*Curatio  
Pharm.  
chirurg.  
Chirurgi-  
ca secundum  
Galenum  
Angina.*

hyllöpus, & abrotanum, & sinapi bullierint, vel ob specificam qualitatem stercore canis, lupi, vel pueri lupinos comédentis exsiccata vel pulveris formâ inpergunt, vel cum melle & syrupo hyllöpi in electuarii formam redigunt, illudque exhibent frequentius elambendum, qui & cineres pullorum hirundinum, capitum piscium, canerorum & testarum cochlearum referunt eodem modo adhibenda. Ipsi collo ad meliorem digestionem imponunt lanam carptam & oleo amygdal. dulc. vel anethino imbutam, vel spongiâ decocto chamamel, aneth. melilot. malv. sem. lini, &c. immersâ locum dolentem foveat, aut oleo lil. aneth. rutac. irin. vel unguent. ex pingued. gallin. æsp. humid. unguent. resumtiv. pulv. nid. hirund. & oleo lil. parato inungunt, aut cataplasma ex farinâ fabar. hord. in decocto chamamel, aneth. sem. lini denovo coctis, additis oleis antedictis paratum applicant. Suppurationem, quando materia aliter educi nequit, sed in eam vergit, promoveunt cataplasmatibus concoquentibus & pus moventibus, quale sequens existit satis probatum.

*Æ. Rad. lil. alb.*

*alib. æ. 3j.*

*flor. mel. lot. P. j.*

*Cœq. probè in aq. simpl. & contund.*

*postmodum add.*

*farin. sem. sænigr. 3vj.*

*adip. gallin. 3ij.*

*Croc. 3ß.*

*F. Cataplasma.*

Hoc applicato insinuat exhibent gargarismata ex decocto caricarum, patiular. sem. malv. alth. sænigr. hinc si pus sit confectum, abicellum rumpunt digito vel calamo, vel candelâ cerâ, vel gargarismo quodam ruptorio ex sale armonico, nitro aut sulphure in aquâ dissolutis. pure verò evacuato locum vel aquâ nullâ, vel decocto caricarum, in quo mel rosatum fuit dissolutum, detergent, & tandem adstringentibus, siccantibus & farcoticis ad integram deducunt sanitatem. Non absimilem adhibent curam in Anginâ *erysipelatâ* à bile productâ, in quâ præter antedicta in usum ducta humorem peccantem evacuant specificis suis cholagogis, pilulis scilicet aggregativis. de rhabarbaro, de quinque generibus myrobolanor. & in nimia faucium angustia, ubi pilulæ deglutiri nequeunt, electuario rosato *Mef.* syrupo rosar. laxat. infuso rhabarb. in debilibus verò & febre divexatis cassâ fistulâ, mannâ & syrupo aut melle violaceo. His præmis ad minuendum nimium in parte calorem medicamenta adhibent repellentia, qualia sunt posca, diabatnon in decocto plantag. & flor. violar. dissolutum, decoctum hord. cum glycyrrhiz. & jujub. gargarismatum formâ usurpata, foris verò collum oleo rosaceo completo, & hinc oleo amygdalino inungunt, vel foveat spongiâ in decocto malv. alth. & sem. lin tepide humectatâ. Tumorem *adematofum* abigunt remediis humorem frigidum & pituitosum evacuantibus, si prius oxymelle simplici vel scillitico, aut decocto hyllöpi, organ. cinamom. & pip. incisus sit, & commode preparatus. & pars accipiens debilior roborata, quare enemata applicant aciora, ex colocynth. agar. diaphœnic. Hier. sunpl. rad. pyreth. centaur. min. orig. calaminth. mercurial. sem. cunin. & similibus pa-

rata, hinc copiosorem purgationem promoveant pilulis coctis, vel ex Hier. cumagar. aut Hier. diacolocynth. paratis, impediens verò faucium angustia pilularum deglutionem, antedicta dissolvunt in jusculo vel alio conveniente vehiculo, ut commodius absorbeantur, quâ de causâ & insulum agarici, cui aliquid electuar. diaphœnic. vel diaturbith. aut elefscophi additum est, propinant. Nonnulli vomitoria exhibent ex veratro albo, elaterio, thymelâ cum sinapi in nullâ aut sero lactis, quæ tamen ab aliis improbantur, ne humorum peccantium nimia copia ad fauces propellatur, & suffocatio inducatur. Gargarismata deinde exhibent ex incidentibus, ut decocto hyllöpi, thymi, organ. rad. Ir. angel. flor. spic. sem. sinap. in aqua nullâ paratis, & curam ut in prioribus absolunt.

Tumori *scirrhus* medetur humoris melancholici ulteriorem generationem, & in partem hanc influxum prohibendo, & genitiam & in parte consistentis immutationem per insulum fol. sen. Confect. hamech. pil. ex lap. Lazul. helleb. nig. & similibus, topica verò eadem penè adhibent, quæ in tumore *adematofato* fuerunt denominata, emollientia potissimum, & leviter digerentia, ut tumor durus paulatim discutatur. cui rei externè maximè convenire judicant emplastrum diachyl. magn. irat. de meliloto, mel anacard. ol. Irin. chamamel. laurini, & id genus alia. Ubi verò remediis hisce nihil proficitur, & de salute ægri desperandum esse videtur, ne hic ob cavitatem præclaram omnino suffocetur, cum *Arcligene* ad subscanationem aliqui perpendum esse contendunt, quâ dilectâ aliquo in loco arteriâ asperâ aëri adducendo & remittendo novus paretur meatus, eamque ita insinuant, ut reflexo capite & dilectâ prius cute in collo, labia vulneris & vasa occurrentia hamulo diducantur, quo arteria aspera facilius in conspectum veniat, tum infra guttur sub tribus aut quatuor ejus oribus transversâ lineâ inter duos orbes constitutam membranam, intactâ orbium cartilagine, cultello incidunt, foramini fistulamqueam vel argenteam inserunt, ut meatus tandiu maneat apertus, donec suffocationis periculum fuerit declinatum, quo tempore plagam denuo consuevit, solam nempe cutem intactis cartilaginibus acui perforantes, & vulnus adstringentibus, farcoticis & epuloticis ad perfectam deducunt curationem.

*Glandularum Colli Tumorem* eodem ferè modo curare & abigere solent, inhibendo ulteriorem humorum productionem & partem mandantem exsiccando, partem verò recipientem ab iisdem liberando, & molliorem & debiliorem roborando, ne ulterius humores suscipiat, hinc venam aliquando secant, si sanguinis influxus glandulas tumere faciat, si vero alii humores peccent, eos specificis suis humoricivis idoneis evacuant, vel si in folispartibus illis mollibus detineantur, & nulli præterea in corpore reliquo elaborentur, ex folisglandulis depellunt, frictionibus, inunctionibus ex unguento resumtivo, dialthea, martiato, oleo amygd. dulc. irino, laurino, camomill. lil. alib. præmisso aliquando soti cû spongia ex decocto flor. camomill. melilot. herb. hyllöpi, organ. sem. lin. vel si discutit nequeat tumor, sed ad suppurationem tendat, eam promoveat digerentibus, cataplasmate nempe ex rad. lil. fol. malv. far.

*Glandularum Colli Tumori.*

# CAP. I. DE FAUCIUM & COLLI AFFECTIB. 245

far. trit. &c. additis ælipo. vel axung. porc. ol. lil. vitell. ov. & croco, ut in aliis tumoribus glandularum occupantibus & bubonum nomine occurrentibus.

*Paracelsi  
modum cu-  
randa  
Anginam.* §. 14. *Paracelsus* priorum præcepta in *Angina*, seu *Squinantia* curatione minimè observat, quin à phlebotomiis, purgationibus & ventosarum positionibus omnino præcipit abstinere, & curationem post apostematis maturi apertionei unitè per gargarinum incarnativum instituendam esse censuit, cujus descriptionem sequenti proponit formâ.

℞. Mell. rosar. ʒiij.  
Aristol. rotund.  
Pisol. aa. ʒß.  
Aq. de prunis  
prunell. aa. ʒvij.  
M.

Gargarizet æger bis vel ter in die, ut intret apostema, quod balsamo naturæ tunc facile curari promittit. Quando verò apostema non fuerit apertum, Gargarismi huius usum nihil profuturum esse admonet, quare si tumor adlit magnus, sequens potius eidem superponi vult digestivum.

℞. Mucilag. de Janogr. ʒx.  
Ceruss. ʒij.  
Capbur. trit. ʒß.

F. Mixture inftar Cataplasmati collo imponenda, ut dolores & tumores mitigentur. Capitis quoque calori nimio sequenti prospicit emplumate.

℞. Aq. rosar. rub.  
turfs. pastfor.  
Solatri  
barb. Jovis aa. pond æq.

M. & ei immergatur linteam, quod indidum ita super caput alligandum.

*Glandularum Tumor.* Glandularum Tumor, si per se ipsum non dispareat & diutius duret, per remedia humorem crudiorum maturantia & apertionei, eodem ferè modo ut ipsum bubonem curare consuevit.

*Helmontii  
cura in  
Angina.* §. 15. *Helmontius* non adeo magnam ad Anginam curandam proposuit apparatusum, sed multis remediis aliis præfert ipsum nitrum, cui singularem in morbo hoc depellendo adscribit virtutem; ejusdem verò Sectatores eidem addunt stercus caninum, nidus hirundinum, sedum majus, quæ medicamenta proprietate quadam specificâ pollere dicunt contra vim anginæ strangulatoriam, tum foris, tum intus adhibita.

*Glandularum Tumor.* Tumorem Glandularum curat laticem spissorem resolventibus & poros cutaneos aperientibus, ut ita vitiosum per sudorem eliminetur, & glandulæ in debitam elabantur magnitudinem, ad quod impetrandum ipsum antimonium diaphoreticum, aliqua singularia quædam sudorem moventia remedia summopere judicat proficua.

*illius  
cura in  
Angina.* §. 16. *Willisus* ad solvendam obstructionem, & sanguini motum necessarium reconciliandum, ejusdem emissionem per venam sectam in Anginâ non modo approbat, sed eandem etiam liberaliustum in brachio, tum sub lingua celebrandam præcipit, ne ejusdem repetitio frequentior sit necessaria, existimat enim parciorem ad sanguinem commovendum non sufficere, quando verò liberalior fenel fuit instituta, post hæc cucutibularum cum scarificatione applicatione ejus vicem aliquoties supplere posse, eadem loco ipsi tumido imponendo, ut eo citius

sanguis reddatur circulationi. Ad ejiciendacrementa, ne eadem sanguineæ mailæ ulterius communicentur, clysteres commendat emollientes ex decocto malv. violar. cum prunis dulcibus, additis eidem syrupo violac. & sale prunellæ, nec non ut inflammationi simul in tempore eatur obviam, apozemata aut julapia, quorum formula sequentes pro exemplo existere possunt.

℞. Rad. gramin. ʒß.  
taraxac. ʒi.  
liquirit. ʒvj.  
succis. ʒij.  
Hord. Mj.  
fol. sonch.  
fragar.  
fol. hepat. nob. aa. Mj.  
passular. ʒi.  
flor. Papav. Rhead.  
prunell. aa. Pj.  
Coq. in l. q. aq. simpl.  
Colatur. clarificat. tbiij. add.  
Syr. jujubini ʒij.  
violar. ʒi.  
Sal. prunell. ʒij.  
M. F. Apozema.  
℞. Aq. flor. acac. ʒvj.  
prunell. ʒiij.  
flor. Papav. Rhead. ʒij.  
Sal. prunell. ʒiß.  
Syr. Semperviv. maj. ʒß.  
violar. ʒi.  
M. F. Julapium.

Fortiora cathartica & vomitoria minds approbat, sed mitiora tantum, ut sunt decoctum cassie cum tamarindis, addito syrupo de cichor. cum rhabarb. in principio tamen aut statu periculossimo vomitoria concedit, ut sic evacuatio ventriculo etiam fauces liberent à suffocatione. Postmodum ut sanguinis viscositas dissolvatur, remedia stercoraria & diaphoretica commendat. ut decoctum stercoris equini, vel ejusdem destillatum in Pleuritide simul approbatissimum, nec non dissolutum stercoris canini, quæ sequenti ratione institui possit.

℞. Stercor. canin. ʒj.  
Aq. Card. benedict.  
scabios. aa. ʒvj.

In his dissolvatur ipsum stercus, agitando simul in mortario lapideo,

F. colatura per linteam, cui add.  
Spir. ʒi ʒj.  
Syr. Papav. Rhead. ʒij.  
M.

Ex eodem stercore mediante Spiritu vini ʒlato tincturam parat, quam ad triginta vel 40. guttas exhibet in vehiculo idoneo. Solidiora enim cum ob fauces præclusas commode nequeant deglutiri, iisdem liquidiore merito sunt præferenda, hinc & inter diaphoretica mixturam simplicem, spiritum fulig. vel C. C. præ antimonio diaphoretico aut Bezoardico minerali, quæ aliâs maxime forent accommodata in usum duci suadet. ne moram in faucibus inveniant, sed citius penetrando subitanè afferant remedium. Externa verò non minus approbat pro faciliore sanguinis coagulati resolutione & discussione, qualia sunt gargarismata, & cataplasmata collo apponenda ex nido hirundinum, præsertim si materia in abscessum se convertere perspicitur, tum pro faciliore apertione materiam emolliat

Hh 3 cataplas-



hyssopus, & abrotanum, & sinapi bullient, vel ob specificam qualitatem stercora canis, lupi, vel pueri lupinos comedentis exsiccata vel pulveris formâ inpergunt, vel cum melle & syrupo hyssopi in electuarii formam redigunt, illudque exhibent frequentius elambendum, qui & cineres pullorum hirundinum, capitum piscium, cancrorum & testarum cochlearum referunt eodem modo adhibenda. Ipsi collo ad meliorem digestionem imponunt lanam carptam & oleo amygdal. dulc. vel anethino imbutam, vel spongiâ decocto chamamel. aneth. melilot. malv. sem. lini, &c. immersâ locum dolentem fovent, aut oleo lil. aneth. rutæ. irin. vel unguent. ex pingued. gallin. æsp. humid. unguent. resumptiv. pulv. nid. hirund. & oleo lil. parato inungunt, aut cataplasma ex farinâ fabar. hord. in decocto chamamel. aneth. sem. lini denuo coctis, additis oleis antehis paratum applicant. Suppurationem, quando materia aliter educi nequit, sed in eam vergit, promouent cataplasmaris concoquentibus & pus moventibus, quales sequens exilitatis probatum.

℞. Rad. lil. alb.

alib. ʒi.

flor. mel. lot. P. 1.

Cog. probe in aq. simpl. & contund.

postmodum add.

farin. sem. sænigr. ʒvj.

adp. gallin. ʒib.

Croc. ʒb.

F. Cataplasma.

Hoc applicato infimal exhibent gargarisma ex decocto caricarum, patiular. sem. malv. alth. sænigr. hinc si pus sit confectum, abicessum rumpunt digito vel calamo, vel candelâ cereâ, vel gargarismo quodam ruptorio ex sale armonaco, nitro aut sulphure in aquâ dissolutis, pure verò evacuato locum vel aquâ mulsâ, vel decocto caricarum, in quo mel rosatum fuit dissolutum, detergent, & tandem adstringentibus, siccantibus & sarcoticis ad integrum deducunt sanitatem. Non absimilem adhibent curam in Anginâ erysipelatâ à bile productâ, in quâ præter antedicta in usum ducta humorem peccantem evacuant specificis suis cholagogis, pilulis scilicet aggregatis. de rhabarbaro, de quinque generibus myrobolanor. & in nimia faucium angustia, ubi pilulæ deglutiri nequeunt, electuario rosato Mes. syrupo rosar. laxat, infuso rhabarb. in debilioribus verò & febre divexitatis cassiâ fistulâ, mannâ & syrupo aut melle violaceo. His præmissis ad minuendum nimium in parte calorem medicamenta adhibent repellentia, qualia sunt posca, diabatnon in decocto plantag. & flor. violar. dissolutum, decoctum hord. cum glycyrrhiz. & jujub. gargarismatum formâ usurpata, foris verò collum oleo rosaceo completo, & hinc oleo amygdalino inungunt, vel foveant spongiâ in decocto malv. alth. & sem. lin. tepide humectatâ. Tumorem *adematosum* abigunt remediis humorem frigidum & pituitosum evacuantibus, si prius oxymelle simplici vel scillitico, aut decocto hyssopi, origan. cinamom. & pip. incisus sit, & commodè præparatus. & pars accipiens debilior roborata, quare enemata applicant acriora, ex colocynth. agar. diaphœnic. Hier. sunpl. rad. pyreth. centaur. min. orig. calaminth. mercurial. sem. cumun. & similibus pa-

rata, hinc copiosorem purgationem promouent pilulis cochiis, vel ex Hier. cum agar. aut Hier. diacolocynth. paratis, impediens verò faucium angustia pilularum deglutionem, antedicta dissolvunt in jusculo vel alio conveniente vehiculo, ut commodius absorbeantur, quâ de causâ & infusum agarici, cui aliquid electuar. diaphœnic. vel diatubith. aut elefophi additum est, propinant. Nonnulli vomitoria exhibent ex veratro albo, elaterio, thymelâ cum sinapi in mulsâ aut sero lactis, quæ tamen ab aliis improbantur, ne humorum peccantium nimia copia ad fauces propellatur, & suffocatio inducatur. Gargarismata deinde exhibent ex incidentibus, ut decocto hyssopi, thymi, origan. rad. Ir. angel. flor. spic. sem. sinap. in aqua mulsâ paratis, & curam ut in prioribus absolunt. Tumori *scirrhuso* medentur humoris melancholici ulteriorem generationem, & in partem hanc influxum prohibendo, & genitiam & in parte consensitens immutationem per infusum sol. sen. Confect. hauech. pil. ex lap. Lazul. helleb. nig. & similibus, topica verò eadem penè adhibent, quæ in tumore œdematoso fuerunt denominata, emollientia potissimum. & leviter digerentia, ut tumor durus paulatim discutiatur, cui rei externè maximè convenire judicant emplastrum diachyl. magn. irat. de meliloto, mel anacard. ol. Irin. chamamel. laurin. & id genus alia. Ubi verò remediis hisce nihil proficitur, & de salute ægri desperandum esse videtur, ne hic ob cavitatem præclufam omnino suffocetur, cum *Arcligene* ad subscanationem aliqui pergendum esse contendunt, quâ dilectâ aliquo in loco arteriâ asperâ aëri adducendo & remittendo novus pareatur meatus, eamque ita instituunt, ut reflexo capite & dilectâ prius cute in collo, labia vulneris & vasa occurrentia hamulo diducantur, quo arteria aspera facilis in conspectum veniat, tum infra guttur sub tribus aut quatuor ejus orbitibus transversâ lineâ inter duos orbes constitutam membranam, intactâ orbium cartilagine, cultello incidunt, foramini fistulam præuream vel argenteam inserunt. ut meatus tamdiu maneat apertus, donec suffocationis periculum fuerit declinatum, quo tempore plagam denuo consunt, solam nempe cutem intactis cartilaginibus ac perforantes, & vulnus adstringentibus, sarcoticis & epuloticis ad perfectam deducunt curationem.

*Glandularum Colli Tumorem* eodem ferè modo curare & abigere solent, inhibendo ulteriorem humorum productionem & partem mandantem exsiccando, partem verò recipientem ab iisdem liberando, & molliorem & debiliorem roborando, ne ulterius humores suscipiat, hinc venam aliquando secant, si sanguinis influxus glandulas tumere faciat, si vero alii humores peccent, eos specificis suis humori cuivis idoneis evacuant, vel si in foliis partibus illis mollibus detineantur, & nulli præterea in corpore reliquo elaborentur, ex foliis glandulis depellunt, frictionibus, inunctionibus ex unguento resumptivo, dialtheæ, martiæ, oleo amygd. dulc. irino, laurino, camomill. lil. alb. præmissis aliquando totâ cû spongia ex decocto flor. camomill. melilot. herb. hyssop. origan. sem. lin. vel si discuti nequeat tumor, sed ad suppurationem tendat, eam promouent digerentibus, cataplasmate nempe ex rad. lil. fol. malv. far.

*Glandularum Colli Tumoris.*

# CAP. I. DE FAUCIUM & COLLI AFFECTIB. 245

far. trit. &c. additis cefipo, vel axung. porc. ol. lil. vitell. ov. & croco, ut in alijs tumoribus glandulas occupantibus & bubonum nomine occurrentibus.

*Paracelſi  
modus cu-  
randa  
Angina.*  
§. 14. *Paracelſus* priorum præcepta in *Angina*, seu *Squinantia* curatione minime obſervat, quin à phlebotomijs, purgationibus & ventofarum poſitionibus omnino præcipit abſtinere, & curationem poſt apoſtematis maturi apertionem uniç per gargarilinum incarnativum inſtituendam eſſe conſulit, cujus deſcriptionem ſequenti proponit formà.

*Mell. roſar. ʒiiij.  
Ariſtol. rotund.  
Pivol. aa. ʒß.  
Aq. de prunis  
prunell. aa. ʒvij.  
M.*

Gargarizet æger bis vel ter in die, ut intret apoſtema, quod baſſam naturæ tunc facile curari promittit. Quando verò apoſtema non fuerit apertum, Gargarilini huius uſum nihil profuturum eſſe admonet, quare ſi tumor adlit magnus, ſequens potius eidein ſuperponi vult digeſtivum.

*M. Alucilag. de ſænogr. ʒx.  
Cerviff. ʒij.  
Caphur. trit. ʒß.*

*F. Mixtura inſtar Cataplaſmatis collo im-  
ponenda, ut dolores & tumores mitigentur. Ca-  
pitis quoque calori nimio ſequenti proſpicit e-  
pilematem.*

*Aq. roſar. rub.  
huſſ. paſtor.*

*Solarii  
barb. jovis aa. pond æq.*

*M. & ei immergatur linteam, quod ma-  
didum ita ſuper caput alligandum.*

*Glandula-  
rum Tu-  
morum.*  
Glandularum Tumorum, ſi per ſe ipſum non diſpareat & diutius duret, per remedia humorem crudiores maturantia & apertionem, eodem ſermè modo ut ipſum bubonem curare conſuevit.

*Helmontii  
cura in  
Angina.*  
§. 15. *Helmontius* non adeo magnam ad *Anginam* curandam proponit apparatus, ſed multis remedijs alijs præfert ipſum nitrum, cui ſingularem in morbo hoc depellendo adſcribit virtutem; ejusdem verò Sectatores eidem addunt ſtercus caninum, niduſ hirundinum, ſedum majus, quæ medicamentæ proprietate quadam ſpecifica pollere dicunt contra vim anginæ ſtrangulatoriam, tum foris, tum intus adhibita.

*Glandula-  
rum Tu-  
mor.*  
Glandularum Tumorum curat laticem ſpiſſiorem reſolventibus & poros canteanos aperientibus, ut ita vitioſum per ſudorem eliminetur, & glandulæ in debitam elabuntur magnitudinem, ad quod impetrandum ipſum antimonium diaphoreticum, aliqua ſingularia quædam ſudorem moventia remedia ſummpere judicat proſicua.

*illicuſſi  
cura in  
Angina.*  
§. 16. *Wiliſſus* ad ſolvendam obſtructionem, & ſanguini motum neceſſarium reconciliandum, ejusdem emiſſionem per venam ſectam in *Angina* non modo approbat, ſed eandem etiam liberalius tum in brachio, tum ſub lingua celebrandam præcipit, ne ejusdem repetitio frequentior ſit neceſſaria, exiſtimat enim parciorem ad ſanguinem commovendum non ſufficere, quando verò liberalior ſemel fuit inſtituta, poſt hæc cucurbitularum cum ſcarificatione applicatio- nem ejus vicem aliquam ſupplere poſſe, eadem loco ipſi tumido imponendo, ut eo citius

ſanguis reddatur circulationi. Ad ejicienda recrementa, ne eadem ſanguineæ maſſæ ulterius communicentur, clyſteres commendat emollientes ex decocto malv. violar. cum prunis dulcibus, additis eidem ſyrupo violæ. & ſale prunellæ, nec non ut inflammationi ſimul in tempore eatur obviam, apozemata aut julpia, quorum formula ſequens pro exemplo exiſtere poſſunt.

*Rad. gramin. ʒß.  
taraxac. ʒj.  
liquirit. ʒvj.  
ſuccif. ʒij.  
Hord. Mj.  
ſol. ſonch.  
fragar.  
ſol. hepatic. nob. aa. Mj.  
paſſular. ʒj.  
ſlor. Papav. Rhaad.  
prunell. aa. Pj.  
Coq. in ſq. aq. ſimpl.  
Colatur. clarificat. lbij. add.  
Syr. junibin ʒij.  
violar. ʒj.  
Sal. prunell. ʒij.  
M. F. Apozema.  
Aq. ſlor. ocac. ʒvj.  
prunell. ʒiiij.  
ſlor. Papav. Rhaad. ʒij.  
Sal. prunell. ʒiſſ.  
Syr. ſemperviv. maj. ʒß.  
violar. ʒj.  
M. F. Julpium.*

Fortiora cathartica & vomitoria minus approbat, ſed mitiora tantum, ut ſunt decoctum caſſiæ cum tamarindis, addito ſyrupo de cichor. cum rhabarb. in principio tamen aut ſtatu periculoliſſimo vomitoria concedit, ut ſic evacuato ventriculo etiam fauces liberentur à ſuffocatione. Poſtmodum ut ſanguinis viſcoſitas diſſolvatur, remedia ſtercoraria & diaphoretica commendat, ut decoctum ſtercoris equini, vel ejusdem deſtillatum in Pleuritiæ ſimul approbatifſimum, nec non diſſolutio ſtercoris canini, quæ ſequenti ratione inſtitui poteſt.

*Stercor. canin. ʒj.  
Aq. Card. benedict.  
ſcabioſ. aa. ʒvj.*

*In his diſſolvatur ipſum ſtercus, agitando ſimul  
in mortario lapideo,*

*F. colaturaper linteam, cui add.  
Spir. æci ʒj.  
Syr. Papav. Rhaad. ʒij.  
M.*

Ex eodem ſtercore mediante Spiritu vini ſſato tincturam parat, quam ad triginta vel 40. guttas exhibet in vehiculo idoneo. Solidiora enim cum ob fauces præcluſas comunode nequeant deglutiri, liſſiden liquidiora merito ſunt præferenda, hinc & inter diaphoretica mixturam ſimplicem, ſpiritum fulig. vel C. C. præ antimonio diaphoretico aut Bezoardico minerali, quæ aliàs maxime forent accommodata. In uſum duci ſuadet. ne moram in faucibus inveniant, ſed citius penetrando ſubitanum afferant remedium. Externa verò non minus approbat pro faciliiori ſanguinis coagulati reſolutione & diſcuſſione, qualia ſunt gargarilmata, & cataplaſmata collo apponenda ex nido hirundinum, præſertim ſi materia in abſceſſum ſe convertere perſpicitur, tum pro faciliiori apertione materiam emolliat

Hh 3 cataplaſ-

cataplasmate ex rad. alth. sem. fœnigr. caric. flor. melilot. cum axung. gallin. & butyr. aut emplastro diachyl. magno, nec non gargarismate ex decocto glycyrrhiz. cum caricis; apertionem promouet Spir. Sal. armon. & ejecta materia purulenta fauces abstergit, adstringit & consolidat decocto rad. prun. sylvestr. aristol. rosmar. fol. rub. plantag. agrimon. prunell. flor. papav. rhæad. addito melle rosato & Rob. dianicum. In casu desperato & periculo suffocationis Laryngotomiam minime improbat.

*Glandularum Colli Tumores.*

*Glandularum Colli Tumores* abigit resoluventibus diaphoreticis, ut stagnatio prohibeatur, quæ sunt Gum. diaphoret. Sal. volat. C. C. Spir. ʒi. Decoct. rad. salic. parill. cum ras. C. C. & herb. Card. bened. Externè unguentum dialth. vel ol. amygd. dulc. camomill. cum ol. destill. succini inungit, nec frictions cum pannis calidis & succinosis infumatis institutas contemnit, cum & hisce liquores ad motum & fluxilitatem disponantur.

*Sylvii modum curandi Anginam.*

§. 17. *Sylvius* ad curandum legitime *Anginam* summopere necessariam ducit sectionem venarum raninarum, & ut in reliquis inflammationibus, remedia sudorifera sæpius exhibet ex aqua theriacal. & Spir. ʒci, addito interdum laudano opiato, hinc gargarismata suadet ardori faucium convenientia & subacida, ex decocto vel aquis solan. lactuc. portulac. plantag. prunell. ligustr. caprifol. additis interdum succis austriusculis mororum, citri, acetos. berber. & sale prunell. Topica à superioribus jam indigitata similiter adhibenda permittit, & quando abscessus ruptus fuerit, evacuatâ materiâ purulentâ ulcus decocto hœdei itidem cum melle rosat. & Spiritus Soli aliquot guttulis mandat, & consolidationi præparat.

*Glandularum Colli Tumorem.*

*Glandulæ Colli* tumefactas & induratas curat medicamentis incidentibus, attenuantibus & sudorem simul moventibus, ut non modo pituita in glandulis coagulata solvatur, & mobilis facta à loco, in quo p. n. hæret, removeatur, vel in vasa sua reducatur, sed illud etiam, quod poros cutaneos obstruit, foras propellatur, quod effectui dari promittit sequente mixturâ cochlearum assumptâ, & corpore ægri decumbentis ad sudorem promouendum mediocriter recto,

ʒi. Aq. sumar.

ʒan. aa. ʒi. ʒi.

theriacal. simpl. ʒvj.

Spir. ʒci gutt. xx.

Bezoard. min. ʒb. vel

ʒi. diaphoret. ʒj.

Syr. Card. bened. ʒj.

M.

Suffitum ex carabe, mastiche & similibus etiam approbat, nec non frictionem blandam glandularum eodem suffitu linteis excepto, quo non modo humorem pituitosum in glandulis hærentem solvi astringit, sed glandulas etiam ipsas in pristinum statum reduci, & adversus novas æris injurias muniri & roborari, cujus rei gratiâ & easdem unguento martiato & alther composito suadet inungi. Quando verò inflammatio simul juncta fuerit, eodem modo, ut in priori affectu, aut Tonsillis inflammatis, curationem in profectu, hoc tamen sedulo observato, ne adstringentia imprudenter adhibeantur, sed emollientia & incidentia, & aque tepida, ut eo melius humor pituitosus obstruens & sanguis aut in vasis sub-

sistens, aut in glandularum substantiam effusus & accensus corrigantur, aut si hoc præstari & suppuratio impediri nequeat, eam emollientibus & blandè incidentibus aromaticis promoveat, & quoad reliqua uti in aliis apostematibus procedit.

§. 18. *Carresianus* placet, ut in *Angina* ritè curanda ea feligantur & adhibeantur remedia, quibus tubuli musculorum faucium à re quavis molestâ liberentur, ne quid ulterius in iis contineatur, quod poros obstruendo aut angustando, exclusis secundi elementi particulis. solas primæ rapidissimas separatim admittat, à quibus violentius cum moveatur & agitur, particulæ pungentes huc illuc verantur, & modò fibrillas nimium tendendo & agitando cum inflammatione dolorem, modò comprimendo faucium angustiam & deglutendi summam inferant difficultatem. Hæc verò remedia nec venæsectionem, nec refrigerantia, nec repellentia, nec adstringentia, nec purgantia deprædicant, sed opportuna remedia sudorifera summè penetrantia, angularis pungentes succorum irregulariter in faucium partes effusorum particulas domantia, hebetantia, aut à quiete in motum disponentia, & tandem dilatatis aliquantulum poris, per salutarem quandam exhalationem ejicientia, quali virtute præditam sequentem laudant mixturam parvis intervallis cochlearum exhibendam in loco calido, aut ægro adhuc in lecto constituto, ut sudorem expectet.

ʒi. Aq. Card. Mar. ʒijj.

ʒabiof.

ʒor. sambuc. aa. ʒij.

Tinctur. myrrh. cum Spir. vini.

ʒiat. parat. ʒb.

Spir. vini camphorat. ʒj.

ʒci ʒb.

Syr. Scord. simpl. ʒijj.

M.

Vd:

ʒi. Aq. menth. ʒb.

tragopog. ʒij.

Tinctur. Croc. ʒij.

Spir. ʒor. sambuc. ʒj.

ʒe volat. ʒb.

Rob. sambuc. ʒj.

Syr. Card. bened. ʒijj.

M.

Ut pori cutanei magis adhuc pateant, & materiam peccantis evaporationem liberius permittant, collum undique lanâ succidâ carptâ, & super prius gum. anim. & succino perpersis calefacta circumdant, & quando lana illa non satis humet, aut sale volatili urinoso abundat, eandem jam calidam & collo apponendam adspersunt spiritu urinx, ita enim & intus & foris diaphoretis facili negotio promovebitur. His remediis prudenter adhibitis, si respiratio ab ægro percipitur liberior, & sufficiens inde colligatur indicium, remedia solidiora deglutiri possent, instant etiam diaphoreticis pulveribus, quicquid angulare profundius absorbentibus, & cum corpore ad sudorem disposito nullibi in eodem quietâ permaneant, secum per poros dilatatos auferentibus, qualis sequens existit mixtura.

ʒi. Aq. Tragopog. ʒb.

galic. ʒij.

ʒi. diaphoret. ʒj.

myrrh.

ʒ volat.

# CAP. I. DE FAUCIUM & COLLI AFFECTIB. 247

Volat. C. C. aa. gr. vj.

Camphor. gr. ij.

Syr. Scabios. ʒb.

M. & ut omnia probè solvantur, agitata exhibeantur cochleatim, sed continuatò. Periculo ita aliquantum superato, etiam colluvium quoddam exhibent, quo levisculè solùm gargarizando aut deglutendo, aut in ore tenendo faucium partes inflammatae aut tumidae sunt attenuenda, & hoc sequens est simplicissimum & proinde optimum.

ʒ. Aq. Caprifol. ʒvj.

ʒ. li. alb. ʒij.

M. ad dissolutionem ʒli.

Si contingat affectui huic alvum simul jungi adstrictam, eandem etiam liberant, ne curationi reliquæ offerat impedimentum. quapropter die à sudatione libera sequens injici præcipimus enemæ.

ʒ. Decoſt. lenitiv. ʒviij.

In eo diffuso.

Extrah. hier. pier. ʒb.

Ory ʒat. ʒj.

M. applicet tepidè.

Cùm verò curatio hæc in tempore institui nequivit, sed fibræ motu ætheræ materiæ violentiori jam fuerint ruptæ, ut in foveâ quâdam liquor chylosus copiosius fuerit collectus, & ab austeris particulis corruptus, adeoque abscessus productus, commodam tunicarum attenuatorem & emollientem, seu ut vulgares loqui amant, suppuratorem promovent inunctionibus unguenti dialth. & ol. scorp. f. nec non cataplasmatum oppositione; ex quorum numero sequens illis satis exitit approbatur.

ʒ. Pulv. Nid. hirund. cribrat. ʒb.

Rad. lil. alb.

flor. camomill.

sambuc. aa. ʒj.

farin. fabar.

sem. saniger. aa. ʒb.

Coq. in lacte ad pulvis consistentiam, cui adde

ol. lil. alb. ʒij.

viell. ovi No. j.

Mell. commun. ʒj.

M. imponatur collo tumido tepidè, & quovis bilorio renovetur: hunc

ʒ. Flor. Malv. arbor. P. iij.

Herb. Hedcr. terrestr.

agrimon. aa. Mj.

Rad. tarax. ʒj.

fr. flor. ʒb.

Cavicar. incif. No. iij.

Coq. in aq. f. Colatur. ʒb. add. alb. grac. subtiliff. pulveris. & cribrat. ʒij.

ʒci ʒj.

Rob. sambuc. ʒj.

Syr. absinth. ʒij.

M.

Aperto his brevi tempore abscessu, pus exspuendum præcipiunt, & ulcus sequenti gargarinate mundandum, ut sponte sua postmodum consolidetur & fauces pristina sua constitutione struantur.

ʒ. Decoſt. salu. veron. & flor.

ligustr. ʒb.

Tinctur. ʒiij.

Spiritu Salu ʒj.

Syr. de ros. siccis ʒij.

M. pro Gargarismate.

Rebus ita secundum methodam hanc sedulo gestis, omnia votis cedere promittunt, nec laryngotomia ulla opus esse audacter satis pronuntiant.

In Tumore quoque Glandularum jugularium ad lympham spissioretem resolvendam diaphoretica commendant sæpius in usum vocanda, ex bezoard. min. Sal. volat. C. C. liq. C. C. succinat. ellens. rorismar. & similibus quibus lymphæ resoluta partim per poros exhalat, partim fluidior remeat in vasa, & glandulæ convenientes pristinam recuperant formam. Hoc verò præstabit iidem sequens mixtura.

ʒ. Aq. sumar. ʒij.

rorismar. ʒij.

Essent. chamædr. ʒj.

Spir. C. C. essentif. gr. xx.

Syr. Card. bened. ʒb.

M. D. una vice.

Potui ordinatio, qui vel vinum mitius, vel cerevisia tenuis sit, imponunt nodulum ex rad. imperator. fernic. farfaparril. ratur. ligni Junip. fol. rorismar. salu. chamædr. heder. terrestr. scabios. flor. sambuc. beton. sem. fernic. &c. Frictiones minimè contemnunt & glandulas indutas aliquoties calidè inungunt ol. camomill. lumbricor. scorpion. & desibill. anif. invicem mixtis, vel Spiritu lumbricor. Sale volat. viperar. imprægnato, aut si tumor huius non cedat, emplastrum diachyl. simpl. camphoratum, vel mixtativum & emolliens Myrsicr. oleo lumbricor. malaxatum imponunt, quibus si tumor non discuti, sed ad suppuratorem disponi videatur, eandem promovent, & more consueti ut in aliis abscessibus parotidum aut bubonum curationem expediunt.

§. 19. Perceptis ita aliorum sententiis & Nosstra methodum nunc brevibus anneximus, ne quid ad impetrandam salutarem curationem videatur omissum esse operæ ac diligentie: equidem si in nullo morbo cunctari malum, in hoc certè pessimum erit, quia suffocationis periculum summum adeſt, ea propter omnem movebimus lapidem, ut potentissimum hostem Cardineſechi interitum minantem extremis prædiciis maturè aggrediamur. Alſ hoc opus. hic labor est. ut agendorum ratio & ordo certissimus innoteſcat. Ergo ante omnia ad causæ morbi hæc existipationem procurandam nos accingemus, cum ea ablata, & morbus, & symptomata, tanquam effectus cessent; cumque causâ morbificâ Anginæ ut plurimum sit acidum acre tum sanguini, tum lymphæ reliquisque succis artius inhaerens, à quo stagnatio inducitur, eam illico refecanda est, quare si stagnatio hæc humorum tanta sit, ut à musculis tumentibus suffocationis periculum immincat, vena secanda venit. Secunda verò vena in brachio, si maturè vocatus fuerit Medicus, aut in pedibus alias autem sub lingua, ita enim non copia dumtaxat evacuat, sed & commovendo sanguinem ad citiorem fluxum, obstructio facta facilius resolvitur, interdum enim sola sectio venarum raninarum præcavet angustiam, saepe enim Angina in principio hæc curatur. Quod si æger veneſectionem non ferat propter virium debilitatem & ætatis infirmitatem, vicariæ possunt esse cucurbitulæ cruribus apponendæ, quam evacuationem quoque utilem existimat Hippocr. S. V. de Morb. iten Benivenu lib. de abdu. morb. caus. cap. 38. historiam narravit.



narrans de quodam anginoso, qui cum ab aliis Medicis pro deplorato relictus fuisset, ab eo liberatus est profundis scarificationibus sub maxillis & ipsa cervice celebratis. Venæsectionem ut & scarificationem pro renata repetenda dicit Galenici: novimus tamen plures, qui a nobis absque venæsectione sunt curati, unde colligitur: ipsam non esse necessariam, sed ne vulgus anamatriptat calumniandi, concedi aliquando potest in Cynanche ad 3ij. quamvis n. V. S. ad sanguinem in fibris stagnantem per arterias eliminandam nequam valeat, efficit tamen quod immittit aliquantum cruoris copia, sanguinis perpetim affluentis particulæ stagnantibus tam copiose non adhaereant. neque fomentum inflammationi accedat. Inter prophylactica remedia quoque refertur fonticulus in brachio excitatus. Purgantia verò angue pejus fugienda sunt, sed si feces induratae intestina onerent, enemata adhibeatur emolliens, cujus sequens esse potest formula.

℞. Rad. alr. ʒß.

fenic. ʒij.

bryon. ʒj.

Herb. mult.

violar.

branch. urfin.

bon. henric. aa. Mß.

flor. malv. arbor.

Camomill. aa. Pj.

sem. lin. ʒß.

Consis. coq. in l. q. aq. simpl. in Colat. ʒviij. dissolv.

Elect. benedict. laxat. ʒvj.

Mell. mercurial. ʒß.

vittel. ov. No. j.

ol. lil. alb. ʒj.

Ori ʒiij.

M. F. Enemata epidē applicandum quāvis horā dici.

Loco enenatis utiliter etiam exhibebitur per os in iusculo assumentum ol. amygd. dulc. cum cremore ʒi, ex gr

℞. Ol. amygd. ʒj.

Cremor. ʒj ʒj.

M. D.

Sedulo etiam distinguenda est Angina à Tonfillarum tumore & inflammatione, prior enim sæpius feliciter bezoardicus curatur, posterior anticatarrhalibus. In maligna Angina & epidemica ante omnia conveniunt blandiora diaphoretica, quæ in curatione pmineserunt punctum, acidum absorbendo, & succos peccantes per diaphoresin eliminando, quæ præsidiorum universaliū nomen & partes sibi meritiūssimo suo vendicant pure, & reliquis palmam reddunt dubiam, momentaneumque, siu tempore in usum vocentur, auxilium conciliant, utpote quæ salinas acres particulas in partem delatas corrigunt, acidum infringunt, & per universum corporis emunctorium expellunt, sicut à parte affecta avertunt. Hijs hinc inserviunt C. C. Oare sal C. C. volat. card. bened. antihæst. Poter. dentes apri, & omnia quæ in pleuritide profunt, Mixtura simpl. ʒ theriac camp. Theriaca, Tinct. Bezoard. spiritus ʒi cum additamento aliquo, rad. vincetox. cabiol. cum syr. papav. rhæad. aq. scabios. plantag. flor. sambuc. omnia enim, quæ in pleuritide alijsque inflammationibus conducunt, & hic profunt; ubi observandum, diapho-

retica hic non in pulveris, neque boli, neque pilularum formā danda, ob summam deglutendi difficultatem, sed potulenta propinanda; In maligna, seu majori malo, & epidemica alexipharmaca interponenda, & pro re nata granum unum theriacæ celestis addi potest. Proderit quoque decoctum ex rad. chin. falsaparill. & herb. scabios. add. mell. ros. & parum lap. prunell. vel arcan. duplicat. Inter ea verò dum deglutendi difficultas permanet, ne aut ob alimentorum defectum plantæ enecetur, clysteres in usum ducere licet, quæ parantur ex lacte, brodio carnis agniæ, vitulina, bulula, pullarum, cum vitello ovar. paucio vini generosi, non acidi aut aulteri, ne coagulationes excitentur, & commoda nutrimenti distributio adhuc magis impediatur.

Sed non adeo diu differenda sunt Topica, quæ hoc in morbo toties salutaria reperta sunt remedia, eaque existunt vel gargarisimata, vel linimenta, vel unguenta, vel cataplasmata, vel emplastra resolventia & discutientia succos stagnantes acidos, & inde natam inflammationem, qualia sunt blanda incidentia, volatilia aromatica, &c. Sequenti gargarisimato nonnullos feliciter curavimus.

℞. ʒ flor. sambuc. ʒij.

plantag. ʒj.

Spiritu vin. ʒvj.

\*ci. gr. xx.

M.

Quando verò æger nequit gargarisare, aut timeundum est, ne fauces magis irriterentur, tunc præstat gargarisimū sæpius solummodo in ore detinere, absque ejusmodi faucium commotione. Vel:

℞. Decoll. flor. sambuc. ʒviij.

ʒ flor. sambuc. ʒij.

Spir. vin. ʒsat. ʒij.

\*camphorat. ʒj.

Mell. rosor. ʒß.

M. F. Gargarisimus.

Sufficit solus spir. vini cum albo graco pro Rusticorum gargarismo.

Sequens verò experientia nostrā comprobatus est gargarisimus, quocumque morbi tempore usurpatus.

℞. Decoll. fol. salic. lbj.

Spir. ʒci ʒij.

Sacch. canib. q. l.

M. F. Gargarisimus.

Quidam urinā propriā se gargarisant, sed præstat sine ulla agitatione talia detineantur in ore, capite retrò deposito, donec incalcescant, dein exspuantur & repetantur subinde. Pro resolutione & discussione non placent unguenta, potius salia volatilia & quæ nullas obstructions possit se relinquunt. Ex. gr.

℞. ʒ volat. ʒij.

Solv. cum pauc. quant.

ʒ flor. sambuc. add.

butyr. recent. vel virid. ʒj.

M. F. Linimentum.

Velexternè circa collum imponantur lintea duplicata ~u vini camphorato madefacta, vel aqua Regin. Hungar. vel aq. theriacal. camphorata, quæ egregia erit. Nimis adstringentia quocumque morbi tempore atro carbone notamus & proscribimus, cum malum indurando & acidum augendo magis nutrant, quam solvant. Laudamus verò sacculum ex croco & floribus sambuci circa tumorem applicatum, item empla-

stema

strum ex rob. sambuci, nitro & vitello ovi paratum. Refert etiam Cardanus lib. 7. de variet. rer. cap. 15. quod rubeta cocta & pro emplastro imperta adeo anginosi proflit, ut quendam jamjam moriturum auxilio hoc liberarit, creditque & filium, quo rubeta suspensa interit, conferre.

Sed si tumor iste cum inflammatione discuti non potest, vel neglectus fuerit ab initio, de suppuratione cogitandum est, in hunc finem conveniunt varia mitigantia & emollientia temperata. Sit vero in juniorum gratiam sequens formula.

℞. Flor. scabios.  
malv.  
chamomill.  
melior.

Ficem, aa. M.

Rad. liquoris, ʒi.

alb. græc. ʒi.

Cog. in aq. simpl. vel lacte informam cataplasma.

Eismülleri cataplasma singulariter etiam existit proficuum, quod paratur ex medulla panis tritice. ℞. rad. alch. lil. alb. aa. ʒi. sem. lini ʒvi. fœmige ʒß. quibus in lacte coctis ad consistentiam pulvis & per setaceum trajectis addit ol. amygd. dulc. lil. alb. aa. ʒvi. butyr. recent. non salit. ʒß. Croci ʒi. vitell. ovi No. ij. Prodest quoque cataplasma de nido lurund. *Myrsiciti*, nitrofa enim quàm maxime conducunt, & tàm discussi, quàm suppurationi inserviunt. Vi vero hæc nitrofa prædita sunt omnia stercorea, quæ multum ❧ci & niri continent, nec non pulvis nocturæ cumpennis combustæ, vi sua lixiviola volatili non parum commodi præstat. Loco cataplasmatum istorum sumatur lana sub collo oviùm cretens, illinatur oleo amygd. dulc. & oleo ʒi per deliq. vel oleo scorpion. & imponatur. Cataplasma verò quod paratur ex salibus volatilibus aromaticis, Camphora & Theriaca, optimum est sæpius in die & ab initio motui applicatum, interpolitis internis sudoriferis, si vero quis suppurationem desiderat, paratur cataplasma ex alio, gummi. ❧ci.

Cum abscessus ruptionem imatur, catæ in ore teneantur juxta locum affectum, vel coquantur in lacte & ore detineantur. Quod si maturatus fuerit abscessus, aperiendus est, quod fiet, si illinatur abscessus cum melle & albo græco, vel decocto sinapi ʒi. in hydromell. libj. aut si attingi potest, aperiatur scalpello. Rupto abscessu abstergentia vulgo dicta usurpanda sunt. Esto formula.

℞. Syr. de ros. sic.  
violar. aa. ʒi.  
Aq. flor. sambuc. ʒi.  
M. & sæpius assumatur.

Ad ulcus mundificandum & consolidandum convenit decoctum hord. libj. cum melle ros. ʒiij. vel decoctum plantag. veron. cum melle. Si ulcera sint contumaciore, ad præscriptum *Silvis* melli rosato addi potest spiritus salis q. si ad suavem aciditatem. Si fordidiora fuerint ulcera, conveniat aqua viridis *Nateri*, vel *Hartmanni*. Consolidat postmodum ejusmodi ulcera decoctum veron. cum melle, addito momento alum. usti.

In extremâ necessitate etiam approbamus opportunum illud auxilium Chirurgicum nempe, Laryngotomiam vulgo, sed rectius Bronchotomiam dictam, quæ à *Paulo Æginetâ* lib. 6. cap. 3.

passim yoropia nominata in summâ respiciendi difficultate proponitur, & à *Marco Aurel. Severino de Selt.* p. 2. maximo extollitur opere, & non modo ab *Archigene*, ut superius jam *Galenici* retulerunt, sed etiam ab *Asclepiade* & *Anthillo* usurpatum creditur remedium, ut ex *Paulo Æginetâ* loco citato videre est, quam Bronchotomiam *Cl. Blankardus* in *Collectaneis* suis Medico-Physicis ex voto institutam fuisse testatur. Sic *Cl. D. VValdschmidtus* cani strangulato laryngem incidit & halitum inflavit, inde canis reviviscere cepit, & larynx faucibus iterum coaluit. Perficitur autem sequenti modo: Scdio per longitudinem myrtiformis in collo sub larynge fit cutanea, factaque cutis diductione inter tertium & quartum annulum bronchi cartilagineum, & quidem in medio membranaceo foramen aperitur, in quod foraminulum dein cannula plumbea, alis prædita, ne introitum rapiatur, induitur, tandiuque ibi relinquitur pro aëris summe necessarii reciprocatione, donec tumor cessaverit, tunc enim removetur & locus apertus consolidatur.

Quoad Anginam minorem, veteribus male notham, aliis vero albam dictam, de qua fac prolixè *Mindererus* in *Medicina Militari* p. 109. tractat; ubi scilicet lentor seu lymphæ viciatæ fauces & linguam obfudet, prodest abstergeri mediante limbo & sambuci humectato, & fiat gargasium cum decocto vel aq. ligustri cum paucis ❧ci addito momento ❧ci. Sic & rob nucum, diamor. cum melle rosato conveniunt, vel sequens gargasium polychrestus in uvulæ exulceratione simul congruus.

℞. Herb. malv. hortens. Mj.

salv. Miß.

flor. ros. rub.

prunell.

veron. aa. Mß.

rad. polypod. qm. ʒi.

Cog. in aq. prunell. libv.

& vini ʒvi.

usque ad casum transversis pollicis, postea colentur, & Celatura leniter exprimitur.

Si verò fauces obfidentur à succo salso & Tonsillæ sunt inflammatae, conveniunt varia anticatarrhalia vulgò ita dicta, ut sunt cinabarina, liquor C. C. succinat. Cephal. n. d. Nervinus, &c. item Rob sambuci in aquâ sambuci solutum multum juvat pro gargasinate usurpatum. Externè vetrici capitis innungatur balsamus succani, vel imponatur fermentum panis cum thure & succino, aut ❧ci vini, & sistris ex thure, mastich. succin. gummi. animæ, aliisque pulveribus anticatarrhalibus institui potest, omnia enim hic profunt, quæ de catarrhis diximus, unde & nuces moschatæ singulare commodum præstabit, si loco tabaci fumentur.

In Tumore & obstructione Glandularum Jugularium colli à materia acidâ viscidâ, conduunt præ omnibus, quæ acidis corrigunt, & obstructionem factam tollunt, ut sunt omnia volatilia præsertim liquor C. C. succinat. cum essent. viperin. Zvvelf. permista & sæpius data & in his affectibus ad primas vias sæmpet recipiendum est, ne chylus acefcat, quare cum in sinem conducunt varia abortientia, Martialis, item amara, pro specifico hoc in casu commendamus essentiam carminativam cum Elixir. antiseptic. *Myrs.* marti-

li catarr.



tatam & diu usurpatam, dein, si lymphā nimīa copiā peccare videatur, interponantur diuretica, ut serum viscidum non tantūm incidatur, sed evacuetur, in quem finem convenit momentum salis aperitivi, card. bened. ablinchii. Laxativis tamen merito præferuntur diaphoretica, non modo lympham crassiorem incidentia & acidum corrigentia, sed per apertos poros etiam abundantiam ejus ejicientia, ut residuum post-hæc facilius à vasis absorbeatur & glandulæ liberentur, quapropter quovis tempore sequentem exhibere licet mixturam.

*℞. Aq. flor. sambuc. ʒij.  
Essent. Card. bened. ʒj.  
Spiritus vin. camphorat. ʒʒ.  
liq. C. C. succinat. q. xv.  
Syr. de Sord. simpl. ʒʒ.*

*M. D.*

Post evacuatam lympham acidum corrigatur, & obstructio in glandulis tollatur volatilibus oleosis, inter quæ excellit  $\Theta$  volat. oleos. nostr. ad paucas guttas per mensem & ultra usurpandum, quod rarò te fallat. In ulceribus faucium experientia nostra seq. approbatum fuit.

*℞. Theriac. Andr.  
℞. dulc. aa. ʒʒ.*

*M. F. pil. No. 30.*

dentur inauratæ, dentur ʒ. singulis vespertinis horis.

In tumore glandularum catarrhali inter remedia salutaria merito numerantur cinabacina & succinata, & quæ toties his in affectibus subitaneum præstiterunt auxilium, insusa lignorum & herbarum anticatarrhaliū in vino, ex quibus sequens formula tyroni interviat pro paradigmatæ.

*℞. Rad. Enul. ʒʒ.  
caryophyllat. ʒij.  
arist. rotund. ʒij.  
Imperator. ʒj.  
Rafser. lign. sassafr. ʒʒ.  
Guajac. ʒij.  
Cori. tamerisc.*

*fraxin. aa. ʒij.*

*sol. rosinar.*

*Herb. majoran.*

*serpill.*

*menth.*

*salv. aa. Mʒ.*

*flor. cent. min.*

*betan. aa. P. j.*

*baccar. junip. ʒʒ.*

*Mac. ʒij.*

*Cass. lign. ʒj.*

*Exhibet. a. paretur Nodulus,*

menstræ vini impendendus, de quo singulis diebus ter ʒij. hauriantur. Essentiæ salassas, salviæ, rosinarini, aliæque loco vini illiusmodi medicati ordinario potui instillari possunt, & cum salibus volatilibus acuatæ etiam aliàs in vehiculo convenienter exhiberi. Maxime tamen hic conveniunt prout in omnibus Tumoribus Mercurialia, imprimis pilulæ nostræ polychrestæ ex Turbith. Miner. M. ʒʒ. & Theriac. And. ʒj. paratæ, ʒ. ad ʒ. vesperti exhibenda.

Inter Topica aliquoties magno cum fructu impoſui Emplast. diachyl. simpl. oleo petræ malaxatum, Vigon. cum ʒio, crocatum *Mysichii* & polychrestum nostrum, quod paratur ex sale ʒco, minio, camphorâ, vitæ ʒij & cerâ, gummiata enim glandulæ haud æque ferunt. Sæpe etiam magno cum emolumento ejusmodi Tumoribus relolvendi gratiâ impoſui julli  $\Theta$  commune tollum, &  $\Theta$  ʒco mixtum in tacculo. Conveniunt quoque suffragigia ex maceratione flor. sambuci, camomill. & ten. carvi in spiritui vini, item solo spiritu convulsivo, vel spiritu matricali aloë maritæ, nec non illinitiones ex oleo anygd. dulc. castor. destillat. camomill. menth. majoran. carvi, balsamo ivervino, &c. calidè adhibitz, quibus interdum facillè discutuntur. Quando verò discussio impetrari nequit, opera danda est, ut suppuratio promoveatur cataplasmaticis ex superioribus jam cognitis, ut ità abscessu aperto materia peccans funditus tandem ejiciatur.

## CAPUT. II.

### De Strumis & Bronchocele.

#### §. I.

**E**st Creatoris Sapientissimi benignitas, ut nientis humanæ habitaculo non modò membris ad usum vitæ prospexerit necessariis, sed eadem etiam ipsa tam pulchro collocaverit ordine, ut cuius intuitu singularis inde emergat venustas. Quis enim non facillè perspiciat, quam concinnè caput inter & thoracem collocatum sit Collum, ut hac parte etiam singulariter superbiere soleat sexus femineæ, toties erecto incedens collo, illudque sub jugum flecti sæpissime impatiens. Quin pulchritudinem hanc variis adhuc aliis ornamentis commendare studet, ut ob cultum hunc eruditis quibusdam Collum à colendo dictum fuisse rectè videatur, sæpe enim torquibus, monilibus, margaritis, auro & argenteo mirum in modum vestitur, ut in luxum & superbiam desileant, Deusq; benignissimus iustè irā in penam imittendam, excietur, ideoq; loco margaritarum aut globulorum aliorum variis excrescentiis morbolis Collum hocce deturparti permittat. Inter Excrescentias verò,

quæ in Collum emergere solent, imprimis recensenda sunt *Struma*, seu *Scrophula*, Latinis Extuberantiæ, seu Excrescentiæ glandularum collidictæ, item Hydrops glandularum Collis, Germanis *Kropff*. Vocantur autem *Scrophulæ* *Scrophis*, id est, porcis, quoniam scrophis seu porcis, vel porcellis frequenter in collo inhaerent ejusmodi glandulæ, vel quod sues multos pariant porcellos, & ità multæ *Scrophulæ* simul in collo nascantur, unde *Felix Platerus* *Scrophulas* *Strumis* rectè distinguit, quod *Scrophulæ* plures sint & minores, *Strumæ* verò pauciores & majores; suntq; tumores parvi materiam steatomatæ propria tunica inclusam continentes, & si tumor est magnus & solitarius, magis ad carnis naturam vergens, tunc vocatur *Struma*. Addunt & aliud *Strumæ* genus. quod dicitur *Bocium*, *Bronchocele*, seu *Hernia gutturis*, aliquando majorē carnis formam induens, & verum collis fungū constituens. Ut plurimum tamen hæc *Strumæ* diversæ genera ab omnib; inter se confunduntur. Incolæ quædam

*Struma Scrophula.*

*Bocium Bronchocele.*

*Collum à colendo dictum.*

ut

# CAP. II. DE SCROPH. STRUM. & BRONCHOCELE. 251

ut Cariothæ & Syriæ omnes ferè à scrophulis vexantur, quare *D. Horn* Alpinos aut strumulos esse & caecos.

*Descriptio  
Scrophulae  
& Strumae.*

*Descriptio  
Scrophulae  
rurum.*

*Broncho-  
cele.*

*Esus de-  
scriptio.*

*Paraffa-  
tis Stru-  
marum &  
Scrophula-  
rum.*

*Broncho-  
cele.*

Scrophulae & Strumae sub duplici sunt differe-  
rentia, vel enim sunt immobiles & pendulae, vel im-  
mobiles seu fixae, quae reliquis partibus profun-  
dius intertextae & quasi radicatae sunt; tactu vel  
molles, vel dolentes, vel indolentes: à quibus-  
dam etiam dividuntur in benignas & malignas.

Defectus possunt, quod sunt tumores duri  
glandularum conglomeratarum colli, vel saliva-  
rium dictarum, ob crassitiam & visciditatem lym-  
phae aliorumque succorum ab acido ibidem sta-  
gnantium & tubulis obstruentium producti.

Bronchocele ad mentem *Celsi* inter cutem &  
aspirat arteriam intersevit, in quo modo caro  
hebes, modo humoralis quae mellis aequae similis  
includitur, interdum etiam minutis ossibus pili  
immixti sunt, vel, ut à *Foresto* observatum, pe-  
diculi vivi. Defectus vero potest, quod sit tumor  
partium mollium prope bronchia, à distensione  
& dilatatione violenta membranae asperae arte-  
riae, nervorum, musculorum & ipsius collicu-  
tis, in formam sacculi, in quo succi postmodum  
colliguntur & flagrando ab acido coagulantur.

§. 1. Pars *glandulae* Strumarum sunt glandulae  
conglomeratae dictae colli; notum enim est ho-  
dierna accurata inspectione Anatomica, oscheima  
conglomeratarum planè diversum esse à conglom-  
eratis, uti videre est in *Hepate*, cujus glandulae ad  
separationem & trascolationem bilis infer-  
viunt. Pancreatis verò glandulae ad succum pan-  
creaticum, sic glandulae salivales ad salivam. Sed  
haec videamus, revera utrum planè illarum glandu-  
larum diversum esse, lympham tamen & saliva  
vix admittunt differentiam, si utrasque lapide  
Chymiae Lydio probaveris. Et quod in istis,  
qui scrophulis laborant, non duntaxat glandu-  
lae istae salivales afficiantur, sed & aliquando in-  
ternae, non ita pridem observavi, dum non tan-  
tum glandulas in collo, sed totum quoque bra-  
chium cum scapulis scrophulosum deprehendi  
in filia mercatoris hujus civitatis mortuae, in cu-  
jus meienterio, aperto cadavere, plures quàm  
mille glandulas parvas tumidas observavi. Con-  
fer etiam *Obser.* annotat. *Pa. la Barbette* in sua  
*Praxi*, lib. 2. cap. 2. quod enim aperui, eorum  
meienterium strumulosum inveni: confer *VVar-*  
*thonium in Adenogr.* cap. 49. de Strumis, alios-  
que. Proinde certum est, glandulas meienterii  
plerumque affectas & strumulosas esse in illis, qui  
à scrophulis vexantur in his regionibus, illas  
enim semper iusto majores, & duriores inveni,  
quam alias esse solent; & in promptu causa est,  
quia succi in corpore nostro ab acido crassi, lu-  
tosi & ipsi facti ubicumque remorantur & sta-  
gnant.

Bronchoceles sedes proxima sunt membrana  
duplex Bronchi, sive Fistulae pulmonalis, alias  
Tracheae & Arteriae asperae dictae, uti & nervi  
eam comitantes, hinc in magno conatu valde  
distendi intumescant, & dilatantur, aliquando  
etiam convolvuntur & dispositionem ganglio-  
formem nanciscuntur, sicque musculos & cu-  
tem colli simul extendunt, & succi illabentes  
coagulati & stagnantes partes haec in extume-  
scentia detinent & conservant. Notum verò  
est ex Anatomico, Fistulam hanc esse canalem  
quemdam cartilagineum membrana duplici, ex-  
terna à pleura, & interna à tunica palati prona-

ta obductum, aërem ad pulmones inferentem,  
atque in homine ipsi incumbere oesophago, ubi  
ab ore recta deorsum per collum ad pulmones  
procedit, cujus caput ori proximum Larynx di-  
citur: alterum extremum ad quartam thoracis  
vertebram in ramos duos dividitur utrinque  
pulmones ingredientes, & successivè in ramulos  
alios distributos, donec ad pulmonum superfi-  
ciem extremam in ramulos minutos desinant, in-  
termidia verò Fistula pars Bronchi est, & *de re  
Medica* facta etymologia, quod potu ad eam  
depluente irretitur. Hanc Fistulam praeter ve-  
nas à jugularibus, & arterias à carotidibus com-  
municatas, etiam nervi à recurrentibus sicuti par-  
tis producti comitantur, quorum ii, qui in dex-  
tram Tracheae partem emittuntur, annulos ejus  
deorsum movere pro inspiratione & voce gravi,  
qui verò in sinistram utrinque exeunt, annulos  
pro expiratione & voce acuta sursum attollere  
& *Villisi* creduntur, in quibus aliquando affec-  
tus hic solet primario herere. Deinde in qui-  
busdam regionibus contingit, ut membranis hi-  
sae illas soli muscoli, sive Longi, sive Scalenii,  
sive alii afficiantur, sunt enim utrinque qua-  
tuor, quorum praeter dictos adhuc recensentur  
Transversales & Spinati, atque in illis dum fibrae  
tubulorum à crassiore succo ab aqua & reliqua  
diata communicato tenduntur, & cutis simul  
depellitur & in protuberantiam extenditur:  
aspera verò arteria & oesophagus preminuitur &  
compressione tali angustantur, sed tum est affec-  
tus inproprie dictus, ut in *scroto Pneumato-  
cele*, Hydrocele, & species quaedam aliae, non  
Herniarum, sed Tumorum lenei inferenda.

§. 2. *Diagnosis* ipsarum Strumarum & Scrophu-  
larum non ita difficilis, tumor enim in collo unus  
vel plures adiunt duri & saepe sub glandula for-  
ma, quas etiam occupant, & haec benignae sunt,  
malignae verò & cancrois sunt dolentes. Deinde  
omnes Strumae aliquando ius membranis sive  
cystis includuntur, quemadmodum Steatoma,  
Atheroma, & Meliceris, & sensibus statim de-  
prehenduntur; interdum cutem & plures  
collum obducunt, & ad Scapulas usque disten-  
duntur, prout observavi in filia nostri merca-  
toris. Sunt uplerivum absque inflammatione,  
quodam tamen eum inflammatione  
sunt conjunctae: aliae malignae & cancrois,  
pro materia acrioris & corrosivae ratione. Sunt  
& aliae mobiles, aliae immobiles. Mensium  
obstructiones easdem faciliè comitantur, ob  
crassitiam succorum massae sanguineae commu-  
nicatorum, ab acido viscido ad stagnationem  
inducendam aptissimo. Distinguntur à Glandu-  
lis in catarrho intumescantibus, quod tumor  
hic mollior sit & per medicamenta diaphoretica  
stagnatio lymphae citius resolvatur, & hinc  
tumor evanescat, Scrophulae verò & Strumae  
longè sunt duriores, & tam brevi discuti ne-  
queunt. Praeterea Scrophulae magis etiam  
sunt pendulae, & protuberantes, adeo ut gra-  
dualis adlit differentia, secundum majus & mi-  
nus. Est diuturniore enim lymphae stagnatione,  
facile ejusdem spissior subsequitur coagulatio,  
unde major illa durities, quae in Scrophulis tactu  
percipitur. Paracelsus verò longè alia exponit  
Scrophularum signa, à Strumarum signis maxime  
differentia. Scrophulas cum dignosci alicut,  
si bulla surrexerit in carnoio quopiam loco,



ubi coloris cum flavo albo, cum ut dicitur maxima, tumoreque, videtur unum in modum & ceterum rubrum, & postea foramina, quorum unum alterum non tangat, incidit. Strumam vero adesse colligi vult, cum in collo nodosi tumores excreverint, cute coniecti adinfar caput.

*Broncho-  
scles.*

*Bronchocele* est aliquando insignis magnitudinis, & deturpat saepe totum collum, ab eo instar sacculi, aut pyri, aut veltæ inflata pendula, & undulatio atque fluctuatio humorem in ea nonnunquam percipitur. Saepè lympham modo spissior, modo flatulenta in ea concluditur, interdum materia carnea, hinc acri organa respirationis & deglutitionis saepe ab onere premuntur, ut inde aliquando suffocatio timenda sit, uno reperta est aliquando massa carnea dura pugni magnitudine, cuius ostiis plurius, uti apparet *Obs. Cl. D. de Murato, Obser. 134. Ephem. Ciern. Decur. 2. Paracelsus* Bocii signa exhibet sequentia: Si mulieri bullæ nascantur, postea porri postmodum carnis excrementum sub cute, vel super eam, quæ pro menstrualium augmento habetur progreditur.

*Medicologia  
secundum  
Galenum  
Scrophula-  
rum &  
Strumam  
rum.*

§. 4. *Galenus* videntur *Scrophulae* & *Struma* progredi ad succi alimentarii superfluitate, producta ab alimentis phlegmaticis & mucilaginosus in hominibus temperamento phlegmatico præditis, quorum facilitas concoctrix debilitat humorem phlegmaticum superfluum & non superabilem ad partes debiliores propellat, in quibus in Glandulis & thoricis induretur, quoniam materia hæc frigida & mucosa inepta sit ad suppurationem; in collo vero facilius, quam in partibus aliis indurationem hanc contingere dicunt, quia acri frigido magis sit expositum, materiam hanc mucosam & vicinam citius compingenti.

*Broncho-  
scles.*

*Bronchocele* non profecti dicunt à collectione vel humore, vel flatu inter cutem colli & asperam arteriam, ab qua cutis distenditur & succi alimentares crassiores ibidem coarctantur; eandem quoque cutis distensionem & flatuum insuppressionem à magno excitari affirmant conatu, in enixu partus, egestione facium, aut suffultendo onere, aliisq; laboribus gravioribus.

*Paracelsus  
opinio de  
causa Scro-  
phularum.*

§. 5. *Paracelsus* statuit *Scrophulas* prodire ex sale de milio, dum alumen resolvitur in aquam, & in primam redit materiam, & postmodum in grana rursus coagulatur, quæ quilibet luum foramen edit, & in membro collectum remanet: quodvis etiam foramen peculiaris centri habere asserit, atque operationem salis huiusmodi esse operationi salis lapillati de grauidine.

*Struma-  
rum.*

*Strumarum* originem spiritui minerali assignat, quatenus hic, quum tartari generis perniciendus erat, propter naturæ suæ conditionem elevatur & ascendit, unde collum obiderit & occupaverit, nodos gutturi gignat, qui petatarum faciendo minime potens, quoniam sine corpore existeret, strumam tamen materiam crispuleam continet, quæ lingulæ iter oblectetur, & in venosis partibus nodos magnos aut parvos facit, ut ita tartara mineralia alimentum tantum aut nutrimentum strumarum habeant ac illarum generatio, seu mater, eaq; conformationem & altitudinem quondam habere præsumitur cum tartaro vini in velle, adeo ut simili modo liquores tartari collum obiderent, eoque loco vasa sua & virtutem haberent excrecentem. Præterea lib. 1.

lib. de generat. *Strutyr* commemorat, quamvis strumæ illius non sui propriæ, sed ipsæ cum aliis communes, in strutis tamen cum aliis deformitatibus esse frequentissimas, idque hæc obiectam, quod non tantum sculturam in ipsa ratio corrumpatur, verum & ipsum corpus, quod indecori formis appetitur, erit. Orii vero ex metallicis & mineralibus aquis, quæ strumas ex nativæ proprietate gignant, ubi multa etiam constellationes concitant, & potissimum ubi huiusmodi regiones repetantur. Nati quoque easdem ex mineralibus vult modo plane eodem, quo alia, quæ oriuntur ex easdem, sicut interpositiva marchantia, vel mineralia crudia, & hinc fieri putat ut strumæ magis ad marum, quam ad intellectus temperantiam proni sint, propter mineræ nempe cruditiæ in struma sitam, quæ collum occupat, in quo mineralium est principium; quodvis autem minerale crudum prope radicem crudam generat excrecentiam illi similem, quod inde fieri debuit, quoniam crudum quodque mater sit & origo nodorum.

*Bocii* ortum adignat ex mensuris & humoribus, eodem loco in quo ambæ humores fluxiones ununtur, illudque in alio fluxu proprium libinet facere emmendum, liquorem enim scilicet fluxum, si coagulatus fuerit, ut ad locum pervenire nequeat, nec id ipsum exequi valeat, quod sui fuerit officii, retrogradi alient, donec transeat in carnis generationem.

§. 6. *Helmontius* docet, *Scrophulas* & *Strumas* oriri ab imaginatione & idea quadam ab Archæi, dum ex tristitia ob paupertatem, digestivam in stomacho simul aberrare facit, & imaginationem sibi cudit istiusmodi nodorum, qui toties tristitiæ affectum sequuntur.

*Strumas* & *Bocium* defectum dicit esse transmutatoris Archæi, non vero coagulationem Tartari, sed ex bono fieri cruore, cui stragillans potestas vitæ medicæ sit relicta, Archæum enim omnem sibi sublimitatem transmutare maliam, nisi à vitæ medicæ potentiore victus cessaret. Contradicit proinde inaffesto Paracelo, dum eosdem ex eadem materia & aquis potius mineralibus profecti credit, potiusque ab eo, ut per ignem cæchy masissus in aquis ostendat, quibus proprium sit, in ultima demum materia digestione, nec alibi quam circa ingulum coagulari, quod enim nunquam præstiturum esse movet. Interim fatetur quidem aquæ medicæ vitam medicam, cui sit proprium Archæum excitare, & inficere in coagulatione boni alimentum, non autem tartari peregrinam illi metallicis materialiter in dirigit petrosam, sed ad strumas requiri contendit materiam, quæ proprietate sui Archæi nata sit præcludere lauces ac quasi præfocare, idque circa aditibus aut terrestris acerbis, transmutatæque in alimentum, reitensque pristina vires vitæ medicæ perfingatur sua potestate, circa guttur magis, quam alibi, & hanc potestatem sibi hereditariam in alimentis, & hinc in cruore relicta convertere proximum solidorum alimentum in excrementum petrosam, quod directum viscacitate stragulantæ ad guttur concodit. Hoc rutinantem Seduni se reperisse dicit fungari præfocant præfocant habere polleere, illosque frequentes & radice laticis, abietis & pini, in quibus ad septentrionem declivibus locis, ubi niger agaricus, ejusdem circumspicitur, ubi

*Bocii.*

*Helmontii  
opinio de  
causa Scro-  
phularum.*

*Strumarum  
& Bocii.*

in tranco frequens, unde didicerit, totum terzæ Leffas fungola indole ibidem contaminari, credideritque Strumas nafi nû herbarum & aquarum, quæ hujusmodi Leffas imbibuerunt.

*Utiſſis de cauſis morborum opinio*  
 §. 7. *Utiſſis* morbis hiſce univerſis eandem ſenné aſſignat cauſam, *Scrophulas* enim oriuntur ex liquore nervo in glandulis obſtinentiori ſtagnatione inſpſſato, *Strumas* verò & *Bronchocele* ab eodem humore nervo in tranſitu ſuo impedito, & in parte quidam colli ſtagnante, dum ſpiritu depreſſo aut avolante, particule ſaline à volatilitate in acorem degeneres, confortia aliena mox ineant, atque corpſcula ſulphurea ſibi accipientes, in tumores ſtrumofos coaguleantur.

*Sylva ratiocinium de cauſa Scrophularum.*  
 §. 8. *Sylva* à coagulatione pituitæ aut Sanguinis in glandulis colli *Scrophulas* oriri exiſtimat, dum ab acido auſteriori ſucci illi propter venarum capillarium obſtructionem reſiſtere non valentes, fortius inſpſſantur, & glandularum ſubſtantiam archuſum impinguntur, ſicque avolantibus fluidioribus ſuccorum partibus, remanentia eorum ſpiſſior redditur & compactior.

*Strumæ ratiocinium.*  
*Strumæ* originem ex lymphæ ducit peccante, & acido ſpiritu nimio in illa contento, à quo humores in glandulis colli conglobati redduntur tenaciores, & tandem in gyptiam conſiſtentiam ceduntur.

*Bronchoceleſis.*  
*Bronchoceleſis* cauſam eſſe aſſerit rupturam & diſtentionem cutis & ſubjacentis membranæ, à reliquis partibus & ſtatuum ſeu acris ſub ea collectione, quod frequentius à violentiori contingit conatu & laboribus cum ſpiritu quidam retentione conjunctis.

*Carteſii ratiocinium de cauſa Scrophularum.*  
 §. 9. *Carteſius* à ſucco glandularum ſive lymphæ tenaci & viſcido, à particulis angularibus & hamatis fortius coagulata, *Scrophulas* oriri exiſtimat, quando enim per arteriolas ſuccus iſdem communicatur multis particulis angularibus acutis & ſolidis præditus, ex in particulis lymphæ ramoſas in glandulis adhuc reſiſtentes agentes aculeos ſuos particulis ramoſis imprimunt, eisdem in motu impediunt, ſicque ad quietem pellunt, ſigunt & coagulant, hinc lymphæ inſpſſata & craſſior per ductus ſuos ab arteriis & venulis diverſos adeo que ſibi met proprioſi tranſire nequit, ſed ſtagnat, & novis particulis ex communi maſſa per arteriolas communicatis auſcſcit, unde glandulæ diſtenduntur & in tumorem elevantur, ipſa verò maſſa pro majori aut minori copiâ particularum ramoſarum, angularium aut terreſtrium diverſam præ ſe fert colorem, ſoliditatem & coherentiam, prout ramula diſſolvit in globulos coherunt, vel diverſimodè implicatæ & acutis angulis compactæ fuerunt, vel intercedentibus particulis terreſtribus & poroſis ali quibusdum denſo fuerunt reſolutæ, ſed nondum omnino fluidæ redditæ, ut mucilaginem craſſiorem, aut materiam pulſaceam releant, quales particule per aerem, cibum & potum ſuccis corporis humani facile poterunt inferri, aut affectibus melancholicis ſtagnationes & angulares particule in iſdem augeri & cumulari.

*Strumæ ratiocinium.*  
*Strumas* ab iſſidem pene deducunt cauſis, & differentiæ earum à *Scrophulis* ſcilicet in majori copiâ particularum terreſtrium particulis ramoſis & angularibus intermiſtarum conſiſtere credunt, quæ minus ab angularibus coagulati queunt, hinc maſſa non ita inſpſſatur, & cum

particule quædam poroſæ iſſidem intermiſſæ aliquando exiſtant, potiùs dilatantur, & fibre glandularum & membranarum adjacentium magiſtenduntur, unde & tumor incrementum capit, maxime dum lympham ſam contentam ſatis humectat, ad quæ inſuper ſi chyloſus aliquando accedat liquor per arteriolas, hic implet tandem corrumpitur, materia putrida & fetida ob diſſoluta ſalia inde facile emergit. Quod autem in quibusdam regionibus ſtrumæ copioſiores conſpiciantur, quam in aliis, id ab iſſidem particulis rigidioribus, angularibus, terreſtribus & ramoſis copioſioribus, quam poroſis & alcalicis, per diſtans ſuccis corporis intermiſis communicatis, contingere rentur, quæ per anguſtos ductuum glandularum vaſcularum meatuum facile nequeunt tranſfluere, ſed angulis ſuis hic illic tubulis adherentes, eosdem obſtruendo tandem claudunt, & circa obſtructionem iſtam variam particularum partium collectionem, coagulationem, aut aliam quandam miſturam inconſtantem & minus convenientem.

*Bronchoceleſis* oriri putant, dum vi quidam *Bronchoceleſis* impetuoſa, & retentione ſpiritus membrana *celenſis*, aſperam arteriam aut muſculos colli inveſſentium extenditur, & à reliquis partibus dividitur; ſpiritus enim animales à priori viâ repelluntur, & magnâ vi regredi coguntur, hinc ſpatium ſufficiens non repertientes in tubulis conſuetis, impetu vehementi membranam divellunt, quo interdum ſimul vaſcula quædam & nervuli dirumpuntur, ut ſucci eorum in cavitatem ſeu ſacculum hunc effundantur, & ſuccellivè non modò majori copiâ colligantur, ſed accedentibus particulis diverſimodè figuratis angulariter quandam conſtituant maſſam, modò ſpiſſiorem, modò ſtatualem, à quâ cutis ſimul diſtenditur, & parſea colli redditur tumida.

*§. 10. N. ſtræ* ex ſententia *Scrophulæ* oriuntur à lymphæ tenaci viſcidâ & acidâ, acore auſtero prædita, in tubulis & meatibus glanduloſis ſtagnante & obſtruente, unde glandulæ non modò intumefcunt, ſed etiam indurantur. Sepe enim ex acido vitioſo, interdum corroſivo, oriuntur dura illæ *Strumas*, quæ nonnunquam primordium ex primis viis acquirunt, ubi chyloſi fermento vitioſo facile acceſcit, hinc acidus ille chyloſus proclivis eſt ad obſtructionem pariendam & meſenterium ſtrumuloſum reddendum, quare in primis hiſce viis læta lymphæ non facile corrigitur in glandulis aliis colli. Nempe quæcunque in parte glandulæ indurantur, inde ſunt *scrophulæ*, ſed alio nomine à Medicis pro loci ratione donatæ. Haſce *scrophulas* comitari ſolet febris lenta, ob viſcidam materiam continuo ſanguini permixtam. Certum autem eſt, per glandulas ex ſanguine arterioſo ſequiſtari lympham. Motus hujus lymphæ non eſt à ſucco chyloſo ad partes externas, verum eſt contra à partibus externis ad receptaculum. Hæc lymphæ cum ſatis tenuis eſt abſque ulla reſiſtentia, facile per ſubſtantiam glandularum percolatur, ne glandulæ quicquam damni patiantur à lymphæ tranſeunte, verum ſi lymphæ craſſior actenacior evadat, iteſi ſi particulis terreſtribus ſit inquinata, vel ſile craſſo ac rigido turgida, non raro poti glandularum obſtruuntur, cumque particule fluidiores ſetolæ præ terreſtribus & ſalinis ſe facilius accommodent anguſtis glandularum po-

ris, hinc is secedentibus successu temporis glandula obliuuntur à terrestribus particulis & talibus rebus, quibus, quæ se angustis pororum accumulare nequeunt. Hæ glandula si à materia tantum viscosa & tenaci cum particulis terrestribus commixta impleantur in collo, oriuntur tumores posteri Scrophulæ dictæ, si prædominentur acidi racres particula, degenerant in caneros, at si terrestres imperium habeant, degenerant in scirrhis. Qui succis abundans viscidis & acidis, promores sunt in affectum hunc, quod pueris contingit scorbuticis sanguinem lutolim habentibus, & catarrholis; præterea ær nimis frigidus & humidus, hoc est, qui abundat acido nitroso, & viscus humidus acidus chylum acidum subministrans ad coagulationem & stagnationem pronum, scrophulis producendis facile interviuit, maxime verò hic culpatur aqua præter mercurium particulas asulfæ in se continens, quales sunt in Carinthia, Syriâ & circa Alpes, quo pertinet luxur, vitæ intemperantia, & ingluviæ, ob quam causam & in senibus produciuntur. Symbolum tuum quoque conferunt seminis longius, otum nimium, vitæ sed: naria & desidiola, aut melancholica, & similia, quæ succos in copia generant acidos & viscidos facile stagnantes.

In *Bronchocele* cum *Cartesiano* vehementem illum impetum merito tanquam causam communiorem acculamus, cuius experientia demonstrat, ex validiore conatu in atollendo graviore onere, violentia spiritus emissionem & retentionem ejusmodi membranae collis interioris divisionem obtingere; id enim spiritus per conuictos suos tubulos & cavitates impeditæ antea fluxerunt, ac spiritus alii ad sufflandos musculos antagonistas prioribus imperiosius obviant, non modo valvulae aliter di-, omittunt, sed spiritus ipsi per angustatos tubulos transgredi nequeunt. hinc cursum suum mutant, & disruptis fibrillis claustris, elientes quodamque ipsam asperæ arteriæ tunicam, si copiosiores spiritus ante inter cartilagineos eius angulos & tunicam eos inuoluentem fuerint contenti, sequentibus vero membranam communem collis tendant & diuellunt, ut sacculus quidam formetur, in quo liquores ex disruptis venis, aut aliis quibusdam stillantes colliguntur, quæ pro diuersa sui mixtura aliam atque aliam quandoque componunt massam, sique nonnunquam materia quædam, siue sit succus nervæ, siue lymphæ pallida, fetida & indurata quasi, aut in gummos concreta, propterea cylindri inelusa in partecarnosa prope guttur sunt obliuata, quæ in tanta copia aperta Bronchocele emanavit, ut adstantes Medici non potuerint satis admirari, qualem videre licet in *Zodiac. Med. Gall. Ann. 2. Obs. 7. & n. p. m. 47.*

*Prognosis.*  
*Scrophulæ*  
*rum &*  
*Strumæ*  
*rum.*

§. 11. *Prognosis* quod concernit, omnes *Strumæ* cum *Scrophulis* difficiles sunt curatu, unde *Strumæ* ad pessimum colli morborum genus referuntur ab *Hippocrate lib. de genat. in Tom. 1. p. 417. §. 6.* Faciliorem tamen curam admittunt incipientes, mobiles & in senioribus. Sic & illæ, quæ causam agnoscent corrodiam, sunt sæpe incurabiles, ut illas vidi in conditipulo quondam meo *Selen* dicto à Chirurgo Gallico *Attavan* nominato inpropterea exstiter, unde mors ipsi fuit accelerata. Quædam enim in mirtinecus in collo produciuntur, quæ suffocationis periculum minuantur, uti *Hildan. lib. 3. Obs. 34.* eusdam

pastoris meminit, qui longo tempore siturâ tali in collo laboravit, cui eam, nulle inquit, accessit, & ad exulcerationem pervenit, nante non amplius victum potuerit, & tandem ipsi morti fuerit traditus. Ordinatio quidem magnum adeo non inferunt semper vitæ periculum, attamen suffocationis metum, cum augentur & lai yngem comprimunt, sæpe incitant, inveteratæ quoque si fuerint, nec medicamentis cedunt, ubi vero Chirurgeum præsidium adhibetur, multitudo aforum in collo præsentium, & artius sæpe in adherentium, minus citam reddit excisionem. *Strumæ* certe fangant Chirurgos & ægros quoniam non facile luppurantur, nec discutiuntur, ob viscidam & teracem lympham in glandulis stagnantem & induratum. Sic & *Strumæ* frequenter in Scirrhum exquittum degenerant, obeandem materiam viscidam, quæ si diutius acido scilicet, aucto, subsistat, in duritiem gypseam transit, & quando exulcerantur, desinunt in cancrotheca ulcerâ fistulosa, ac nonnunquam in cancrotheca & corroliva, acido illo in eis reddito nimis acro.

Eodem ferè modo se habet cum *Bronchocele*, *Broncho-* à ejus compressione asperæ arteriæ illata, sæpe *celæ* suffocatio oboritur, quæ nos novimus exemplum. Confer quoque *Theod. Kerkr. ng. Obs. Anat. 74.* qui observavit à *Bronchocele* subito in crecente & asperam arteriam collis vertebri adprimente monalem quandam suffocatum, quod & de puella *Fulpius lib. 1. Obs. 46.* animadvertit. A *Bronchocele* internè circa jugulum abcondita suffocationem observavit *Piatrus*. Ob lætos quoque aut compressos nervos in senibus oritur defectus, ut ægri vel difficulter audiant, vel gustus aut olfactus is imminuatur, aut alia quædam spirituum obtingat aberratio, unde forte *P. A. ræci* affectum hunc stolidis sæpius accide e putavit. Curatio in totum observatur difficilis, & aliquando casu, quam studio Chirurgico, relicti fuerint abactæ, quod simul præbet indicium, non semper de curatione penitus esse desperandum.

§. 12. Optimum *Dietæ* regimen, licet in aliis affectibus, ita in his præsentibus, cum magno ægrotum instituitur emolumento. Quemadmodum enim commissi in *Dietâ* errores sæpe affectuum origo sunt, ita optima victus ratio in plurimum in curatione omne fert punctum. Aer ergo sit optimo æthere, non vero acido nitroso repletus, proinde vitetur nebulosus ac pluviosus. *P. etu* sic ceptus & attenuatus, & quidem parcellissimus, nam media & abstinencia multum ad curandas strumas facit, angue pejus liguntur cibicrassi, fumo indurati, legumina, brassica, & alia digestu difficilia. Nocet & nimia repletio. Alia alimenta potius conducunt, quæmixta, à carne suilla & piscibus omnino abstinendum. Omnia aromatica & aperientia vulgo ita dicta conveniunt. Potus sit vinum Gallicum, aut potius Theæ vel decocti scrophular. vel potius aquarum mineralium, quæ in primis in thetens inveniuntur, ut sunt Emblesis, potissimum vero repleta ibidem aqua mineralis in puteo peculiaris exsiliens. Conducunt & themæ VVishadentes & Badenses in Helvetia, & Carolinæ in Bohemia. Motus & Quies minime excedant, motus enim nimis nocet, nec non gellatio super caput maximorum onerum, item motus aut conatus nimis in parte laborio. *Atem* quotidie res-

spon-



## CAP. II. DE SCROPH. STRUM. & BRONCHOC. 255

spondeat. *Animi motus* temperetur iusto rationis freno, omni studio ablegentur tristitia & maior luesco & spiritus nimis coagulantes. Vitetur & locutio plurima, & risus immoderatus, ne distendendo vaia & musculi magis dilatentur.

§. 13. Curationem *Scrophularum* & *Strumarum* aggrediuntur *Galenicorum* omnium primum evacuatione humorum peccantium medicamentis pituitam incidentibus & eliminantibus, aliisque materiam earum absumuntibus, qualia sunt radices bryon, pimpinell. aristol. rotund. polypod. querc. scrophular. it. Herb. agrimon. heder. terrestr. rut. murar. artemis. filipend. Hermodactyl. agar. sem. cartham. turpeth. sem. urtic. nasturt. sinapi. &c. ex quibus varias colligunt remediorum formulas, potissimum vero infusum aliquod parant initio ad septimanam integram dosi convenienti propinandum, quale sequens exhibit formula.

℞. Rad. Ir. Flor. ʒi.  
Pimpinell.  
Polypod. querc. aa. ʒvj.  
Rut. i.  
bryon. aa. ʒiʒ.  
Hermodactyl. ʒiij.  
Herb. Heder. terrestr.  
Scrophular.  
Chamad. r.  
satur. r.  
rut. murar.  
salv.  
agrimon. aa. Mʒ.

summit. thym.  
flor. anth. aa. p. j.  
Sple. Ind. Pʒ.  
fol. fen. s. fl. ʒi.  
agar. trachyscat. ʒʒ.  
sem. cartham. ʒij.  
fenic. ʒʒ.  
urtic.  
sesel.  
apii. aa. ʒij.  
cinanom. acut. ʒi.

*Incis. confus. & Nodulo inclusa infundantur lbvj. vini generosi, feni loco tepido, & postmodum quovis mane de eo potio assumatur conveniens, necessario asservato dixit regimine. Infuso quando humores peccantes nondum satis inciduntur & evacuantur, decoctum aliquod parant validius attenuans & ad faciliorem evacuationem eosdem disponens, quale conficitur ex rad. enul. Ireos, Spatulæ foetida, pentaphyll. filipend. Scrophular. apii, herbis matruh. beton. capill. ven. pimpinell. tanacet. flor. genist. sem. apii, urtic. linap. ciccr. rub. in vino coctis cum melle, & cinamomo aromatizatum quotidie, simulque comedendas tabulas aromaticas ex speciebus diagalag. diarthod. dianth. tum humores superfluos eliminant Pilulis aggregatis, aureis, vel cochuis. Ejecta verò sic materia peccante & superflua, reliquias ejusdem ulterius specificeis quibusdam absumant, electuario nempe sequente.*

℞. Conserv. majoran.  
rosar. aa. ʒvj.  
Cort. citr. condit. ʒʒ.  
Pulv. rad. scrophular. ʒiij.  
Spong. combust. ʒij.  
off. sep. ʒi.  
cinanom. ʒij.

*Zingib.*

sem. sinap. aa. ʒʒ.

M. cum s. q. syrup. heder. terrestr. redigantur in formam Electuarii, de quo singulis vespertinis & matutinis horis ʒij. assumantur. Re ita gesta topica quoque remedia ad subsidarias vocant copias, initio quidem emollientia, vel resolventia & discutientia, at quando hæc nihil præstitura conspiciuntur, ipsa substituntur suppurantia. Ad priora referunt emplastrum de meliloto, oleo chamamelino malaxatum, empl. de mucilag. oleo Irmo malaxatum, ceratum de ceylo Pylagris, Cataplasma ex farinâ lupinor. amaror. in oxymelite, aut ex fumo bubulo in aceto coctis, vel malagma monomachium sequens ab *Althuario* commendatum.

℞. Spum. argent. lbʒ.

syrup. rad. alib. ʒix.

sem. malv. ʒlv.

sanigr. aa. ʒij.

lini ʒj.

seriula campan.

anth. aa. ʒʒ.

chamamel ʒij.

veratr. candid. ʒij.

salsp. such. ʒi.

Adip. suil. vetust. ʒiij.

anserin. ʒʒ.

galinac. ʒi.

medull. cerv. ʒij.

cera lbʒ.

galban.

colophon. aa. ʒij.

ol. vetust. ʒxv.

Liquentur, quæ liquari debent, & arida adjiciantur.

Suppurationem promovent, quando de discussione spes cuncta redditur irrita, cataplasmatibus ex faciu. rad. alth. lil. alb. sem. fenigr. vitell. ov. butyro & cepis parum assatis. nec prius abscessum aperiant, quam de contentâ materiâ omnimodò in pus conversâ satis sint certi. ne immatura facta apertione & spirituum dissipatione, calor natus, ad putrefactionem & suppurationem necessarius, immutetur, proinde longo temporis tractu suppurantia apponunt, ut fomes scrophulosus putrefactione istâ penitus exstipetur. Si nec hoc obtinere queunt, & materia omni emolliorioni & suppurationi repugnat, scrophulas colli superficieras nimisque profundis pendentibus radicibus, cutis faciâ incisione à partibus, quibus attextuntur, divellant & tandem abscindunt, cautè tamen animadvertendo, ne aut venas jugulares, aut arterias carotidas, aut nervos recurrentes instrumento ladan. Hemorrhagiæ instantis periculum avertunt, ipsas scrophulas post divulsionem acu filum ducente ad basin trahendo, & filum utrinque arcitius revinciendo, ut sic constructæ sensim decidunt, & tum vulnus communi ratione denuò occludunt.

*Bronchoceles* curationem aggrediuntur præparatione humorum peccantium & eorumdem evacuatione, potissimum quando morbus hæc nondum adeò auctus est, sed adhuc pronalci incipit, quapropter eadem in ulum ducunt medicamenta, quæ in scrophulis arripunt, decocta nempe, aut infusa, humores vitiosos, maximò vero pituitosos incidentia & educunt, ipsosque flatus dissipantia & discutientia, ex sem. carv. cynin. cinanom. galang. caryophyll. piper. & zingib.



zingib. tum revellendorum & derivandorum humiorum gratia fomiculos in brachiis effodiunt. aut setaceum per cervicem uti ieiunt, topica apponunt adstringentia & interceptientia, posthac discutientia & exsiccantia, non omisso specificis tumori huic abluendo singulariter dicatis. radicibus nempe bulbort. aristol. rotund. bryon. filipend. polypod. onomid. artic. mort. Herb. agrimon. herniar. pilosell. rut. flor. genist. cort. tamarisc. vicia pyram. cinet. hyong. marin. alumi. ex quibus variè concinnantur sunt medicamentorum formulae, quarum sequens tyronibus praebeat exemplar.

*R. Herb. jecut. ar. mon. ʒij.*

*herniar. ʒib.*

*pilosell. ʒij.*

*rut. aa. ʒj.*

*Rad. onomid.*

*bryon. aa. ʒib.*

*filipend. ʒij.*

*Cinct. spang. cynobat. ʒij.*

*ess. sap. ʒj.*

*sem. cynin. ʒiv.*

*pip. long.*

*alumi. aa. ʒij.*

*Pulvisusata ex cep. s. q. mellis depumati. &*

*s. a. F. Electuarium,*

de quo luna decrecente exhibeantur singulis diebus ʒij. in aurora, & potui ordinario, qui sit vinum medicore, lequens imponatur Nodulus.

*R. Rad. filipend.*

*scrophular. aa. ʒ. ʒ.*

*aristol. rotund.*

*verib. se. aa. ʒij.*

*Herb. Heder. terrestr.*

*Herniar.*

*beton.*

*fatuv. cep. aa. Mj.*

*flor. genist. P. j.*

*fil. cupress. Mʒ.*

*vicia querc. ʒib.*

*sem. fenic. ʒij.*

*gula. ʒ. ʒij.*

*cinamon. ʒj.*

*fat. gemm. ʒb.*

*M. convenienter apparentur, & nodulo indantur.*

Augmentum eius inhihent quoque externis topicis adtingentibus. fortè videlicet ex decocto fol. pyror. equiset. cupress. alumi. in vino adstringenti factio, vel ex thermis sulphureis & aluminosis, aut emplastro ex gumm. ammon. in aceto soluto, pice navali, mastich. oliban. pulv. rad. irid. colocynth. sem. sinap. sal. gem. & alumi. cum oleo nucum malaxato per septimanas aliquot imposito. Quando vero tumor ita jam increvit, ut ejussummento modo dictis nequeat resisti, fortiora adhibent discutientia, qualia sunt cataplasmata ex farin. fabar. orobi, baccis lauri, foliis rut. rad. cyclam. sem. cymini, sulphure. nitro, &c. in vino coctis. vel unguento ex oleo rutae. piper. axung. castor. pulv. hermodact. cymini. colocynth. lumbicor. succo artham. & pauco cerea parata, quibus tumor hic studiose est innungendus. His vero licet cedere noli, ad cauteria & sectionem accedendum, praeter quodam ex praecapito supra summam cutionem in se tuum exerceas, ut id quid nimis accenditur, ita citius & blando, humore liquorem effluente, eo vero, quod densius est, digitis edu-

cto, & ulcere postmodum sub linamentis sanescente. Sectionem vero, si alio instituitur, tumorem medio nudo linea ad unam usque metendo, & sumum videri in integro corpore digesto separando, totumque cum velamento sito eximendo, tum aceto, sale vel iure imbuto eligendo & oras una sutura iungendo, superimposito his emplastro glutinante, aliisque convenientibus, & leniter, ne fauces comprimentur, deligando. Tunica vero si eximi nequeat, eidem differentia adperguntur ex sacceusilla, stercore lundinum, chalcitide, maly, veratro albo, pyrethro & thure, ut ita penitus consumatur, eoque obtentio linamentis aliisque us moventibus medicamentis curationem praerolequantur, usque dum cerato diachalcitid. vel alio quodam emplastro idoneo consolidato & integra sanatio perficiatur.

§. 14. *Paracelsus* curationem *Scrophularum* *Paracelsi* corollivis, & consolidativis abolverendam esse curatio praecipit, abstinendum vero à pice, oleo calidis, *Scrophularum* aristolochiar. viridi aris. artemico, sale ammoniac. praecipitato. auripigmento, alumine calcinato, ungula caballina & herbis omnibus attractivis. Corollivum vero commendat lequens.

*R. Virguli alb. ʒj.*

*ag. ros. ʒij.*

*Litharg. ablut. ʒb.*

*Commise. cum oleo rosar. & pannis in eo madefactis foraminum orificia quaque leniter impleantur. Consolidativum ejusit paratur.*

*R. Consolid. Regal. lbʒ.*

*Aristol. long. ʒij.*

*Myrb. ʒb.*

*Mum. ʒij.*

*Post traurationem.*

*R. Ol. rosar. q. s. pro incorporatione, formetur in modum emplastrum.*

In curandis quoque scrophulis huic magnam vim adscribit opopanax, à quo externe adhibito easdem penitus evanitas esse confidit.

*Sirummarum* & *Bruchae* curationem non minus duplicem proponit, medicinale, per pulveres & portiones ex cineribus hyongiarum, corall. rub. cinamon. & similibus emollientes instituendam, vel attractivalem, per cauteria actualia vel sectionem perficiendam. *Bruchae* ex mentibus & haemorrhoidibus progenti, ad eaque morbi muliebria à priore aliquantulum directi, frequentem ipsamulat curationem. Huiusmodi curare jubet, et de pyrativem, vehementius hinc provocat, mentibus vel haemorrhoidas. Postremo luttendum vult fluxionem, uti in Noli me tangere. Ad provocandam mentitum cum deopipulatione veniarum sequentem commendat mixturam.

*R. Lignum. pulg.*

*artemis. aa. ʒij.*

*can. carib. ʒij.*

*lique. tiria. castri. bovis ʒj.*

*Ros. damascen. im.*

*Emulsi. ʒb. melle & cere.*

Hinc mixturam ad aquam ex fructibus lavinae, vel oleum de amans ejus. Haemorrhoidas provocat sequenti.

*R. Scrophuli colati ʒb.*

*bilelis.*

*Mastic. aa. ʒj.*

*Fiat emplastrum per se s. a. super locum haemorrhoidarum.*

§. 15. *Helmomus* ad destruendas *Scrophulas* *Helmomus* *lin. na cura*

*Scrophularium* fungulare putat existere remedium pulverem ex radice g. adoli & digitalis, cum internè studiose exhibitum, tùm gummi ammoniaco, vel ali in internum & emplastris modo externè admotum.

*Strumarium & Bronchocele* Ad *Strumas* & *Bronchocele* abigendas prædicat cum aliis pulverem ex spongiis marinis vel fungo cyrsoobati in ollâ cumbultis, vel sequentem magis compositum cum triplo sacchari paulatim liquari miscendum, & tempore lunæ decrefcentis ad 3℔ adhibendum. quo unius mensis spatio strumas & Inguos liquari promittit, & unâ cum præfatione ab illis illatâ fugari.

℞. *Spong. marin. in carbonem combust.* 3ij.

*Oss. sep. ust.*

*Pip. long.*

*Zingib.*

*g. adol.*

*pyreth.*

*Sal. gemm.*

*calc. testar. ovor. aa.* 3j.

*M. cum mas. filiat. ex præstatis spongiis, & paulatim exsiccat.*

Externe sequens idem adhibere jubet unguentum.

℞. *Ol. laurin. pingued. suill. non adulterat.* 3vij.

*Oliban.*

*Mastic.*

*Gumm. Arab.*

*Resin. abietin. aa.* 3ij.

*M. & per retortam aest. lietur oleum, cum cineribus clavellatis denique retificandum.*

§. 16. *Vtilissus* curationem *Scrophularum* & *Strumarum* aggregatur resolutione iquoris illius in glandulis inspersit, ejusdem resoluti commodâ eductione per cathartica & diuretica, & prohibitione, ut ulterius hujusmodi materia in glandulis colligatur & inspissetur. Ad resolvendum autem liquorem inspissatum, externis potissimum utitur discutientibus, ut foru ex decocto rad. bryon. cyclam. lapath. scrophular. succis. herb. agrimon. artenis. pimpinell. fol. rotis mar. fabin. & similibus, in vino coctis. vel impositione emplastrî diachyl. ireati, inunctione unguenti de bryon. vel de arthanitâ, vel ex succis herb. scrophular. & rad. cucum. alin. cum gumm. ammon. in acet. solut. & pingued. anath. parato, vel limimento, ex pinguedine humana, viperâ cum oleo succini; hinc internè per septimanam exhibet apozema ex rad. lapath. scrophular. pimpinell. Irid. Florent. galang. herb. agrimon. heder. terrestr. saturej. chelido. min. flor. genist. bacc. Junip. sem. linap. Zingib. & pro majori evacuatione eidein vel simili decocto immiscet hermodactyl. Turpeth. agaricum, & semen cardiani, vel pilulas exhibet tales, ex ʒio videlicet cum extracto catholico misto. Glandularum tumore ita aliquantùm imminuto, ad materiam penitus consumendum & prohibendum, ne ulterius ejusmodi succum recipiant, pulveres exhibet strumales, quorum sequens esse potest formula.

℞. *Spong. combust.* 3ij.

*Pil. marin. combust.*

*Ciner. Ligni. Junip. aa.* 3j.

*Lap. punic.*

*calam. aa.* 3℔.

*spong. 3uj.*

*visc. pyrer.*

*Pip. long.*

*Zingib.*

*Sal. gemm. aa.* 3ij.

*Sem. lapp. min.*

*Cinamom. aa.* 3℔.

*M. F. Pulvis, dimidia sacchari canthii pulverisati portione miscendus, & ad 3℔ pondere quovis unâ lunâ decrefcente alluendis. Huic verò remediis absque fructu tentatis, & materiâ nullam admittente discussione, eandem cataplasmatis & emplastris emollientibus ad suppurationem disponit, & eodem modo, ut in aliis abscessibus, curationem præcipit commodè ad ministrandam.*

Ad *Bronchocele* admoveendam fortiora ad huc discutientia, quàm in prioribus, & situs dissipatione subadstringentibus mista tum externè commendat, forciù potissimum ex decocto rad. ononid. Irid. urtic. herb. agrimon. puleg. herniar. sem. tamenili, nuc. cupress. sulph. & alum. in vino vel lixivio coctis, vel flores salis ammoniaci dissolvit in spiritu frumenti, in quo panuos intingit, & calidè eos imponit, aut emplastrum de baccis lauri cum stercoribus, vel ad rupturas. Interius essentiam carminativam, & pulverem in scrophulis annotatum cum eodem modo credit assumi, in na, verò malo remedia hæc aliæque parum præstatura cum aliis facitur, unde si tumor nihilominus adimendus sit, ad operationem Chirurgicam circumspectè instituendam tractum admittit.

§. 17. *Spiritus* in curatione *Scrophularum* non minus eo potissimum intendit, ut sicci in glandulis ab acido coagulati denique resolvantur, & resoluti regrediantur in vasa, per quæ commodè aliorum distribuantur, vel si plane sunt inutilis, per diuretin & alvum eliminentur. Resolutionem hanc volatilibus quidè insituri posse concedit, at sumum hoc in casu adhibendum vult studiū, ne evaporatio partium volatiliorum nimis citò aut violentè promoveatur, & insabactis crassiores & spissiores remaneant vix dum corrigibiles, sed scitò viam sternentes. Ut media proinde incedatur viâ decocta suadet lignorum aliarumque radicum & herbarum incidentium ex scrophular. fenic lapp. squill. pimpinell. saturej. verben. tanaceto, bacc. Junip. &c parata intus assumenda, quibus si pericula viscida sit dissoluta, eandem copiam peccantem pilulis suis consuetis præcipit evacuandam, tùm ad reliquas in glandulis penitus attenuandas & eliminandas, iudicifera porrigit ex spiritu sal. ammoniaci, bezoard. min. vel ʒio diaphoret. & post hæc illa, quæ ab aliis ad scrophulas consumendas jam sunt enumerata. Ipsum tumorem externè inungit unguento martiato cum oleo Philosophor. mixto, vel emplastrum eidein imponit ex gumm. ammon. bdell. galbano &c. cum terebinth. parato. Si vero omnino discuti nequeant, sed in abscessum vergere videantur, suppurationem promovet, & ut in aliis abscessibus fieri solet curationem abolvit.

*Strumas* eadem planè tractat ratione, non nunquam fortioribus quibusdam intermissis & salivationem promoventibus, quibus si non obediunt, caute in extirpationem earundem instituit.

In *Bronchocele* ad discutiendos status non parum subsidii allaturum sperat emplastrum suum carminans ex gummis, opio, aliisque paratum.

Kk

ratum, post quod emplastro ad Hernias, aliisque subadstringentibus non contemnendas adscribit vires. Interius pulverem ex sale gemm. & alumi. utlo cum speciebus diagalang. in aqua genistæ vel rutæ exhibuit, curationem hanc non parum promoturum esse affirmat.

Carlesiani  
modum  
proceden-  
dum cura  
Scrophu-  
larum.

§. 18. *Carlesiani* in curatione *Scrophularum* maxime sunt solliciti, ut mistura illa tenax & viscida in glandulis atque particulis angularibus coagulata incidatur, & a quiete ad motum excitetur, quare frictions instituunt pannis calidis, & fotas ex lixivio cinerum ligni Juniperi, in quo stipendula, scrophularia & agrimonia cocta sunt, iisque subiungunt illinitiones ex spiritu salis armoniaci fuccinato, spir. saponis, vel limmentis aliquantulum spirituosius, aut Gummi præcipitatum continentibus, ex quibus pro emolli-tione sequens magni ab iis penditur.

℞. Spir. Salis

Ol. cer. stillat. aa. ʒss.

Spir. ʒci

vin. rectificat. aa. ʒj.

Ol. de Luterib.

Petr. aa. ʒj.

Sapon. A. span. ʒss.

M. optimè pro linimento.

Ad eundem quoque finem emplastra apponunt attenuantia, quorum sequens exet exemplum.

℞. Qui viv. cum aq. fort. solut. ʒiv.

Axunge. porcu. ʒviij.

Coq. in olla stiliis sparsula lignea continuo move-  
vendo, donec materia inde exurgat  
molle, cui addantur

Cere flav. ʒiij.

Pulv. massich.

oliv. aa. ʒvj.

M. F. Emplastrum.

Promovent eandem attenuationem medicamen-tis internis ex lignis paratis & diaphoreticis ex bezoard. mineral. Regulo ʒij medicinali, aliis-que; tùm ne quid denuo in glandulis colligatur, per tempus aliquod continuant illa, quæ coagu-lationem impediunt, & visciditatem resolvunt, qualis sequens est mixtura.

℞. Aq. Pimpinell.

scabios. aa. ʒij.

Essent. rad. scrophular. ʒss.

viperar. ʒi.

Liquor. Oss. gemm. ʒiij.

Syrup. heder. terrestr. ʒj.

enul. ʒij.

M. dentur duo cochlearia unâ vice. Ad sup-purationem non minus ac ceteri transeunt, quando materia diffusioni penitus repugnat.

Strumosa  
tum.

Eadem etiam adhibent remedia in *Strumis*, quibus Mercurialia singulariter convenire judi-cant, unde emplastrum de ranis magnis extollunt laudibus, etiamsi in totum ob terrestritatem materiz dissolvi nequeant, ad dolorem tamen mitigandum, & ne tumores incrementum, empla-strum hoc profuturum credunt, gummosa verò & calidiora omitteunda volunt, ne glandule nimis irritatæ in caucrum transcant, aut particulis subtilioribus violentius discussis, reliquæ cras-siores scirrhum producant. Ad sectionem non nimidim properant, nisi morbus hic non alius cedat remediis, & exstirpato tamen ab ægris serio postuletur, tùm caute eandem absque nervorum aliorumque vasorum læsione experto Clirurgo permittunt administrandam.

In *Bronchocèle* commendant internè essen-tiam. camomill. & co. tic. aurantior. cum spiri-coleis. ʒci anisato; externè verò emplastrum de baccis lauri, & subadstringentia ex gallis & nucibus cupressi, ut cataplasma ex sativ. tabar. sem. cum pulvere gallar. bol. armen. & simplicibus. In principio, ne tumor incrementum capiat, ferulas aut lamipam plumbeam imponunt super emplastrum, & forius aliquantum colligant, observato tamen, ne gula nimium collingatur. Emplastra quoque ad reliquas herniaz species convenientes hic in usum ducunt, cum si-milem operam in hoc morbo præstare queant. Tandem incisionem adiungunt, si medicamenta non prosunt, ut flatus & reliqua materia exi-mantur, & foramen postmodum emplastro sti-ptico iterum claudunt & consolidant.

§. 16. *Nostro* iudicio in *Scrophulis* ab ob-structione contumaciori glandularum, ab aci-do viscido factâ oriundis conducunt omnia il-la medicamenta, quæ acidum illud viscidum corrigunt & obstructionem tollunt, italia nem-pe volatilia, liq. C. C. succinat. cum essent. viperin. Zeev. sal. volat. C. C. quæ omnia succis motum reconciliant; huc pertinent & omnia aperientia vulgo sic dicta, ut sunt Mar-tialia, e. g.

℞. boni Diaph. blis Chalyb.

c. ʒppt. aa. ʒj.

Cass. lign. ʒiv.

c. sacch. in ʒ paleg. solut. ʒiij.

Semper enim ad primas vias in hoc affectu respi-ciendum est, ne facile accedat chylus, eam ob causam conferunt omnia absorbentia, imprimis spongia combusta, ossa sepiæ, oculi ʒci cum flori-bus ʒci permitti, qui elegans sunt remedium, ut & terra foliata ʒi more Tacheiniano parata, & inter-nè, & externè usurpata. Pro specifico com-mendamus arcanum duplicatum & essentiam carminativam cum Elixire antisebrili *Mysf.* ma-ritatam, anjara enim generosa sunt remedia. Chy-lo ita correcto in primis viis lymphæ remaneus viscida in glandulis stagnans educatur blando hydragogo, in quem finem sola radix laxativa cum Mercurio dulci sufficit. Alii commendant Turbith addito momento salis aperiti vi. ʒci, vel card. bened. vel trifol. fibrin. In delicatioribus ex-hibui Decoctum passularum cum fol. fern. & Tartaro crudo paratum. Evacuata lymphâ, aci-dum viscidum potè corrigatur volatilibus o-leosis, inter quæ excellit sal. volat. oleos. n. d. ad paucas guttas per aliquot menses usurpatum, quo plures Dei gratia feliciter restitimus. Ca-vendum verò, ne calida nimis & desiccantia ap-plicentur in principio, quo in casu mobiles ma-gis partes relictis terrestrioribus discuti, & ita scrophulæ in scirrhus transire solent: sed appli-canda veniunt, quæ materiam viscidam & terre-strem incidere, attenuare & fermentare valent, conducet ergo internè sequens.

℞. Bezoard. min. gr. vij.

ʒss diaphoret. ʒviat. gr. iiij.

Ibericæ. Andromach. ʒj.

M. pro sudorifero.

Assiduo etiam studio ad mesentericum strumo-sum cura dirigenda est, quâ de causa Tinctura Antimonii ex icoris Reguli ad 20. guttas singulis matutinis horis in ʒignor. succis. tarax. exhibeat. Potui indantur rad. farsaparill. lign. fassalr. bacc. Junip. fol. ceterach. Extracta quo-



## CAP. II. DE STRUMIS & BRONCHOCELE. 259

quoque ex his aliisque vegetabilibus sæpe omnem paginam implent, quibus deinde pulveres contra strumas, acidum absorbentes; interponantur; laudamus sequens.

R. Pulv. contra strumas Quercet. ʒij.  
Arcan. duplicat. ʒj.  
Mijc. F. Pulvis.

Vel:

R. Rad. Vincetoxic.  
Ononid. aa. ʒß.  
ʒi diaphoret. ʒiij ʒij.  
Pulv. ad strum. A. ʒviij.  
Ol. nucisß. ʒß.  
sicch. alb. ʒß.  
M. f. pulv.

Dosis, quantum capit cuspis cultri bis de die Luna decrefcente. Vel:

R. Pulv. ad strumas August. ʒiij.  
Arcan. duplicat. Myul. ʒiij.  
Magist. Spin. viper. ʒj.

M. F. Pulvis ad ʒj. exhibendus Luna decrefcente. Electuarius ex pulvere lactearum & melle paratum capiat strumofus magnitudine Nuc. molchat. horis maturis per 30. dies, quod valde commendat Scultetus & alii. Sequens etiam euporiston est remedium Loffii, quo Empiricus quidam se innumeros curasse gloriatur.

R. Spong.  
lap. Spong. aa. ʒj.  
floccor. ex pannulaneo rubr. disciff.  
mandib. luc. aa. ʒß.  
panis tost.  
lap. Specular. aa. ʒiij.

Comburantur omnia simul in olla clausa, P. Pulv. exquisiff. rit. add. sacch. ʒj. Dosis ʒj. decrefcente D.

Sequens etiam laudibus suis non est desituentum.

R. Spong. combust.  
off. sepiæ.  
pip. long.  
nigr.  
Zinzib.  
Arcan. duplicat.  
lap. Spong. aa. ʒß.  
P. per. pp.  
Sem. plantag.  
Nuc. cupress.  
molchat.  
Turbit. aa. ʒij.  
Sa. char. q. l.

M. l. Pulvis.

Vel conducit pulvis Arnoldi de Villâ novâ ad strumas. Radix vincetoxici tanquam verum antidotum in scrophulis laudatur ab Etsnero in Eph. Germ. Ann. 1. O. lerv. cuius decoctum non incommuni est remedium per longum tempus. Sicut, radix enim hæc singulare quid obtinet in curandis strumis. Lapis spongiæ calcinatus etiam dicitur specificum in strumis remedium, quia acidum in succis abundans absorbet.

Molles Danticanus sequenti modo feliciter instillat curari. Interne dedit ʒa decrefcente pulv. spong. & lap. spong. calcinat. & sequente tempore illi curavit scrophulas.

R. ʒi ad alied. caliginat. libi.  
Lap. ʒi. cum portu vitæ libi.  
C. C. ad. libi.

M. & ex Rotori distillat. a. rostro add. Camph. ʒß. deinde illi iussit sequenti linimento.

R. Ol. distill. ex lardo porcini.  
laurin. aa. ʒj.

M.

Inter Topica verò in principio disiccutientia sunt adhibenda & dein ad emollientia accedendum, si verò hæc nihil efficiant in scrophulis, excedentia seu corrodentia ulsiropanda. Disiccutientia parantur ex volatilibus, hinc Barbetæ commendat unguentem ex sale volat. quodam cum butyro majali, ut & emplastrum sequens, quæ optima sunt.

R. Gummi Galban.  
Ammoniac.  
bdell. aa. ʒß.

bacc. laur.  
staphyd. agr.  
pyrethr.  
cumin. aa. ʒvj.  
Stercor. columbin. ʒj.

caprin.

Axung. porci ʒiij.  
Ol. Camomill. ʒj.  
Cera &  
Picis aa. q. l.  
M. F. Emplastrum.

Vel

R. Succ. Raphan.  
Sis volat. ʒj.  
Sapon. Viner. ʒij.  
Coq. in Unguentum.

Spirituosa verò mihi magis placent: ex. gr.

R. Spirit. topic. ʒij.  
\*ci ʒj.

M.

Vel sequens, quod experientiâ comprobatum est.

R. Spir. frumenti libi.  
bacc. junip.  
lauri aa. ʒß.  
sul. beton.  
serpill.  
flor. lavend. aa. ʒj.  
\*ci ʒß.  
L. ʒj.  
lign. Guaiac.  
rad. saraparill. aa. ʒvj.  
Coq. in aperto vase,  
Deur pro Epithimate.

Ad fermentationem in succis stagnantibus excitandam, & ad motum materiam latentem incitandam, conducet præ aliis cataplasma sequens vel simile.

R. Herb. scord. absynth. rute,  
cicuti. aa. Mj.

stercor. columb. ʒvj.  
sal. tart. colocynth. aa. ʒvj.  
herb. salu. Mj.  
sem. brodan. ʒv.  
fumentul. ʒiij.  
sal \*ci ʒiij.

extr. rad. hypon.  
sem. cumini. aa. ʒß.

Add. facieb. vini vel urinae f. cataplasma, & quidem bis de die applicandum.

Post applicatam cataplasma scrophulæ sequenti illuende sunt linimento, quod commendat celeberr. Du. Oyetcamp.

R. Ungu. Dialth. ʒj.  
Ol. succin.

K k 2

Junip.



*Junip. aa. ʒb.**Laurin.**Philosopb.**Spir. Sol. ꝯci aa. ʒiib.**M. D.*

Post inunctionem applicari potest seq. Emplastrum.

*ꝯ. Empl. melilor.**diachyl.**gumm. galban. aa. ʒb.**labdan. ʒiib.**pulv. myrrh.**aloes aa. ʒb.**macis. caryoph. aa. ʒij.**sem. cumin. R. salu. aa. ʒj.**Tinct. labdan. ʒiib.**styrac. liquid. ʒij.**sal. volat. C. C. ʒvj.**Ol. macis still. ʒiij.**M. F. Ceratum.*

*Scultetus* laudat oleum lacertarum, nos nostrum viperinum, quo multum præstitimus. Sic & pinguedo vipera in strumis incipientibus egregia medicina est, earumque incrementum præcavet. Inter resolventia & numerari potest tanquam egregium remedium sal. volat. lap. spong. in liquorem arte Chymicâ redactum & extenit illitum. Item sequens illinatur sæpius.

*ꝯ. Spir. vuc. amphorat. ʒij.**Tinct. ʒii ʒj.**M.*

Optimè resolventia cum maturantibus & enollientibus adhibentur. in quem finem conducunt gunum. Annon. Galb. bell. opopanax, &c. Sic & oleum irinum, liq. terr. fol. & ol. Si per deliq. item *Helmonti* efficacissima sunt in resolvendis strumis. Spiritus convulsivus n. d. etiam conducit sæpe strumis illitus.

Conveniunt quoque pro resolvendis his tumoribus strumolis omnivaria ʒalia, & emplastrum illud in tumoribus discutendis adeo famosum *Vigenis* de ranis cum ʒio, nec non amalgama ʒale, ex quo & cum quo emplastra parata sunt proficua, item sequens nostrâ experientiâ optimum est.

*ꝯ. Succ. rut.**sabin. aa. ʒvj.**ʒiill. ʒb.**▽ vit. ʒij.**Ol. lil. alb.**rut. aa. ʒi.**castor. ʒij.*

*Cog. ad succor. consums. add. bdell. in + dissoluit. ʒij.*

*• Salis ꝯci ʒiij.**ʒis vuv.**lap. pumic.**Nuc. cupress.**aristol. rot. aa. ʒb.**euphorb. ʒb.**Cer. citr. q. f.**F. Linimentum*

Sequens *Estmülleri* ʒale non contemnendi erit usus.

*ꝯ. Emplastr. diachyl. cum mucil. ʒj.**ʒis vuv. salivâ extenit. ʒj.**M.**♂ Cucumeris asinini proficuum est.*

Strumas curari posse dicunt, si cer manu mortuis

cu jusdam fricentur. Propriâ etiam salivâ singulis diebus manè illinantur. Alii easdem abigi posse pronuntiant, si pavens singulis matutinis horis propriam potet urinam. Tanquam si cæcicum à *Carducio* in *Prax. Hartm.* laudatur Sal punicis, si ʒj. in aquâ scrophulariâ omni manè allumatur. Cures Talpæ in decocto scrophular. exhibiti ab *Hartmanno* interius commendantur. Quod si exulcerata fuerint, eodem autore curantur in sperlis cumeribus salapandæ in olla igne circulari exustæ. Si vero scrophulæ fuerint dolorificæ, optimè mitigabuntur vel per emplastrum *Vigenis*, vel nostrum ʒale. Si tendant ad suppurationem, sequens conducit unguentum *Barbettes*, quod ex *Fabricio* est mutuatus.

*ꝯ. Ol. Myrrin.**laurin. aa. ʒb.**Unguent. martial. ʒj.**Argent. viv. florib. ʒiij extenit. ʒvj.**M. F. unguentum.*

Vel imponatur emplastrum de meliloto cum oleo camomill. & pingued. viperin. maxatum. Strumæ suppurate non statim sunt apertendæ, quia ob visciditatem acidam materia univeria non facile suppuratur, proinde semper cataplasmata emollientia & suppurantia ulterius sunt imponenda, & foramina diu aperta servanda. Si vero ad suppurationem ob visciditatem lymphæ tam facile perducere nequeant, imponatur aliquando cortolivum, ac applicetur turunda cum unguento basilic. cum terebintina communi mixto, cui aliquando, ut n. elius foramen aperit maneat, admisceri potest mentum, c. o. c. metallorum. Glandularum ulceratæ et studio sistunt sunt mundificanda & dein incarnanda. Pro mundificatione sufficit baln. ʒis aniat. vel terebintinatus.

Scrophulæ prominentes & pendulæ filo vel pilo equino sensim sunt contrahendæ, ut tandem marcidæ spontè decidunt. Si vero propriâ cystide includantur, Chirurgi manu necesse est ut curentur, & cultro excendantur, eo tamen respiciendum. nemagna vasa languiscent aut nervi laedantur. *Hartmannus* sine incisione strumas facile curari affirmat, si bibat æger ex cratio hominis sepulti, non quidem semel, sed sæpius.

Aæuleum ex fabaria collo appentum à *Celeb. Wædelio* magnipenditur. Bulo per 40. dies caleo putrido & oleo olivarum nutritus, & in unguentum redactus optimè conducit tunicis illitis, auctore Patre Capuccino Gallo.

His si non cedat malum, curantissimi instituat palliativa, exterius applicando emplastrum de ranis cum ʒio, quippe verum est, quod *Carrésium* jam enunciant, si glandulas obstructas fortius agitaveris per gummis & olea calidiora, non raro ferocius etiam transierunt in caneros, vel discussis particulis subtilioribus abeunt in scirrhos.

Solâ imaginatione curari posse scrophulas & strumas affirmant Historici quidam, de curatione Regia Gallica & Anglica agentes, quam, ne quispiam ad curationem hanc scrophularum pertinens videatur omittum, breviter nunc exhibebimus. Die Pentecostes Rex Galliarum, pridie horâ vespertina primâ Deo reconciliatus & lacta usus lynxi in æde D. Francisci sacra honores morbosos ab Archiatro Regio ejusque Collegis in quodam ordine ab utroque latere ita collocatos,

catos, ut ipso intermedio personæ quatuor iuxta se invicem unâ vice transire queant, insimul probe exploratos, nunc ex avaritia & studio probandi domi. aut dolo & invidia ex aliorum hostium insinctu Regem instruimento quodam aut armis hac ratione insidiosè & clanculum lædendi aut occidendi se ægros simulent, latellitibus, aliaque cohorte militari stipatis, capite nudatus & facie manibusque singularem præterens pietatem accedit. Adventante verò Rege homines nobili manibus in cælum sublatus in genua devoti procumbunt, quos deinde Medici à tergis eorum flantes capillis placideprehendunt & verius Regem declinant, qui brachio dextro aliquantulum exerto & manu in formam crucis posita singulorum frontes tangit, luice simul prolatis verbis. Rex tangit te. Deus sanat te, in nomine Patris, Filii, & Spiritus Sancti. Quibus peractis Regis accedentes Eleemosynarii, unicuique exhibent munusculum, & unum post alium per acris fores dimittunt. Regi verò exhibetur aqua pro abluendis manibus, & actus hæc ceremoniis hæc finitur. In Anglia cura hæc sequenti more peragitur: Archiater Regius cunctos ad se vocat morbosos, ex quibus, reprobè explorata, strumus seu malo Regio laborantibus certum denominat conclavè aut templum in quo congregentur, ut Regem accederent, qui finita concione cathedræ insidens, à dextris Secretarium tot Angelotot, seu nummos aureos vinculo sericeo albo dependentes. quot distant ægri, manu tenentem, à sinistris verò strumosos admittit, ab Archiatro sufficienter instructos, quomodo ternâ capitis incircumvacione Regiæ Majestati sint approximaturi. Tum Ecclesiasticis verticulum quendam prælegit ex Bibliis ad ceremonias istas aptum, verb. gr. ex Marc. cap. 16. v. 18. ubi Christus Apostolis suis promittit ægros ab impositione manuum eorum sanatum iri. Medicus cum quovis strumoso separatim Regem accedit, & cum illis prociat in genua, Rex vero manu sua dextrâ malam ægri sinistram, & sinistâ dextram tangit, & simul Consecrator priorum verticuli lectionem repetit ad quemvis actum, Medico non prius surgente, quàm ægri cuncti fuerint tacti, quibus peractis Ecclesiasticis priores sex vesiculos capitiprimi Evangelii S. Johan prælegit, & si quidam nondum plene fuerint curati, eorum unus post alium denuò ad Regem ducitur, qui ipsemet uniuscujusque collo Angelotum appendit. eosque à se dimittit: ubi Rege pro ablutione manuum aqua porrigitur, & recitat precatione Dominica cum collectis actus hæc clauditur. Quidquid vero aliud de hac ecclâ sentiant, Regibus hæc solis domui hoc peculiare tribuentes, nuhi in imaginatione ægrorum curatio hæc, si quæ est, potissimum consistere videtur, cum & Comites

Hæspurgientes eos à strumis liberalitè dicantur, qui potum aquæ ab eorum manibus acceperint, & quotidie huiusmodi curaciones à privatis hominibus contingere observentur in variis morbis, ita ut sola spirituum animalium valida dispositio id præstet, quod externo adhibetur attractui, spiritus enim valde ab imaginatione commoti quævis claustra petrumpunt, & omnia dimovent obitacula, ut commodior inde succorum antea stagnantium & jam resolutorum sequatur distributio, & sic tumor omnis evanescat.

Cura *Bronchoceles* non multum differt à curatione Strumæ, nisi quod Bronchocele felicius ac tutius manu Chirurgi aperitur: notum enim exemplum est Bronchoceles fortuitæ curationis *Zod. Gall. O. f. 11.* Quidam enim patrâ Muncienlis 42. annos natus, cuius jam pridem deurpabat collum Bronchocele insignis magnitudinis, assidens fabro fæteratî solcas ferreas equo affixuro, dum urget fabri ministrum, ut compendium temporis faciat, veru fætereo acuto recentissimè fornacæ ducto, & calverum lommationi destinato percussit, ictus ille, quo Bronchocele transacta est, primo hortorem incussit, sed qui postmodum in ingens gaudiū emersit, exiiente enim altam humore sculto in grumos concreto calculi formibus corpusculis, lentibus similibus, admixtis, uno pene momento subsedit tumor, qui antea pe. toris regionem devolvebatur, unde subiecuta supuratione curatio integra brevissimè succellit. Confer quoque prædict. *Zod. Gall. Olf. 9. pag. m. 69.* Sic & Clariss. *Muralto* ejusmodi Bronchocele curavit incisione facta in parte molli & declivi profundius instituta, foramen vulneris spongiâ præparata implevit & diapalmâ deligavit, & sic ægram perfectè ab hac Bronchocele liberavit, prout videre est in *Decur. Eph. Germ. Ann. 3. Olf. 134.* Emollientiatanen singulaxer conveniunt & medicamenta flatu discutientia, si ve carninativa, manuali operationi circumspicte præmittenda, præcipue verò ex camomilla, internè & externe, essent. carminat. cum Elix. anticebil. *Myrsi.* Tinctur myrrh. Pulv. ex rad. Ireos sem. anil. & herniat. pip. long. cinanom. alumi. ust. myrrh. & similibus. Externè oleum chamomill. linaragdin. emplastre. debacc lauri, malaxat. cum ol. chamomill. æten Bals. Quis & empl. dialuph. vel lequens cataplasma.

℞. Capar. alb.  
rad. lil. alb.

alib. aa. q. l.

Cum ol. chamomill. in pulcritam reduc. & addit sapone nigro q. l. F. s. a. Cataplasma per 12. dies calidè applicandum, quod & proderit in Scrophulis.

### CAPUT III.

#### De Glottidis Constrictione, & Epiglottidis Induratione.

##### §. I.

**S**ola structura diversitas organorum corporis nostri usum operationem variat, ejusdemque commoda dispositio unum idemque membrum pro partium, ex quibus

compositum est, differenti figurâ, sitû, magnitudine & motu pluribus destinatur. Hæc itaque causa existit, quod i. *argus* & respiratori, & voci efformandæ interserviat, posteriori quidem

Kk 3

dem maxime: quoad superiores sui partes, *Glossidem* videlicet, & *Epiglottidem*, quibus recte se habentibus nullum patitur vox impedimentum, morbis vero afflicte tantum aliquando inferunt damnum, ut nullus edi ab homine queat sonus, aut quàm difficilis sit, sed vox ipsa hæreat faucibus, nec ultra possit propelli. Cum vero & hæc in actione machinæ humanæ nullum sit inferendum aut permittendum obstaculum, affectus, quibus partes hæc nonnunquam prehendi posse observatum fuit, quamvis rariores sint, nec adeo frequenter in praxi occurrant, merito hic separatim tractandos suscipimus. *Glossidis* verò *Constrictio* est ejusdem angustatio, facta à re quadam rigidiore, partes ejus tum musculosas, tum cartilagineas & membranæas, vel externæ, vel internæ comprimente, & sic rimam à priori formâ in aliam cogente, ut latera ante distantia, nunc plus minus invicem conniveant. Pertinet ad constructionem istam altera quædam species, in qua rimabæc à re quadam externâ importunè insilapla interius obstruitur & præcluditur, sique non modo vox impeditur, sed aëris transitus denegatur, sique respiratio difficilis, & suffocationis periculum inferitur.

*Glossidis  
constrictio.*

*Epiglottidis  
Induratio.*

*Epiglottidis Induratio* est partis hujus sive operculi *Glossidis*, quoad particularum ejus interstitia fibrosa occupantium, à majori motu & tardiori, in minorem & celeriores, à particulis alienis aperi foribus, & defectu liquoris irrigantis orta transpositio, inde & fibræ compinguntur, & operculum hoc rigidius rimulam *Glossidis* magis patulam reddit, quam decet, sique & voci & deglutioni ponit obstaculum.

Referri huc possit & contrariò ejusdem operculi nimia emollitio & depressio à re quadam humida, aut dura & gravi, sed hæc symptomata tum per emanatum quondam ex prioribus intelliguntur, tum posterius ratione causæ cum *Glossidis* præclusionem in unum incidit.

*Partes  
afflicte.*

§. 2. *Partes afflicte* sunt *Glossis* cum *Epiglottide*, quarum prior *γλωττις* Latine vertitur Lingula, seu parva quadam lingua, & est pars, seu corpus illud, quod in *Larynge* pro aëris ingressu & exitu ad respirationem & vocem necessario foramen seu rimam constituit. Ex tertia & quarta *Laryngis* constat cartilaginibus, uno verbo *ἀγοραιοειδής* ab Anatomicis comprehensis, Latine cartilago guttalis dicta, quod forma ejus ad gutturium, vel partem illam vaforum accedat, quâ aqua effunditur, & hæc rimula junctis duobus superioribus hujus cartilaginibus partis processibus efformatur. Notum enim est, *Laryngem*, id est, asperæ arteriæ caput, quinque constare cartilaginibus ex quibus prima *θυροειδής*, seu seuiformis, secunda *αγοραιοειδής*, seu annularis, quod totam *Laryngem* ambiat cognominatur, tertia & quarta, à quibusdam pro una habita, *Glossidis* huic impenduntur, quinta denum rimam tegit & claudit, *Epiglottis* proinde dicta, situm obtinens ponit lingue radicem ad os hyoides, in brutis pari muscutorum supra dorsum donata, in hominibus autem hisdem destituta, musculo tamen membranoso fruens, cujus fibræ carniæ rectè ab osse hyoide per *epiglottidis* dorsum exeuntes ipsam atollunt, & verius lumen immutem suam molliuntur inflectionem. Dum vero per rimam hanc reliqua *Larynge* angustiores aëri copiam elidunt, sonus ille efformatur, live vox, ad loquem percipiendam & in-

teriora mentis cogitata alius aperienda transire necessaria. In opere hoc rectè præstando mens nostra officio fungitur Organistæ, spiritus animales per nervos recurrentes levi parvis ad musculos mittens tum thoracis, tum *Laryngis*. Pulmones solum instar aëiem extrudunt & mittunt in fistulam, qui per angustiam *Glossidis* inter *Epiglottidem* cum impetu quodam erumpens sonitum efficit, quem lingua, tanquam digitus Musici musculos *Laryngis* variè tangentes, moderatur, pro lubitu mentis diversimodè disponit, & interdum suaviter modulatur. Absque mentis quoque imperio sola organi structura & vario spirituum influxu, variè in brutis oriuntur concentus & diversæ vocum species, & has in avibus quibusdam, quæ tamen omnes *epiglottide* destituntur, singulari mentis acque centia nonnunquam auribus nostris percipimus, in aliis vero brutis, quorum nonnulla in profundo *Laryngis* ventriculum quendam obtinent, imperio tam molesto quandoque effertur, ut non sine horrore aures percutiantur. Ad diversitatem quoque vocum multum tribuit constitutio fistulæ pulmonalis, quatenus illa vel brevior, vel longior, latior, vel angustior est, potissimi tum vero officium præstat *Glossis* nostra cum *Epiglottide*, quibus male se habentibus ipsæ rationi obex quidam interponitur, & deglutitio redditur difficilis, quorum prius in *Glossidis* Constrictione fieri solent, posterius autem in *Epiglottidis* Induratione, ob quam rimula illa perpetuò solet hiare, ut in cognitione morborum horum pluribus nunc percipiemus.

§. 3. Facile vero *Glossidis* & *Laryngis* *Constrictio* manifestatur ipsâ vocis in agrosis interceptione, quando enim omni adhibito conatu nunc quidem emittere possunt, nullus dubitabit rimulam hanc *Laryngis* à re quadam molesta angustatam & pene præclusam esse, cuius adhuc certius indicium hinc deduci potest, siager de loco doloris rogatus summam faucium partem ostendat penes ipsam lingue radicem, & nulla alia adsint signa angustæ, nullus tumor in collo, nulla inflammatio aut aliud quodpiam interiores faucium partes occupans. Deinde pro majori vel minori istâ in vocis elisione aut respiracione difficultate ipsius quoque morbi cognoscetur magnitudo, ut gravior hic morbus sit percipiendus, quando omnino vox proferri aut respiratio peragi nequit, levior vero, ubi vox aliqua, aut exspiratio adhuc persentitur. Multum præterea ad morbum hunc facilius cognoscendum investigatio faciet causarum, quæ in re sequentes paragraphi nos commode adjuvabunt.

*Epiglottidis Induratio* colligitur ex vocegravisiori, raucâ & nigra, vel ejusdem omnimodâ ablatione citra apoplexiam, anginam aliumque morbum aphoniam aliis inducentem, respiratione frequentiore, singulari in deglutione molestiâ, quatenus frivola ciborum minora ipsam *Laryngem* ingrediuntur, & suffocationem nuntiant, hinc ægroti majores tantummodo bolos gula suæ aptare coguntur. Potius etiam quando assumentur, majori copia trachæam ingreditur, & ad pulmones pertingens tussim inducit, sed ex hac notitiam de Induratione illa judicandum est. Cibi in asperam arteriam aut *laryngem* illabentes, de nimo *glossidis* hiatus siquæ *Epiglottidis* apertura & distantia iudicium præbent satis firmum, quod si frequentius &

serè



ferè semper obveniat, meritis de ipsius rigiditate suspicio oboritur, ob quam à cibis delabentibus non deprimitur, nec tunc claudunt, sed per paululum quatuor ostium non modo in gulam, sed ipsas quoque fauces & alpeham arteriam illabiuntur, & non modo difficilem causantur respirationem & tussim, sed si portiones crassiores & asperiores sunt, nec citò satis expellantur, doctorem ingentem & suffocationem.

*Ætologia  
secundum  
Galenum  
affertur  
Glottidis  
Constrictionis.*

§. 4. Ut in *Cansarum* per investigatione feliciores simus, aliorum non transibimus adjumenta, sed à toties jam rogatos nostros denuò consulimus Medicinæ Antistites. Referunt vero omnium primò ipsi *Galenus*, priorem illum morbum, nempe *Glottidis Constrictionem* oriri vel à causis internis, humoribus scilicet crassis, viscidis, pituitosis aut melancholicis circa partem hanc collectis, vel à rebus austeris foris illabentibus, ut comestione fructuum immaturorum, aut vi potentium strangulatoria, vel rebus durioribus in principio guis diutius hærentibus, & adjacentem glottidem comprimantibus, aut etiam alia ratione occludentibus, quod à motus quoque organici partium vicinarum contingere posse proferuntur.

*Epi-glottidis  
Indurationis.*

*Epi-glottidis Indurationem* deducunt tum ab ineptie calidi & sicci partium vicinarum, ob quam cartilago hæc videm nimium exsiccat, quod in *Pneumonia*, *Angina*, aut febribus maxime causticis, interdum obvenire posse adierunt; tum à rebus audentibus & exsiccantibus, ut pipere, zingibere, cibis fumo duratis, salitis, parciore potu, aëre per inspirationem adsumto nimis sicco & aspero, vento boreali &c. id genus aliis humidat. cartilaginibus hujus abluentibus & eandem corrugantibus.

*Paracelsus  
obno de  
Glottidis  
Constrictione.*

§. 5. *Paracelsus* ordine sequens *Glottidis Constrictionem* obungere rationatur à sale aluminoso resolutò, ad partem hanc delato, eandemque pro virum ratione & subiecti dispositione comprimente.

*Epi-glottidis  
Indurationis.*

*Epi-glottidis Indurationem* à sale spissiori deducit, à quo omnis durities partibus quibuscunque obveniat, unde salitudo vel cum cibo & potu, vel alia ratione ad cartilaginem hanc pertingens, similè morbum generi suo communem eandem inducat.

*Helmontius  
epno de  
causa  
Glottidis  
Constrictionis.*

§. 6. Ad *Helmontii* testem *Glottidis Constrictionem* natales suos debet Custodi Laryngis a re quidam aliena irritato & perterritò, unde fugam ille molens vel à sua contrahit, & simul superiore istam Laryngis partem constringit. Res vero illa custodem percellens variarum potest esse spectum, sive in corpore genita, sive exterius adveniens, insit per egerimusdam hospitis dominium in alieno territorio conquirituri.

*Epi-glottidis  
Indurationis.*

*Epi-glottidis Indurationem* à defectu laticis dependere approbat, & custode defaucto nihil ex communi laticis malà ad ejusdem partis irritationem secedente, & ad eam transmittente, quare defectu succi emollientis rigescat, ut glottidem ulterius nequeat claudere.

*Ussing  
ætiologia  
Glottidis  
Constrictionis.*

§. 7. A *Vissio* percipimus, *Glottidis Constrictionem* fieri tum à rebus fortis illapsis & meatum hunc obstruantibus, tum à convulsione partium fibrosarum Laryngis, tum ab alia quâdam compressione vicinarum partium, unde Glottis simul angustatur, & tandem à latice aut sanguine

ne evasato circa partem hanc moram trahente, & temporis diuturnitate incrassato, sique tracheæ introitum occludente.

*Epi-glottidis  
Indurationis.*

*Epi-glottidis Indurationem* ab inopia humiditatis irrigantis produci annuit, hæncque eo subito non à variis causis fieri, hæc nempe sicciore per inspirationem assumpto, febribus ardentibus, inflammatione pulmonum, & similibus.

§. 8. *Sylveus* superior in sententia absque ullâ controversia subicribit, tum quoad *Glottidis Constrictionem* aut à morbis vicinarum partium, aut à rebus extraneis irrudentibus, aut humoribus acidis convellentibus oriundam; tum *Epi-glottidis* quoque *Indurationem* ab humoris defectu quomodocunque inductam certo dependentem.

*Cartilaginosa  
Indurationis  
causa  
Glottidis  
Constrictionis.*

§. 9. Eadem etiam *Cartesius* fiat sententia, ad rem clarius delineandam addentes, fibras musculi arytenoidis interdum à particulis humatis nimium constringi, à quo similiter cartilago hæc constringatur, ab aliis autem corporibus irruentibus cavitatem occludi, aut in formam torqueri incongruam.

*Epi-glottidis  
Indurationis.*

*Epi-glottidem indurari* asserunt absumpto aut inspissato liquore cartilaginem hanc aliis irritante, vel ab aëre sicciore & asperiore multis particulis salinis prædito, vel à morbis diuturnis calidis, quo facto poros ejus angustari, & fibras sibi invicem propius accedere, quarum situm ad invicem archiorem substantia totius cartilaginis mutata configurationem & corrugationem immediatè dicunt sublevari, & sic foramen aut rimam illam Laryngis non obtegi, sed apertam manere.

*Nosstrum  
iudicium  
de causa  
Glottidis  
Constrictionis.*

§. 10. *Nosstrum* ut nunc addamus de hîc iudicium, asserimus equidem Laryngis illum introitum, quem Glottis constituit, constringi, id est, occludi posse à variis rebus heterogeneis ab extra in rimam hanc infortunio quodam irruentibus, ut quando vel fortiori inspiratione alligantur res in aëre volitantes, flocci nempe, muscæ, apes, vel inter ridendum aut loquendum frustulum cibi deglutitur, quod deviando non gulam sed Laryngem per apertum meatum ingreditur, idque eo citius contingit, quando portiones itæ aliquæ in parte fuerint acutæ; sic nota sunt exempla de suffocatis ab officulis animalium, mica panis, frustulo ficus, nucleo ceræ, pilo circa epi-glottidem evoluto; idque frequentius accidisse, dum homines inter manducandum & deglutendum sibi non temperant à risu aut fortiori loquela, siquidem expiratione illa validiore operculum laryngis live Epi-glottis à rimula sua dimota, & hæc amplius, quam decebat, aperta, res vetò istius generis illapsæ & in Glottide hærentes, eam tunc varîe torquent, constringunt & occludunt, ut aëri pro respiratione aduultendo, aut emittendo, non sit ulterius patula. Respræterea, aut cibi autem, dum ad deglutendum gulæ offeruntur, musculos Laryngis unà cum gulâ & faucibus constringere possunt qualia sunt poma & pyra sylvestria, acido-austera, torbi, prima lyvestia immatura, & alique fructus acerbi & succi eorum, liquores stipicii; ær crassus, aut particulis vitriolicis, sulphureis, acidis, austeris, aut fumo carbonum sulphureorum præguans eandem edit operationem. Laqueus & vincula è regione Glottidis collum fortius circumducta eandem constringunt, & vel ex proposito, vel improvito suffocationem inferunt. In convulsione



dem maxime: quoad superiores sui partes, *Glossidem* videlicet, & *Epiglottidem*, quibus rectè se habentibus nullum patitur vox impedimentum, morbis vero astrictè tantum aliquando interitur damnum, ut nullus edì ab homine queat sonus, aut quàm difficillimè, se à vox ipsa hæreat faucibus, nec ultra possit propelli. Cùm verò & hæc in actione inclinata humanæ nullum sit inferendum aut permittendum obstaculum, affectus, quibus partes hæc nonnunquam prehendi possent observatum fuit, quamvis rariores sint, nec adeò frequenter in praxi occurrant, meritò hic separatim tractandos suscipimus. *Glossidis* verò *Constrictio* est ejusdem angustia, facta à re quadam rigida, partes ejus tum musculosas, tum cartilagineas & membranæas, vel externæ, vel interne componente, & sic rimam à priori lorinà in aliam cogente, ut latera ante distantia, nunc plus minus invicem contineant. Pertinet ad constrictionem istam altera quædam species, in quâ rimahæc à re quadam externâ importunè illapla interius obturatur & præcluditur, sicque non modo vox impeditur, sed aëri transitus denegatur, sicque respiracionis difficultas, & suffocationis periculum infertur.

*Glossidis  
constrictio.*

*Epiglottidis  
Induratio.*

*Epiglottidis Induratio* est partis hujus sive operculi *Glossidis*, quoad particularium ejus interstitia fibrosa occupantium, à majori motu & tardiori, in minorem & celeriorum, à particulis alienis ac perioribus, & defectu liquoris irrigantis oria transpositio, unde & fibræ compinguntur, & operculum hoc rigidius simulam *Glossidis* magis patulam reddit, quam decet, sicque & voci & deglutitioni ponit obstaculum.

Referri huc possit & contrario ejusdem operculi nimia emollitio & depressio à re quadam humida, aut dura & gravi, sed hæc symptomatica tum per enantiam quandam ex prioribus intelliguntur, tum posterius ratione causæ cum *Glossidis* præclusionem in unum coïncidit.

*Partis  
affecta.*

§. 2. *Partes affectæ* sunt *Glossis* cum *Epiglottide*, quarum prior γλῶττις Latine vertitur Lingua, seu parva quædam lingua, & est pars, seu corpus illud, quod in Larynge pro actus ingressu & exitu ad respiracionem & vocem necessario formatum seu rimam constituit. Ex tertia & quarta Laryngis constat cartilaginibus, uno verbo *agoutan* vocem ab Anatomicis comprehensis, Latine cartilago guttalis dicta, quod forma ejus ad guttutrinum, vel partem illam vasorum accedat, quâ aqua effunditur, & hæc rimula junctis duobus superioribus hujus cartilaginibus partis processibus efformatur. Notum enim est, Laryngem, id est, asperæ arteriæ caput, quinque constare cartilaginibus ex quibus prima *Epiglottidis*, seu scutiformis, secunda *Epiglottidis*, seu annularis, quod totam Laryngem ambiat cognominatur, tertia & quarta à quibusdam pro una habita, *Glossidis* huic impenduntur, quinta demum rimam tegit & claudit, *Epiglottis* proinde dicta, situm obtinens ponè linguæ radicem ad os hyoides, in brutis pari musculorum supra dorsum donata, in hominibus autem hisdem destituta, musculo tamen membranoso firmens, cujus fibræ carneæ rectæ ab osse hyoide per *epiglottidis* dorsum excurrentes ipsam attollunt, & vetus lumenitatem suam molliunt inflectionem. Dum vero per rimam hanc reliqua Larynge angustiora aer motu copiosè eliditur, sonus ille efformatur, live vox, ad loqueturam percipiendam & in-

teriora mentis cogitata alius aperire datam operæ necessaria. In opere hoc rite præstando mens nostra officio fungitur Organistæ, spiritus animales per nervos recurrentes texti parvis ad musculos mittens tum thoracis, tum Laryngis. Pulmones solum milar aerem extrudunt & mittunt in fistulam, qui per angustiam *Glossidis* inter *Epiglottidem* cum impetu quodam erumpens sonitum efficit, quem lingua, tanquam digiti Musici musculos Laryngis varie tangentes, moderatur, pro lubitu mentis diversimodè disponit, & interdum suavitè modulatur. Absque mentis quoque imperio sola organi structura & vario spiritu in influxu, vatu in brutis oriuntur concentus & diversæ vocum species, & hæc variis quibusdam, quæ tam omnes *epiglottide* destituuntur, singulari mentis acque centia nonnunquam auribus nostris percipimus, in aliis vero brutis, quorum nonnulla in profundo Laryngis ventriculum quandam obtinent, impetu tam molesto quandoque effertur, ut non sine horrore aures percutiantur. Ad diversitatem quoque vocum multum tribuit constitutio fistule pulmonalis, quatenus illa vel brevior, vel longior, latior, vel angustior est, potissimum verò officium præstat *Glossis* nostra cum *Epiglottide*, quibus male se habentibus ipsæ irritationi obex quidam interponitur, & deglutitio redditur difficilis, quorum prius in *Glossidis* Constrictione fieri assolent, posterius autem in *Epiglottidis* Induratione, ob quam rimula illa perpetuò solet hære, ut in cognitione morborum horum pluribus nunc percipiemus.

§. 3. Facile vero *Glossidis* & Laryngis *Constrictio* manifestatur ipsâ vocis in ægrotis interceptione, quando enim omni adhibito conatu nunquid emittere possunt, nullus dubitabit rimulam hanc Laryngis à re quadam molesta angustatam & pene præclusam esse, cuius adhuc certius indicium hinc desumi potest, si æger de loco doloris rogatus summam faucium partem ostendat penes ipsam linguæ radicem, & nulla alia adsint signa angustæ, nullus tumor in collo, nulla inflammatio aut aliud quidpiam interius faucium partes occupans. Deinde pro majori vel minori istâ in vocis elisione aut respiracione difficultate ipsius quoque morbi cognoscetur magnitudo, ut gravior hic morbus sit percipiendus quando omnino vox proferri aut respiratio peragi nequit, levior vero, ubi vox aliqua, aut exspiratio adhuc perferuntur. Multum præterea ad morbum hunc facilius cognoscendum investigatio faciet causarum, quâ in se sequentes paragraphi nos commode adjuvabunt.

*Epiglottidis Induratio* colligitur ex voce graviori, raurâ & nigra, vel ejusdem omnimodâ ablatione cura apoplexiam, anginam aliumque morbum aphoniam aliis inducentem, respiracione frequentiore, singulari in deglutitione molestia, quatenus frustula ciborum minora ipsam Laryngem ingrediantur, & suffocationem minantur, hinc ægroti majores tantummodo bolos gula suæ aptare coguntur. Potius etiam quando alliantur, majori copia trachæam ingreditur, & ad pulmones pertingens tussim inducit, sed ex hac non ita de Induratione istâ judicandum est. Cibi in asperam arteriam aut laryngem illabentes, de nimio *glossidis* hiatu sicque *Epiglottidis* apertura & distantia iudicium præbent satis firmiter, quod si frequentius &

*Diagnos.  
Glossidis  
Constrictio.*

*Epiglottidis  
Induratio.*

ferè





vulnere musculorum laryngis, vel anginā, aut alio quodam eorumdem tumore idem obvenire solet, maxime si par quartum, sive thyroarytænoides est inflammatum tum enim cartilago arytenoides valde constringitur, & hæc contracta laryngem claudit. Simile quidpiam cartilago hæc pati potest à Tonillarum tumore, inflammatione & duritie, majori holo in gulâ hærere, carunculâ glottidis incumbente tumefactâ, à quibus pariter aliquando comprimitur. Alia quædam glottidis constructio aut oclusio fieri solet, dum boli majores deglutiendi, aut vi intrusi, per cesophagum, non satis patentem, non transiunt, sed in faucibus hærentes epiglottidem comprimunt, sicque laryngem fortius occludendo aëri itidem transitum denegant, respirationem impediunt & suffocationem inferunt, ut contigit quibusdam fructus integros deglutituris, pyrum nempe aut castaneam; alii vero pisces vivos ori indentes, sive ex incuriâ aut amentâ, sive piscatores natando manus liberas servaturi, qui per fauces viam quaesivisti operculum laryngis depellerunt, & antequam istis succurri potuisset, vitæ eis filum abbreviarunt.

*Epiglottidis Induratio.*

*Epiglottidis induratio* aliquando canalculis à carunculis Epiglottidis incumbentibus oriundis obstructis, ne nullus liquor ad cartilaginem hanc seu operculum Laryngis pervenire queat, cum enim substantia hæc ordinariè mollis, exliccat, induratur & rigescit, quoniam motus partium illius, qui ante in spaciis fiebat ma oribus, & tardior, jam longè est celerior, & intra spatia minima exercitur. Consumitur quoque idem hic liquor in majori februm æstu, inflammatione Tonillarum, Anginâ, Peripneumoniâ, Pleuritide, salivatione nimia, à quibus omne humidum nonnunquam adeo exliccatur circa partes hæc, ut communis illa otis membrana laryngis interiore partem succingens, eadem simul destruat, quod obvenire etiam soletis, qui nimia copia tabaci fumum allumunt, quo instar furni aut camini partes hæc aridas reddunt & plane exsiccant. Ventus borealis & Cæcias aperto ore aut diuturnior inspiratione assument, quod viatoribus quibusdam circa mare iter diutius ducentibus contingere potest, partes hæc aridas reddit, unde Glottis hæc rigida & flecti nelecta simulam Laryngis non claudit, sicque homines multis obijcit periculis, ut in priori morbo jam peripeximus. In Luce Venerea cum universa lymphæ sit infecta, & à temperie sua blandiore in acriorem corruptivam transposita, & cartilaginem hanc detrimentum aliquod pati posse vix dubitandum est, quin tandem penitus corrodatur, ut & hæc ratione ad officium pristinum simulam videlicet occludendi, reddatur inepta. Imò cum pars ista sit laryngi contigua, si hæc defectum patatur liquoris, propter vitium aliquod glandularum nihil per ductus consuetos ad eam mittentium, ejusdem ipsius inopia & ista suprema cartilago tandem redditur confors, & liquore privata irrigante faciliè corrugatur & rigescit.

*Prægnos.*

§ 11. Non sunt morbi hi contemptui habendi, cum *Glottidis Constructio* diutius durans suffocando mortem ipsam accersere queat, summe enim ad vitam necessaria respiratio vix præclusa inhibetur. & propterea morbus hic periculo satis est plenus, ut verba Hippocratis, *Prædictor. lib. I. §. XI. m. Tom. 1. pag. 477. & Conc. prænot.*

*cap. 2. m. Tom. eod. pag. 545.* tanquam veritati consona etiam hic referenda esse censuam, nempe quod fauces dolores, graciles cum ægretolerabili molestiâ, strangulatoriæ perniciolæ sint acutæ. Sepe enim vix moram concedunt ad medicinam idoneam parandam, & parti laboranti commode applicandam, sed antequam via recipiendo aëri relectur, ægri eodem destituti, quo tamen diu carere nequeunt, inter apparatus ipsam intereunt. Hoc verò non tantummodo contingit in inflammationibus vicinarum partium, imprimis musculorum Laryngis, sive Anginâ, nec in morbis solum convulsoribus, sed in hisce quoque casibus, ubi corpus aliquod externum inconvenienter in simulam hanc fuerit illapsum, & partibus ejus adeo firmiter adherens, ut citò satis ejici, & meatus hic à reilla obturante liberari nequeat. Pertinet etiam aliquo modo ad convulsivam illam Glottidis constructionem, & que in Angina obvenire solet, effata illa Hippocratis, *Prædictor. lib. I. §. 2. m. Tom. 1. pag. 477.* Loci circa fauces in acutis morbis doloroli, graciles, parvi, suffocatorii, quando hiarit ægri, ut os aperire & claudere non facile possint, meius emotionem portendunt: ex talibus phrenetici fiunt, & perniciolæ affecti. Ab ipsi vero rebus ex infortunio quodam in Glottidis foramen illapsus quæ contigit constructio, non minus, ac quæ externâ quadam violentiâ, aut fure collum circumducto fieri solet, sæpius viâ lethalis, quemadmodum de Terpandro Citharædo refert *Triphon*, eum Sparta in Sciade canentem, dum ore haret, quodam sicu teneret patientem & in faucibus ejus vi impingente, subito fuisse strangulatam; & ex recensione *Valerii Maximi* Anacreon Tejus Poëta anno ætatis 85, dum pallæ uvæ succo tenues & exiles virium reliquias foveret, unius acini pertinacior in aridis faucibus humor eum suffocavit. Quod enim in Glottide pertinacius hæret, ob impedimentum Epiglottidis aut planè non, aut difficulter admodum eximitur, nec commodum est, ut per trachæam in pulmones protrudatur, ibi enim hærens tenens pulmone substantiam vesicularem levi negotio lædet, aut valè comprimit, sicque vel mortem subitanæam, vel lentam consumptionem & phthisin procurabit. Quæ verò ita sunt constituta, us vel citò, vel tractu quodam temporis non adeo longo resolvi & liquari possint, aliquando per tussim quandam, irritatis ita pulmonibus, ejiciuntur, quod mulieri cuidam obvenisse recenset *Marcellus Donatus in Hist. mirabil.* cui pilulas justè satis crassitudinis devoraturæ una ex illis per Glottidem, sive trachæam os dilapsa fuit, ibique per tres ferè horas persistens suffocationem finit minata, nec ullo ingenio eximi potuit, tandem vero liquata per tussim fuit reiecta & muliere à suffocatione & imminenti morte liberata. Sic quo breviora sunt corpora illa, eo difficius extrahi possunt, longiora verò sufficienti parte extraximam laryngis prominentia, ut in faucibus videri & instrumendo prehendi possint, facilius & citius aliquando educuntur. Merito ergo morbus hic flatur periculo plenissimus, & in quo si spes quædam alluceat liberationis, omnis mora habenda quam maxime noxia.

*Epiglottidis Induratio* morbus est admodum contumax, & nullis ferè remediis in statum pristinum reducibilis, aut admodum difficilis, & in leviori solummodo specie, in qua nondum in oleam

oslem ductilem cartilago hæc fuit transmutata, sed fibræ emollientibus adhuc flexæ, & corrugatio seu rigiditas resolvi valent. Morbo vero hoc detecti multis subiecti sunt periculis, tum propter inspirationem, tum propter deglutionem. Quando enim aer frigidior magna copiâ per patentem Laryngis rimam trachæam ingreditur, & ad pulmones pervenit, hi valde irritati tussim febriam excitant, & magnam nonnunquam percipiunt lesionem. Ex cibo insuper & potu in deglutione quæ non sunt timenda mala? Vix consilio institui potest, in quâ non maxime sit cavendum. ne quid comminutorum ciborum apertum hoc ostium ingrediat, & ledales machinæ excutit tinnulus. Hinc forte accidit, ut Anacreonti sem ex succo cartilago hinc adeo exlicata obruerit, ut quod unque assumentum eam potius, quam gulam penetrat, & succus compressæ uvæ enacior fuerit, quam ariorem trachæam pervaderet, sed in strictiori Glottidis foramine hærens, respirationem interceptit, & suffocationem insperatam attulerit. Quapropter cum in ætate admodum proventus humidi universalis quidam sit defectus & consumitus, fibræque partium rigidiores, quam ut facile flexæ & emolliresqueant, affectus hic in iisdem adhuc certius, quam in junioribus, pronuntiandus est incurabilis.

§. 12. In morbis hæc *Dæta* regulæ studiosè sunt observandæ, maxime quod *Aerem* concernit, cum organa respirationis læsa, aut morbo aliquo infecta, aeris excessu magis adhuc compræmuntur; cibo enim ad tempus aliquod homines possunt carere, iere vero nullo modo. Eligeundus itaque aer purus, serenus, temperatus, vitandus frigidus, nebulosus, crassius, pluviosus, ventis nimium agitatus, aut patetentis acidis, ut fumo sulphureo, carbonum fossilium, lignorum recentium, aut alio quodam incongruo infectus, quapropter aer aliqua ex hæc abibus inquinatus, arte corrigendus est & depurandus, in *Epiglottidis Induratione* & hinc nimia Laryngis apertione eo respiciendo, ne patulo ore aer copiosius hauriatur, & hinc larynx, trachæa & pulmones lædantur, sed accurata mensura & potius per nares admittatur. *Cibus* in *Glottidis Constrictione* convenit tenuior & fluidior, purvisa dosi una vice assumtus, & probe masticatus, ne crassiores & majores boli in faucibus aut gula longiori morâ hærentes, laryngem adhuc magis comprimendo suffocationem accelerent in *Epiglottide*, verò *Induratione* boli aliquantum majores sunt deglutiendi, ne portiones minutiores deviantes patulam trachæam potius, quam gulam ingrediantur, & commodum foret, ut ægros supino fluidiora propinentur. Vitanda itaque & aulera, fructus sylvestres, pyramides, & id genus alia, eligenda verò dicoctis & aromatibus mediocriter condita & lusciora, superata tamen omittenda, sed mace & aloë pitula potius condienda, quæ post eodem in cochleari perforato separari possunt & residuo detrali, ne ori illata aliquid creent periculi. Potus erit cerevisia tenuis, vinum dulcius emulatum, vel quod præstat, decoctum huius cum passulis & glycyliza, lac bubulum cum melleum, vitanda cerevisia vetusta, acida, crassa & terax, vinum asperum, aut nimis viscidum, quale nullum est recens ex nova expressum & nondum deæcatum, vinum Hispanicum aut Malvacicum nimis glutinum, pessimum vero est in hoc casu glacie refrigeratum,

utpote commiventem jam vitæ januiam penitus occludens. *Somnus* quidem concedendus est longior, cum humidiorum partium non parum contribuat, sed causæ simul observandum, ne humor lymphicus auctus & copiosus ad Laryngis ostium confluctum irruens, inopinato suffocet, ægros dormiente non advertente, quapropter in catatolhis pendenter dignoscendum, quid magis conveniat. In Laryngis Induratione *Epiglotis* unius sunt abbreviandæ, & somnus paulo tempore & aqua mensurâ procurandus, atque sedulo observandum, ne tempestate existente sicca ore hiantæ ægri somno se iradant, ne major inde sequatur exlicatio, aut quidpiam in aere volitans simul hauriatur, quod laryngem intrans ejusdem ostium obturet; quare de oblitus stupinus, in quo oris apertio, ob compressos pulmones musculos thoracicos, & hinc diffusiliorem respirationem frequentius contingit, irruente somno est interdicens. A *Munio* abstinerebunt, nec tamen omnem à se relegabunt Glottide contracta laborantes, quietus autem agant Epiglottidem habentes induratum, si enim oculum contigerit à reformatione illapsum, moti quodam conveniente, expiratione fortiori, & studio quodam excitata tussicula, eorumdem ejectionem facilitare possunt, in patente verò rima per motum validiorem aeris noxius copiosus absorberetur, quod minime conveniret, sed grave malum importaret. *Exercendorum* ratio studiosè est habenda, ut nihil exilis ultra debitum retineatur, aliis & hinc malum hæc valde augeretur. proinde & alvis strictior solvenda, & velicæ repleta via reddenda patula, per quam sarcinâ sua commode liberetur, mucus naribus & auribus cerumina citò sunt eximenda, ne obstruktionem suâ respirationem difficilem magis augeant. *Animo affectus*, quantum possibile, rectæ rationis freno sunt coercendi, Iracundia & Tristitia planè pellendæ, & spe bonâ spirituum motus fervendus est liberior, multum enim animi laxatio contribuit tubulis corporis dilatandis, & fluxurum per eos transitui facilitando, aut aliquo modo promovendo.

§. 13. *Curatio Pharyngæ acutæ & Chirurgicæ* horum affectuum studium nunc locatur, merito Antecessoribus nostris prima concedimus vota. Incipiant proinde Vesitiores, nempe *Galenici Constrictionis* quos reliqui ordine sequentur. Porrigunt verò *Ætiæ*, isti in *Glottidis Constrictione* curanda hoc consilium, ut humores vitiosi, crassi & tenaces, sive pituitosi sint, sive melancholici, attenuentur & incidantur per pectoralia convenientia, uti sunt decocta varia ex rad. pimpinell. enul. ononid. cichor. chinæ, Ireos Flor. Imperator. scyllæ, herb. Hyssop. marrub. capill. Ven. chamædr. beton. erylin. pææx. scabios. thym. flor. itreclad. sem. anil. basilic. Card. Mar. urtic. siler. montebac. juncp. passilis, caricis, &c. quæ sequens exhibet formula.

R. Rad. Enul. 5vj.  
Ir. Flor.  
Imperat.  
Pimpin. aa. ʒiij.  
Chin. ʒij.  
Herb. Hyssop.  
scabios.  
capill. ven.  
Chamædr. aa. Mj.

L

Jun-



*summit. thym.*  
*flor. anth. aa. Pj.*  
*sem. urtic. ʒijj.*  
*anis. ʒij.*  
*bacc. Junip. ʒijj.*  
*Incis. coq. in f. q. aq. commun.*  
*Colatur. ʒijj. add.*  
*Oxymell. squillit. ʒß.*  
*Syr. Diapras. ʒiß.*  
*M. Alūmat æger ʒijj. una vice.*

Hoc adhibito si humores facti sint fluidiores, at nondum commode eiciantur, eosdem evacuant decocto poussimum fol. sem. cum agar. decocto galli veteris cum speciebus solutivis, vel electuar. Hier. cum agar. aut Indo, vel confectioe Hamach. aut pilulis aggregativis, alla ereth. Arab. vel similibus, si gula adhuc satis patula sit, ut commodè deglutiantur. Si opus videtur, etiam venæsectionem instituunt. Ab austero quodam succo ad Laryngem à comestione fructuum sylvestrium aut aliorum strangulantium transmissio ortam constrictionem resolvunt edulcorantibus, ut decocto Glycyrrhizæ cum passul. vel caricis & sem. anisi. looch de Seylla syrup. Jujubin. de crysim. capill. Ven. Res externas ex unprovisio illas passas commota tussi excreari jubent, vel si prehendi possint, instrumento educunt, & viâ lubrica reddita, butyro inulso & recenti, vel oleo amygd. dulc. aut sesamum, vel si hoc fieri nequeat, & locus mucrone rei, ut osticuli, acicular, &c. latus ad suppurationem tendat, eandem promoveat appolius externæ convenientibus cataplasmatibus, ut rupto abscessu res illa molesta simul cum pure commodius ejiciatur. Interea verò, ne ob denegatam respirationem æger suffocetur. Laryngotomiam instituunt, & toramini fistulam artificiose insinuant, per quam acri liber conciliatur transitus. Topica etiam foras adhibent, emollientia, formâ linimentorum, ex quibus sequens tyronibus præbent exemplar.

¶ *Unguent. pectoral. ʒijj.*  
*alib. ʒij.*  
*Agripp. ʒj.*  
*Ol. lil. alb. ʒiß.*  
*sesamin. ʒß.*  
*M. F. Linimentum.*

Vel:

¶ *Rad. liquoris. ras. ʒijj.*  
*Herb. Marrub.*  
*arnic. aa. ʒij.*  
*farin. sem. lin. ʒß.*  
*sem. anis. ʒj.*  
*Caric. No. j.*

*Incis. & pulverisata misceantur cum butyro. recent. ʒijj.*

*Sient per horas aliquot in loco calido, vel super cineribus calidis, agitentur spatula, post exprimantur per linteum. expresseo linimento eadem denno admisceantur species dosi dimidia, & idem labor adhuc semel repetatur, postea admisce.*

*Medull. cervin. ʒij.*

*Axung. anat. ʒijj.*

*F. Linimentum*, quo regio loci affecti sub mento frequenter illinatur. Morbi partium vicinarum si constrictionem hanc induxerint, eorundem curationi incumbunt, ut iis profligatis & Glottis debite rursus dilatetur.

*Epiglottidis Indurationem à causis exsiccantibus inductam corrigere tentant emollientibus &*

humectantibus, si morbus nondum sit diuturnus, nec cartilago hæc in oleam abierit duritiem, cui optima quoque medicamina frustra adhiberi norunt, sed in leviori malo decoctum propiunt pectorale, decoctum patularum cum flor. malv. arbor. & syrup. dialt. decoctum caulium. Loch de iisdem; tum pinguis & oleoalentum deglutita, ut butyrum recens, oleum olivarum amygdalor. sesamum, vel per se assumpta, vel in picurlo tepido exhibita, quibus aliquando externa affocant, ut unguentum resumptivum, dialt. vel alia ex superioribus jam cognita.

§. 14. *Paracelsi cura in Glottidis Constrictione* Paracelsi cura in Glottidis Constrictione. eo dirigitur, ut sal aluminosum illud resolutum, ad partem hanc nimia copia transmissum corrigatur, & aliorum relegeatur, aut quocumque modo dometur, hinc liquorem hyperici, elenium mellis, liquorem perlarum, salutaria exitura putat remedia ad constrictionem hanc solvendam.

In *Epiglottidis* quoque *Induratione* sal illud spissius luadet dissolvendum, ut pars indurata relaxetur & debite emolliatur, quod præ aliis imperari vult elixirio auri, misto cum elixirio throni, & aqua mellis, vel elentia vini elasti adhiimpio, hæc enim sperat siccam quodcumque tandem in diuolutum.

§. 15. *Hilmentii cura in Glottidis Constrictione* Hilmentii cura in Glottidis Constrictione. ut omne custodem hujus partitis irritantia amoveatur convenienti emetico ex ʒio potissi- mum parato. deinde custos in libertatem restituitur, ut à metu hostis sui liberatus à fuga placide revertatur, & pristino suo bene fungatur officio, proficiendo nempe parti huic, ne ullum pariter damnum aut periculum, quod per arcana & elixiria vegetabilium quorundam præstabitur.

In *Epiglottidis Induratione* defectum laticis resarciri vult, & custodem corroborari, ut secre- tionilaticis, partisque hujus irrigationi debite rursus advigilet, qua virtute simul præter aliis Elementum perlarum lactem pollere existimatur.

§. 16. *Willisi scopus in Glottidis Constrictione* Willisi scopus in Glottidis Constrictione. curatione hic est, ut quodcumque foris illapsum & rimam hanc occludens eximatur live digitis, siue instrumento, siue leateat aut vomitu, quocumque gula asperant arteriam simul agant, & hæc corpus heterogeneum & molestum expellat: si vero hoc obtineri nequeat, ne suffocatio obiciatur, Laryngotomiam necessitanti esse credit, pro aeris ad pulmones introitu, sine quo respiratio peragi nequit hæc verò cessante ipsa vita hominis delimit. Affectu quodam ipsamodico, seu convulsione partium hbrvatarum, aut multorum Laryngis si acciderit, antispasmodica in usum dunt remedia aliunde jam cognita, ut & in compressione à vicinarum partium morbis curationem ad hos ipsos dirigit, & sanguinem aut lympham circa Laryngem & Glottidem evasimataq; incallitam resolvit diaphoreticis & salibus volatilibus spirit. sang. human. sal. armon. vel bezoardico minerali, aliisque remediis in Angina aut Pleuride aliis usitatis. Illusionem intus per ex unguento dialt. & sicut ex fol. malv. alr. mercurial. flor. lil. alb. & far. sem. lin. in aqua coctis externè approbat adhibenda.

Ad *Epiglottidis Indurationem* emollientia adhibet cum aliis, & humectantia ex lacte, decocto patularum. butyro, oleo amygd. & simi. qua lente sunt deglutenda, quo circa partem hanc diutius commorantia eandem debite imbuant.

*Epiglottidis Indurationem.*

qua-

quapropter & externè linimenta à Galenicis jam prolata, totisque superius adnotuit.

§. 17. *Silicis* nihil de morbis hñce curandis proponit lingulare, sed in *GloTTidis Constrictione* ad causas respicit, & morbos vicinarum partium prius remouet, vel rerum ab extra illapſarum eſpulationem, ſi poſſibile ſit, promouet per tuſſim aut ſternutationem excitatam, vel quocunque modo hæc conuenienter obtineri queat, humores verò acidos corrigit ſalibus volatilibus aſiſque remediis mitigantibus & abſorbentibus.

Ad *Epiglottidem* emolliendam remedia commendat lympham glandularem augmenta, vel eandem coſulatam & inſpulatam ſoluentia & incidentia, quorum priora ſunt alimenta facilis digeſtionis & ſuccum copioſiorem in ſanguinem & lympham interſentia, imprimis lac, butyrum & iuſcula, ex carne animalium iuniorum, cum medicamentis humectantia, ex quibus decoctum herb. malv. violar. tuſſilag. capill. ven. cum paſſulis ſatis aſtimatur ſalubre; poſteriora vero ſunt aromatica blandiora & ſalia volatilia oleoſa, à quibus omne viſcidum inciditur & in ſtatum conuenientem reducit.

§. 18. *Cartilagineus* placet in adeunda *GloTTidis Conſtrictione* curatione, ipſas etiam advertere cauſas, & pro eorum diuerſitate dirigere remedia eundemque adminiſtrationem. Quando enim mulculi *Laryngis* particulis hamatis conſtricti cartilaginei hanc ſimul comprimunt, & ita ſtimam reddunt anguſtiorē, eaſdem ſectere ſtudent & ita emollire, ut tubulos ſeu canaliculos muſculorum interius non detineant, & hi in primum reſtituti ſitum liquoribus conſuetum perſeuerant tranſitum, hoc enim obtento nihil ſtagnabit, ſed motu ſuccis permanente libero, etiam cartilagineſ debita ſua ſcuerunt forma, cujus rei gratia ea propinant remedia, quæ poroſa ſunt, & globulis ſecundi elementi facile cedunt, ut iſdem tubulos ingredientibus, & hamulis aſiſque ac utiſque particulis rigidioribus in uſu detentis ſeminentibus, materia ſubtili interuenienti via pateat magis paſtula, unde tubulis illis ſolæ particulaſ illas deſtruat. frangat, & ita vel in aliam redigat figuram, vel ſecum extra corpus alſcripiat, & hæc virtute ſequentes conſtare iudicant remedium formulaſ.

℞. Decoct. rad. lapp. maj. & ligni ſuſſufr. aa.

℥. aq. commun. parat. libb. add.

Spir. ꝯci ʒij.

Qui ſuccin. volat. ʒj.

Syr. ſenne. ʒ. ſb.

M.

Aſſumatur a. vel ʒ. cochlearia una vice tepide.

℞. Aq. aniſ. ʒiſb.

ſlor. ſambuc.

ſcabioſ. aa. ʒiſb.

Tinctur. Croc. ʒiſj.

Spir. ꝯci ʒij.

ſ q. uat. C. ʒ. ʒiſb.

Syr. de Hyſſop. ʒi.

M. D. Cochlearium.

Reſ illapſas eximunt, ſi prehendi poſſint, & quo commodius id peragatur, regioneſ loci affecti ſovent externè decocto rad. lil. & ſlor. camomill. in ſaleſfacto, quod calidimicula quoque bibendum ſtudent, ne *Laryngotomiam* in extremo periculo aduenientes, quamvis aliquando diaphoretici & ſalibus volatilibus fruſtrula ciborum ſtimula huic illapſa, commodè eſecerint.

commota inter ſudandum tuſſiculâ, quâ iuuate, etiam agriſ vix aduertentibus animum, facile fuerunt expulſi.

*Epiglottid. manducata* emollire ſtudent humectantibus, id eſt, lympham augmentibus, quæ ex copioſiori & laudabili chylo denum reparatur, quapropter lacte epiduſculum cum tale quodam volatili ſapius aſſumptum affectui huic valde conuenire iudicant, uti & decoctum ligni ſaſſiſtræ cum ſantalo rubro, vel ſequentem mixturam.

℞. Aq. Ma'v.

bell. d. aa. ʒ. ſb.

Mucilag. ſem. cydon. aq.

reſ. extract. ʒiſb.

Spir. Oxi optime dulciſcat. ʒij.

Syr. ſujuben. ʒj.

M.

Aſſumatur cochlearim ſapius in die, & lentum deglutatur ut cartilago hæc ſatis imbuta. Eadem de cauſa malitioſiſſime excitant per trochilicos conuenientes, aut grana malticæ. ut ſaſſiva proſpecta ad partem hanc fluens eandem irriter & quantum poſſibile eſt, expandat; ſed operam hanc perdiſ latentur, quando cartilago hæc omni ſucco tamdiu ſint deſtituta, ut in olſeum abierit duriciem, quam nulla ratione ſciant emollire.

§. 19. Ex noſtra ſententiâ curatio *GloTTidis Conſtrictionis* aut *Occluſionis* debet inſtitui, quâd cauſæ ejus citò auferuntur, quæ propter ſtimula huic illapſa ſternulatione ſæpe reſpelli poſſunt, & nonnunquam diaphoretico volatili, quo liquor nervoſus oppreſſus excitatur, ejusque copioſior in tubulos muſculorum laryngis aſſluxus promouetur, ut ita eorum auxilio expulſio rei extraneæ procuretur, quod nonnunquam felictate ſuccellit, reſultatque nobis D. *Vogelſan-gini* hiſtoriam typothetæ cu, uſdam inter labores ſuos pomo veſcentis, cum intereâ ab alio re quâdam projecta petitus ſuit, ex terrore interveniente gemitu fruſtratum quoddam pomi aſperſus *GloTTidi* irreptiſ, & per aliquot dies ibi hæſit, non modò tuſſim, ſed reſpirationem quoque difficile cum dolore ſatis acuto & moleſto excitans, quæ tamen ſymptomata brevi cellauit, cum ſequentia ab eo præſcripta adhibuiſſet remedia.

℞. ʒiſ diaphoret. ʒj.

Spec. aſiur. ſimpl. ʒb.

Sal volat. C. C. gr. vj.

M. F. Pulvis una vice aſſumendus in ſequenti vehiculo.

℞. Aq. Capriſol. ʒb.

Secord. ʒij.

Spir. aniſ. ʒj.

Syr. Hyſſop.

M.

Majora tamen corpuſcula aliqua adhuc parte extra rimam prominentia vel digitis, vel alio inſtrumento forma forcipis prædico facile prehendiuntur & extrahuntur, ſerum verò nubi ſanguis propinquo vomitioſo ſæpe cedit, & cum incideſſetia denum & ſucco aſtertoſo ſtrangulantes corrigentia locum habent. Ex. gr.

℞. Aq. Hyſſop.

ſerpill aa. ʒiſb.

Spir. ꝯci aniſat. ʒj.

Eſſent. Gummi. Ammon. ʒb.

Syr. de liquirit. ʒj.

M.

re. Essent. succin.

*Salfisr.* aa. 3j.

*Spir.* ꝯci 3i.

*M. D.* gutt. 30. pro dosi.

A rebus strangulantibus exte. nē adnotis si contingat, ut fune, compressione manuum, aliisque rebus violentis, eadem, scilicet, illico sunt adimenda, & liquori nervo debitus reconciliandus est transitus per remedia spirituosā & volatilia, sed iustitia id aliquando non permittit, & malefici quidam poena ejusmodi vivis sunt eximendi. Morbi in vicinia partis hujus commorantes, & rimam hanc constringentes si debite tollantur, & confr. tū hęc simul cessabit. Ne verò diuturnior Glottis constrictione ob impedimentum aëris ingressum suffocationem & mortem inferat, in extremo periculo instituenda est Laryngotomia vulgo sic dicta, melius autem Bronchotomia appellanda, utpote cujus subiectum non Lar. nx, sed ipse asperæ arteriæ truncus, seu Bronchus est, ut ita aliis remediis generibus non sufficientibus, extraordinaria aëri per chirurgiam hanc patet via, quo nimirum interrim respiratio per vulnus Tracheæ inflictum fieri queat, usque dum obices illæ fuerint remotæ. Novimus tamen plurimos abhorretere ab operatione hac, tanquam periculosissimā, quorum rationes videri possunt apud *Aquapend. de Operat. Chirurg.* p. 232. *Fur.* 4. cap. 2. *Bartholin.* cent. 1. *Epist.* 80. & *Lamz. v.* pag. 199. quas tamen pariter apud eundem *Aquapend. l. a. Fienum tract.* 4. c. 3. & *Renatum Moreau in Epist. ad Barthol.* hujus *Cent.* 1. *Epist.* 81. refutatas observabis. & periculum, quod inde metuant, non tantum est, ut lethaliter absolutam inferat, quatenus per providam satis operationem hoc declinari potest: dum vulnera etiam casu asperæ arteriæ illata, licet vocem atque loquelam, haud tamen semper respirationem lardant, atque per se lethalia non sunt, ut experientia *Aquapend. Tulp. lib. 1. Obs.* 5. *Parei lib.* 9. c. 9. *Schenek.* *Obs. l.* 2. pag. 228. atque *Sennert. Prax. lib.* 2. pag. 2. c. 1. testantur, imo, ut non sine omni periculo hæc chirurgia peragatur, tantum tamen hoc non est, quantum illud præsentaneum, quod morbus interin illa operatione minatur. De cetero per dexteritatem Chirurgi felicissimè cum successu hæc sectionem adornatam perhibent *Schenek.* pag. 223. *Maurean* apud *Barthol.* & *Lamz. v.* modo juxta *Aquapend.* nemis sit Anatomes peritus, quia sub hoc Medico & Artifice omnia tutissimè ac felicissimè peraguntur. Præmissis tamen inquirendum erit primò, an non difficilis spirandi maximam partem à Pulmonum inflammatione pendeat? cum hæc sæpius asperæ hujus arteriæ morbos, & potissimum Anginam comitetur vel excipiat: secundò, an multum materiæ viscidæ causalem hunc replet: tertio, an Laryngis inflammatio per totum bronchum extendatur? In his casibus frustanea est operatio, ac pereunt nihilominus ægri.

Modus operandi hic est. Reclinatur primò ad posteriora ægri caput, quantum per inflammationis aut alterius morbi dolorem fieri potest: partim ut asperæ arteriæ conspectior fiat, partim hujus intestitia membranosa magis à se invicem distendantur. 2. Ab explorato tracheæ capite atrimento ducatur linea per medium colli longitudinem versus juguli cavitatem. 3. Ab eadem La-

ryngis inferiore parte numerentur circuli cartilaginei, descendendo in brevioris colli subiectis usque ad interstitium tertii vel quarti, in procedioris vero cervicis hominibus usque ad quarti vel quinti, in quibus sectio fieri debet ad est, in remotiore magis à larynge affecta vel inflammata parte, ne inflammatio sectioni foras superveniens malum augeat. 4. Locus hic digitorum contrectatione inventus, ducta secundum colli latitudinem linea, descendente ad rectos angulos interfecante notetur, & cutis cum panniculo carnoso digitis ministris utrinque elevetur, ac ita complicitur, ut linea transversa in medio plicaturæ appareat: hinc 5. mox transversa trahatur culter falcatus, qui elevatus atque retractus integumenta hæc secundum tractum lineæ longitudinalis dissecet, ita quidem ut vulneris longitudo pollicem transversum aquet, sufficiens nihilominus sit pro inuiculis sternothyroides detegendis, qui 6. sanguine deterlo in sui interstitio, quod linea alba longitudinali designat, inanubrio scalpelli, similive instrumento aliquantum ancipiti parum divellantur, quo aspera arteria demidetur: ac 7. hujus interstitii antea notari tantum sectione transversa incidatur, quantum pro excipiendâ minore cannula sufficiens sit. Hæc autem cannula 8. argentea seu plumbea incurvata & totam inibus petula, ita tamen ne extremitate sua parietem asperæ arteriæ posticum attingat. in anteriore vero parte anasta sit, ne inter inspirandū sinul attrahatur, sed circa collum vinculis firmari queat, per quam vulneri tracheæ immillam respirationem æger celebret usque dum inflammato Laryngis celet, aut obitaculum respirationis quodvis fuerit subiatum, ac per viam ordinariam illa denuò fieri queat. Interim 9. labia vulneris unguento digestivo & emplastro conveniente illinantur, donec 10. cannula protrahatur, & scarificatis, si opus fuerit, vulneris externi labiis, futura hæc sibi adducantur, ac medicamentis & deligatione commodè consolidentur.

In Epiglottidis Indurationis curatione placet nobis sententia *Cartesjanorum*, de restitutione nempe larympis deficientis, ut ita cartilago sufficiens denuò irrigetur, & hoc solummodo tentari & aliquando obtineri potest. si fibræ cartilagineæ nondum adeò exaruerint, nec in oleam adierint duritiem, sed adhuc flecti queant, dum à lymphâ glandulari reparata satis insucentur, cui reinsertiunt non modo remedia humectantia, qualia sunt lactepidum, decocta pectoralia & similia, sed saliva quoque volatilia glandulas & ductus lymphaticos aperientia, ut absque ulla morâ conveniens & sufficiens liquor ad cartilaginem hanc stillare valeat, quale remedium sequens exhibet formula.

4. *Decoll.* *Glyceriz.* cum *hord.* & *passul.* libij.  
*Spir. vini rectificat.* 3iij.  
*Spir.* ꝯci 3b.  
*M.*

Oleum amygdal. dulc. in jusculo aliquoties lentè deglutitum cartilaginem hanc emolliet ut melius expandatur, & rimulam Laryngis debito modo operiet.

Si verò è contrario cartilago hæc rimulam nimis arcte claudat, & vel à extranea, vel à mucoviscido



viscido ibidem collecto valde deprimatur, res illæ sunt eximendæ, & materia viscida incidenda & attenuanda, ut tussicula quædam aut fortiori expiratione eliminetur, ad quod aqua

asthmatica confert cum essentia enulæ & Spiritu æci anilato, vel Spir. gumm. Ammoniæ, affectibus hisce abigendis satis congruo & respirationi facilitandæ proficuo.

## CAPUT IV.

## De Aspera Arteria Angustia, Asperitate, Ulceribus &amp; Vulneribus.

## §. I.

Examinatis priore in capite morbis superiorum Asperæ Arteriz & Laryngis partem occupantibus, nunc ad reliquos organum hoc alius etiam in partibus invadentes ordine nobis placito progrediemur, quales sunt Asperæ Arteriz Angustia, Asperitas, Ulcera & Vulnera.

Descriptio  
Aspera  
Arteria  
Angustia.

Asperæ Arteriz Angustia est meatus ejusdem seu cavitatis imminutio, quoad circumferentiam, vel parietum seu superficiem cartilagineam circulatorum membrana quædam lubrica induta à se invicem distantiam quæ æri consuevit denegatur, vel difficilis saltem redditur transitus, vel à constrictione aut compressione cartilagineum istarum annularium externâ, vel ab obstructione interna proveniens.

Asperitas.

Asperitas est membranæ Asperæ Arteriz interioris à consuetâ levitate & lubricitate defectus, & voci & respirationi difficulatem pariens, & à diversis causis induta.

Ulcera.

Ulcus est solutio continui, seu disruptio fibrarum & tubulorum unius vel alterius partis Asperæ Arteriz, vel cum, vel sine effluxu materiæ purulentæ vel succorum corruptotum, à stagnatione & aciditate corrosiva succorum excitata.

Vulnera.

Vulnus est eisdem Arteriz continuitatis dissolutio, orta à vi externâ & re quadam pungente, vel scindente, vel contundente. A diversitate hæc causarum vulnera hæc dividuntur in Puncturas, Dissectiones, easque vel longitudinales, vel transversales, vel obliquas; & Contusiones, vel vulnera cum contusione, quæ sunt quæ ab ictu, aut globis explosis bombardarum, aliarumve instrumentorum bellicorum inferuntur.

Parti affecta.

§. 2. *Parti affecta* est aspera Arteria, Trachea, seu Fistula Pulmonum, aliquando raro exemplo duplex observata, Eph. A. i. p. m. 26. ordinariò verò in machina hæc vitali tantum unica existens, cuius structura ex præcedentibus capitibus, quantum ad morbos curandos requiritur, satis jam reddita est cognita atque perspecta. Ab hisce verò affectibus non tantum musculi Laryngis, sed secunda etiam ejus pars seu Bronchia propriè dicta & tertia nonnunquam, à *Maligno* vesicularis nuncupata & in pulmonum corpus delinens, occupari possunt. In Angustia enim fistulositas primario læditur, dum vel cartilagine annulares, & cum iis simul ligamenta, membrana externa à pleura oriunda, & interna à tunica palatum involvente producta, vel à re quadam externa violentâ comprimentur, vel parietes interiores magis vel minus invicem conniveant, vel à corpore quodam inconvenienter vel in cavitate ipsâ, vel inter cartilagine & tunicam internam hærente, contingi redduntur, ut Asperitate verò à re quadam acuta seu acritunica seu membrana in-

terior, in statu sano liquore quodam viscoso obducta, & binas adhuc alias sibi adjunctas habens membranas, glandulosam nempe & vasculosam, molellatur; in Ulceribus & Vulneribus & musculi Laryngis, & tunica utraque, & cartilagine, & ligamenta, quæ hisce intermedia sunt & motum præstant, cum valis omnis generis lædi possunt & infestari, adeo ut vix ulla pars integrâ hujus fistulæ sit eximenda, quæ ab uno vel altero ex morbis hisce nequeat prehendi, & nonnunquam lethaliter corrumpi.

## §. 3. Cognitio morborum jam designatorum Diagnostica.

non adeo latet in obstructo, etiam ex respirandi difficultate, vocis defectu, imminente suffocatione, rebus strangulantibus exterius adhibitis, vel interiori in asperam arteriam illapsis & obstructentibus, tumore partium vicinarum, Angustia Tracheæ facile colligitur. Deinde Asperitatem præcedo vocis, dolor pungens in inspiratione, expiratione, vel deglutitione potulentorum perceptus, tussicula frequentior & sylvestris sufficiens produm & manifestant, Ulcus, si fuerit non patet ad speciem, & dolore tamen, excretionem succi cruenti, aut in diuturnis & sordidis, purulentis & fetentis sâis colliguntur, cruore nempe & pure ulcus, dolore vero locum affectum ostendentibus. Vulnera vix ullo indigent signo, cum & videantur, & ex recentiore ipsius ægri vel à distantium, quo instrumentum, quo tempore & qua ratione illata fuerint, abunde percipiuntur.

§. 4. Causam Angustia adscribitur Galenicæ vel constrictioni, vel compressioni, vel obstructioni. Constrictionem fieri dicunt à manu, laqueo, sive alia re externa & violenta, vel etiam à medicamentis adstringentibus; compressionem à turgente morbus & inflammationibus partium vicinarum, vel holo majorem gulâ hærente; obstructionem verò tum ab humoribus crassis & glutinosis ex cerebro in asperam arteriam destillantibus & in ea cumulatâ, tum excrementis saniosis cruentis aut purulentis ex accessu pulmonum aut thoracis rupto copiosis in partem hanc procurrentibus, tum grumo sanguinis aut excrementi carnosi post ulcus vel vulnus promanante, tum à rebus externis variis in arteriam hanc illapsis & in eadem hærentibus.

Asperitas cum Tracheâ hinc contingere docent aut à distillatione aeris ex cerebro membranâ interiori præterente, aut vaporibus quibusdam internis, aut rebus externis, fumo nempe, vento, pulvere, aliisque aeris vitis, aut ab ulcere membranâ dilacerante.

Ulcus verò causam constituunt humores acres & erodentes, & potissimum pituitum falsum in cerebro calido ex vaporibus copiosis contractam, conferente multum ad ejus generationem



nemaere externo, uti contingat tempore verno siccio, squalido & aquilonio, excipiente hyemem austriam, pluviolosam & serenam, præterea etiam materiam acrem & purulentam ex inflammationibus & exulcerationibus partium thoracis in partem hanc transmissam, vel potulentia aut medicamenta acra & corrodentia in cavitatem hanc delata.

*Vulneribus* communem adsignant causam, videlicet instrumenta acuta vel pungentia, vel scindentia, vel contundentia, ut tela, ictus, morsus, aliæque ratione continuatæ hujus membri solventia.

*Paracelsi opinio de causis morborum.*

§. 5. *Paracelsus* in Tracheæ *Angustia* nullas novit causas præ prioribus differentes, *Aperitatem* verò & *Ulcera* à salibus corrodentibus, & *Vulnera* ab instrumento quodam acuto scindente, pungente, vel contundente infligi facit.

*Helmontii opinio de causis morborum.*

§. 6. *Helmontius* præter externas *Angustiam* seu Constrictionem & *Vulnera* Tracheæ procreantes, potissimam horum affectionum causam Latæ diversimodè corrupto adsignat, adeo ut ob lassitudinem Custodis in mucum crassum & viscidum versus arteriam hanc obstruat, accensæ autem acrimoniæ suæ tunicam interiorem erodat, & levitate sua priver consuetæ, siquæ *Aperitatem* inducat, tandem verò salium quoque dissolutorum copiam adimens partem hanc planè exulceret.

*Willisii rationem de causis Tracheæ Angustia & Vulnerum.*

§. 17. *Willisius* quoad res violentas Compressionem, Constrictionem, & *Vulnera* parti huic inferentes priorum effatis album adiciens calculum. *Angustiam* quoque fieri posse refert ab opelione, quam sæpius contingere observavit à feri, dum à sanguine abscedit, fluore catarrhali, & de valis sanguiferis in has partes exundatione, quod primo tenue & acre tussim pariens molestissimam, postea per coctionem crassescens & tracheæ parietibus adhærens, inspirationis vias valde angustet, & extremitates earum proflus implendo decurrit, qualem angustiam & à sanguinis extravasati, nec non puris aut materiæ ichorolæ & lymphæ ductibus aut sanguinoductibus in vesicula tracheales exundatione & superveniente stagnatione, vel concretionibus quibusdam lapidosis, à quibus tracheæ valvæ valde comprimuntur, excitari & dyspnoeam oriri affirmat, vel à fibris tracheæ ductuum spasmodicè affectis, à quibus ipsi ductus contrahuntur & occluduntur, ut acri ad debitam inspirationem transitus necessarius denegetur.

*Aperitatem.*

*Aperitatem* Tracheæ obvenire monstrat, vel à serofitibus nimidiis acris à sanguine in tunicam tracheæ glandulosam copiosius depositis, & magna ex parte in ipsius cavitatem exundantibus, à quibus tunica interior vellicetur & erodatur, sanguinem verò à superveniente quodam acido, ut frigore suscepto, vel acidis epotis, nimis fundi & in serofitibus ejusmodi præcipitari; deinde etiam à rebus aliis rudentibus in tracheam illapsis, vel pure acris ex pulmonibus per tracheam hanc rejecto in transitu ejusdem corrodì posse lubenter admittit.

*Ulcera.*

A majori tandem ejusmodi erosione, in qua tunica vasculosa profundius exeditur, *Ulcera* etiam ipsa provenire asserit, quod in plithisie etiam obvenire solet, dum materia purulenta in pulmonibus à sanguine secreta ubique in tracheæ vesiculas & ductus minores infinetur, & sic foveas & ulcera in partibus ejus ubivis efformet,

§. 8. *Sylvius* opinatur *Angustiam* Tracheæ fre- *Sylvii*  
quentius fieri à pituita live fluida viscidave, live *etologia Tracheæ Angustia.*  
acri, blandave, vel sanguine concrecente solutove, vel pure crasso, tenuive, vel sanie, vel aqua in demetis ad pulmones usque penetrante, à quibus omnibus etiam aspera hæc arteria possit oppleri, siquæ simul acri transitus angustari.

*Aperitatem* ejusdem interdum ab humoribus *Aperitatem*  
acidis, vel salis muriaticis, tum à capite, tum in aliunde ad fauces & asperam arteriam delabentibus; interdum verò à solis habitibus eadem qualitate præditis, & partem hanc male affectibus ortum trahere sibi quàm maximè habet persuasum.

*Ulcera* causam constituit quodcumque acre, *Ulcera*  
live lymphæ sit, live pituita, live sanguis, live sanies, quod rodendo continuatæ partis lusus dissolvit. *Vulneris* causam adscribit quicumque castrum, vel punctum, vel contulium solutionem parti huic inferenti.

§. 9. *Cassiani* & constrictionem & compressi- *Cassian.*  
onem admittentes. *Angustiam* quoque à inco- *Angustia*  
quodam viscido ex lymphæ vel liquore nutrien- *Angustia*  
te, tunicæ interiori superfuso, & à particulis quibusdam rigidioribus ab aere vel alimnde superveniente coagulato & inspissato, dum liquores isti in motu impediti fuerint, oriundo induci credunt, nec non à liquore nervo ab heterogeneo quodam corpusculo in motu impedito, & aliqua in parte moram neçtente, à quo tubuli comprimuntur, & acri per fistulam hanc consuetus intercepti transitus.

*Aperitatem* communiter contingere putant, *Aperitatem*  
dum particulæ quædam rigidiusculæ & micro- *Aperitatem*  
natæ, vel cum aere, vel alio quodam succo ex va- *Aperitatem*  
sculis, vel glandulis in tubum huic respiratorium effluenteliquori unctuosissimo intermiscuntur, quæ ibidem invicem diutius hærent, suasque culpidulas ipsi fibrularum tunicæ interioris interstitiis insinuant, unde hæ vellicatæ pulmonibus in consortium tractis sufficillam excitant, insuper liquor lubricans ab iisdem impeditus tunicam hanc ubicumque nequit illinere, sed sulculi aut prominentiæ quædam redduntur, ad quas aer in expiratione allidens, voce quadam rauca lesionem istam obligat.

*Ulcera* à majori tubulorum disruptione per diuturniorem liquorum glandularum & vascularium stagnationem, atque particulæ acutarum intermissionem iudiciæ exoriri aliis persuadere conantur, in quibus majoribus sulcis variorum colligatur succorum mixtura, etiam pars quædam chylosa, quæ ab acido corrupta materiam exhibeat purulentam, cruorem verò ex arteriis profluente ab iisdem scindentibus particulis vel paulatim erosio, vel violenter disruptis.

*Vulnerum* causam à superioribus satis exposi- *Vulnerum*  
tam esse, nec ulterioribus eandem verbis indige- *Vulnerum*  
re fatentur.

§. 10. *Nostandem* quod attinet, facillè damus *Nostre*  
prioribus, *Angustiam* Fistulæ hujus pulmonalis *Angustia*  
contingere posse à constrictione externâ per su- *Angustia*  
neum, manus violentas, catenas aliæque vincula, vel compressionem manus, pedis, tumoris parium adiacentium, aliarumque parti huic incumben- *Angustia*  
tium rerum tum externarum, tum internarum, sicut & à globulo vel sagitta ex obliquo cuti & musculis colli ad usque partem hanc infixio fieri non est impossibile, magis tamen propin- *Angustia*  
quæ ab-

# CAP. IV. DE ASPERÆ ARTERIÆ AFFECTIBUS. 271

& absque aliarum partium circumacentium æquali afflictione oriri solet, vel à rebus quibusdam in fistulam hanc infusus illapsis, & in ampliori etiam eius parte aliquando sine suffocatione hærentibus, quod accidere posse argumentum sunt res illæ lapsus per tussim salutariter eiectione, quidni enim sine suffocatione illabi possint, dum sine eadem per tussim reperiuntur? Et videtur suffocationi tum deimmo accedere, quando res illapsæ in capite & orificio asperæ arteriæ hærent, nec per angustius laryngis foramen aut epeji, aut ulceris protrudi valent: Præterea à mucus teracis collectio, vel in ipsa arteria hæc ex propriis vasculis collectio, liquoribus in cavitate ejus depluribus, ibidem stagnantibus & ab acido quodam coagulatis, aut temporis tractu, coagulatis & patientibus volatilibus, induratis; vel à pulmonibus emanata materia cruenta aut purulenta copiosa in arteria aëliam tracheam obstruente. Angustia autem quæ solet fistula hæc, quando in fistula tuncum paralyti resolvuntur, hoc est, à denegato influxu partium fluidorum, spirituum nempe, unde aspera arteria quasi collabitur & hæcescit, vel à horarum Asperæ Arteriæ strictione spasmodica, sive convulsione, prout hic posuiderunt & insulteres hysterice nonnunquam affliguntur.

**Asperæ.**  
**in.** *Exoritur* Trachea hæc à quibuscumque particulis acrioribus vel ard. oribus liquorem lubricantem vel cortampentibus, vel absumentibus, tum ipsas tunice interioris fibras lædentibus, quales interdum cum aere per inspirationem ad partem hanc transferuntur, vel ab aliis quibusdam necesse eadem communicantur vel cum cybo & potu alliantur, ut ex nimio nucum vel fructuum austeriorum comestitu contingit, ex quibus masticatis liquor rancidus & particulis asperioribus prædus emanat, qui liquori lubricanti domelico commixtus hinciliatius adheret, & tum aer, tum lucis horam necere, & hbrarum irritationem excitare consuevit.

**Vitium.** *Ulcera* Tracheæ oriuntur à succis corollivis circa partem hanc tum foris, tum minus stagnantibus, ejusdem fibrillas aut tubulos erodentibus, qui vel ex lymphâ in glandulis corrupta, vel ex materia purulenta acri ab exulceratis pulmonibus in partem hanc transmissa progrediuntur.

**Vulnerum.** *Vulnera* causam agnoscunt violentam, millum mentem nempe acuta scindit, pungentia, vel oborta contudentia, casu aut inania quadam parti hanc fortissimè nocet, quibus nimis fistulæ hinc in pulmonibus dissolvunt, prout antecessore, de his satis jam demonstravit, quorum verbis hic ita cum huc usque rebus ipsis conformibus libenter acquiescimus.

**Pneumonia.** §. 11. Quasi morborum horum sit sperandus eventus, & quæ secum possent pericula vitæ, paucis jam est disquisitionum. Lætam undecumque æger non avertent nisi cum, quo enim organum respiratorium intervientum integritas ad præsentem vitam incolamitatem magis est necessaria, eo quoque morbi eandem devastantes sunt periculosiores. Hinc quando *Angustia* Asperæ Arteriæ totam acri præcludit viam, nec cito latè eandem sistat, vel obstruere referat, vel à contractio fieri possit suffocatione certissima vite claudens. Obstruere à materia quadam distillata oborta de quo loquitur, & materia masticata, vel masticata, ut gloriolum transire possit, excreando ejicitur. Quæ post

philitin consummatam subito & graviter invadit, mortem portendit, cum vel crassorem bolum materiam purulentam & corruptam pulmonum substantiam, vel totalem humidi consumptionem, & cartilaginum ab ariditate contractione significet, quæ nullis restituerunt remediis. Angustia compressionem oborta, sublata gula obstruente aut intumescencia ipsa quoque brevi cessabit, si vero morbi gula curari nequeant, sed indices augeantur, de subsequutura suffocatione remanet periculum.

*Aperitas* vocis maxime incommodat eandem, quæ rancum reddit, aut plane supprimit & prout tunica Tracheæ interior magis vel minus est exsca, & liquor unctuosus adimpus vel corruptus, eo etiam faciliorem vel difficiliorem admittit curationem. In principio præterinde graviore incremento occurrere potest, & alij cum talibus revigat, quàm si morbus cundo vires assumptum.

*Ulcera* hujus partis non carent periculo, nec adeò facile curantur, præsertim si interiore membrana occupent, ad quæ medicamenta apertis nequeant applicari, quæ enim forma liquida minus alliantur, vel cito transeunt ad pulmones, vel potu abluuntur; insuper cum pars hæc nulla unquam fructu quiete, sed obiacem hærentem & emittentem continuo moveatur, consolidatio non facile obinetur: quod dictum in *Vulneribus* etiam locum habet, quæ usque plurimum periculo sunt plenissima, præsertim si vala jugularia simul sint distenta, aut ipsa arteria in tegre per transversum dissecta, quæ nulla arte de quo connectitur, sed machina humana: totalem aëri destructionem. Quæ cum convulsione tacta sunt, articuler admodum lauantur, & longius requirunt tempus ad partium confectionem per suppurationem ab integris separationem & novæ carnis generationem.

§. 12. *Diæta* instituat talis: *Aer* eligatur purus, serenus, nec enim nebulosus ac pluviosus, austrius, acidus, utrolo nimis & ætæus, æther vero bene constitutus, seu multis particulis blandis volatilibus præditus, maximus morborum horum existit sanator. *Cibi* sint liquidi, subdiles ac deglutiri faciles, nocent acida, spissa, aliaque coagulantia & humores inasistentia, uti & nimis salina & acra partes lasas magis corumpentia. Si quis Angustia est obnoxius, ligat nimis magis ostas, & caveat à deglutatione ciborum solidorum. *Potus* sint tepidi, frigida enim maxime nocent. *Somnus* ac *vigilia*, item quies omni ea est excelsu graviori. *Alexis* ut lubrica, *Animi pathemata* moderata; exulent anxietas & moeror, tanquam maximè coagulatores & acidi auctores.

§. 13. *Curationes* morborum præsentium ita instituunt *Galenici*. In Asperæ Arteriæ Angustia à contractione & compressione orta causas illas removere jubent, manum nempe vel laqueum, vel morbos partium vicinarum curare, quibus *Angustia* vel sublati & hanc angustiam cessantiam elevari sunt; in obstruente vero res tonificas illas tussu aut vomitu jubent & iterandas, quod ut facilius obtineatur, partem hanc vel butyro, vel oleo amygdal. vel unguento pectorali foris illunt; humores autem calidos emittunt & attenuant, ut commode postmodum extractione vel tussu ejiciantur, quo liquens contere promutuo decoctum.

*W. Herb. Hyssop.*  
*capill. Ven.*  
*marrub.*  
*scabios. aa. M℞.*  
*Glycerhiz. ʒi.*  
*scyll. ʒ℞.*  
*Incis. coq. in aq. simpl.*  
*Colatur lbij. add.*  
*Syrup. de prass. ʒiij.*

*M.*

In eundem finem quoque propinant syropos capill. Ven. de Hyssop. oxymel tun simplex, tum scylliticum, Lohoch de pino, diatreos, aliaque electuaria expectorantia.

*Aperitatem.* *Aperitatem* à quacumque fermè causa productam curare tentant lenientibus & emplastricis dictis, humidioribus præsertim, vel ticcis mollioribus immittis, quorum numero insunt bolus Armenum, terram Sauriam, amylinum, tragacanthum, Lohoch de pyllio, diapenidium, diacodium, mel rosatum, item lac, vinum dulce, alicam & pisanam, ex quibus pro formula inferuat sequens.

*W. Lohoch de pino ʒi.*  
*Conserv. violar. ʒv.*  
*Spec. diatr. frag. ʒi℞.*  
*diapenid. ʒi.*  
*Bol. Armen. ʒ℞.*  
*Syrup. de papav. simpl. q. s.*  
*F. Electuarium molle, seu Lambitium.*

*Vulnibus.* In *Vulnibus* ab humoribus falsis acerbis oriundis usum lactis magnificiunt, tum ut pravorum humorum generatio inhibeatur, tum ut geniti jam temperentur, sordes abluantur, detergantur & carnis generatio promoveatur, si verò sordida sint, fortioribus utuntur detergentibus, siccantibus & sarcoticis. Ad detergentia referunt mullum, decoctum hordei cum melle rosato, vel magis compositum seq. modo parandum.

*W. Herd. Mij*  
*Glycerhiz. ras. ʒ℞.*  
*sol. apii,*  
*heder. terrest. aa. Mj.*  
*Flor. ros. rub. Pij.*  
*Juguar.*  
*Passular.*  
*Caricæ. aa. ʒ℞.*  
*Bulliant in aqua simpl. lbij. ad tertia partis consumptionem.*  
*Colatur. reliqua add.*  
*mell. rosat. ʒi℞.*  
*Elect. diapenid. ʒ℞.*  
*M.*

Assumatur aliquoties in die portio quædam in ore detinenda, & sensim deglutienda, vel gargarizatio eadem instituenda. Posthæc exsiccantia usurpant & adstringentia, ut bolum Armenum, myrrham, olibanum, aristoloch. rotundam cum melle in electuarium redacta, quod paulatim præcipitum deglutendum ut portio quædam ad ipsam partem ulceratam perveniat.

*Vulnibus.* In *Vulnibus* ad sanguinis sistendum effluxum pulveres adspersunt adstringentes, ex mastiche, bolo, farina volatili, crepitu lupi, C. C. ullo, pilis leporinis, sanguine draconis, & similibus, hinc labia futuris conjungunt & sarcoticis conglutinant, si verò Concutio id prohibeat, carnem laceratam suppurantibus vertunt in pus, quo facto sordes detergent, tum sanis generationem

promovent, & tandem cicatrice vulnus occludunt.

§. 14. *Paracelsi* curatio *Angustia* peragitur re- *Cura Pa-*  
 motione caularum, tum externarum, tum in- *ractifica-*  
 ternarum, & phlegmatis ex pulmone in fistulam *horum af-*  
 hanc rejecti resolutione, ut ulterius expectore- *scilicet.*  
 tur, ad quod Elixir de Tartaro crudo in Asthma-  
 mate tantopere laudatum multum utilitatis con-  
 ferre putatur.

In *Aperitate* & *Vulnibus* remedia ex sulphure & croco, nec non liquorem hyperici aristol. mum. & myrrh. intrò recepta, externè verò emplastrum de calaminari, & in sordidis ulceribus unguentum arsenicale collaudat.

Similiter quoque in *Vulnibus* vinum essatum de pulmonaria & veronica, cum liquore muniæ aut aristolochiæ proficua existunt. & fortis liquorem aluminis Rochæ pro adstrictione facili impetranda, ad totalem vero consolidationem emplastrum suum oppoteldochi apprimè commendat.

§. 15. *Hæmorrhia* ad mucum illum obstruendo *Angustiam* causantem commodè reolvendum antimonium laudat diaphoreticum, ad *Cura Hæ-*  
*montiana.*  
*Aperitatem* verò laudantur opiatum *Paracelsi*, quo omnis acrimonia laticis dometur; in *Vulnibus* & *Vulnibus* corruptorem vult enecandum, & Archeum remediis balsamicis placandum, eodem planè modo, quo in *Vulnibus* & *Vulnibus* in genere, per consueta remedia curatio instituenda ab Auctore hoc præcipitur.

§. 16. *Villisi* curatio *Angustia* ab obstructione ortæ peragitur expectoratione materia; ob- *Willisi cu-*  
 struentis, quæ ut facilius succedat, nimia visco- *ra in Tra-*  
 sitas corrigenda, & fluiditas tum ferro in crassam, *chea Angu-*  
 tum materiae purulentæ est concilianda, præ- *stia.*  
 missa nonnunquam venæsectione, decocto chinae, lignor. & glycyrrhizæ, vel oleo amygdalar. dulc. vel Syropo aliquo pectorali; deinde novus materiae influxus est inhibendus sanando vasa aut lymphæ ductus nimis patentes, vel aliter laxos, per species diatrageant. cum Lohoch sano vel conserv. rosar. & Syropo de papav. rhazad. Fibris verò Tracheæ ipsamodice affectis antispasmodica pectoralibus permiscet, propinando Aquam Hyssopi cum aq. antiepilep. Lang. Spirit. ceralor. C. C. Syropo de erylimo & mulco pyxidato.

*Aperitatem.* *Aperitatem* Tracheæ secundum Auctorem hunc curatur mitigando & abiorbendo acrimoniam nimiam liquoris serosi, tum tunica interiori læsam sanando per dulcia pectoralia & lubricantia, vel etiam balsamica, quæ de causa sequens in tussi phthitica adeo salutare, etiam in hoc affectu cum singulari effectu abhiberi posse affirmat.

*W. Ol. Amygd. dulc. recent.*  
*Syrup. Capill. ven. aa. ʒi℞.*  
*sacchar. canth. ʒij.*

*M. terendo in mortario vitreo, vel agitando in phialâ, donec albescat.*

Lambatur sapius in die lentim deglutendo. Laudat quoque Syrupum de meconio, de erylimo, jujubinum, nec non Balsamum Peruvianum ad guttulas aliquot in conserva violar. aut Lohoch de pino adsumptum.

In *Vulnibus* & *Vulnibus* ad decocta pergit *Vulnibus*  
 vulneraria ex ligno Guaiac. salicæ, rad. clin. enil. *& Vuln-*  
 Herb. heder. terrest. veron. in arietol. paranda, *erius.*  
 quibus addit sulphurea, iisdem ferme minimè tribuendo virium, qualia sunt lac, Turcica & Syru-

Syrupus Quis, Tinctura picis liquat. cum aq. ale. ter colatur in alio ad medietatem abstrahenda parat, addita Tinctura, in quibus subijungit opoballum, vel balsamum Peruvianum. Externa tunc unguentum est. Alium ex terribili & melle cum myrrha & croco, quibus cum ulcera vel vulnera bene sint mundata, emplastro stupeo, vel oppositodoch, vel diaphanis curam absoluit.

9. 17. *Sylvestrum* li andinus. Curatio *Angustia* Alpene Arterea influenda est vel effluxu aquae adunila; vel excretionē contentorum, quae spontanea ab usodem eccitata tussis abigendo peragitur, interdum vel expulsiō promouenda est vel incidentibus, vel incallantibus, pro excutendorum vaporum exsiccandis, et pīusque quāitate medicorū alternenlis, praeter ea vomitioneque expulsiōnem istam obtinere posse experientia confirmatū promittit, quoniam tamen in languinis spūtu tūcus omittendū esse prudenter adhortatur.

In *Aphorismis* Trachea ex adhibet medicamina, quae timore et in illo iulium muricatum vel *calamum* currugete valet, inter quae maxum facit premi pilulae de castiglois, vel de styrace, quibus iulium in linctis et gargariis ex decoctione colae inter, racaribus, tusilag. paululis insensibus, horum, seu n. Papae, albi et similibus, in aqua de crevina tenui, vel fero lactis posita, adhibetur, de quo vel violar, vel canale potest, ut rob. diurectio. Ab habitibus obviens, sonitua alia partem, olea nempe *amomum* n. n. cori. aur. et. lenie maxime verum quum *Salicatum* n. n. in quore convenienter aut nos quacumque, non tamen acido salutari aut mentis.

[illegible]

8. 18. *Caricium* ad diluendam *Aspersionem*  
 Alperæ Auteræ omne viscerum & coagulatum  
 resoluunt, liquoremque modum deperendum  
 restituunt attenuantibus & volatilibus spiritibus  
 quibus sequens condat mixtura.

 $\alpha = f_1, E(1), \bar{5})$ .

A. H. M. 51.

*Tumulus proprius*. Мыл. Зуб.

*S. ant. memb.* 518.

Sp. 1. \* 513.

*Sutur. & Myfor. 519*

*M. D. cochleatum.*

[illegible]

1. (cont.)

*Syrup. emet.* Ang. Sal. ʒij.

*M. D.* una vice.

*Aperitatem* mitigant lubricantibus, partien- *Aperita-*  
las pungentes hebetantibus & fibras laxes de- *tem.*  
mulcentibus, ut Lobuch de caulibus cum spe-  
cieb. diatrageanth. trochiscis de alth. decocto  
liquirit. cum carie. vel sequenti matina,  
R. *dy. lib. alb. ʒij.*

R. Ag. l. alb. 511.

*Lobelia dulcis*. Querc. 3iiß

Tinct. r. Croc. Süß.

Syr. Erysim. Lob. 36.

*M.*

Cochleare hujus mixturæ teneatur in ore, & len-  
tem percutatur ad glottidem perflicere. Reparationem  
liquoris purioris purioris in Trachea deficientis  
infundunt oleo amygdal. dulc. cum oleo deft.  
am. decocto pallul. & pnear. in quo butyrum  
recentis fit diluatum, vel jusculo ex cerevisia  
calida, cui sem. ficum, contus. & in petaliga-  
tum fuerit incoctum, addito oleo olivæ re-  
cent. q. l. vel dimittat cerevisia quantitate.

In *Ulcibus & Vaheribus* decoct. algin. Gua-<sup>Ulcera &</sup>jac. lalfafas, traxim cum herb. veron. heder.<sup>Vulnere.</sup>  
terrellr. fciabio alique vulheris com-  
mendant, nec non Tinctur. Gu. oculos cancror.  
myrtian, aliaque porola, fuccos corruptos im-  
bibentia, tum & fanantia baliana interna  
& externa, nec non emplaftra in ulum admi-  
tunt.

9. 19. *Nobis curatio Augustia* Alperæ Arterix peragitur remotione, si licet, omnium illorum, quæ vel foris partem hanc comprimunt, aut conflungunt, vel intus obstruunt, quod posterius ut factius & felicius impetretur, necessaria sunt aliqua doremæ, atq. huiusmodi hanc lubricantia, ita enim res forisculæ illar. commodius ejectionur, quia de causa oleum amygd. dulc. vel butyrum recens insulum cum uramine exhibebitur, ita ut in ore aliquandiu detentum lenit per glottidem in Tracheam defluat, si vero hæc non sufficiant, agitatione manus alperæ arteria foris frequentius, sed levis fricetur, & tussis excutetur, vel etiam vomitus per tartarum emeticum, vel aquam bene dictam R. dandi aquæ alluminate & styropi capill. Quis intermissum, ut motu vehementiori expulso ista promoveatur, ad quod etiam conferet, si pars hæc tum inferius tum superius circa Lar. nigrum illatur variis linimentis pectoribus & emollientibus, ut membranz cum ligamentis, cartilaginibus & musculis facilius cedat rei exitum molienti, aut si alteri fieri nequeat, & periculum misset suffocationis, ut nihil relinquatur incutendum, Lar. yngotomia, seu potius bronchotomia instituenda, ut per foramen illud rei, quantum possibile, exitus pareat, vel ad minimum suffocationi obviam eatur. Materia verò tenax, viscidæ & crassior in cavitate Tracheæ hærens & eandem obstruens, ex incisis flagrantibus, coagulatis & rursus oriunda, incidenda, dissolvenda, attenuanda & fluxilis est reddenda, ut levi quadam excoctatione quas eliminari, qua in re juvenum erunt spiritus in omni species euale, ut spiritus gummi. Ammon. Species diaceros, cum sale volatili & ol. dest. aut. per. & extrad. li. aron. flori. &c. & benzoe. Tinctura proprietatis, & quando materia illa est purulenta, ballam. Peruv. rectificatus, seu destillando per retortam cum arena vel cineribus fluidior factus, in aqua leab. & styropi diapras. frequen-

*Asperit-*  
*tem.*

*Vulnera.*

Nostre me-  
thodum me-  
dendi Tra-  
ctica An-  
gustia.

*Vlcera &  
Vulnera.*

Cartespa-  
notum ta-  
tio curan-  
di Affera  
Arteria  
Angu-  
stiam.

Mn tius



tudis exhibetur. A Tumore partium vicinarum Angustia hac producta ante omnia tumor iste curandus variis resolventibus & discutientibus, hinc egregie convenit unguentum aromaticum sequens.

℞. *bacc. lauri* ʒij.

*rad. pyrethr.* ʒß.

*lumbrie. terr. No.* iiii.

*butyr. non salu.* tlbj.

*Frixentur & exprimantur, add.*

*ol. laurin.* ʒvj.

*ʒunip.*

*orisinar.* aa. ʒß.

*Sapon. nigr.* ʒj.

*Pulv. colocynth.* ʒß.

*Cere flav.* q. l. M.

Addi etiam potest sal aliquid volatile. Hoc resolvit, emollit, idem convenit omnibus tumoribus ac doloribus, paralyti, &c. Si Angustia hæc fuerit producta à stagnantibus succis, varia itidem conveniunt resolventia, quæ succum ad motum pristinum incitant, ut sunt omnia salia volatilia, & ex his parata cataplasmata sæpius de die calide applicanda, & quæ simul acidum in succis contentum absorbent, ut sunt omnia porosa. Si coarctura exorta fuerit à paralyti, vel defectu spirituum animalium, conveniunt omnia nervina liquida, tum interna, tum externa. Decoctum salvia in vino laudatur, addita essentia thymi; salia volatilia in vino vel alio liquore conveniente assumuntur, quæ egregie restitunt spiritus animales perfundatos, & liquoribus motum pristinum restitunt. Est formula.

℞. *Aq. lil. convall.*

*salv.*

*ceras. nigr.* aa. ʒj.

*Spir. lil. convall.* ʒß.

*theriacal. com. essent. castor.* ʒij.

*Syr. de Erysim.* ʒj.

M.

Externè conducet Aqua mirabilis, Anhalt. Spiritus meus arthriticus externus. Cataplasma nostrum nervinum. Mânatur collum & nucha spirituosus ac nervinus, ut ol. lumbrie, costin. destill. succin. anis. lavendul. Tinctura castor. & similibus. Si Angustia Asperæ Arteris oriatur à spasmò, hoc est, à succi nervei acris effervescentiâ, ubi non aliter motum illum excitat, ac si naribus indamus aliquid acre, unde sternutatio excitatur, conveniunt quæcumque antispasmodica vulgo dicta, item aromatica, tam internè, quàm externè: in hunc finem præ aliis conducit balsamus nervinus *Schefferi*, & externè balsamus meus arthriticus externus, vel unguentum nervinum & cataplasma ex nervinis & volatilibus paratum.

*Asperitas*

*Asperitas Tracheæ* corrigitur omnibus illis, quæ succos acres destruere & mitigare possunt, qualia sunt Spiritus æci assiat, Essent. menth. Aq. Althm. Spec. diatr. diatragacanth. Syrup. Jujubin. Tussilag. liquirit. ol. amygd. d. cum sacch. canth. & ol. d. anisi, quibus simul partes læsæ & exasperatæ debet lubricantur & leniuntur. Sic quando ab acerbis succis fauces fuerint excoriatæ, ut solet contingere in febris, convenit internè mucilago sem. cydon. cum aq. sperm. taur. extracta, & pulvis noster temperans sa-

pius exhibitus. Ad succos tenuiores incrassandos, mitigandos, & expectorationi faciliori accommodandos, non contemnendus est pilule de cynoglossa, quibus optime cum succis frequentius utimur. Externè convenit sequens vel simile unguentum.

℞. *Unguent. resumptiv.*

*Fil. Zachar.* aa. ʒß.

*Ol. ranar.*

*amygd. dulc.* aa. ʒij.

*camphor.* ʒj.

M.

Vel fiat mucilago ex lacte muliebri. Salivæ defectus potu, præsertim vini, vel cerevisiæ secundariæ refarcitur, addito Spirit. ʒæci.

In curatione *Ulcery* omnis collocanda est opera, ut parti huic periculose ita laboranti, quantum possibile, succuramus; exhibeantur proinde internè variæ sudorifera, nempe decoctum lignorum, & cuilibet ejus dosi addantur Tinctura ʒij. ʒj. aliaque, quæ salia ista corroliva in succis stabulantia absorberent, ut pulvis noster temperans. Variæ quoque & frequentiores fiant iniectiones, instillat omnium sit aqua ʒ. vel si aqua hæc miscetur cum oleo nucum recent quod egregie sanat & temperata acrimoniâ, quo & pertinet aqua n. fra viridis formâ gargarismatis usurpata. Pulvis quoque potius fumigatio est egregius. Hisce alia decocta vulneraria abstergentia internusculantur, & tandem consolidantia subjungantur, in vulneribus aliis proficua.

*Vulnera* verò cum pectoralibus succos acris dos mitigantibus & absorbentibus vulneraria ita dicta reposcunt, ut decoctum chinæ cum herb. veron. heder. terrestr. tussilag. alchimill. pulmonar. maculof. pentaphyll. pilosell. & lign. santal. rub. quod edulcorari potest syrupo jujubino & de Hispidula, qui hoc in casu multum conferunt. Sic pulveres quoque conveniunt ex oculis cancer ʒio diaphoret. terr. sigillat. myrrh. maltich. lap. hæmatit. pp. eroc. orisadstring. & similibus; nec non essentia traumatica, cancer. lumbrieor. Tinctura hyperici, Ois. Balsamus Peruvianus vulnera optime mundare & sanare solet, tum internè, tum externè adhibitus. Externè fumigatio vulneris instituiatur, per pulverem prunis inspersum ex olibano, opopanace, assa foetida, castoreo, & camphoræ, quibus succi acres singulariter mitigantur, corriguntur & liquor nerveus ad convenientem excitatur influxum, sanationi vulnerum tantopere necessarium, nobis enim certum est, absque sutura aut conglutinatione laborum vulnera hæc coalescere posse, si impedimenta convenientibus auferantur remediis, atque noxiis acris, quantum fieri potest, prohibeatur accessus, & hac de causa locus, in quo ægri hi servantur, ætèrè contineat tepidum, per sustumigia correctum, & vulneri imponatur epithema calidiusculum ex spiritu lumbrieorum & vini camphorato, quo prudenter facta vulnera hæc aliquando feliciter curantur, modo Trachea non nimium læsa, aut planè dissecta, vel cartilagineæ & ligamentatotaliter sint destructa. Consolidatio emplastro siptico *Crollii* commode tandem poterit promoveri. In hæmorrhagia hujus vulneris sustenda sufficit solus spiritus vini rectificatus, externe applicatus, quo nihil securius est.

CAPUT

## CAPUT V.

De Gula, seu Oesophagi Tumore, Angustia, Ulcere &amp; Vulnere.

§. 1.

**P**ost Epiglottidem & Asperam Arteriam in conspectum venit Gula seu Oesophagus, cuius officium Pharynx denominatum ut plurimum obturatum reperitur, nec delinquit, nisi ut viam aperiat his, quæ à lingua in hanc partem propelluntur, vel ut exitum permittat iis, quæ à ventriculo in os rejiciuntur, quod ut commodè & absque ullo impedimento peragatur, oportet, ut Oesophagus à morbis exeat immunis, sed cum & hic suos quandoque patiatui manes, non immerito morbos istos, à quibus occupari & adtraductionem ciborum in stomachum & potum, vel ejectionem illorum, quæ ventriculo molestiam creant, ineptus reddi potest, examini nostro jam submittemus, eo quod hæc oesophago male affecto sæpius comparatur, conveniunt nobis hic, quàm alibi de iisdem tractandi videatur locus. Inter morbos veto illos primò nobis occurrat *Tumor*, qui est Oesophagi in magnitudine excessus inconueniens, & dolorem, & difficultatem deglutendi importans, atque à succis in canaliculi musculorum, vel glandulis annatis stagnantibus & coagulatis suam trahens originem.

Oesophagi  
Tumor.

Angustia.

*Angustia* Oesophagi est cavitatis ejusdem immunitio aut interclusio à diversis quibusdam causis inducta, cibusque deglutendus & nonnunquam ipsi etiam potui transitum ad ventriculum intercipiens.

Vicus &  
Vulnus.

*Vicus* Oesophagi est dissolutio fibrarum & tubulorum ejus à corruptione fistulæ eorum interiorum acruum, uti *Vulnus* ejusdem dissolutio est, facta à causis externis pungentibus, scindentibus vel contundentibus.

Parti affe-  
cta.

§. 2. Affectus nostri pro *Parti affecta* agnoscunt Oesophagum, causam istum seu infundibulum, veteribus etiam Gula dictum, per quod cibi à dentibus comminuti & masticati ope lingue duntaxat ad ventriculum. Hæc canalis pro necessitate aperitur & clauditur, 7. musculorum ope. quorum primus Oesophagus dicitur, foriter adhaerescens utrique lateri cartilagineis scutiformis, & circuitu suo oesophagum obvolvens, in obturatione Oesophagi suum præbens officium: Alii sunt duplices, eorumque primi nominantur *Sphæropharyngæus*, ortum ducentes ab apophysis acutis ossis sphænoideis, & oblique pharyngis inferi lateribus eundem suum attolendo aperient. Secundi sunt *Sylopharyngæi*, erati ab extremis apophysis styloideis ossium temporum & lateribus pharyngis implantati, quem dilatant, latera ejus dextrorsum & sinistrorsum trahendo. Tercii sunt *Cervicæ pharyngæi*, ortu ab articulatione capitis cum prima vertebra, & fibras suas expandentes in subilantiam pharyngis, quem restringunt fibrarum suarum contractione. Ceterum Oesophagus à Pharynge ad ventriculum usque expotrigitur, triplici gaudens tunica, quæ dici possunt, Tunica interior, tunica media, & tunica exterior. Interior ex fibris tantum tendinosis diversimode intertextis est compacta. Media ex fibris carnis est composita, quantum duplex recensetur ordo, tum in homi-

nibus, tum in brutis. In hominibus fibræ priores ordinis in longum protenduntur, à pharynge ad ventriculum usque, quare *Longitudinales* indignantur. Fibræ vero alterius ordinis sunt instar totidem minimorum circumlorum oesophagum circumvolvunt, *Circulares* appellata, quod spirali lineæ oesophagum circumceant, & quoniam aliæ à dextra ad dextram tendunt, aliæ à sinistra dextram petunt, variis in locis se deculatim secant. Singulare quid in isto transitu animadvertitur, quod fibræ scilicet, quæ uno in loco aliis superjacent, primo in occursu subternantur, post superiora petant, & denudatam subspiciantur. Tunica exterior consistit ex fibris tendinosis subtilioribus, tenuioribusque fibris interioris. Hæc autem omnia ita ite intelligantur, Anatomia te apprime docebit. Tunica interior oesophagi & exterior mediarum tendinum vices agunt, ita ut oesophagum confiderare debeas instar musculi, cujus tunica interior est caput, media venter & exterior cauda. Posteriori oesophagi parti prope quintam thoracis vertebrae corpus quoddam adnascitur glandulosum, modo ex duplici glandula, modo ex pluribus compositum, humorem quandam suppeditans ad cavitatem pro faciliori deglutione commodè imbuendum.

§. 3. *Tumor* Gulae facile cognoscitur ex dolore in deglutione versus posteriora & dorsum, ipsaque deglutione difficili, non uti ex angustia, quia sæpe ipse Oesophagus obstruitur, ut omnis aditus cibo & potui in ventriculum denegetur, verum & musculos, quales Cephalopharyngæus, Sphæropharyngæus in suo motu impedit. Tumor enim cibos deglutiri non permittit, ægrosque mediâ debilitat. Benè vero hic est distinguendum, num vel ab obturatione ab ingestis & ibidem hærentes, vel an ab abscessu quodam in gula latente, an vero à paralyti gula deglutitio nostra lædatur, quæ signa ex causis peti possunt. Nam si instrumentum vel flexile os balanzæ profundè satis gula intrudi potest, signum est, nullam carunculam aut tumorem adesse, sed Paralytice esse gula, unde & ipsa *Angustia* indicitur, quam ipsa quoque deglutitio prode diffidentia, atque si ab externis ingestis hæc producta sit, relatio ipsius ægri, vel astantium in medicum de morbi specie & causa adhuc reddet certiores. *Vicus* cognitio haud difficilis est, cum ex sanie circa humerum emanante, & simul læsa deglutionis functione sufficienter pateat. Sic quoque *Vulnus* à prægressa causa violenta, ipsa continui solitione, tum interiorum, tum exteriorum partium, & inter eorum hæmorrhagia, facile liquet.

§. 4. Causam *Tumoris* Oesophagi adscribunt *Galenicæ* uni, vel pluribus ex quatuor humoribus, nempe vel sanguine, vel bili, vel pituita, vel succo melancholico, in parte hæc vel lentum congestus, vel in eandem subito affluentibus, quorum prius ob facultatem patris ex nigricem debilem, posterius vero ob dolorem humores attrahentem potissimum obveniat, & tumoribus hisce frequentius adjunctam esse aperi intemperiam

Diagnosis.

Galenicæ  
humorum  
Etiologia in  
Oesophagi  
Tumore.



quandam cum materia, ex qua, si difciti nequeat, vel inflammatio, vel abscessus aliquando suboritur.

*Angustia.* Inter *Angustia* Oesophagi causas referunt vel malam conformationem à primo ortu, vel compressionem à tumoribus aut luxatione vertebrarum, vel res, externas in eum protrusas & cavitatem ejus obstruentes, ut ossicula, bolos majores & duriores, lapillos, numinos, & alias, vel pituitam crassam, lac coagulatum, aut vernes ex ventriculo ascendentes & Oesophago diutius inhaerentes.

*Ulcera & Vulnera* easdem regeant, quas in priore capite in Arteriz Asperz Ulceribus & vulneribus recensuimus.

*6. 3. Paracelsus* Oesophagi Tumorem etiam ut reliquos ex collectione procedere docet vel humoris, vel carnis, vel ventorum: *Angustiam* verò vel à paralyti oriri, vel meatum hunc obstrui externis illapsis. *Ulcus* à corrosione salium & *Vulnus* ab instrumento & externi violentia deducit.

*6. 6. Helmontius* à laticis influxu uberiore & diuturniore retentione Tumorem Oesophagi oriri posse existimat, *Angustiam* verò, vel potius obstructionem à majori & sicciori bolo, dum ad ventriculum ob defectum liquoris Oesophagi huiusmodi descendere nequit, & defatigatione Archei, nec non constrictione aut compressione partium adjacentium vel etiam ab utero in mulieribus oboriri censet; alijs gulam per se actam & semper, non secus atque velica propriè carens contento, à clausam esse proficetur, quapropter & cibos, potum aut aerem in se non habentem, ob necessitatem, ut inquit, naturæ, quam non patitur vacuum, seipsam lateraliter attingere, à cibo tamen morbis liberam debetè diluari. *Ulcus* causam laticis ab acido corrupto imputat, ut *Vulnera* ab externa re lædente inferuntur.

*6. 7. Valdesius* originem Tumoris Oesophagi deducit ab humoribus crassis inter tunicae exterioris fibras contentis & ibidem inspissatis.

*Angustia* causam adscribit vel paralyticam exterioris carnosæ, vel fibris nerveis tunicae interioris ab explosis re spirituum nimis inflatis & dissentis, vel rebus variis in cavitatem hærentibus.

*Ulcerebus & Vulneribus* communem assignat causam ex priore capite jam cognitam.

*6. 8. Sylvius* causas Tumoris Oesophagi non alias novit, quam communes illas omnium tumorum, nempe vel auctam Oesophagi substantiam, vel humorum contentorum extra locum naturalem in substantiam ejusdem effusionem.

*Angustia.* *Angustia* Oesophagi, atque hinc orientis deglutitionis læsæ causas enumerat obstructionem à re solidâ ipsius canale implente, carne videlicet nunc in ipso læso excrecente, nunc per ingluviem aut infortuniū devorata & in ipso hærente, aliquando cartilagine, ossis, nucleo, vel alia re ibidem morante; tum compressionem à tumore vicino, vel coactum post sui excoarctationem, aut paralytū musculos ejus occupantem.

*Ulcera* ab acido acri, & *Vulnera* à re exterius lædente produci asserit.

*6. 9. Cartesius* demonstrat Tumorem Oesophagi exurgere, dum vel lympham in glandulis Oesophagi coagulatur ob particulas quas-

dam diversimodè angulares aut ramosas, transmissas per nervos aliosve ductus minus accommodatas, intermissas, vel interior tunica & subiecta vasa à re quâdam acuta, ut ossiculis asperiori mucronato, frustulo vitri, aciculâ, aut id genus corpusculis rumpuntur, & tubuli succos suos effundunt, qui extra confluens tubulos corumpuntur, & inflammationem aut abscessum constituunt.

*Angustiam* hujus infundibili, indeque deglutendi difficultatem induci ajunt, dum vel à tumoribus propriis, vel vicinarum partium, musculi & nervi comprimuntur, aut tubuli eorum à visciditate liquorum obstruuntur, ut officio suo in admitendis & detrudendis cibo, potu, medicamentis non debetè fungantur, vel fibræ membranosæ à liquore quodam acido aut multis particulis hamatis constante contriunguntur, vel latera Oesophagi post ulcus vel vulnus invicem concresecunt, aut carticula seu excresecencia quædam prænascentur, vel in cavitæ aliquâ hæret, quod nec in ventriculum facile detrudi, nec per pharyngem ejaculari valet, ut liquor viscidus inspissatus, bolus ciborum aridior & asperior, aut etiam major, aut res quodam alia inconcinna ad deglutitionis hoc instrumentum improvidè delegata.

*Ulcere* causam etiam hac in parte commovent, strant particulas acutas aut liquores violentè commotos, aut obstruendo soli materiam primi elementi transitum permittenti, à quibus fibræ partes rumpuntur, & tubuli cum vasculis dilacerantur, ut diversi liquores ex iisdem profliant.

*Vulneri* non aliam fingunt causam, quam ab aliis jam prolatam.

*6. 10. Ex nostrâ sententia* causa Tumoris Oesophagi eadem est, ac aliarum partium tumorum; nempe sanguis, reliquique succi in canaliculis, vel lymphæ in glandulis Oesophagi crassas & tenaces suas particulas stagnantes, qui factâ quâdam colluvie partes adjacentes distendunt, & tumorem hunc efficiunt.

*Angustia* Oesophagi diversas agnoscit causas, etenim inter Oesophagum atque asperam arteriam insinuare se interdum solet durus quidam tumor, gulam tam strictè ocludens ut denegato omni alimentis transitu certò periret hominem. Aliquando *Angustia* hæc fieri solet à carticula gulæ ex ulcere Venereo oborta. Funestam Oesophagi *Angustiam* à cartilagine annuliformi, exiguo foramine prædita, & ab ipso Oesophago enatâ memorat *Excell. D. Becker in Decur. I. Eph. N. Cur. A. IV. Obs. 67.* *Angustia* fit quoque à tumoribus ab improvidè deglutitis, sic Secretarius quidam nuper inter ridendum deglutiens os aviculæ; quod in gulâ hærens assumpto vomitorio feliciter eiecit. *Filiolæ* ejusdem Oesophagum à variolista coactum fuisse, ut denegato cibi potusque per illum transitu miseræ puellæ fame miserum non sine maximo parentum luctu pereundum fuerit, observavit *Bartholæus Act. Hass. Obs. 109. velum. 1.* Sic & Oesophagus quasi in totum clauditur à paralyti; ibi simul notandum, quod in hominibus etiam in statu sano Oesophagus ordinario contrahitur à fibrarum longitudinalium intumescencia, & à circularium contractione stringitur. Abbreviatio & contractio ista Oesophagi cognominatur *illius*

*Oesophagi Tumoris.*

*Angustia.*

*Vuln.*

*Nostrâ sententia de causis Oesophagi Tumoris.*

*Angustia.*

illius motus peristalticus, motus enim iste peristalticus exercetur, ut id, quod semel pharyngem subingressum est, in Oesophagi cavitatem non remoretur; ita ut asserere possimus, Oesophagum hac fabrica evinctum esse, ut motu suo peristaltico, hoc est, succo nervorū influente, alimenta in stomachum usque impellat. Denique motus iste peristalticus vermicularis nuncupatur, quia vermium more movetur Oesophagus, sese in uno loco contrahendo ac constringendo, & in altero sese tumefaciendo, quod continuatur facta per undulationem ab uno isto extremo ad alterum communicatione. Obliquam inferiorem (scurculorum nervorum) in fibras tendinosas tunicarum ejus esse causam merito suspicari possemus. Nam spiritus animales fibras quandam subingressi, ipsam tumefaciendo constringerent extremum, ex quo prodissent. Et denegato hac ratione ceteris ingressu, impedirent, ne plures effluerent, dum fibrae in pristino stato repositae forent, elastici sui motus virtute. Et quia fibrae longitudinales sunt continuæ, & circulares universæ à fibrillis tendinosis inter se invicem conjunguntur, spiritus animales in longitudinales ulterius tendentes, & circulares vicinas subeuntes, in iis eundem edere effectum, quem in aliis produxissent. Continuat ergo fluxu ab uno Oesophagi extremo ad alterum, motum vermicularem sive undulantem efficerent, quo locus unus altero strictior breviorque devenit, postea in pristinum statum relictus, dum contractio ista & abbreviatio ad inferiorem producit, & ita deinceps. His premisissis facile causam paralyticam consignare possumus, cum musculi convelluntur, & in horum fibras aut tubulis obstructis spirituum animalium influxus denegatur. Sic paralyticam gulæ exemplum habet Celeb. *Hannemannius* in *Eph. G. Decur. Ann. 3. Obs. 48.* pistoris cuiusdam & civis Buxtehudani qui in morbum febrilem incidebat, quem auctum musculorum pharyngis & Oesophagi tunc vehementem paralyticam comitabatur, ut nihil quicquam, sive solidum, sive liquidum esset, deglutire posset, & sic morbo hoc fuit extinctus. Sic & *Nicol. Tulpius*, *Petrus Salmus Divesius*, & *Thomas Willis* plura habent ejusmodi exempla, ut & Celeb. *D. Stalpart van der Vliet*, qui inquit *Obs. rarior. Cent. post p. pr. Obs. 27.* Pannifex quidam Erbachensis à 4. annis nihil solidi deglutire volebat nisi potulentum lib. 1. desuper assumeret, aliàs ipsi cibis ita in faucibus hæret ut altero die cibum concessu iterum reddere & quasi ruminare posset, vicique sanus exiit. Id mihi, nec non Expert. viro, *Dno. A. Nuk* (Professori nunc Leidensi & Anatomico Celeberr.) rarior occurrit circa nobilem quandam matronam casus, cui nihil omnino deglutire valenti etiam id, quod deglutire conabatur, vox Oesophago fistebatur, brevique post ab inferiori parte sursum ebullire incipiebat, unde in vehementem tumorem angoremque magno cum suffocationis periculo incidit, ita ut quidquam assumere recusaret. Hi viri clarissimi impeditæ hujus deglutitionis causam non paralyticam, multo minus efferescitæ, duræ tumori, verum glandularum Oesophagi obstructioni, tumori que, carnosarumve interioris Oesophagi tunice fibrarum contractioni, ex acidi acerbis effluviis haud dubie ortæ, ascribere. Improvide quoque deglutitæ angustiam & sæpe plenariam obstructionem Oesophagi inferre possunt, sic re-

tenet *Cl. Dn. Raygerus Obs. 109. Eph. G. A. 9. & 10.* plura exempla improvide deglutorum, partim cum vitæ periculo, partim sine eo. Sic ex deglutitis fuculis mesylorum & putaninibus nunc vidit sartoris filium derespente suffocatum; item alium, qui ex nucleo pruni perit; meminit etiam puelli ex improvide deglutito nummo, *Grußer* / intereuntis, porrò addit, quod filiolus 2. annorum cremballo ludens illud in os sum, fecit tentansque illud deglutire; sed imminente suffocatione perterritus adstantes, cum illud eximere amplius non possent, immisso digito ad vomitum movere voluit, sed magis detrudunt. Vocatus Chirurgus immisit spongiâ ferreo filo præfixa, aut vomitum conciliare aut penitus in ventriculum detrudere laboras, sed frustra, ha sit, quantum conjici poterat, in gula, & puer quidem liquida, quæ ipsi dabantur, valde pinguis deglutiebat facile, nequitiam solida, flente continuo saliva. Tandem rectia de sua sponte vomitus exoriebatur sine dubio urgente hoc cremballo, intimo fibrillas vellicante, quo vomitu istud crembalum undæ exturbabatur, & sic parvulus ex præsentaneo vitæ periculo servatus fuit. Alter filiolus ex deglutito ossiculo in Oesophago hærente, & mortem minitante, circa 14 diem mane post pusillum sumunt iter vomendum ossiculum illud eiecit, & sic cessantibus pluribus, & quidem diutis symptomatibus superstes mansit. Sed quis omnia recensere? Nos enim plures aciculas, acus, araneas, vitra, (sic *Blasius Gresser*) & nulle alia vidimus innoxie deglutita, quæ hic narrare superfluo, ne videar observationes comportant. Lectorem ultra debuit detinere. *Conf. Ann. 3. Eph. G. Obs. 141. & 333. item Cl. Dn. vander Wou Oesophagi rarior. Cent. p. Obs. 22. Amal. Lausan. Cent. 6. Curat. 49.* ubi post læratum sanguinis & assumptorum vomitum, deglutienti omnimoda difficultas, etiam aquæ, solâ vini assumptione salva.

*Ulcera* Oesophagi causas dicimus esse particulas acres, seu acidas fibras longitudinales Oesophagi corrodescentes, & earum substantiam absorbentes, insimul succum nutritium eadem labeficientes, ut non nutriat, sed labia ulcusculi magis exedat, & fibras simul circulares ipsamque tunicam ulterius & sæpe penitus consumat.

*Vulnerum* Oesophagi, ut quorumvis aliorum, est causa & continui solutio, & divisio facta à vi externa. Perinde verò est, in qua parte facta fuerit solutio continui, sive nervosa, sive musculosa hinc rectè *Bontekoe* dicit, ruptiones arteriarum, et si sint ex fibris nervis, esse etiam vulnera. Illa solutio continui est solutio tubulorum, sive vasculorum, sive canalicularum, unde tunc humores in iis contenti effluunt, stagnant, particularumque ipsorum mixto turbatur.

§. II. Omnes affectus Gulæ seu Oesophagi periculosi sunt, denegato enim alimenti transitu certò pelluntur homines. Veteres dicunt, si materia obstruens sit pituitosa, interdum, curari ab atra vero bile ortum affectum nunquam domari, quod confirmat *Tulp. lib. 1. Obs. 44.* Abscessuum, qui omnem deglutitionem impediunt, meminit *Joach. Camerarius epist. 110. Cyl. Hornung.* Sic etiam funesta fuit illa obstrutio Oesophagi, quæ fuit à catilagine annuliformi exiguo foramine prædita, cujus mentionem facit *Cl. Bekers in Dec. 1. Eph. G. A. 4. Obs. 67.* Situ moris sunt leucosthi vel carunculae in gula adint,



lethales sunt, Bronchotomia enim huius in casibus influit nequit, quoniam pars huius, Oesophagus sc. constat ex fibris tenuissimis longitudinalibus & circularibus dictis, quibus laxis necessario deglutitio cessat, & hac cessante ob defectum nutrimenti homo mori cogitur. Tumores quoque facile comprimunt asperam arteriam, eamque ita angustant oculidumque, ut respiratio non tantum imminuatur, sed sepe in totum tollatur, unde mors. Sic Cl. Dr. *Blancardus Cell. Med. Phys. Cent. 3. c. 43* memorat Oesophagi coalescentiam & Sciatoma quoddam mortis causam quale & exemplum habet *Bartholin.* in *Op. supra citata*. Sic frustum fissile, quia Tabaci amatores fumum imbibunt, faucibus inhaerens causam huiusmodi mortis, testatur *van der W'iel Obs. 1. Cent. 1. plura passim occurrunt* in faucibus haerentium exempla, quae mortem causant, live illae aciditiae quidam nimiumque subito ingurgitatione ibidem fixae remanere, live per oculum, live intertidendum, live de industria, infortunioque quodam per os immittitur in gulam irreperit. Plura exempla habet *Schenck. Obs. Med. lib. 2. cap. de suffocatis acribus per errorem angustis, impulsisque* alique plures.

Paralysis gulae sepe semper lethalis est, de qua legatur *Eph. G. Obs. 48. Decur. Ann. 3. Sic & Tulpius lib. 1. Obs. 42.* inentionem iniecit paralysis Oesophagi musculorum in muliere 50. annorum, quae ne guttulum poterat transmittere, & septimo obiit die. Paralyticos gutturis potu frigido ortu meminit *Job. Hedericus Obs. 59.* Plura exempla legi possunt apud saepius memoratum *D. van der W'iel in Obs. rar. Cent. poster. Obs. 27.*

Inflammationes, Exulcerationes & ipsa Ulcera Oesophagi sunt ob partium ipsius angustiam, & via necessitatem ad alimentorum sc. deglutitionem, maxime periculosa.

Eandem ob causam & *Vulnera* maxime sunt periculosa, imprimis si sint magna, & tubuli seu fibrillae longitudinales ac circulares fuerint ad plurimam partem abscessae & ruptae, unde necessario pars collabi, & officio suo fungi in postum nequit.

§. 12. Uti plures affectus sola quiete & abstinentia curantur, ita hoc imprimis in his attendendum est affectibus, quare in Tumoribus Oesophagi solaliquida sorbenda sunt, ut sunt juscula varia hordeacea, avenacea, cremor imprimis hordei, gelatin. C. C. ossis bovis & vituli. bene enim nutrites cibi ac temperati conveniunt. Sic & charesofolium aliaque iuculis incoqui possunt, & si illa haut deglutire possunt ægri, ipsi per syringas aliaque instrumenta indenda sunt, & ut facile transeant, sale volatili præditi sunt condendi. Aer sit calidior, aut potus temperatus, frigidus angue pesus fugiendus: quia magis incassat, & ad stagnationem succorum aniam dat, acidum augendo, ac fibrillas longitudinales ac circulares Oesophagi jam patientes pungendo & discindendo, unde sepe ulcera exoritur. Quare aer alper semper calidior corrigatur, serenus enim, purus ac temperatus calidusque multum facit ad circulationem sanguinis ac reliquorum succorum promovendam. *Potus* sit tenuissimus, hic conducit decoctum Thee, vel rosmarinum, vel tulalras, vel veronice, vel hederæ terrestris cali-

dè assumptum. Vinum verò ob aciditas suas particulas plane exulet. *Quies* corporis conducit, contra *Vigilia* nocent, retardant enim motum sanguinis & succorum. Sed nec animi status praeterendum est, qui ab actis invidis curis, latius æ tranquillius sit. Denatur itaque supercilio nubes, animo onus, fronti senectus. Dum enim aliis animus se nimium torquet curis ac metu mortis, spiritus incassantur, humoresque ab his deserti coagulantur & stagnant, imò parti facile paralysis inducere valent. Hinc ad ultimum fungatur & opere suo venter, sicque alvus laxa, insensibilis quoque transpiratio, quæ juxta *Sanctorii* calculum in *Med. Stat.* plus excrementum egerit, quam sensibiles excretiones, in his affectibus sit expedita.

§. 13. Præmissis iis, quæ ad Dietam spectant, ad auxilia, quibus primo Tumor Oesophagi abigatur, jam perendum est, de quibus tamen aliorum ætate nobis graviorum sententias prius percipiamus. Galenicus ergo ipsas *Tumorum* causas respicientes, si Inflammatio gulam occupet, præmixto victu tenuissimum sanguinis multo generationem prohibente, atque potissimum ex pituita constante hordeacea licco limonium medicata, aut iure pulli gallinacei, in quo folia lactuca, endivia & acetosæ bullient, julapia præscribunt refrigerantia & humectantia, ex decocto hordei, acetos. cichor. lactuc. portulac. sem. 4 frug. mag. & min. cum julap. rosat. syrup. violar. fragor. &c. Redundantem verò sanguinem, ne inflammatio ulterius incrementum hauriat, venâ in utroque brachio dissecta sufficienter emittunt, habita tamen virium & quantitatis sanguinis in corpore toto existentis ratione. Alvum propter nimium calorem febrilem sicciorum & adstrictam humectant & lubricam reddunt clysteribus ex decocto malv. violar. betæ, atrip. in quo elect. benedict. laxativ. fuerit dissolutum, addito oleo lilior. aut violar. & quando majori indiget irritatione, 3ß. sal. genum. Pro majori averfione cucurbitulas quoque dorso apponunt, scapulis & coxis, cum aliqua scarificatione, nec amittunt frictiones corarum, tibiærum, & crurum, post quas & vincula iisdem partibus insciunt. Audacius etiam ad repulsiōnem accedunt, applicantes parti laxiori exstimate, ne plus sanguinis aut humoris fluentis admittat, remedia topica adstringentia. & hoc modo robur parti adjicientia putat, quorum numero inserunt oleum rosaceum omphacinum, myrrhinum, cydonior. epithema ex decocto flor. rosar. malicor. fol. myrrhi, addito aliquanto vini adstringentis aut aceti rosacei, unguentum ex oleis prædictis & pulveribus balsustor. santal. rub. corall. creta, addita q. s. ceræ paratum, vel cataplasma ex ros. rub. myrril. sorbis, cydon. in aqua vel vino adstringente coctis, addito oleo rosaceo omphacino. Ab adstringentibus & repellentibus huius per initia usurpatis ad laxantia accedunt sic digerentia, linimenta nempe ex adip. asserino, butyro recenti, oleo camomill. & melior. & cataplasma ex sem. fenigr. lin. rad. alch. flor. camomill. melior. quorum usu si materia sit emollita, eandem vel exspatatione, vel si ad ventriculum & intestina vergat, purgatione eliminant. exhibitis elect. diaprun. & pulpa cassia vel manna, cum locum affectum nundant & abstergunt gargariunt ex decocto hordei cum melle rosato, vel alio quodam apozemate ex herbis plan-

Dietæ in  
Oesophagi  
morbo in-  
stauranda

Curatio  
Galenica  
Oesophagi  
Tumoris.

plan-

plantag. fragar. veron. cum syrupo granator. & violar. Peccante quoque humore bilioso, & tumore existente erysipelato, abundantiam ejus imminuunt & qualitatem corrigunt remediis itidem refrigerantibus & humectantibus, eodem ferme modo, ut in tractata nunc Inflammatione jam percepimus. Et contrario vero humore existente pituitoso & tumore edematoso, visciditatem illius corrigunt calefacientibus, incidentibus & attenuantibus, aliisque pituitam concoquentibus. decocto nempe salvia, betonica, majorana, thymi, rad. Imperator. enulæ, Ireos, cum oxymelle simplici vel liquillitico, melle anthosato, Syrupo de calameith. Hyssop. beton. Materiam superfluum evacuant decocto agarici, vel clysteribus ex decocto herb. malv. parietar. branc. urini, in quo electuar. hier. pier. sit. dissolutum, vel pessario ex melle cum speciebus electuar. hier. pier. stutellina sollicitant. ut humores peccantes per alvum potius, quam per vomitum ejiciantur. ne dolor in gula augeatur, aut de suffocatione periculum inferatur. Tumorem jununt oleo anethino, chamomelino, nardino, vel cataplasma imponunt ex farina fœnigr. hord. feni. lin. fabar. cum pulvere rosar. & myrrh. in vino coctis, addito oleo chamomelino aut nardino malaxatum. Tumori scierhoso emollientia adhibent, relaxantia & digerentia, emplastrum videlicet de meliloto, Oelyp. Philagr. demucilaginis, aliaque, quibus Tumor ille durus resolvitur.

*Angustia.* Sublato ita Tumore etiam *Angustiam* Oesophagi ab eodem comprimente productam auferri promittunt, si vero ubi alias causas contingit, easdem tollere debent, adstrictionem à cibis aut medicamentis relaxando oleis, jusculis pinguibus, fomentis aut balnei ex decoctione rad. altheæ, lil. feni. lin. flor. malv. Chamomill. & siml. Bollum grandiorum vel humorem viscidum & glutinosum in Oesophago hærentem præmissa potione dulci & pingui meatum relaxante, vel vomitu arte concitato per superiora ejiciunt, vel candela cerea aut alio instrumento idoneo in ventriculum ipsam propellunt.

*Vulnere.* In Gula *Vulneribus* gargarisnata commendant ex decoctione herbarum adstringentium & sarcocticarum, quales sunt equisetum, lonicula, consolida, centaureum, caryophyllacæ, balsamina, tormentilla, quas pulveritas cum melle quoque in electuarium redigunt frequentiori in usu habendum. Vicina partes si simul læsæ sint, curationem admodum difficilem, sapientissime impossibilem pronunciant, & remedia topica toti collo imponunt, quando vero gula tantum contulæ est, cataplasmata ad transversos spinæ processus adhibent humores confluentes repellentia, gulam ipsam roborantia, & humores jam susceptos digerentia, qualia ex foliis cupressi, plantag. aloë, ladano, cum oleo lilaceo, aut chamomelino aptè conficiuntur.

*Vulnere.* Ad *Ulcera* Gulae curationem dextrè peragendam, venaesectionem & purgationem aliquando præmittunt, ne pravi humores in corpore contrahantur, aut geniti & contracti ad partem affectam copiosius sentantur, ulcus inflammet, aut acrimonia sua corrumptant & sævum efficiant, deinde ut carnis restitutio, consolidatio & cicatricis inductio eo facilius subsequatur, sordes prius detergunt aqua mulsa, vel decocto hordei, cum melle rosato, vel herb. præstii, calamanth.

chymi & caudæ equinæ, vellactæ quoque asinino cum melle rosaceo permixto, quibus simul dolorem & asperitatem ab ulcere excitatam mitigari promittunt; Ulcere vero sufficienter detecto, siccantia, adstringentia & carnis generantia adhibent, collutiones nempe ex decocto herbarum in vulneribus jam nominatarum, quibus addunt pulverem trochiscorum de carabe, de terr. sigill. hol. Armen. & ut melius hæreant, glutinosa addunt, ut syrupum myrtinum, de rosæ siccis, gumm. Arab. tragacanthæ, aliaque acrimoniae humorum fontiter resistentia.

§. 14. *Paracelsus* Oesophagi hunc *Tumorem* *Paracelsi* ut ipsam curat Squinanthiam, internè collu- *curatio huius mor-* tionibus ex aqua prunell. cum melle rosæ, & pul- *borum.* vere rad. aristol. rotund. *Angustiam* abigit tum curando paralytin, tum eximendo res cavitate ejus obstrictas. *Ulcera & Vulnera* ut reliqua aliarum partium solet tractare.

§. 15. *Helmontius* affectus hosce eodem tractat *Helmontii* modo, quo in aliis partibus circa eodem versa- *cura in morbu Oesophagi.* ti solet, in *Tumore* laticis retentionem tollendo tum per remedia interna ex Gilo, tum per externadurum relolventia, ex quibus reliquis præfertur unguentum in Serumis descriptum, vel abscessum maturantia. *Angustiam* tollit auferendo quodcumque obstruens aut comprimens, vel uterum in convenientem statum reducendo per castorina & arcænum alitè fetida. In *Vulneribus* & *Vulneribus* communiter nititur methodo, habito semper respectu ad irritationem Archæ, ut ille, omni studio sedetur.

§. 16. *Vitis* in Oesophagi *Tumore* humo- *vitis* res crassos & duros attenuat & resolvit cæta- *medus em-* plasmatas, unguentis & emplastris emollientibus præ- *andi Oesophagi* foris adhibitis, qualia sunt cataplasma ex feni- *Tumorem.* fœnigr. cum sol. malv. rad. alth. & flor. chamomill. Unguentum dialth. emplastr. diachyl. de mucilaginis, internè vero decocta ex radicibus tubæ, enul. scabiosæ, herb. calaminth. saliv. heder. terrest. cum diaphoreticis quibusdam internis propinat. Materiam ad diffusionem ineptam & in abscessum vergentem maturat, & si fieri potest, eodem interius rupto, & materiâ purulenta per exspirationem evacuata ulcereque absterio, balsamicis & vulnerariis curationem absolvit.

In *Angustia* ad causas respicit, Paralytin aut *Angu-* Spasmodum abigendo per decocta & destillata ex *siam.* herbis saliv. beton. majoran. fauræ, flor. paralyf. rad. ari. Imperator. ligno Guajaci, sassafr. C.C. vel Spir. C.C. & æci. vel etiam diaphoretica, ut *Θ* viperar. bezoard. mineral. Tinct. Gil. nec non externalinimenta antiparalytica & antispasmodica ex succino & thernis; bolos & res deglutitas in Oesophago hærentes & viam hanc aliis præcludentes, ut antecedentes, vel in ventriculum instrumento quodam proprio detrudit, vel per vomitum ejicit.

*Ulcera & Vulnera* gargarisnatis vulnerariis & *Ulcera & Vulnera* balsamicis remediis, quibus in vulneribus & ul- *Vulnera* ceribus aliarum partium uti solet, curare possit sibi maxime habet persuasum.

§. 17. *Sylvius* in *Tumore* Oesophagi eadem *Sylvius* adhibet remedia, quibus morbi huius genere cu- *in Oesophagi* rantur; in *Angustia* vel carunculam absumere *Angustia* tentat linimento ex melle rosaceo cum oleo *Ulcera & Vulnera* vi- *Ulcera & Vulnera* trioli, vel alumnæ usto, quo carinacula hæc in- *Angustia* terdum mediante cereo est tangenda, vel res in cavitate hærentes ulterius in ventriculum propellit,



pellit, aut cum prioribus Auctoribus vomitu e-  
jicit, vel paralylin tollit remediis nervinis. Ad-  
modum verò difficilem aut planè impossibilem  
pronunciat curationem, si post erosionem latera  
Oesophagi fuerint concretæ, in quo casu fere-  
la tantum molliora per Angustiam hanc penetra-  
re valentia suadet exhibenda.

*Vulneribus & Ulcibus.* In *Vulneribus & Ulcibus* etiam hujus par-  
tis post decocta aliasque mixturas vulnerarias  
balsamum suum  $\frac{1}{2}$ is commendat anisatum, vel  
succinatam.

*Caristia.* §. 18. *Caristiam* in *Tumore* Oesophagi resolu-  
tionem urgent succorum coagulatorum per dia-  
phoretica interna, Tincturam videlicet  $\frac{1}{2}$ ii  $\frac{1}{2}$ li-  
tam. Spiritum C. C. camphoræ theriacal. flor.  
sambuc. Electuar. diacord. &c. externè vero per  
varias illutiones tum oleas volatiles. tum  
spirituosas, nempe oleo lumbrior. flor. sambuc.  
septem flor. *Myrsin.* cum  $\frac{1}{2}$ o d. succin. cam-  
phor. anil. Spir. lumbrior. cui  $\frac{1}{2}$  volat. C. C.  
sic associatum, vel emplastrum imponunt dia-  
chylum camphorat. vel de gummis & terebin-  
thin. cum salibus volatilibus & oleo d. anisi  
paratum.

*Angustiam.* Relolutis & discussis ita Tumoribus istis, etiam  
Angustiam Oesophagi ab eorum compre-  
ssione ortam auferri certi sunt, si hæc vel ab ob-  
structione pendeat tubulorum, vel fibrarum con-  
structione, vel paralyti, spiritusosa & volatilia  
adhibent tubulosas periclitia, particulas ac-  
tas & hamatas hebetantia & electentia, atque ipsi in  
liquorem nervosum augentia, mixturas nempe  
ex aqua majoran. saliv. thymi, spir. lavendul. ci-  
sent. castor. Spir.  $\frac{1}{2}$ ci succinat. S. sup. flor. pa-  
ralys. aurant. & similibus. Res in cavitate hæ-  
rentes cum aliis vel ad ventriculum detruden-  
das esse jubent, vel vomitu, tussi aut sternutatio-  
ne superius ejectiones, aut forcipibus aliisque in-  
strumentis convenientibus extrahendas, lubrica-  
tis prius cavitate Oesophagi oleo amygd. dulc.  
cum ol. d. anisi, aut junculo pinguiori.

*Vulnere & Ulcere.* In *Ulcibus & Vulneribus* hujus partis deco-  
cta vulneraria non continentur, si quidpiam de  
oculis expp. vel  $\frac{3}{4}$ io diaphoret. & myrrh. usdem  
sit admixtum. Essentias traumaticas ex rad. lym-  
phyt. herb. saliv. sanic. Alchimiill heder. terrestr.  
flor. hyperic. cancris, cum spiritu lumbrior. &  
syrupo de Hispidula cuagni æstuant pretin. Ex-  
terne tussumigia laudat & camphorata, nec  
non balsamum Peruvianum & Emplastrum sti-  
pticum oleo hyperici exprellò, & lumbrior.  
cum guttulis quibusdam ol. d. succini, mala-  
xatum.

*Nostri cu- ra in Oesophagi Tumore.* §. 19. *Nostri* curatio consistit in eo, ut causa  
immediata ac mediata *Tumoris*, materia scilicet ob-  
struens removeatur, meatus, cavitates & vasa à  
supinatione spulsa, viscidà, vel alio modo oclusa  
releventur. Tubulorum ergo & canaliculorum  
obstructionem quocumque modo factam, &  
succe glandulari vel alius succi viscositatem cor-  
rigunt ac stagnationem impediunt incidentia &  
attenuantia volatilia, decoctum scilicet fol. major-  
an. & rotismar. cum Thée tepide adhibita, in-  
ternè, & his etiam gargarismo instituitur, vel  
folia rotismarini cum quidam portione rad. py-  
rethri masticanda sunt, ut partes lubiles vola-  
les horum medicamentorum sese Oesophago  
immiscendo, eundem moveant & fluxiliorem  
reddant materiam ibidem stagnantem, canalicu-  
los Oesophagi aperiant, & fibrillas stuant ad

ejectionem materiam noxiam, quæ postmodum  
ipsa cum saliva exspuntur, & Tumor evacuata  
materia dissendente valde immuitur. Liquida  
remedia hic eligenda sunt, & ut plurimum vo-  
latilia. Externè conducunt suffumigia varia ex  
olebano, mastic. aliisque herbis & floribus aro-  
maticis parata, & semper fumus ore excipitur.  
Omni enim ope annitendum, ut tumor discu-  
tatur, hinc conducunt varia volatilia & aroma-  
tica externè illita, ut  $\frac{1}{2}$  Regni Hungar. Spir. la-  
vendul. lumbrior. insul. arthrit. &c.

Quoad Chirurgicalia auxilia, omnium primum  
V. S. habetur, quatenus feliciter remorantem &  
opplentem causam humore gravidam expedit,  
& stagnanti sanguini & succis tumorem Oeso-  
phagi producentibus motum debitum restituit.  
Venæsectione namque in educta locum trans-  
fertur sanguis vicinior. atque factio sic univervo  
sanguini spatio amphior. expeditioni discurret  
motu; unde & ille, qui prius in vasis suis stagnans  
substitebat, nunc sublata copia stagnantis  
sanguinis, & succorum motum recipit, & ob-  
structiones refert, hinc in Oesophagi glandu-  
larum obstructione, tumoreve carnosarum in-  
terioris tunice fibrarum contractione, ex acidi  
acerbi affluentia orta, Expertissimus D. Nuck  
cum Cl. D. *Sieffart van der VViel* cum succel-  
su V. S. his adhibuerunt in Matrona nobili. quam  
& adhibitis similis syrupis & gargarismatibus  
brevis ab ejusmodi tumore liberarunt. Vide *Stal-  
part. Obs. rarior. Cens. post Obs. 27.* Si vero venæ-  
sectio cum D. *Bontekoe* & D. *Ghehenâ* dupli-  
ceat, frictiones instum possint in collo, ut cutis  
canaliculi aperiantur, succi stagnantes moveantur,  
& sic motus ipsorum promoveatur, sic nempe  
collum aspersiori panno spiritu quodam im-  
buto, vel gummi anime fucato fricetur. Huc  
pertinet instrumenti in Oesophagum immisso,  
imprimis os balneæ flexile, variis medicamentis  
illitum.

*Angustiam* Oesophagi quod attinet, si illa *Angustia*.  
oriatur à caruncula ibidem existente, affectus hic  
est incurabilis, cum illam eximere nequeant Chi-  
rurgi, Oesophagotomia verò non planè respici-  
enda est, imprimis in angina externa, cum hæc  
operatio tantæ periclitationi non sit obnoxia uti  
laryngotomia, præsertim si rei illius spicula  
tantâ faucibus contumaciâ inhæterent, ut ad il-  
la evellenda omnia instrumenta (quorum di-  
versa huic operationi destinata possunt ac re-  
media in callum adhererentur, quamvis ne qui-  
dem ad hoc nisi exhausto prius reliquarum cau-  
telarum fonte, prudenti Medico sit confugien-  
dum. Hic vero optime noisse debet fibrillas lon-  
gitudinales & circulares, ne penitus abscondan-  
tur. aliâ pars officio suo amplius fungi nequit,  
cum non in casu desperato, ubi alius remediis  
nullum unpertrati potest juvenem, & mors præ-  
sonibus adit, eandem tentari posse licitum vi-  
deatur. Si res improvide deglutita hæreant in  
gula, ibidemque angustiam efficiant, illæ renovo-  
vendæ sunt vel excitato vomitu & irritatis fibris  
hiscæ efficiendæ, vel instrumento eximendæ sunt,  
vel in ventriculum porro protrudendæ, cui ope-  
rationi inservit instrumentum *Vvillstii Pharm-  
rational. part. 1. p. 54. aut Hildum Cens. Obs. 31.*  
& cura hæc pro re infixa figuræ diversitate va-  
rianda est, deinde varia de vulsionibus danda, laxan-  
tibus intermixtis, ut ita foras eliminentur. Si  
gula angustia ab osticulo deglutito & gula in-





riores & exteriores distinctis, utrisque undecim numero & ita constitutis, ut interiores à superiori & interiori costæ cuiusque parte, à posterioribus ad anteriorem oblique ascendentes, inferiori cuiusque costæ superioris lateri inferantur, exteriores vero interioribus superiacentes, à parte inferiori & exteriori cuiusque costæ superioris enati oblique ateriorum parti superiori & exteriori cuiusque costæ inferioris implantentur, & hoc modo fibræ musculorum exteriorum fibras interiorum crucis seu literæ X formâ transversim secant, & à musculis hinc pectoris cavitas augeatur & costæ sursum ducuntur, sicque sibi invicem fibrarum opemagis approximant. Sunt præterea alii quidam muscoli, quibus intercostales substernuntur, quorum nomina sunt Saccolumbus, Triangularis, Serratus maior, Subclavius, Serratus minor, superior, & Serratus minor inferior, quorum structuras & usus hic plumbistrachæ non permittit Instituti nostri ratio; sufficiat hæc pro partis affectu meliori cognitione panis indigisse, & observasse, musculos hos potissimum cum cute exteriori & pleurâ interiori in Vulneribus & Fistulis lædi, & interdum plura vel pauciora vasa intercostalia & thoracica simul dilacerari, unde ipsa hæmorrhagia emanat.

*Diagnosis.*

§. 3. Quoniam verò ipsa Vulnera quoad externam præcipue faciem in sensus incurrunt, inaneque lacerari operam, si recensendis Signis Diagnosticis duntius immorari vellem; quod verò ipsorum interiore concernit conditionem, scum & magnitudinem, ea non nisi sagaci conjectura & accurato Medici iudicio innoscere poterunt, siquidem non semper facile iudicatu sit, quæ partes internæ vulnerata sint, & quousque vulnus penetraverit, cum tale scrutinium scientiâ Anatomicâ & diligenti partium actionum lætaram, nec non excretorum examine nitatur, & hoc potest nostro Thoracis vulnere demonstrari. Si enim sanguis cum tussi rejicitur, & aerè vulnere progreditur, certiores reddimur, & instrumentum in Thoracis cavitate penetrasse. ipsosque pulmones cum vase sanguifero perfodisse, vel Fistulam adeò sinuosam & profundam esse, ut in cavitate Thoracis delinatur; adeo & suffocatio, anxietas febris, dolor, pectoris inflammatio & tandem mors. Rectè in hanc rem *Barbette*: Ex Anatomia sciendum est, 1. quis partis cuiusque situs, 2. quis usus, 3. Symptomata consideranda, 4. eorum, quæ per vulnus eiciuntur, conditio notanda. Certum enim est, si pulmo vel pectus ob musculos respiratori dicatur vulnus accipiat, spirandi difficultas adeo; sanguis effluxit ex ore spirans, ex plaga ruber, sinulque etiam spiritus cum sono fertur, in vulnus inclinari juvat, quidam absque ratione coniungunt, multi in ipsum vulnus inclinati loquuntur, in aliam partem obmutescunt; Si spatiosa ac amplalaxitas est, paucus sanguis ex plaga spumans evacuat, cum non est, ore magis per vomitum redditur, cervicis vasa attolluntur, lingua alium colorem assumit, & multum spiritus attrahunt ægri, frigida appetentes, & si diuturnus sit morbus, tum febris, tum marcor hominem conficit. Vulnera Thoracis quæ spiritus dissipant, & ita humorum inferunt coagulationem, aut sanguinis largiorem profusionem, uti sit, quando vel vena, vel arteria prope cor læditur, absolute sunt lethalia, quando respira-

tionem subito tollunt, quod contingit, si ipsi pulmones aut aspera arteria fuerint dillecti, ægri suffocari intereunt.

*Fistula Thoracis* quoad externam faciem in sensus nostros facile incurrunt, & ex sinuoso anfractu apparent; quale fistulosum ulcus habet civis quidam hujus civitatis, inter tertium & quartam costam, ex quo jam per annum magna quantitas purulenta emanavit materiam, adhucque manat, & si candela admovetur fistulæ, illa extinguitur; respiratio ipsi valde est difficilis, ex respirazione autem læsa cognoscitur pulmones esse laxos, & si vulnus in pectoris cavitate penetrat, aerè vulnere profluit. Haud absimile casum vidi Hanoviz in discipulo Francconico, post morbum abscessu laborante sub brachio inter secundam & tertiam costam, ex quo per mensem ultra viginti libras materia effluxit purulenta, & æger in totum emaciatus fuit, sed tamen nostrâ ope, Deo adjuvante, pulsatæ restitutus fuit sanitati. Rarum est, quod Minder hæc in vicinâ in infante nondum tertium annum egreisso, & adhuc lactante, non ita pridem observavit Medicus *Tetlmeyer* dictus: infans ab initio tussi sicca vexatus, eiciebat postea materiam purulentam ac fetidam, apparebat inter quintam & sextam costam finitri lateris tumor, qui adhibitis variis emollientibus rumpebatur, & ex eo cum materia purulenta simul prodibat spica, (sic *Sternor*) recens, ac si modo ex horreo fuerit desumpta; injiciebantur per syringam varia decocta vulneraria, & cæterum vulnus, a tractabatur, sed cum aer intus contentus cum impetu egrediretur, & aer externus nimis frigidus ingrederetur, elapso octiduo infans defunctus est.

§. 4. *Galenici* ad Causas Thoracis Vulneris referunt omne id, quo unitas cutis, carnis musculosæ, & membranae carnosæ medi hujus ventris dissolvitur, sive per sectionem simplicem, sive cum contusione id contingat, quo referunt varia telorum genera, gladios, cultros, scalpellos, ferrum candens, lapidem, lignum, glandem, plumbeam aut ferream, & quicquid incidendi, lacerandi, frangendi, pertundendi & contundendi vi prædictum est, sive ex improvviso, sive cum studio parti huic inferatur, & hoc vel violenta manu & animo hostili, vel ex arte & intentione bonâ, dum Chirurgus pro educendo pure in empyemate partem hanc aperit, à quibus aliquando superfoeteneus tantum læditur, interdum verò tam profundè, ut vulnus in ipsam penetret cavitatem, & contenta in ea viscera simul afficiat.

*Fistularum* causis inferuntur humores pravos profundis erodentes, tum ipsam in vulneribus aut ulceribus ob negligentia Chirurgi corruptum, unde acrimonia sua angustiores & profundiores sinus effodiat.

§. 5. *Paracelsus* peculiaries Vulnerum causas in hac parte nullatenus constituit, sed à præcedentibus indicatas absque ulla mota controversia libens admittit. *Fistulas* vero ortum habere asserit ab aluminum cum nutrimentis in partibus Thoracis resolutione, quæ locum suum inclusum appetant & putresciant, non tamen corrodant, quoniam dulcedine polleant, postquam verò oculatum ejusmodi putrefactionem fecerint, aut in lacum extenderint, spiraculum sibi met parent, non alia de causa, quam ad respirationem.

§. 6. *Helmontius* eandem continui solutio- *Helmontii*  
hæc

*Ætiologia*  
secundum  
*Galenicos*  
ipsius *Thora-*  
*cis* Vul-  
*neris*.

*Paracelsi*  
opinio de  
causâ vul-  
nerum &  
*Fistularum*

de causa  
Vuln. & Fistula-  
rum originis

nem in *Vulneribus* è variis instrumentis produci agnoscit. & *Fistulam* à latice in *vulneribus* corrupto, oriri existimat, unionem non modo impediens, sed à profundius perforante, ipsum quoque *Aetheum* ad novæ tunicæ fabricacionem, quia cavitatis illa obducitur, leducens.

Secundum  
Vuln. & Fistula-  
rum causam  
causa Vul-  
nerum &  
Fistularum

§. 7. *Vilissimas* res acutas externas violenter continuum solventes in *Vulneribus* ut causas admittit, & *Fistulas* à succo nutritio & nervoso corruptis, in materiam purulentam acrem conversis, acrimoniâ suâ partes Thoracis profundius perforantibus oriri credit, callum verò sinuosum à particulis terrestribus tum partium membranarum destructuram, tum humorum corruptorum existimat coagulari.

Iuxta Syl-  
vium cau-  
sam Thoracis  
Vuln. & Fis-  
tula-  
rum.

§. 8. *Sylvius* quoque *Valerium* Thoracis causam agnoscit continui solutionem à re externa inductam. *Fistulas* etiam vulnera insequi docet, dum humores salis muriatici, aut acidi acres partes molles, vel etiam membranaceas corrodant & excedant, à quibus simul partes cutaneæ perfodiuntur.

Cartesii  
norum ju-  
dictum de  
causa Tho-  
racis Vul-  
nerum &  
Fistula-  
rum.

§. 9. *Cartesii* quoque *Vulnerum* causas unanimum cum reliquis fovit consensum. *Fistularum* causam imputant particulis acutissimis aliquantum stratis & subtilissimis, quæ fibrillis inherendo ad materiam ætheream agitate easdem corrodant, interstitia tubulorum perterebrant, sicque ad vicina reptando, destructis fibrillis pluribus tubulis angustioribus unum latius efficiant, & succos corruptant, quo fiat, ut & hi ascensentes cum calidius fibrarum coeant, & à particulis subtilioribus ad circumferentiam repulsi, destituti particulis volutilioribus & porolioribus ob particulas angustas ad motum valde exilant inepti, donec tandem totaliter quiescant, atque hoc modo angulis & aliis suis superficiebus invicem variè junctis obrescant, & hinc sibi fixius adherentes callosam constituunt tunicam fistularem istam cavitatem firmâ suâ contiguitate servantem, & succum chylosum & glutinosum coercentem, ne patietes invicem jungan- tur & agglutinentur.

Notra-  
ventia de  
causa Tho-  
racis Vul-  
nerum,

§. 10. Ex *notra* sententia Thoracis *Vulnerum* causa proxima est uti aliarum partium vulnerum, continui nempe solutio, seu divisio unitatis in parte Thoracis facta à vi externa. Itaque omnia illa, quæ sunt acuta, dura ac rigida, quæque vim habent incidendi, contundendi, perforandi & urendi, merito sub causarum medietatum nomine veniunt, ut sunt gladius, globi sclopetorum, sagittæ, acus, culter, hæstæ, dentes animalium, ferrum candens, aliaque innumera, quibus thorax transditi potest aut dilacerari.

Fistularum

*Fistulae* sunt ab acredine corrosivâ absumente, & sæpe ex nutrimento proprio corrupto, & una cum lymphâ, vel sanguine, vel succo nerveo infecto, & acido corrosivo reddito, à quo oriuntur sanies, pus & sordes, fibrillis enim disseis & corruptis exstillant humores, qui in sanem abeunt continuo effluentem. Si ergo ipsa sanies per interstitia muscularum pectoris seu thoracis latus serpit & partes molles cum laminibus duris exedit, ulcera sinuosa & vaginosa infert, quorum officina aut etiam canales in locis membranis & nervis indurantur, & in callum quasi osseum transmutantur, unde dein fistula & ulcera fistulosa suam trahunt originem.

Prognosi  
Vuln. & Fis-  
tula-  
rum

§. 11. In *Prognosi* formanda nonnullæ regulæ experientia & rationibus sanctæ annotandæ ve-

niunt. *Vulnera* quæ majora vasa pulmonum, vel cordis, vel pericardium ita, ut aqua effluat, lædunt, semper sunt lethalia; in pulmonibus enim quando ramus quidam magnus læditur, mors præ fortibus est. Si plus aeris ex vulnere quam aspera arteria egreditur, habetur lethale. Sic & vulnera cordis absolute sunt lethalia, qualia sæpe observantur. Ita Princeps Churlandæ in obfessione Budensi in Thorace globulo sclopeti læsus mortuus est. In milite Lmburgensi idem observavi, qui à globulo in duobus lobis pulmonum læsus, in ipso tamen lobo majora vasa fuerant discissa, quam in altero, hinc uno lobo curato, altero verò sphacelato desinuit esse. Sic & ille D. *Ruyff* / cuius fecimus mentionem in *Misc. curios.* Decur. i. Obf. per cor ente perfusus statim animam exhalavit. Si ergo in *Vulnere* Thoracis sanguis spumulosus cum tussi rejicitur, & aer è vulnere foras progreditur, pessimum est, denotat enim pulmones cum vase sanguifero læsos esse. Sic vulnera in Thorace punctim inflicta, plus alunt periculi, quam cæcis facta.

*Vulnera* Thoracis lateralia periculosa sunt, quam anteriora à tergo inflicta, plus inferunt periculi, quam à parte sterni, nam lateralia quamvis sint superficialia, periosum facile in consensum trahunt, hunc inflammatio, pleuritis, &c. *Vulnera* quoque priora spinali medulla, eo periculosa. *Vulnera* Diaphragmatis in carnosa parte sunt periculosa, sanantur tamen aliquando, si verò membranosa ejus pars fuerit læsa, lethale est, quia inde producit febris & delirium, unde mors. Convulsio in vulneribus Thoracis perniciosa est, denotat enim spiritus, seu humores tenuissimos esse nimis acres. Si vulnera hæc cum intensa febre, inflammatione & dolore sunt, malum est. *Vulnera* hæc quoque diutius ære exponuntur, eo redduntur deteriora. *Vulnera* à sclopeto inflicta plus damni inferunt, quam alia. Si *Vulnera* pectoris penetrant in dorsum, ut plurimum sunt periculosa, & ægri circa diem 7. n. 14. moriuntur, propter superveniens *Erysipelas*. Si verò vulnus penetrans per pulmones, nisi majora vasa fuerint læsa, spes est sanationis, abit enim in abscessum sæpe sanabilem. Sunt itaque omnia Thoracis vulnera periculosa, multosque viventium consortio valedicere coegerunt, ac in aliis phthisin excitant ipsa morte aliquando pejorem, mortis enim habet vires, lentè cum trahitur vita gementibus. In *Empyemate* & *Asthmate* vulnera pectoris fuisse anchoram salutis, testatur historia *Clariss. Dui. Myr.*

*Fistula* ut omnium partium, sic imprimis Thoracis, sunt periculosa, imprimis antiquæ, profunda, & anfractuosa. Quæ usque ad pulmones tendunt, eo pus acre acidum ibidem congestum, facile viscera illa Thoracis afficiuntur. In corpore senili & infirmo mortem accelerant, imprimis ubi aer è fistula exit.

§. 12. Quanti sit momenti *Dieta* in cura vulnerum, de hoc consulatur Chirurgi experti, constat enim, ægros in victu vel potu excedentes ex vulneribus simplicibus incidisse in vulnera lethalia. *Vulnus* ergo quo levius & simplicius, eo largius alimentum concedendum, contra quo gravius, gravioraque adiunt symptomata, præstat potius tenuissimus victus, avenacea, jus carniū, pullorum gallinaceorum, decoctum parietarum. Exulent omnino acida acra, quia

Nn 2

quia

quia non tantum coagulant humores, sed eosdem etiam pervertant. *Potus* sit cerevisia tenuis cum rasur. C. C. vel decoctum hordei cum pafulis, & liquoris, aliisque herbis vulnerariis paratum, ne tamen in tanta copia exhauriantur, uti Chirurgi hodierno tempore assolent propinare. Vinum acidum asperum & omnia quae pectori sunt inimica, vitentur. Aer frigidus ob acidum nitrosum asperius ceu pestis fugiendus & quocumque modo à vulnere arcendus. Motus nimis fugiatur, sed quies sanat. Vitet æger animi pathemata excedere, imprimis iram, etenim propter solam iram vulnus redditur lethale, quia humores redduntur aciores, & motus eorum ordinarius perturbatur.

Curatio  
secundum  
Galenicos  
Thoracis  
Vulnere.

§. 13. *Curationem* Pharmacæutico-Chirurgicam in *Vulneribus* aggrediuntur *Galenici* his: eam remediis, quibus reliqua vulnera curari solent, nihil singulare observantes, nisi solum partes musculosas occupant, quando verò ad interiora penetrant, summo studio ipsa advertunt symptomata, maxime tamen sanguinis fluxum nimium ex dissecis venis & arteriis, tum respirandi difficultatem à sanguine effusio pulmones obruente inductam. Ipsi sanguinis profluvio occurrunt laetore eisdem effusione per venam dissecatam in utroque cubito, cucurbitularum & vinculo- rum applicationem, repetitas fisiones venarum & arteriarum dissecatarum obturationem, adhibitis earum orificiis medicamentis adstringentibus & obstruentibus ex aloë, thure, succo acaciae, terr. sigill. bol. armen. cum albumine ovi in linimentum redactis, & linteolis carptis exceptis. Respirandi difficultatem & gravem anhelum facilitare conantur, ipsi sanguinem in cavitate contentum, & pulmones obruentem evacuando per vulnus scalpello sufficienter dilatatum, super quo ægrotatum rite collocant, ut ita pulmones ipsi distensi eundem commodè expellant, & ut hoc citius procedat, ægrum iubent tussire. Sanguinem etiam copiosorem una vice non evacuandum esse monent, sed pluribus, interjecto aliquo inter easdem intervallo. Si jam sit concretus, & in grumos conversus, & propterea commodè nequeat evocari, eundem polca propinata, aut pulvere mumie, aut sanguinis hædini exhibitio prius dissolvunt. Supervenientem inflammationem & febrem arcent remediis sanguinis intemperiem calidam refrigerantibus, decocto hordei, cum fol. plantag. acetos. portulac. in humorum calidorum abundantia sanguinem per venam sectam emittunt, deinde portem vulneratam, ne fluxiones ulterius suscipiat, vel oleo rosaceo omphacino, aut myrrhino inungunt, quibus aliquando pulverem boli Armeniæ admiscunt, vel foveant cum spongia expressa ex vino rubro adstringente, in quo rosæ rubræ, balaustræ, sumach, aut myrtilli bullient, vel emplastrum diachalciteo oleo myrrhino malaxatum & super alutâ extensum imponunt, & post tempus aliquod adstringentibus admiscunt aliquantulum relaxantia & digerentia, qualia sunt farina fœnig. hord. sem. lin. fol. alth. melilot. chamomill. aneth. axung. gallin. anserinæ. Ablatis hoc modo symptomatis, ipsi vulnere postmodum omnem curam impendunt, cujus unitatem restituere tentant, si nulla sanie aut pure sit infectum, per medicamenta adstringentia & siccantia, quibus simul partes internæ laceratæ aut aliter læsæ sanantur, & quæ confici-

untur ex herbis & radicibus pilosellæ, saniculæ, caryophyllatæ, tormentill. consolid. maj. rub. tinct. centaur. aristol. veron. caud. equin. ex quibus cum aqua parari possunt decocta, quibus adduntur pulveres de terr. sigill. myrrh. mum. & Syrupi de rosis ficcis, myrrhin. de Symphyt. vel eadem simplicia una cum pane coquant in iure carniarum quod ad alendum ægrum exhibent. Ex simili quoque decocto modicè calido, additis aloë & sarcocolla, injectiones instituunt per syringam, ut facilius ad partes perveniat. Vulnere vero existente sordido & purulento, illud prius detergent & repurgant vel mulsæ, vel decocto hordei, hyssopi, calamenth. aristoloch. & equiset. in aqua simplici, vel pro validiori deterfione in lixivio, aut vino. nisi inflammatio hoc prohibeat, parato, addito aliquando melle rosaceo, quod factò, & pauco interlapso temporis spatio ipsum ægrum super vulnus apertum collocant, pro faciliiori sordium effluxu, & ne eadem in ipsam thoracis cavitatem stillent, & viscera ibidem contenta inficiant, quas validius etiam detergent unguento linamentis filo alligatis excepto & inposito, ne in cavitatem decendant. Vulnere sic repurgato. & parte in naturalem temperiem reducâ, unitatem promoveant carnis amillâ factâ restitutione per medicamenta siccantia, qualia sunt. oleum hyperici, aut abietinum linamentis exceptum & vulnere immisum, vel resina terebinthina cum pulvere thuris, aloes, myrrhæ, sarcocollæ, nec non unguentum basilic. vel de matrisylvâ, tum emplastrum diapalm. vel de gummi. elem. externè imponunt & tandem vulnus cicatrice claudunt.

*Fistulas* non abnili ratione tractare solent, ut ipsa vulnera, sedulo tamen observantes, ut callus abluatur, & eoq. adempto ulcus consolidari queat. Immittunt ergo fistulæ radicem seseli vel spondilii, vel aristol. rotund. vel geratiani. quibus callum consumi credunt, vel si remedia hæc nimis sint debilia, & fistulæ tortuosæ sint, aut multiplices, ex *Clistefatto* majus in manu, quam in medicamentis prædicunt quærent, quare fistulæ subcutaneæ specillum infinuant, & supra id eandem incidunt, explorando omnes ejus rivulos. ut simul incendantur, usque ad fistulæ finem. tum callum excindunt, & fistulas injiciunt, superimposito medicamento glutinante. Fistulas autem super costas cunctibus, costam ab utraque parte in loco fistulæ præcidunt, & corruptum omne eximunt, ne quid relinquantur, & pro meliore purgatione linimenta in melle tincta imponunt, vel herbam matrisylvam pulverisatam in vino ad tertias coctam injiciunt, aut linimenta imponenda eodem solent imbueri. Ne verò abundantia humorum peccantium curationem reddat difficilem, ægrotum purgant syrupo rosat. ex multiplici infus. vel pilulis aggregativis, vel sequenti aut simili decocto.

§. Rad. enul.

scabios. 2a. 3j.

Polypod. querc. 3ij.

Glycerhiz. 3ib.

Herb. Hyssop.

Marrub.

Capill. Ven. 2a. Mj.

fol. fen. 3vj.

agar. trochiscat. 3ij.

epithym. 3b.

passa-



# CAP. VI. DE THORACIS VULNERIB. & FISTULIS. 285

passular. enucleatar. & contus. P. iij.  
Cogn. in aq. commun. lbij. ad remanent.  
lbij.

Colentur forti expressione, & Colatur. add.  
vel

Mell. commun. 3vj. & ad despumationem  
pariter ebulliant; vel

Syrup. de Capill. ven. 3iij.

De hoc decocto fumantur quovis mane 3iij. vel  
iij. Hoc ablumto alia propinant decocta pecto-  
ralia & vulneraria, & in specie sequens.

℞. Herd. mundat. & contus.

passular. mund. contus. aa. P. iij.

Rad. iussilag.

bugloss. aa. 3ß.

Glycerhiz. raf. 3ij.

fol. Peron.

scabios.

Card. bened. aa. Mj.

sem. anif. 3j.

Ingubar. No. xv.

Cogn. in aq. simpl. q. l. ad lbvj.

in quibus dissolv.

Syrup. rosat. simpl.

de 2. radicib. ad 3iij.

add. cinamom. 3j.

F. Apozema, de quo uncialiquot quo-  
tidie altuantur. Commendantur quoque à qui-  
busdam decoctum ligni Guaiaci cum corticibus  
ejusdem. Ipsi postmodum fistulas imponunt  
emplastrum nigrum, vel ceratum ex lithargyr. &  
cerul' in oleo commun. ad debitam consisten-  
tiam coctis, quod lineo vel alutæ su. etindu-  
ctum adhibent, usque ad perfectam, si obtineri  
potest, sanationem.

Paracelsi  
cura in  
Vulneribus  
§. 14. Paracelsus ad Vulnerum horum facilitio-  
rum sanationem nihil adeo commendat, quam  
defensionem, ne quid foris eadem ingrediatur,  
tum enim naturam curationem optime præstitu-  
tum esse pronuntiat, si vel solus balsamus mumia,  
vel spiritus auri intus exhibentur, ad incarnationem  
citiùs impetrandam; externè verò empla-  
strum opoteldoch curationem absoluturum  
conficit.

Fistula, de vulnere si sit provocata, ad eandem  
solam omnem curationem vult dirigendam, ita  
ut ab ipso vulnere etiam planè digrediarur Chi-  
rurgus, & ea adhibeat remedia, quæ fistulas ab-  
sumunt, potiones nempe internas, & ablutiones  
externas per destillatum & aquam mercurialem,  
prout de fistulis in genere pluribus indicabit.

Helmonti-  
ana cu-  
ratio  
§. 15. Helmontius nulla peculiaria in partus hu-  
jus Vulneribus & Fistulis suadet remedia, sed ea-  
dem adhibet, quæ morbis istis in genere conve-  
niunt, & alibi sufficienter à nobis indicabuntur.

Willisii  
curatio  
Thoracis  
Vuln. §. 16. Willisius in Thoracis Vulneribus tum su-  
perficariis, tum in cavitatem penetrantibus &  
pulmones lædentibus. pectoralia adhibet & vul-  
neraria, quibus ligna etiam sunt intermixta,  
quorum formulam sequens præbeat exemplar.

℞. Rad. Pentaphyll.

Cherfol. aa. 3j.

Chim. 3ß.

Herb. sanicul.

veron.

eupator.

tussilag.

pilosell. aa. Mj.

Lign. Guajac. cal. 3j.

Passular. 3x.

sem. bombac. 3vj.

Cogn. in aq. font. ad medietatem,

F. Apozema, edulcorandum Syrup. de  
Symphy. vel de Pilosella.

Magno quoque in pretio habet pulveres ex co-  
rall. pp. ocul. 35 flor. 3is, C. C. pp. & simili-  
bus, uti & Tincturam 3is Balsam. de Peruv. & c.  
Ipsum vulnus non prius conglutinat, quam san-  
guis evalatus & in thoracis cavitatem contentus  
effluxerit, partes contusas digestivo in pus redi-  
git, hinc abstergit, mundat & inposito empla-  
stro styptico finit coalescere.

In Fistulis cum aliis urget, ut callus absuma-  
tur unguento Aegyptiaco cum 3io dulce. & si  
opus ea sit. incisionem peragit, tum ulcus variis  
injectionibus ex decocto nicotianæ, & rad. ari-  
stol. rotund. cum succis centaur. apii, vel deco-  
cto calc. viv. mundat, & turundis ex melle in-  
spissato cum thure. myrrhâ, sarcocoll. alum. ustâ  
exsiccat, tandem ut aliud quoddam ulcus dispo-  
nit ad consolidationem.

§. 17. Sylvius in Vulneribus hisce approbat sylvii mo-  
de decocta pectoralia ex histort. tussilag. veron.  
botr. & similibus cum pulvet ex 3io diaphore-  
tico & oculis 35. Externè linimenta ex melle ro-  
sar. cum inastiche, aloë & myrrh. quibus præ-  
missis usque ad consolidationem emplastra sty-  
ptica suadet imponenda.

Fistula, si callus spiritu vitrioli melli mixto  
fuerit absumptus. instillat balsamum 3is anisa-  
tum, quibus non modo probè mundari promit-  
tit, sed perfectè quoque sanari.

§. 18. Cartesius in curatione Vulnerum Tho-  
racis secundum rationem & cum salute ægro-  
rum prudenter administranda, opera præcipua  
eò dirigitur, ut succi per diupta vasa & tubu-  
los in locum partis dissolutæ confluentes per  
remedia convenientia, & æcis externi tempera-  
tionem, aut à vulnere coercionem ita præser-  
ventur, ne quid particularum acutarum corrup-  
tæ admittant, quo fibra partium solidaru-  
rum exedantur, rumpantur, & redunioni fibra-  
rum se junctarum, mediante succo nutritivo glu-  
tinoso perficiendæ, obex ponatur. Eapropter,  
quàm citissimè fieri potest, in thoracis aliqua  
parte vulnerata hujusmodi propinant mixturâ.

℞. Aq. Card. bened. 3j.

alchmill.

tormentill. aa. 3ß.

oc. 35 pulveris. 3ij.

lap. ceratis. 3ß.

myrrh. elect.

bezard. min. aa. 3ß.

sacch. canib. alb. 3iij.

M. D. coctileatim.

Interea ne quid omitatur forissecus adhiben-  
dum, in spiritu vini camphorato dissolvunt The-  
riacam, & aliquid salis Card. bened. eoque lineæ  
imbuunt quadruplicata vulnere calidè imponen-  
da. Absumpta priori portione, ut spiritus con-  
servetur & hæmorrhagia nimia vel præcavea-  
tur, vel si ea jam dominetur, quantum possibile,  
inhibeat, ægroto sequentem exhibent mix-  
turam.

℞. Aq. burf. pastor. 3iß.

fol. renell. querc. 3j.

typhor. Cerv. 3iß.

Tinctur. bezoard. 3iij.

Aq. Osi 3iß.

Syrup. de Tormentill.

Corall. aa. 3vi.

No 3

M. de



M. deur coheleatim singulis horis. Parti vulneratæ parcere quidem conantur, ne vulnus studio ampliarent, & fibrarum majorem intintuant dissolutionem, insciendo per syringem Spir. vin. camphoratum, essent. hyperic. & spiritui lumbricor. commistum, sed si fibræ quædam tubulorum & musculorum contusione dissolutorum prominent, & succi cum nutrimento partium corrupti in ipsi hæreant interstitiis, in inatiam purulentam propter acidum corumpens abeunt, vultus autem existat angustius, quam ut puri & saniei exitum permittat, illud scalpello aut lancetta dilatari jubent, & vulneranda ex radice gentiane ita paratâ, ut in hinc capitulo quodam ant. ansula sit donata, ne in thoracem prolatabatur, apertum servant, insuper ipsam turundam illinunt linimento ex melle, terebinthinâ & paucula parte gii compo-  
posito, pro faciliori fibrarum contularum separatione & suppuratione promovenda. In ipsam vero thoracis cavitatem si plus materia destillet, quam extracta turundâ extra thoracem effluat, & cras copiosius in eodem hæreat, diaphoretica exhibent & diuretica traumaticis eleganter commixta, quemadmodum è sequentibus constat mixturis.

- ℞. *Aq. chærefol.* ʒij.  
*Alchimill.* ʒi.  
*ʒii diaphoret.* ʒiiss.  
*Ebor. s.* Δ. ʒi.  
*ʒii xci depurat.* ʒss.  
*Syrup. de scord. simpl.* ʒi.  
*M.*
- ℞. *Aq. Caprifol.*  
*Vern.* aa. ʒij.  
*Tinctur. Hyperic.* ʒiij.  
*myrrh.* ʒij.  
*Spir. lumbric. essentificat.* ʒj.  
*Syr. Heder.* ʒi.  
*M.*
- ℞. *Aq. Tussilag.* ʒiiss.  
*mellefl.* ʒi.  
*Tinctur. flor. bellid.* ʒiij.  
*Spr. ʒr. valde dulcificat.* ʒi.  
*Syr. rub. Id.*  
*boliv.* aa. ʒss.  
*M.*

Evacuato pure, atque ex eupnoeâ & absëntia doloris pleurici, nec non mutato colore urinx, à rubedine ad flavedinem accedente, de materæ cruentæ & purulentæ, tum per transpirationem, tum diuresin egestionem, & reliquorum succorum correctione, quatenus loco particularum acutarum, salibus volatilibus benignis præditi sunt, certiores reddit, vulnus mundavit & abluunt, primo spiritu vini camphorato, cui essentia ex electuar. Diafco. parata sit immixta, deinde succo millefolii, in quo myrrhæ & aloë macerata fuerunt, hinc balsama instillant, nempe vel balsamum momordicæ, vel peruvianum, vel Hypericonis, & simul emplastrum ex balsamo hpc. Sato, nempe dum flores ʒis in oleo Hyperici expresso bullierunt, additis cerâ, terebinth. oliban. myrrh. & terr. ʒli dulc. impo-  
nunt. Ab his perfectam sperant sanationem, modo ipsum cor non fuerit transfolium; quæ sanatio ut felicius procedat, etiam decocta vulneraria & pe. thoracis, imprimis si pulmones simul læsi fuerint, coheleatim propinant, eaque parant ex herb. & flor. tussilag. pulmonar. maculos. alchy-

mill. bugul. pyrol. fanicul. rad. tormentill. aristol. rotund. pimpinell. linguisorb. astacis & similibus. Cerevisiæ quoque instillant Tincturam rosar. Hyper. bellid. essent. cancer. aliosque liquores traumaticos. In virium defectu sequentem extollunt mixturam.

- ℞. *Aq. bugloss.* ʒi.  
*mellefl.* ʒvj.  
*cinamom. cydoniat.*  
*myrrh.* aa. ʒss.  
*Gelatin. C. C.* ʒiij.  
*Tinctur. bezoard.* ʒij.  
*Spir. ceras. nigr.* ʒij.  
*rosar.* ʒj.  
*Syrup. Corall.* ʒj.  
*M.*

Cui formula placet electuarii, ei sequens solent præscribere.

- ℞. *Conserv. Pulmonar.* ʒss.  
*tormentill.* ʒiij.  
*Elect. diafco.* ʒij.  
*Lap. cerat.* ʒij.  
*Margarit. pp.* ʒss.  
*myrrh.* ʒj.  
*Sp. Vin. camphorat.* gt. xvj.  
*Syrup. simplici.* q. l.  
*F. Electuarium.*

Sumatur nucis avellanæ majoris quantitas, manè meridie & vespere.

*Fistula Thoracis* callo obturatis hoc modo *curam* accommodant, ut absumto callo per liquorem mellis abstractum *Ang. Sal.* quo radicem rad. aristol. rotund. vel gentian. imbunt, viam parent aliis liquoribus per syphunculum injiciendis, liquori nempe ex scor. reguli ʒii, velaquæ ʒss, cum Sp. vini, quibus probe mundantur, & succi acres corriguntur, dum particule angulares & lanceolatae absorbentur & hebetantur, liquoribus vero nervino & chyloso nutritio non modò necessarius paratur influxus, sed iidem quoque incorrupti asservantur, ut *Fistula* eorundem oppletionem & agglutinationem fibrarum debite consolidentur. *Fistulis* profundioribus & multiplicibus ex *suasu Barbettes* cannulam intrudi permittunt subcurvam, quâ profunditas earum exploretur, atque per eam acus figurâ cannulæ respondens & filum sericeum ducens trajicitur, in fundo fistulæ cutis acn. perfoditur, hinc acu & cannulâ demissis, fili fines conne. xuntur, & filum exedentibus illinitur, ad callositatis absumptionem. Incisione si opus sit, instrumento commodo eandem volunt instituendam, tum *Fistula* probe abluitur Sp. Vini camphorato, vel aqua balsamica *Queret.* hinc balsamum indunt lithargyri terebinthinatum, donec *Fistula* sanationem admittere videantur, quam proseguuntur sequenti balsamo D. le *Mort.* fistulis frequentius instillando, simul interne vulnerariis usurpatis.

- ℞. *fol. Hyperic. cum floribus tenuioribus,* repomantur in s. q. d. terebinth. macerentur loco calido per tres dies; dein recutia adhuc folia & flores oleo à precedentibus expresso repomantur denovo per tres dies; & eodem modo ter procedatur adhuc. Dein oleum rinctum, aqua superfundatur. Evaporetur oleum mediante coctione, donec residet balsamum unctuosum & crassum, ad instar sanguinis rubicundum.

§. 19. *Nost. r. n. consilium est, ut Chirurgus ita* *Nost. me-  
tim. thodum me.*

# CAP. VI. DE THORACIS VULNERIB. & FISTULIS. 287

de dendi Tho-  
racis vul-  
neri.

tim ad vulneratum in Thorace vocatus inquit, num vas aliquod magnum laesum fuerit, tum enim statim sanguinem eliciat, iubendo a grum parti vulnerate incumbere, os & nares constringendo, quo facilius sanguis expellatur. Quidam Venae sectionem commendant, ad dentes, quod pars haec sit vicina cordi, unde & pulmones & sanguine grumoso & nimia subsequente sanie liberentur, pleuritis praevideatur, & respiratio reddatur liberior, sed non adeo prudenter, quia sanguis semel evasatus crassior redditus, nec in arterias retrogredi, nec in venas promptè influere potest, unde & facta V. S. aeger adhuc redditur debilior. Si vulnus Thoracis non fuerit satis amplum, volunt nonnulli illud dilatare, quapropter cannulam immittunt, sed saepe incalium laborant, cum sanguis statim in grumoso abeat; si vero vulnus non satis proptus exitu pateat, imponi potest crunda ex spongia parata cum filo. At si satis amplum est foramen, plumaceolum ex linteis carptis formatum, ac idoneo digellivo oblitum, cum emplastro acidum temperante imponatur, bona adjecta ligatura. Alii adhibent injectionem, sed ab actibus abstinendum volumus, potius in Thoracis hilec *Vulneribus* commendamus sudorifera ex ocul. *Es.* *Es.* diaphoret. antihæc. Poter. viper. pp. lap. icissilem Anglicum, decocta lignorum cum liquoribus aliisque balsamica, balsam. nervin. Scharffer. sal. volat. oleofi. n. d. Sadorifera enim acidum sanguinis ac reliquorum humorum temperant, lympham crassam attenuant, obstruatas vias referant, & vel sensibiles, vel insensibiliter humores vitiosos eliminant. Purgantia quaecumque, seu pectori inimica ut & omnia acida & acris sunt fugienda.

Quando Chirurgus exploravit & deligavit vulnus more solito, non tamen instrumento ferro, sed potius candela cerea, quia instrumenta rigida fibris musculorum nocent, Medicus quoque interponere debet talia medicamenta, quae sanguinem grumulosum dissolvunt. Esto una & altera formula in tyronum gratiam.

*℞. ▽ chercifol.*

*card. bened.*

*Maria*

*veron. aa. ʒiſs.*

*lap. Es pp. ʒj.*

*ʒii diaphoret. ʒſs.*

*Syrup. heder. terreſtr. ʒij.*

*M.*

De hac mixtura accipiat aeger singulis horis ʒi vel 4 cochlearia. Vel si res est in angusto, respiratio urget, & suffocatio imminet, detur in cerevisia sperim. ceteri ʒſs.

In tempore quoque injiciatur Enema sequens, vel simile, si alvus fuerit adstrictior.

*℞. Rad. enul.*

*alb. aa. ʒij.*

*berb. violar.*

*cardiv. aa. Mj.*

*flor. sambuc.*

*Camomill. aa. P. j.*

*Cog.*

*Colatur. ʒ. lbj.*

*add.*

*ol. lini recent.*

*nucum aa. ʒj.*

*Virell. ov. No. j.*

*Sals. ʒi ʒſs.*

*M. F. Enema.*

Elapso die secundo vel tertio, diaphoreticum exhibendum sequens.

*℞. Corall. rub. pp. gr. xv.*

*Lap. sciss. Anglic. gr. x.*

*ʒii diaphoret. gr. xij.*

*F. Pulv.* Exhibeatur in aq. veron. Si tussis torqueat aegrum, & febris adjuerit cum dolore lateris pungitivo, diaphoretica continuanda sunt, aliaque antipleuritica, quae hic quoque conveniunt, vulnerati enim hi ut pleuritis sunt tractandi, propterea omnia, quae acidum humorum temperare & coagulationem eorum impedire possunt, optima sunt remedia; nec diuretica hic sunt contemnenda, modo non sint nimium acida. Ex. gr.

*℞. ▽ Papav. err.*

*fragar. aa. ʒſs.*

*veron.*

*chercifol. aa. ʒj.*

*Sp. lumbricor. ʒj.*

*Conſeſt. alterm. ʒſs.*

*Syr. violar.*

*papav. err. aa. ʒſs.*

*M.*

Singulis horis 2. cochlearia exhibenda cum essentia vulnerariae infra descriptae gr. ʒo. Vel propinetur sequens decoctum.

*℞. hord. P. j.*

*raf. C. C. ʒij.*

*rad. liquor.*

*Chin. aa. ʒij.*

*farfar.*

*enul. aa. ʒj.*

*Herb. heder. terreſtr.*

*pulmonar.*

*veron. aa. Mj.*

*Passular. min. ʒj.*

*Cog. in ▽ font.*

*Colatur. ʒ. lbij. add.*

*Syr. de jujub.*

*violar. aa. ʒiſs. M.*

Singulis tribus horis 4. cochlearia plena assumentur.

Sidolor urgeat, blandiora dissolventia externe applicentur, sequenti modo:

*℞. flor. chamomill.*

*sambuc.*

*melilot. aa. Mſs.*

*summit. aneth.*

*Herb. origan. aa. Mj.*

*sem. lini.*

*fenigr. aa. ʒſs.*

Incisa infundantur sacculis, & cog. in lacte; imponantur ligaturae. Sic & vulnere sacculi lacti incocti apponi possunt.

Si ex humorum effluxu ex suis vasculis pus fuerit collectum in costatum interstitiis in vulnerem non penetrante in Thoracem, omni ope anitendum est, cauterio ut eliciatur, & si hoc non sufficiat, lanceola puri exitus parandus. In vulnus variæ injectiones fieri possunt ex decoctis vulnerariis & pectoralibus paratis. Ex. gr.

*℞. ▽ fontan. lbij.*

*Infund.*

*Herb. matrisclo.*

*vine. pervine.*

*sanicul.*

*prunell.*

*pulmonar.*

*hyperic. aa. Mj.*

*rad.*



rad. arifol. rotund. ʒj.

Coq. ad tertiam.

add.

half. ʒiis anifat. ʒj. M.

Per ſyringem inicitur liquor mell. roſar. cum decocto in diſ. Vel:

R. Herb. ruſſag.

ſcabioſ.

herb. veron. aa. Mij.

ſol. abietis Mj.

Paſſular. maj. exacinat. ʒiij.

ſem. ſanie. ʒß.

bordai Mij.

Coq. in aq. commun. ac vin.

p. xq. add.

Mell. roſar. ʒj.

M.

Semper etiam reſpiciendum eſt, ut ſanguis coagulatus diſſolvatur per expectorantia vulgo ita dicta. Convenit præſertim in vulnere pulmonum decoctum Veron. cum ſyr. hæder. tert. Vel:

R. ʒ veron.

chæreſol.

heder. terr. aa. ʒiſſ.

Tinct. myrrha ʒij.

ocul. cancr. pp. ʒiſſ.

ſyr. heder. terr. ʒj.

M.

De hac miſtura aſſumat æger ſingulis horis duo cochlearia plena. Si nimis ſunt debiles ægri, exhiberi poſſet aq. perlat. cum aq. veron. cochlearium. Si quæ res in pectore latent, ex extrahendæ ſunt, propter quas aliquando etiam paracentheſis inſtituenda.

In applicatione turundarum cautè incedendum eſt, ne rapiantur in pectoris cavitatem. tale enim factum eſſe plures eſt antuæ hiſtoriæ Chirurgorum, quæ & nonnunquam abreptæ cum tuſſi fuerunt ejectæ. Hoc verò non fit ob ſuſtentionem thoracis, ſed per pulſionem, quando enim thorax capaciore redditur in inſpiratione, quoniam diaphragma contrahitur deorſum, & dum hoc fit, abdomen protuberat, ſicque æterem valde propellit, qui, quandoquidem vacuum nullibi datur, eodem tempore intrare debet thoracem ampliatum, atque ita ær partim ingreditur, per rimulam laryngis, partim etiam per vulneris oriſcium, utpote per viam commodiorem, breviorẽ ac magis liberam, ac dum ær ita protruit intro per vulnus parvulum thoracis, in tranſitu ſecum propellit turundam, niſi filo fortiter alligetur.

Sed turundis applicandis nimis diu non inſiſtamus, ne producamus Fiſtulam pectoris immedicabilem, nec in pectoris vulneribus reſpiratio fiat frequens & foris, continua enim pectoris agitatione in reſpiratione facta malum producit, quia vulnus in conſolidationi motus non parum obſtat, hinc magis conducunt plumaceola.

Chirurgus etiam in vulnere pectoris inquirere debet, an vulnus penetret in thoracis cavitatem, flammam ergo candela accenſa, ſeu plummam vulnere admoveat debet, ſi intus tremulus obſervetur motus ab ære ex pectore egrediente, vulnus uſque in cavitatem penetrat, ſi minus, non penetrat.

Ubi accidit tandem, ut puſ ſuper diaphragma copioſe contentum per vulnus nimis altum nequeat expelli, nec per tuſſim, nec per curiam,

tum commendatur paracentheſis. Inciſio illa artificialis thoracis in loco decliviori fit inter quintam & ſextam coſtam, ſi numeres ab inferioribus, non in medio pectoris, ſed in latere, magis tamen ad anteriorem, quam ad poſteriorem partem, ac potius circa ſuperiorem coſtæ partem, quam circa inferiorem, & quidem ſcalpello obvoluto aliqua ex parte panniculo, eo tempore, quo patiens expirat. Rara eſt hæc operatio noſtris in terris ob ægros immorigeros & impatientes: hoc tamen notandum, ut & in paracentheſi abdominis, ne aqua aut puſ una vice ſimul emittatur, ſed potius partitis vicibus, ne fibrillis ob æterem accedentem nimis frigidum moleſta afferatur & excitetur inflammatio ſape ſineſta.

In Fiſtulis Pectoris ante omnia eo incumbendum, ut acidum in ipſis latens inſurgatur, internè itaque præter illa, quæ Antecelliores jam monſtraverunt, varia alcalia ſala volatilia & decocta vulneraria exhibeantur, quæ ſimul pectoralia dicuntur. Ex. gr.

R. Herb. mariſiv.

ſanicul.

Veron.

virg. aur.

chæreſol.

heder. terreſtr. aa. Mj.

ocul. cancr. ʒij.

alb. grec. ʒß.

rad. ſarſaparill. ʒß.

liquirit. ʒij.

Coq. in cerviſ. q. ſ.

Semper etiam reſpiciendum eſt ad primas vias, ut chylus ſit dulcis, non verò acidus, in quem finem conducunt ſtomachica, v. gr. eſſent. abſinth. cum Elix. pectoral. n. d. & eſſent. traumatica, conducet & liquor. terr. ſoliat. ʒi, Tinctur. antiphthil. ut & Tinct. ʒs. ſponſata cum Tincturâ ʒi, imprimis verò alcalia fixa & volatilia quæcunque, & dulce. & ſacchar ʒi, quia maxime abſorbent acidum. Conducunt & thermæ Emſenſes, quæ vim habent acidum domandi & fibras nerveas corroborandi; optimè etiam conducet potus Theæ, ob ſal volatile oleoſum quod in ſe continet. Annumerata ſunt quoque optima remedia ſæpius exhibitæ. Ex. gr.

R. ʒiſ diaphoret. ʒß.

ocul. cancr. pp. gr. v.

M. D.

Vel:

R. Aq. ſanicul.

chæreſol. aa. ʒij.

calc. viv. ʒiij.

ocul. cancr. pp. ʒj.

ſyr. heder. terreſtr. ʒß.

M.

Internè præ aliis noſtrâ experientia comprobata eſt ſequens Eſſentia vulneraria, quæ non tantum omnibus vulneribus pectoris & pulmonum, ſed etiam fiſtulis aliſque ulceribus convenit. Doſis a gr. XX. ad XL.

R. Rad. Tormentil. ʒj.

conſolid. maj. lbß.

Imperai. ʒiſſ.

ſem. Hyperic. ʒiſſ.

ſol. pyrol.

alchymill.

plantag. aa. M. v.

Chelidon. maj. cum ſoto. Mij.

Methodum  
medendi  
Thoracis  
Fiſtulis.

Con-

## CAP.VII.DE LUXAT.VERTEB.GIBB.& SPIN.&c. 289

Contra digerantur in ana aq. & vini per 14. dies, exprimantur & in Balneo insipientur ad syrupum liquidiorum, cui adde sextam partem Sp.vin. qui insistentiam elicit ex floribus Hypericonis.

Externa chirurgica consistunt in absumptione calli per butyrum arsenici, vel oleum Zii dulcis, hinc mundificatione fistularum & dein, consolidatione, in quem finem variae injectiones sunt ex decoctis. Sequens vel simile conducet.

R. Bacc. Junip. P. j.  
rad. aristol. rotund.  
liquirit.  
enul. aa. 3j.  
summ. hyperic.  
herb. veron. aa. Mj.

Myrrh. elect. 3lb.

Zii dulc. 3j.

F. Decoctum in aq. & vin.

Aqua calc. viv. cum Spir. vini conducet. Aquam plantag. cum Zio dulci & saccharo si optimum expertus sum remedium. Vel injiciatur succus chærefol. cum succo cancor. fluiat. Turundis imponatur sequens unguentum.

R. Mell. despum. 3lb

aloes.

myrrh.

thur.

assafœid. aa. 3j.

M. F. Unguentum.

Reliqua peti possunt ex capite generali de Fistulis

## CAPUT VII.

### De Vertebrae Luxatione, Gibbositate & Spina nodosa.

§. I.

**R**ectitudo spinæ dorsii homini non modo figuram conciliat venustam, sed actionibus quoque præstandis & oneribus defendendis aptissimum, unde à Physiognomis etiam illi, qui magnam & validam habent spinam, pro magnanimitis habentur, quibus verò parva & debilis existit, molles existimantur. quales sunt mulieres. Debito quoque in loco sitæ vertebræ ejus hominem in omne flectere latus facile permittunt, & hic præfertur illis, qui duræ sunt cervicis, aut rigidi dorsii, quod de immorigeris prædicari solet atque obstinacibus, omne illis deficientibus onus, a quo in illum latus verti aut flecti necessest, ea propter etiam vertebræ extra consuetum sive ordinarium situm prolapsæ aut distortæ & venustati & sanitati non parum solent detrudere. *Luxatio ergo Vertebrae* Vulgò describitur, quod sit earum ex propria sede motio excedens, & in alienam prolapsus, cum motus voluntarii læsione.

*Luxatio vertebrae.*

*Gibbus.*

*Gibbositas* vel *Gibberositas*, aliis *Gibber* & *Gibbus*, Græcis *Κόψωσις* dicta, vel *Κόψη*, à Scholasticis refertur ad morbos malæ conformationis, consistentes in figura vitata dorsii ob vertebrarum situm rectus exteriora mutatum & luxationem, plerumque à causis externis violentis inductam. Qui hoc affectus laborant, *Gibbosi* dicuntur.

*Spina nodosa.*

*Spina nodosa* dicitur affectus, in quo vertebræ nodos habent & quasi excrecentias hinc inde protuberantes, quale quid Limburgi in defuncta filia VV. observavi; & affectus hic prioribus rarior occurrit, & ut plurimum infantes afficit, quia ossa ipsorum sunt haud admodum dura, sed poros habent ampliores.

*Differentia.*

Differentias quod attinet, & *Luxatio* propriè sic dicta, & *Subluxatio* in vertebrae locum habet, utraque vel versus exteriora est, quæ *Gibbus* dicitur, si vel versus interiora, & vocatur *Lordosis*, ceterum exemplum notavit Cl. VVedelius in *Ephem. Anat. Decur. 2. Ann. 5. obs. 219.* vel ad utramque partem, *Ossisipum* reddens, vel ad latus.

*Paraffia.*

§. 2. *Paras affecta* horum affectuum sunt vertebræ, Græcis *παράσπινδυλοι* dicti, ossa nempe illarum excavata, superius & inferius plana, exteriori variis processibus, donata, spinam constituentia, quorum in collo septem, in dorso duodecim, in lumbis quinque, & ossesacro totidem numerant Anatomici, quibus adjunctum est os

coccygis, quæ hoc in affectu à sedesua vel introrsum, vel extrorsum excidunt. Rarius observatur hæc Spina dorsii bifida, quale exemplum apud *Tulpium lib. 3. Obs. 30.* legere est.

§. 3. *Luxatio Vertebrae & Gibbus* visui & tactui patent, præter quod & symptomata quædam graviora affectus huius aliquando comitantur, v. gr. paralytis brachii ex luxatione vertebrarum cervicis, femoris, & lumborum. In Gibbo si thoracis structura admodum vitietur, sequitur respiratio difficilis, vel periculum quoque suffocationis. Si cervicis vertebræ luxatio fiat, quæ tamen cum pauca illic intercedat cartilago, non nisi summa vi fieri potest. Aliquando verò prima vertebræ, quæ per arthrodiam laxè jungitur, si luxetur, sextam anginae speciem ab *Hippocrate* dictam efficit, quæ species Practicis vix innotebit.

*Spina nodosa* ex visu, magis verò ex tactu dignoscitur, dum tuberculi quidam vertebrae incumbentes in dorso infantum percipiuntur.

§. 4. *Galenici* causam *Luxationis Vertebrae* *Ætiologia* & *Gibbositatis* duplicem constituunt, externam nempe, & internam. Externa illis sunt lapsus, ictus, compressio, mala consuetudo aliudque violentum vertebrae vel introrsum, vel extrorsum expellens, ut loco suo excedant. Internam *Gibbositas* fingunt plenitudinem & siccitatem, à quibus ligamenta contrahantur, quæ postmodum ipsæ vertebræ sequantur: & huc etiam referunt virium debilitatem, ob quam non modo muscoli & nervi corporis pondus nequeant sustinere, unde ipsa spina incurvetur, sed partes quoque aptæ reddantur recipiendis humoribus aliunde transmissis, ex quibus tubercula oriantur ligamenta contrahentia & vertebrae in priorem partem adducuntur.

*Spina nodosa* causam imputant humoribus crassioribus ob facultatem concoctricem debilem nimia copia ad spinam transmissis, & ab expultrice partis hujus non amandatis, quos facultas nutriendi ipsi spinæ postmodum cum succo nutritio firmius agglutinet; sique nova quædam tubercula spinæ vertebrae adnascantur.

§. 5. *Paracelsus* causas externas violentas in *Luxatione Vertebrae* admittit, & *Gibbum* abortum statuit esse naturæ, qui tantum insubstantia sui corporis nascatur, dum virtus creatrix aberret, & quæ vera membra dorsum & ossa creare deberent, ea ex defectu virtutis creatrix Gibbi.

OO

à na-



à natura dissolvi, ut nihil sit nisi spasmus virtutis crescitivæ; ideoque si spiritus crescitivus operationem suam perficere nequeat, propter impedimentum formæ, tum naturam subjectam, quod formari debet, supprimere, & gibbum aut curvaturam facere, & membrum ita incrementum, si nimirum natura in principio, antequam spiritus crescitivus venerit, monstrum in spina dorſi & nuchâ constituerit, tunc id secundum formam illam, quam natura delineaverit, ita crescere ac augeri.

*Spinam fieri nodosam* asserit, dum ex quartâ generatione concretum quoddam extra proportionem suam existens transeat incrementum.

§. 6. *Helmontius* refert *Luxationis* Vertebrarum & *Gibbositatis* originem ad inæqualitatem roboris ipsius spinæ, ob quam vertebræ in alienum situm distorqueantur, accedente vel externâ, vel internâ quâdam vi Archeon subſtèrente, à quo distributiva simul seducitur.

*Spina Nodositas*em oriri putat ab errore sextæ digestionis, dum virtus crescitiva & distributiva ab Archeon inordinatè ad ejusmodi cudentas excrementas impellatur, ad quod & ipsum partis inæquale robur suum tribuat quadram.

§. 7. *Villifius* in Vertebrarum *Luxatione* causas accusat externas violentas, casum nempe, ictum, compressionem, nec non internas, abscessus & tumores circa vertebra collectos, à quibus ipsæ vertebræ propellantur.

*Gibbositatem* oriri dicit vel ab ipsâ luxatione vertebrarum, vel à nervorum & spirituum animalium vitio, dum nervi intercostales spasmus dicit afficiuntur, costæ comprimuntur, & vertebræ versus interiora incurvantur, versus exteriora verò protuberant.

*Spina Nodositas*em succo imputat nutritio, & liquori nervoso, in quantum succus nutritius vilcidior majori copiâ versus spinæ regionem devehitur, liquor verò nervosus paucior aut debilior, aut malo præditi fermento, eundem non rite distribuit, unde succus nutritius copiosus, ibidem congestus in tumores istiusmodi abeat nodosus.

§. 8. *Sylvius* quoque in *Luxatione* Vertebrarum causas externas à superioribus jam annotatas agnoscit, & internas, maxime ligamentorum relaxationem.

*Gibbi* causam tum luxationem istam vertebrarum statuit, tum malam costarum conformationem, in utero foetui obvenientem, & spinæ inda factam distortionem, vel humorum circa spinam collectionem.

*Spinam nodosam* fieri censet à sanguine nutritio copiosius ad vertebra spinæ has vel illas, aut certam vertebrarum partem profluente, à quo partes istæ aliis magis alantur, & proinde quoque substantiâ sua augentur.

§. 9. *Cartesius* in Vertebrarum *Luxationis* causam & Ligamentorum nimiam admittunt laxitatem, ob quam vertebræ sibi invicem minus firmiter annectantur, & externum quoddam infortunium, lapsum infantis super brachium ancillæ bajulantis, aut ex altiori in locum inferiorem, jactum lapidis in dorsum, aut alterius cujusdam rei gravioris, & quidquid violentia vertebras extra locum ordinariū potens est propeleere.

*Gibbum* oriri dicunt aliquando à luxatione

vertebrarum, aliquando à distortionem spinæ adhuc mollioris, vel in utero matris, vel extralumi, nonnunquam & à mala consuetudine, dum infantes & juniores nimis se incurvant, sicque spina indureſcens figuram incurvatam adipiscatur.

*Spinam fieri nodosam* dicunt à succo nutritio *Spina nodosa*. multis particulis crassioribus, terreſtribus turgido, per arteriolas inter fibras vertebrarum à sanguine propulſas, à quibus fibræ in ætate teneiori molliores diducantur, & tubuli reddantur ampliores, ut in has vertebra nutrimentum illud crassius copiosius influat, quàm in alias, sicque aliæ vertebræ copiosiore & crassiore succo nutritæ magis protuberent, quàm illæ, ad quas paucius & tenuius pervenit alimentum.

§. 10. *Nostro* judicio causæ *Luxationis* generales etiam in *Luxatione* Vertebrarum maxime locum habent, quales sunt casus ab alto, à quo plures infantes novimus gibbosos factos, quo pertinet quæcumque vis violenta, item constrictione vestium, ut in juvenculis sæpe fit, quæ quid infantibus etiam contingit ex hæreditate. Motus corporis nimis aut inordinatus, item ætas infantilis ob lubrica & delicata ligamenta; omne enim id, quod vi ligamenta extendere potest, luxationem infert. Internè humores nutritii viscosi solventes copiosius effluentes, vias lubricas reddentes, & ad dearticulationem commoventes. Item emollientia & humida aqua incautè applicata.

Dorſi Vertebræ ubi luxatur, *Gibbositatis* oritur, *Gibbositatis* raro verò una sola extorsum fertur, quæ enim necitur cartilagine, vix adeo relaxari potest, vertebræ verò ab invicem plus minusve secedentes, curvaturam in dorſo, & cum se erigere nequeant, breviteram quoque illius, & cum eo totius corporis in gibbosis appellatis procreant, atque prominentia inde nata ad exteriora potius, quam interiora, cum spinæ vertebrarum illas eò adeo detorqueat nò sinant protuberant: pro diductionis autè vertebrarum modo vario, nunc acutum, nunc obtusum, & majorem minoremve Gibbum efficit. Nonnunquam ad atera inflexæ vertebræ alio modo corpus intorſu & breve afficiunt. Et in omnibus illis dorſi curvaturibus, cum costæ dorſo annexæ spinam, sequantur, pectus quoque vel elatum, vel depressum vel aliter deformatur apparet. Ex *Greg. Horſii* Observatione constat, à vehementi cordis palpitatione gibbum esse excitatum.

Quod causam concernit protuberantiū ossium *Spina nodosa* in *Spina nodosa*, arduū esse dicit *Celeb. Glissonius, deſa*. hujus rationem reddere, tandem verò aperte nobiscum asserit, excrementas has, seu nodos ossium, produci ex inæquali nutritione ossium, puta ex liberaliore nutritione protuberantium parium, & parciore cæterarum parium ossis; ossium ergo genus obſtructionibus facile in hoc affectu infestatur, indeque id inæqualiter nutriti contingit, & hæ partes in ipsis infantibus molliores ac spongiosiores sunt reliquis partibus ossium. Ossa costarum extrema ubi cum cartilaginibus sterni committuntur, nodosa fiunt, articulorum ossia protuberantia, ita tota spina parim extorsum partim intorsum variè inflectitur. *Cl. Major* inquit, ossium inconcinnitatem produci ab inæquali nutritione, nempe si ossa crescant & elongentur, & musculi

*Spina nodosa.*

*Helmontii opinio de causa Luxationis. Vertebrarum & Gibbi. Spina nodosa.*

*Villifii aetologia Luxationis vertebrarum.*

*Gibbositatis.*

*Spina nodosa.*

*Sylvii opinio de causa Luxationis vertebrarum. Gibbi.*

*Spina nodosa.*

*Cartesii notum de ratione de causa Luxationis vertebrarum.*

*Gibbi.*

musculi accrescant & sic detineantur, tanquam in chorda, pari modo, ac si arbori teneræ & crescenti chorda superius & inferius alligetur, ita tamen, ut eadem à chorda non tendatur, nullus dubito, quin arbor dicta crescentem incurvabitur. Sic vertebrarum ossa cum præ brevitate incurrari nequeant, in nodos protuberant.

Ut melius ista intelligantur, hæc nutritio potest ob pororum ossium obstructionem vitiari, imprimis si accedat spirituum animalium debilitas & paucitas, quæ alias sunt distributiones succi nutriti, hinc infantes & debiles hic affectus afficere solet. Affectus hic sæpe primordia sua habet in primis viis, in quibus digestio non recte perficitur, unde nec chylus probus, sed crassius & ad nutritionem ineptus perficitur, qui ad ossa delatus propter obstructionem pororum ossium coagulatur, & in nodos figitur, stagnans enim succus acquirit crassitiem & ducit ad magnam, ut quasi in ossum mutetur substantiam.

Pregasti  
Luxationem  
Vertebra-  
rum.

§. 11. *Luxatio* Vertebrarum dorsi quæ extorsum accidit, aliquando curabilis est, quæ verò interiorum facta est, pro lethali & incurabili à Chirurgis habetur, præcænte his *Hippocr. lib. V. Sect. 1. p. m. 867. Tom. 1.* cum tamen aliquando eam curatam viderim: exemplum quoque extat in *Ephemer. nstr. Germ. An. 4. & 5. Obs. 77.* Intorsum enim luxata vertebra renes, pulmones, diaphragma, aliasque partes interiores premere, & conqualare ac ledere possunt. Urina quandoque supprimitur, alvus non secedit, ob nervorum constrictionem & spirituum stagnationem, & pedes movere nesciunt.

Gibbositatis.

*Gibbosi* facile sunt phibitici, ceu pluribus exemplis confirmari potest, succi enim circa pedes ob pressionem valvorum stagnare coguntur, hinc fiunt acidores. Gibbos dorsi ab initio aliquando curabilis est, & in junioribus, in adultis verò malo an inveterato, incurabilis habetur. Quibus gibba sit spina, dum pueri sunt, priusquam corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit. his corpus iuxta spinam coaugeri solet, sed crura quidem ac manibus perficiuntur, illa verò partes defectuosiores fiunt. Supra septum transversum quibus Gibbositatis est, his & costæ in asplritudinem augeri non solent, sed in anteriorem partem, & pectus acutum fit, sed non latum, ipsique & difficulter spirant & stridulam faucium asperitatem habent, sed & juxta magnum verticalem cervicem repandam habere coguntur, ut ne caput ipsis pronum sit, multam igitur angustiam faucibus exhibet etiam hoc os intra vergens. Ob talem igitur figuram ejusmodi homines eminentis gutturis magis quam sani apparent, & tuberculis circa pulmonem duris ac crudis plerumque tales affecti sunt. Quibus verò infra septum transversum Gibbositatis est, horum quibusdam morbi vesicæ ac renium accedunt: sed & abscessus ad suppurationem, & circa laterum mollitudines & inguina duntaxat ac ægrè curabiles, & neutri horum gibbositates solvant; coaræ verò his magis excarnes fiunt, quam his, quibus superne gibbositas contingit, universatim spina his longior est, quam gibbosis, pubes verò & barba tardior ac imperfectior, & infusciores hi sunt, quam superne gibbosi. At quibus aucto jam corpore gibbositatis facta fuerit, his palam præsentis inmemorabili judicationem gibbositas facit, per tempus

tamen, aliquid ex iisdem significationem plus aut minus præbet, quemadmodum etiam in pueris, minus autem malignè in totum talia se habent. & multi sanè jam facile ac sano modo gibbositatem sustinuerunt usque ad senectutem, & maxime hi, quibus ad carnositatem & pinguedinem promotum fuerit corpus, pauci tamen talium sexaginta annos transgressi sunt, plerique verò brevioris vitæ sunt. Ex calu quibus spina gibba sit, horum sanè pauca superantur, ita ut dirigi possint, affirmante hac *Hippocr. de artic. §. 37. & 38. M. Tom. 2. p. 793. seqq.* Quibus corpus carnosum & pingue redditur, facilius tolerant gibbum, pauci tamen horum ad sexagesimum annum vitam produxerunt, teste *Hippocrate Veltar.* Ex anhelatione aut tussi gibbosi facti ante pubertatem, pereunt. *Sect. 6. Aph. 46.*

*Spina nodosa* est difficilissima curatu, & transit *Spina nodosa* vel in hecicam, vel in tabem dorsalem, vel rachitidem plerumque lethalem, ob nimiam constrictionem vasorum, & inde humorum stagnationem factam.

§. 12. Victus ratio ex *Hippocratis* præscripto primis diebus exquisita esse debet, deinde plenior, quies, silentium imperandum, habitus corporis accommodandus, alvus subducenda, *Diat.* Venere abstinendum: quare cura *Diatrica* eò dirigenda ut humoribus stagnantibus concedatur motus liberior, & pars luxata reposita in situ convenienti servetur, nec denique prolatur. At ergo sit purus, subtilis, & benigno æthere præditus, non pluviosus, nivofus, nec ventis agitatus, adeoque si talis non existat per se, sed qualitate quadam novâ præditus, arte corrigendus est, ut ægris hinc reddatur conveniens, quo absque ulla impedimento respirationem peragant. *Cibus* consistat ex iusculis & carnibus juniorum animalium, pullorum nempe gallinaceorum, vitulorum, agnorum cum vegetabilibus idoneis paratis, ut inace, semineansi, vel fœnic. foliis torismarini, salvia, satorej, decocto C. C. &c. *Potus* sit cerevisiatenuis, bene defæcata & radicibus angelic. caryophyll. leos, herb. capill. sis, scelopend. Veron. & cort. amaricis medicata, vel vinum emulatum modicè exhibitum. Aquæ autem potus frequentior valde nocet, maxime si cruda assumatur, vel si sit novalis, aut quæ in cysternis aut alibi diu stagnaverit. Lactentes nutrice gaudeant sana, bislari, & secundis rivulis prædita, cujus lac est optima stox, neque nimis crassum & viscidum, neque nimis serosum acce, vitiosum verò corrigatur croco & salibus volatilibus, quibus nutrites in cibo & potu frequentius utantur. *Motus* non sit violentus, neque nimis diuturnus, sed debito tempore subveniente quiete mitigetur. *Ægri* quantum fieri potest erecti incedant, non incurvati versus anteriora, si luxatio aut gibbus sint versus anteriora, si verò versus interiora vertebra fuerint prolapsæ, incurvati hæc juvare potest, & cavendum, ne versus posteriora ea instruantur. *Somnus* largior non est denegandus, procumbatque in ventrem ager, pronuntente dorso versus exteriora, supinus vero dormiat, si in thoracem vergant vertebra. Alvus cito fungatur officio, *excrementa* enim diutius *reienta* malum augent, dum intestina repleta diaphragma premunt, & motui musculorum Thoracis multum faciunt impedimenti, unde respiratione magis adhuc redditur diffi-

difficilis; quā gibbi aliis omni tempore valde affliguntur, & duplici inde premuntur molestia. Quantum possibile, *animus* sit pacatus, nullā anxietate maceratus, seu gaudio, amore mediocri, & latitia quamq. jucundissimis stipatus satellitibus, à quibus liquor nervosus, live spiritus animales in semitas rectas commodissime deducuntur.

Curandi  
ratio  
rationem  
Galenici  
Luxationis  
Vertebra-  
rum &  
Gibbosita-  
tis.

§. 13. *Curationem* horum affectuum, & quidem ipsius *Luxationis* Vertebrae & *Gibbositatis* ita instituit *Galenicus*, ut locus affectus relaxetur, hinc quantum necesse est distendatur, ut vertebrae prolapsae in situm debitum restituantur, ad quod talis utitur apparatus. Postquam pro relaxatione obtinendi partem affectam balneis, fomentis, inunctionibus ex ol. lil. alb. camomill. amygd. axung. taxi vulp. can. capon. &c. satis emolliaverunt, hominem super scamno in ventre collocatum diabus circumdant habenis, unā supra vertebrae prolapsam sursum, & alterā infra eandem deorsum trahente, quas habenas pistillis alligant, ab utroque scamni existentibus, vel, quas alli praefertur, axibus ab utroque illo extremo collocatis, qui converti habenas alligatas venienter attrahant, ut homo simul in partes extendatur contrarias, quo facto Medicus vel Chirurgus partem ad posteriora prolapsam manu vel pede in situm pristinum urget atque propellit, ad latera verò prolapsam paluā non minus in partem priorem premit, & quantum possibile, restituit. Si difficile sit hoc procedere conspiciatur, parti protuberanti imponit panniculos, & asserit ab uno extremo parieti, juxta quem scamnum est collocatum, inferunt, ab altero extremo manibus illumprehendunt & tandem premunt, donec vertebra prolapsa sit reposita. In priora & thoracis cavitatem prolapsam vertebrae hac ratione cum reponere nequeant, quidam ex vetustioribus aliud quoddam excogitarunt machinamentum, sed ob crudelitatem sibi imitabile & periculo plenissimum, equidem subiectis pannis aegrum hujusmodi scilicet pluribus locis alligant, & quidem si vertebrae superiores erant prolapsae, pedibus deorsum spectantibus, si verò inferiores, iisdem sursum versis, cum scalam cum homine alligato per cochleam & funem ad turtim vel culmen domus aliquis attraxerunt, & subito inde super locum tenentem demiserunt, ut ita corpus simul distenderetur, & vertebrae prolapsae in priorem reverterentur locum. Sed quis non videt, citius mortem hoc ausu crudeli, quam sanitatem & corporis integritatem restitutionem acquiri? Unde cum *Hippocrate* prudentissimo merito rejicitur, & impostoris potius, quam Medici assumatur molimen. Humaniori verò & feliciori modo repositae vertebrae ut contineantur, hominem servant quietum, & partem affectam fasciis albuline ovi, in quo pulvis adstringens ex bolo, cort. granat. ros. myrtill. & pauco aluminis commixtus est, imbutis vincunt, nec non pannis aut laminā aliquā firmiore suffulciunt. Inflammationem partis praecavent vel cerato liquido, vel oleo rosaceo omphaceo, quibus fascias & pannos inungunt, imperatā simul inedia & celebratā venesectione, aut pro necessitate exhibito cathartico. His peractis & vertebrae confirmatis, vincula resolvunt, & quod restat duritiei, medicamentis emollientibus, fomentis & inunctionibus commode perficiunt.

Hoc etiam modo *Spinam* tractare solent *modos* *Spinam* *no-*  
*sam*, observantes simul, ut partem mittentem, capi-  
*no-*  
tut nempe corroborent, inperfo pulvere calefaciente, & parum exsiccante ex fol. sal. beton. majoran. rad. Cyper. aristol. rotund. mastic. succin. cinamom. Nucist. rasur. lign. Rhod. & similibus, quas species cum terebintina quoque & cerā, addito oleo masticino in emplastrum nonnunquam redigunt & capiti imponunt. Humores superfluos evacuant electuat. benedict. laxativ. aut syrupo diafer. & pro ventre laxando abdomē inungunt unguent. de archan. & dialch. nec enemata omittunt emollientia. Ipsa deinde tubercula & nodos, adeoque *Spinam* vitiosam inungunt emollientibus, aut unguento maruat. popul. ol. lilior. lumbricor. vulpino & aliis, aut emplastrum imponunt de Oculpo *Phi* agr. aut diachyl. cum guminis, ad plenariam usque nodorum istorum resolutionem.

§. 14. *Paracelsus* nihil peculiare in *Luxatione* *Paracelsi*  
Vertebrae novit adhibendum, sed aliorum  
operationi adlentur, neque ad *Gibbositates* res-  
perit remedium, quo virtutem crescitivam cor-  
roborat, ut defectum hunc suppleat, aut aberrationem naturae emendet, sed quae spasmo conveniunt, eadem etiam hoc in calu adhiberi posse censet, quorum numero inferuntur pinguedines taxi, vulpis. sciuri, cati rubri, quibus partes protuberantes inunguntur.

Ad *Spinam* *Nodofam* galbanatum suum utili-  
ter adhiberi posse non dubitat, ut tubercula illa  
emolliantur & concretum vitiosum resolvatur.

§. 15. *Helmontius* in Vertebrae *Luxatione* *Helmontii*  
placet vertebrae prolapsae repositio in si-  
tum debitum, reliquas verò *Gibbositates* & *Spinæ*  
*Nodofas* species curare jubet confortando  
Archeum, & resolvendo durities, ut virtus distributiva nutrimentum a qualiter dispenfet, ad quod olea nonnulla convenire possunt, maxime oleum cereae & strobilorum expressi, neque compressiones per laminas ferreas aut plumbeas ab eo initium temerant.

§. 16. *V. Villisus* Vertebrae *Luxationem* non minus  
in debitum suum restitui vult situm, hancque  
repositionem, ut optatō peragatur, praecedere  
vult extensionem per vincula subalis & ad illa  
& crura ligata, atque aegro super mensam locato,  
tum enim vertebrae ad exteriora dilapsas vel ma-  
nibus solis, vel fustibus aut lignis ad interiora  
tamdiu premi posse contendit, donec pristinum  
repetierint situm, in quo tum ut retineantur, tho-  
race ferreo eā parte, quā corpus a gri tangit, lin-  
teo obducto, & interjecta lana emolliat homines  
istos indui jubet. *Luxationes* verò Vertebrae  
ad interiora factas frequentissime omnem illud-  
dere operam impensam conficitur, uti & illam,  
quae facta fuit ad latera. Restitutis autem ita ver-  
tebris, etiam *Gibbum* curatum iri prouincit, à  
*luxatione* illā prius subortum, ad cuius produ-  
ctionem si spasmodicae affectiones primariae ex-  
sisterint caute, interne non minus, quam externae  
aliis remediis inermiliter illa, quae spiritibus ani-  
malibus liberum conciliant motum, & copulam  
demant explosivam, qualia sunt spiritus fuliginis,  
C. C. oleum succini, castoreum, cuius  
pinguedinem axungis vulpis, taxi, aliorumque  
brutorum associat, & in linimentum redigit,  
quo locus affectus cerebrius venit inun-  
gendus.

In *Spinæ* *Nodofitate* succi nutritii viscosita-  
tem



Nodosa.

tem corrigat per remedia chylicationem promoventia, & impurum à puro separantia, qualia sunt vel decocta vel infusa ex rad. myrrhid gramin. silic. maris, eichor. osmund. regal. chin. herb. scopolend. Veron. capill. Ven. rut. murar. cort. tamarici. *Se* Qi. ligno lassif. aliisque merientibus, quibus subiungit illa, quæ liquorem nervosum & augment & subtilisant, folia nempe salvia, rorismarini, cort. aurant. Spiritus C. C. Succini. Regione dorsii pannis calidis fricare & intingere suadet unguentis ex herbis quibusdam in aqua coctis & expressis, quales sunt, fol. sal. rorismar. cochlear. osmund. regal. capill. Qis, additis medullis cervi, bovis, viculi, oleo vulpino lumbri. butyro majali vel emplastrum ex gummi Ammoniac cum succis herbarum insipillatis paratum & nodis impositum, ad humorum induratum emollietionem & resolutionem perficiendum, quam melior succi nutritio dispensatio facile subsequitur, non parum sperat allaturum esse juvenis.

Sylvianna  
entra in  
vertebra-  
rum Lu-  
xatione.

§. 17. Sylvi per repositionem in locum pristinum Vertebrarum dorsii *Luxationem* curandum esse docet, quod fit permissa emollietione per unguentum diatheze, oleum vulp. axung. austeris, canis, humani, aliorumque remediis conveniunt adhibitionem, debita compressione in partem contrariam, tum incurvatione aut situ corporis ab agro praestando, ne impetio curvatione, si ad priora fuerint dilata, ut ad dorsii regionem vergant, ipsius autem dorsii, si ad posteriora egrediantur, ut versus interiora aliquo modo deprimantur.

Gibbo.

Non ab simili ratione Spinæ prominētiam in *Gibbo* tractandam vult, successivè eum eandem per laminas aut thoraces ferreos si fiat compressio in junioribus ad signum magis compositum reduci posse sperat, quo obtento, & vertebis in locum suum restitutis, quietem imperat, & partium restitutarum retentionem per emplastrum ad fracturas conciliandam.

Spina

Nodosa.

Ad *Spina Nodosam* unguenta ex gummiis in aliis tumoribus durioribus resolvendis proficua similiter commendat, ei spe fretus, non minorem fructum etiam hoc in casu eadem esse allaturum.

Cartesia.

norum mo-

dus curan-

di Vertebra-

rum Lu-

xatione.

nem.

§. 18. Cartesiani placet ipsa illa repositio vertebrarum *luxatarum*, partem affectam prius fovendo decocto herbar. beton. sal. chamædr. fol. rorismar. lauri, flor. chamomill. hyperic. in vino generoso facto, hinc illinendo sequenti unguento.

R. Suci cervin. ʒj.

medull. ejusd. ʒʒ.

Spir. lumbri. essentif. ʒij.

ol. dest. Chamomill. ʒij.

salv. ʒj.

Hyperic. expr. ʒijj.

M. F. Linimentum.

Partium luxatarum restitutionem perficiunt, præviā necessariā extensione à prioribus jam indicata, potissimum ea, quæ fit per trochleas, compressionem per prelium aliud, quo lutea comprimuntur, si ad posteriora vertebra prominēant, ad interiora verò si vergant, & incurvatione ægri aliquoties repetita nihil præsterit, curationem perfectam imperari posse valde dubitant, quin frequentius lethalem fore hunc morbum aperte pronunciant. Ad firmiorem retentionem vertebrarum restitutarum, & diuturniorem

quietem, abstinentiam à laboribus, gravioribus, & decubitu prioriorem omnimodo necessaria esse censent, nec sine juvamine extitum credunt emplastrum masticinum cum dimidia parte emplatri stupic mixtum, & oleo hyperici malaxatum, si dorso aut parti debili imponatur & aliquamdiu ibidem servetur.

Incurvatam Spinam in *Gibbo* infantum ad figuram decentiorem redigi posse sperant per thoraces ferreos, aut ex charta crassiori paratos, panis ubique suffultos, noctesque diesque etiam ad annos aliquot gestatos, adultorum verò gibbos difficulter correctionem admittere autunt; duriora quoque ligamenta repressio spinæ obfistenta prius emolliunt unguentis & axungis variorum animalium; nec non oleo lumbri. cor. & vulpino, quæ in casu hoc valde congruentia maxime approbant.

Ad *Spinam* corrigendam *Nodosam* in ætate adhuc puerili operam dant ut blandis diaphoreticis, tum fixis, tum volatilibus, interne exhibitis particula crassiores in succo nutritio attenuentur, subtiliscentur, & ad necessarium disponantur fluorem, quo particulis consilans homogeneis æqualiter per tubulos distribuatur, & æther amicus canaliculos satis dilatat, atque lucos propellat, ne uno in loco copiosius hæreant & agglutinentur, quam in aliis, quapropter interne inuljugum extrema quædam remedia, qualia sunt frictions mediocres frequentius repetita, foris ex decocto rorismarini, ment. sal. flor. chamomill. hyperic. &c. in vino lacto, illinatione cum liquore ex ana Qi & Sri per Retort. destillatis parato, necnon Spiritu lumbri. cor. & Spir. M. i, nec in hoc casu improbat emplastrum stupicum *Crolli*, sed ad nodos resolvendos & partem roborandam illud satis aptum existere judicant, si vel oleo Philothophor. vel oleo terra malaxetur & per tempus aliquod parti *nodosæ* impositum detineatur.

§. 19. Nos de curatione morborum præsentium ita sentimus. Quamvis in *Luxatione* articulorum nulla salus aut curatio expectanda, nisi præmitta illorum restitutione, sic & de hac in *Vertebrarum Luxatione* eadem ratio est interim ut restitutio hæc felicius obtingat, incommotis succurrendum est debitis medicamentis imprimis verò conducunt varia fomenta & linimenta temperatis resolventibus & nervinis parata, quales sunt sæculi ex floribus Chamomill. sambuc. anchos, rosar. herb. majoran. rut. verbasc. alch. aa. Mij. sem. lini ʒij. concilis & confulis, atque in lacte vaccino coctis qui imponantur parti affectæ. His linimenta idonea possunt interponi; ex gr.

R. Ol. Lumbri. cor.

Chamomill. aa. ʒj.

salv. ʒʒ.

Axung. Cunicul. ʒij.

homin. ʒvj.

M. F. Linimentum.

Interne quoque varia motum liberiorem humoribus conciliantia exhibenda sunt, ejus rei gratia salia imprimis conveniunt volatilia & hxa, \* cum ♀ fragar. bals. nervin. liqq. C. C. succinat. Gum diaphoret. oculi ʒss, mumia, sperma ceti: Potissimum verò nimis operæ humoribus indigent. Retrahuntur autem vertebra imprimis in *Gibbo* extorsum intorsive, aut ad latera curvata vel loco motu, dum contrarii nixu stando vel sedendo dorsum ita flectitur, ut

O o 3 curvitas



curvitas illius sensum erigatur, sed cum hoc vi adhibita una vice fieri nequeat, ideo per decubitus talein, in quo diutius morari trahere possunt, id rectius peragitur, maximè vero ope instrumenti, quo pars illa premitur. Chirurgus Francofurtensis *Almacheus* Luxationem Vertebrarum dorsi interiorum factam sequenti modo restituit: Stragulum integumentum arcuè convolvit, & ægrum magno cum labore imposuit, ita ut vertebrae interiorum flexæ convolutio stragulo incumbere. Hinc mantilla duo, quarum alterum sub axillis, supra femora alterum alligabitur, viris duobus fortibus tradidit, inque terram procumbere, (pedibus parieti affixis, quo fortius tenere queant) iussit, postmodum machinâ tractoriæ ex *Vitruvii* lib. 10. cap. 4. parietem terebravit, famulum sensum voluit, viros quoque fortiter tenere fecit, manibus suis prius dorso rectè impositis applicatisque, usque dum vertebrae extensæ fragorem ediderent, quo percepto ac audito funiculi mantiliæque sensum sunt remissa, impositumque emplastrum aliquod contra fracturas. Repositione peracta, blandè dissolventia adhibuit, aliæque traumatica, & sic agonizantem quasi ægrum feliciter restituit.

Alias autem restitutio hæc vertebrarum versus interiora dislapsarum admodum est difficilis, & à multis planè habita impossibilis, neque enim ab anterioribus reprimi queunt, neque à posterioribus facile attrahi: ne tamen ægri absque ullo iuvamine tanquam deplorati derelinquantur, *Guilielmus Fabricius Hildanus* singulare excogitavit auxilium, quod tamen tanquam extremum remedium sine periculo nequit tentari, & sequenti modo ejusdem sit operatio: Factâ incisione novacula in dorso usque ad ipsam vertebrae appendicem descendentem, denudò per idem vulnus, modo majus, modo minus, pro diversa dislocationis magnitudine, & vertebrarum impressarum pluralitate, inmissâ novacula duas alias instituit incisiones, unam ad dextrum, alteram ad sinistrum appendicis lateris, atque tenaculis aptis appendice prehensâ & spinâ extensâ vertebra in altum trahit, & in situm debitum reponit. Quando verò incisione facta hæmorti hagia operationem impedit, eam sistere jubet stupis arcuè contortis & albumine ovi madefactis, atque pulvere ad sistendum sanguinem adpersis, quibus totum vulnus adimpletum emplastrum applicat tenaciter hæreatis, & fasciam alligat, donec post horas aliquot sanguis subsiderit, cum stupæ clementer eximuntur, & adhibentur tenaculæ fortes & dentatæ pro numero vertebrarum, ut iisdem sufficienter apprehendantur. Sed maxima hic habenda cautela, ne propter nervos ex medulla spinali ad latera vertebrarum proidentes incisio nimis fiat profundè, nec operatio instituitur viribus ægri jam lapsis, sed ab initio statim morbi, priusquam ulla inflammatio aut intumescencia partem affectam occupaverit, quapropter in progressu morbi nimis præcipitanter ad hanc operationem non est transeundum, ne ægri absque iuvamine cum morbo plus adhuc crucientur atque artis subditiæ penes vulgum veniant in despectum.

*Gibbi.*

*Gibbi* curatio consistit iudem in repositione luxatarum vertebrarum, sensum premeundo vertebrae, & illas manu in pristinum situm restituentes. Cum vero id utplurimum longo denum

tempore fieri possit, intendum est instrumento ad id opus apto, quod continuò parti adherens successivè premat, (interpositis variis linimentis acidum temperantibus, & coagulatos humores dissolventibus) hinc paratim thorax ex charta forti, vel ossibus cæci, (*Sichthener* Brust) vel corio picato, vel, quod melius est, ex ferri iaminâ panno obductâ, partem gibbosam premeus, à latere verò simul debent vincula annexi, quibus artus stringi possunt, vel ex ferro pollicis trochleæ (*Schrauben*) parari, ut de dein diem artus constringantur. In delicatulis panneus thorax, cui lamina ferri vel plumbi insuitur, applicari potest, quales thoraces optime novit conficere *Dn. Fay* Cranenburgeris, & Chirurgus *VVedling* Hanovienis, atque in hac civitate *Callisellus* *Dn. Miling*, qui gibbosos quoque vinculo idoneo ad tempus suspendere novit, ut vertebrae restituantur, de qua suspensione confer. *Glisson*, p. m. 400. ubi ita refert: Artificialis corporis suspensio perficitur ope instrumenti cupisdam pensilis ex fasciis eâ arte formati, ut pedus sub axillis complectatur, caputque sub mento aliâ fasciâ circumdet, manusque binis anlis exapriat, unde corporis omnis partium à pueri manibus, partim à capite, partim ab axillis in aëre pendulum sustinetur, ita ut ab adstantibus non sine voluptate huc illuc impellatur. Hoc exercitium genus multis modis in hoc affectu conducere et dicitur. Etenim ad ossa curva restituentia, ad articulos deflexos erigendos, ad curvam corporis staturam elongandam, conferre promittitur, idemque quod alia præstant exercitia perficere, succis liberiores motum concedendo, atque uberiorem alimentum ad partes externas primoque affectas distributionem promovendo, pullosque huic exercitio assuetos voluptatem potius, quam molestiam inde percipere; sed non, uti iactant, magnam ex hac suspensione commodum vidimus. Nos meliorem novimus luxatas vertebrae restituenti modum, & non ita pridem duos juvenes Comites gibbosos feliciter restitimus. Aliqui, ut magis dilenduntur partes, calceus plumbeos pedibus adaptant, & contractori corporis lateri pondus adjuiciunt, quo facilius partes ad æqualem longitudinem extendantur. Hoc autem exercitium solis robustioribus competit, & sæpe absque ullo commo do instituitur. Varia quoque emplastra, linimenta nervina acidum & coagulatum dissolventia sequenti modo parata applicari possunt, emplastrum scil. nervinum, A. Emplastrum nostrum nervinum, vel sequens.

℞. Ol. N. M. expr. 3℥ss.

maslich.

oliban.

succin.

myrrh. aa. 3j.

Castor. 3℥.

℞ li alb. 3ij.

Cera

picis naval. aa. 3℥℞.

M. F. emplastrum.

Oleum limbricor. cum axung. human. & castor. ol. N. M. vel insus. arthritic. balsam. meus nervinus externus, optima sunt remedia spinæ dicata, ut per hanc fluentes spiritus debiles vel coagulati reficiantur, & ad motum celebriorem incitentur.

In Spina Nodosa ante omnia ad primas vias Spina respiciendum, ut digestio rite perficiatur, & chylus

chylus nutritioni destinatus optimè præparetur & ritè distribuat, dein ut spiritus animales, tanquam succi nutritii distributores, recreentur. His indicationibus satisfaciunt omnia nervina balsamica, acidum scilicet temperantia, ut Balsamus nervinus Schæfferi, Elixir nostrum stomachale, Romanum. Hic & conducunt omnia volatilia oleosa, & curari debet hic affectus eodem modo, quo superius scrophulas, seu glandulas induratas tractavimus, uti enim ibi glandulæ sunt à spissis & crassis humoribus obstructæ, sic & hic ossium pori sunt obstructi, & propterea omnia opera aperiendi, insimul acidum obstructionem hanc pariens absorbendum, liquor ergo C. C. fuccinatus, ☉ volat, oleosum, omniaque diapho-

retica egregia remedia sunt interna, quibus & pro re nata incidentia interponenda sunt præsertim amara quæcunque.

Externè quoque varialinimenta & emplastra resolventia applicanda sunt, sicuti etiam conveniunt omnia spirituosâ, & omnia illa, quæ commendavimus in glandulis induratis & scrophulis, ut sunt spir. sambuc. theriacal. camph. Spir. vin. camphorat. imprimis cataplasmata ex herbis cephalicis & nervinis cum spirituosâ parata: & cum hic affectus rarissimè occurrat, prout hæcæmus tantum unicum exemplum in praxi nostrâ occurrit, nolumus prolixiores esse, ne tempus inutiliter teramus.

## CAPUT VIII.

## De Costarum Luxatione &amp; Fracturâ; item Mucronata Cartilaginâ Prolapsu &amp; Incurvatione.

## §. 1.

**D**ignum sanè est observatu, quod scribit *Fernel. lib. 5. Pathol. c. 12.* & confirmat *Sylvius*, palpitationis cordis tantam esse vim, ut sæpe sit animadversa thoracis vicinas costas effregisse, sæpe & eas, quæ supra mammæ sunt, de propria sede depulisse, unde patet, quam facile costæ luxari possint.

*Costarum Luxatio.* Est autem *Luxatio Costarum*, quando ipsarum capita ex situ suo naturali remouentur à vi vel externa, vel interna.

*Fractura.* *Fractura Costarum* dicitur, quando illæ ab inflexi vi, tum externâ, tum internâ, discontinuatæ franguntur.

*Mucronata cartilago.* *Mucronata* quoque *Cartilago* solet aliquando *prolabi* & incurvari, qui affectus mulierculis quibusdam dicitur, & quidem male, *Cordis compressio*, hæc enim cartilago si nimium intorsum prematur & incurvetur, subiectæ partes læduntur, hepar maximè & ventriculus, infantesque atrophia pereunt, quia inde valæ comprimuntur, ut humorum circulatio impediatur, quæ cessante necessariò & nutritio cessare debet.

*Pari affecta.* §. 2. *Pari affecta* sunt illa ossa, quæ ad latera vertebrarum dorsii sunt, & dicuntur *Costæ*. Superficies costarum externa aspera est, quæ vertebres alligantur, quia inde prodeunt ligamenta alligantia, ibi verò duobus donantur tuberculis, quorum primus articulatæ sinui vertebræ, secundus jungitur vertebræ processui transversio. At inferiores quinque simplicitatibus junguntur tuberculo. Hic notandum Chirurgis, in paracentesi, quæ fit, seu superius dictum, inter 5. & 6. costam, eam influcndam esse à summo ad imum, non contra, ne venæ, arteriæ, nervi, qui sunt in infima parte sinu, lædantur. Cartilagineæ sunt hæ costæ plerumque prope sternum, circa quod & ab Anatomicis aperiri solet Thorax, non verò prope dorsum, ubi ossæ sunt. Utplurimum utrimque sunt duodecim, in utroque sexu, aliquando tamen tredecim imò, Limburgi in viro quatuordecim observavi. Dicuntur aliæ spurie, aliæ veræ, de quibus videantur Anatomici.

Sternum verò seu os pectoris in anteriore Thoracis parte costis incumbit & inferniur quasi, unde & Anatomicis dicitur Sternum, aliis officium ventriculi, nonnullis cartilago eniur-

mis, quibusdam os gladioli vel ensiforme, item cartilago mucronata dicitur. Cavitas hoc in loco extrinsecus apparens dicitur fovea vel scrobiculus cordis. Non possum hic me temperare, quin reprehendam Anatomicos, quod uni rei tot imponunt nomina, quæ adeò magnam pariunt confusionem junioribus Medicis ut tempus inutiliter terere, imò memoriam suam torquere debeant ea omnia sibi imprimendo, quæ tamen in praxi aut nullatenus, aut parum existunt proficua.

§. 3. In *Luxatione Costarum* ægri conqueuntur de dolore satis valido in regione ipsius luxationis, nec se flectere possunt, costæ enim ex sede sua prolapse, subiectam pleuram aliasque partes membranaeas comprimunt, unde dolor vehementissimus, qui sæpe adhuc majus incrementum capessit ex eo, quod in tubulis partium compressis & distortis humores stagent & acecant, atque ita velli cent fibrillas. Quod verò se ritè flectere nequeant ægri nostri, ex eo provenit, quæ caput costæ è cavitate propria propulsum non gaudet, ut antea, loco cavo, qualis ad motum ejus obeundum requirebatur, hoc enim facit, quod spiritus animales per tubulos ab humoribus stagnantibus, sanguine etiam evalato obstructis & ab ossè dislocato compressis, musculus intrare eosque inflare nequeant.

*Fractura Costarum* apparet ex superficie inæquali, dolore, tumore, & nonnunquam inflammatione, imprimis si præcesserit causa quædam violenta, puta ictus, casus ab alto &c. Sumimus enim cognitionem à causis violentis, & à casu vel gravitate contudentis corporis, & à relatione ægri vel astantium, quod scilicet dum cecidit, maximum strepitum vel æger ipse, vel adstantes persenserint.

*Mucronata Cartilaginis Prolapsus & Incurvitas* ipsis oculis patet, adest simul respiratio difficilis, & propter obiectum os ventriculi continua pressio stomachi, ac dolor instar cardialgiæ.

§. 4. In *Causis* constituendis *Luxationis Costarum* omnes unam eandemque fovent sententiam, *secundum Galenicum* rem quamvis agnoscunt violentam, per quam Costæ à loco suo protrudantur, quales sunt casus, percussio, jaculatio vehementes & of-

& offensio corpore gravi & valido, dein acetabulorum laxitas & nimia lubricitas, ut costarum capitula facile queant eicere.

*Fractura Costarum* causas easdem agnoscunt, siue enim percussione, siue iaculatione, siue casu costæ ad corpus aliquid durum alliduntur, earum diffractionem inde accidere posse profitentur.

*Cartilaginis Ensisformis Prolapsus* seu *Depressionem* oriri putant tum ab humore quodam interno tenui aut crasso circa ipsam collecto, à quo nimium laxetur, tum à rebus externis violentis, casu nempe, ictu, corporis nimia extensione, distortionem aut circumvolutione, à quibus singulis situs hujus partis queat mutari.

*Paracelsus*, §. 5. *Paracelsus* morborum horum nullam aliam agnoscit causam, quam externam violentiam, vel ossa hæc extra debitum suum locum aut situm expellenti, vel detorquentem, vel omnimodo frangentem.

*Helmontius*, §. 6. *Helmontius* priorum dictis hoc in loco non contrariatur, sed ab externo quodam intruente violento & Costas luxari, & frangi, & Cartilaginem Ensisformem deprimi posse fatetur.

*Willisus*, §. 7. *Willisus* se in omnibus hic præbet consentientem, & ad unam omnes morborum horum causas à prioribus relatas admittit.

*Sylvius*, §. 8. *A Sylvio* eadem de morbis h'ic verba prolata percipimus, omnia ad casum, percussionem, depressionem, aut aliam quandam violentiam externam tendentia.

*Cartesius*, §. 9. *Cartesius* easdem approbant causas, ad dentes solummodo, *Luxationem Costarum* ab externo infortunio tum frequentius contingere, quando acetabula vertebrarum à copiosiori lymphâ eadem circumfluente magis existant lubrica, ut capitula costarum facilius iisdem expelli queant, *Fracturam* verò, quando Costæ acetabulis istis firmius adhaerentes, rigidiore sint, ut ab occurrente re duriore vel juxta longitudinem, vel transversum ab unitate sua dissolvantur, nonnumquam unâ cum contusione partium cartosarum & membranarum easdem obtegentium, nonnumquam absque illâ, *Cartilaginis ensiformis depressionem* & incurvationem frequentius ab ipsa pressione adversus rem duram contingere volunt, quam molities hujus cartilaginis & copiosior ejus irrigatio à lymphâ & succo chyloso facile promoveat.

*Nos*, §. 10. *Nos* illorum accedimus sententiæ, quibus causæ *Luxationis Costarum* vel extrinsecæ vel intrinsecæ constituuntur. Externæ evidentes sunt, ut ictus, percussiones, casus & distortionem, & quicumque motus validus & violentus. Internæ sunt plurimæ; sic humor crassius & visis suis elapsus ita violentia luxare facit costas, ceu nuper exemplum novi in viro 30. annum nondum egresso, cui à sero evasato, vulgo dicto catarrho, costæ sexta fuit luxata. Sic & tubercula circa ligamenta excreverunt, & costam detruunt, maxime verò hoc fit in vertebra dorsi, in quibus fit gibbositas juxta *Hippoc.* 2. de artic. 6. ubi ait, quod abscessus & inflammationes profundæ faciunt luxationes, quia tumores faciunt & premunt partes, ita ut ad contractionem ligamentis ipsis luxatio obveniat, mucosus enim humor, puta lymphâ ipsius copiosius collecta circa ligamenta costarum in causâ est, ut laxitas oriatur, & consequens costarum luxatio.

Causæ *Fractura Costarum* ferè eadem sunt, *Fractura* plerumque extrinsecæ, (cum rarum sit, quod à palpitatione forti fuerint costæ ruptæ:) videlicet omne corpus durum, violentum, grave ac contundens partes ossæ, vel casu hoc accidat, vel alio modo, non refert: *Fractura* hæc contingunt vel cum inflammatione, vel ulcere, vel vulnerem, ut ab ictu sclopetorum, cum prominentiâ costarum, cum convulsione, cum gangranâ, aliquando cum luxatione, quæ omnia ex capite generali luculentius & accuratius sunt petenda.

Causa prolapsæ & incurvatæ *Cartilaginis ensiformis* est abundantia lymphæ cum succo nutritio copiosiore ad partem hanc profusæ, à qua cartilago hæc nimis emollitur, & à fortiori aliquid tantum petacta inspiratione, aut externâ quadam vi superveniente, aut è pristina se de propellit, aut interiora versus comprimitur.

§. 11. *Luxatio Costarum* difficilius pristino *Prognosis*, loco restituitur, at non magnum periculum infert, & sæpe absque incommodo ægri vitam degunt. Pessima illa est, quæ fit cum *Fractura Costarum*. Sic si diutius fuerint luxatæ costæ, cavitas illa expletur muco, & impossibilis est restitutio.

*Fractura* verò *Costarum* ut & *Prolapsus* ossis pectoris majus inferunt periculum, quia substructa viscera & reliquæ partes solidæ facile premuntur, hinc propter obstructionem inflammantur & sphacelantur partes hæc obstructæ, & vitali suo alimento ex motu succorum impedito destituta. *Harvæus de generat. animal. exerc.* 52. p. m. 300. costarum proponit *fracturam*, in qua suppurato abscessu tantus permansit pectoris meatus, ut pulmones & cor videri ac tangi potuerint.

§. 12. *Videtur* & in his affectibus externis *Diaeta*, accuratè observanda est. Aër ambiens frigidus summopere fugiendus. *Hippoc.* 3. de *Fract.* 12. in omnibus luxationibus & fracturis cum & sine vulnere utitur victu admodum tenui; quod & confirmat *Celsus* l. 8. c. 30. unde sola jusscula avenacea & hordeacea cum pane albo concedunt, tenuis enim talis victus inflammationem inhibet & febrem impedit. Si febris verò cellaverit & inflammatio non metuenda, ad victum mediocrem, ad humectantia & liquida accedendum. Imprimis fugiantur omnia acida, quæ majorem coagulationem humorum efficiunt, ut vinum mustum & cerevisia non bene cocta, vinum austrium; convenit autem decoctum vulnerarium nostrum ex alcalibus paratum, item potus Theæ. Somnus & vigilæ, motus & quies sint convenientia, ne vis humoribus inferatur, omnia sint pacata. Animi affectus sint moderati, ira & animi quæcumque commotiones vehementiores sint fugandæ, quia humores vel coagulant, vel increscant, hinc omnia in deteriora ruunt, & mors aliquando acceleratur, ob nimiam coagulationem & stagnationem humorum vel succorum corporis nostri. Venus fugiatur, & alvi excrementa altero die sunt cienda & evacuanda.

§. 13. *Galenus* in *Costarum Luxatione* præci- *Galenico*, quam locat operam, ut in pristinum locum fiat rum mo- repositio, & simul inflammatio vitetur, & jam præfens tollatur vel oleo rosaciâ omphacino frequentius illito, vel emplastro diachylo imposito. Pro diversitate verò *Luxationis* etiam repositionis variant modum, quando enim versus superiora costæ extra situm suum discesserint, vel manibus, vel locatione ægri super januam, capitulum elapsum tandem premunt, donec descen-

scendat & ad debitum situm revertatur. Vergente verò costâ versùs inferiora, agrum versùs anteriora hic incurvare jubent, brachium aut manum genu imponere, & eadem manu per impositionem istam corrobora't costam elapsam comprimere, quò situm priorem & convenientem repetat. Ad interiora & anteriora tandem dilabantem costam emplastris atraherentibus loco cavo super costam istam frequenter impositis, & aliquoties vehementius revulsis adducere tentant, & in debitum situm reponere.

Fractura.  
rati.

In Fractura Costarum solliciti sunt, ut partes fractæ denuò adjuvantur & componantur, propterea agro spiritus retentionem in ungunt, vel tussim, ut hoc modo versùs interiora deprellæ partes ad exteriora propellantur, quam reductionem & manuum operâ & emplastrorum inpositione adjuvant, inflammationem autem arcent venæsectione, quam necessariam quoque æstimant in contusione ad removendam obstruam, humores nempe ad partem læsam affluentes, virtute sua revollunt, dein linimentis & emplastris jam cognitis. Fragmenta ossium membraceas partes pungentia per incisionem eximunt, ne ingentes inde exoriundi dolores peiora adhuc accersant symptomata. Cucurbitularum inpositionem non omnes approbant, inuentes per humorum attractionem costam fractam magis adhuc deprimi, quapropter uti maluit lana oleo calido intincta, & cerato parnis fasciisque leniter adstrictis, ut ita simul compleantur partes desidentes, vinculum reddatur æquale, sique os thoracem versùs expulsum paulatim ad cutem revertatur: ubi simul observant, ut fascia media omnium primò deligetur, atque hoc modo præcaveatur, ne cutis ad alterutram partem debito magis declinet. Si neglecta hæc ligaturâ contigit, ut caro reddita fuerit mucosa, eandem ad os usque adurant, ut siccus ille glutinosus dissipetur, cui tæ medicamenta non credunt sufficere, & hanc ultionem necessariam quoque esse movent, quando caro collisa abiit in pus, ad exitum illi parandum, ubi ad omnimodum ejusdem evacuationem interea linimentum lin devinctum foranini imponunt, ut facile queat educi, neque ulcus exasperetur. Unionem costæ promovent per calum emplastris ad fracturas ossium confectis, & vulnus communi more ad consolidationem disponunt.

Cartilagin.  
nis Ensi-  
formis Pro-  
lapsum.

Cartilaginis Ensisformis Prolapsum corrigere & in statum debitum restituere aggrediuntur, tum cavendo humorum influxum, & imminuendo plethoram institutâ venæsectione & victu tenui, tum inpositione cucurbitulæ superius perforatæ cum levi flamma, loco prius butyro insulso illito, ut præviâ hæc emolitione cartilago facilius flectatur, quo obtento cartilaginem firmant vel fomentis ex balauistiis, Nucib. Cupressi, mastiche, thure in vino nigro coctis, vel emplastro ejusdem speciebus cum resina & cera parato.

Paracelsi  
morbos  
hæse tra-  
dendi  
ratio.

§. 14. Paracelsus in Costarum Luxatione restituentâ nullam aliam proponit methodum, quàm qua in aliis dislocationibus curandis utitur, eamque alibi aperiemus.

Similiter Fracturas Costarum eadem tractat ratione, quâ reliquorum ossium; in Prolapsu verò Cartilaginis Ensisformis tacito quodam consensu præcedentem processum approbare videtur.

§. 15. Helmontius Costarum hæse morbos aliis manuali operâ tractandos permittit, interdo morbu  
hisce cu-  
randis  
opinio.

nis verò remediis in Fractura exhibendis præfert radicem Consolidæ, quâ sola fracta ossa felicissimè conjungi experientiâ fuit edoctus.

§. 16. Wilsius repositionem Costæ luxatæ necessariam prædicat, & repositæ confirmationem, ad quas operationes eodem plane utendum esse judicat apparatu & processu quo Galenici officia sua commendaverunt.

Ad Fracturam Costarum debitè curandam partium juncturâ unionem requirit, & ad eandem citiùs obinendam obstruclorum remotio-  
nem, quare frustula ossæ dolorem & inflammationem excitantia removeri vult factâ incisione, & emplastro ad fracturas curam abolvere, exhibitis, si iisdem opus esse perspicitur, potionibus aliisque remediis vulnerariis.

Cartilaginis Ensisformis, sive Ossis Sterni Depressionem nonnunquam & humerorum & costarum compressionem indigere existimat, in agro supino & dorso pulvinar subiectum habente instituentâ, ut cartilago hæc ratione denuò attolatur, usurpatis simul linimentis quibusdam emollientibus & anodynis, & adhibitis plagulis & fasciis super humeros decussatim ligandis.

§. 17. Sylvius in Costis luxatis ipsam instituentem præcipit repositionem modo convenienti, pro luxationis diversitate, & repositarum confirmationem; fractas verò & unionem & compressionem repositæ asserit, uti Cartilaginis Depressionem ejusdem in priorem situm repositionem, sive per costarum & humerorum compressionem, sive cucurbitularum ipsi cartilagini inpositionem ista facilius queat obineri.

§. 18. Carsesiani diuturniorem cunctationem in Costarum luxatione admodum pronunciant periculosa, & repositionem earum quanto magis subent instituendam, eodem planè modo, quo Galenici pro triplici Luxationis diversitate eandem celebrandam esse edocuerunt, quam nostri hi maximè approbant, & ne quid lucis obtubulos & canaliculos in figura & situ mutatos impedimenti procreet stagnatio & coagulatio, eosdem diaphoreticis, diureticis & dissolventibus in fluorem debitum redigere student, subjunctis volatilibus liquorem nervosum augentibus & motum ejus promoventibus, ut tubuli deprelli comòde insentur & attollantur.

Costas fractas sanari promittunt solo emplastro quodam ad fracturas, aut cataplasmate ex radice symphyti, quando nempe fractura existat simplex, absque ulla contusione & inflammatione, cum malis verò hisce conjunctâ majorem reposcere curam fatentur, & non modo remedia interna diaphoretica & post hæc volatilia ex Tinctura Hyperici, Spiritu lumbrior. &c. C. exhibenda esse, sed per incisionem frustula ossium separata eximenda, & partium carnearum & membranearum aut præcavendam esse corruptionem per Spir. Vini camphoratum, crocatum & Vam Ψæ, aut si hæc præcaveri nequeat, per supurationem eadem à portione sanâ & integra esse segreganda, tum partes costæ fractæ uniri mandant, eam, quæ extra prominet, manu in situm debitum reponendo, quæ verò ad interiora vergit, & spiritus retentione ab agro propellendo, & manuum operâ à Chirurgo debite



bitè locando, aut emplastro glutinatorio imposito & vi abstracto in locum debitum revocando.

*Cartilagi-  
nis Depres-  
sionem.*

Ad *Cartilaginis Enliformis Depressionem* facilius corrigendam fottus ex herbis majorum. rorismaria. ferpill. flor. Camomill. Cort. auran. sem. Coriand. facculo inclutis & in Spir. Vin. calido maceratis non parum juvaminis allaturus confidunt, quando scæculus ite per tempus ster- no depresso imponatur, & tum cucurbitula cum flamma imponatur, ægro supino decum- bente, & ẽ regione partis depressæ cylindri- lingo dorso ejusdem subjecto, & simul humeris & costis circa latera compressis, donec cartilago hæc decedens debetè rursus colloccetur, quo ob- tento oleo mastichino locum illinunt, & empla- strum ex eadem pro majori corroboratione ei- dem imponunt.

*Notra sen-  
tencia de  
curations  
Coffarium  
Luxatio-  
nis.*

§. 19. In *Coffarum Luxatione* etiam noſtra ſententia omni opero antenidum, ut priſtino reſtituantur loco, rarò enim ſponte reſtituntur, ceu obſervavit *Bartholinus Hiſtor. Anatom. Cent. 1. Oſſ. 22* Communi methodo reſtitui ſolent coſtaſ impoſito emplaſtro glutinatio, quo Chirurghi cutem cum coſta elevat & ſic reſtituit, atque hæc operatio facilè quidem peragitur, ſæpè tamen obſervavimus, quo Chirurgi exiſtimant, fuiſſe coſtam reſtitutam, cum tamen non fuerit, interim ita occaſſuerit, ut æger per dies vitæ nullam moleſtiam inde ſenſerit. quia Crea- tor Optimus maximus tot coſtiſ corpori proſpexit, ut una luxata, altera officium faciat, & ad motum omnes coſtæ requiruntur, non verò una ſola. Tumores & inflammatio huic affectui obvenientes facili Marte convenientiſſ. remediſ curari poſſunt, reſtituit enim coſta ſæpe ſponte abeunt. Ne verò de ſede ſua iterum excidunt, varia imponi poſſunt emplaſtra modicè reſolventia coagulatum humorum, ut ſunt emplaſtrum nervi num, noſtrum polychreſtum, paregoricum, diachylum, de ſpermate ceti. &c. & ea quæ parum adſtringunt, ut Emplaſt. de Terra Catechu.

**Бразилия.**

In *Fractura Costarum* omni operâ eò annitendum est, ut simul pars exterior locum ordinarium prominens in eundem reprimatur, & partes illæ junctæ aduniantur, ad quod sæpe manûs operâ indiget æger, potissimum si portio quædam versus exteriora promineat, spiritus autem retentione ipsæ æger restitutionem istam promovere potest, si ad interiora pars costæ diffractæ vergere percipitur. spiritus vero hæc retentione & conatu ægri interno colant propellendi non sufficienti, emplastura apponimus glutinaciorum ex cerebinthina & gummis, quo violentius avulso, pars illa depressa in locum debitum reprimi-

tur. At si fractura non fuerit simplex, sed cum magna contusione iuncta, & partes olæ acutæ fibras partium membranosarum pungant, vellicent & partes carnes vulnerent, tubulorum destruant, & motum succorum pervertant, sicque inflammationem accendant, ne maior obveniat succorum stagnatio, & ob repletionem tubulorum partes laxæ premantur, & hæc ratione dolor reddatur vehementior, venæsectionem existimamus non modò inuicem inutilem, sed planè necessariam, quia hæc non morbi causam amovebit, sed tantum symptoma, nempe dolorem mitigabit: & post hæc remedium diaphoreticorum usum, simul etiam prævia incisione partes olæ separate acutæ sunt eximendæ, aut rasorio quodam cistello prominentiæ angulares hæbetandæ & la vigandæ, ne fibras partium mollium ulterius pungant & tubulos destruant. Ad plenariam denique partium Costæ reduciarum consolidationem apozemata vulneraria frequentius mediocri dosi assumpta, & emplastrum aliquod ad fracturas alias consuetum externe impolitum non contemnendam agris hisce præstabit utilitatem.

Offis Sterni, five Cartilaginis Ensiliformis Pro-  
lapsum aut Depressum hoc modo optime tra-  
ctari censemus, ut post forum ex herbis nervinis  
et inunctionem linimenti emollientium, nec  
non exhibitionem internam remedium sangui-  
nem coagulatum resolvendum, et succorum  
stagnationem prohibentium aliunde jam cog-  
nitorum, æger supinus corpori cuidam duriori im-  
ponatur, hinc humeri inferiora versus depri-  
mantur et costæ hæc illuc moveantur, donec pars  
depressa pristinum locum repetisse observetur,  
quo obtento emplastrum aliquod obfirmans  
adhibeatur, quare sequens *Barbette* admodum  
proficuum hoc in casu existit.

by. Rad. bistort.

*Nuc. compress.* 22 3j.

*Maſtich.*

Thur. 22

*Balanst. 2j.*

Ol. Nuc. 3iff.

*Picis naval.*

Terebinth, a

*Fiat Emplastrum.*

sufficiente verò con

Non sufficiente verò compressione istâ humero-  
rum, & costarum utrimque agitatione, cucur-  
bitæ cum flamma applicatione non modò ap-  
probamus, sed si una vice voto non fausfecerit,  
ejusdem repetitionem seriò suademus, atque ut  
tamdiu in loco isto detineatur, donec & æger &  
Chirurgus operatione istâ scopum suum saluta-  
riter attingat.

CAPUT IX.

*De Mammillarum Tumore, Inflammatione, Oedemate, Scirrho,  
Emphysemate, Cancro, Magnitudine indecorâ, Foveâ  
Et Ulceribus.*

§. I.

**C**um varia morborum genera variis certè dirisque insultibus fequiorẽ sexum omni atate, omnique tempore multigena reverà Factorum expositum forti & violentiæ invadant, permultas satis atroces & ferè horribiles

adinvenimus aggressiones, quæ ipsi tum celi-  
bi tum conjugato & gravido circa sua gestationis  
incerta dubiæ eventus tempora, propriis  
partum ipsum obtingunt. Hæc quot variis  
tum internis tum externis causis, quot diffi-

crimibus vitæ obiectus: Sed confusus omnem charybdin evasisse & planè evasisse, ecce in scyllam haud raro unam alteramque deplorabilem incidit, quarum non minimæ nobis videntur

Mamma-  
rum Tu-  
mor.

*Mammillarum Tumores. Inflammatio, Oedema, Scirrhus, Empysemata, Cancer, Magnitudo indecora, Fovea & Cicera*, quos affectus externos ordine, & quidem ad methodum nostram jam inceptam paululum intimius spectemus, ut eos non tantum clarè & distinctè dignoscamus, causasque sciamus, sed & illos curare noverimus. Antequam autem ulterius procedamus, necessum erit in tyronum gratiam, ut ab ipsa affectuum voce & descriptione exordiamur. *Tumor* itaque Mammillarum est ipsarum magnitudo aucta & inæqualis, à stagnatione humorum in glandulis propriis & ipsarum motu per partium meatus & tubulos impedito, lymphâ nempe acidâ stagnante, aut lacte ab acido concreto ut plurimum productus.

Inflam-  
matio.

*Inflammatio Mammillarum* dicitur, si in externa facie mammillarum conspicitur renitens tumor cum pulsatione dolorificâ, quæ si mitior, *Oedematodes* communiter cognominatur, cum tamen sit verum *Oedema*, non enim dicitur *Inflammatio Oedematodes*. Alii differentiam faciunt inter inflammationem & Erysipelas; quum verò nos neque Inflammationem à sanguine, neque Erysipelas à bile derivemus, sed à succis acris, talis & acidis stagnantibus, hinc affectus huiusmodi nostro iudicio secundum magis & minus inter se differunt.

Scirrhus.

*Scirrhus Mammarum* est Tumor earundem durus renitensque tactui, ex coagulatione lactis diuturniore: sæpe & sanguinis aut chyli crudioris ab acido viscosi inducta obortus.

Empysemata.

*Empysemata Mammillarum*, nostro iudicio, nunquam datur, sed ad *Oedema* referri debet, vulgus tamen inflationem ex flatuosi spiritus copiam in mamma collectâ obortam dicit.

Cancer.

*Cancer Mammillarum*, est tumor earum ab acido corrosivo inique fortis se habente, circa inammam sibi imperum rapiente, & tandem glandulosa hæc loca devastante, corrodeute & corrumpente obortus.

Fovea.

*Fovea* est, ubi plures fistulæ in Mammis inam foveam faciunt, à particulis asperioribus succum humectantem absumuntibus, & cutem rigidam reddentibus dependens.

Vicia.

*Vicia Mammarum* est solutio ipsarum unitatis à lactis, vel proprii alimenti, vel lymphæ, aliarumque succorum in acido acri producta.

Magnitudo indecora.

*Magnitudo indecora Mammarum* est tumor earundem à nimii succi albilis congestionematus.

Pars afflicta.

§ 2. Recto tramite descendimus ad subiectum. Mammæ itaque numero geminæ sunt, communi tegumento munitæ, quas fontem sanctissimum corporis, generis humani educatorem *Favorum*; apud *Gellium lib. 12. cap. 1.* vocat, sicut in utroque mediis pectoris latere, quasi electo loco non venustatis duntaxat, sed potius infanti lac commodius suppediendi gratia. Consistant ex sufficienter requisitis omnium generum vasculis, propaginis scilicet arteriarum, venarumque à subclaviis axillaribus & mammariis in eisdem per interiora multiplices ramulorum serie dispersis, & nervis thoracicis, cum à quinto, aliis quarto pari, cum à plexu circa claviculas & aliunde undiqueque planè innumeris ad papillam

usque disseminatis, sic & tubulis sive venulis lactiferis membranaceis flexuosis, instar aut labyrinthi, aut mæandri, per totam illam substantiam distortis dissipatisque, ac ad ordinatos papillæ siphunculos, ex illis lac conservatum promentes, copiosâ ramificatione excurrentibus constantes, figuræ foris hemisphæricæ, ad pediculus verò planæ quam substantiæ mollis, ceteris omnibus tamen glandulis durioris, compactæ, continuæ, albilissimæ, spongiosæ, perviæ à parte ad partem, ac uniformiter versus papillam quasi duplicatæ, & in rugas deductæ cuticulæ, unâ cum membranâ glandulosi corporis productionem acuminatî compages glandulosa conglobata sui generis cum modo dictis vasculis formosè efformat.

Diagnosi.

§ 3. Operæ pretium videtur, ut aliquantum brevissimis saltem, nostrorum affectuum signa pathognomonica generaliter præmittamus, quo hisce cognitis affectibus hi accuratius cognoscerent, ulterius indagari, feliciusque curari possint. Itaque primò *Tumoris Oedematosis* signa universaliter dicemus. Tumores *Oedematosis* sunt molles, laxi, digito prementi cedentes. Vetiugia diutius decident, & successivè denuò protuberant, indolentes sunt & abicantes.

*Inflammationis* verò Mammillarum signa præcipua sunt calor nimius in ipsis mammillis & in toto corpore, dolor, pulsatio, tumor, rubedo partis inflammatae, ejusdem tensio & renitentia, sicuti *ben Tjira* alibi hisce testatur: Quanto iniquius, membrum, in quo phlegmone, magis est nervolum, tanto dolor est major; & quanto magis carnosum, tanto minor pulsatio, & calor, & dolor. Varius autem pro diversis affectibus partis sede & humorum domino, observatur & subsequitur dolor, alius enim est internus, profundus, pruriginosus, ulcerosus, gravativus, punctorius, lancinans, urens, &c. Dolor & calor increfcens indicium est suppurationis, remittens & aliqua in parte mammillæ mollicies notat, pus subesse, nigredo, lividitas ac interdum graveolentia præagiunt corruptionem, durities tumoris remanens, diminuta tamen, arguit indurationem ab acido ortam.

Mammæ in quibus lac facile coagulatur, & coagulatum hæret, *Scirrhus* durum tandem stagnatione factâ contrahunt. Indolentes sunt hi tumores scirrhosi, hinc differentia apud Auctores Prædicos sequens inuiciter annotatur, quia *Scirrhus* dicitur vel indolens & legitimus, vel dolens & nothos, quia aut *Scirrhus* est aut non est. *Scirrhi* facilius is superveniunt, quibus sanguis in poris viscerum per acidum nimium vel fixius dictam materiam coagulans cumulat. In *scirrho* enim acidum coagulando materiam in duritiem redigit.

*Empysemata* cognoscitur ex flatuosa distentione. Stupenda illa fuit inflatio mammarum *Elisabethæ Trevers*, 24. annorum natæ, cujus mentio fit in actis Anglicis Anno 1669. mens. Octob. cujus sinistra mamma 35. librarum pondere fuit. Rectæ mammae circumferentia pedum 2. digitor. 7. sinistrae ped. 3. & digitor. 12. fuit.

*Cancer* Mammillarum sæpe ab initio vix ciferis aut pilis, aut castaneæ magnitudinem ostendit, cum haur ita pridem in virgine

gine hujus civitatis observavi, & successivè incrementum capit. Subiit parvoinitio tuberculum est durum nigricans, interdum lividum, punctiombus molestum, ubi verò increvit, est durum, coloris plumbei, dolet in principio moderate, in augmento vehementius, tandem exulceratur, ubi dolor est atrocissimus, adeo devoratio partium glandularum ac carnosarum vicinarum, scilicet musculorum pectoralium cum insigni ulceris fetore. In progressu adeo ardor pulsativus & quasi urens dolor, circa tumorem venæ nigro sanguine turgida sunt, quæ pedes canceri referunt, sanguinem sæpe stillat mamma cancro obfessa, respiratio maxime patitur, virgines senes & vitam sedentariam agentes, multum acidi in sanguine foventes hoc affectu facile infestari solent.

*Fovea* se facile præbet conspectui, est enim fistula sive cavitas major, latior & profundior, cui dolor sæpe jungitur.

*Ulcus* idem facile in visum nostrum incurrit, acidum enim illud corrodens sumit fibras & glandulosas partes mammillarum sensim sensimque absuntit & depascit, in his enim partibus ut glandulosis, aliquid acidi subtilis fecernitur, quod si lympham efficiat, continuatiora ac magis dolorosa, in eo corrosiva oriuntur ulcera, quæ facile degenerant vel in fistulas vel in cancerum.

*Magnitudo indolens* ex ipso quoque patet visu.

*Mitologia secundum Galenicum Mammæarum Tumorem.*

*Inflammationis.*

*Oedematis Scirrhi.*

*Emphysematis.*

*Canceri.*

*Fovea & Ulcerum.*

§. 4. Ad *Causas* morborum Mammillarum investigandas accessuri, ab expositione *Galenicæ* exordiemur, juxta quam *Tumor* partium harum natalis suos obtinet à diversorum humorum ad easdem influxum nimio & diuturniore in iisdem retentione, propter quam fungosa hæc substantia in tantum distendatur, & intumescat, nonnunquam etiam à congruuntione lactis. Pro diversis vero humorum constitutione, diversis orti dicuntur Tumorum species, ex quibus *Inflammatio* causam agnoscit sanguinem aut attractum, aut transmissum, atque vel suppressum & in mammarum venis capillaribus adhuc hærentem, vel expressum & extra venulas illas elapsum incalcescentem & putrescentem; & has internas causas aliquando promoveri asserunt ab aliis quibusdam externis, lapsu nempe in manus, percussione, frictione fortiori, scalatione aut vestium nimia constrictione, quibus omnibus sanguis tum alliciatur, tum ejus per venas influxus inhibeatur.

*Oedema* Mammarum originem habere credunt ab humore pituitoso molli & viscido, uti *Scirrhum* ab humore melancholico crasso vel per congestionem in mamma collecto, vel ex præpostera resolutione absumptis partibus tenuioribus ibidem relicto, & *Emphysema* ab halitu quodam crasso, vel ex mensibus suppressis, vel semine diutius retento, vel excrementis ad partes hæc elato, & easdem in molem majorem extendente.

*Cancerum* Mammarum ab atrâ & adustâ bile orti putant, dum vel à sanguine menstruo, vel aliis humoribus ab utero regurgitantibus & corruptis eadem quantitate sua augetur & in manus colligitur.

*Foveam* Mammæarum aliquando à tumoribus disruptis, vel fissuris pluribus à serosis acerbis humoribus inductis in unam majorem unitis, extortam fuisse observant; *Ulceræ* verò ab hu-

moribus acerbis & erodentibus pronasci, ut in aliis partibus, fatentur.

*Magnitudinem indecoram* Mammæ adipiscitur vel à mensium diuturniore retentione, abundante sanguine in partes hæc fluentem, vel à frequentiore earundem contractione, quæ sanguinis nutrientis copiosior alliciatur affluxus, vel à tumoribus variis, maxime à causis flatulentis ortum trahentibus.

§. 5. *Paracelsi* opinio de causis morborum hortalis percipitur, quæ *Tumor* Mammarum à collectione lactis fieri censetur diversimode ab aliis quibusdam humoribus eidem intermixtis, adeo ut sale quodam accedente arsenicali, *Inflammatio* sublequatur; sale verò plumoso fluxiones menstruales coagulante, *Oedema*; sale nitroso vel vitrioli in conos vel lapillos concretescente *Scirrhi*; & tandem ex sale quodam mercuriali magno exurgente statu *Emphysemata* producantur.

*Cancer* Mammarum juxta Autorem hunc provenit ex sale corrosivo fluxionum menstrualium, sive plumoso, sive arsenicali, à ubera deposito, à quo rubeus primò attollitur tumor cum propria maturatione, qui postmodum in ulcerationem transeat rubicundus latè radius expansis, & fetorem cum intervenientibus uredine, frigore, calore, doloreque diutius persistente concipiat.

*Foveam* & *Ulcus* à salibus deducit corrosivis substantiam carneam depascitibus.

*Magnitudinem* Mammæarum *indecoram* à nimio nutrimento ab Archeo in mammæ transmissio excrecere autumat, collecta ita copiosiori carnis materiâ.

§. 6. *Helmontii* Affectus hi Mammarum maxime partem à latice oriundi videntur, à cujus abundantia ad mammæ deposita & à pelle non allecta *Tumores* producantur indolentes & *Oedemata*; si verò Archeus ob diuturniorem ejus moram ad excaulescentiam provocetur, *Inflammatio* in signum furoris accenditur, *Scirrhi* generantur, dum pars quædam cruoris ad mammæ superficiem allecta inepta existit, ut in corpus volatile & transvolabile disponatur. *Emphysema* emergit, dum fermentum aliquod peregrinum latici vel cruori in mannis immiscetur, à quo gas productum flatulentum partes hæc in tumorem hujusmodi attollit.

*Cancer* sit, dum Archeus ob occasionem aliquam externam, sæpius contusionem in furorem se transplantat, quo carnem mammæarum topicè infestat.

*Foveam* & *Ulcus* in Manibus fieri vult ut in reliquis partibus, à sale nempe acro, quod latex in via admittit, vel à vento quodam intus genito, & malignitatem suam in externa parte plantante, vel à contusione aut vulnere male curato.

*Magnitudo indecora* Mammis contingit à copiosiore cruore nutriente, sæpius à frequentiore contractione in manus affecto.

§. 7. *VVilissii* Mammæarum *Tumores* varios à diversorum humorum in eas influxu produci cum *Galenici* docet, & quidem à sanguine valde in mammis effervescente & simul in transitu suo impedito, obstructione in valis earum atque ex ea *Inflammationem* excitari credit. *Oedemata* originem ab humoribus efflicte dicit crassis & viscidis in mammis effusis, atque in iis diutius hærentibus, *Scirrhi* partium harum causam existere vult

*Magnitudinem indecoram.*

*Paracelsi de causis morborum mammæarum opinio.*

*Helmontii opinio de causis hortalium morborum.*

*Injecta & Injuncta causa hortalium morborum.*

parti-



particulas salinas succi nervei spirituosis partibus depauperati, & alicubi in manimis stagnantis, quæ in fluorem degeneres, & consortia aliena in eunt multa corpuscula terrestria sibi adiscant, sicque in tumoribus istos duos coagulentur.

*Emphysema* Mammarum exoriri credit à diversis succis sanguini intermixtis, quorum exacta fieri nequeat mixtura, hinc ad mammas depositi varias incant effervescentias flatulentas, à quibus pars earum cutanea in tumorem attollitur, hosque flatus sæpe ex ipsis intestinis altum, & ad partes hæc delevi posse, aliis facilius concedit.

*Cancerum* Mammarum à levi occasione excitari posse proficitur, atque parvæ earum lesionis succedere, quoniam tumores atque ulcera maligni moris in partibus nerveis earumque emunctioris præcipue contingant, liquorem enim, aut, nerveum adeo depravatam, ut spiritu depresso particula ejus salina in fluorem degeneres, sibi in corporecula sulphurea adiscant, plane corrosivum evadere & stygium, eaque propter humore nerveo in transitu impedito alicubi in manimis stagnante, spiritu statim depresso aut volante, particulæ salinas à volatilitate in acorem degeneres consortia mox inire aliena, atque corpuscula sulphurea aut alia alius generis sibi in partibus in tumores congelari canerosos, sicque hoc ritu à liquore nerveo stagnante, & concretionem heterogeneam moliente tumoris velut mineram in manimis consilari, ejusdemque liquoris jugiter affluentis supplementa in partem vitiositatis indolem perverti, quibus etiam aliter accedere varias impuritates atrabiles à sanguine aliisque humoribus suffusas, quæ junctis viribus, veluti cum diversis sales ac sulphura confunctum desulfantur, efferationem augeant, atque in mammas affectis materiam septicam, ac instar aquæ stygiæ elcharoticam constituent.

*Foveam* Mammarum oriri statuit, vel à consumptione nimia humoris benigni, poros cutaneos partium harum aliis implentis vel ab intermixtis eadem humoribus vitiosis, multis prædictis particulis asperioribus lividiosis, à quibus profundiores succi effodiantur, & cutis cum cuticula amplius dehiscat.

*Ulcera* Mammarum ab iisdem causis induci ait, à quibus ulcera aliarum partium emergunt, sanguinem nimirum impuro, & multis particulis salinis corrodentibus repleto, à quibus continuas partium cutanearum in manimis dissolvitur.

*Magnitudo* Mammarum indecora derivatur à sanguine bono & multum nutriente, liquoreque nervoso copioso, sanguinem bene nutriendum magnâ copiâ apponente, qui liquor frequentiori contractione sæpe ad partes hæc alliciat.

§. 8. *Sylvio* præeunte *Tumor* Mammarum à coagulatione lactis ab acido factâ oriri solet, *Inflammatio* à sanguine evasato & ab acido itidem corrupto, *Oedema* ab humore pituitoso in manimis collecto, *Scirrhus* à pituita & lymphâ artius inspissatis, *Emphysema* à flatibus ex bile & pituita vitiosis in se invicem effervescentibus\* oriundis, *Cancer* ab acido valde acri glandulas mammarias lædentes, *Fovea* & *Ulcus* ab eodem acido continuum solvente, & *Magnitudo* indecora à sanguine multum nutriente & Mammarum substantiam adaugente

mas invadentium ratiocinium eò vergit, ut à coagulatione lactis copiosioris in mammas stagnantis à liquore glandularum mammariarum, seu lymphâ, multis particulis angularibus austeris imbutolactâ, *Tumores* eorum frequentius exoriri proficiantur, maxime verò hoc contingere sibi persuadent, chylo, seu immediata lactis materiâ, ex receptaculo suo multas particulas terrestres, salinas fixas & austeras, tum in ventriculo à cibo & potu crudiore, tum à succo pancreatico in tenui intestino acceptas, per arterias mammarias ad tubulos mammarum devehente, à quibus globuli lactei in motu suo impediuntur, itaque compingantur, ut tandem intotum quiescant, & stagnatione suâ transfusum alterius liquoris impediunt. Nec excludunt ipsi sanguinem & lympham, sed utriusque laxitatem & ad motum pigritiam mammas tumorem inferre posse dicunt, & hinc sæpe contingere, ut ex mensium obstructione mammarum intumescant, dum vaginæ extremæ & labiorum vulvæ arteriis obstructis sanguis ad mammas copiosius influat, ibidemque vitius detineatur, donec tandem ob acquiritam acceptionem coaguletur, & ad motum reddatur ineptus. Accessionem istam promovet nonnulla à cibo & potu acidis copiosius & frequentius assumptis, moreore & tristitia diuturniore alisque mentis anxietatibus, quibus succorum in corpore motus impeditur.

Dum verò à succis antedictis porri in tantum obstruuntur, ut soli rapidissime primæ elementum materiam concedatur transitus, *Inflammationis* & *Erysipelas* produci statuit, quoniam particula illæ æthereæ igneæ sunt dispositionis, fibrillas tubulorum mammarum valde agitanes, & propterea dolorem pulsantem & ruborem parti tumenti inferentes.

A lymphâ sale volatili & particulis porosioribus depauperatâ *Tumorem Oedematosum* nasci volunt, quatenus ob particulas ramosiores pinguiore & terrestres sibi invicem per quietem artius junctas, diuturniore stagnatione in tubulis glandularum coaguletur & inspissetur, ad cuius copiosiorum productionem vitam sedentariam non parum facere cum aliis fateantur.

*Scirrhus* ob copiosiores particulas terrestres, angulares & acidas austeras, atque salis volatilis abluitionem in tactulis ovalibus contentas, lac artius adhuc inspissantes oriri dicunt, quo fiat, ut mamma in lapideam nonnunquam mutari videantur duritiem.

*Emphysema* Mammarum secundum horum opinionem, emergit ex lymphâ particulis attenuatis, & in vaporem vertis, quæ cum per insensibilem transpirationem assiduò tenues evadere consueverint in auras, obporos tamen à crassioribus & spissioribus quibusdam particulis ocellis intra tubulos mammarum demanere coguntur, unde pro sublimitate, & ad motum promptitudine majus spatium querentes, cutem premunt, attollunt, sicque mammas protuberare faciunt.

*Cancer* Mammarum causam statuunt lac in sacculo uno vel altero mammarum proprio ovali corruptum, sæpe ex levi aliqua occasione externâ, contusione, lapu &c. quibus fibre tubulorum rumpuntur, aut contorquentur, ut transitum debitum invenire nequeat, sed in sacculis moram adeo diuturnam necesse cogatur, ut per eam globuli lactei destruantur, compingantur

Sylvio de causis morborum herniarum opinio.

Caricula.

§. 9. *Caricula* nunc de causis morborum mam-



gantur aut dissolvantur, atque in multas particulas acutangulas subiles abeant, tandem tubulos sacculorum destruentes & mammas evulcantes. Sanguinem quoque menstruum ob arteriolas vaginales uteri obstructas, aut propriam crassitatem retentum, in mammis auctum & corruptum, varias particulas acies ad glandulas in segregatione lymphæ, & lactis ad tubulos & sacculos lacteos mittere posse concedunt, à quibus variæ fiunt coagulationes & fibrarum destructiones, canerosos affectus immediate producentes.

*Foveæ.*

*Foveæ* Mammarum illis oritur à defectu lymphæ pinguioris, glandulas cutaneas humectantibus & inuagentibus. quare glandulæ illæ miliaris cum fibris rigidiores & sicciore evadant, quæ deinde à fortiori globulorum æthereorum illius facile queant dissolvi.

*Ulcera.*

*Ulcera* Mammarum eandem sœvent causam, quam in aliarum partium ulceribus sæpius iam manifestarunt, fibrarum nempe à fortiori liquorum evasatorum multis particulis angularibus prædictorum alluivirruptionem & destructionem.

*Magnitudinis incrementum.*

*Magnitudo* Mammarum indecens causam agnoscere iis videtur chylum bene nutriendum magnâ copiam tum ad alias corporis partes, tum ad mammas delatum, ideoque pingues & corpulentas etiam, grandibus præditas uberibus existeré dicunt; præterea contredactionem spiritus excitare referunt, ut copiosè per nervos in tubulos mammarum insiliant, & eosque distendant, & chyli nutriendis promoveant influxum, qui propter salinas, & acidas particulas temperatas juxta partes solidas quiescere incipit, sique appositione sui mammarum substantiam augere.

*Acidum judicium de causa Mammarum Tumoris.*

§. 10. *Nostro* judicio causa *Tumoris* Mamillarum cum in quocunque est flagratio ut plurimum lactis, eusdemque accrescentia; si enim tubuli in mammis fuerint vel à causa interna vel externa obstructi, necessariò lac vel chylus stagnare debet, hinc fit ejusdem coærcetatio & congestio, & partes distenduntur vel à tumorem elevantur. Cum jam in ergastulo hostes peregrini quasi conclusi, nec tam exiguo & coærcetato hospitio sint contenti, sibi ampliores efformant locum, eundem ratione effusionis, vi ferocior & effractionis quoad omnem dimensionem dilatando, distendendo, inque tumorem attollendo, aliquando enim mamma evadit dura instar saxi, & sæpe ad magnam excrevit molem. adeò ut nonnunquam exæquaverit pondus 6. aut 8. librar. prout notavit Celeberr. *Craun*, Fautor quondam noster colendus, nunc verò magno cum Medicinæ cultioris studiosorum delirio ad celestes sedes delatus. Huc faciunt cause externæ, imprimis aer frigidus, qui maximus coagulator lactis est; malè ergo faciunt mulieres lactantes, quæ mammas aëri exponunt frigido, facile enim sibi accersunt ejusmodi tumores, ob acidum nitrosum, quod in aëre observatur. Sic & de reliquis rebus vulgo non naturalibus dictis sentiendum, de quibus tamen generali capite de Tumoribus plura dicemus.

*Inflammationis.*

Causa *Inflammationis* Mammarum est acidum delitescens in glandulis Mamillarum. Particulæ acidæ illæ ibi hærentes, & ac fibrillas satis acriter scindentes dolorem non tantum producant, sed & à sanguine in valis capillaribus stagnante ob incipientem coagulationem ab acido provenien-

tem rubor oboritur. Sic quoque fit inflammatio materiæ cribrandæ culpa in propriis tubulis ac canaliculis, quæ cum impetu & pedetentim à viscidâ materia, tumoribus, vinculis, aliisque causis externis subsistit, unde fit, ut aliquo in loco procurrente æthere, fermentatiora quadam suborta partes subtiliores & magis spirituosæ, compedibus solutæ, corpus detelinquant & avolent, superfluites verò copia & viribus inferiores jam debilitatæ, fractæ, imò victæ, tandem etiam paulatim eliminantur, quare pinguioribus sublequi nitescentes, & à lalinis quibus oleosa facile junguntur, acidisq; detentæ ferocius agunt, & si intentius hisce acido salinis particulis allœciatæ, in se invicem agunt, sub eodem aggrediuntur, torquent, destrunt & inflammant ita tandem intestino hoc motu sedato, omniumque viribus fractis, harum particularum corruptio & putrefactio est generatio alterius, scilicet puris, pro sanguinis aut chyli corrupti varietate variè, in abicellum vel apostema degenerantis. Eo vero ipso, dum mammas has immanes hi hospites invadunt, unitatem dilacerant, propagines nervosas, tendinosas, membranaceas, cutem, aliasque partes sensibiles, ratione acrimoniæ, ex oleositate, sale acidoque animatæ prognatæ, pruritum producant, pungunt, lancinant, arrodunt, divellunt, quæ lesio perquam tristis & summe molesta in mammis, præsertim in incremento & statu, in aliis mitior ac benignior, ut in carnosioribus, profundioribus, sensumque difficiliorem habentibus, & declinatione particulæ hæ heterogeneæ sanguini commixtæ ejus mutationem turbant, sique febrem excitant, tanquam hujus affectus fidelem comitem. Oriuntur autem ut plurimum Inflammationes Mammarum post partum, quem sequitur magna sanguinis effusio loci horum nomine insignita, quæ producitur à secundinis, unde maxima copia sanguinis & chyli effluit. Principatæ & macilentæ magis hinc fluxui obnoxie sunt, quam quæ sæpius parturierunt; sæpe quoque frustulum ex secundinis in utero remanet & ex ejus corruptione oriuntur febres periculosissimæ, uti & ipse totus moritur in utero, & exinde oritur febris ut plurimum letalis, quod non ita pridem in tribus foeminis observavi. Hisce consideratis, facile quilibet percipere potest, quomodo lac in mammis à defectu novi chyli concretæ & stagnet, à qua stagnatione canaliculi mammarum obstruuntur, & ab hac obstruktionem nervuli comprimuntur, hinc spirituum impeditur motus, & per consequens effervescencia suboritur. Lac quoque stagnat, si non bene à succrice vel instrumento exlugar- tur. Huc quoque pertinet aer frigidus, si lactantes ei improvidè se exponant, ab aëre enim frigido succi circulares tardius moventur, hinc & lac fit crassius, & ad obstruendum tubulos aptus. Sic & non maritatæ hisce affectibus obnoxie sunt; tempore enim menstruali observamus mammas vel in vel detumescere.

Puerperæ & lactantes interdum *Erysipelas Erysipelas* Mammarum corripuntur, quod contingit ab aëre frigido acido, acidum in corpore augente, insensibilis enim transpiratione impedita insit *Erysipelas*, & quia affectus hi, cum multones dicuntur, inter se non differunt, plura non addemus.

*Scirrbus* Mammarum nascitur nostro judicio *scirrbus*.

ex coagulatione aut lactis aut sanguinis, aut chyli crudioris, vel utrisque in tubulis Mammarum ab acido intensiore fixo materiam lacteam coagulante facta. Huc quoque faciunt viscera, si in ipsorum tubulis lateat acidum quoddam fixum, quod delatum ad mammas faciliè ipsarum tubulos obstruere, & affectum hunc excitare potest. Sic Scirchi Mammarum facile fiunt ab Epithematibus nimis frigidis aliisque repellentibus incautè applicatis, per hæc enim pori magis obstruuntur, & materia magis coagulatur, quod omnibus Chirurgis apprime noandum est, ne ex Tumore Scirchi efficiant. Apparent autem Scirchi isti potissimum in mammis aurofarum virginum vel viduarum, imprimis quibus vel nimis mature, vel nimis serò in senectute menses fluere solent. Cum enim succi per ordinarium mensum cursum non sufficienter attenuantur & emittuntur, acidum in iis augetur, hinc faciliè fieri potest, ut ejusmodi particulæ vitiosæ in sanguinem ferverantur, quæ dein ad mammas tendunt & ibidem ordinarium lactis cursum impediunt, & si accedat incertor diuturnus, qui est causa, quod particulæ chylosæ sint crassæ & acidæ, quæ dein faciliè stagnant, nec à sanguinis aliorumque succorum motu propelli possunt. Et cum interim sanguis nullas contineat particulas spirituosas & volatiles, hinc & nulla effervescunt, & per consequens nulla commotio succorum fieri potest, unde succi crassi, non aliter ac caseus per compressionem, coagulantur, propter acidum autterum, quod in sexu hoc cū crassis succis ut plurimum offenditur. Volatiles enim particulæ avolant reliquis crassis, adeo ut non aliter fiat scirchus, quam prout terra ope ignis vertitur in lapidem. Nullum verò scirchus habet sensum, quoniam in scircho canaliculi nervulorum compressi sunt, hinc & nullus dolor, & affectus hic diu durat absque periculo aut damno reliqui corporis, quia nihil de Scircho in massam sanguineam transfertur.

*Emphysematis.* *Emphysematis* causa sunt flatūs, qui tamen nunquam solum accipi possunt, sed semper lymphæ permixta est, suntque tubulis, meatibus & maxandris mamillarum inclusi. Dum verò flatūs isti locum appropinquare querunt, tubulos distendunt, sicque tumorem hunc flatuosum excitant.

*Cancer.* *Cancer* Mammillarum causa est acidum corrosivum aquæ fortis simile, circa glandulas ipsarum sibi imperium sapiens easque depascens, unde spiritus animales ibidem quasi excubias agentes, omnes intendunt vires ad hostem depellendum, sed sæpe frustra in aperto cancro, ubi jam salia corrosiva vim suam exerunt, carnem vicinam depascendo causticum arsenicale, aut vitriolaceum potentissimum, quod ex dolore, quem sentiunt ægræ, manifestum est. Facile verò fieri potest, quod mensibus obstruatis glandulæ quarundam mammariarum functionem suam perdidierint, hoc est, quod nonnulli canaliculi ita sint ab externa causa obstructi, ut quorū succorum affluxus sit, hinc si acres acidæ vitriolacæ particulæ cum subitū de alcali locatæ per hos tubulos transire debent, & nullæ adiunt oleosæ vel spirituosæ, necessario ibidem hærent & cancrum produciunt in iis partibus, ubi fiuntur & stagnant, crassæ enim transire nequeunt, & sic stagnare coguntur, ex quâ stagnatione obstructio simul oboritur. *Bartholin. Hist. Anat.*

*Cent. 1. Obs. 7.* Cum ex mamma cancroſa stil-lare observavit. Fit & Cancer sæpe de causâ violentâ, lapsu, ictu, seu exemplum legere est apud *Tulpium Lib. 1. Obs. 33.* ex mæiore, seu ego plures novi, ex obstru-tione mensium, alijsque.

Causa Mammarum *Foveæ* & *Ulcæris* est eadem, quæ aliarum glandularum, nempe acidum acre peregrinum salinum, vel in ipso lacte, vel in alimento partis hujus corrupto acceſcente hærens, vel ab aciditate salina in sanguine vel lymphâ quacumque occasione obortâ, & circa has partes se accumulante oritur, prout palam est, si ejusmodi ulceribus apponantur emplastra, hæc redduntur nigra, quod in dicendum certum est acidi corrolivi, hinc & obcausam communem faciliè hic affectus transit in cancrum. Sic & ulcæra fiunt sæpe ab abscessu per congeltionem, vel acris humoris affluxu, lactis coagulatione, vel à vulnere, contusione, &c. de quibus plura in capite de ulceribus.

*Magnitudo indecora* Mammarum oritur à copia succi chylosi nutritis, omnesque tubulos in mammis dilatantis, unde hæc adeo opplentur & intumescunt, ut sæpissime aliquando reddant deformes. Contingit autem incrementum hoc nimium modò illis, quibus totum corpus bene nutritur, & propterea fiunt corpulentæ, modò iis, quæ partes hæc sibi frequentius permittunt contrectari, quo fit, ut hibrarum tubulorum & nervorum istâ blanda agitatione, spiritus, sive liquor nervosus majori copiâ atque impetu ad partes hæc influat, chylumque disponat, & per tubulos propellat. Quoniam verò tubuli ita dilatati plures repossunt spiritus ad sui elevationem, & hi celerius eosdem transfunt, nec semper iam copiosi adesse queunt, hinc fit, ut mamma per contrectationem frequentiore grandiores factæ mollescant & pendulæ fiant, certum sæpe in sexu hoc præbentes indicium, virgines frequentiore passas fuisse attactum.

Obvenit etiam mulieribus aliquando mamma *Trichiasis*, dum pilus per papillam exit, qui nobis in locis hisce crevisse nullatenus videtur, sed in cibo assuntus, & cum chylo celeriori fluxu agitato ad mammarum tubulos, & ipsum tandem receptaculum lactis delatus, ex quo cum lacte per papillarum canaliculum quendam ejicitur, vel ex eodem prominet aliqua parte, ut digitis vel forcipula se faciliè præbeat extrahendum.

§. 11. *Signa prognostica* desumuntur à partis affectu, hujus affectæ nobilitate, acrimoniâ nimia causarum, & symptomatum vehementiâ; mammarum enim substantia maxime adenosa faciliè ad concipiendam corruptionem apta, quia ex glandulis hisce lymphæ acris exsudat, quæ illas & carnem cum membranis absorbet, & in gangranam aut sphacellum facillime degenerat, quia à corrosivo vasa devorantur, quare propter subsecquentia peiora mala pars hæc corrupta, nisi ægræ mortem plus, quam vitam ament, est præcidendenda. Quid autem hac abiectione præcipis illis postea accidat, legimus in *H pp. lib. de Gland. Sect. xii p. 422. edit. Lind.* dicente: Vox ipsarum alpera redditur, & humores ad gulam feruntur, & multo spūto vexantur, & caput dolent, & ab his ægrotant.

*Inflammatio* quoque judicatur secundum tempora, in principio enim potest discuti & res-

solvi, in statu non item; sitendat ad syderationem, hoc pessimum est, aut enim minatur abscessionem, aut mortem subitanam. Adjuncta febris lactis dicta morbos hos graves reddit, nisi nono die sponte sudore solvatur. Ratione situs & magnitudinis etiam prognosis varianda, quatenus inflammatio vel profunda est, vel non, vel circa papillas radicem, in qua intolerabilis sensus, vel in tota mamma, vel ejus una pluribusque partibus.

*Scirrhus* Mammarum est affectus contumax & periculosus, facili Marte in cancerum degenerans, maxime quando suppurantibus imprudens tractatur.

*Emphysema* ut plurimum magnus comitatur & acutus dolor, ad brachium & totum latus, costas & papillas se extendens, qui tamen haud adeo difficulter mitigatur, nec de totali ejus curatione est desperandum.

*Cancer* Mammarum non exulceratus est curatu difficilissimus, eo quod loca adenoïsa seu glandulas occupat, in his enim affectus difficiliores sunt curatu, quam in partibus musculosis. Tuberculum illud cancerosum parvulum per plures, imò 30. annos delitescere potest, absque dolore & ullo alio incommodo, sed inopinatus in apicem cum miserandis symptomatibus prodit. Mammæ licet exteriori corporis partem teneant, his tamen ægrotantibus, in prædicendo memoriâ tenendum est, quod affectus mammarum raro ad sanitatem reducantur propter glandulas, earumque succum stillantem, in quibus facile lac, serum chylusque crudior stagnare, accrescere ac corrumpi potest, ea propter canceri, qui inibi altas fixerunt radices, sectionem respiciunt, imò facili repullulant. Cancer exulceratus peior est non exulcerato, & quoniam mammarum cordi sunt vicinæ, ideo periculosior est earum status morbosus, aliquando tamen felicitate ab initio excinduntur canceri earum parvum adhuc tuberculum repræsentantes.

*Foveæ & Ulcera* etiam difficiliter curantur, ob raram, sensibilem, glandulosam & spongiosam partem substantiam, & si irritantur hæc ulcera, facile fiunt cancroïsa.

Quod concernit *Magnitudinem indecoram* Mammarum, hæc nihil præ se fert mali, nisi quod in virginibus aut innuptis pulchritudini quid detrahat, easque de frequentiore admittâ confectione reddat suspectas; ut plurimum quoque reliqui corporis incremento adjungitur.

*Dista.*

§. 12. *Dista* in hisce mammarum affectibus externis ritè observanda est. Aër proinde sit temperatus, acidus verò & acris angue pejus fugiendus est; puerperæ enim mammas calentes subito denudante, aer ejusmodi poros cutis penetrans tubulos confringit, quare lac in glandulis quibusdam stagnare coactum coarctatur ac accedit, unde sæpe tumor inflammatio, scirrhus, & id genus alii affectus promanant. Cibus potrigatur in his affectibus mediocri & conveniens, non acidus, non nimium salutus aut infumatus, potus sit tenuis. Somnus legitimo tempore concilietur, sicut nec vigilæ prætrahantur. Alvus officii sui oblita admonetur, animique affectus immoderati exulent; quatenus enim imprægnata quedam ferè continuo sibi imaginantur, quanto in naufragio fluctuant, & vitæ discrimine hæteant, quantum sit periculosus ille futurus exitus, tragœdiæ similis, facile ex assiduâ hujus pe-

riculi volutatione, animi dejectione, tristitiâ, mœrore, sollicitudine, acidum augetur, & magis sæpe corrosivum redditur, hinc partes hæc exulcerat, corrodit ac devorat.

§. 13. *Curationem* Morborum Mammarum occurrantium *Galenicis* instituit, ut in *Tumore* earum humores retentos commode & per vias debitas ex iisdem evacuent, qua de causa eosdem inspissatos & incrassatos prius attenuant & resolvunt, quo citius postmodum evacuari possint. A lactis itaque concretionem & coagulationem quando mammarum intumuerunt, ad ejusdem incisionem & attenuationem internè commendant decoctum rubiæ tinctorum, pulegii, origani, calamentii, oxymel simplex & compositum, mumiam in vino datam, vel coagulum leporis Mammæ etiam vovant decocto fenigraci, petroselinii, apii, althææ, aut inungunt oleo chamomælini, anethino, amygdalo dulci, linimento ex melle, butyro & selsamo, vel cataplasma imponunt ex farina fabæ, cic. rub. succo apii, & oxymelle, aut ex farina sem. lin. & fœnig. cum oleo chamomælini & aceto paratum, ut ad grumos lactis citius dissolvendos linimentum ex coagulo leporis, aceto, butyro, oleo chamomælini & anethino paratum valde extollunt. A calore nimio consumptis partibus tenuioribus si obtigerit lactis coagulatio, pramisso victu refrigerante, ex lactuca, endivia, cichorio, ptisanâ, medicamenta continuant incidendo simul refrigerantia, tum internè tum externè adhibenda, unde mammas etiam inungunt succo alfinis cum oleo rosaceo, vel foveat decocto lentium cum posca, & duritiem remanentem emolliunt unguento dialthææ, cum oleo chamomælini & paucis croci commistum. Quod resolutum est, ne diuturniore morâ dolore in foveas, vel vitros, vel succræ, vel catulo jubent exsurgendum, ut ita noxa omnis præcaveatur.

Ab influxu autem sanguinis quando ortus est *Inflammatio*, Tumor sive *Inflammatio*, sanguinem avertunt per venæ sectionem in cubito lateris affecti celebrandam, aut si menses simul sint obstructi, in poplite aut talo, tum alvum aperiant electuario diaprunis vel diacatholico, vel cassia fistulari aut syrupo rosarum per multiplicem infusionem parato, vel enemâ quoddam ex decocto emolliente, additis uno vel altero ex prædictis electuariis, oleo & paucis salis ano injiciunt, atque post peractam hanc evacuationem universalem pro majori avertione, frictions instituant dorso, costarum, natium, crurum ac tibiarum, quibus locis & cucurbitulas imponunt cum scarificatione, ipsis verò mammis medicamenta admovent repellentia, aqua tepida, ne pectori noceant, atque materiam cum impetu ad interiora compellant; quare spongiâs adhibent ex posca expressas, aut lineæ oleo rosaceo omphaceo, aceto & aqua rosaceis imbuta, nec non alia epithemata ex aqua aut succis nymphææ, solani, portulacæ aut umbilici Veneris, vel linimentum ex ovis crudis, oleo rosaceo, & paucis aceti inviceni probè subactis paratum, quæ tamen repellentia non usque adeo tutò in ulum trahuntur. Postmodum si inflammationis estus visus fuerit remissior, ad digerentia una cum repellentibus accedunt, qualia sunt focus ex decocto rosar. camomill. apii, in oleo rosar. & camomill. nec non aceto & aquâ communi parato, atque cataplasmata ex iisdem simplicibus, additis farina hordei,

dei, fabar. & succo solani composita. Pro majori vero obtinenda emolliitione & discussione cataplasma apponunt paratum ex medulla panis subalbi, in decocto fol. alch. parietar. apii, flor. Camomil. melilot. & sem. lini macerata, additis ei contusa, vitell. ov. croco & myrrhâ. Ad suppurationem si materia potius, quam discussionem vergere appareat, eandem promoveant cataplasmatibus ex pulvere rad. lil. alb. alch. farina tritic. sicibus &c. in aqua coctis, contulis & commistis cum butyro recenti, auxungia non salita & pauco croci compositis, quibus si pus sit confectum, huic exitum parant vel ruptorio ex stercore columborum sylvestrium cum nielle mixto parato, & debita in parte mammae imposito, vel scalpello, aut si pus profundius lateat, ferramento cadente, lib. junctis linimentis suppurationibus foramini illitis per tempus aliquod, & hinc detergentibus, donec tamen ulcusculum hoc per sarcotica adhibita nova carne repleti, & citatrice debite possit occludi.

Oedema-  
tis.

Oedema Mammarum per decocta calefacientia & attenuantia cum syrups iisdem qualitatibus pradis intus allumenda, tandem tracta resolent, donec humore pituitoso convenienter correcto & attenuato, ejus copiam nimiam phlegmagogis evacuatæ queant, hinc externè digerentia apponunt & discutientia, quibus si succus crassior non obediât, suppurationem promoveant emplastris calidioribus, Apostolico nempe, cerato Oeclypi Philagrii, & id genus alis, usque dum aperto abscessu pureque evacuato, non aliâ, quam in præcedente Inflammatione jam indicatâ ratione curatio possit absolvi.

Scurbi.

In Scurbo Mammarum curando toti in hoc sunt negotio, ut partes crassiores & magis terrestres fortius emolliantur, & tandem discutiantur, propterea focus frequentius repetunt, qui instituntur ex lixivio dulci, in quo radices lilior. albor. althææ, flor. camomil. melilot. sem. lini, fœnigr. bullierunt, quibus subjungunt cataplasmata ex radicibus althææ in aceto niello coctis & contulis, additis sem. lini, fœnigr. parata, vel sterus caninum album pulveris terebinthina excipiant, & instar cataplasmatibus imponunt, aut linimento inungunt ex gummi. Ammon. & galban. in aceto solutis cum butyro vaccino recenti, auxungia gall. nar. & anser. nec non pauco terebinth. composito inungunt, & postmodum emplastro ceroneo aut de mucilaginis quod restat duritiei penitus emolliunt conantur.

Emphyse-  
matis.

Ad tollendum Emphysema ea in usum ducunt medicamenta, quæ & flatus discutiant, & menses suppressos referant, & fluxum eorum promoveant, qualia sunt, decoctum ex rad. imperator. fœnicul. levisitic. herb. origan. puleg. agrimon. calamenth. saly. sem. anisi, carvi, coriandr. pp. cort. aurant. addito syrupo menthæ vel de camomilla, & subjunctis speciebus diacymini & diagalangæ. Nec inutiliter theriaca in vino Hippocratico exhiberi potest. Forus posthæc applicant mammae ex decocto baccar. Junip. sem. cumin. levisitic. fœnigr. herb. aneth. agrimon. rutæ, saly. scord. flor. camomil. sambuc. in aquâ & vino parato, vel cataplasma ex iisdem feminibus & farina lupinor. aut emplastrum de meliloto cum emplastro de baccis lauri mistum, & oleo de castoreo malaxa-

tum imponunt, aut oleo camomelino, nardino & rutaceo invicem multis tumorem inungunt.

Cancer.

Cancer incrementum prohibere student influitatâ venæ sectione in poplite aut malleolo, vel etiam in cubito lateris affecti, & adhibitis medicamentis humores melancholicos & adultos evacuantibus ex infuso fol. sen. cum fumar. & epithymo, vel syrups de fumar. composito & de polypodio, aut confectioe Hamech majore, tum mensium fluxum promoveant, & ipsi mamma affectæ applicant vel epithemia ex succo solani, sempervivi aut plantag. vel linimentum ex tintia in succo uno vel altero ex prædictis dissolutâ, vel ex pompholyge, cerulla & chalcitide alisque metallis ustis & ablutis, cum oleo rosaceo & succo solani in mortario plumbeo diu agitata paratum. Ad excisionem canceri hujus cum radicibus, tum ob interdictum Hippocratis lib. 6. Aph. 36. tum quia operatio hæc periculo est plenissima, non libenter accedunt, sed quum medicamentis in totum abigi nequeat, ea tantum adhibent, quæ malum aliquantum mitigant & impediunt, ne reddatur asperius.

Ad Foveas Mammarum explendas unguen-  
tum rosaceum & de tintia commendant, nec non emplastrum album coctum, aut teratum diapalma.

Valcorum.]

In Ulceribus Mammarum ritè curandis, humorum etiam vitiosorum sufficientem evacuationem apprime ducunt necellariam, cum sanguinis missione & mensium provocatione, quibus præmissis eidem ratione, quâ in aliarum partium ulceribus, procedere solent, humores acres mitigant, ulcus mundant, abstergunt, & tandem consolidant, ad quas intentiones obtinendas emplastrum tripharmacum singulare judicant præstiturum esse juvenem.

Mammarum Magnitudinem indecoram im-  
minuunt vel provocatione menstruum, vel diu inda-  
blatione & curatione tumorum, vel externis  
topiis adstringentibus, quæ vel formâ focus ex  
decocto equisiti, fol. myrti, nuc. eupressi gallar.  
immatur. alum. balaustior. vel unguenti aut em-  
plastri ex bolo, gallis viridibus, aluniæ, &c.  
cum uelle mixtis, mammis sunt admovenda.

§. 14. Ad Paracelsi normam Tumores Mamma-  
rum curantur pro diversitate salium ipsium lac curati  
in partibus hîc collectum corruptum, & Merbis  
quidem Inflammationem earum auferri posse  
lperat salis arsenicalis attemperazione per ver-  
nicem mammis inflammatis exterius inunctum;  
Oedemati valde proficuum fore existimat em-  
plastrum suum oppodeltoch ex aromatibus per  
tempus aliquod tumori huic impositum. In  
Scurbo magnam adhibendam vult cautelam, ne-  
que per digerentia, neque per corrodentia ante  
durationem ipsam curari tentandam, sed post-  
quam à naturâ in ulcus concoctum sit, huic  
mundificationem & consolidationem commo-  
dè præstandam esse injungit. In Emphysemate O-  
leum Philosophorum approbat, ut tumor ille  
hoc studiosius illinatur.

Pro sublatione Canceri fluxiones menstruales  
præcipit amovendas, tum eundem anodyno ter  
vel quater mortificandû, donec consolidante cu-  
raabiatur. Anodynum sequenti parat ratione.

℞. Spenniol.

succi solair. aa. ʒj.

liquor. vernicis ʒb.

Reduc in formam unguenti.

Qq

Reme-



Remedium etiam de glutine aquatico valde commendat, quod lib. 5. cap. de Cancro in genere cum reliqua curatione communicabit.

Ad *Fissuras* Mammarum forum ex decocto farinæ fabar. & siliginis, cum pyrolo & agrimonîa in aquâ facto profectum fore promittit, post quem axungia taxi, aut cati sylvestris inungi possunt.

In *Ulceribus* Mammarum unguentum ex Talco prædicat, quod sequenti modo est parandum.

℞. Talci debite pp. 3j.

*Liquor. Mum.*

*Terebinth.* aa q. s. pro unguento. Talci verò ad ulcera hæc præparatio ita peragitur. ℞. Talci lbj. Cineris fabar. & avenæ aa ad pondus par, reduc in quantum ignem per diem & noctem, abluè & exsicca.

*Magnitudinem* Mammarum *indecoram* coërcet & imminuit destillato aluminis cum aquâ communi facta, quo lineæ imbuta iisdem mole aut flacciditate laborantibus imponuntur.

*Helmontii  
de morbu  
Mamma-  
rum cu-  
randu  
opinio.*

§. 15. *Helmontius* ad curationem *Tumorum* Mammæ occupantium latius aversionem necessariam ducit, quem sæpe per sola topica depelli posse opinatur, adeo ut lapis Bulteri ad omnes hocce morbos tollendos ei summe habeatur profectus; nec non in *Scirrhis* oleum Scrumarum, quo durities quæcumque resolvitur, in *Cancro* internè magnis extollit encomiis mercurium suum diaphoreticum fixum, externè verò gluten de aquatico Paracelsi valde approbat, uti in *Foveis* pinguedines animalium, in *Ulceribus* Colchotar ʒli, & in *Magnitudine indecorâ* succum plantaginis cum alumine mistum.

*Willisii  
Cura in  
Mamma-  
rum In-  
flamma-  
tione.*

§. 16. *Willisius* ad diversitates humorum, à quibus *Tumores* fuerunt oborti, in curatione solet respicere, & cum in ipsâ Mammæ *Inflammatione* sanguis obstructionem faciat, ejus dissolutionem & pristinæ circulationi restitutionem promovet tum venæsectione, tum resolutione ejusdem viscositatis per spiritum C. C. & alia sudorifera, si verò fluiditas pristina reparari nequeat, materiam concoquit & suppurat per cataplasmata & emplastra aliis inflammationibus dicata, ut aperto abscessu materia purulenta debite eliminetur, quâ in parte ab antiquorum placitis latum vix unguem cecedit.

*Oudemati.*

In *Oedemate* etiam Mammæ humores crassos & viscidiores fortius in fluorem redigendos esse admonet, eosdem tum internis, tum externis attenuando & resolvendo per decocta ex rad. apii, bryon. eryngii, fœniculi, herb. salviæ, calamenth. fol. rosmarin. flor. sambuc. lign. cassiæ, additis colaturæ ʒj. vel 3℔. spiritus ʒci. Frictiones & fœtus externè commendat ex decocto beton. menth. flor. hyperic. bacc. lauri. Junip. cum calce in aquâ communi parato, post quos aut emplastrum diachylon iteatum imponit, aut si discussio fieri nequit, suppurationem promovet, ut in tumore antecedente.

*Scirrhus.*

*Scirrhi* Mammæ curationem institui debere censet particularum terrestrium resolutione, earundem ad fluorem dispositione, & partium spirituosarum restitutione & adauctione, quas tamen intentiones ob partium terrestrium coagulum spissius, & spirituosarum in succo nervo defectum majorem non semper impetrari posse concedit, frequentiores tamen fœtus

ex herbis spirituosus in aquâ decoctis, & spiritu vini & sale si acutos aliquod allaturos esse sperat juvenem, uti & gummi Ammoniacum aut Opopanax in spiritu vini solutum, ad emplastra consentiant redinspillatum, & tumori impositum, quæ remedia externa ut eo felicius suas agant vires, interna quædam resolutiva & sudorifera exhibet, inter quæ Tincturam salis Qi magno habet in pretio.

In *Emphysemate* Mammæ internè suadet *Emphysemata* carminantia, externis verò emplastrum *maie.* de haccis lauri, aut cataplasinata ex farina fabar. cum semine carvi. fœnic. & pulvere folior menthæ commendat.

Ad *Cancrum* nondum exulceratum pauca *Cancra.* adhibet medicamenta, & præter interna sanguinem depurantia ex ligno Guaiaco, rad lapath. polypod. herb. fumar. scabios. epithym. tum etiam diaphoretica ex ʒo & ʒio, reliquis cum *Hartmanno* præfert emplastrum ex gummi Ammoniaco in aceto soluto, & debite redinspillato tumoribus cancris impositum, si verò jam est exulceratus, linimenta ex tutiâ, ulibano, lithargyro, &c. cum succo sempervivi & cancrum in mortario plumbeo parata juvenem allatura esse promittit.

*Foveis* Mammæ illinit oleum ovorum, *Foveis.* vel axungiam caponis, aut serum cervinum liquefactum, quibus dolores mitigantur, & sulci debite tandem expleantur.

In *Ulceribus* Mammæ sanguinis quoque *Flores.* depurationes per decocta & infusa convenientia instituit, quibus etiam purgantia ex sennâ, elleboro & carthamo immiscet, tum sudorem promovet, & forissecus unguenta & emplastra imponit suppurantia, absbergentia, mundantia & consolidantia, prout in aliis exulcerationibus eadem requiruntur.

*Magnitudinem* Mammæ *indecoram* imminui posse credit per frequentiora jejunia, *Magnitudinem indecoram.* abstinentiam à cibis & potibus multum nutriendis, & externa remedia adstringentia, qualia ab Antecessoribus jam fuerunt indicata.

§. 17. *Sylvius* in *Tumoribus* Mammæ à lacte ab acido coagulato oriundis, coagulationem denuo dissolvendam, & acidum corrigendum vult per ʒum diaphoreticum, aliaque remedia sudorem moventia, externè per leves frictiones & impositionem emplastri de spermate ceti, dandamque esse ait operam, ut vel omnino nullus, aut minimus in Mammis oriatur abscessus, si verò hoc præcaveri nequiverit, sed ex subsequuta *Inflammatione* jam factum sit apostema, sequentes observandas præcipit cautelas: 1. ut multiplices noxæ apostemata subsequentes aut comitantes tollantur, 2. ex minore spatio apostemate occupato pauciores partes noxam patiantur, 3. à pure diutius in partibus quibuscumque hærente, ac sensum magis magisque corrupto & aciore facta, plures non lædantur partes, & imprimis vasa, utpote quorum noxa hominis sanitati noceat magis, quam carni quorumvis corruptio. Præterea suppurationem, quantum possibile, ad externas partes & Mammæ superficiem trahendam esse monet, quoniam apostemata in locis profundioribus nec sponte, nec arte absque plurium partium læsione queant aperiri: Si pus cum lacte ad papillas vergat, illud à

*Sylvii cura in Mammæ tumore & Inflammatione.*  
lactrice

fulcrice exfugendum vult. & apoftema fuperciei jam proximum in loco maximo declivi ac præteritum molli aperendum, quo citiustutiusque medicamentis convenientibus valeat curari. Approbata autem cataplasmata ex rad. lil. alth. farin. lem. lini tritici, flor. meliloti, cum cepa affata & butyro infuslo parata, ad emolliendum, & ad suppurationem disponendum apoftema, nec non unguentum dialth. & emplastrum diachylum. Post apertionem curam adhibet reliquis ulceribus accommodatam, per medicamentum interna & externa, fomenta nempe & decocta vulneraria satis penetrantia, cum addito vini spiritu parata, & balsamum sulphuris, quibus & mundatio & consolidatio perquam promovetur.

In *Oedemate & Emphysemate* Mammærum salialaudat volatilia interius affluenda, quibus & pituita resolvatur, & status inde emergentes discutiantur, foris etiam unguenta dialth. compositum & Martiatum, cum oleo camomill. aut laurino inungit, & emplastrum suum carminans imponit, quod in tumoribus hujusmodi apprimere censet proficuum.

Ad *Scirrhum* dissolvendum non minus sua laudat salia volatilia, tum intus, tum foris adhibita, & emplastrum suum carminans, vel de spermate ceti, aut ex gummatibus paratum per tempus aliquod impositum.

*Cancro* Mammærum ea convenire putat remedia, quæ acidum domant & austeritatem ejus corrigunt, ne acquirat acrimoniam exulceret, qualia sunt salia volatilia mitiora interne adhibita. Spiritus vini aromaticus, cum Spir. æci. vel fixantia & absorbentia, quæ exulcerato magis conveniunt, ut tutia, pompholyx, cerussa, saccharum hi, succus solani, opium in vino solutum & alia, quibus austeritas mitigatur.

In *Fovæ & Ulceribus* bene mundandis & consolidandis nullum æquè prædicat remedium, quam balsamum suum sulphuris anisatum, quem ulceribus quibuscumque tuto sanandis satis credit idoneum.

Ad *Magnitudinem indecoram* Mammærum imminuendam cum aliis fovæ & cataplasmata adhibet adstringentia, ex foliis pyrorum, myrti, balaustis, gallis, vel epithema ex aqua albuminum ovorum, quæ conqualata, & cum alumine & creta in pastam rediguntur, ex quâ aqua elicitur.

§. 18. *Cartesianis* potissima cura eò dirigitur, ut in *Tumore* Mammærum succi coagulati & stagnantes resolvantur, & in motum pristinum restituantur, quo particulæ vitiosæ terrestres cum reliquis reduci nesciæ, per convenientes vias eliminantur, sive eliminatio hæc fiat per alvum, sive per urinam & menses, sive per poros mammærum sufficienter dilatatos, quapropter ea eligunt remedia, quæ in poris suis benignum continent ætherem, & particulis tenuioribus gaudent & volatilibus, ut citò tubulostransire, & succis & liquoribus in eis contentis se insinuare possint, qualia sunt infusa in vino, aut decocta in aqua & vino, vel aqua sola ex rad. Imperator. fœnicul. levistic. enul. scabios. valerian. rubiz. herb. ment. puleg. salvia, chazetol. fol. rotis marin. chamædr. lem. dauci, fœnic. ligni satiastr. &c. &c. quibus præmissis pro sudore largius movendo exhibent gum diaphoret. cum myrrha, C.C. Philosph. pp. floribus æci & paucocamphoræ. Externe ad succorum & lactis stagnationem

resolvendam totis admovent ex decocto calaminth. parthenapii, fol. byron quas herbas etiam in Spir. viii macerant, & hoc lintea imbuunt pro epithemate calidiuscule adhibenda. Eadem etiam de causâ ex farinis fabarum, lini, fœnigr. orobi, fabar. cum lacte parant cataplasma, cui in fine camphoram addunt in Spir. æci dissolutam, vel Spir. lumbrior. & Spiritu vini camphorat. mammas tumentes illinunt, aut emplastrum de galbano crocatum *Myschii* imponunt. Materia verò in mammis adeo existente spissâ, ut omnino dissolvi & per poros apertos discuti nequeat, sed in abscessum & suppurationem vergat, ob chylum nutritium à particulis acutis acidis corruptum, suppurationem istam promovent seu faciunt, hoc est, medicamentis emollientibus, & tubulos laxantibus, & dilatantibus chylum corruptum in profundo hærentem ad superficiem alliciunt, ut per aperturam vel lancetta, vel ruptorio, vel sponte, sive à particulis internis erodentibus factam effluat, quod fieri posse asserunt absque insigni apparatu, dum exhibitis prius diaphoreticis internis, mammarum vel spiritusosillantur, vel linteis calidis leviter fricentur & foveantur, ut hoc modo tubuli aperiantur, & chylus stagnans corruptus, nec nutritioni, nec reductioni in massam sanguineam aptus, per eos ad cutem affluat, ut hoc modo particulis acutis rodatur, pertundatur, atque ita prorumpat, quod sæpius præstatur emplastro diachylo simplici & de meliloto invicem mixtis & tumori impositis. Nuper femina quædam scorbatica dextra mammarum tumore laborans Chirurgum accessit, qui repellentibus forsan, aut aliis inconvenientibus topicis adhibitis tumorem istum immane quantum auxit, & in abscessum mutavit, atque ubi circa papillam emplastrum imposuisset, locus ille quali tenui pellicula obductus, & fusco colore tinctus apparuit, eo quod succi acidi intus contenti glandulas destruxerint, & sub cute jam attenuata hæserint, quum verò chirurgus iste abscessum emollire nequerit, sed secundum vice tumorem frustra aperuerit, subsequente ex apertis veniulis solo sanguine, mulier moræ diuturnioris impatiens, & doloribus excruciatâ D. D. *Vogelsangium* consuluit, qui sequentibus auxiliis eandem & à cachexia scorbatica, in qua femora & tibie crustis & squamis subatis erant deturpata, liberavit, ita ut ab usu infusli jam jam describendi crustæ & squamæ citò satis deciderint, & cutis apprimè fuerit mundata, insimul etiam mammarum tumenti tam salutariter prospexit, ut non modo per duas istas aperturas à Chirurgo jam factas, sed etiam tertiam sponte subortam pus laudabile profluxerit, durities diutius antea permanens dissoluta, & exoptata sanatio pro voto agræ fuerit subsequuta, promoto nempe fluxu menstruo. & alvo reddita laxiori, tum per muliebria sub specie fluxus uterini albi magnâ copia humorum vitiosorum evacuata.

Æ. Rad. Scabios.

Enul. aa. ʒi.

poipod. qu. ʒv.

farjaparil ʒiij.

Herb. scord.

sumar.

nummular.

veronic.

scelopendr.

*Herb. ceterach. aa. Mß.*

*flor. sambuc. P. ij.*

*hyperic. P. j.*

*rasur. santal. citrin. 3vj.*

*sassafr. 3ß.*

*Guaiac. 3ij.*

*Cori. ejusd.*

*Öli 9s aa. 3ijj.*

*sem. danci 3ß.*

*Parentur pro Nodulo 1j. mensura vini*  
imponendo, de quo vino singulis diebus manè & vespri ante cubitum cyathus præter propter 3ijj. capiens exhauriatur. Absumpto hoc de Tinctura 3ijj. facta singulis diebus horis matutinis 10. guttæ in cerevisia tenui assumpæ fuerunt, quæ sudorem primò paucum, deinde largiorem excitant, quo sanguis & reliqui succi egregie fuerunt depurati. Cumque ægra hæc in ligne commodum à vino hoc percepisset, secunda vice speciesbus istis cerevisiam tenuem superfundit, de qua & ipsa & liberi ejus scorbutici cum fructu per tempus aliquod hiberunt, & tandem species de novo fuerunt paratæ & cerevisiæ impoluit, cuius usum ad curationis finem continuavit. Sequenti interea spiritu tumor durior post abiectionem remansens discussus, & inflammatio circa ulculculam fuit abacta.

*R. Spir. lumbrior. 3j.*

*vin. camphorat. 3v.*

*flor. sambuc. 3ijj.*

*M. & calidiusculè tumor illinatur.*

*Inflamma-  
tione.*

Solent autem Cartesiani *Inflammationis* Mammarum curationem hac ratione instituire, ut quicquid pororum obstructionem produciens exterminetur, & pori non modo materię æthereæ subtilissimæ, sed globulis quoque secundis elementis, & recrementis per transpirationem insensibilem eliminandis sufficienter pateant, & liquores omnes faciliè fluant refluantque, quæ de causâ magnificunt sudorifera ex oc. 66. 3io diaphoret. sale card. bened. Myrrh. camphor. &c. spiculas quascumque absorbentia & secum extra poros in ærem deferentia. Non aliam ob rationem externè spiritum vini crocatum aut camphoratam unà cum Sp. 9ci cum 9paratum externè illinunt, aut lintea hæc mixturâ imbuta tepidè imponunt, domantur enim particule angulares, & pori aperiuntur, ut illæ agitata exhalare possint. Ut dolor mitigetur & fibrillæ ab impetu particularum acutarum non adeò fortiter commoveantur & tendantur, oleum momordicæ illinendum interdum admittunt, hujus enim particulis ramosis fibrillæ obductæ angulorum istorum vim faciliùs eludunt, eosdemque hebetant. Sed absumentis particulis subtilioribus & succorum sæculentis crassioribus, cum salibus acutis acidis in Mammarum tubulis & glandulis restitantis, ad easdem resolvendas, & salia mitiganda emplastrum imponunt diachylum cum gummi, sub quo si non æque resolutio, quam ipsa subsequatur suppuratio, cataplasmatibus convenientibus eandem promouent, ut lac vel chylus corruptus per dilatatos hujusmodi fori tubulos ad externam cutem promanet, & hanc vi salium acutarum perterebret, sicque foras effluat, unde tumor & inflammatio imminuuntur.

*Erysipela-  
ta.*

Ab Inflammationis curatione nihil aut parum abluat ea, quam instituunt in Mammarum *Erysipelate*; internis enim diaphoreticis, inter

quæ Spir. florum sambuci cum Tincturâ 9il alis præferunt, poros aperiant & particulas acutas in lymphâ fibras cutaneas distendentes contentas mitigant, corrigunt aut planè ejiciunt, faciliè enim per poros apertos exspirant. Si verò post sudorẽ aliquam adhuc iras heri videantur in moram, externis convenientibus & pororum apertionem, & salium acutorum acidorum hebetationem promouent, imposito nempe vel linteo Sp. vini crocato bis vel ter imbuto, & denuò spiritu vini calidè humectato, vel in decocto florum sambuci, olivani, myrrhæ & croci in vino factis, addito Spir. 9ci linteis humectatis & tepidè admotis, vel spiritu lumbrior. & camphoræ mammis illitis.

Si tumor Mammæ occupans ad *Oedema* vergere videatur, lympham spissiorem attenuant, resolvunt & fluxilem reddunt, ut partem ad ductus suos revertatur, & vel correctus massæ succorum communi denuò immisceatur, vel vitiosis adhuc existens per ureteres effluat, partim per apertos tubulos & poros evaporat, ideoque salia volatilia tum internè, tum externè commendant, qualia sunt Essentiæ chamædr. rorismar. salv. lignor. liq. C. C. succinat. sal volat. 9i, decocta herb. menth. puleg. rorismar. rad. Imperator. caryophyllat. Ireos Flor. costi dulc. bacc. Junip. &c. calidiusculè bibita. Fomenta foris adhibent ex decocto absinth. origan. calaminth. rut. bacc. lauri, macis, caryophyllor. vel oleis de castor. destill. rorismar. succini guaiac. 9i volat. &c. inungunt, & emplastrum de baccis lauri imponunt.

Ut dures in *Scurro* magis adhuc resolvatur, nec tamen particule volatiliores residuæ absumantur, ea feligunt remedia, quæ absque irritatione, aut pororum occlusionẽ à particulis suis volatilibus benignis poros transire, & coagulatam spissam dissolvere possunt, ad quorum classem referunt oleum Philosphorum, quo tumorem istum durum aliquoties in die illinunt, vel etiam Spir. gummi ammoniaci cum Sale 9ci per retortam paratum, aut ipsum gummi ammoniacum in 9to solum per linteum tractum & debitè redinspillatum, emplastri formâ imponunt, quod si parum adhuc præstare conspiciatur, emplastrum de ranis cum 9io Vigonis imponunt, aut sequens *Barbette*, per tempus aliud continuandum.

*R. Gummi. Galban.*

*Ammon.*

*Opopanax. aa. 3j.*

*flor. 9ci*

*myrrh. rub. aa. 3ß.*

*Camphor. 3j.*

*ol. lil. alb.*

*Axung. anat. aa. 3vj.*

*Cera q. s.*

*M. F. Emplastrum.*

In *Emphysemate* Mammarum internè statûs *Emphyse.* discutientia exhibent, ut essentiam Camomill. *ma.* Roman. cort. aurant. menth. in aqua & syrupo scænic. externè laudant facculum camomillæ & semine anisi impletum, in vino coctum & tepidè impositum.

*Cancerum* Mammarum occultum & nondum *Cancerum,* exulceratum nec medicamentis emollientibus irritari volunt, nec ubi partibus subjectis firmi- ter adherescit, excæcari; sed humorum malignitatem corrigendam esse injungunt per sudorifera

fera ex oculis es, C. C. Philof. pp. & cerufa ʒiij, in aqua fumat. ſcrofular. & ſyrupo ſcord. ſimpl. exhibita, & foris vel folia uvæ inverſæ recentia in mortario plumbeo contuſa, vel cepam ſubcineribus coctam imponunt. In Cancro exulcerato medicamenta acria proſcribunt, adhibitis ſolum mitioribus. decocto nempe veronica, ſcabioſæ, geranii, ſcrofulariæ, cui admixcent Tutiam. pp. C. C. pp. plumbum uſtum, ceruſiam, & mel, quâ mixturâ ulcus probe ablunt & lintea eadẽ imbuta tepidè imponunt, quâ ratione & liquorem mellis ab ʒio abſtractum Ang. Sal. adhiberi poſſe concedunt. His non ſufficientibus adhiberi poſſe concedunt. His non ſufficientibus ad particulas corroſivæ fortius deſtruendas & domandas cineres cancrorum fluviatil. ranar. ſtercoris humani cum myrrhâ pulverifata imponunt, & emplaſtoma nus Dei dicto Dile Mort ad ſanationẽ perducunt.

Tumor.

Ad Foveas Mammarum replendas, pinguiora admittunt admixtis alcalicis, quæ foveis iſtis illiunt, potiſſimum verò ſequens linimentum.

ʒi. Sœvi ovil. ʒij.  
Tur. pp. ʒij.  
ſacchar. ʒi ʒb.  
Ol. hyperic. expreſſ. ʒj.  
M. F. Linimentum.

Vlcera.

In Vcleribus Mammarum ſudorifera & decocta aut inſuſa lignorum cum herbis vulnerariis interius commendant, & foris ulcus ablunt aut tangunt linteo aqua calcis vivæ, in qua ſaccharum ʒi & camphora fuerunt diſſoluta, imbutæ, poſtea emplaſtrum Oppodeltoch; aut ex calce viva lota, parum exſiccata & cum oleo lini miſta paratum imponunt, aut pulverem mandibularum lucii parum toſtarum inſpergunt, ut cruſta inducatur, ſub qua ulcus faciliè ſanatum iri pollicentur.

Magnitudinem indecoram.

Mammarum Magnitudinem indecoram imminui poſſe credunt per frequentiore inedia, abſtinentiam à tactu & contrectatione, & compreſſionem fibrarum, ut tubuli anguſtentur, & chylus nutritivus tanta copia influere nequeat, per medicamenta quædam externa, ſeu topica, qualia ſunt cicuta contrita impoſita, decoctum alchimillæ, fol. liguſtri, balautior. equiſet. hypocitiſidis & aluminis, vel emplaſtrum Plateri ſequens:

ʒi. Maſtick.  
Tur. aa. ʒb.  
Gallar.  
Nuc. cupreſſ. aa. ʒij.  
bol. vel  
argilla, aut  
terr. cimol. vel  
rubric. ſabril. ʒiij.

Pulverifata excipiuntur albumine ovi & aceto.

Noſtra Methodus curandi Mammarii Tumorem.

§. 19. Noſtra ex ſententia Tumore Mammarum quocumque eò annitendum eſt, ut acor lactis, vel alius humoris ſtagnantis temperetur, & quicquid in glandulis coagulatam eſt diſſolvatur, acidi enim humores maximè hic corrigendi veniunt, internè ergo omnia ſudorifera conveniunt. Eſto formula una & altera in tyronum gratiam.

ʒi. ʒ Chereſol.  
puleg.  
Card. bened. aa. ʒb.  
Mixtur. ſimpl. ʒb.  
Syr. Papav. erras. ʒiij

M. d. ad vi.

Succus chæreſolii per oſtiduum aſſumptus egregiè quoque juvat.

ʒi. ʒ Card. bened. ʒij.  
Regin. Ungar. ʒi.  
ocul. ʒb. ʒb.  
Diſcord. Sylv. ʒj.  
Sperm. ceti gr. xv.  
Tutur. corallor. ʒb.  
Spir. Cephal. n. oleoſ. gr. xv.

F. Mixtura, cochleatim exhibenda, de nec ude ſequatur, qui acidum temperabit, & obſtructiones reſolvit. Interea aſſumatur Decoctum calidum ex cereviſia, pane ſecaleico toſto, cum nuce Moſchata fricato, & add. cort. citr. exter. qui potius ſuccos fluidiores reddit, hinc calor in ſuccis percipitur, & obſtruſtio reſolvitur, quod etiam contingit, ſi lac congruatam, & à frigore quaſi coagulatam eſt. ſimiliter enim ut alii ſucci incraſſati mediante calore reſolvi poſſent.

Ad acidum, ſummum iſtum coagulatore, corrigendum. conducunt etiam ſalia volatilia & fixa, alcalia quæcumque, oculi nempe ʒb, ʒium diaphoret. ſpermaceti, &c. quæ omnia ob vint alcalinam acidum enervant, iſpilloſ humores attenuant, & ad circulationem invitant.

Externè etiam proſunt omnia medicamenta, quæ attenuant & reſolvunt, hinc commendamus ſequens.

ʒi. Herb. ſanicul.  
abſinth. aa. Mj.  
membr.  
ſcord. aa. Mʒ.  
leuſitic. Mj.  
ſem. ejusd. ʒib. :  
Salis ʒci  
ʒi aa ʒij.

Cog. in vino, & cum linteis calidè applica, & add. pro re nata.

ʒ Regin. Hungar. ʒij.  
Spir. Matricar. ʒb.  
ʒci  
camphor. aa. ʒij.

M.

Cum panno fricentur calidè Mammæ, exurganturque ſæpius; & cum lac per remedia hæc externa fuerit attenuatum & fluidius redditum, faciliè per papillam & alia vaſa eliminari poſteſt, quia præſcripta remedia in ſe continent multum ſalis volatilis oleoſi & ſpirituoſi, experientia enim conſtat, quod ſolo Sale ʒco ſtagnatio & congreſcentia lactis curari poſſit, hinc ſi aromatica ſalia admiſceantur, facilius illud reſolvitur. Poſt ablaſtationem quia Mammæ ſolent intumefcere, imponatur emplaſtrum hoſtrum rubrum.

Mulierculæ noſtræ cortices ſambuci cum fatina imponere ſolent tumoribus & inflammacionibus, alia imponunt, & quidem melius, flores camonillæ & ſambuci cum ſuſſuribus ſacculis incluſos mammis tumefactis & inflammatis. Sed optimè hic notandum, ut agræ lac ſibi ſæpius exſugi curent. Ad acorem lactis ſtagnantis temperandum, & quicquid in glandulis coagulatam eſt, diſſolvendum, commendamus cretam cum butyro inſuſlo inſtar linimenti ter de die inungendi, vel ſolam cretam cum pulvere liquitiæ, vel farinâ ſecalica & repleti ſacculi calidè ſæpius imponantur. Ubi verò tumores ſint nimis duri, ſequens imponendum eſt.

Qq 3

ʒi. Em



# 310 *ENCYCLOP. CHIRURG. RATIONAL. LIB. II.*

℞. *Emplast. diaphoret.* Myns.  
de Ammon. Forstest. aa. ʒj.

Ol. ʒi per deliq. ʒj.

M.

℞. Ol. lini q. v.

*Camphor.* ʒj.

*Cum lana applicetur.*

Emplustra etiam de cicuta, diachyl. simpl. de sperm. ceti egregia sunt in dissolvendis tumoribus à lacte coagulato obortis.

In Tumore Mammarum, quod apprimè nocent Chirurgi, emollientia plus nocent quàm profunt. melius autem conducunt Spir. vini camphorat. emplastr. de spermate ceti, diachyl. cum gummi. quæ visciditates attenuant, & acidum coagulans infringunt, quo factò quilibet humor ordinarium suum recipit fluxum & circuitum. Nocent & suppurantia, quia inde fistulæ facile oriri possunt, nisi iis studiosè occurratur remediis acidum corrosivum in pure hospitans dominantibus. Alii optimo cum successu, ut Cl. Mays, imponunt emplastrum stypticum *Paracelsi*, à quo tumores brevis suppurantur ac sponte aperiuntur, aperturæ dein imponi debet balsamus Arcaei, qui sequens est.

℞. *Axung. ovis,*

*Gumm. elemi.*

*Terebinth. Ven.* aa. ʒij.

*Ol. hyperic.* ʒiſs.

*Cera.* ʒij.

*santal. rub.* ʒi.

*M. liquefiant omnia, percolentur ac fiat Balsamum.*

Applicetur porro emplastrum stypticum *Paracelsi*, ac superimponatur sacculus calidus farinæ fecaliciæ impletus, ad duritiem reliquum emolliendam. Celebr. *Hildanus* sequenti linimento maximo cum fructu in tumoribus Mammillarum usus est.

℞. *Gumm. Ammon.* ʒj.

*Ol. Amygd. dulc.*

*tit. alb.*

*pingued. gallin.* aa. ʒij.

*succ. cicut.* ʒiiij.

*Acet. scyllit.* ʒij.

*M. postea coq. colatura cum forti expressione servetur ad usum.*

Linimento hoc calidè inunxit Manumam, & sequens applicuit emplastrum.

℞. *Emplast. de mucilag.*

*Melior.* aa. ʒiiij.

*Gumm. Ammon. dissolut. in ʒ scyllit.* ʒiſs.

*M. F. a. Emplastrum, addendo parum cera, si opus est.*

*Inflammati.* *Inflammati* si primum attigerit tantum gradum, Pharmacia varia suppeditat remedia, sed *Erysipelas*, antequam ad ea accedamus, ante omnia Chirugos admonemus, ut abstineant à repellentibus ac frigidis, quæ ceu pestis fugienda sunt, imò optandum esset, ut ejusmodi remedia tanquam venena, Chirurgis auferrentur, etsi enim affluxum humorum & suppurationem suspendere videantur, & iisdem prævenire, succos tamen coagulatos magis adhuc incalescant, atque resolutioni & dissipationi ineptos reddunt, meatus, poros ac tubulos undique compingendo & obferando, præterea spiritus halituolos condensant, ipsorumque notum retardant, quæ mala mammarum corpus minime ferre potest, maxime enim glandulosum est, ideoque facile cor-

ruptibile. Eapropter hic æquè internè ac externè varia diaphoretica adhibeantur, quæ obstructions factas tollunt, acidumque tanquam coagulatorem emendant, si enim in *Erysipellate*, aliisque Inflammationibus aqua frigida, vel repellentia, vel adstringentia adhibeantur, metus est, ne in gangrænam abeat, si verò alcalia & spirituosiora acidum frangentia usurentur, brevi sanari poterit, uti sunt omnia sudorifera, unde hoc in casu sequens nostrà experientiâ in *Erysipellate* Mammarum confirmatum est.

℞. *Roos sambuci* ʒij.

▽ *flor. sambuc.* ʒiiij.

*M. F. Potiusculula sudorifera.*

Vel :

℞. *Theriac.* vel

*Diascord.* ʒj.

*Cum aq. flor. sambuc.* ʒvj.

*theriac. ul. camphorat.* ʒij.

M.

℞. *C. C. f. Δ* ʒſs.

*ʒii diaphoret.* ʒſs.

▽ *flor. sambuc.* ʒſs.

*Syrup. de Scord. simpl.* ʒij.

*M. Sumatur una vice.*

Externè in *Erysipellate* Mammarum conduct pulvis ex farina hordei, liquirit. aa. ʒſs. cum canabe imponendus & singulis horis repetendus, vel pulvis contra *Erysipelas Myns.* imponi potest. Si humida applicentur, semper camphora addenda. Si tendit ad suppuracionem, hæc est juvanda variis modice resolventibus, imposito emplastro styptico *Paracelsi* & si abcessus fuerit ruptus, immutatur balsamus *Arcaei* supra descriptus, superimposito emplastro diachylo simplici.

In Mammarum Inflammatione summâ, cum doloribus atrocissimis, sequens cataplasma raro te fallat.

℞. *Herb. scord.*

*salv.*

*rorismar.* aa. Mß.

*bacc. junip.*

*lauri* aa. ʒiſs.

*Myrrib.* ʒiiij.

*sem. fœnic.*

*cumin.*

*bardan.* aa. ʒij.

*Croc. opt.*

*styrac. calam.* aa. ʒſs.

*Salis xci*

*Tartari* aa. ʒij.

*Addè bisce medull. pan. albiss. farin. fabar. & cum lacte vel vino dulci.*

*F. Cataplasma, cui prorenata add.*

▽ *Regin. Hung.*

*Elix. vita* aa. ʒi.

*Camph.* ʒiiij.

*Sper. cet.* ʒij.

M.

Si Inflammatio cessare incipit & suppuratio infat, tunc ceratum sequens imponatur,

℞. *Gumm. Ammon.*

*ladan.*

*Unguent. basil.* aa. ʒiſs.

*resin. pini* ʒvj.

*Ol. Guajac.*

*cera* aa. ʒij.

*Pulv. myrris.*

*Croc.* aa. ʒſs.

M.

In

# CAP. IX. DE MORBIS MAMMARUM. 311

In Erysipellate Mammarum maligno & ad gangrænam vergente sequentem curationem imitari poteris Cl. D. *Vogelsangii*, Med. D. expertissimi, hic enim mulieri rusticæ erysipellate ulceroso in sinistra mammâ affectæ, ita ut cutis instar membranæ aciculis hinc inde pertulæ conspiceretur, ex quibus foraminulis non modo humor acris manabat, sed quasi mucore obduncta apparebant, uti in vasculis quibusdam intueri licet, in quibus humor aliquis fuit, vel in ligno humido & in loco occluso jacente, in cuius superficie, aut sub cortice mucor subcæruleo-albus accrescit, sequentia præscripsit remedia.

- ℞. *Aq. flor. sambuc.* ʒß.
- scabios.* ʒij.
- Spiritus flor. sambuc.* ʒß.
- Essent. lignor.* ʒj.
- Liq. C. C. succinat.* ʒß.
- Syr. Card. bened.* ʒijj.
- M.

Unâ vice hæc absurtâ mixturâ benè sudavit, & hinc non modò dolores, quos antè in thorace, latere sinistro humero & dorso senserat pungentes & tenivos, ut se juncurvarè nequiverit, fuerunt sedati, sed nocte etiam sequente placidè quievit, cum per quinque noctes antè vigiliis fuerit macerata, & erysipelas ipsum istud fœdum sequenti spiritu externo bidui spatio fuit abactum.

- ℞. *Spir. vin. camphorat.* ʒß.
- flor. sambuc.* ʒiij.
- ℞ci c. ʒ parat. ʒiij.
- M.

Linteis spiritu hoc imbutis locus affectus ter in die leviter fuit attraxus, unde primâ vice dolor quidam emerit, sed postmodum agra remedium hoc facile ferre potuit. libenterque eodem fuit, cum citò satis auxilium inde persenserit.

*Scirrhus.*

Cum *Scirrhi* causa consistat in contumacissima obstructione glandularum, omnia ea conveniunt, quæ vim volatilifandi habent, ut *Sal volat. viperæ*. *Tinctura ʒii*, *Sp. Salis ʒci volat. oleof. Sylv.* *Mixtura simplex*.

Externè omnia conveniunt, quæ vim dissolvendi & dissipandi habent, ut *Empl. dia ʒis Rulandi*, *malax. ol. tartari*, *emplastrum Saturninum Myns.* *Vigonis cum ʒio*, & cicurâ de spermate ceti, &c. *Cataplasma* nostrum de cancris, & alia. *Emollientia* verò sæpe multum nocent & malum subito augent, videndum ergò semper, an tumor durus in his glandulosis partibus discuti possit, proinde sunt, qui in hunc finem etiam externè *Sal volatile* addunt. Si enim tumores hi imprudenter tractentur, in ulcera cancræola facile abeunt, hinc omnia ea, quæ in cancro oculo profunt, & hic juvant. Sequens cæterum multis experimentis comprobatum est in *Scirrho* aliisque tumoribus rebellibus.

- ℞. *Cera cum cinab. Animon.*
- rubr. fass.* ʒij.
- Gumm. Galban.* ʒß.
- Tinctur. ejusd.* ʒiij.
- Gumm. Ladan.* ʒj.
- Sperm. ceti* ʒiij.
- Crociopt.* ʒß.
- Pulv. sem. cumin.*
- salv. aa.* ʒvj.
- M.F. Ceratum.*

Potest etiam addi *Elixir vitæ*. Omnia hæc, quæ in affectu hoc topicè usurpantur, calidè sunt applicanda, calor enim multum juvat ad dissolutionem, quoniam particulæ facillè tum commoventur. Sæpe scirrhus hic cancræolus non nisi ferro curatur.

In cura *Emphysematis* ad status respiciendum est, quapropter omnia ea hic conveniunt, quæ in Colicâ flatulenta recensimus, omnia videlicet carminativa, Essent. flor. Camomill. carminat. *VVedel.* *Spir. carminat.* de tribus, & curatur tumor hic variis resolyventibus, eodem modo, ac Tumor œdematodes, imprimis autem conducunt alelica dissolventia. Externè imponatur emplastrum carminans *Sylv.* vel unguentum carminans *Myns.* aut oleo carminativo destillato ejusdem tumor hic inungatur.

Cum *Cancer* Mammarum difficilè, exulceratus verò vix curetur, idè cura aliquando tantùm palliativa ei adhibenda, Tuberculo n. vel nulla vel cautissima adplicanda remedia nec crebro ille irritandus emplastris è pinguibus & calidis, inspecie vitanda summe emollientia humectantia, suppurantia ne Hannibali illi ad portas via monstreretur, imò plerumque sufficit curam ne quidem tentare metu subiti incrementi, aut exulcerationis mox subsecuturæ, valido enim medicamento exasperatur, lenibus non solvitur; exulceratum ergò hoc malum est Noli me tangere, si quid tamen tentandum, conveniunt ab initio ʒus dulcis, qui optimus acidi corrosivi dominator est, & alia diaphoretica sanguinem purificantia, ut sunt *Tinctura ʒii*, *Essentia viperæ*. *Zuvels.* *Tinctura bezoardica Myns.* ʒ volat. C. C. viperæ, fuliginis, quod optimè arsenicalem destruit acrimoniam, omnia theriacalia, camphorata, aliaque *Salia volatilæ & fixa, oleofa*, ~ sagoceni proprio sale exaltata conveniunt & martialia saturnina, tartarea, imprimis ʒ volat. oleof. n. d. decoctum lignorum, eorumque essentia. Incipientem cancerum cæpam sub cineribus coctam aliquando sanasse referunt, sed meâ experientiâ non confirmare hactenus potui. Ubi *Cancer* oculus fuerit parvus, instar pisi, & mobile tuberculum, id ferro, h. e. novaculâ Chirurgis nostris usitatâ excindendum est, unicum nempe remedium est tempestiva sectio, nisi enim præcidatur, præcidit vitæ filium: tuberculum verò hoc feliciter excisissimum lege apud *Tulp. lib. 1. Obs. 53.* item apud *Th. Bartholinum in Alii. Hassniens. Ann. 1. Obs. 27.* confer & *Obs. ejus 72.* Si verò cancer magnus fuerit, profundus, magnis arteriis ac nervis adhærens, & partibus subiectis firmiter adhærescat, minime scandendus est, ne arteriæ, nervi, peristomium, &c. vulnerentur. Post *Cancer* excisionem non statim fluxus sanguinis sistendus, nec eicidivam patitur agra; & melius acutius excinditur, si *Cancer* sit in papillâ vel manumæ extremo. Potest etiam in cancro oculo emplastrum ex farinâ milii imponi, vel unguentum deranis cum ʒio, vel *Vigierii* unguento ex ranis & cancri, vel quod optimum & nobis usitatum *Empl. è sperm. Ranar. saccharo ʒni.* Si ad Suppurationem tendit solis externis è sale fuliginis paratis remediis aggrediendus est. Nonnulli imponunt cancræolo tumori cancræos fluviatiles cum alio contusos, vel unguentum de ranis viridibus. In Cancro quoque Mammarum non exulcerato optimum remedium est colchocæ edul-

dulcoratum & cum  $\nabla$ albuminis ovorum in capta-plasma redactum.

In Cancro exulcerato  $\Theta$  fuliginis dicunt esse egregium remedium destruens arsenicalem acrimoniam, cui tamen domando ipsum arsenicum per oleum  $\Psi$ i correctum & oleo myrrhae inbutum præaliis à D.D. *Estmüllero* æstimatur proficuum. Dn. Muys commendat crystallum inontanum tam externè quàm internè. *Tulpius* commendat sequens:  $\kappa$ . plumbi liquefacti q. v. add.  $\mathcal{Q}$  viv. & tantillum  $\mathcal{Q}$ i vitæ, sic omnia redigere poteris in pulverem, qui ulceribus hisce inspergatur. Oleum  $\mathcal{H}$ i reliquis palmam præcipit, acrimoniam enim cotulivam optinè sedat, doloresque lenit, & sæpe cancos exulceratos cicatrice obducit. NB. Pro curâ palliatiâ Cancro Mammillarum admoveatur lamina plumbea  $\mathcal{Q}$ io illita, & quotidie ablatur aquâ aluminosâ: ferrum & cauteria optima sunt remedia.

*Forster*, Ad *Forster* commodè explendas miræ efficacis sæpius experti fuimus emplastrum despermate ceti; nec non unguentum *Sebast. Cisse* ad perionones, cujus descriptio addiscitur ex *Seb. ödero*, cui tamen substitui poterit unguentum de Tutia, aut diapompholygis.

*Vicari*, In curâ Ulceris nec V.S. nec institutas & sæpius repetitas purgationes existimamus convenientes, sed totius curæ cardo in eo vertitur, ut acrimoniam humorum corrigatur, quod nec obtinere possumus per purgantia, nullo minùs per venesectionem, hinc alia querenda sunt remedia, scilicet ergo volatilia illam corrigunt, aliaque sudorifera temperantia, quæ acres has particulas vel insensibiliter, vel sensibiliter per cutem eliminant, nec negligenda sunt blandiora diuretica. Fidelem spondent operata sudorifera longo tempore in usum vocata, nempe decoctum lignorum, cujus cuilibet dosi addi possunt Tincturæ eorundem, vel  $\mathcal{Q}$ ii, gutt. 12. aut 15. Convenit & succus charetolii internè exhibitus. Hic asterisco notandum, quod ulcus Mammarum vix curari potest, nisi lacte prius exsucto & exsiccato. Si subsit durities, resolvatur emplastro diachyl. albo, ol. amygd. d. vitanda emplastra solida, quod hanc partem inflammet, & transpirationem impediant, sed eorum loco cerata applicentur: ex. gr.

$\kappa$ . Mass. empl. de mucilag.

diachyl. alb. aa. 3j.

d. lil. alb. q. f.

M.

Si ulcus dolorificum sit, circumcirca liniatur oleo rosato in mortario plumbeo agitato, vel oleo ovorum. Inter externa varia quoque profunt decocta, imprimis sequens.

$\kappa$ . Bacc. Junip. P. j.

rad. aristol. rotund.

lign. sassafr.

Guajac. aa. 3ß.

summ. hyperic.

flor. Camomill. aa. P. ij.

myrrh. elect. 3ß.

$\mathcal{Q}$ ii  $\mathcal{Q}$ iat. 3j.

M. F. Decoctio in f. q.  $\nabla$  & vin.

Oleum Momordicæ primatum ducit in ulceribus & tinibus Mammarum. Si magna acrimoniam adest, interponi potest unguentum *Ægyptiacum* correctum & solutum in spiritu vini, vel decoctum scoriarum reguli  $\mathcal{Q}$ ii, vel  $\mathcal{Q}$ s, superimposito emplastro  $\mathcal{H}$ ino cum croco  $\mathcal{Q}$ is, vel emplastro *T. mai. a Guldenkle*, quod extat lib. 6. c. 26. Turundæ sint nullæ, vel valde breves & tennes, ex linteis carptis, & pulvinuli leves, teneri ac sine iuturâ. In Mammarum abcessibus hals.  $\mathcal{Q}$ is cum ol. papav. expt. ill. parat. maxime laudatur. Ad ulceris exiccationem proderit emplastrum dia  $\mathcal{H}$ i *Myrs*. In Ulcere cancroso proficuum est pulvis ex ranis æquatilibus, cancris & C. C. uto. C. l. *Estmüllerus* novit pauperulam, quæ in ulceribus Mammillarum solis foliis cussilaginis cum fructu usâ est. Sufficit ex mastice, thure, aliisque per infundibulum in ulcus immisus, non contemnendus usus est. Acra omnia vitanda sunt tanquam venena. In Ulceribus cancris mitiora ex vegetabilibus præstant aliis, qualia sunt à Cartelanis jam denominata Decocta Veronice, heder. terrestr. scabios. scrophular. fumar. mista cum C. C. pp. plumb. ust. camphor. cerulâ, melle, & aliis. Fonticuli nonnunquam in ulceribus hisce Mammillarum insignem navant operam. Reliqua ex capite generali de Ulceribus peti possunt.

Mammarum Magnitudinem indecorum præter dictam tenuem, & parviorem ciborum valde nutrientium usum, imminuere quoque possunt frequentiores sudationes, & auctus mensium fluxus, tum externa adstringentia imposita ex gallis, balastis, malicorio, foliis prunor. sylvestr. alumine, &c. Quid folia hederæ arboreæ valeant in constringendis mammis, & ipsarum formâ decorâ conciliandâ, de eo vide Observationem in Epistolâ nostrâ secundâ ad Virum Celeberr. D. D. *V. Valdesmulum*, Collegam & Amicum nostrum exoptatissimum. Confici quoque possunt formæ plumbeæ mammis imponendæ, ut ab iisdem comprimentur, & majus earundem prohibeant augmentum, quæ si apta formentur magnitudine, & puellis adhibeantur, priusquam hisce mammillæ in majorem excreverint molem, easdem coercere possunt, ut & parvulæ permaneant, & duriores reddantur, quod sæpe exoptant corporis sui cultui & decori nimium studentes famellæ, quæ de causâ formæ istæ illinuntur oleis hyoscyami, nymphaeæ, cydonior. myrtillorum, quibus tamen linimentum ex album. ov. & alumine præferri posse censuimus. Ad magmas graciliores reddendas proficuum est oleum Nuc. Myristicæ externè illitum. Item ad mammarum nimiam intumesceniam laudatur lixivium calcis vivæ cum spongia impositum.

In Trichasi Mammarum ad pilorum faciliorem expulsionem sudorifera conferre possunt, ut lac vel alii liquores spissiores, in quibus pili isti conglutinantur, dissolvantur, & effluendo pilum unâ evehant, vel minis impediant, quò digitis aut forcipulâ extrahatur.

## CAPUT X.

## De Papillarum Fissuris, Foveâ, Defectu &amp; Imperforatione.

## §. I.

*Papillarum Fissura, Fovea, Defectus, Imperforatio.*  
**P**apillæ mulierum gravidarum aut puerperarum præcipue lictantium *Fissuris*, live *Rimis*, quas Græci *Rhagades* nuncupant, aliquando vexantur, quæ & *Scissura* dicuntur, & sunt cutis quædam sejunctiones profundiores, quales & labiis, ano, utero, aliisque corporis partibus superveniunt: aliæ *Foveæ* molestantur, hoc est, cūm maximâ in Papillâ; aliis Papillæ planè deficiunt, nonnullis eadem sunt imperforatæ.

*Pari aff. Ita.*  
 §. 2. *Partes affectæ*, de qua agimus, vocantur Papillæ, quo nomine fungosum illud corpusculum vocatur, in Mammis protuberans, puerique ore excipiendum, multis foraminulis perforatum, in quæ foramina tubuli lactei desinunt, lactique ex his sucto pressoque exitum præbent.

*Diagnosis.*  
 §. 3. Affectus hi in ipsam visum incurrunt, & lactantes summo afficiuntur cruciatu in Fissuris & Foveis Papillarum, valde enim ipsis molestæ sunt, ex quibus aliquando sanguis stillat, seu observavit Cl. D. *Mays Prax. Chirurg. rational. Obs. 7. Decad. 4.* sæpe tamen Fissuræ hæc ichorem stillant, seu lympham corruptam acrem. Sunt enim valde dolorificæ mulieribus, maxime ubi lac sūgit infans, ubi aliâs eadem Papillæ sanæ existentes potius à suctione infantis titillationem ac voluptatem sentiunt.

Defectus Papillarum præter inspectionem nullo indiget alio indicio; *Imperforatio* verò cognoscitur, quando lac in Mammis existens exitum nullum invenit, etiamsi manibus mammae, aut papillæ ab infantibus sugendo gingivis & labiis comprimantur.

*Mutatio morborum horum secundum Galenicum.*  
 §. 4. *Causa* Papillarum *Fissurarum* & *Foveæ* statuitur à *Galienico* ipsius cutis papillas obducit tenuitas deni suctio fortior infantis, aut lactis & humorum feroforum & biliosorum acrimonia, à quibus cutis dirumpitur aut erodatur.

Papillarum *Defectum* vel à primo ortu esse annunt, ex errore aut debilitate formatricis, aut ab ulceribus acerbis, à quibus Papillæ erosæ fuerint & absumptæ, nonnunquam eas solum intra mammas delitescere dicunt, donec fortiori suctione proluciantur.

*Imperforationem* itidem ab ipsa natiuitate ita existere dicunt, dum nulla foramina in utero sunt elaborata, vel oriri postea serunt à callo post ulcus relicto & papillas obstruente.

*Paracelsum.*  
 §. 5. *Paracelsus* Papillarum *Fissurarum* & *Fovearum* causam adscribit salî carnis vel sanguinis, sine corruptione cum sudore prorumpenti, & absque sanie papillas dirumpenti. *Defectum* & *Imperforationem* evitutus formatricis & crescitivæ inbecillitate dependere existimat, unde partes hæc non satis extra mammas propelluntur, aut perfectè non sint elaboratæ.

*Helmontius.*  
 §. 6. *Helmontio* oriri videntur Papillarum *Fissura* & *Foveæ* à latice degenerante, partes hæc non benigne irrigantur, sed acore suo erodente. *Defectum* eorum interdum à contractura fieri posse credit, quâ intro retinentur, aliquando verò eas reverâ deficere concedit, quod

ob debilitatem aut aberrationem Archei in femine & utero partes hæc non satis sint elaboratæ, aut nulla relicta principia, ex quibus augeri & procrecere possint, cui debilitati Archei ipsam quoque Papillarum *Imperforationem* adscribit, vel mucro cuidam viscido meatus obstruente.

*§. 7. Willisus* Papillarum *Fissuras* & *Foveas* *Willisium*, tanquam causas deducit ab inclementia aeris, caloris & frigoris excessu, suctione infantis fortiori, succi benignioris cutanei defectu; contra vitiosi salini in poris papillarum existentis dominio, à quibus omnibus Papillarum tunica in fissuras & foveas diffundatur. In *Defectu* & *Imperforatione* easdem admittit causas, quas superiores recensuerunt.

*§. 8. Sylvius* de causis affectuum Papillarum *Sylvium*, consulescentes, percipimus ab eo, findi partes hæc, quando levi inflammatione, vel etiam sanie turgentes, acutius constringuntur, à sugentium gingivis, aut à dentibus eorum mordentur. Inflammari verò partes hæc à sanguine extra vas effuso, ac partes circumjacentes angente acque angustante. Sæpe etiam excoriarî & exulcerari dicit Auctor huc easdem Papillas, ob infantum sugentium os, (hoc est, labia, gingivas, palatum & linguam,) aphthis, aliisque ulceribus male affectum; vel ab erysipelatis quidam specie, ipsas papillas propter causas diversas, febres puta, vel alios affectus femininarum, corripiente; vel ab ipso etiam lacte sponte ac continuo affluente, ipsasque adeo papillas, dum acrimoniam nanciscitur, excoarctante non minus, quam ipsas etiam mammas & partes vicinas, ad quas pertingit.

*Defectum* Papillarum inde derivat, quòd in quibusdam feminis vel ante imprægnationem atque partum aut deesse videantur, quoniam retractæ sunt & latent in mammis, aut revera desint; vel post partum & lactationem per fissuras transversas profundiores à mammarum corpore secedant, & ab infantibus mordicis amputentur.

*Imperforatione* interdum Papillas à primâ natiuitate advitæ exitum laborare proficitur, interdum verò tubulos, per quos lac debet efflui, velin suo exortu, vel in progressu angustatos esse, sæpius per compressionem factam à tunor caliquo aut in papillis ipsis, aut circa ipsas in mammis existente, ac præsertim ab inflammatione; rarius verò per obstructionem, productam à lacte in ipsis tubulis à frigore inopinato papillas afficiente coagulato.

*§. 9. Cartesius* ex præcedentium relatis approbat inter causas Papillarum *Fissurarum* & *Fovearum* statuendas ea, quæ ad fibrarum tunice papillas investientes & tenerinæ rigiditatem & disruptionem faciunt, defectum nempe liquoris benigni, ex mixturâ lymphæ & succi nervosi oriundi, unde fibræ non satis inunctæ & molliores reddita, à vi externâ facile rumpuntur. ac remper asperiore in fibras irruente, suctione fortiore infantis, affectibus ejusdem os

Rt occu-



occupantibus, particulis lactis effusi aut emulcti acutioribus, salis aut acidis, non absteris, sed diutius circa papillas herentibus & exulcerantibus, à quibus etiam Fovea per longum quandoque tempus in iisdem relinquatur.

*Defectum* Papillarum adesse dicunt, tum ex nimia tubulorum brevitate, unde per influxum lactis tunica non satis queat distendi, & in figuram papillæ diduci, tum quod per ulcera, morfus infantis, profundiores fissuras, aut alia quædam infortunia mammæ iisdem fuerint privata; tum quod in virginibus & mulierculis quibusdam tenerioribus ante partum, ob defectum lactis & liquoris nervi motu suo & influxu eas propellentium, intra mammas adhuc deliteant.

*Imperforationem*, sive effluxum lactis à Papillis prohibent, dependere volunt vel à crassitie & continuitate ipsius tunicæ, partes hæc fungosas invellentes, propter quam oscula tubulorum in vertice papillarum nulla existere possint, vel ab ipsorum tubulorum obstructione à lacte crassiore, aut à liquore acido coagulato, vel, quod *Sylvius* jam innuit, à compressione eorundem tubulorum à diversis quibusdam tumoribus, mammæ circa regionem papillarum affligentibus.

*Notrum  
iudicium  
de causa  
Papilla-  
rum Fissu-  
rarum.*

§. 10. *Notrum* iudicio causa harum *Fissurarum* est vel à lactis acrimoniâ nimia, quia sæpe infantes eodem tempore & aphthis laborant, quod tanquam commune malum est à communi causâ oriundum, vel à seri acrimoniâ falsa. Sic quoque *Fissuræ* hæc ex lacte acido post infantum fortioriem suctionem adhaerente oriuntur; quò & referri possunt causæ externæ, aer nimis frigidus acris, qualis in Martio, & à constitutione Aquiloniâ dominatur, & tunc itidem in his, quæ tenerioris sunt constitutionis, & tenerâ cuticulâ præditæ, fissuras in labiis & manibus excitare solet, quia aer tum temporis in se continet multum acidi nitrosi; suctio infantis validior, abs qua excoarctatio oritur, & hinc accedente lymphâ vel lacte acris cuiusvis conditionis exulceratio levis subsequitur.

*Fovea.*

Causa *Foveæ* est disruptio fibrularum inter fissuras existentium, à fortiori adhuc acrimonia acidi in fissuris collecti producta, quod facile fit, dum lymphâ deficit benignior oleosa, tum glandulas, tum fibras cutaneas aliâs humectans & illinens, ne nam facile ab externâ quadam molestia dirumpantur.

*Defectum.*

*Defectus* Papillarum vel est à natiuitate & vitio organi, vel à vulnere aut ulcere, à quibus absumuntur & nonnunquam corroduntur papillæ, sæpissime enim cum à suctu infantis sanguis exit, & rima in ulcus, quod aliquando absumit & corrodit totam papillam, degenerat, ceu aliquoties vidimus.

*Imperforationis.*

*Imperforatio* est à soliditate aut obstructione tubulorum Papillarum, quæ vel est à mala conformatione, vel à materia viscida, vel lacte grumoso, alioque humore acido tenaci eos obstruente.

*Prognosis.*

§. 11. *Fissuræ* Papillarum & *Foveæ* nisi citò tollantur, facile in ulcus transeunt, ob acre ibidem hærens: unde sæpe tota Papilla corroditur & absumitur. Ulcera hæc dein difficulter sanantur, quia ob infantum suctionem nulla aut exigua quies Papillis conceditur.

*Defectus* Papillarum à natiuitate & malâ conformatione incurabilis habetur, cum pars semel amissa restitui nequeat, si verò intra Mammas saltem lateant in virginibus quibusdam, tempore necessitatis suctione aut lactis & spirituum fortiori influxu feliciter aliquando propelluntur.

Sic & cum *Imperforatione* Papillarum comparatum est, quæ enim à primo ortu est, nullam admittit curationem, ea verò, quæ à lacte aut alio quodam succo spissiore tubulos obstruente natales fuisse, remediis convenientibus poterit aperiri.

§. 12. In minutissimis his affectibus etiam *Diatæ*.

ritè observanda est, alias incaustum laboras medicamentis eos curare. Aer ergo Aquilonius frigidus, acidus scilicet, nitrosus ac acris fugiatur, nec tali aeri exponantur papillæ. A cibis acrisbus salis & fumo induratis abstineant ægræ. Sic etiam potus sit optimæ conditionis. Reliqua ad *Diatam* spectantia ita moderentur, ne quicquam eorum auream excedat mediocritatem.

§. 13. Curatio Papillarum *Fissurarum* & *Foveæ* instituitur à *Galenico* remediis externis adstringentibus, glutinantibus & consolidantibus, epithemate nempe ex decocto aut infuso geranii, archimillæ, cort. tilix, &c. tepide imposito, vel linimentis ex semine psylli & cydon. aqua plantag. extract. additis tutiâ, cerulsi, & ol. rosæ, aut oleis lilior. alb. amygdalar. rosar. vel butyro recenti & axungia anatis. Infante mammæ petiuro, papillas abluere iubent aquâ rosarum, atque ob curam diuturniorem & vehementem lactantis à compressione in mammillarum dolore, quidam instrumentum suadent per quod lac exsugatur. Præservationis gratiâ ne papillæ findantur, nonnulli utiles repperunt cupulas aut pileolos & cerâ paratos, & resina abietinâ repletos, thoraci lineo alligatos. ne decendant, & papillis superimpositos.

*Curatio  
secundum  
Galenici  
Papilla-  
rum Fissu-  
rarum &  
Foveæ.*

*Defectum* Papillarum totalem, sive à primo ortu sit, sive à consumptione per ulcera, nullis remediis sciunt rescarcire, si verò intra mammas papillæ solum deliteant, earum propulsionem facilitate solent vel instrumentis suctoribus, vel cupulis glandium, aut testis avellanarum resina laricea repletis, & suctione catellorum.

*Imperforationi* ab ipsa natiuitate ita existenti, aut à callo subortæ, nullam norunt medelam nagustiam verò meatum dilatari promittunt suctione frequentiore, vel catulis, vel instrumentis instituenda.

§. 14. *Paracelsus* in Papillarum *Fissuris* & *Foveis* usum vernicis commendat, qua papillæ hoc morbo afflicte sunt illinendæ, vel axungia taxi, aut limimento de lithargyrio. In *Defectu* & *Imperforatione* aliorum votis facile subscribit.

*Curatio  
morborum  
secundum  
Paracel-  
sum.*

§. 15. Ex *Helmontii* sententia *Fissuris* Papillarum convenit inunctio ex sevo cervino cum oleo rosarum in linimento redacta; *Defectus* verò aliquando obedit remediis adversus contracturas probatis, totalis autem non curatur, ut *Imperforatio* ab obstructione meatuum diaphoreticis corrigitur, altera verò in utero facta nullis potest remediis emendari.

*Helmonti-  
um.*

§. 16. *VVillisius* curationem instituit Papillarum *Fissurarum* & *Fovearum* sanando cutem seu tunicam læsam & dissilam linimentis externis sal vitiosum corrigentibus, domantibus, & partes divisas denuo conglutinantibus, quæ

*VVillisi-  
um.*

quæ sunt ex butyro insulso, medullâ vitali, ol. rosar. hyperici, pinguedine omenti agnini, terrâ sigillatâ, tutiâ, camphorâ, vel axungia hirci cum oleo ovorum mista, & aliquando solo unguento pomato aut rosaceo. Ad *Defectum* & *Imperforationem* nulla proponit remedia, sed Antecessorum prolati consilii acquiescit.

*Sylviu.*

§. 13. *Sylvii* curationem *Fissurarum* & *Fovearum* in Papillis existentium optimè absolvi posse docet, si 1. quævis mala ipsas papillas occupantia, inflammationes & similia sine mora curentur ac tollantur; 2. ipse Fissuræ in tempore consolidentur. Inflammationes curat medicamentis lac coagulatum dissolventibus, cepis nempe sub cineribus asfatis, & emollientibus ex bolbis lil. alb. rad. & fol. alth. fol. malv. farin. sem. lin. fenigr. cataplasmatibus formaturpatis, additis salibus volatilibus blandioribus. Excoriationis curam consistere ait r. in sublatione affectûs infantem urgentis, 2. in ipsâ restitutione Papillarum excoriatarum, per aëum temperantia & blandæ exsiccantia, aut consolidatione exulceratarum. Inter aëum Papillarum temperantiæ censet aquam rosarum, plantaginis, mucagineum, sem. cydonior. & gummi, tragacanth. cum aquis jam dictis paratum, cremorem lactis cum admista creta alba in pollinem redactâ, quod remedium in Erysipelate quoque papillarum prædicat, nec non aquam calcis vivæ cum §io dulci decoctam, & aquam sambuci, non neglectis medicamentis interius, imprimis si febricula aliqua simul currat, in quo casu præ multis aliis medicamentis blanda sudorifera utilis existimat. In Excoriatione excitatâ à lacte sponte continuo ferè effluente, atque acrimonia suâ tum ipsas Mammas, tum Papillas rodente, medicamenta reposcit blandè atque potenter exsiccantia, quale lixivium calcis vivæ exitit, & ne novo lacte continuo efflente alium hoc renovetur, dandum vult operam, ut vase aliquo conveniente vitreo, vel ex laminis ferri tanno tecti ita efformato, ut Mammas absque notabili earum pressione applicari possit, lac illud excipiat, & subinde effundendum colligatur. In Papillarum exulceratione laudat balsamum *Ætis* quemvis, imprimis autem gratissimum, ut noceat infanti sugenti: qualis est anisatus, tum quoque balsamum Peruvianum, quem & adiplarum Fissurarum consolidationem summè æstimat proficuum, uti ipsum quoque oleum ceræ ritè paratum.

*Defectum* Papillarum & totalem, nec rene- diis blandis, nec vi foras extractâ & in ambitum circumligatâ Papillam repræsentante aut mentiente parte relaxari posse faceret, retractas verò atque in Mamillis latentes, vel spontè post partum emergere, solere vel blando saltem affric- tu, pileorumve ceterorum, eburneorum, argenteorum, plumbeorum, aliorumve inpositione sensum prodicuras esse promittit.

*Imperforationis* verè curationem novit nullam, angustatos autem tubulos à compressione relaxari docet, sublatis tumoribus compressio- nem istam excitantibus, & imprimis inflamma- tione; obstructionem earundem referari fomen- to aromatico & sale volatili eidem juncto.

*Carstium*

§. 18. *Carstiani* ad curationem Papillarum *Fissurarum* & *Fovearum* pro voto obtinendam, necessariam ducunt, ut fibræ rigidiore siccæ

emolliantur & humectentur, atque quod fal- sis acidi acuti in succis istis collectum est, hebetetur & corrigatur, quo consolidatio partium se- junctarum faciliè subsequatur. Omnium ergò primò particulas acutas acido-salâs reliquis in- tentionibus adversas domant remediis porosis & volatilibus, spiritui vini camphorato, aqua cal- cis vivæ dulci, linimento ex oleo, sem. lini & cremore *Ææ*, terrâ *Q* dulci, mucilaginis, & id genus pluribus. Fibras rigidiore cum emol- liunt pinguioribus, axungia animalium, oleo ovor. lumbricor. momordicæ, unguento anreo cum guttulis quibusdam olei destillati, ligni Rhodii. Mitigatis particulis acutioribus, & fibris emollitis, consolidationem faciliè subse- quatur esse confidunt, aut ulceribus profun- dionibus adhuc partes has occupantibus oleum myrrhæ, vel balsamum de Capiva, vel alium convenientem instillant, & cavitatis oppletio- nem, sicque ipsam consolidationem vel unguen- to diapompholygos, vel emplastro gryleo, lupti- co aut diapalmæ penitus perficiunt.

*Defectum* Papillarum illum tantum curan- dum aggradiuntur, qui falvis tubulis & illæxâ regione harum protuberantiarum à sola occul- tatione earum intra mammas dependet, ad quem suppleendum annulos ex linteo cerâ obducto, vel alia conveniente materiâ paratos imponunt, si- mulque mammas fricant, & annulos versùs pre- munt, ut ratione hæc papillæ extra annulum pro- pellantur, ubi & cupulas, aut pileolos, instru- menta ab aliis suctoribus dicta approbant, ut hujus- modi impressione, dum ær circa instrumenta ista majori copiâ collectus vi in mammarum re- gione circa papillas, fibras cum tubulis & succos in his contentos premit & pellit, papillarum e- gressus promoveatur.

*Imperforationem* repræsentantem obstructio- nem & occlusionem foraminulorum Papillarum à lacte inspissato & coagulato, referat solent diaphoreticis alcalicis & volatilibus, cum spiri- tuosis, incidentibus & resolventibus, qualia sunt spermaceti, cum §io diaphoretico, ocul. *Æb*. De volat. C. C. Spiritus lumbricor. elæosac- char. fœnic. anis. &c. externis linimentis dissol- ventibus & lac fluidius reddentibus, ex ol. amygd. lumbricor. Camomill. cum oleis destill. anis. fœnic. vel fofus ex flor. camomill. fol. ro- rismar. herb. menth. semen fœnic. in Spiritu vini maceratis, & vel in sacculo, vel intra lintea tepidè impositis. A compressione tumorum mammas occupantium ortam lactis retentionem & effluxum prohibuit, morbis istis sublatis, sponte mutatum & correctum iri sibi aliisque persuadent. Veram verò imperforationem & tunicæ Papillarum crassitiem in meliorem sta- tum redigere velle, opus existimant plane diffi- cile, & plerumque omni carens optato successu, ad quod perficiendum vera adhuc deficiunt re- media.

§. 19. *Nostri* cura in *Fissuris* Papillarum eò *Nostri* ca- dirigitur, ut accrimonia omnis corrigatur, inter- ram Pa- nē quidem per diaphoretica acidum simul ab- pillarum sorbentia, ut §ium diaphoret. ocul. *Æb*. Anti- Fissuræ & hect. *Pster*. cum cinabarinis mixta & sæpius Foveæ. exhibita. Externè hæc Fissuræ curantur ut Aph- thæ, & conducit mucilago sem. cydon. p. syl. cum terra plantag. rosar. sperm. ranar. extract. addito momento utrius pp. & sacchari §i vel

Rt 2

papillæ

papillæ exulceratæ & fissæ iungantur xungia canis, vel medulla cruris vituli, vel pingued. hirci, adjecto grano uno & altero camphoræ; imponatur quoque pileolus plumbeus in apice foraminibus pluribus pervius. Nostra experientia oleum ovorum allis palmam præcipit externè illitum. Ad Fissuras Papillarum dolentes, quæ vel à suctu fortiore infantum, vel intemperie lactis, vel lactentium aphthis oriuntur, oleum hyperici admoveatur, papilla prius salivâ madefactâ. Convenit etiam oleum rosar. in quo radices pimpinellæ fuerint infusæ. Sic quoque oleum ceræ, unguentum diapompholyg. nutrit. alb. Rha. &c. sunt utilia. Sequentia à *Vigierio* experientia sæpe sunt comprobata.

℞. Ung. alb. Rha. & rosar. lot. ▽  
plantag. aa. ʒiib.  
Tut. pp.  
lithargyr.  
ceruss. pp. lot. aq. rosar. aa. ʒiij.  
succ. solan. ʒiij.  
ol. Myrsitor. q. l.  
F. Unguentum.

Vel:

℞. Ung. ros.  
Ol. ros. omphac. aa. ʒiib.  
succ. plantag. ʒib.  
sev. virulirecent. ʒx.  
lithargyr. pp. & lot. aq.  
plantag. aut rosar. ʒvj.  
Pulv. plumb. ust.  
ceruss.  
Tut. pp. aa. ʒiij.  
terr. sigillat.  
bol. Armen. aa. ʒiib.  
M. in mortario plumbeo, ducantur per duas  
boras pistillo plumbeo,  
F. Linimentum.

Sequens etiam nostrâ experientia comprobatum est.

℞. succ. herb. beton.  
veron.  
origan. aa. q. v.  
butyr. insuls. q. l.  
Coq. ad consumps. succorum, deinde per linteum colatur.

Papillarum morbi curantur certius mucilagine seminis cydoniorum cum Tutia ppt. & sacch. Fini.

Brevi etiam sanantur hæc *Fissura & Fovea*, si papilla singulis diebus aliquoties leviter tangatur peninæ pluriâ oleo ceræ, vel melius myrrhæ imbutâ, ceu observavit D. *Myrs*. Descriptio verò olei myrrhæ ad usum hoscæ convenientis est sequens.

℞. Myrr. elect. pulv. q. v.  
Indatur albuminibus ovor. ad duritiem coctis, & in loco humido solvatur in liquorem oleaginosum, recens semper parandum.

Si papilla sanguinem stillet, opponatur tantum liquor stypticus, vel fiat linimentum ex pulv. gum. Arab. amylo, & propriâ salivâ, quo papillæ sæpe tangantur.

*Defectus* Papillarum si est à nativitate, vix datur remedium. In quibusdam verò virginibus ita delitescunt, ac si is delectatur sint, omni ope ergo annitendum est. nun ope instrumenti alicujus luctuori dicti eliciantur, ut munere suo satis benefungantur. In huius instrumentis invenientis sexus muliebris maxime variat: sunt, quæ nucem moichatam excavatam papillis delitescentibus applicant; aliæ pileolos ex cera & itanno imponunt, aliæ vitra parva instar cucurbitularum applicant, nonnullæ annulos ex cerâ & panno conficiunt & circumcirca ponunt.

*Imperforatio* ipsam tubulorum à materia viscidâ vel lacte coagulato obstructionem pro causa agnoscens curabitur omnibus illis medicamentis, quæ materiam viscidam incidere, attenuare, lac coagulatum aut congruatum resolvere, acidum destrruere, & omnia in fluorem deducere queunt, scilicet nempe volatilia & diaphoretica alcatia, quibus porci simul convenienter asperientur, & repagula quævis auferentur, quorum sequens esse potest formula.

℞. Ocul. s. gr. x v.  
ʒii diaphoret. ʒb.  
Myrrh. gr. iij.  
sperm. cet. gr. vj.  
Ol. destil. rosmar. gr. i.  
M. F. Pulvis, d. una vice.

℞. Aq. faniç. ʒb.  
Card. bened. ʒij.  
Regin. Hung. ʒj.  
Spir. xci anisat. vel  
faniçulat. ʒj.  
Syr. menth. ʒij.  
Sord. simpl. ʒj.  
M.

Externè præter spiritum vini Camph. & aquam calcis vivæ, leves frictions & illusiones salium volatiliu liquorum curationem promovebunt. Conformationem malam in meliorem non facile est reformare, præmissis, quando in utero fœtus eam jam contraxit, nulla enim remedia ad opus hoc satis sunt idonea; perforationem verò acui quidam per papillas instituere velle, absque dolore non peragetur, quem sexus hic tenerior vix sustinebit, nec certò Medicus potest promittere, operatione istâ lactis effluxum fote promovendum aut provocandum, sed infantes verius alentur, aliis lactandis si tradantur nutriticibus.

## FINIS LIBRI SECUNDI.

JOH.

# JOH. DOLÆI ENCYCLOPÆDIÆ CHIRURGICÆ RATIONALIS.

## LIBRI III.

### DE MORBIS ET EXTERNIS ABDOMINIS.

#### CAPUT I.

#### De Ventriculi Tumore, Ulcere & Vulnere.

**D**Escendimus ad inferiorem Microcolmi regionem, Gasteranacis, insigni illi Toparchæ, à morbis variis ab externa violentia, aut internâ quadam rempestare turbida illatis lacescitis aut oppresso suppetias laturi. Merito verò ipsi ejusdem approximamus metropoli, Ventriculo nempe, ut eundem vel præmuniamus, ne ab hoste externotam facile occupetur, vel ex eadem hostem jam admittimus, cum majori ipsius dedecore ejiciamus. Etenim primam sibi reposcere curam in Ventris hæc regione ipsum Ventriculum, facile nobis concedent, qui norunt, quantam utilitatem ab ejus integritate tota capiat œconomia animalis, & è contrario quantâ ab ejusdem debilitate, aut destructione afficiatur noxâ, & quod vix ulla in abdomine labore pars, cui hic non compatiatur, hinc primas illi debet partes ipsium ejus nomen est indicio, quo tanquam parvus indigitatur Venter, & jam iudum ab Hippocrate animadvertum, quod ventriculo corpus retribuat, ubi vacuus fuerit, & de ipso fruatur, dum plenus existit: *Helmontius* autem operationes partis hujus mirabiles majori considerans stupore, ipsius Animæ sedem eidem, & potissimum Pylo-ro, quem Rectorem constituit, audaciùs attribuit, quibus tamen operationibus miraculosis absque Gasteranacis, sive liquoris nervosi subtilissimi, & diutius intra tubulos fibrarum membranarum jam commorantis, cujus imperio & ipse liquor dissolvens à sanguine per arteriolas secretus, & per glandulas & interio-rem tunicam in cavitatem stillans quodammodo subijcitur, potenti moderamine & ad motum pronitate minime fungerentur, cui ut citò obediat ipsa organica ejus dispositio eum valde reddit capacem. Rejectis verò morbis rariùs occurrentibus, & vel situm, vel magnitudinem, aut figuram ejus totaliter immutantibus, cujus primordia ab ipsa in utero formatione dependent, & invitâ nec facile cognosci, nec corrigi queunt, uti quòd aliquando cum omento in Thorace fuerit repertus, penes *Strauss. Resolut. fœtus Mussipont. p. m. 15.* aut in dextrâ thoracis parte variis humoribus repletus, cum pulmonis in eadem parte carentia, apud *Riverium Cent. 4. Observ. 67. p. m. 646.* per medium sectus ulnam Parisiensem superavit, apud *eund. p. 664.* com-

muniores saltem pervestigandos aggredimur, quales sunt *Tumor, Ulcus & Vulnus*. Præterquam verò quòd venter noster diverso modo intumescere solet, præcipè in Hydropse Tympanitide, Hydrops Uteri, Molâ, & quandoque in diuturna obstrukcione Mensium & Lochiorum, Ventriculus etiam ipse intumescere potest ex ipsius inflatione, & stagnatione succorum in capacitate ejus facta, sed de his hic loci sermo noster non erit, cum in Encyclopædia Medicâ jam plene sint pertractata; sed Tumoris ventriculi nomine hic venit vulgo *Abscessus* particulatis ventriculi, cujus cum Auctores Chirurgici inter affectus medi ventris quoque faciant mentionem, pariter & nos, hic tamen potius, quàm alibi, de ipso utilis quædam tyronibus sumus communicaturi.

Ventriculus itaque non minùs ac alia partes molles Apostemationi, sit venia verbo, obnoxio use est, quod cum contingit, vocatur *Tumor* seu *Abscessus* Ventriculi, qui nonnunquam in aliquâ ejus parte, tum externa, seu gibbâ, tum intimis penetralibus exoritur, & aliquando indurefcit, interdum autem suppuratur, ac in convexa parte ventriculi existens, ruptione sua pus in abdomen, extra ipsum ventriculum, in parte verò ejus intrinsecâ & concavâ diruptus, materiam purulentam in capacitatem ipsius dimittit.

Ex timoribus hæcæ aliisque causis nonnunquam & *Ulcera* generantur Ventriculi, quæ raro quidem, sed tamen aliquando occurrunt, sæpiùs autem *Vulnera* ipsi accidunt Ventriculo, cum pars hæc æquè ac alia externis illis injuriis violentis sit exposita.

Affectus hi cum solo nomine eorum auditò omnibus parant, eos hic pluribus verbis describere vel definire operæ haud ducimus pretium.

§. 2. *Pars affecta* est Ventriculus utriculum ferme exhibens, constatque pluribus diversæ naturæ membranis, & quadam villosâ glandulis constât, ac in talem aptatur formam, talibusque instruitur contentis, ut digestionis officina commoda fiat, cibum scilicet & potum facile admittit, continet, & mediante succo quodam ex glandulis suis prodeunte, salivæ haud absimili, à sanguine separato, ita dissolvit, ut succulentæ partes à sterulentis secedant, totum denique solutum convenienter expellatur. Ex tribus

Rc 3

enim



enim membranis componitur Venterculus, quarum interior & exterior ex fibris tendinosis sunt contextæ, & media ex fibris carneis. Medium spatium, quod interjacet, multis minutissimis glandulis vesicularibus est conspersum. Ductus illarum excretorius interiorum tunicam pervadunt, & in ejusdem cavitate plimulæ instat quid efformant, hinc aliis vocatur *Tunica Tomentosa*. Cùm Tunica mediæ textura sit consideratur, tres villos videntur in ipsâ fibrarum ordines in brutis, duo verò in hominibus; prior nil aliud est, quam continuatio fibrarum longitudinalium œsophagi, quæ à superiori ventriculi orificio ad pylorum pertingunt: Alter verò est continuatio fibrarum circularium œsophagi, quæ in angustos rectos à longitudinalibus secantur. Diversi sunt omnes fibrarum ordines nullam aliam ob causam instituti fuisse, nisi ut morum peristalticum in stomacho perficerent. Hujusce motus & vibrationis quasi ministerio alimenta, quæ in stomachum per imperium ejus orificium delapsa sunt, ab illo per pylorum extantantur. Cæterum ventriculus arteriis à cœliacâ gaudet, venas verò ad splenicam & portam mittit, par vagum suppleditur illi duos nervorum ramos satis magnos, & innumera fibrillæ nervæ à plexu menterico in illum exportantur, & tandem ab eo egrediuntur vasâ normallâ lymphaticâ, quæ ad chyli receptaculum contingunt. In lupo ventriculis inter tunicam carneam & nervæam apparent sæpe glandulæ satis ingentes, & soliditate fere cartilagineæ, in quibus hærent lumbriculi exiliiores, quos stimulos hujus generis animalis summariter appellant. Sic & Celeberrimus D. Boerhaave P. P. amicus singularis, in canibus necum simile paradozum observavit.

#### Diagnosi.

§. 3. *Tumor* Venterculi innatescit ex ipsius distentione externa, & ipso visu & tactu cognoscitur. simul enim regio sinistra infra papillam comprimitur & intumescit, adest etiam appetitus prostratus, aliquando vomitus, aliquando diarrhœa.

*Ulcerâ* Venterculi cognoscuntur ex eo, quando è regione istâ effluit materies purulenta, & si sedit vomitus, dolores terminoli maximi, aliaque venterculi vitia: sæpe observavi halitus graveolentiam, sœces alvine sunt interdum nigre, copiosa foetidaeque, adest sapillimè his in affectibus ardor venterculi ob acidum corrosum ibidem latens.

*Vulnus* ipso etiam visu innatescit, & simul ad sunt tormina, singultus, sudores sæpe erumpunt frigidi, & externa frigeant, appetitus prostratus, injecta alimenta & potulenta ex vulnere effluunt, quæ vulnera facili in ulcerâ transeunt, exinde enim venterculum vulneratum esse prædicamus. Quod autem alimenta ejiciuntur per vulnus, mirum non est, quia venterculus adeo laxus est, ut sit foramen factum, simul etiam convulsionibus vexatur, hinc vomitus & tormina. Reliqua symptomata oriuntur ab impedita sanguinis circulatione, unde extrema necessitas frigidescere debent.

Galenico-  
rum opinio  
de causis  
Venterculi  
Tumoris  
& Abscessus.

§. 4. *Ætiologia* instituitur, præmittimus aliorum judicium nostrum, quidem agmen dicunt Veteres, Galeni effata tenacius persequentes, quorum de causis Venterculi *Tumoris* hæc est opinio, quod originem hic sumat à variis humoribus in venterculo per affluxum, vel per congestionem collectis & in eo corruptis, in

specie verò *Abscessum* frequentius sequi volunt inflammationem hujus partis sanguine in materiam purulentam convertit.

*Ulcus* Venterculi causam statuunt humores acres, vel in Venterculo ex pravis alimentis contractos, vel aliunde transmissos, à quibus tunica venterculi interna abradatur & exulceretur, quod & contingere posse affirmant à causis externis intro assumtis, medicamentis scilicet adurentibus, delecteriis & exulcerantibus imprudenter exhibitis.

Inter *Vulnerum* Venterculi causas externa recentem instrumenta sciendâ, vel purgentia, cultros, enses, tela, aliaque manu violenta per abdomen in Venterculum detrusa, ut continuas ejus inde dissolvatur.

§. 5. Rectè à Galenico ad Chymicorum illum Monarcham *Paracelsum* progredimur, qui his opinio de causis morborum hujusmodi. in Venterculi morbis nullam peculiarem excogitavit causam, sed ut in aliis partibus, ita & hic *Tumorem* à collectione humorum originem faceret, Abscessumque fieri, quod materia collecta nondum adeo fortis sit, ut aperturam efficiat; si verò salia immista sint corroliva, ipsum *Ulcus* sublevari docet cum apertura, & *Vulnus* Venterculo à causis infligit concedit externis, alias quasdam abdominis partes simul disjunctis.

§. 6. Adit nunc per ignem ille Philosophus *Secundum Helmontium*, ut de causis morborum præsentium suam subscibat sententiam, quæ eo vergit, ut Venterculi *Tumor* sæpius dependeat à Pylori regiminis oblixi clausurâ diuturniore, ob quam alimenta digesta ad intestina nequeant transire, sed æquo diutius retenta corrumpantur, & venterculus ipsum distendat, interdum verò cum latice acriori commista partem hanc excedant atque exulcerent. In *Vulneribus* communem admittit causam à prioribus jam indigitatam.

§. 7. *VV. Illiusum*, decus illud Anglorum perierat, à sanguini per arterias intra tunicas effuso, ibidemque per diuturniorem commorationem corrupto, *Tumorem* Venterculi causam deducere non aliter, ac animalis partibus Abscessus soleant contingere.

*Ulcera* causam Venterculum instantiam ipsum aut sanguinem esse corruptum & purulentum, acrimonia sua membranas venterculi exedentem.

*Vulnus* Venterculi causam admittit res externas sciendâs vel pungentes, per violentiam quandam ipsi venterculo intrusas.

§. 8. Lugdunensium illum *Aesculapium*, D. *Secundum Sylvium* de causis morborum Venterculi jam nominatum, si interrogamus, id deportamus responsi, *Tumorem* vel Abscessum ejus pronasci à sanguine in venterculum, vel intra tunicas ejusdem effuso, & cum humoribus variis commisto & corrupto, quæ miscela aliquando in ipsam abeat suppurationem.

*Ulcus* Venterculo obvenire docet, quando humores isti valde acres sunt & erodentes, & *Vulnus* ab externâ quâdam res erodente aut pungente per pectus aut abdomen ad ipsum venterculum violentius adactâ.

§. 9. Qui Philosophi illius accuratissimi D. *Cartesii* Des *Cartes* principis fundamenta Medica superstruunt, in *Tumore* & Abscessu venterculi succi chylosi in extremitatibus arteriarum in circulationem & stagnationem acculant, abs quâ dum ramuli obstruuntur, vicini tubuli simul

cont.

comprimuntur, & transfluxum succorum impediunt, donec diversæ particulae, porosiores & angulares, à materiâ subtili fortius commotæ, fibras dirumpant, & succus chylosus ob particularum acidarum copiam in materiam abeat purulentam, quæ tamdiu intra tunicas augetur, donec fibras perturbet, & vel per vomitum aut feces ejiciatur, vel diutius retenta graviora mala producat.

*Ulcus Ventriculi* causam ipsam illam erosionem aut disruptionem indignant fibrarum membranacearum stomachi, factam à particulis angularibus acutis ipsius chyli corrupti. *Vulnere* Ventriculi communes adignant causas, ab aliis jam manifestatas.

*Noftra sententia de causa Ventriculi Tumoris & Abscessus.*  
§. 10. *Noftrum* ut adjiciamus calculum, affirmamus, *Tumorem Ventriculi* ut plurimum oriri à stagnatione sanguinis & succorum circa ipsius regionem, vel externè à frigore contractâ, vel internè à sanguinis constitutione depravatâ, vel à contusione, ulceratione, vel combustione, & tunc dicitur symptomaticus. Obstructio enim minimorum vasorum ventriculi adest, vel succi nimis crassius viscidus sunt, vel sanguis & succi reliqui eò nimia copiâ impelluntur.

*Ulcus Ventriculi* est ut plurimum ab acidis corrosivis seu acerbis succis, partes has persulfentibus & ibidem stagnantibus, & imperium sibi rapientibus, cum enim acidum in arteriis gastricis sanguinem stagnare faciat, vicinas ventriculi partes corrodit & devorat, hinc ulcus, particulae enim illæ acidæ pertinaciter hærentes in poris tunicarum ventriculi humores alios persulfentes inscunt & convertunt in acidos, qui dein ob tubulos ab ulceribus interruptos circulationem perennare non valentes, à succis à tergo continuo infrequentibus propelluntur foras in cavitatem ulcerum, hinc ulcera hæc ut plurimum fordida sunt, & cum pars hæc ventriculi glandulosa existat, eò magis semper alius humor ex his glandulis emanat, & in eundem vertitur succum acrem & corrosivum, & cum simul fibrilla stomachi discindantur, hinc ulcera ista sunt valde dolorifica, imprimis si fuerint in superiore ventriculi parte, putà orificio, quod ob concursum nervorum valde est sensibile. Observavimus etiam à pustula acri ventriculi parti exteriori adherente, abscessum & ulcus excitatum fuisse ventriculi: confer Eph. Germ. Ann. 9. & 10. Obf.

*Vulnera* oriuntur à continui solutione vi factâ, à causa scilicet externa. Sic vidimus aliquoties ventriculum vulneratum ab ense, ut quicquid fecit cibi immitteretur, illicò ventriculi in parte iterum effluerit. *Vulnera* hæc vel à parte posteriori, vel anteriori inferri solent, nonnulla sunt tantum superficialia, alia per ipsam tunicam ventriculi transeunt, alia sunt cum contusione.

*Prognosis Ventriculi Tumoris.*  
§. 11. *Prognosis* quod concernit, *Tumores Ventriculi* non sunt spernendi aut negligentius tractandi, cum liquorem digerentem vel corrumpere vel impedire possint, ne per internam tunicam in ventriculi cavitatem stillare valeat, hinc dyspepsie, anorexiæ, quin vomitus quandoque, & alia symptomata graviora subsequuntur. Materia etiam purulenta post abscessum ruptum existente copiosiore & aciore, diarrhoeæ, vomitus enormes, & aliquando suffocationes, interdum etiam mors ipsa tragædiam hanc claud-

re solent. Forissecus per exteriorem tunicam si abscessus fiat disruptio, materia purulenta non facile evacuetur, unde spuria nonnunquam suboritur pleuritis, & verendum, ne masculi adjacentes aut reliqua viscera exedantur, & nova quædam vomica in abdominis cavitate colligatur.

*Ulcera ventriculi* difficillima curatu esse, extra omnem dubitationis aleam ponimus, ea verò aliquando curata fuisse, plures testantur auctores Medici fide digni; sic & nos exemplum communicavimus curiosis, cent superius dictum est; hinc Cl. *Mercellus Eph. Germ. Decur. 1. Ann. 2. Obf. 219.* exemplum toraminis cujusdam dat in ipsa sede ventriculi elatiore, sub sterni fortissima scatenis amuræ, de qua patiens ante annos aliquot conquectus, brevi post aperturam moriebatur; confer *Stalpart. Obf. 26. Obf. varior. cent. post part. 1. item Salmuth. C. 1. Obf. 43. Holzer. c. 43. Forest. l. 18. Obf. 33. Scultet. Armament. Chir. Obf. 50. Hildan. cent. 3. Obf. 20. &c.* Ulcera enim hæc plerumque ægros ad mortem, ni hanc accelerent, comitari solent.

*Vulnera Ventriculi* lethalia statuit *Hippocrates Aph. 18. S. 6.* non verò quod simpliciter talia sint, sed quæ magnam violentiam & diffissionem involvunt, *Celsus* verò, *Avicenna*, alii plerumque lethalia illa putant, plura tamen novimus exempla eorum, quorum saucii curati sint ventriculi. Confer *Fallop. Dimerbroc. p. 33. c. 6.* Sed ut verum fatear, inter rarò contingencia illa referenda esse existimo. Meretur hic legi *Obf. 4. Cent. 2. Cl. Steph. Blankard. Anat. pract. rar.* Semper ergo his in vulneribus notandum est, sintne vulnera magna, penetrantia, an minus; sintne in orificiis ventriculi, an in fundo ejus. Superficialia ergò vulnera facilius curantur, quàm penetrantia. Sic & periculossima sunt ista, quæ sinistro ventriculi orificio insiguntur, ob diffissionem multorum nervorum ac fibrarum ibidem prostantium, inde affectus spasmodici alique terribilia oriuntur symptomata. Non tam periculosa sunt ea vulnera, quæ in ima parte ventriculi inferuntur, quia substantia ista ventriculi carnosior, crassior atque non tam membranacea est, hinc facilius sanari possunt. Si arterie magnæ aut alia vasa fuerint rupta ac discissa, eò periculosius malum est.

Rara & miratione digna sunt duorum cultellivororum exempla, quorum alterius *Osvaldus Crollius Præfat. Basil. Clym.* meminit, cum inquit, Bohemum rusticum Anno 1631. Præge cultellum novem pollices longum deglutivisse, cujus acumen paulò supra ventriculi fundum ad sinistram partem extuberabat, verso ad dorsi spinam manubrio. Hic autem culter post duos menses per Chirurgum Florianum Matthias feliciter per scissionem extractus, locusque dein sanatus est. Hunc verò cultellum Ipse Romanorum Imperator inter pretiosiores rarioresque thesauros asservari jussit. Alterius meminit *Joh. Cluverus Epit. Hystor. l. 2. Append. per idem, ajens, tempus, (videlicet 27. Maj. Anno 1635.)* adolescens quidam rusticus 22. annorum, in Borussia novum vitæ periculum novo atque audaci remedio evitavit, Andreas Grunheide nominabatur, ex Grunvalda, is diu stomachi languore laborabat, atque ideo vomitionibus assuetus, cum semel pro more suo arreptæ cultello manubrium ejus in fauces immitteret, gulæ ad-

voniu-

vomitum stimulantæ ergo, cutellus fortè è manibus elapsus gulam profundius ingreditur, ac demum, et si agere, in stomachum ipsum descendit. Igitur accipiti malo, & haud dubium in exitum hominis vergenti, aiceps quoque & iterum remedium consilio Medicorum Regiontanorum adhibetur, quod ejusmodi fuit: Agro firmis asseribus fortissimè alligato, restrictoque, ne versando se, curam magistri turbaret, Chirurgus paulò infra costas sinistri lateris apta ad id novacula aperire corpus ad ipsum usque ventriculum cœpit, tum perterritato eo apertoque levè è vulnere cutellum extrahit. Æger dein adhibitis fomentis & debita curatione brevi planè convalescit. Cutellum testem miraculi Rex Poloniæ per idem fortè tempus Regiontanum intrans adferecepit; quam historiam & fideliter Heurnio Professori Lugdunensi in Batavis communicavit Daniel Beckerus, Academicus Regiontanæ tum temporis Professor, juvenis quoque & cutelli picturam transmisit, quæ à me in Lugdunensi theatro Anatomico conspecta est, & hodieum conspici potest. Interim ipsa hæc historia à pluribus, præsertim vero ab ingeniosissimo Theod. Craanen, Consiliario & Archiatro quondam Brandenburgico, & Amico meo singulari, nunc etiam post cineres colendo, in dubium vocatur. Nos etiam vulnera superficialia, quæ etiam penetrantia ventriculi Limburgi & Deciz curata novimus, & hac de causa de vulneratis coram iudice non semper hæc vulnera pro lethalius exclamentur ab imperitiis, ne sanguis innocens effundatur, qui dein coram tribunali iudicis vindictam poscit, quare in his Medicus requisitus cum circumspiceione sententiam suam pronunciet. Celebert. D. Menzelius obs. communicavit curiosis de Vulnere Ventriculi ultra 11. annos aperto, superstitè viro, vid. Eph. G. decur. 2. An. 5. obs. 1.

*Dista.*

§. 11. In Ventriculi Tumoribus, Vulneribus & Ulceribus *Dista*, si unquam, certè hic optima instituenda est, & qui deo eo potissimum respiciendum est, ut stagnans humorum in Tumoribus impediatur & resolvatur, in Ulceribus vero & Vulneribus, ut acidum corrosivum temperetur, & si possibile, planè tollatur. Aer ergo sit temperatus cibi sint boni succi & facilis digestionis, potus sit ventriculo gratus, & hic non nimium eo repleatur, imprimis ab acidis abstinendum, ne is cibos corrumpas, hiuc enim chylus corruptus & crassus sanguisque inspissatus maximè nocuus generatur. Nec potus frigidus hauriatur, quantum enim frigidus potus bibentibus noceat, omnibus notum. Sanguis enim æstuans statim à frigore coagulatur, coagulum illud in hac aut illa parte imperium sibi rapiens & sedem figens varios affectus excitat, dum primò oritur febris, postea sanguine corrupto emanantur homines, & acque sæpe perditum eunt, unde maximè culpandi sunt ii, qui tempore æstivo palati gratia potum ordinarium glacie refrigerant, in plures enim inde incidere possunt gravissimos morbos, qui tamen mos perquam perversus in aulis etiam hodierno adhuc tempore adeo solet esse sollemnis. Motus & quies non excedant limites, magis tamen prodest quies. Somnus & vigilæ ad mediocritatis regulas coercentur. Alvus sit lubrica, animæ passionis sint pacatæ ac tranquillæ, si ullibi certè hisce in ventriculi affectibus observandæ.

§. 13. *Curationem* dirigunt *Galenicis* in Ventriculi *Tumore* ad diversitates humorum, in *Absecessu* ab inflammatione, adeoque sanguine copiosius in ventriculum depositis ibidemque corrupto oriunda studium locantes maximum, ut sanguinis copia minuatur, & à ventriculo fiat aversio per venæsectionem in utroque cubito per vias institutam, apertionem hæmorrhoidium, curcubitalium in natibus applicationem, ipsam verò purgationem non institunt adeo fortem, sed solum lenientia approbant post digestionem externis linimentis ex oleo chamomel. melilot. amygdal. butyro recenti & axungia anserina, vel cataplasmatibus ex sem. lin. fœnigr. sol. alth. flor. chamomel. melilot. compotitis insituentium, quem in finem laudant decoctum tanaisindrum, syrupum rosar. ex multiplici infusione paratum, mel rosaceum saccharinum laxativum, melaëreum, electuaria diaprunis, cassiam fistul. in aqua endiviæ solutam, vel clysteres emollientes & lenientes frequentius injiciunt ex decocto malvæ & violariæ, vel pulli, cum cassia, ol. rosac. vel violac. sacchar. & vitell. ov. paratos. Apparentibus deinde coctionis & declinationis indicis, septimo die confidentius exhibent remedia fortius aliquantum purgantia. ex infuso rhabarb. cum santal. addito succo rosaceo ad validiorem sordium parti affectæ adhaerentium educationem. His peractis tum alterantia, tum roborantia ex aq. plantag. rosar. syr. nymph. Spec. diarthod. Abbat. diamarg. frigid. per tempus aliquod continuant, donec apostematis resolutio facile obtineatur, quam promovere terebinthina aq. absinth. lota, vel vulapiis ex aq. acetos. furnic. syr. de pom. & absinth. paratis, addito pulvere ex speciebus diamarg. frigid. Focus externè quoque ventriculi admovent regioni, paratos ex decocto rad. Ir. Flor. sol. menth. absinth. Pont. puleg. majoran sem. anis. fœnigr. flor. chamomill. anthos in aqua & vino. Suppurationem promovere cataplasmatibus ex rad. alth. sol. branc. utrin. flor. ros. farin. hord. semlini, fœnigr. flor. chamomill. in aq. coctis, additis ol. ros. chamomill. & pingued. gallinæ, quæ sæpius repetunt ad abscessus ruptionem, qua obtenta & pure per secessum ducto, ulcus ablergunt vel decocto hordei cum saccharo rosaceo, vel hydromelite in potu exhibitio, addita nonnunquam manna thuris. Accedente verò Tumore Ventriculi ad speciem *Ordemati vel Scirrhi*, curam ad pituitam & humorem crassorem dirigunt, uti in morbis hisce alias partes occupantibus facere sueverunt. habita sollicitudine, ne vomitus excitent. quo majorem ad ventriculum laborantem humorum affluxum futurum esse metuant, potiùs clysteribus per inferiora materiam molestem evacuant. Inter topica aliis præferunt, quæ ventriculum simul roborant & modicè relaxant, qualia sunt oleum nardinum, anethicum, chamæmelinum, absynth. cum myrrha & schænantho. emplastrum diachyl. vel de meliloto, oleo nardino & mastichino malaxatum, vel emplastrum de Hylopo Philagrii. Magnis autem encomiis deprædicant ipsi schænanthum in vino coctum, & tum intus exhibitum, tum foris cataplasmatibus forma ventriculo Cæpiis appositum.

*Utem* Ventriculi præmissa venæsectione ad humorum peccantium aversionem, ne in partem jam debilitatam copiosius influant, ablergunt remediis mitioribus, ne fortioribus exhibitis vomitus

mitus excitetur, & motu hoc violentiori foramen ulceris dilatetur, quare mineralia quævis rejiciunt, exceptis acidulis seu aquis mineralibus nonnullis ferratis & aluminosis, ex quibus Gilli acidulas Meinenfes, Itali verò aquam Tetuccianam laudibus haud vulgaribus deprædicant, ob singulares, quibus præditas esse dicunt, virtutes Ventriculi & intestinorum sordes detergendi, putredinem arcendi, partes affectas consolidandi & cicatricem inducendi. Decocta quoque approbant absinthii, mentha, aut calametha, thymi, prassii, stachadis, &c nec non aquam hordei cum melle rosaceo, vel lac alinum, quibus si speratus non obtineatur successus, ad hieram, vel electuar. diacatholicum confugiunt, quorum usum tamdiu continuant, donec locum affectum optime, ut putat, habeant repurgatum. Facta sic deteotione, ad siccantia pergunt, adstringentia & carnem generantia, quorum numero inferunt syrupum myrtium, cydoniorum, lymphiti, de rosæ siccis, rob. de cornis, mespila condita, baccas myrti, pulveres ex bolo ameno, lap. hæmatit. e-bore ust. trochiscos de spodio, de terra sigillata, de carabe, velelectuarium ex thure, sarcocolla, acacia, corall & bolo Armeno. melle exceptis paratum, vel additis consersis quibusdam, ut sequens monstrat formula:

℞. *Conserv. Symplyt.* ʒj.

*absynth.* ʒij.

*Carn. cydon. condit.* ʒvj.

*Cor. ill. rub.*

*Bol. Armen.*

*Lap. hæmatit. aq. rosar.*

*ad. genter lot.* aa. ʒiij.

*Ebor. ust.* ʒj.

*Hypocist.*

*Thuris.*

*Sarcocoll.* aa. ʒj.

*Sacchar. rosar. tabellat.* ad pondus omnium  
*M. & cum syropo myrtino F. s. a. Electuarium* manet & serò ad castaneæ quantitatem exhibendum.

Topica externa ad ulceris occlusionem & consolidationem consuevit totum forma ex decocto absinth. malicor. rosar. balaustior. myrtillor. gallar. thur. mastich. vel emplastrum aliquod imponunt adstringens, qualia sunt triapharmacum *Misnes*, vel diachalcytheos appellatum.

*Vuln.*

*Vulnus* Ventriculi magnum, si fieri potest, consuere solent, parvum verò omisâ futura solis pulveribus adstringentibus & sarcoticis inspersis ad unitatem reducere tentant, cute tamen abdominis & omento ex ciso futura deuo conjunctis, in parte verò inferiore relicto quodam ad puris exitum foramine, cui turundam ipsam ventriculi vulnus aliquid saltem tangentem, & medicamentis sarcoticis ex syropo de rosæ siccis, pulvere sangu. dracon. bol. Arm. & mastich. paratis illitam immittunt, tum fomenta & emplâstra adhibent sarcotico-stomachica, & internis convenientibus remediis curationem promouent, propinato vel decocto vulnerario ex rad. tormentill. consolid. caryophyllat. herb. centaur. min. fanicul. equiæt. vel exhibitio electuario ex consolidantibus, quale in Ulceribus modo fuit descriptum, vel conservauit rosarum antiquam, aut trochiscos diatrageanth. præbent diglucendos. Cibo ventriculic non nimium voluit onerandum, ne ventriculus ab iisdem validius

distendatur, & consolidatio impediatur, ut tamen ager sustentari possit, clysteres in usum ducunt nutriendes, quibus hoc in casu vires haud parvas largiuntur.

§. 14. *Paracelsi* curatio *Tumoris & Abscessus Paracelsi* Ventriculi peragitur sublatione putrefactionis & grossitie humorum in Ventriculo collectorum, quam intentionem se omnium optime consequuturum esse confidit per alcæ suum, atque magisterium & essentiam ʒi, quæ remedia hoc in morbo tanquam arcana singulari habet in pretio.

*Ulcera & Vuln.* hæc eodem tractat modo, quo reliqua alias partes occupantia; nec discrimen illud admittit, quòd quardam vulnera ratione partium sint lethalia, cum quodvis vulnus neglectum aut minus convenienter tractatum, mortem queat inferre, interim vulnera hæc alius periculosa dicenda concedit, & remediis autem eligit in Ulceribus balsanum ʒi, in Vulneribus essentiam hyperici & centaurii minoris iutus adhibita, & foris emplastrum Oppoteldoch ad consolidationem usque, tum in Vulnere, tum in Ulcere partis hujus apponit.

§. 15. *Helmontius* in ipsoctiam Ventriculi *Ab-* *Helmont.* *scissu* emollietionem & maturationem promouet, per medicamenta aliarum partium apostematibus accommodata, sanguinem nempe hirci & olea nonnulla, maxime in Scrophulis sibi usitatum illud polychrestum, tum axungia leporis promouet rupturam, & curationem consolidantibus absolvit.

*Ulcus* Ventriculi internorum curationem arcanis petagendam esse vult, & potissimum ex Antimon. paratis; si verò partes vicinæ & continentes abdominis simul sunt apertæ, remedia externa etiam approbat, quæ aliis Ulceribus in genere conveniunt, ex quibus singularem adscribit virtutem ipsi terræ vitrioli, utpote in qua peculiaris lateat ulcerum domitor.

*Vulneribus* Ventriculi adhibet alcalia, & maxime oculos cancerorum, tum potiones vulnerarias, quas hoc in casu vires non adeo contemnendas possidere facile credit, & cum ventriculus aliarum partium vulneratarum felici curationi prospicere debeat, cum sibi ipsi pro meliori successu medicamina præparaturum & dispositurum esse sibi persuadet, modò os stomachi adhuc exsistat illæsum, secus enim si contingat, mortem ipsam omnem curationis spem ademitte experientiâ multiplici jam annotavit.

§. 16. *Willisus* ad curationem Ventriculi *Tu-* *Willis.* *moris* commodè obtinendam cā incumbit, ut sanguinis ulterior ad partem hanc prohibeatur affluxus, & materia intra tunicas ventriculi itagnans à venis quantum possibile, resorbeatur, quàm intentionem venesectione se consequi posse proficitur, quibus subiungit clysteres diutius continuandos, & semè quotidie exhibendos, ut ita subducto alvo sanguinis recrudescant proluciantur, tum julapiis & apozematis sanguinem attemperantibus ex endiv. lactuc. acetos. decocto hordei cum glycyrrhiz. sem. fenic. utitur, & sanguinis lentorem resolventia iisdem subiungit, quæ salibus constare debent volatilibus, ex quibus spiritum laudat & ci interiorius exhibitum, & foris pro dolore simul leniendo linimentum ex unguento dialth. vel totus & cataplasmata ex chamomill. menth. fenic. sem. lini, & similibus in usum ducit. Ma-



teria verò ad resolutionem existente inepta, eandem per medicamentam maturantia concoquit, ut ita interius, si fieri possit, abscellu dirupto, materia purulenta vel per vomitum levior, vel, quod melius est, per feces evacuetur, quare cataplasinata ex farina hordei, sem. lin. fornigr. flor. chamomill. melilot. rad. alth. additis oleo lilior. vel chamomill. & axungia quadam, vel butyro confecta imponit, & internè oleum sem. lini cum aqua menth. & agrimon. nec non syrup. Hyssopi mixtum aliquoties in die præbet absorbendum, donec pure evacuato absterio fieri possit decocto hordei cum melle, & tandem balneo Peruviano perfecta instituatursanatio.

*Vlcera.*

Ad *Ulcus Ventriculi* sanandum remedia adhibet mundificantia, abstergentia, exsiccantia & consolidantia balsamica, decocta vulneraria ex agrimon. scabios. pimpinell. veron. Electuaria ex conserva rosar. menth. absinth. cum ocul. cancr. corall. margarit. bolo Armen. oleo terebinth. syrup. lymph. & similibus in ulceribus aliis convenientibus.

*Vulnere.*

Eadem etiam vulneraria usurpat in *Ventriculi Visceribus*, potissimum verò apozemata ex millefol. veron. agrimon. tormentill. rosar. C. C. rad. consolid. sem. myrrill. mastich. nec non balsamum de Capaiba, Spiritum mastichis, myrram cedonior. pulveres ocul. & oliban. laphazmat. pp. Corall. pp. Inter emplastra foris applicanda mastichinum approbat, & commune illud stipiticum Crollii, omnibus vulneribus accommodatum.

*Sylviana morborum horum ventriculi curatio.*

§. 17. *Sylvius* Ventriculi Tumori itungit varia unguenta & linimenta, ex unguento nempe dialth. martiat. ol. Chamomill. lil. anethi, non omiffis salibus volatilibus, ad sanguinis coagulationem resolvendam, quod si verò hoc videatur impossibile, & abscellus tendat ad suppurationem, ad cataplasmata pergit emollientia & maturantia, ex farinis, herb. nasturt. charēfol. malv. & capā sub cineribus coctā, cum oleo lilior. parata, quibus si abscellus sit ruptus & *Ulcus* exiit, vulneraria propinat vel apozematis, vel pulveris, vel electuarii formā, quorum potissima ingredientia sunt acidum domantia, rad. consolid. Saracenic. aristol. tormentill. Herb. fanicul. pyrol. alchimill. veron. beton. summitat. hyperic. aq. plantag. diafcor. raf. C. C. ocul. & C. C. ust. Gum. diaphoret. quibus præmissis ulcus postmodum ballamo suo terebinthinato mundificat & consolidat. In *Vulneribus* hujus partis eadem ratione procedit, & pro faciliore consolidatione emplastrum stipiticum foris vult imponendum.

§. 18. *Cartesiani* curationem Ventriculi Tumoris aggrediuntur remediis attenuantibus & succorum crassitiem & stagnationem resolventibus, ut florem pristinum recipiant, & tubuli ob obstructione liberentur, quod præstant salibus volatilibus, & nonnunquam etiam fixis diaphoreticis quodvis angulare domantibus, & factam inde coagulationem destruentibus, adeoque tali vel simili mixtura curationem inchoant.

¶ *Aq. Charēfol.* ʒiʒ.

*Menth.* ʒi.

*Essent. agrimon.* ʒiʒ.

*Centaur. min.* ʒi.

¶ *ʒci anisat.* ʒiʒ.

*Syrup. Scabios.* ʒi.

*M. d. cochlearim.*

Potum ordinarium convenientem reddunt vegetabilibus quibusdam, radicibus nempe enulæ, pimpinell. Zedor. fœnic. herb. agrimon. menth. absinth. Pont. heder. terrestr. marrub. piperitid. nasturt. rut. flor. Chamomill. Rom. anth. fum. nit. centa. min. ¶ *ʒi fixo & volatili*, eumque calidiuscule potius, quàm frigidum propinant, & hac de re decoctum Thee miris in hujusmodi casibus depreciant encomis, quæ tamen vires aliis Decoctis ex debitis simplicibus paratis, & calidiuscule assumtis non sunt detrachendæ, calor enim in attenuatione & resolutione succorum incrassatorum singulare præbet juvamen, quoddamque viciose quiescens ad motum salutarem excitando, & hæc ob causam externos etiam foci ventriculo applicandos teriò commendant, quales sunt, qui parantur ex maceratione herbar. charēfol. taraxac. scord. absinth. flor. chamomill. sambuc. sem. lini. cumm. in spiritu vini, in mortario parùm conquassatis, & additā camphorā sacculo lineo inditis, ut ventriculi regioni calidiuscule applicentur.

Quando verò ob nimiam collectæ materie copiam attenuatio & resolutio obtineri nequit, & abscellus ad suppurationem pergit, hanc promoveant admotis cataplasmatibus paratis ex rad. cucum. asin. alth. bryon. allii, cepæ, fol. charēfol. brassicæ, betæ, branc. urlin parietar. farin. lint. fœnigr. fabar. ficibus, flor. chamomill. melilot. sambuc. croci, axungia porci, vitulinā, humanā, butyro, oleis lilior. chamomill. verbasf. terebinth. gum. ainmon. galban. melle, aliisque emollientibus, ut succi motu hujusmodi artius compressi, in angustiiori spatio agitati tunicam ventriculi distendant, attenuent, & fibras quasdam tandem dirumpant, sicque materia purulenta in ventriculi cavitatem dilapsa per intestina evacuetur; quapropter pro citiori & faciliiori cataplasmatum penetratione & abscellus diruptione iisdem pauculum quidpiam calcis vivæ, aut *ʒis ʒi immiscet*, vel regionem ventriculi tali linimento inungunt, superimposito postmodum subsequenti emplastro.

¶ *Unguent. Seripp.* ʒʒ.

*Basil.* ʒij.

*Ol. dest. menth.*

*Chamomill. ana* ʒʒ.

*Ol. lil. alb.* ʒiʒ.

*M. F. Linimentum.*

¶ *Emplastr. de melilot.* ʒij.

*Diachyl. cum gum.* ʒj.

*M. malax. ol. chamomill. & menth. & imponatur loco tumenti.*

Pulveres internè exhibent rupturam facilitantes, & materie purulente evacuationem promovenes, qualis sequens existit non contemnendi usus,

¶ *Ocul. & ʒij.*

*Sperm. cet.* ʒʒ.

*Rad. ari ʒj.*

*ʒis absinth. gr. xij.*

*C. C. volat. gr. vj.*

*M. F. Pulvis*, de quo una vice quantum mucro cultelli capit, exhibeatur. Rebus ita gestis Decocta vulneraria in usum ducunt, vel mixtura alias convenientes ex aq. veron. alchimill. Tinctur. myrrh. Syr. botrys, donec balsamo Peruviano, de Capaiba, essent. chelidon. cum *ʒi anisat.* consolidationem & sic integram sanationem pro voto perficiant.

Existentibus verò, succis adeo acidis, & *stom.*

tot

tox particulis angularibus acutis permixtis, ut *Ulcus* per longiorem permaneat temporis tractum fortiori addunt alcalia & porosa ex tinctura  $\zeta$ i. aq.  $\Psi$ .  $\Psi$ . camphorat. aliisque acidum destruentibus, ut accedente laudabili succo nutritio foramen oppleri, & solutio continui debite queat reduci, cui scopo sequens subserviet mixtura.

$\mathcal{R}$ . Aq. Veron.  $\zeta$ ib.  
Nummular.  $\zeta$ i.  
Alchimill.  $\zeta$ ib.  
Calc. viv.  $\zeta$ ij.  
~ mistich.  $\zeta$ ib.  
Camphor.  $\zeta$ ib.  
Syr. Consol. maj.  $\zeta$ i.  
M. d. coquebatim.

Pulveres etiam exhibent ex oculis  $\mathcal{S}$ . olib. myrrh. corall. pp. sang. dracon. & foris Emplastrum oppotelloch. *F. VVurizii* apponunt, non omisissis foribus calidiufculis, ex herbis stomachicis & vulnerariis, cum spiritu vini & camphora paratis.

Non minorem curam adhibent in Ventriculi *Vulnere*, cui salibus volatilibus tum internè, tum externè usque paris prospiciunt, ne in labiis succorum stagnatio, & hinc inflammatio excitetur, quapropter exhibitis internis sudoriferis, regioni vulneris focus ex herb. menth. hyssop. beton. flor. chamomill. hyperici, sale armon. & camphora in Sp. Vini maceratis apponunt, tum turundas foramini abdominis insinuant unguento traumatico illitas, & propinatis per tempus aliquod potionibus vulnerariis ex herb. centaur. min. card. bened. alchimill. pyrol. hyperic. rad. pimpinell. sanguisorb. Zedoar. consolid. glycyrrh. in aq. paratis, addito pulv. ocul.  $\mathcal{S}$ . vel ordinario potui, cerevisiæ aut vino dulci instillant Tincturam hyperici, cum tincturâ myrrhæ mixtam, aut balsamum Peruvianum, aut de Capaibâ ad guttulas sex in iusculo exhibent, & emplastro styptico vel glyste foris apposito carnis & cutis restitutionem, sique vulneris clausuram & consolidationem promovent, arcendo nimirum particulas acutas & succos acidos, ut succo chyloso benigno fibræ disjunctæ sibi invicem rursus agglutinentur.

*Noftra curam in Ventriculi Tumore.*

$\S$ . 19. *Noftra* iudicio in cura *Tumoris* Ventriculi semper eò incumbendum est, ut stagnatio succorum subsistentium removeatur, & ipsis concedatur liberior motus, quod obtinemus acidum viscidum corrigendo, in quem finem conducunt omnia salia volatilia aromaticæ, aliæque, quæ vim incendi habent. Sic nuper curavimus quandam solo sale volatili C. C. præ omnibus commendamus simul aromaticæ, quæ serum in glandulis gastricis emendant: liquor quoque C. C. succinat. balsam. nervin. essent. mac. vel bals. capaib. vel peruv. destillatione correctus, vel oleum ejus ritè & sine empyrevmate destillatum ad guttas 1. vel sequens conveniunt.

$\mathcal{R}$ . Essent. flor. Chamomill.  $\zeta$ ij.  
Zedor.  
Macis. aa.  $\zeta$ j.  
~  $\mathcal{S}$ is  $\Psi$ volat.  $\zeta$ ib.  
Ol. succin. gutt. vj.  
M. d. guttatim.

Vel detur sequens spiritus confortativus  $\mathfrak{h}$ . d.

$\mathcal{R}$ . Gran. cardamom  $\zeta$ ij.  
coccinell.  $\zeta$ ib.

~ confortativu,  $\mathfrak{h}$ . e.

~  $\mathcal{S}$ is  $\zeta$ ij. cu  $\mathfrak{h}$   $\mathcal{Q}$ i  $\zeta$ vij.  
destill.  $\zeta$ ij.

*Senti in in, nunc per aliquot dies, postea fitrentur.* Dosis 20. vel 30. guttulæ.

Sal volatile oleosum nostrum succinatum admirandas habet vires, item Elixir stomachicum *Thomson*. Omnia quoque carminativa, quæ simul obstructions referant, profunt, ut sunt carminativa quæcumque, Essentia carminativa variis modis parata, pulveres peptici dicti, quibus & pulvis  $\mathcal{S}$ is  $\Psi$ es aliæque salia, ut magis penetrent, permisceri possunt; nec absorbentia continentenda sunt, ut antieicet. Poter. cum ocul.  $\mathcal{S}$ . mixtum sæpius exhibendum. Diuretica quoque in usum trahenda veniunt, per quæ sæpius obstructio referatur & materia viscida obstruens per urinam ad vesicam amandatur. Diaphoretica verò hic omnem implent paginam, quæ in omnibus Tumoribus egregia sunt, quæ partim dicta & ubivis dicenda erunt, acidum enim humorum temperant, succos spissos attenuant, vias obstructas referant, & quidem vel sensibiliter, vel insensibiliter. Externè imponi debent varia resolutiva vel dissolutiva, omnia enim repellentia hic maximè nocent, profunt verò  $\Psi$ . camphorat.  $\nabla$ . Lang. Regin. Hungar. cum ol. succin. vel emplastrum de sperm. cet. diachyl. cum gummi. diaphoret. crocat. quæ visciditatem attenuant. coagulans acidum debilitant & enervant, stagnantesque humores ad ordinarium cursum promovent. Sacculi & imponi possunt ex flor. chamomill. Sambuc. bacc. Junip. herb. ablinth. menth. roremarin. majoran. saliv.  $\mathcal{S}$ . commun. &c. quæ ob vim alcalicam acidum enervant, spissos humores attenuant, & ad circulationem redigunt Si ex incerta applicatione medicamentorum repellentium in maturationem abeat tumor, conducunt omnia ea, quæ acidum corrosivum emendant, quæ in Ulcere jam enarrabimus.

Curantur autem *Ulcera* Ventriculi eodem *modo*, ac aliarum partium ulcerum, nempe acidum corrosivum corrigatur, ulcus enim sæpius originem suam debet tumori, qui suppuratus & iponte apertus, multum puris emittit, quandoque tumor talis à Chirurgo aperitur, quæ apertura sæpius per longum tempus durat, & sic produciuntur ulcus. Ulceri ergo tali commune digestivum ex terebinthina, vitello ovi, aloë & myrrhâ paratum imponatur, quia hæc omnia resistunt acido, & temperant corrosivum istud sale suo balsamico, quo abundant, quod & facit saliva salui & jejuni hominis. Optima & egregia sunt decocta varia ex herb. & rad. aromatic. parata, additis  $\nabla$ . calc. viv. Spir. vin. Camph.  $\mathcal{S}$ .  $\Psi$ ci cum  $\Psi$ . parat. Ad duritiem verò ulceris tollendam applicetur emplastrum stypticum *Paracelsi*, vel nostrum polychrestum, vel suffumigiun inlitatur. Conducunt & omnia ea, quæ communicaturi sumus cap. de Ulceribus in genere. Rejicimus hic Chirurgis alia usitata acra, pingua & repellentia, quia tantum obstructions pariunt, acidum augent, & sic partibus stuporem inducunt. Internè conveniunt varia acidum corrigentia, imprimis elixir propriet. sine acido, decoctum lignor. oculi  $\mathcal{S}$ . sum  $\mathcal{S}$ is.

In cura *Vulnere* Ventriculi omnia ea, quæ in aliarum partium nobilium vulneribus *Vulnere*.  
S s 2 obfer-

observanda sunt, bene sunt perpendenda, pars enim hæc ob partes suas membranosas, glandulosas & nervosas nobilis est, unde & periculosa sunt ejus vulnera; eo ergo semper respiciendum est, ut aer propediem arceatur, dein omnia calide applicanda sunt, quia fibræ in solutione hujus continui absconduntur & franguntur. Si vulnera sunt ampliora, læsa ventriculi pars ad ventris vulneratos musculos attrahi debet, ut una eademque futura ventriculi laceratæ partes cumcute simul musculusque læsis contrahantur ligenturque. Hoc facto ad digestiva seu acidum corrigentia accedendum est, acidum enim in omni vulnere nocere jam notum est, conducit ergo aqua vitæ, ol. Junip. vel  $\nabla$ . theriacal. cum  $\sim$  Hic  $\sim$  Hic  $\sim$  Hic. vel  $\sim$  vin. Camph. cum  $\sim$  Hic  $\sim$  Hic  $\sim$  Hic. vel  $\sim$  aliorum mentem pariter communi methodo ex terebinth. bals. Pecuvian.  $\nabla$ . vitell. ov. vel ol. ov. digestivum, additis aloë & myrrhâ; nobis tamen placent in his vulneribus fibrosis & glandulosis liquida spirituosâ. Febbris si adest, curetur per diaphoretica,

& vulnere imponantur vulgò ita dicta defensiva, quæ tamen acidum absorbent, præ aliis tamen conducit emplastrum nostrum polychrestum, quod componitur ex minio, camphorâ,  $\sim$  Hic  $\sim$  Hic  $\sim$  Hic, & cerâ, vel emplastrum gum. elem. Tacamah. nervii, diapalm. ana.  $\frac{3}{8}$ . malaxetur ol. lumbric. &c. vel imponatur vulnere emplastrum stypticum ex terr.  $\sim$  Hic  $\sim$  Hic  $\sim$  Hic. ol. hyper. & cerâ. Merito hic carpendi sunt, qui frigida & repellentia applicant hisce vulneribus, quæ certè meo judicio ex foro Chirurgico eliminanda sunt; & pessime faciunt ii, qui in hisce vulneribus  $\nabla$ . S. instituunt, cum tantum balsamum & nutrimentum vitæ exhauriant, & sic sæpe ægrum neci dent. In hisce Ventriculi affectibus externis mihi quoque suspecta sunt omnia purgantia, quia per hæc non tantum optimi & nutriendi succi exhauriuntur, sed & fibrillæ simul nervæ undecumque convellantur, irritantur ac torquentur, unde sæpe dolor, inflammatio, spasmus, convulsiones, & id genus plura excitantur symptomata.

## CAPUT II.

## De Abdominis &amp; Intestinorum Vulneribus, item Hernia Intestinorum.

## §. 1.

Abdominis  
& Intestinorum  
vulnera,  
Hernia.

**E**Xaminatis Ventriculi morbis, ad vicina gergimus viscera, & quidem omnium primò ad ipsâ Intestina, Ventriculo adeò firmiter annexa, ut ab Anatomicis Ventriculus continuatus indigitentur, quæ cum in Abdomine abdentur, nec ab externis violentiis lædi queant, quin munimentum hoc externum de læsione ista participet, amborum affectus simul unaque operâ jam petradabimus. Equidem Vulnera Abdomini æque facile ac aliis intestini accidunt, cum ex iisdem ferè constet partibus Abdomen; estque *Vulnus* Abdominis & Intestinorum eorum à causa externa facta solutio continui: *Hernia* verò est nimia dilatio, (rariissime ruptura.) peritonæi, ab obstructione tubulorum, & à causa violenta quacumque oborta, per quam Intestina in inguen descendendo, Herniam intestinaleam produciunt. Haud rarò contingit, ut vel omentum, vel intestina, vel utrumque decendant, & affectus hic *Ramex*, *Ruptura*, Græcisque *κίδη*, *Σπῆν* & *ῥήξις*, noceo dicitur. à Paracelsò hernia describitur *der Bruch* nihil aliud est *als ein Loch da die Intestina heraus gehen*, unde non video quo jure diversis testiculorum tumores, hydrocele v. gr. farcocele, pneumatocoe, cistiocele & à pluribus practicis ad hernias referuntur cum nec ruptio quædam necque dislocatio observetur. Plures veterum Herniam foeminis supervenire non posse putant, quòd illæ peritonæi productionibus careant; verum omnibus recentioribus & nostrâ experientiâ confirmare possumus, illam æque foeminis ac viris contingere, adeoque rectè inquit D. Stalpart van der *Viel* Obs. rar. p. m. 243. licet enim membrana peritonæi exterior foeminarum vasa spermatica eodem modo, quo in maribus, extra ventris cavitatem non deducat, colligere tamen est, eandem membranam inte-

gumentum ligamentis rotundis præbere; idque satis ad inferiora productum, ut epiploæ & intestinis ad valvæ usque labia procedendi occasio idèò concedatur, ut Herniæ completæ species inde emergere possit, quatenus scilicet peritonæum eo in loco, ubi ligamenta exeunt, præter modum dilatur. Affert exemplum *R. de Graaf*, qui in cadavere filix cujusdam hernia laborantis eo in loco, ubi rotunda uteri ligamenta abdomen deserunt, peritonæum adeò relaxatum se invenire refert, ut integrum foveam sive bursum efformaret, per quam intestina in inguen descendeant, & sic Herniam producebant. Similem recenset historiam *Fabric. Hildan. Cent. 6. de Blegny de Herniis*, Confer *Thom. Bartholin. Histor. Anatom. c. 1. hist. 3. G. Blasius Obs. Med. 8. casum recenset de muliere 40. annos nata, quæ antefex jam annos gravi hernia fuit afflicta, ita ut validissimo vinculo sese semper cingere necesse haberet. Sed quid multis opus est? Hæc in civitate novi duas matronas honestas ob ruptum ex casu peritonæum Hernia laborantes.*

§. 2. In hisce Abdominis & Intestinorum *Parti affe.* Vulneribus pariuntur omnes ejus partes, h. e. *sa.* musculosæ, glandulosæ, imprimis verò membranacæ, quibus intestina ab Anatomicis in sex partes dividi solent, prima dicitur Intestinum Duodenum à pyloro enatum, ubi liquor quidam flavus & oleosus in intestina excurrit; plerumque chylo adhuc immutato repletum conspicitur. Secunda dicitur Anatomicis intestinum Jejunum, quod in Duodeni fine incipit, ubi reperitur exteimenta, duodecim æquat palmas, & quidem in longitudine. Tertia dicitur Ileum; & hæc dicuntur tenuia, gracilia, & angusta, reliqua dicuntur crassa, ut Cæcum, Colon & Rectum. Colon juxta Cæcum ortum suum habet, & gyro magno circa cætera convolvitur

inte-

## CAP. II. DE ABDOM. & INTEST. VULN. & HERN. 325

intestina. In ejus principio membranosa apparere duplicatura, ita contexta, ut facilem aditum perunitat ab ileo in Colon, sed difficillime regresum. Tota Coli cavitas in parvas distribuitur cellulas, & eo in loco, ubi ultima intestinorum pars recta ad anum tendit. Crassa hæc intestina dicuntur Anatomicis, ob crassas, seu robustiores tunicas, quas habent. Cuncta hæc intestinatriciplici constant tunica: Interior fibris tendinosis diversimode implicatis est constructa, media ex bino fibrarum ordine, quarum alia sunt circulares, alia longitudinales, est composita, & exterior est fibrarum tendinosarum contextus. Tunica hæ omnes inserviunt motui peristaltico. Præter has tunicas, in substantia intestinorum tenuium advertuntur minutissimarum glandularum congeries, quæ tubulos suos excretorios in cavitatem intestinorum explicant, & in illam liquorem quandam tenuem & pellucidum effundunt, quem possimus appellare liquorem intestinalem, qui necessarius est ad chylum è stomacho emanantem magis dissolvendum & separandum.

Ne quid sicco à nobis pede prætereatur, partium infimi ventris structuram & usum, peritonæum, vasa semen præparantia, Testes cum tunica & Scroto, quæ omnia Hernias considerantibus explicanda præcipue veniunt, paucis hic ex Anatomicis repetenda. Peritonæum membrana visceribus circumcincta firmo eadem nexu continet, & est duplicata membrana diaphana, saccum refert, in quo omnia infimi ventris viscera reconduntur. Peritonæum hoc variis fibris scroto connectitur, atque intra ejus duplicaturam non duntaxat testiculorum vasa recondit, sed ea quoque a hujus parte contegit, ita ut vasa hæc intra duplicaturam ex abdomine provenientia ad testes eorumque vicinas partes excurrant; subinde perivium est peritonæum, ut vasa transmittat circa uterum, imprimis ligamenta rotunda vermiformia. In viris procellus spermaticis valis exitum præbentes in utroque inguine non minus, ac mulieribus obturati sunt, verum in canibus aliisque brutis aperti sunt, si enim in hominibus, qui recti incedunt, aperti essent, vix quisquam inveniretur absque Hernia, quod in brutis ita fieri haud potest, quia horizontaliter & non perpendiculariter incedunt. Semel hunc procellum in viro, idque in latere sinistro apertum vidit D. Blankard. c. 33. num juvenili tempore hernia laborasset, nescit. Testes seu corpora glandulosa optime dices minutissimorum vasculorum congeriem semen continentium, quæ si absque ruptione dissoluta sibi invicem annexerentur, facile viginti ulnarum longitudinem excederent. Si plura cupis, adeas Anatomicos, Bartholinos, Blankardos Francos & Nuckios. Tres herniarum species in praxi sequentiores sunt Enterocoele subonocoele & omphalocoele rarissime contigit quod à liene hepate è loco suo dimoto sit ruptio.

Diagnosi  
Vuln. & Intest.  
norm.

§. 3. In Vulneribus Abdominis semper eo respiciendum, quarum partes internæ fuerint læsæ; si vulnera hæc penetrant in cavitatem, non potest semper cognosci, quæ partes læsæ sint, nec admittunt stylium, male enim inquiritur in hisce partibus specillo ferreo aut plumbeo, aut argenteo, sed potius in illo, vel candela cerea, quia melius flecti potest & accommodari ad quæliacumque occurrence obstracula, hinc optime

annotavit Cl. Murr, quod specillum aliquando valde profunde intret, per interstitia musculorum transiens, & quod vulnus tamen non penetret usque in ventris cavitatem, & è contra, quod vulnus penetret aliquando usque in abdominis cavum, licet specillum ubi intruditur, mox inveniat resistentiam, scilicet quia partes in corpore læso aliter figuratæ erant, dum ager vulnerabatur, quam postea, ubi vulnus istatus explorabatur; non ergo hæc vulnera admittunt stylium, sed per contricturam cognosci debent partes læsæ, ex situ scilicet vulnerati, ex instrumento, ex symptomatibus, ex sanguine aliisque excretis. Si punctum vulnus inditum sit, quomodo cognosci potest? Enis vix potest ingredi, quin non lædat intestina; (1.) Corripitur animi deliquio, superveniunt anxietates, inquietudines, convulsiones, febris &c. Chirurghi solent turundam explorare naribus, an scrotus quid spargat, ex quo intestina punctum læsa esse judicant, quod tamen sæpe fallit. Vulnus potest insili in abdomen absque intestinorum læsione, si scilicet non sunt nimis repleta. Cognosci etiam potest ex situ vulnerati, nunc sedens vel stans fuerit vulneratus, utrum per lineam rectam, an per obliquam transeerit, nam si oblique, non tam facile læduntur, si sanguis externatur vel per anum, vel per vomitum, in indicium est, intestina esse læsa; si clyster injiciatur, videndum, an quid curcus ejiciatur.

Hernia visu & tactu facile agnoscuntur, apparet enim in inguine tumor, atque in maribus ac feminis, qui ab initio parvus est, mox altior & amplior redditur, nunc pressus cedit abique, rursumque remeat, nunc mollis est, nunc duritiem inæqualem præ se fert, conamine facta, ex halitus retentione propellitur. Epiplocele dicitur, cum ab omento sit, Enterocoele cum ab intestinis prodit, in qua specie sæpius tumor iste in inguine minimè subsistit, sed inde in scrotum in masculis descendit, & saccum ex parte, vel totum inplet, tumorem majorem minoremve producit, cute colore non mutata, sed cum rugosa aliàs sit, tunc tensa existente. Hic si promatur tumor, aut resupinetur corpus, perit, rursumque his cessantibus redit. In sexu sequiori etiam ejusmodi tumor Enterocoele in inguine interdum producit, qui & sæpe ex inguine, quemadmodum in maribus in scrotum, sic hic deorsum sub cutem exporrecus, eam in immensum nonnunquam tumorem elevat, & ut in viris, iterum abit, reditque, De Omphalocoele inferius agemus. In omnibus hisce herniis dolor aliàs nullus, aliàs verò maxime circa initia in inguine, tempore scilicet frigida, dolor lancinans ac punctorios percipitur. Alvus in majori Hernia semper est constipata, perseverante malo, nonnunquam oritur convulsus, cum acri fæces alvi evomant, hinc plura alia oboriuntur symptomata atrociora, & nonnunquam ipsamors.

§. 4. Differentias Herniarum Autores præter necessitatem excogitant plurimas, nos ad minimis tantum 3. species, Enterocelen, Epiplocelen, & Exomphalocelen, reliquis verò species, ut Hydrocelem, Circocelen, Physocelen seu Pneumatocelen & Sarcocelen numeramus inter tumores, quia veri sunt tumores, & non rudtuzæ.

§. 5. Axiologiam quod attinet, Galenicæ Causæ  
Ss 3 Abdo-



*morborum  
horum se-  
cundum  
Galenico.*

Abdominis & Intestinelorum *Vulnere* causam, adscribunt externis instrumentis secantibus aut pungentibus, violenta manu per Abdomen ad ipsa intestina, vel crassa, vel tenuia adactis, ut continuas partium harum dissolvatur.

*Hernia* causam vel laxationem seu dilatationem meatuum in peritonæo propè inguina constitutorum, vel disruptionem statuunt ipsius peritonæi, per quam vel omentum, vel intestinum aliquod, maxime præ cæteris intestinis magis solutum illud cæcum descendat, interdum ad scrotum usque, & huic dilatationi & disruptioni anam præbere dicunt externas quasdam violentias, causam ab alto, cursum nimium, femorum ab invicem distortionem maiorem, gestationem ponderis, diminutionem molis alicujus gravioris, conatum magnum ad explodendas fœces siccas, vel excludendum partum, tussim asperissimam, clamorem maximum, tibiarum tubarumve usum diuturnum, aulhelitus contentiorem violentam, coitum immoderatum, potissimum à cibo copiosius ingesto, status copiosos intestinis inhærentes, aliasque violentias ob quas meatus illi multum patiantur, quod quidem facilius contingat, quo vel per se, vel ab usu balnearum aliarumque rerum relaxantium fuerint lubricati.

*Paracelsus.*

§. 6. *Paracelsus* & causis Abdominis & Intestinelorum *Vulnere* communem fovet sententiam, nec de *Hernia* inguinali peculiarem proferit opinionem. unde rupturam vel dilatationem peritonæi eundem hunc admittere nobis colligere licet, reliquis verò Herniarum quod attinet species, de his aliena quadam ab aliis philosophatur ratione, uti enim menstruum solis mulieribus, sic herniam soli virili sexui convenire fingit, nec locum mutare, sed partes genitales in tumorem attollere, ejusque tres excogitavit species, quarum causas lib. 4. de morbis scroti lumen exhibebitur.

*Helmontius.*

§. 7. *Helmontius* easdem, quas reliqui admittit morborum horum causas, externam videlicet violentiam, dum instrumentis acutis abdomen & intestina in *Vulneribus* discinduntur, in *Hernia* vero intestinali lapsu, saltu, aliove impetu permeatum inguinalem, & interdum ad scrotum usque propelluntur, ubi ab adjunctis flatibus intumescant, & propter tumorem istum repulsionem in abdominis cavitate reddant difficilem.

*Wissow.*

§. 8. *Wissow* quoad causas morborum horum Abdominis & Intestinelorum Veterum sententiis in omnibus habemus consentientem, *Vulnera* enim à dissectione vel punctura instrumentis facta, & *Herniam* à violenta quavis actione produci asserit, quæ peritonæum vel rumpi potest, vel meatusque dilatari.

*Sylvius.*

§. 9. *Sylvius* Abdominis & Intestinelorum *Vulnera* ab iisdem causis contingere posse cum aliis fatetur, à quibus aliarum corporis humani partium vulnera suscitantur; *Herniam* verò à vehementi ventris compressione excitari asserit, qualem difficilis fecumalvinarum expulsio nunquam exspoliatur, nec non qualemcumque conatum laboriosum aut lapsum fortiozem, à quibus vehemens corporis concussio & intestinum excitatur propulsio.

*Cartesius.*

§. 10. *Cartesius* similiter Abdominis & Intestinelorum *Vulnerum* causas accusant res externas scindentes, piungentes, vel pettere-

brantes violenta manu in abdomen & intra hoc contenta intestina, tum crassa, tum tenuia, adactas, à quibus continuas eorum dissolvatur, quales sunt enses, gladii, secures, falces, cultri, styli acuti, acus majores, globuli plumbei, sagittæ, & hujusmodi alia, quæ aliarum corporis partium continuitatem dissolvere possunt, siquidem & partes præterentes omnes istis, quibus & alia, exposita sint periculis.

*Hernia* causis inferunt quancumque peritonæi processus in ipsis inguinibus dilatandi occasione, conatum nempe magnum in efflandâ voce, expellendis facibus alvinis induratis, excludendo partum, lapsum ab alto, vel in ipsis infantibus super ulnas gestantis, saltum, distensionem crurum & femorum, sublationem molis gravioris, cubitum infantum super ventrem, à copiosiore mox ciborum infatu, & quicquid peritonæum vel dilatare vel dirumpere potest, ut omentum aut intestinum vel in inguen, vel in scrotum ipsum per foramen amplius descendat, sicque aut bubonocelen, aut oëocelen constituat.

*Nos.*

§. 11. Etiam *Nobis* causa *Vulnere* Abdominis & Intestinelorum eadem est, quæ & aliarum partium, solutio scilicet continui à causa quancumque violentia producta, ceu jam dictum est à *Cartesiano*, cum quibus nunc & nostra vela expandimus; quo verò vulnus est amplius & penetrantius, eo periculosius est, & mox elabitur vel omentum, vel intestinum.

Causa *Hernie* meo judicio non semper est ruptura peritonæi, uti ferè omnes hæcenus auctores putarunt, quia peritonæum est membrana crassa, tenax & humida, quæ non tam facile in abdomine rumpitur aut dilaceratur, prout videmus in vesica humida, quæ vix manibus fortissimis dilacerari potest, sed nostro judicio membrana hæc potius dilatur & extenditur, hinc non differt an à uteri procidentia ab Enterocæle & Exomphalo, nisi loco, certissimum enim est, in Enterocæle seu *Hernia* intestinelorum peritonæum circa processum suum ut plurimum dilatari & relaxari, in Exomphalo circa umbilicum, ubi in procidentia an duntaxat intestinum rectum, & in uteri procidentia vagina uteri dilatatur. In Exomphalo abdominis viscera quandoque à calu aut lapsu concussa sunt, ut hepar mole sua versus umbilici regionem descendat, & ob gravitatem non tantum intestina comprimentur, sed & peritonæum dilatatur, juxta contenta forinsecus facile conspici possint. Non negamus tamen prius rupturam peritonæi in herniis, quia hoc rupto & in aliis partibus dantur herniæ, quæ ab imperiis incautè pro abscessibus tractantur; *Bartholin. Cent. 2. hist. 45.* observat, herniam mox infra cartilaginem eniformem ex ruptura peritonæi; sic propè spinam dorsii peritonæo rupto ibidem hernia excitatur, confer *Eismüller. p. 135.* sed tantum dicimus, hanc non tam sæpe causam esse, quàm hujus peritonæi dilatationem. Relaxatio peritonæi exoritur ex eo, quod multi ejusdem tubuli obstruant, inque illis stagent ac coacerventur, humores, qui progressu temporis se insinuant inter strillas peritonæi, illudque hoc pacto relaxant, prout optimè ratiocinatur *Cl. Meys Chirurg. rational. Observ. 3.* & hoc notandum, quod intestina crassa tam firmiter lumbis annexa rarissime vel nunquam in *Hernia* prolabantur,

## CAP. II. DE ABDOM. & INTEST. VULN. & HERN. 327

tur, sed tantum intestina tenuia, jejunum & ileum, unâ cum omento. Causæ ergo Herniarum sunt omnia ea, quæ peritonæum aut laxare, aut dilatare, aut id rumpere possunt in loco quodam; sunt itaque ut plurimum causæ externæ, v. gr. motus nimis quicumque, clamor nimis, equitatio, saltatio fortior, sternutatio, vomitus & tussis violentior; rarum exemplum suggerit *Plater. in Obs.* Herniam scilicet intestinale ex nimia & violenta purgatione: sic ob clamores nimios facile infantes herniam sibi adsciscunt.

*Prognosis  
vulnerum  
Abdominis  
& Intesti-  
norum.*

§. 12. *Vulnera* Abdominis omnia sunt periculosa, quia ejusmodi difficulter curantur, ob motum respirationis: vulnera enim consolidanda postulant requiem. Sic & vulnera abdominis, quamvis non penetrant, & in linea alba tantum sunt, difficillimè sanantur, ob partes ramosas membranosasque illadem exsistentes. Vulnera abdominis penetrantia sunt omnia valde periculosa, sed longè magis ea, quæ ampla sunt, quia tunc vel omentum, vel intestinum facile foras prolabitur, ubi enim omentum fuerit prolapsum, nisi id statim reponatur, brevi coagulatur, emoritur, & calorem suum mutat, ob ærem acidum ambientem, quo enim aer frigidior, eo periculosius malum, quia materia in vasculis exilibus adiposâ, quibus prædictum est omentum, contenta facile coagulatur. Quod si intestina simul fuerint læsa, æger in magno vitæ periculo versatur, & quidem magis, si vulnus fuerit inflatum intestino tenui, minus verò si crasso, quia in hoc vulnus postquam consultum fuit, facilius conglutinetur, & crassa intestina tantum scæces, tenuia verò chylum continent, sunt tamen exempla quodam intestina læsa & fistulata feliciter fuerint curata. Sic quoque si simul fuerint læsa & discissa vasa sanguifera maxima, vel in hepate, vel in liene, tunc malum ut plurimum lethale est, quia semel effuso sanguine, is vas suis restitui nequit. Similiter si vulnera per anteriorem abdominis partem intrent, ac per tergum & per spinalem medullam egredierentur, ut plurimum lethalia existunt. Si verò *Vulnera* Abdominis hæc partes non læserint, ut plurimum curantur ægri brevi temporis spatio, & quidem intra tres, quatuor aut plures septimanas. Vulnus enim infligi potest in abdomen sine intestinorum læsione, si scilicet non fuerint nimis repleta, quod cognosci potest ex situ vulnerati, nam sedens vel stans fuerit vulneratus, utrum per lineam rectam, an per obliquam transierit instrumentum, nam si oblique, non tam facile læduntur intestina, si sanguis excernatur vel per anum, vel per vomitum, indicium est, intestina esse læsa; si clyster injiciatur, videndum, an quid cruoris vehat.

*Herniam* quoque concernit, si intestina diu extra abdomen & situm ordinarium suum exulant, malum est, pessimum verò, si eadem reponi nequeunt. Quo tumor major & durior & multum dolens, eum periculosior est, si adsunt vomitus enormes, cum confipatione alvi, & superveniunt convulsiones, intestina nequeunt restitui, tunc ædum est de ægro, cui plurimum exempla, intestina enim tam diu extra abdomen detenta ob ærem ambientem magnam contrahunt noxam, pori enim intestini aliquatenus oburantur, hinc status alijque vapores condensantur, & sic intestinis necem portantur, unde & illa sæpe sphacelantur & gangrænâ afficiuntur, cui *Hæmorrhæ* in defunctis ex herniâ sæpius fuimus

contemplati. In senibus difficillimè, in pueris verò circa octavum annum facillimè & quidem falsis curantur.

§. 13. *Cura Diætica* consistit in schola Medica *Diæta*. recepta rerum non-naturalium, quamvis minus prudenter ita dictatum, legitima administratione. *Aer* ergo in his affectibus sit calidus, & temperatus, frigidior aura tanquam insensibilis hostis in his affectibus fugiatur angue pejus, quia maxime impedit motum circulationem, Hernia enim à frigore præsertim subitaneo, solent fieri lethales, coagulata enim materia in fibrillis intestinorum, dolorem, hunc spasmus & duritiem intestina acquirunt, quæ insequitur ideo, consue *M.C. Ann. & p. 154*. Exercitia nulla sint, nisi moderata, quietem enim desiderant Hernici. Vitiatur ergo quicumque motus vehementior, quies verò optimum Hernia remedium, sic *Fabric. Hild.* refert, sexagenarium per 20. annos herniâ maximâ laborasse intestinali, qui à nemine Medicorum ac Chirurgorum potuit curari, et tunc senem postea absque remediis in totum esse restitutum primæ sanitati, postquam morbo quodam periculoso decubuerat in dorso per semestrem spatium, quapropter optimum dicit contra Herniam remedium esse quietem & decubitu in dorso. Somnus & vigilia sint moderata. Victus ratio instituitur ex illis, quæ dant optimum chylum, ingiantur statulenta, legumina quæcumque, impræmixta fabæ & lentes, acida omnia, brassica; & cocta conjuvantur cibi aromaticis & seminis carminativis aliis. Potus sit vium dulcis, vel cerevisia optimè defæcata & fermentata, aromaticisque imbuta. Caveatur à crapula & quocumque excessu. Animus sit pacatus & tranquillus, vitetur ira, moeror, & ejusmodi animi motus vehementiores.

§. 14. *Curationem* morborum præsentium *Galenicæ Pharmaceuticæ-Chirurgicæ* aggressuri, enim cura præcursoribus nostris prima effrendenda concedimus vota; & quidem ordine ut eos ducentes *Galenicæ* eo summam ut curandis Abdominis & Intestinorum *Vulneribus* locandum esse nos & In-

præcipiunt diligentiam, quò ipsa ex vulnerato intestino venire prolapsa & nonnulli superficie tenus vulnerata intestina superiusperio pulvere adstringente sanguinem supprimentes & sarcotico, quanto citius, ne ab aere offendantur, in ventrem repellantur, sin à flatibus ita jam sunt repleta, ut per angustius vulnera abdominis foramen commodè reponi nequeant, osificum hoc sollicitè volunt dilatari, statusque discutit, spongiâ vino, cui semina anili, carvi, feniculi, cumuli, flores chamomillæ, & summitates anethi fuerint incocta, & adhuc calido imbuta superimposita hinc intestinis repositis, peritonæi & abdominis cutis carnosæ labia sutura convenienti volunt conjungi, ne calor illenativus vicerum, qui tamen imaginarius est, transpiret, aut, quod veritati conformius, frigus intret externum, & læsa jam intestina magis adhuc infestet; quo facto agglutinationem & consolidationem operose illi morborum depultrici Naturæ relinquunt perficiendas, cum ignota illa Dea, more quodam Ethnicis potius, quam Christianis concedendo, mirâ in curandis corporis malis illis prædita videatur potentia, quamvis & hanc satis infirmam esse abbreviatamque fateri cogantur, si intestina adeo sunt discissa & dilacerata, ut ipsum stercus

vul-

*Prognosis  
Herniæ.*

vulnere egrediatur, hoc enim in casu ob morbi magnitudinem summum adesse periculum movent, eaque propter intestinorum, maxime crassorum, labia vino stiptico prius abluta concinnâ futurâ iubent coniungenda, & ut ante, pulverem adstringentem & sanguinem sistentem inspergendum, postremo verò ipsum abdomen consuunt, voluntque nonnulli, ut pro exitu materię purulentę foramen quoddam relinquantur, alii verò de eo minüs sunt solliciti, persuadentes sibi, unâ cum ceteris excrementis è vulnere exsulantibus pus illud à Natura sua ad inguina depulsum, atque in his excitatum iri abscessum, quo disrupto excrementa quæcumque facilius effluunt & repurgantur. Utamen Deastrę illi Naturę copię quædam obviammittantur subsidiarię, quibus agglutinatio illa vulnerrum horum promptius perficiatur, decocta quædam propinant ægrotis, quæ parare solent ex centauro, rubia, fœnicula, caryophyllatâ, consolidâ, tormentillâ, caudâ equinâ, mastiche, mumia, thure in aqua communi maceratis, & deinde ad tabem decoctis, vel simplicia illa in pulverem redigunt, & in iusculo quodam ad drachmam usque exhibent, aut reliquis admiscunt alimentis. Pro sordibus repurgandis, ipsisque intestinis magis adhuc detergendis & adstringendis, remedia prædicta vino incoquant adstringenti, quod cum terebinthina, gummi, sarcocolla, thure, myrrha, aloë, terra Armena, sanguine draconis &c. permixtum clysteris instar in alvum infundunt, unposito golypto, vel lintheis duplicatis, quadruplicarive, ut in ipsis intestinis ad tempus aliquid detineatur.

*Hernia intestinalis* curationem hoc modo intrant, ut imperatâ inedi in exinanita alvo, & flatibus per clysteres discussis, nec non præmissis fotibus, infestationibus, balneis, cataplasmatibus emollientibus & flatibus discutientibus, intestinum vel omentum prolapsum per meatum remediis prædictis aliquantulum relaxatum in locum pristinum & ordinarium reprimatur, post hæc medicamentis adstringentibus & laqueis meatus peritonæi relaxatus aut disruptus constringatur, sicque intestinum vel omentum in loco debito conservetur, ne denuò per meatum in scrotum delabatur, quamvis utrumque sæpius obtentu difficillimum esse fateantur: nihilominus & interna & externa adhibenda esse volunt remedia adstringentia, potissimum verò externa cum laqueis, ut ita facilius meatus comprimatur, hinc pubis & inguinis regionem fovent spongiis vel panniculis imbutis decocto rad. consolid. maj. bistort. narciss. pentaphyll. chelidon. maj. herb. equiset. polygonii. herniar. fol. pyri, berberis, plantag. flor. rosar. balauftior. stoechad. anth. pilar. cupressi, gallar. virid. immatur. cort. granat. sem. nasturt. torrefact. cum in. alumin. in vino rubro adstringente & aqua per diem & noctem prius maceratus, & postmodum decoctis, fotu verò hoc, quàm calidè ferre potest ager, aliquoties adhibito, loco deinde prius abrado inponunt emplastrum aliquod meatum peritonæi fortius constringens & occludens, qua virtute prædictum esse affirmant emplastrum de pelle ærietina Arnaldi de Villa nova, ramici puerorum maxime dicatum, vel quod ex sequentibus componitur speciebus.

R. Gallar. immatur.

Nuc. cupressi.

Malicor.

Balaustior. ana 3j.

Gumm. Arab.

tragacanth.

Sarcocoll.

Thur.

Myrrh.

Aloë, aa. 3℔.

Rad. arisfol. rotund.

Sang. dracon.

Mum.

Rd Armen.

Lap. hamatis.

Spodii.

Gyps.

Alum. aa. 3jij.

Te. antur omnia, & cum aceto & cera alba q. s. suscepta redigantur in formam emplastri rupturę imponenti.

Commendant nonnulli folia cicutę simplicis torrefacta & trita, vel folia hyperici viridis recens contusa instar emplastri rupturę imposita. Remediis etiam internis curationem hanc promovere tentant, exhibitis vel pulvere ex rad. symphyt. maj. vel folior. balsaminę, vel radicis Uvularię, vel pilulis ex pilis leporinis & melle inspissato confectis, aut aliis decoctis, syrupis, electuariis, vel pastillis convenientibus, quorum ingredientia ex sequentibus seliguntur, quę sunt, rad. c. bistortę, symphyti, pentaphylli, acori, rubię majoris, valerianę, herbę plantag. caryophyllata herniaria, polygonium, equietum, centaureum majus, ballamina, salvia, pimpinella, pilosella, semen myrrillor. coriand. pp. nasturtii torrefactum, flores rosar. balauft. authos, pilar. cupressi, costus amarus, mumia, blatta Bizantina usta & aquâ consolidę elota, chalybe pp. bdellium, sangu. dracon. terr. sigillat. bol. Armen. tragacanth. trochisci de spod. de carabe, &c. Quando verò nec remediis hisce internis usurpatis, nec vinculis & ligamentis exteris, ex quibus reliquis proferunt illud, quod Lupum vocant, quo meatus peritonæi relaxatus constringitur & comprimitur, intestini vel omenti prolapsus ulterior prohiberi potest, consulunt aliqui, ut testis ejus lateris, in quo intestinum in scrotum prolabitur, excutatur, ut ita peritonæi process. sacrtiüs comprimi, constringi & occludi possit: hanc tamen operationem non approbant omnes, quoniam in ætate provectioribus non sine periculo instituitur, & in disruptione peritonæi parùm prodesse possit, & hac causa candens ei substituitur ferramentum, quo pluries supra rupturam amoto, & cutis & peritonæum contrahantur, sicque angustato meatu tum omenti, tum intestini prolapsus apte prohibeatur.

§. 15. *Paracelsus* in Abdominis & Intestinorum *Paracel-*  
Vulneribus curandis magnam à Chirurgo postulat *sica cura*  
diligentiam, maxime in vulneratis intestinis, hæc *in Abdo-*  
enim, si fieri possit, cannulis argenteis artificio- *minis &*  
sè vulconnectenda, bonumque judicari omen, *rum Vul-*  
si unâ cum excrementis exeat intestinum, quod *neribus.*  
tamen, qua ratione sit intelligendum, singulari indiget Oedipo, cùm qualis sit hic in curatione successus, non facit sit intellectu, ipseque hic Autor industriam hanc non in omnibus subeundam esse non sine causa admonet: remedia verò eadem hic admittit, quæ reliquis vulneribus sunt dicata, & à stomacho facitè poterunt digerit, potissi-

potissimum potiones approbat vulnereales, quæ componuntur ex herbis consolid. maj. agrimon. serpentaria, betæ rubrâ, ophioglossi, sed singulari ratione, dum caustro induntur simplicia cum vino, ejusque orificium operculo obtectum bene obturatur pulve ex farina facta, sicque aquæ foveit imponitur, ut ad horam unam vel sesqu. vinum cum simplicibus in cantharo bene ebulliat. Externa balsama, unguenta & emplastra eadem adhibet, quæ in aliarum partium vulneribus commendat.

*Hernia.*

In *Hernia* curanda ad horrenda arma, adeoque ad difficillimum curandi modum non vult transirendum, sed citra inmanum facillima & præsentissima ratione curationem hanc absolvi posse promittit, dummodo sequentia studiosè abhibeantur remedia.

℞. *Liquoris de Nyllopheno* ʒij.

*Ossur.* ʒi.

*M. simul & imponatur.*

℞. *Thur.*

*Macis*, aa ʒß.

*Terpentina* ʒij.

*Axung. de cervis, quæ est in modum unguentis*, q. f.

*Terantur.*

Hoc linimento locum rupturæ ad tres aut quatuor hebdomadas in dies bis ungi jubet, egrotumque supinum decumbere, sic enim quicquid est rupturæ sanari sperat, dummodo didymi locus non putrefcat.

§. 16. *Helmontius* Abdominis & Intestinarum *Vulnera* curatu admodum æstimat difficilia, nec diversa ab iis proponit remedia, quæ *Vulneribus* in genere existimat convenientia.

*Herniam* intestinalem magnetica curatione depelli posse, per multiplicem experientiam corroboratus affirmat, herniosus enim per juvenculum quercum cultro diffusam ut dehiscat, si traducitur levi veste amictus, & postmodum quercus aliquot nexibus demò ligetur, & rima consolidetur, etiam heruam aufferi & ægrum convalescere observavit, quando verò quercus diffusa non consolidatur, sed arefcit, indicium fuit, *Herniam* non curari, & ægrum aliquando ab alio morbo herniæ superveniente fore extinguendum. Hanc antem curationem à superstitione vindicatoris, quam accusare quis possit ideo, quod in transitu seninudi herniarii per fissam querculum tota hæc virtus sit constituta, sufficere aliter pro responso, non subesse hæc verba, incantationes, impietatesque, finemque esse honorem Dei in suis magalibus, à quo dos ista emanare creditur in naturam propter magnam virtutem herbarum. Transitum verò istum realiter & sympatheticè consolidationem vulnerati abdomini operari, præcipue si ipsa quercus non exarefcit, sed consolidetur, manifestum vult esse imprimis, quod pulvis sympatheticus servans cruorem vel pus in linteo, ne putrefcat, deferat ejusmodi balsamicam vim ad vulnus abiens, & sanetur, proinde nihil impedire, quo minus apotheca ærecenti quercus lethali & medullari vulnere transcurrentem afficiens, & halituenus inspirata sit ad instar pulveris sympathetici balsamique, potissimum quod quercus glandes, folia, cortex, &c. sunt inter potissimum potius vulnerarii simplicia, &

querectis verò fumus expiret magnæ virtutis. Ulterius autem inferenti & querenti, si saltem ille quercus sit alicujus virtutis, cur non sufficiat additare? non aliter respondebit, nisi quod non sit humanum, scrutari magnalia consilia, sive judicia Dei, transitum verò requiri. Nec proinde involvere superstitionem sibi poterit, non quidem per rationem à priori, in dotibus beneficii divini, sed prorsus à pari, & ut dici solet, argumento, quia est; ut enim prægnans appetens cerasum, si manum fronti lux admovertit, foetum in fronte perpetuo ceraso signaverit, sin manum quietam servaverit, non signabitur foetus; sic absque superstitione requiri transitum ait per fissam quercum, ut vis vitalis consolidandæ quercus abeat in consolidandam membranam Abdominis, non verò esse animam, quæ imaginetur, aut velit signare frontem foetus, sed manum per incuriam tangentem frontem suam id efficere, quoniam Archei sit operatio naturalis, non animæ; eadem hac ratione incuriam esse exhalationem Archealem è quercu fissâ, camque tantum oppositionem, quæ sit transitus, requirere, fissuram quercus rupturam herniæ, colligationem & realitatem arboris solidaturam herniæ, transgressum per auboris rimam applicaturam intimam atque medullarem denotare, quercum verò peculiarem significationem gere consolidationis, eò quod potum vulnerarium membris dictum suppeditet, & colligantiam tandem causulam & similitudinem connexum in Archeo ostendere. Similem curationem per magnetem proponit, cujus dorsum eodem modo intestinum quo ferrum propellere, & herniam curare docet. Præter sympatheticas hæc etiam aliam novit *Herniæ* curationem per semina consutula ani, carvi, fomiculi, coria idri, in vino cocta & potui exhibita, quæ convenientes est, si magnadurities, quæ pyloro subest, intestinum retropelli impediatur, his enim remediis durities emollitur, ut hernia faciliè retropellatur.

§. 17. *Vulvis* cura in Abdominis *Vulneribus* non est aliena ab aliorum Auctorum procedendi modo si enim absque peritonæi & intestinarum læsione sint, ut aliarum partium vulnera vult tractanda, si verò ad intestina penetraverint, hæc ipsa prius consuenda, pulvere adstringente ex mastiche, myrrha, aloë, sang. dracon. confecto aspersenda, & sensim in locum ordinarium sunt intrudenda & reponenda, ægro semper in latere opposito decumbente, quod idem ita fieri debet cum omento, & quando status repositioni obstant, si aut carminativis internè & externè adhibitis sunt discutendi, aut intestinum magno flatu distentum sine periculo debito in loco acupungendum, ut ventus ipsè exitum reperiat. Omentum si per vulnus elapsum corruptum sit, funiculo infra partem corruptam ligandum est, & hæc abscindenda, reliqua verò reponenda, relicta aliqua tali portione, qua foras revocari possit, si ulterius computrescere incipiat. Vulnus tertium majusculum liturâ, minusculem verò emplastris glutinatoriis jungendum est, instillato simul balsamo de Capaba, & adtempus aliquod iusto assumentis potionibus aliisque medicamentisque vulnerariis, ut succus nutriticus balsamicus itis particulis sufficienter imbatur.

*Hernia.* *Hernia.* curam ita instituit, ut omentum vel intestinum prolapsum repellatur, in locum debito

*Helmontii  
opinio de  
curatione  
Vulnerum  
Abdomi-  
nis & In-  
testinarum  
Hernia.*



debito retineatur, & cingulis, pulvinaribus, emplastris & quiete prohibeatur, ne denuo possit prolabi, exhibitis simul internis remediis adstringentibus & herniæ convenientibus paratis, ex rad. consolid. osmund. regal. valerian. herb. herniar. papinell. vinca pervinc. jaceæ, semperfoliat. & c. aliisque, non multum enim ab aliorum herniam curandi modo secedit.

*Sylvius* solutæ unitatis in Abdominis & Intestinatorum Vulneribus postulat redunonem suturâ faciendam tum in intestinis, quæ post illam aquâ calidâ abluta debicum in locum sunt reponenda, tum in ipsius abdominis partibus separatim, peritonæo nempe & musculis, in spersis pulveribus adstringentibus, & emplastro stiptico vel alio consolidante vulnere extrinsecus imposito, non omisis apozematibus vel aliis medicamentorum vulnerariorum formulis interius assumendis.

*De curan-  
da hernia.*

In Hernia patiens ita locandus, ut resupinato pedibus in altum elevatis intestina vel omentum aut spontere deunt in sedem pristinam, aut si hoc fieri nequit, remotis obaculis & potissimum flatibus per emplastrum suum carminans discussis, manibus retrudantur, tum fasciis aut subligaculis tamdiu retineantur, donec necitas per adhaescentiam musculorum ita sit angustatus, ne ulterius prolapsus ille contingat, quem in funem etiam unguenta vel emplastra in usum ducit, agglutinationem istam promoventia, & herniæ potissimum dicata, soubus verò calidioribus intestina non vult irritanda, sed solum temperatis, ne iliaca passio aut vomitus sequantur enormes; quandoquidem etiam in ætate profectionibus conjuncto & conrescentia hujusmodi vix sit speranda, fasciis intestinum suadet in loco convenienti detineri, ne mala graviora prolapsu scrotum iis inde sint expectanda.

*Carotefia-  
norum mo-  
dus curan-  
di Abdomi-  
ni & In-  
testinorum  
Vulnera.*

*Carotefiani* in simplici Abdominis Vulneribus absque læsione intestinatorum curando eadem planè procedunt ratione, quâ vulnus in genere tractare solent, sistendo sanguinis effluxum nimium, removendo obstacula, adiungendo invicem vulneris labia & eadem consolidando, non omisis interius sanguinis coagulatione promoventibus, ut oculis & c. spermate ceti C. C. aliisque sudorem promoventibus, quem hoc in casu maxime judicant proficuum. Ipsi Vulneri etiam foris adhibent fottus calidiufculos ex herbis vulnerariis, salviâ, alchimillâ, menthâ, hyperico, in vino coctis, vel linteum duplicatum spiritu lumbricorum, in quo camphora dissoluta, imbutum sepidè imponunt, donec emplastro vel unguento ex mastich. gummi. caranni. terebinth. ol. Philosoph. hyperici, aliisque paratis perfectè possit consolidari. Intestina extra vulnus protuberantia & statu distenta, vel decocto ex carminativis in vino dulci parato, vel lacte calido sovent, & vulnus angustius in tantum dilatant, ut intestina per illud commodè in abdominis cavitatem, situmque pristinum possint repelli, quâ ratione etiam omentum prominens fovere solent, & portionem ejusdem corruptam, ut præcedentes, filo ligare & abscindere, relicto filo, ut denuo extrahi & portio ulterius corrupta rescari queat. Vulneratis verò simul ipsis intestinis, sive tenuibus, sive crassis, ut vel chylus, vel excrementa per vulnus effluant, quamvis res periculo sit plenissima, & parva de salute spes, nihil-

ominus intestina vel lacte calido, vel spiritu vini camphorato & Elettaria hyperici abluant, sicut ununt, sicque in situm ordinarij reponunt, instillato balsamo de Capaiba, vel balsamo mort. ex aloë, myrrha, benzoë, styrace calami. & u. vin. & paucis & c. his parando, & internè potiunculam exhibent spirituosas particulas in tubulis intestinatorum augentem & corroborantem, cujus sequens esse potest formula,

*℞. Aq. salu. ʒiij.  
menth. ʒi.  
Regin. Hung. ʒß.  
Tinctur. hyperic. ʒiij.  
Spir. lumbricor. ʒij.  
Mastich. ʒiij.  
Camphor. ʒij.  
Syrup. Peron. ʒi.  
botryos,  
de tormentill. aa. ʒß.*

*M. d. cochlearium.*

Reliquum vulnus ut conglutinetur, & peritonæi & musculorum partes in vulnere majori suturâ per filum crassius cerâ obductum aduniant, & vel unguentum traumaticum *Blancardi* inungunt, vel emplastrum aliud consolidans ex acido abforbentibus parandum, qualia sunt, bolus Armena, plumbum ultum, lithargyrum, minium, oblihanum, mastix, galbanum, terebinthina. oleum loti odorati, ovorum, Philosophorum & cera. Potionibus vulnerariis semper admiscunt pulverem ex ocul. & c., ut acido fortius resistant.

In Hernia curanda primam quoque impendunt operam, ut intestina vel omentum eò repellantur, unde prolapsa sunt, removendo obstacula eodem planè modo, quo in Abdominis vulneribus, ad restituenda intestina statum & intumescientiam eorum soubus aut cataplasmatibus discutiunt, & dunt quoque vis emolliunt, qua de causa rad. alth. fol. malv. flor. camomill. sem. anis. carvi, fenigr. in lacte coquant, & linteâ eodem imbuta calidiufculis adhibent, in simul regionem protuberantæ sequenti inungunt linimento,

*℞. Sevi Hircini ʒß.  
Axung. capor. ʒij.  
Ol. Hyperic. ʒiij.  
Lumbricor. ʒj.  
Ol. Petr. alb. ʒj.  
Dest. macis gutt. vj.*

*M. F. Linimentum.*

Loco hujus usurpant butyrum, cui flores verbasci & hyperici fuerunt incocti, & postmodum agro aut in tabula, lecto, aut, si infans fuerit, gremio matris, vel alterius apte disposito, capite aliquantum ad inferiora, inguine verò ad superiora respiciente, & pedibus divaricatis, intestinum vel omentum per processum peritonæi dilatatum in ipsam abdominis cavitatem detrudunt, quo facto vel unguentum ad Hernias *Mynsichti*, illinunt, & quietem decubitusque supinum ad longum imperant tempus, vel emplastrum imponunt fibras comprimens, & ita meatum istum angustans, aut mediante accrescentia quadam carnosa occludens, quorum varias habent formulas, ex quibus sequentes aliqua præbere possunt exempla,

*℞. Resin. ibij.  
Cera, ibij.  
Terebinth.*

*Farin.*

## CAP. II. DE ABDOM. & INTEST. VULN. & HERN. 331

*Farin. fabar.* aa. ʒiʒ.

*Fenigr.*

*Consolid. maj.* aa. ʒi.

*Rad. Alb.* ʒi.

*Herb. barh. caprin.* ʒiʒ.

*Bol. rub.* ʒiʒ.

*Spir. vin. f. vin. adust.* ʒiij.

*Acet. vin.* ʒiʒ.

*M. f. a. F. Emplastrum.*

*Rad. Aristol. rotund.*  
long. aa. ʒʒ.

*Filicis.*

*Osmond. regal.* aa. ʒi.

*Consolid. maj.*

min. aa. ʒvj.

*Cetrach.*

*Glasti.*

*Cand. equin.* aa. ʒi.

*Sem. plantag.*

*nasurt.*

*psill.* aa. ʒʒ.

*Nuc. cupress.*

*Gallar.*

*Cupular. gland.*

*Fabar. torrefact.*

*Myrrillor.*

*Malicorii.*

*Balanfior.*

*Acacie* aa. ʒʒ.

*Ex hisce in subtilem pulverem redactis fiat capsula cum vino rubro ad consensionem emplastri reducendum, cui addo*

*Tauris.*

*Myrrb.*

*Aloes.*

*Mastich.*

*Boli Armen.*

*Mumia.*

*Lap. calamin. pp.*

*Lithargyr. aur.*

*Sangu. dracon.*

*Picu navalis* lbij.

*Terebinth. q. f.*

*F. f. a. Emplastrum.*

*Rad. Pic. naval.* ʒij.

*Aloes.*

*Olibani.*

*Mastich.* aa. ʒʒ.

*Colcot. li.*

*Boli Armen.* aa. ʒiij.

*M. F. Pulvis, qui excipiantur vel melleagine rad. consolida maj. vel albumine ovi, & instar emplastri imponatur.*

Sed circa emplastrorum horum impositionem rectè monent, non omnes eadem terre posse, siquidem ocellus poris particulæ transudantes sub emplastro retentæ fibras cutaneas vellicant, poros occludunt, & hac ratione pruritus, inflammationem & pustulas excitant cum dolore urente, quod si in quibusdam contingat subiectis, deinde emplastro locum lacte calido abluint, & linimento ex sevo ovillo cum oleo overumparato inungunt, ut pori ita dilatentur, fibræ crispæ relaxentur, & spiculæ acutæ fibris earumque tubulis inhaerentes inviscantur, sicque dolor minuat & pustulae decidant. Subligaculorum usum cum pulvinaribus & scuto ex cera confecto, ac recteque regioni herniæ alligatis summopere ducunt proficuum ad prohibendum ulteriorem intestinorum prolapsu.

sum. A quibusdam interna quoque exhibentur remedia aperturæ oclusionem promotura, inter quæ laudantur semen nasturtii tostum, perfoliatæ, Tinctura Hyperici, Essentia lymphiti, potio seu decoctum contra herniam intestinalem *Mynsichti*, vel Pulvis sequens:

*Rad. Cichor. alb.* ʒʒ.

*Pulsatil.* ʒi.

*Sem. Perfoliat.* ʒij.

*M. F. Pulvis, in jusculo ad ʒj. adsumendum.*

Sunt tamen, qui hisce parum tribuunt, vix percipientes eorum vim esse tantam, ut peritonæi procellum comprimere, sicque meatum satis queant angustare, quod ipsa quoque sæpius monstrat experientia, quare & spiritui salis, à quibusdam ad herniam scutandam valdeperè deprædicato non adeo fidunt, sed si quis felix subsequutus est curationis exitus post ejus usum, non tamen spiritui huic, quàm subligaculis, quieti, & reliquo diatæ regimini eundem ferunt in acceptis. Quando vero malum hoc ita accrevit, ut ob intumescentiam & variam contorsionem intestinorum, per mæxum inguinalem in locum ordinariæ repelli & pristinae sedi restitui nequeant, & extrema confugiunt remedia, & herniotomia approbant, & sectionem tamen testiculæ aduersionem non adeo frequenter instituentes, sed potius sectionem & puncturam auream, de quibus, Herniæ curationem ulterius explanantes, pluribus modis sumus acturi.

§. 20. *Nos*trum ergo de morbis hisce Abdominis & Intestinorum ritè curandis sententiam sequenti nunc percipito ratione. *Vulnera Abdominis à Chirurgo statim examinanda sunt, quænam partes fuerint læsæ, si verò satis manifestè constet, quòd vulnus in abdomen penetraverit, non opus est ut exploretur vulneris profunditas, ideoque Chirurgos nostros hic carpo, qui specillo ferreo statim inquirent vulneris profunditatem, & ita partes illas hoc instrumento lædunt, fibrillasque discidunt, præstat ergo vel candela cereæ uti, vel specillo plumbeo flexili, quæ ita flecti possunt, ut catheter flexilis, & sic ejusmodi instrumenta accommodantur ad qualescunque occurrentes mæandros, sed inquisitioni huic non semper fidendum est, quoniam in corpore læso partes aliter figuratæ erant, dum æger vulnerabatur, quàm postea ubi vulneris status explorabatur. Pessimi etiam faciunt Chirurgi illi, qui vulnera hæc ampliora reddunt, quia omentum & intestinum facilius tunc excidere possunt, in casu verò, ubi jam illa fuerint prolapsa, & ob distensionem nimiam hæc reperiri possint, tunc aliquando concedi potest, ut vulnus magis amplum reddatur. Reprehendendi non minus veniunt, qui in hisce vulneribus statim ad venæsectionem, tanquam ad anchoram sacram, confugiunt, quia tanquam bestię rapaces, & tanquam hirudines ægris sanguinem vitæ hujus nostræ unicum pabulum exhauriunt, & ægros ad plura disponunt mala. Maximè & Chirurgos nostros hodie nos carpo, qui statim utuntur frigidis & adstringentibus, humorum enim circulationem Chirurgi per frigida ac adstringentia perperam imposita retardant, in quorum verò circuitu non tantum sanitas, sed & vita nostra consistit, & hoc retardato sanitas, penitus verò ablato vita perit.*

Vulneratis ergo hisce meo judicio statim

Tt 2

cx-

exhibeantur acidum absorbentia, & circulationem quorumvis humorum promoventia, inter quæ palmam aliis præcipiunt oculi ☿, & ium diaphoret. Antisept. Poter. Mumia. sperma ceti, lapis Irlandicus, & scissilis noster. Nec omitterenda sunt diaphoretica, quæ sanguinis grumos evasacos dissolvunt, & circulationem humorum promovent, sequenti ergo utatur mixturâ cochlearum.

℞. *Card. bened.*  
*Maria,*  
*Fœniculi,*  
*Veronica*, aa. ʒij.  
*Lap. ☿. pp.* ʒj.  
*ʒii diaphoret.* ʒb.  
*Syrup. beder. terrestr.* ʒj.  
*M.*

Detur quoque sæpius dosis sequentis pulveris, à quo sudor expectandus.

℞. *Ocul. ☿. pp.* ʒj.  
*Lap. Irlandici.* ʒb.  
*M. F. Pulvis.*

Vel:

℞. *Sperm. ceti* ʒb.

Elapſis aliquot diebus, iterum diaphoreticum exhibendum:

℞. *Corall. rub. pp.* gr. xv.  
*Unicorn. ver.* gr. xj.  
*ʒii diaphoret.* gr. xij.

*M. F. Pulvis*, qui detur cum aqua veronica. Diuretica blandiora singulare quoque hic præstabunt juvamen. Si verò in amplo abdominis vulnere intestinum fuerit prolapsum, hoc prope diem est reponendum, aliis enim flatibus ita distenditur, ut in pristinum locum reponi minime possit, hinc pori intestinorum à frigore oculi iterum aperiendi sunt, & liquoribus intus contentis major conciliandus est motus & circulatio promovenda, imò ipsa intestina lacte calido, in quo flores camomill. cocti, foveanda sunt; calide ergo imponatur linum nendol recentem contortum, nondum verò coctum, vel ipsum linum exsiccatum, & in lacte dulci coctum. Intestina dein flatibus jam consumptis reponi debent, si id fieri non potest, vulnus magis amplum reddatur, si verò fuerint reposita, vulnus aliqua ex parte consuatur, si opus sit, turundæ ergo alibi sæpius jam dicto digestivo inunctæ vulnere imponantur, ac superimponatur emplastrum idoneum stipticum, vel nostrum polychrestum, superimpositis sacculis calidis.

Si vulnus Abdominis non penetrans sit in linea recta alba sic dicta, tunc & varia balsamica dicta imponantur turundæ, & tractetur hoc vulnus, uti partis membranosa.

Cùm verò omentum prolapsum, & ob moram aliquam jam fuerit corruptum, quoniam, ceu superius diximus, facillè sphacelatur, tunc inter partem sanam & corruptam filum interjiciendum est, & portio corrupta abscindenda, ne pars sincera trahatur, & confuso aliquatenus vulnere, filum tamen extra abdomen pendulum relinquendum, donec decidat.

Si intestina fuerint læsa, & quidem tenuia, tunc res est in angusto, sed omnia tentanda sunt, vulnus intestini consuatur, si fieri potest, & apponantur balsamica vulneraria, vel talis pulvi

inspergatur, qui paratur ex myrrh. aloë, bol. Armen. camphor. saccharo ʒi p. æq. vel foveatur sequenti vel simili spiritu cum spongia.

℞. *Spir. vin. comm.* ʒij.  
*Tram.* ʒib.  
*Aloei,*  
*Camph.*  
*Myrrh.* aa. ʒj.  
*Regin. Hung.* ʒj.  
*Sacch.* ʒi ʒib.  
*M.*

Hic & conducunt omnia ea, quæ superius de Vulneribus Abdominis agentes exhibuimus.

Si patiens in sinistro latere fuerit læsus, ipse in dextrum se conferat, & si intestina à flatibus fuerint nimis distenta, ut vix intrudi possint, & poruli nimis sint obstructi, sequens conducet ad resolvendum.

℞. *Flor. chamomill.*  
*Melilot.* aa. Mj.  
*Sem. anis.*  
*Fœnic.*  
*Cumin.* aa. ʒib.  
*Caryophyll.*  
*Macis* aa. ʒb.  
*Cog. in lact.* add.

℞. *vin. camphorat.*  
*Aq. theriac.* aa. ʒij.  
*Sacch.* ʒi ʒij.

*Ol. anis.* ʒij.

*M. F. Epithema*, loco vulnerato & intestinis protrusis tepide applicandum.

Si vulnus abdominis fuerit nimis amplum, consui possunt labia vulneris cum peritonæi valis. Si omentum fuerit prolapsum, id statim pristino loco reponendum, & si jam fuerit frigidum, sequens adhibeatur remedium cum spongia applicandum.

℞. *matricar.* ʒij.  
*Aq. menth.*  
*Regin. Hung.*  
*Physagon.* aa. ʒj.  
*Camphor.* ʒij.

*M.*

Si omentum verò jam nigrum fuerit & putridum, nil illud ligandum est, & abscindendum, at filum non abscindatur, sed ex corpore dependeat, usque fiat separatio. Omento intruso, vulnus consui potest, relictò parvo foramine, ad materiam effluxum, & filum repetendum. Si æger non habeat alvum laxum, enema dandum non est, quia intestinum facillè ob confusionem factam rumpi potest, sed sufficit suppositorium, vel decoctum paskularum.

Interim circa vulnera hæc semper respiciendum est ad symptomata, facillè enim fieri potest, ut partes internæ contusæ fuerint, hinc facillè marce febris oboriri potest, cui si haud congruis remediis occurratur, gangræna & certa mors sequetur, quare statim ad sudoriferas mixturas, & decocta tanquam ad factam anchoram confugiendum est. Ad crassitiem succorum incidendam, & partem corroborandam, conducet cataplasma ex ruta, summit. ab. synth. salv. bacc. laur. Junip. sem. cumin. fœnic. flor. chamomill. melilot. myrrh. pulv. rad. beyon. &c. & in vino coctis, addita farin. fabar. q. s. ad consistentiā cataplainatis, & dein imponatur emplastrum de cumino cum camphora, vulnera enim harum partium tractanda sunt cum cautione.

## CAP. II. DE ABDOM. & INTEST. VULN. & HERR. 333

tione, & semper ad internam inflammationem & febrem respiciendum, hinc singulis quatuor horis, uti in peste solet, dentur duo cochlearia mixturæ sequentis vel similis sudoriferæ.

℞. *Aq. Scord.*

*Menth.* aa. ʒiʒ.

*Regin. Hung.* ʒʒ.

*Diascord. Syto.* ʒ. op. ʒʒ.

*Ocul.* ʒʒ pp. ʒj.

*Bezari.* min. ʒʒ.

*Camphora* gr. iiij.

*Sacch.* ʒj gr. v.

*Ol. Sassafr.* ʒʒ.

*Syr. cinamom.* ʒvʒ.

*M. d. ad vitrum.*

Pro potu ordinario. F. Decoctum ex rad. Scorzoneri, Chin. heib. veron. card. bened. & fenic. in ʒ. commun. & vino coctis, adjecta lap. prunell. ʒʒ. quod semper calide bibatur, vel infusetur vino, vel potui ordinario sequens.

℞. *Elux.* vit. ʒij.

*Propr. Parac. absque acido.*

*℞. nestr. ceph. oleo.* aa. ʒj.

*Ol. Sassafr.*

*Menth.* aa. ʒʒ.

*M.*

Ad consolidandum. & ulcerationem impediendam sequens vel simile conveniet decoctum.

℞. *Rad. Gentian.*

*Barban.* aa. ʒiʒ.

*China,*

*Salsaparill.* aa. ʒj.

*Cort. Guaiac.* ʒvj.

*Herb. Scord.* Mij.

*ʒis Qi* ʒʒ.

*F. Decoctio in vino.*

Hujusmodi potus continuandus est usque ad plenam restitutionem ægri.

Intestina verò prolapsa si gangrænosæ fiant, & fœces exeant, confluere haud licet, sed adhibitis decenter medicamentis motum humorum promoventibus, calidioribus nempe, ut aqua ʒʒ, cum ~u vin. camphorat. consolidatio illorum sponte subsequetur. Sicin quodam viro Francothalensi tempore pestis anno 1666. hernia intestinali laborante, tumoreque hoc indies majorem ruborem concipiente, tandem gangræna correpto, remediis applicatis aperto, cum fœces intolerabili cum fœtore emanarent, remedia superius dicta adhibita fuere, post mundificationem sic dictam caro succrevit rubra, & consolidatio facta fuit. Æger adhuc sanus vivit. sed cibus copiosius ingestis, eo loci tenuis transsudare videtur lymphæ. Simile quid, sinistro tamen cum eventu, contigit in virgine 20. annorum, quæ diu in inguine tumorem sensit, qui major factus & apertus pus non laudabile exhibuit, unde humor effluens acrimoniâ suâ intestinum ileon, quod in dissectione cadaveris apparebat, corrodingo, partibus illis gangrænam inducere cepit, successit febris lenta, & tandem hæctica, quæ etiam paucorum dierum spatio fuit extincta.

In cura *Herniæ* intestinalis eò in incumbendum, ut reponantur intestina prolapsa in situm debitum. dein repositis intestinis peritonæum firmetur & consolidetur, ne ulterior intestinis concedatur prolapsus. Ut ergo reponantur intestina prolapsa, conveniente situ ægro relupinato, crucibus & natibus ejus nonnihil elevatis adjuvanda sunt, & impedimenta, status, stercora, &

alii humores stagnantes removenda sunt, & cum intestina tenuia tantum prolabantur, hinc flagratio humorum illa circulantium, & ab hac tenio membranarum & spalinodes intestinelorum affectus duritiem representantes oriuntur, quæ blandis ac aromaticis fomentis externis resolvenda, & si status simul urgent, uti semper fit in hernia intestinali, mixtura quædam carminativa propinanda; exempli gratia:

℞. *ʒ. flor. Chamomill.* ʒij.

*Carminat.* ʒj.

*Essent. carmin.* ʒʒ ed ʒʒ.

*Flor. Chamomill.* ʒj.

~ *ʒ. ci anisat.* ʒʒ.

*Syr. Cort. aurant.* ʒij.

*M. d. ad Vitrum.*

Alvus servetur laxa, vel suppositoriis, vel clysteribus, qui tamen ab initio non semper adhibendi sunt, sed si confirmata fuerit prolapsus, & symptomata gravia ægrum torqueant. Forus quoque vatii humiditæ hiccique imponantur parti affectæ, & præ aliis convenit linum nendo recter contortum in lacte dulci coctum, & calide applicatum, stercus ovillum dulci lacti incoctum & applicatum, non contemnendi usus erit remedium. Omnia ergo emollientia, blande discutientia & anodyna, vulgo ita dicta, conveniunt: contra frigida repellentia & adstringentia in prolapsu intestinelorum, atro notamus carbonem, utpote, quibus remediis ægri ad cymbam sæpe Charontis deducuntur.

Homines provectæ ætatis à tali morbo nunquam, nisi lectione curantur, quæ etiam ipsis sæpe est fatalis. Variatamen em: laltre regionum lumbari, & inguini applicantur: inter quæ emplastrum Magnæcum *Hoffmanni* à nonnullis celebratur, ipseque Autor opere de methodo medendi p. 426. talia profert: In delapsu intestinelorum in inguina, vel scrotum, artificiose & perita Chirurgi manus primùm requiritur, quæ intestina in pristinum reducat locum, id quod fit, dum æger diductis cruribus supinus collocatur, & capiti declivior, coxæ vero superior datur locus. Dein fœces indurate emolliendæ, & si summo cum dolore magna quoque vel inguinis, vel scroti, vel utriusque durities conjuncta fuerit, scrotum & inguen decocto rad. alch. sem. lini, flor. melilor. aute erit fovendum, ut ita facilius intestina tractentur. Hæc omnia compendiose supplet emplastrum meum magneticum, licet & ipsa iliaca passio una adsit, propriâ experientia à me deprehensum, inque pluribus diversæ ætatis, constitutionis & sexus, subjectis, eodem etiam malo plures per vices ad desperationem usque aliorum recurrente, multoties non sine fructu probatum, quod satis dilatare nequeo, lumbis applicatum tormina juxta sopiendæ ventris atrocissima, intorta, dislocata & incarcerata in scroto intestina, quamprimum incaluerit, in pristinum transfert abdominis sedem, ipsis etiam ægrotis, non quidem fine molestia, vim ejus attractivam animadvertentibus. Emplastrum est sequens.

℞. *Gumm. de sagapen.*

*Ammoniac.*

*Galban.* aa. ʒij.

*Terebinth.*

*Cera Virgin.* aa. ʒv.

*Magnet. arsen.* ʒj. gr. xv.

*Rad. ari* ʒj.

Tc 3

Gum-



*Gummata dissolvantur in 4. q. f. & colla in formam emplastri, additis reliquis speciebus, extendantur super alutam.*

Sed ut fatear quod verum est, sæpius id applicari iussit herniosis meis, qui nullum exinde habuerunt levamen, nec scio, quã vi attractoria suum edere possit effectum. Alii absque commodo & effectu ob vim attractoriam pinguedinem leporinam, vel ursinam dorso illitanti commendant.

Ne verò Herniæ aperiantur, uti imperiti Chirurgi hernias sæpe pro bubonibus habent, & illas aperiunt, quarum herniarum incautè aperiatarum exempla videantur apud Rhod. Obs. M. cent. 2. c. 72. Heechster. Dec. 10. & imprimis apud Cl. van der Vliet Obs. rarior. cent. 1. Obs. 54. sicuti & hic Castells huiusmodi casus infelix non ita pridem contigit, dum Chirurgus quidam falso deceptus præiudicio de abscissu inguinali, lancetâ tumorem tam profundè aperuit, ut ipsum intestinum perduceret, quo factò cibus potusque, & alia ingesta per foramen effluerunt, ægerque obitu suo postridie curam absolvit. In his ergo cautè mercari debeat Chirurgus.

Ut verò repositis intestinis peritonæum iterum conglutinetur, & laceratum consolidetur, tum externa, tum interna plura ab Auctoribus narrantur remedia, inter quæ ferè non unicum verè fidei respondet, quamvis *Hartmannus* nimis deprædicet laudibus balsamum suum salis gemmæ, & plura ejusmodi remedia possunt peti ex jam dictis, reliqua verò videri apud Cl. *Ermilærum* p. m. 155. quorum præcipua sunt sequentia.

1. *Gumm. Caran.*

*Sem. nasturt. aa. q. f.*

*Præparantur cum album. ov. q. f. & imponantur.*

Emplastrum ex pice navali, resina & luteribus coctis pulverisatis inter se mixtis paratum, item Emplastrum dialuphuris *Randis*, oleum laceratarum, &c. Hernias quidem sanari posse, & imprimis in juvenili ætate, non dubitamus, sed in adultioribus non nisi sectione ab experto Herniotomo instituta. In juvenibus ergo bonam fasciam, cujus optimam vidimus formulam, cingulum nempe, sive subligaculum abdomini circumligandum, & ex linteo confectum, cui adjunctum est pulvinar ex gossypio, aliquantum durum, & trochleâ scroto affigendum, ut intestinum repositum ulterius prolabatur, emplastro carminante *Sylvii* absque ✕ parato, & super corium extenso hernicæ prius imposito; & quies hinc juvenibus maximo opere imperanda est, quæ herniarum panacea est. Remedia interna in hunc finem data peritonæum conglutinare posse mihi minime videntur, sed ejusmodi remedia ex falsâ præconcepta opinione per fallacem experientiam sunt excogitata, proinde credulos inani spe laciunt, & sperato successu sæpius destituunt.

Sectione ergo adultioribus suadenda, si velint sanari, quæ sequenti modo instituitur: Agro tabulæ imposito in superiori scroto parte fiat incisio, studiose tamen hæc instituenda, ne lædantur intestina, tum canalís argenteus pennæ anserinæ crassitie habens, & una parte concavus, altera verò convexus, aperturæ in sinuetur, secundum ductum peritonæi dilatati, ut juxta cavitatem ca-

nalis absq; ulla intestinorum læsione aperta ita illa ampliari possit, donec intestina per illam commode repellantur, quibus restituti peritonæum profundè satis prehensum connectitur, ne intestina denuo prolabantur, & aperta filo consuitur. Quando verò ob excrementorum indurationem & intestinorum intumescentiam, aliudve quoddam obiaculum intestina per meatum angustiores repelli, & sic debito loco restitui nequeant, canali antedicto peritonæum dilatatum in altum rollatur, & juxta cavitatem canalís abdomen versus cultello in tantum dilatetur, ut intestina aptè restituantur, quo factò vultus consueatur, & processus ad viam angustandam adempto convenienter consolidetur.

Absque sectione sola punctura nonnulli morbum hunc tollere, & intestinorum prolapsum prohibere tentant, dum superiori scroto regioni acui longa perforantes, acum hanc per processum adigunt peritonæi, filoque acui inserto per scrotum ligato processum illum ita claudere allaborant, ut nihilominus vasa seminaria cum teste ipso salvo libera permaneant, & æger feliciter sanetur.

Alia verò ab hac est Punctura aurea ita dicta, quod filo aureo processus peritonæi, aut potius meatus iste nimium dilatacus connectatur, & una cum sectione sequenti ratione peragitur. Factâ aperturâ super osse pubis, stylo ferreo infra processum istum adactò ipse processus attollitur, deinde vasa spermatica & musculi cremasteres inquirenda sunt & separanda, hinc processus peculiariter & partes etiam omnes separatæ foras protrahuntur, processus forcipe foraminato prehenditur, & per foramina ista forcipis acui quinque aut sex fila ducentes, proximè vasa spermatica & musculorum cremasterum, una cum vulneris labiis secunda vicetrajicitur, tum fila ab utraque parte contrahuntur, & nodo firmissimo connectuntur, & nodus hic tamdiu propendere permittitur, donec sponte decidat. Sub peritonæo detecto filum aureum bis, vel plumbæum semel artificiosè trajicitur, & medioeriter contrahitur, ut vasisâ contusione præservatis & illæsis, processus saltem angustetur, tum filum istud forcipulâ bisterve contorqueatur, & residuum studiose abscinditur, ne partibus ulla exinde læsio obveniat, tandem ægro lecto imposito, capite declivore, & pube elevata, ne intestina delabantur, vulnus communi more sanatur. Si enim quidpiam est, quod in curandis herniis summopere conducit, illud sane apta & conveniens est fasciæ (vulgo ein Bruch-Band) quâ & quidem longæ linteo confectæ herniæ insaustum præprimis recentes perfectissimè curari possunt, imprimis si aliquot dantaxat septimanarum quies & decubitus supinus accesserit & applicetur Emplastrum Carminativum *Syl.* vel nostrum ad rupturam.

Loco sectionis interdum usurpatur cauterium indolens, dum repulsiis intestinis, & restitendis, quantum fieri potest, ad os pubis diducto, hic acramento notatur, postmodum testiculo suui pristino & debito restituto, loco notato imponitur corrosivum, quod ad os ipsum penetrare permittitur, hinc eichara abactâ quantum sufficit de processu peritonæi abscinditur, & foramen arte sanatur. Si verò testiculus ipse veniat abscindendus, scrotum secundum longitudinem inciditur, per quam incisioem testiculi una cum

parte

parte peritonæ dilatata eximuntur, & à scroto debite separantur, vasa sanguifera scroci, quam altè fieri potest, colligantur, & infra ligaturam abscinduntur, funiculo usque sponte decadat extra scrotum prominente, quo facto ad consolidationem vulnus sedulo perducitur, ut foramen ita ritè claudatur. Omnibus hisce paluam eripere dicitur nova herniarum cura per arcanum Regis Galliarum (vulgo le secret du Roy) quo Operator Gallus plures restituisse dicitur quod remedium est ~ ☉ probe rectificat. qui pro ætatis ratione datur à gt. iij. ad ʒij. in vino rubro, & sumendum est hoc remedium per 21.

dies, applicetur simul fascia conveniens ac firma simplex sive duplex, cui effectum potius tribuo quam remedio interno ~ cui salis, qui quidem in sua diuretica serum superfluum è M. S. præcipitando sanguinem magis ipsissimum efficere potest ut partes affectæ libæque liquore magis consistente nutritæ ac firmiores reddatæ se contrahere & in situm naturalem vindicare queant, sed meo iudicio nunquam curabitur hernia solo hoc spiritu exhibitò, nisi simul fascia adhibetur, & sola est fascia unde auxilium expectari potest.

## CAPUT III.

## De Ani Procidencia, Fistula, Fissura, Mariscis, Condylomatibus &amp; Atritis.

## §. I.

**E**Xtremitas Intestiniurum commodum præbet ostium eliminandis excrementis. quæ egestio cum maxime sit necessaria, ne diutius recitata graviora inferant mala, merito nunc morbos examinamus, qui partem hanc Intestiniurum ultimam infestando magnas quandoque ægrotè decumbentibus precreant molestias. Ani ergo Procidencia nil aliud est, quam intestini recti prolapsus seu dilataio, quæ fit, quando sub excretionæ fecum intestinum rectum multum prominet, & aliquando extroorsum hæret, ut non facile possit retrahi, & in locum pristinum restitui.

Ani Procidencia.

Fistula.

*Fistula Ani* est ulcus sinuosum in intestino recto, ejusdemque vicinis musculis.

Fissura seu Rhagades.

*Fissuris* seu *Rhagadibus* etiam Anus divertatur, dum cutis ejus aridior existens, à particulis rigidioribus, & salisacidis diffinditur, & fibrarum ejus connexus molèstè sejungitur, ut majores quandoque & profundiores in eo sulci suboriantur.

Mariscus.

*Mariscus* dicitur tumor natus in ano, ex stagnatione humorum ibidem circulantium. Dicitur etiam *Ficatio*, *Ficosis Tumor*, vel *Ficosa eminentia*.

Ficatio.

Thymus. Condyloma.

Huc refertur & *Thymus*, qui affectus tamen omnes sub nomine Condylomatum possunt comprehendi. *Condyloma* autem est tumor, aliis carnis excrescentia callosa circa anum. Condylomata sunt aliquando citra inflammationem & mollia, quandoque verò cum inflammatione & dura dolorificaque. *Hæmorrhoides* quoque *cæcæ*, vel *Protuberantia venæ hæmorrhoidalis* vocantur, hinc condolendum est, quòd antiquitas adeò fuerit curiosa in fingendis nominibus, quibus medicinan tantum obscuravit, magis enim fuit de vanorum verborum apparatu, quam de rebus ipsis sollicita.

Hæmorrhoides cæcæ.

Atritis.

*Atritis* seu *Atrera* dicuntur imperforati in utroque sexu, quibus anus aut genitalia perforata non sunt, sive id ex constitutiòne à primo ortu, sive ex morbo acciderit, carne vel membrana supercrecente, & meum obstruente.

Pars affe-

§. 2. *Pars affeclia* horum affectuum est Anus, Calus, seu *Podex*. Intestinum enim rectum, ob rectum incessum ita dictum, in anum terminatur, qui est veluti mensura quædam, quæ illud, quod exterrinari debuit, determinata mensurâ

foràs truditur. Hujus exterior pars musculo sphinctere donata, est pars valde rugosa. Habet autem Anus præter sphincterem adhuc duos musculos levatores, quibus excrementa excernuntur, & podex seu anus iterum clauditur. Triplici gaudet tunica, abs qua dependet motus ille vermicularis ad podicem usque, & ab hoc ejectione peragitur excrementorum, quæ in intestinis remorantur, ut foràs eliminentur. Glandulis quoque suis intestinum hoc gaudet minutissimis.

## §. 3. Ani Procidencia ex relatione ægri facile Diagnosti.

patet, quando enim ægri hi alvum deponunt, facile hanc observant procidenciam, & sæpe coguntur manu, vel linteis calidis ipsam reponere & intrudere, magnumque sæpe percipiunt dolorem, imprimis, si intestinum fuerit inflammatum, & stercora ejicienda existant duriora.

Si *Fistula* sit oriunda, ab initio maximi adfunt dolores, & propter urentem materiam, antequam ipsi exitus conceditur, homines insanientes quali reddit, aperto abscessu materia ichorosa sæpe putrida, & cum sanguine mixta effluit, quæ cuniculos agit, & sic in fistulam abit sæpe dolorificam, unde ægri aliquid neque sedere, neque ambulare, ægreque cubare possunt. Ex fistula tali calculi excelsi sunt, uti annotavit Cl. *Geisfrid. Schultzius* in *Eph. Germ. Ann. IX. & X. Obs. 185.*

*Fissura* sive *Rhagades* ani cognoscuntur ex visu & relatione ægri, qui tactu easdem dignovit, sunt enim rimæ quædam profundiores, interdum siccæ, interdum verò instar Ulcusculorum humiditatem quandam exsudentesque saniem, modò superficialia, modò profunda, vel condylomatibus junctæ, vel ab iisdem liberæ, interdum succi acres in iis collecti, vel liquor intestinalis in easdem depluens & stagnatione corruptus dolorem magnum & puritum excitant, quo ægri valde molestantur.

*Mariscus* seu *Condylomata* sæpissimè, & quasi semper hypochondriaci superveniunt, cum habeant humores spissos ad stagnationem faciles, qui cognoscuntur ex ani ardore, in exoneranda alvo dolore maximo & parturientibus non dissimili, excrementa sunt dura & instar scybalorum, tumores sunt plures, unus altero major, adfunt insomnia, cum virum prostratione, ægri sunt mæsti, intercludit sæpe tumor talis mole sua exitum excretis illac erupturis, impediendo rigidè,

ne

ne descendat alvus, vel lorium deponat vesica, statim & depolitionem dolor vehemens insequitur.

*Atriti* seu *Imperforati* ex ano clauso & imperforato facile cognoscuntur; Tres occlusorum dari species Praedici contendunt, videlicet Angustiam seu Conniventiam intestini recti, ani Clausuram per membranam, & Coelitum, ob quem patientes propriè *Atrææ* sive Imperforati dicuntur. Sed quid quæso prodest hæc divisio, annon secundum magis & minus, & pro causa- rum varietate sunt iidem affectus.

*Ætiologia morborum horum secundum Galenicum.*

§. 4. *Ætiologia* morborum intestini hujus recti sive *Ani Galenici* hoc modo peragunt, ut in *Ani Procidencia* acculent tum musculorum & nervorum hujus partis imbecillitatem, resolutionem vel paralyin, refrigerationem, abscellus, tum quamcumque causam violentam, irritationem intestinorum vehementem in dysenteria aut tenesmo, conatum magnum in scæbis egerendis institutum, lapsum ab alto in dorsum, unde vel nervorum, vel musculorum oriri solet resolutio, ut intestinum hoc ab iisdem ulterius haud detineatur.

*Fistularum Ani* causam sive originem referunt ad morbos alios, quos prægressos & neglectos aut male curatos fistulæ ipsæ insequuntur, aut morbi isti in fistulas terminentur, uti sunt inflammatio, phrynata, abscellus, hæmorrhoides, condylomata, fici, rhagades aliique partem hanc intestini recti exulcerantes.

*Fissurarum* sive *Rhagadum* causis adscribunt quicquid unitatem parvis hujus dissolvere potest, confluxum nempe humorum acrim, distensionem cutis nimiam à condylomatibus, conatum magnum in detrudendis & excernendis scæbis duris aridisque in alvo diutius retentis, coitum præposterum & nefandum, ob quem pariter anus diffindatur.

*Mariæcarum* sive *Condylomatum* causas tribuunt sanguini crasso & lioso, in rugosa ani substantia diutius detento & coæservato, maxime verò filitris præcedentibus, quibus caro fungosa & rugosa cristarum instar excrescat.

*Atriti* vel in ipso utero ab errore facultatis plasticæ ita progeneri dicunt, vel ab ulceribus ita reddi male curatis, dum meatus iste in tantum concreseat, ut excoendis nullus, vel difficillimus conedatur transitus.

*Paracelsus.*

§. 5. *Paracelsus* nullam novam in *Ani Procidencia*, ab aliisque jam relatis differentem addere novit causam; in *Fistulis* verò accusat sal excrementorum in ano emortuum, quod absque cutis perforatione extremum hoc intestinum profundius pervadat.

*Fissuras* seu *Rhagadas* ex hæmorrhoidibus oriri dicit, dum sal menstruolum se recipit ad locustas, & separationem quamvis salis scissi transire tantum in fissuras, ubi cum alio non fuerit commixtum.

*Condylomata* seu *Fici*, quos & Verrucas hæmorrhoidarum nominat, originem habere vuln ex hæmorrhagiali sanguine: cum nutritivus humor separatus à substantia sanguinis per porum suum emunctorialem penetret extra materiam propriam, sicque in talein transeat excrescentiam, quicquid enim à succo nutritivo separatur, in suæ substantiæ similitudinem transire refert, ac pro loci vitriolique salis ratione dividi in cancerum.

*Imperforatos* in matrice ita generari allerit, ab inæqualitate seminis, & quod natura in liquore vitæ non sit perfecta & integra, maxime verò quod semen, ex quo exitus hic intestini elaborari debet, aut deficiat, aut abundet, unde superfluum in hujusmodi abeat additamentum, quod meatum istum occludat. Aliâ etiam ratione anum occludi aliquando observavit, dum nempe nonnullis joco per styptica fuit compressa adeo, ut propter necessitatem excretionis opus fuerit aperiri terebris.

§. 6. *Helmontius* ipse Pylorus non parum ad *Ani Procidenciam* contribuere videtur, utpote cujus regimini cuncta intestina cum podice subjaceant, qui vel à felle, vel ab alia quadam causa irritatus in subiecta ista furit, & è sedesua conclusa deijcit.

*Fistulas Ani* à latice intestinali corrupto & acelcente produci retur, necnon *Fissuras*, & differentiam solum in diversitate salis consistere, qui in Fissuris nondum illum malignitatis gradum obtinet, juxta quem in Fistulis intestinum rectum profundius erodit, sinumque callosum ob cruorem infectum producit.

*Condylomata* à nutritio succo ab acido corrupto, & propter contritum cutem excrescere putat; *Atriti*que vel in utero ab errore formatricis, & defectu, vel in dispositione seminis generari, qui in Fissuris nondum illum malignitatis gradum obtinet, juxta quem in Fistulis intestinum rectum profundius erodit, sinumque callosum ob cruorem infectum producit.

§. 7. *Wilsius* in Recti intestini *Procidencia* accusat relaxationem fibrarum musculosarum, interdum à purgantium violenta stimulatione & scybalorum duriorum propulsione inductam, nonnunquam verò ab ipso illo conatu in excernendis scæbis majori intensio in hoc propelli, ob nimiam fibrarum distensionem, qua simul spiritus alliguntur, ut fibræ nimium relaxatæ ulterius non contrahantur, nec intestinum hoc in situm debitum reducant.

*Fistularum* originem adscribit latice intestinali multis particulis salis erodentibus imbuto, & ob peculiarem quandam diathesin pravam extremum hoc intestinum profundius aliquando exulcerante.

*Fissuras Ani* fieri allerit, dum vel cutis ani existit liccor, & scybala majora, duriora & asperiora sunt, ut sic in transitu suo cutaneum illum contextum rigidiorum nimium extendendo divellant & fendant, vel etiam particule salinæ sejunctionem fibrarum inducant.

*Condylomata* ex particulis acidosis salinis ex massa sanguinea ad cutem ani delatis concrecere autumat, & *Atriti* veros in utero ita generari à defectu vel abundantia materię spermaticę, & fermenti spirituosii plastici in parte hac elaboranda debilitate, aut aberratione.

§. 8. *Sylvius* inter causas *Ani Prolapsus* inducentes frequentissimam admittit vehementem ventris compressionem, ad fæces alvi duriores, exsiccatas & compactas propellendas frequentius institutam, per quam anus simul ita propeletur.

*Fistulas* & *Fissuras Ani* ab acido acri in parte hac collecto originem sumere contendit, acriori quidem in Fistulis, mitiori in Fissuris, quas ramen à nimia extensione & siccitate cutis etiam produci posse concedit.

*Condylomata* oriri dicit à præpostero Veneris ulu.

usu, & partis hujus arcto confictu, sive id contingat à personis lue Venerea correptis, sive ab aliis sanis, cum non tam lucem ipsam Veneream sequantur, quam nimium & præposterum Venereis usum & abusum, quo cutis hæc rugosa nimium conficitur.

*Imperforationem Ani* in utroque sexu vitium aile conatum, uti imperforationem vaginæ uteri in sexu femineo.

*Caricifia-  
nos.*

§.9. *Caricifiani* inter causas *Ani Procidencia* recentient frequentiore alvi evacuationem, in qua per sæpius repetitam pressionem intestinum propellatur, excrementa duriora, hæmorrhoides cæcæ intumescencia suâ meatum intestini hujus recti angustantes, sicque vehementiorem excrementorum expulsionem inducentes, calculum in vesica intestinum comprimantem, conatum validum in partu difficili, vel etiam in ipso calculo excludendo, fibrarum intestini relaxationem, ob quam facile elabitur, nec in situ debite retinetur.

*Fistula Ani* causam statuunt particulas angulares succorum & vasculis ab ulceribus, tumoribus nimium tendentibus aut violenta commotione & agitatione partis hujus diffractis, intra musculos ani effusorum, & temporis tractu accensuum, quocumque pertingentes obstruunt tubulorum lateraliū & duriem circa eosdem callosam inducentes, intra quam vel cuniculorum, vel speluncarum instar cavitas quædam remaneat.

*Fissuras Ani* ab angularibus particulis liquoris intestinalis, vel hæmorrhoidalis accensitis produci existimant, à quibus cutis intestini recti diffringitur, nec non à stercoribus majoribus, durioribus & siccioribus, eorum in eorum exclusione nimium dislidentibus, ut inde facile rumpatur & dissindatur.

*Concylomatia, Ficus, sive Mariscus* enalci didunt, dum à particulis acutis erosâ cutis foraminatur, ex qua carnoia quædam exurgens substantia pro diversitate suæ figuræ hæcæ repræsentat excrecentias.

*Ani Clausuram* fieri docent, dum vel membrana crevitioramen obducens & exitum prohibens excrescendis, vel cavitas intestini recti nimium angusta est & convivert, vel in totum nulla in utero est elaborata.

*Nostrium  
judicium  
de causa  
Ani Pro-  
cidencia.*

§.10. *Nostro judicio* causa *Prolapsus Ani* ut plurimum est violenta & imbia dilatatio & extrusio intestini recti, dein & musculi plus minus relaxati deficiens retractio, à spirituum animalium circulationis defectu; sic & ubi vas omnia & nervi sunt nimis à serosis humoribus relaxati; sic in pueris serosis humoribus repletis ejusmodi procidencias pluries observamus. Sic quoque à magno nisu & conatu affectus hic, oritur, ceu videmus in pueris vociferantibus, in calculo vesicæ, in parturitibus, in alvo sicca, nec non à crebriori excretionis conatu in teneismo extenduntur ac relaxantur musculorum levatorum fibræ, omnes etiam humores ibidem stagnantes & fibras irritantes facile hunc affectum producere possunt, idemque præstant omnia acria, tum venientia, tum purgantia, quæ fibras continuo lacerando & irritando continuum ferè elapsum procurant, læpe enim à supposito acri & enemat nimium frequenter applicato procidencia notavi. Sic & hæmorrhoides dolentes & nimis fluentes ad hunc disponunt morbu. Procidencia Ani hæc & accidit ali-

quando vitio fibrillarū, musculorum & nervorū & in ipsis contentorum succorum, nonnunquam à percussione & casu ab alto supra os factum, hunc affectum productum fuisse, notârunt Auctores. Diarrhæa longius protracta intestini recti, ac musculorum fibras relaxando similem procidenciam inferre valent: quicquid verò herniam, procidenciam uteri, oculi &c. producere solet, & hanc ani procidenciam procurare potest.

Causa *Fistula Ani* est acre quoddam corrosivum, à stagnatione humorum & impeditâ eorum circulatione productum, imprimis circulas fedales collectum, unde humorum circumstantium particulæ multæ acidiores in carnem vicinam transudant per partes magis distentas, & sic simul fibrillis ibi irritatis & post difficili dolor oboritur, & postea ulcera, quæ dein pluribus fibrillis diruptis redduntur profunda, particulæ enim illæ acidæ pertinaciter hærentes in poris ac fibris intestini recti, humores alieni aliquid convertunt in acidis, qui ob tubulos ab ulceribus interruptos, circulationem continuare non valentes, ab humoribus à tergo continuo insequentibus propelluntur foras in cavitatem ulcerum, quam ad summum usque adimplent humore acri, acido ac tenui. cui simul admixta sunt particule viscosiores ac magis ramosæ, quæ ramulis suis libi mutuo implexæ ac hærentes in superficie ulcerum, illa foras reddunt. Omnia proinde, quæ particulis scindentibus acidis ac ramosis prædita sunt, circa anum imperium libi rapientia & fibras disludentia, affectum hunc excitare possunt, fractis enim fibris istis circulatio humorum necessariò impeditur, succus ipse redditur acrior, & ita evalatur.

*Fissura Intestino recto* obveniunt vel à particulis illis acidioribus, fibras cutaneas amplius, quam par est, dislocantibus & sejungentibus, ut sulci inde oriantur magis aliquando, vel minus interdum profundi. Nascuntur autem acidæ istæ particule ex sanguine partibus spirituosius depauperato, vel à peregrino quodam acido infecto, quod non modicum cibo & potu corpori inferitur, sed tale quid etiam in præpostero & impuro coitu contingere, ubi cum spermate corrupto particule hujusmodi ad partem hanc ipsam desinunt, & humorem in intestino recto contentum inficiunt. Nefando etiam hoc flagitio fieri solet, ut cutis nimium distendatur & violenter dirumpatur, uti eandem hanc fibrarum rupturam inducunt scybalæ crassiores, sicciores, durioræ & asperioræ cutem disludentia, quod & facile fieri potest, dum ob defectum humoris irrigantis cutis est aridior, & fibræ ejus rigidiores, quo fit, ut conatu majori ad scybalorum sicciorum expulsionem fibræ ad relaxationem minus dispositæ nimium tenæ rumpantur. In aëre tempore brumali interdum acidum tale latitat nitrosum, quod in excreviendis facibus intestino huic diutius denudato & aperto insinuat, malo huic inferendo fatis esse accommodatum.

Causa *Condylomatium* sunt particule multæ acidæ & viscosæ simulque ramosæ, quæ cum humoribus circulantibus ex poris valorum sedalium magis dilatatis ad intestinum rectum delatae fuerunt, vel glandulæ intestini recti ab iis viscidis humoribus obstruuntur, in quibus hærent, & dum laterum suorum acie fibrillas solito vehementius commovent, dolorem excitant,

Uu

citant,



citant, atque hoc pacto tubuli vicini aliquatenus distorquentur, unde humores stagnantes brevi nora in glandulis simul aciescunt, hinc circulatione impedita alluentes humores cumulantur, & sic necessariò tumor oboritur; etenim omnium ferme tumorum causa est obstructio tubulorum & circulatio humorum impedita, hinc melancholici, hypochondriaci, cachectici & omnes ii, qui habent plures succos viscidos & acidos ad stagnationem, & circulationem humorum tardiores reddendam pronos, in affectum hunc ut plurimum incidunt. Sanguis quoque est sæpe inspissatus, & per arterias hæmorrhoidales in venas ejusdem nominis transire impotens, partes ani distendit & aneurismata producit, quibus ruptis sanguis emanans fluxus hæmorrhoidalis vocatur. Sæpe tamen varices eodemque in loco concitantur, sed hoc plerumque fit à prægressa alvi constipatione, quâ sanguinis regressus impeditur, ita ut venæ magnopere distendantur, tandemque ruptantur.

*Atritis* veri ita nascuntur in ipso matris utero, dum intestinum hoc in formatione fœtus non satis elaboratur, & ad extremum usque excavatur, sed pars quædam spermatica crassior, tenacius coherens massam præbet spissiore, quæ in situ operculi cuiusdam meatum hunc obturat, & quod fistulosum esse deberet, solidum reddit & impervium; vel carne aut membrana quadam cuteve meatus iste obducitur, nonnumquam etiam sphincter constrictur aut carne operitur, quod *Boniven. cap. 30. de abd. observavit.*

*Prognosis Ani Procidencia.* §. 11. Quid de eventu horum affectuum sperandum sit, paucis nunc perspicimus. Anitæque *Procidencia* pro caulorum varietate vel facilius vel difficilior curatur, si nemini altiores egesserit radices, facile in tumorem abit & aliquando inflammatur, imo interdum gangrænam contrahit, ceu bigam exemplorum novimus. Si æresolusione & relaxatione nervorum acciderit, difficillimè sanatur; è contra si acciderit pueris & robustioribus, haud adeò difficilis est curatio.

*Fistula.* *Fistula Ani* magnam tum ægris, tum Chirurgis creant molestiam, facile enim multiplicantur & duæ vel tres ex una emergunt, insimul tubercula quædam suboriuntur dura, meatum istum intestini occludendo exitum fæcum prohibentia. Quæ intestinum perforant & facibus alvinis transitum permittunt, aut in vesicam penetrant, ut urina per fistulam exeat, pessimi sunt ominis, & raro aut nunquam optatam admittunt curationem. Nondum verò penetrantes *Fistulæ* & simplices aliquando sanantur, quamvis cura non sine difficultate institui possit, interdum perfectam sanationem non admittentes majus corpori non inferunt damnum, sed hæmorrhoidum instar sanguinem & saniem emittunt cum incommodo ægri, tractu tamen temporis, si copiosior sequatur effluxus, adeò ut lymphæ ex aliis vasibus ad emunctorium hoc succedat & magna emanet quantitate, atrophiam producant, totalem corporis emaciationem, ipsamque mortem sensim inferentem.

*Fistula* non sunt negligendæ, ex parvo enim principio magnum exurgere potest malum, & levem hunc ab initio morbum putatum graviora excipere ulcera erodentia, & ipsæ etiam fistulæ. Si verò non neglantur, sed in tempore

idoneis iisdem occurratur remediis, corrigi & in totum auferri possunt. Dolor gravis, qui eadem concomitatur, ob maximas fibrarum irrationes & spirituum dispersionem graviora provocare potest symptomata, succorum in corpore distributioni maximè incommoda, unde & apta nutritio inhibetur, & ægri contabescunt.

*Condylomata* quod attinet, & hi tumores sæpe Medicis negocium facessunt, imprimis cum materia nimis viscida tenaxque sit, & simul ægri hypochondriaci & morosi; & semel ibi abactis facile revertunt; imo humores diu commorantes aciores redduntur, qui dein fibrillas discindunt & facit ulcera & fistulas producant, imo ob maiorem tumorem & inflammationem interdum gangræna, sphacelus & mors oboriuntur, ceu patet ex *Obs. 122. Eph. Germ. Ann. 4.* perveniunt enim hi tumores ad eam magnitudinem, ut supprimant ægrotis juxta alium cavescam, quarum tamen partium diu non possunt uscarere usu, quin cendum sæpe sit simul dulcissimæ lucis usurâ. Eiusmodi lethalem *Ani* tumorem observavit *Tulpius lib. 3. Obs. rar. cap. 10. p. m. 157.* *Condylomata Ani* similiter lethalia observavit *Leijss lib. 3. Observ. Medicinal. Ouf. 28.* Facile & hæc in bubonem transeunt & redduntur cancrois, hinc ejusmodi tumores lue Venerea infectis frequentius accidunt, aliisque hypochondriacis & icorbuticis.

*Imperforatus* stricte sic dictis puerulis hoc vitium semper ferè lethale est, quod pluribus exemplis, præcipue tamen apud *Tulpium, Platenum Ephem. Germ.* confirmatur; aliquando & curantur, ceu liquet ex observatione *Ludovici curiosis communicatâ in Eph. Germ. An. 3. Obs. 25.* Fœmellis verò non tam subito ad frequentem funesta est ani occlusio, quod à *Minadoo* exemplo puellæ comprobatur, cui cûm anus imperforatus esset, & intestinum rectum in pudenda desineret, per id fæces nunquam non excernebat, vitam ad annos sex & fortè ulterius protrahens. Ani clausura per membranam, & ubi tîma adhuc conspicitur, facile incisione curatur, hinc *Scultetus Observ. 77.* refert, senoville obstetricem Patavinam, quæ anum totaliter occlusum acicula communi perforare, & foramen turundis ex gentiana ampliare solita fuerit. Infantes sub tormento tam atrocis morbi durare possunt ad septimum, decimum, undecimum, & decimum tertium diem, ceu *Hildanus* testatur.

§. 12. His præmissis proximum est, ut paucis quoque vivendi regimen ordinemus. In *Procidencia* igitur *Ani* eligatur aër purus ac calidus, frigidus verò maximè existit noxius, illis enim, qui diutius fæco rigidi insident, facillimè animum prolabi, omnes Autores Medici unanimiter testantur, nec verò sola hæc sessio, sed frigus externum quoque alio modo has partes nimidiù affligens ob acidum suum nitrosum hoc malum producere potest. Victus quoque eligatur acidum temperans, in genere euchymus & eupeptus, vitentur salita, infumata, acrida, aromatica, piperata, & omnia ea, quæ salinam in se continent acrimoniam, aut nimis sunt acida. Potus sit cerevisia defæcata, vel vinum generosum dulce, at moderatè haustum. Quietè & somno indulgendum. Ani pathemata sunt moderata, animus ipse tran-

tranquillus, exulet ira alique commotiones maiores. In *Fistulis & Fissuris* eadem convenit serēdiatā. In *Condylomatibus* eō incumbendum, ut alvus sit libera.

*veterum  
methodus  
curandi  
Ani Pro-  
lapsum.*

§. 13. *Veteres* in *Procidencia Ani* curatione ita procedunt, ut restitutio ejus quam celerrimē peragatur, ne inflammatio eum prehēdat, quā praeiēte restitutio ista esset difficilis, absterfis quapropter fordibus lixivio quodam ex cinere querno confecto, vel urina pueri calidā. intestinum mundatum digito indice aut medio in sedem debitam retrudunt, quō firmius in ea retineatur, nec ab humoribus viscidis depellatur, quā de causa ad firmiorem retentionem eīdem intestinum vino austero, in quo gallae immaturae, nuce cupressi, balauſtia & myrrha incocta sunt, abluesolent, quo illud conficiari & corrugari promittunt. Ad maiorem deinde adstrictionem & constipationem remedia adhibent laxitatem, ad prolapsum multum facientem, prohibentia, pulveremque inspergunt ex gallis immaturis, nucibus cupressi, corticibus pini, succo acaciar, hypocistidis, rhoē, fructu ericæ, flor. rosar balauſtis, thure, myrrha. ceruilla, alumine & similibus, ex quibus sequens eligi potest formula.

℞. Gallar. immatur.

Malicor.

Rhois,

Balauſtior. aa. 3℔.

Thur.

Myrrh. aa. 3ij.

Spum. argent. 3iij.

M. F. Pulv.

Restituto sic intestino hoc vitanda jubent omnia alvum sollicitantia tum alimenta, tum medicamenta, & ligaturam tandiu admovent, donec omnia sedata & intestinum omnimodo sit confectum. Quando verō inflammatio jam praeſens tam facilem non permittit curationem, aut intestini repulsionem, majores incedunt remedium apparatu, atque ad tollendam intemperiem illam cum materia, non modō necessariam imperant mediam, sed sanguinem etiam subtrahunt, sectā venā in cubito vel alio, & cum statim l. viter adstrictoria & repellentia adhibent intestino prolapsū, oleum nempe rosaceum omphacinum, vel unguentum sandalinum, & post illa ad relaxantia pergunt, digerentia & dolorem lenientia, fortia infusentes vel balneum ex decocto folior. malvæ, altheæ, fertulæ campanæ, flor Chamomillæ, meliloti, sem. lini, sem. nig. anumq; oleo chamomelino & anethino, intermisso oleo rosaceo vetusto, illinunt, donec abacta per remedia hæc inflammatione ad constipationem, adstringentia & siccantia superius indigicata transire liceat. A paralyſi tandem, & nervorum ex osse sacro derivatorum resolutione, à frigore contracta originem habent *Procidencia Ani* hoc modo obviam irescunt, ut prænullo victu calido & sicco, cruditatibusque in corpore abundantibus per debita remedia prius preparatis, post vomitū evacuatis, intestinum prolapsū foveant remediis calefacientibus & siccantibus, potissimum lixivio ex cineribus rorismarini, lauri, vel cupressi parato, vel vino generoso, quibus incocta fuerint herbe calaminth. marrubii, beton. puleg. paralyſ. verbasc. fol. myrrh. cupressi. malicor. balauſtia, flores anthos, floechad. tiliae, post quem fortum vel infusum intestinum in sedem debitam digitis reponunt, & ne denno

prolabatur, fumo suffiunt ex remediis calidis & siccantibus prunis inspersis, pulvere scilicet, vel trochiscis paratis ex radicibus Cypri, galangæ, floribus anthos, floechadis, nuce Moschata, inace, caryophyllis, corticibus thuris, mastiche, ladano, hypocistide, quæ si in trochiscos formari debeant, pulverulenta resina terebinthina igne liquata sunt suscipienda. Pro majori robore nervorum ipsi ano & ossi quoque sacro applicant emplastrum aliquod conveniens ex supradictis, vel sequenti formula paratum.

℞. Thur.

Myrrh.

Caryophyll.

Siercor. caprin.

columbin. aa. 3℔.

Euphorb.

Custor.

Mixta terantur, & terebinthina guttulis aliquot aqua ardentis irrigata excepta redigantur in formam Emplastri.

Mastichinum dictum emplastrum eundem in finem à quibusdam solet applicari.

In *Fistula Ani* humores pravi in corpore redundantantes evacuant remediis cuique aliis predominanti congruis, & vel Phlegmagogis, vel Cholagogis, vel Melanagogis, hunc icaristicationes frequentius instituunt in naibus & pedibus, vel hirudines iisdem applicant, aliaque remedia ad tempus aliquod continuant exsiccantia, donec locum invenire perspiciant fordes putridas abstergentia, & carnem corruptam & putridam adimentia, ut sic carne bona restituta, perfecta subsequatur consolidatio. Malo verō hoc tam altas agentekadices, ut remediis hujusmodi minimè cedat, specillo fistulæ immisso altitudinem ejus explorant, quā cognita vel ferramentum aliquod leve & flexile, vel limum crudum tenuissimum quintuplex ad palmi latitudinem ita contortum, ut unitas facta sit. setā equinā obvolunt, & specillo stanno perforato inferunt per fistulam impellunt, inditoeque digito indice manus sinistra in anum, vel ferrum istud flexile, vel specillum cum filo occurrentis per intestinum rectum educunt, sicque vel podice extracto carnem, quæ inter fistulam & internam recti intestini superficiem intercedit, scalpello aliquantū falcato una vice incidunt, ut unus eorum, quæ descendunt, pateat exitus, vel cum specillo extrema parte inclinato simul inserti eidem lini caput prehendant, & cum altero ejus capite bis aut ter vincunt, reliquum verō ex lino dependens intortum ad nodum alligant, jubentque ægrum, ut seipsū seceper per vices, quotidie scilicet nodum fortius alligando, donec id, quod inter duo ora interjacet, eodem modo seceatur, ac scalpello factum est, limumque integrum reddatur. Si tamen multa caro inter fistulam & intestinum rectum interponi, aut cum fistula pendentatur, per quam alē speculum penetrare videatur, sectio nem minimè volunt instituendam, ne dum sectio incautius obeatur, simul musculi intestinum constringentes imprudentius præcendantur, agerque faeces delabentes in posterum continere nequeat, sed invitus egerere cogatur. Facta verō sectione, vulneri isti linamenta indunt. ne sua sponte coeat, eademque fistulam eliciat, donec caustico medicamento, auripigmento

*Fistulam.*

to nimirum pp. aut alumine usto, quicquid putridum exiit & callosum, absumatur, & caro sana per farcotica, nunguentum de minio, de lithargyro, &c. reficiatur. Non penetrantium Ani fistularum orificium & ductum dilatant vel radice gentianæ, vel spongia exsiccatâ, &c. si nihil obediat, sinum excludit. carnemque putridam & callosam cauterio quodam itidem absumunt, cuius loco interdum linum byssinum succo tithymalli magni intinctum, & flore ærisusto & contrito inspersum. vel linamenta unguento Ægyptiaco aut pforico *Mesues* illita & implicata ad fistulæ longitudinem demittunt, vel pastillos ex unio in aqua plantag. aut melle rosato dissolutos linimenti formâ adhibent, aut fistulas aliaque ejusmodi ulcera lixivio ex cineribus sarmentorum vitis parato, in quo pariter mel rosatum dissolutum fuit, ablunt, & emplastrum de salice externo eorum orificio imponunt.

*Effusur.*

*Fissuras* live *Rhagades* hac ratione tractant, ut humores peccantes & superfluos debitis syrupis prius correctos medicamentis catharticis evacuent, vel si inflammatio addit, venâ cubiti dextri internâ vel malleoli dissectâ moderatam sanguinis copiam eliciant, postea ipsi. Rhagadibus citra nonidum obduratis topica adhibentes citra morbum & asperitatem siccantiâ & adstringentiâ, foris nempe ex decocto fol. plantag. olivæ, rubi, flor. rosar. aluminis, vel vaporem ex vino rubro, cui scoriz ferri candentis inspersa sunt, aut linimentum ex radice diplaci in vino coctis, ad mellis crassitiem contulsis, & in vase æreo (parulâ æreâ diutius agitatis, aut adipi anguillæ, dum ea assatur collectæ, inuntescent pulvere pinearum in furno siccatarum abjectis nucleis, & linimenti foris inungunt. Præsentem verò jam callo, eundem absumunt unguento Apostolorum, vel Ægyptiaco. eoque abacto *Fistulas* sequenti obducunt unguento.

℞. *Lithargyr.*

*Ceruf.*

*Plumb. ust. aa. ʒiib.*

*Camphor. ʒb.*

*Alum. ovi. ʒj.*

*Ol. lini. ʒiib.*

*M. agitentur omnia in mortario plumbeo, pistillo plumbeo, ad justam spissitudinem.*

*Vel:*

℞. *Lithargyr.*

*Ceruf.*

*Plumb. ust.*

*Alum. ust.*

*Thur. aa. ʒj.*

*Adip. suill.*

*gallinac.*

*anser.*

*Ol. Papav. aa. ʒj.*

*M. omnia super igne lento, & F. Linimentum.*

Conducet quoque sequens eodem modo adhibitur.

℞. *Succi Lycii ʒiij.*

*Aloe ʒj.*

*Sang. dracon. ʒb.*

*Camphor. ʒij.*

*Ceruf. ʒij.*

*Adip. anser. ʒij.*

*Ol. lini parum.*

*Subigantur omnia in formam Linimenti.*

*Emplastrum tetrapharmacum in oleo rosar. so-*

lutum & linimenti formâ adhibitur, ad consolidationem promovendam quibusdam singularis exsistimatur efficacia.

Ad *Condylomata* abigenda corporis instituntur purgationem ab humoribus crassis & sæculentis per pilulas de fumaris, electuarium Indum, confessionem Hamech, & sanguinem sæculentis ejusmodi jam infectum emittunt ad mediocrem quantitatem, ex vena itidem cubiti dextri internâ, tum ipsam condylomatum carnem spongiosam abluere tentant remediis primùm levioribus, ne locus nimium asperetur, ex quibus sequens valde collaudant.

℞. *Ungu. diapompholyg. ʒj.*

*Alum. ust. ʒj.*

*Stibii, seu ʒii. ust. ʒiij.*

*Ol. lini.*

*Myrrh. aa. q. s. ut*

*Fiat Linimentum debita consistentia.*

Hoc linimentum excipiunt linamentis & loco affecto applicant, ut eidem diutius adhareat. Eodem modo etiam emplastrum diachalciteos duplicatâ chalcitidis quantitate paratum, & in oleo lini vel nucum solutum admoveveresolent. Imbecillioribus verò hiis existentibus remediis ad fortiora properant unguentum nempe Ægyptiacum, vel Apostolorum, aut pulverem sequentem:

℞. *Chalcitid.*

*Alum. aa. ʒj.*

*Anripiment. ʒb.*

*Pulv. sabin. ʒj.*

*Hermodactyl. ust.*

*Myrrid. ust. aa. ʒiib.*

*Pompholyg. ʒiij.*

*Terantur omnia diligenter, &*

*F. Pulvis subtilissimus.*

quo fungosa excrecentia adspargatur, & ne paritis acrior sensus nimis irriteretur, aliquid opii, aut rad. mandragoræ, aut seminis hyoscyami admiscant. Condylomata altiora filo ligant, ut alimentum iis subtrahatur, aut novacula vel alio instrumento commodiori excindunt, & sanguinem aliquantisper effluere permittunt, ut sic de impunitatibus ejusdem sæculentis aliquid simul evacuetur, quo facta sanguinem supprimunt & cicatricem inducunt vel ferramento candente, vel pulvere ex malicorio, thure, sangu. drac. bolo, farina volatili, & paucio alumine, qua ratione procedunt, si anus condylomatis undiquaq; sit obstitus, excindendo nempe altiora ferramento, & humihora remediis antedictis absumendo.

*Arrius* membranam istam orificium obducentem dissecant novacula, & speculò insertò meatum dilatant, donec fistulâ plumbeâ unguento de cerussa, vel diapompholygos obductâ ad tempus aliquod inditâ foramen in debita servant latitudine & cicatrice obducant; qua ratione & istam angustiam corrigere student, quæ post ulcera vel vulnera sanata ob conglutinationem arctiorem fuit illata.

§. 14. *Paracelsi* curatio *Ani* prolapsi eadem ratione perficitur, ut portio illa prolapsa oleo ovorum prius illita pristino loco digito premente reposita, & adperso pulvere ex scarabæis pilularibus in furno siccatis, aut fumo ex scoris ferri coarceatur, ne denuò decidat.

*Fistularum Ani* curationem peragit ut in aliis *Fistulis*, locis, cum omnium unam eandemque curationem esse affirmet, mundificatis & incarnatis citra omnem corrosionem, live internæ sint potior

potiones vulnerariæ, sive externa localia, inter quæ aliis præfert remedium istud de quatuor guminis alibi descriptum. A lue Venerea originem ducentibus æ adhibet, quæ carcinomatibus dicata sunt, potissimum vero Realgar alcalizatum & emplastrum de cinnabari, quo curationem absolvit.

Fissuris.

*Fissuras* sive *Rhagadia* tollere satagit vel pessario ex aloë succotina & radice aristolochiæ pulverisatis & terebinthinâ exceptis, vel sequenti pulvere iisdem insperso.

℞. *Mumia* ʒj.  
*Lacca rubra* ʒb.  
*Pulv. aranciar.*  
 ʒi aa. ʒij.  
*Chimolia* ʒib.  
*Cachimia* ʒv.

F. Pulvis.

Assert etiam eadem curatione hæmorrhoides auferri posse, in qua spodium omnem partem adimpleat, adeo ut line hoc nullo expectati possit successus.

Condylomatus.

*Condylomatum* curationem modò duplicem proponit, alteram dulcibus corrosivis peragendam, alteram medicamentis stercoralibus, modò eadem unâ cum hæmorrhoidibus eadem curatione auferri posse statuit. Quæ corrosivis peragitur, sit vel corrosivo dulci simplici, vel eodem mixto cum aceto. Corrosivum dulce ita paratur:

℞. *Ol. lateris* ʒj.  
*de Juniperis* ʒb.  
*Ol. ex myrris* ʒij.

M.

Corrosivum dulce mixtum cum aceto sequens est.

℞. *Ol. lateris* ʒj.  
*Aq. aluminij* ʒb.  
*Vridatis* salis ad pondus  
 omnium.

F. Mixtura.

Curam de stercoribus sequenti modo vult institui. ℞. Patientis dejectum stercus, misce cum oleo de vitellis ovorum, premat patiens, ut exeant verrucæ fuscæque, quibus tunc medicina superponatur.

Imperforations.

*Imperforationem* & *Occlusionem Ani* instrumentis perfodi aut perterebrari permittit, cum alia ratione eundem referari posse nunquam cognoverit.

Hæmorrhoidum cura in Aniprocidentia.

§. 15. *Hæmorrhoides* cum assæclis suis *Procidencia Ani* restaurari promittunt radice acaciæ, vel pulveris formâ aspersâ, vel focu adhibita, quâ viâ regredientem podicem in vetus confortium recipiat pylorus, & furoris sui immutari conscius factus debito suo regimine pacatusque fungi occupat.

Fistulis.

*Fistulas Ani* conveniens esse remedium assertit ipsum arcanum corallinum *Paracelsi* interius assilumum, sicut aliis ulceribus desperatis optatum asserat auxilium; inter topica verò auripigmentum fixatum dulce aliis præfert, ad ulcera hæc fistulosa maxime conveniens.

Fissuris.

In *Fissuris Ani* singulare quoddam existit remedium confudit ipsum oleum saturni, quo illito laticis corruptio corrigatur & productæ ab eo foveæ sanentur.

Condylomatibus.

Ad *Condylomata* tollenda sudorem morientium deprædicat, quo illitæ excrecentiæ illæ corrugentur, & flaccidæ redditæ tandem penitus soleant decidere.

*Ani Clausuram* altis instrumentis aperire permittit, quamvis operationem hanc non semper felicem nancisci succellum respexit, & eandem propterea sapiens frustraneam esse fatetur.

Clausura.

§. 16. *Vulvis* restitutionem postulat *Ani prolapsi*, & jam restituti confirmationem ne celerius extra sedem convenientem decidat. Restitutio fit remotione impedimentorum tumoris nempe anum regredi ventem, refrigerationis, flatuum intestinis inhaerentium, aliorumque, per foras emollientes & discutientes ex decocto radicis althææ, brancæ ursinæ, lilior. herb. malv. agrimon. martub. menth. flor. chamomill. verbasc. sem. fœnigr. carvi. bacc. lauri, & retrusio ne digito pericienda, postquam oleo quodam portio intestini recti prominens lubricata fuit, ut facilius retropellatur, chamomeli nempe, lilior. vel hyperici. Anus repositus in suum confirmandus est, ne denudè prolapsus, quod sit epithematis adstringentibus tepidis ex decocto rad. bistort. pentaphyll. symphyt. herb. salv. consolid. Saracen. millefol. fol. querc. laur. flor. balaustr. sem. sumach. gallar. bacc. myrth. cort. mespil. inunctione unguenti nervini, & Comitilæ, & insperione pulverum ex ladano, mastiche, succino, sang. dracon. & croco. his adstringente, quæ remedia ut citius speratum edant effectum, decubitus supra ventrem aut latus aliquod, & quietem ad tempus quoddam protraham agro sumopere commendat.

Fistulis.

*Fistulas Ani* inveteratas & penetrantes vix ullam admittit curationem exiliatam, & propterea easdem quietas relinquere melius esse, quam remediis irritare, quæ verò non adeo diu radices egerunt, earum callum absumi posse censet vel Unguento *Egyptiaco* turundâ cavitati immisso, vel ferro candente, per cannulam ferream foraminatam fistulæ intrusam, deinde dilatam fistulam vel cistello falcato discindit vult, vel, si non sit adeo profunda, sed brevis & simplex, eam abstergere præcipit decocto agrimon. apii, cent. min. in quo mel rosatum fit dissolutum, addito pauculo æruginis æris & ʒij præcipitat. sublimat. tum turundam ex unguento diapompholygos asperam pulvere mumiz & sacchari si inlinuat, superius posito emplastro convenienti, vel stiptico *Collij*, & decocta lignorum cum herbis acrimon. scabios. nummular. centaure. aliisque vulnerariis ad tempus aliquod propinat, ut latex acrior corrigatur, & nimia ejus quantitas sudore eliminetur.

Fissuris.

*Fissurarum Ani* curationem aggreditur vel cutem sicciorem & rigidiorē emolliendo & humectando, fotu instituto ex decocto malv. alr. branc. ursin. sem. lin. flor. lilior. deinde unguento vel emplastro parato ex terebinth. cerâ, bolo Armen. & ol. oliv. icybala etiam majora & duriora emollienda sunt clysteribus ex lacte vel decocto lenitivo, additis mucilag. sem. ptyll. & oleo liliorum. Particulas autem salinas acres temperat, & ulcicula inde producta lenit & consolidat mucilagine tragacanth. sem. cydon. unguento de lithargyro, de Thut. pomato, non omisiss fortioribus absorbentibus pulveris formâ inspersis ex cerullâ, lap. calam. C. C. nifo, sarco. coll. ubi laticis acrioris major adjuerit copia.

Condylomatibus.

Ad *Condylomata Ani* absumenda etiam interphoreticiæ ʒatis, & simul externa absumentia.

Uu 3

pul-



pulveres videl. inspersos ex radice scrophular. myrrha, thure, albo græco, cancris & coriis calceorum combustis, vel linimentum ex albo Græco in V. dissoluto; extantiora verò filo vult liganda, vel forcipe, aut scalpello abscindenda, adperso mox post incisionem pulvere adstringente ex mastiche lap. hæmatite pp. litharg. & cerulla.

*Atrius.*

*Atriorum* curationem difficilem esse pronunciat, nec semper imitabilem, si verò locum invenire videatur, eodem modo operationem instituendam annuit, quo superiores eam peragendam esse declarant.

*Sylvi mo-  
di curationis  
Ani Pro-  
lapsi.*

§. 17. *Sylvi* in curatione *Prolapsi Ani* intentus est, ut fæces duræ, propter quas vehementiori ventris compressione in difficiliore earum expulsiōe Anus simul fuit dilapsus reddantur fluidiora, vel potulentis copiosis & jusculis pinguibus assumtis vel salibus volatilibus, & interduo acidis blandioribus facies compactas dissolventibus, tum injectis enematis ex jusculis, utrinâ lacte dilici, aut decoctis emollientibus, addito oleo, butyro, melle, & similibus; ventrem etiam inferiorem unguentis emollientibus illicere proficuum censet, althææ scilicet, aut martiato, ut & hac ratione fecum alvinarum promoveatur expulsio, qua obteata, sic; remotis obstaculis, ipsius podicis vel spontaneum subsecuturum esse sperat regressum, vel facili saltem opera digito aut linteo duplicato eundem repelli posse, & adpersio pulvere leviter adstringente ex thure, mastiche, galis. cupulis glandium, fol. verbasci, aut lesione super altherm quercinum recenter detruncatum, & aliquantulum calefactum, in situ decenti tamdiu detineri, donec corroboratus ulterius non delabatur.

*Fistulam.*

In *Fistula Ani* callum adimendum esse jubet cauterio convenienti, sive sit ferrum candens, sive aliud remedium consumens, ex sale potillimum lixivioso constans, quo facilius stylo profunditas eius indagari possit, & tum cuniculos discindendos. & acidum acriter temperandum interne sudoriferis, & diaphoretico, oculiscancrorum, decocto ligni salisfræ, guajaci, juniperi, herbarum fumar. scabiosæ aliarumque salibus volatilibus oleosis constantium, externe balsamo de Capiba, oleo terebinthinæ, ejusque balsamo, vel balsamo sulphuris terebinthinato, quo & ipsa hæc ulcera fistulosa omnium optime mundari & consolidari posse promittit.

*Fistulas.*

In *Fistulis Ani* ipsum etiam acidum temperandum esse judicat, vel clysteribus ex mucilaginosissimis paratis, vel oleis aliisque linimentis pinguibus ex sevo hircino potissimum confectis, si verò cutis simul existat scicior, ut in quacunque facum expulsiōe diffiliat, emollientia adhibet in alvi procidentia jam indigitata.

*Condylomata.*

*Condylomata* etiam *Ani*, præter luis Venereæ adhibitam curationem auferri posse docet medicamentis mercurialibus acrioribus ipsa consummentibus, aliisque spiritibus acidis, vitrioli, sulphuris, si una eorum guttâ toties, sed semel tantum in die, tangerentur, donec corrolâ sint & siccata decidant, quod etiam paxitari posse censet remedio, quod paratur ex aquæ plantaginis & rosarum aa. ʒij. cum aluminis cudi & ʒii sublimati aa. ʒij. nullis, in vitro decoctis, & post subsidentiam effusis, quod linteo parti affectæ est applicandum.

*Imperforationem.*

*Imperforationis* curationem instituendam esse

innuit, vel remotiōe membranæ aut carunculae meatum obducantis, instrumento acuto pungente & scindente, per Chirurpum, si fieri possit, ut contentis excrementis reddatur exitus, prohibendo simul infectis bacillis oleis aut unguentis obductus, ne denuo concreseat.

§. 18. *Cartesiani* suadent, ut *Ani Prolapsus* Cartesiano-  
quantocyus in situm pristinum reponatur, & *no-  
rum ra-  
tio curationis  
Ani  
Prolap-  
sum.*  
ut repulsiō hæc facilius obtineatur, portionem prominentem sequenti inungunt linimento.

*Ol. commun. ʒij.*

*Pulv. gallar.*

*Cori. granat. aa. ʒij.*

*M.*

Post inunctionem digitis linimento adhuc madidis anum intrudunt, & linteo aut candela, quantum satis est, repellunt. Refrigeratum prius fovent linteis lacte calido imbutis, & retrum in situ confirmare student sicut et nervinis & adstringentibus parato, foliis saliv. beton. absinth. matrisylv. flor. chamomill. Rœm. & commun. balauft. hyperic. melilot. in vino rubro & aqua chalybeata aut extinctionis ferri fabror. coctis. additâ colaturâ paucula quantitate sacchari ʒi. A quibusdam laudatur albumen ovorum cum alumine pulverisato agitatum. Interius restitutum jam anum illiunt melle rosaceo, & ad præcedendum ulceris emprolapium vinculum imponunt, cui subjiciunt lintea vel spongias comprimentes vel vino rubro, vel decocto alicui convenienti intinctas, æquoque fortiorem in excludendis fæcibus interdiciunt compressionem, & contra eodem mandant, ut in exoneranda alvo digitis podicem retineat, & ab adstringentibus simul & nimiam relaxantibus in totum abstinat.

*Fistulas Ani* curaturi interna sanguinem de-  
*Fistulas.*

purantia, & succos corrodescentes edulcorantia & corrigentia præmittunt, ut liquores quicumque ad partem hanc affectam depluentes non nisi particulis consent blandis. porosis & angularium motui destructivo resistentibus, & ad quietem nimis proclives ad motum excitantibus, si mulque viciosas per sudorem eliminantibus, quibus prædita celebrant decoctâ ligni Guajaci. Salisfræ, rad. Chin. S. ræparigl. scabios. herb. scord. absinth. Card. bened. centaur. heder. terrestr. chelidon. maj. verop. aliarumque vulnerariarum, non modo humores superfluos absummentium & siccantium, sed tumorem etiam auferentium & partem corroborantium, qualia etiam remedia externe parti huic fistulose admoveere solent, & vel decocto valuerunt per syringam ex radicibus gentianæ, valerianæ, chelidonii majoris, aut convenienti lixivio. Calum fortius adhærentem dissolvunt & erodunt ʒio ʒto. phlegmate Oli. O. nisto, O. locæruleo, aqua forti. mercuriali, unguento fulco *Wartzi* vel *Ægyptiaco*, humidis fistulam eluendo, & linteis aut carbasis iisdem imbutis fistulæ intus, unguenta & mel Chelidonis coquendo, inipsâ sub forma turundæ pulveribus corrodentibus adperit eadem insinuant. Cuniculos multiplices scalpello discindunt, ut fundus earum manifestetur, & callum remediis antedictis non superabilem ferro candente absumunt, fovendo postmodum anum cataplasmatibus ex icordio, Phellandry, seni cicutaria palutris, angustifolia, sabina, ruta, solidagine Sarracenicâ, & ulcus ipsum mundant sequenti austura.

*Æ. Succ.*

℞. Succ. Chelidon. maj.  
Scrophular.  
Apii, aa. ʒiij.  
Vini ʒiſſ.  
Aloëi ʒij.

M.

Fistulam bene mundatam carne laudabili opplere student, inflillatis, aut turundis ex carbalo intrudendis prius inunctis balsamo de Capaiba, Peruviano, oleo trifolii odorati, unguento aureo, basilico, & superimposito emplastro diachylon, vel diapalmæ, vel de gratia Dei, quibus ipsam etiam consolidationem, & novæ cutis inductionem perficiunt, vel si non sufficiant, adperso pulvere ex calce lora, thutia & terra Oli dulci emplastrum Oppoteldoch F. VVutzi ad perfectam ulque sanationem imponunt.

Effusus.

*Fissuras Ani* ut rite curent, ipsas causas advertunt, & vel particulas acutas corroderentes & scindentes hebetant spiritui vini camphorato, aqua ʒ. oleo myrrhæ, quibus fissuras istas abluunt, & unguento albo camphorato illinunt; vel stercore duriora emolliunt lenientibus, pinguibus & mucilaginosi tum per os assumtis, tum clysteris aliorumque topicorum forma adhibitis, laudaturque jusculum tepidum, vel butyro vel oleo olivarum aut amygdalarum dulcium pinguescitur, addita ʒi. vel altera cremoris & granis aliquot ʒis volat. ʒi, hinc fistulas illinunt vel mucilaginis ex sem. cydon, ptyllii, gum. Arab. tragacanthæ, admista pauca quantitate ʒis ʒi, vel oleo ceræ recenti, qua feliciter sape perlanantur.

Condylomata.

*Condylomata Ani* eradicare student remediis acutis erodentibus & destruentibus, butyro ʒi, oleo Oli. ʒi per campanam parato, quibus excrescentias istas quotidie attingunt, donec exsiccatæ decendant. Extantiores autem filo vel pilo equino ligare solent quotidie fortius constricto, ut hac ratione succo nutriti denegetur transitus, & tubercula alimento privata similiter decendant, quo impetrato succos emanantes accescere prohibent pulveribus inspersis ex Thutia, ceruſſa, lithargyro, bolo, & rugine uſto, calce lora & similibus, à quibus & cicatrix pro voto simul emergit.

Clauseram.

In *Clausera Ani* membranam meatum operientem vel unguibus digitorum discerpunt, vel promptius cultello discindunt & meatum aperiunt, inserto postmodum canali plumbeo unguento diapompholygos, aut de lithargyro obducto, ut cicatrix eo citius accrescat, & meatus iste conservetur. In Conniventia frequentius canales aliosque bacillos oleo obductos, vel pessos ex sevo hircino & cera confectos, & oleo raparum obductos podici intrudunt, ut frequentiori ista intrusione & educatione meatus dilatetur. Quando verò podex omnimodò in utero concrevit, curationem impossibilem esse admovent.

Nostra curam in Ani Proidentia.

§. 19. *Nostra* iudicio ad ipsam *Ani Proidentiam* rite curandam totius rei cardo in eo vertitur, ut Anus reponatur & repositus firmetur. Reponitur autem optime manus ope, quando indice digito, vel melius linteo in lacte cocto restituitur, quo facto æger diu supra ventrem quietus jaceat, ut ita melius firmetur anus, ad quem scopum facilius obtinendum ille illini potest oleo scarabæorum vel hyperici, superinsperso pulvere gallarum, vel nostro adstringente uliali;

plures sequenti modo feliciter curavimus; si dolores scil. multum urgeant, vel faeces induratae sint, focus instituendus sequens vel similis.

℞. Flor. Verbasci,  
Chamomill, aa. Mij.

Cog. in lacte, & applica, tum sequentem insperge pulverem.

℞. Fol. Verbasci. q. ſ. indantur crucibulo cooperto alio, & sic concrementur, deinde in pulverem vertantur subtilissimum.

Postmodum æger insideat asseri ex ligno quercus parato, cui inspergatur pulvis subtilissimus ex mastiche, olibano & asphalto paratus, & si simul alvus est obstructa & stercorea sunt dura. præter enementa quotidie detur internè ol. amygd. dulc. ʒi. cum cremor. ʒi ʒi. à quo remedio alvus semper servatur aperta. Vel luffumgium instituat ex gumm. asphalt. oliban. mastic. vel pulv. alb. græc. & scarabæorum asseri quercino inspergatur & ano excipiat. Decoct. agrim. verbasci, cum lact. coct. & appl.

Nostra quoque experientia impedit crebriorem ani prolaptum oleum apum externè illitum, postquam anus extrusus sevo cervino calido fuit illitus & blandè intrusus. Oleum momordici externè applicatum c. linteo est summum & raro fallax remedium.

Ubi malum ab affectu convulsivo aut paralytico fuerit productum, varii focus externi instituantur ex floribus archos, Chamomill. stæchad. Arab. foliis saly. balauftiis in vino chalybeato coctis, in quem finem quoque varii suffitus institui possunt ex succino, mastiche, thure, myrrha, asphalt. fol. rorismarini, flor. rosar. rub. stæchadis Arabicæ. conveniunt thermæ quibus Principiâ quadam feliciter curata est aliis remediis frustra tentatis.

Ex Hæmorrhoidibus affectu hoc prognato, inungatur anus oleo scarabæorum, quod paratur, dum scarabæi in oleo mastiche bullierunt; si verò productus fuerit ex teneſmo, conducet oleum mastiche, in quo flores verbasci fuerint cocti.

Alii quidem dorso & lumbis applicant emplastra, at non video, quomodo hac operemur, & intestinum rectum in sede debita firmare possint. Sequenti linimento euporisto plures curatos novimus.

℞. Unguent. de linar. ʒij.

Camphor. gr. iij.

Lap. calamina.

Lithargyr. aa. ʒj.

Sacchar. ʒi ʒſſ.

Cum ol. rosar. q. ſ. f. Unguentum ano scil. illinendum.

In cura *Fistule* eo incumbendum, ut acre corrosivum circa anum imperium sibi rapiens corrigatur & emendetur. In levi exulceratione ani conducunt inunctiones ex oleo rosar. & lumbicorum probe in mortario plumbeo agitatis, & in linimenti consistentiam redactis item suppositoria ex sevo cervino vel hircino, cum pulvere alcoliato thuris, thutia, & c. parari possunt, vel illinantur exulcerationes unguento de ceruſſa, camphora, vel diapompholygos, unà cum pauca quantitate terræ Oli dulcis rite paratæ, quocumque modo vel per se, vel linteis applicatis ano intrusis. Quo melius verò ad fundum ulceris perveniatur, cultello instituenda est incitio,

exhibeantur acidum absorbentia, & circulationem quorumvis humorum promoventia, inter quæ palmam aliis præcipiunt oculi ☉, Gum diaphoret. Antihect. Poter. Minia. Sperma ceti, lapis Irlandicus, & scissilis noster. Nec omitterenda sunt diaphoretica, quæ sanguinis grumos evasacos dissolvunt, & circulationem humorum promovent, sequenti ergo utatur mixtura cochlearum.

℞. *Card. bened.*  
*Maria,*  
*Feniculi,*  
*Veronica,* aa. ʒij.  
*Lap. ☉.* pp. ʒj.  
*ʒi diaphoret.* ʒss.  
*Syrup. heder. terrestr.* ʒij.

*M.*

Detur quoque sæpius dosis sequentis pulveris, à quo sudor expectandus.

℞. *Ocul. ☉.* pp. ʒj.  
*Lap. Irlandici.* ʒss.  
*M. F. Pulvis.*

Vel:

℞. *Sperm. ceti.* ʒss.

*d.*

Elapsis aliquot diebus, iterum diaphoreticum exhibendum:

℞. *Corall. rub.* pp. gr. xv.  
*Unicorn. ver.* gr. xj.  
*ʒi diaphoret.* gr. xij.

*M. F. Pulvis*, qui detur cum aqua veronicæ. Diuretica blandiora singulare quoque hic præstabunt juvamen. Si verò in amplo abdominis vulnere intestinum fuerit prolapsum, hoc prope diem est reponendum, aliàs enim flatibus ita distenditur, ut in pristinum locum reponi minime possit, hinc pori intestinorum à frigore occlusi iterum aperiendi sunt, & liquoribus in tus contentis major conciliandus est motus & circulatio promoventia, imò ipsa intestina lacte calido, in quo flores camomill. cocti, fovenda sunt; calide ergo imponatur linum neno recenter contortum, nondum verò coctum, vel ipsum linum exsiccatum, & in lacte dulci coctum. Intestina dein flatibus jam consumptis reponi debent, si id fieri non potest, vulnus magis amplum reddatur, si verò fuerint reposita, vulnus aliqua ex parte consueatur, si opus sit, turundæ ergo alibi sæpius jam dicto digestivo inunctæ vulneri imponantur, ac superimponatur emplastrum idoneum stipticum, vel nostrum polychrestum, superimpositis sacculis calidis.

Si vulnus Abdominis non penetrans sit in lineæ rectæ alba sic dictæ, tunc & varia balsamica dicta imponantur turundæ, & tractetur hoc vulnus, uti parvis membranofa.

Cum verò omentum prolapsum, & ob moram aliquam jam fuerit corruptum, quoniam, ceu superius diximus, facile sphacelatur, tunc inter partem sanam & corruptam filum intericiendum est, & portio corrupta abscidenda, ne pars sincera trahatur, & consuto aliquatenus vulnere, filum tamen extra abdomen pendulum relinquendum, donec decideat;

Si intestina fuerint læsa, & quidem tenuia, tunc res est in angusto, sed omnia tentanda sunt, vulnus intestini consueatur, si fieri potest, & apponantur balsamica vulneraria, vel talis pulvi

inspergetur, qui paratur ex myrrh. aloë, bol. Armen. camphor. saccharo ʒi p. æq. vel foveatur sequenti vel simili spiritu cum spongia.

℞. *Spir. vin. comm.* ʒij.

▽ *Tramat.* ʒiʒ.

*Aloes,*

*Camph.*

*Myrrh.* aa. ʒj.

▽ *Regin. Hung.* ʒj.

*Sacch.* ʒi ʒss.

*M.*

Hic & conducunt omnia ea, quæ superius de Vulneribus Abdominis agentes exhibuimus.

Si patiens in sinistro latere fuerit læsus, ipse in dextrum se conferat, & si intestina à flatibus fuerint nimis distenta, ut vix intrudi possint, & poruli nimis sint obstructi, sequens conducet ad resolvendum.

℞. *Flor. chamomill.*

*Melilot.* aa. Mj.

*Sem. anis.*

*Fenic.*

*Cumin.* aa. ʒiʒ.

*Caryophyll.*

*Macis* aa ʒss.

*Coq. in lact.* add.

~ *vin. camphorat.*

*Aq. iheriac.* aa. ʒij.

*Sacch.* ʒi ʒij.

*Ol. anis.* ʒij.

*M. F. Epithema*, loco vulnerato & intestinis protrusis tepide applicandum.

Si vulnus abdominis fuerit nimis amplum, consui possunt labia vulneris cum peritonæi vas. Si omentum fuerit prolapsum, id statim pristino loco reponendum, & si jam fuerit frigidum, sequens adhibeatur remedium cum spongia applicandum.

℞. ~ *marrical.* ʒijj.

*Aq. menth.*

*Regin. Hung.*

*Physagon.* aa. ʒj.

*Camphor.* ʒijj.

*M.*

Si omentum verò jam nigrum fuerit & putridum, nilo illud ligandum est, & abscidendum, at filum non abscindatur, sed ex corpore dependeat, usque fiat separatio. Omento intruso, vulnus consui potest, relicto parvo foramine, ad materiam effluxum, & filum repetendum. Si æger non habeat alvum laxam, enemadandum non est, quia intestinum facile ob confusionem factam rumpi potest, sed sufficit suppositorium, vel decoctum palisatum.

Interim circa vulnera hæc semper respiciendum est ad symptomata, facile enim fieri potest, ut partes internæ contusæ fuerint, hinc facili Marte febris oboriri potest, cui si haud congruis remediis occurratur, gangrena & certa mors sequeretur, quare statim ad sudoriferas mixturas, & decocta tanquam ad sacram anchoram confugiendum est. Ad crassiem succorum incidendam, & partem corroborandam, conducet cataplasma ex ruta, summit. absinth. saly. bacc. laur. Junip. sem. cummin. fenic. flor. chamomill. melilot. myrrh. pulv. rad. bryon. &c. & in vino coctis, addita facin. fabar. q. s. ad consisten. tiam cataplasmatum, & dein imponatur emplastrum de cumino cum camphora, vulnera enim harum partium tractanda sunt cum cautio-

tionē.

## CAP. II. DE ABDOM. & INTEST. VULN. & HERR. 333

tione, & semper ad internam inflammationem & febrem respiciendum, hinc singulis quatuor horis, uti in peste solet, dentur duo cochlearia mixturæ frequentis vel similis sudoriferæ.

℞. *Aq. Scord.*

*Menth.* aa. ʒiʒ.

*Regin. Hung.* ʒʒ.

*Discord. Sylv. f. op.* ʒʒ.

*Ocul.* ʒʒ pp. ʒj.

*Bezoar.* min. ʒʒ.

*Camphoræ* gr. iiʒ.

*Sacch. Fi* gr. v.

*Ol. Sassafr.* ʒʒ.

*Syr. cinamom.* ʒvʒ.

*M. d. ad vitrum.*

Pro potu ordinario F. Decoctum ex rad. Scorzoneri, Chin. herb. veron. card. bened. & fœnic. in ʒ. commun. & vino coctis, adjecta lap. prunell. ʒʒ. quod semper calidè bibatur, vel instilletur vino, vel potui ordinario sequens.

℞. *Elix. vit.* ʒij.

*Propr. Parac. absque acido.*

℞. *nostr. ceph. oleof.* aa. ʒj.

*Ol. Sassafr.*

*Menth.* aa. ʒʒ.

*M.*

Ad consolidandum, & ulcerationem impediendam sequens vel simile conveniet decoctum.

℞. *Rad. Gentian.*

*Bardan.* aa. ʒiʒ.

*Chinæ,*

*Salsaparill.* aa. ʒj.

*Corr. Guaiac.* ʒvʒ.

*Herb. Scord.* Mij.

*Sis Qi* ʒʒ.

*F. Decoctio in vino.*

Hujusmodi potus continuandus est usque ad plenam restitutionem ægri.

Intestina verò prolapsa si gangrænosa fiant, & scæces exeant, consilue haud licet, sed adhibitis decenter medicamentis motum humorum promoventibus, calidioribus nempe, ut aqua ʒx, cum ʒ. vin. tamphorat. consolidatio illorum sponte sublequetur. Sicin quodam viro Francothalensi tempore pestis anno 1666. hernia intestinali laborante, tumoreque hoc indies majorem ruborem concipiente, tandem gangræna correpto, remediis applicatis aperto, cum scæces intolerabili cum fœtore emanarent, remedia superius dicta adhibita fuere, post mundificationem sic dictam caro succrevit rubra, & consolidatio facta fuit. Æger adhuc sanus vivit. sed cibis copiosius ingestis, eo loci tenuis transsudare videtur lymphæ. Simile quid, sinistro tamen cum eventu, contigit in virgine 20. annorum, quæ diu in inguine tumorem sentit, qui major factus & apertus pus non laudabile exhibuit, unde humor effluens acrimoniâ suâ intestinum ileon, quod in dissectione cadaveris apparebat, corrodo, partibus illis gangrænam inducere cepit, successit febris lenta, & tandem hæctica, quæ etiam paucorum dierum spatio fuit extincta.

In cura *Hernia* intestinalis eò incumbendum, ut reponantur intestina prolapsa in situm debitum, dein repositis intestinis peritonæum firmetur & consolidetur, ne ulterior intestinis concedatur prolapsus. Ut ergo reponantur intestina prolapsa, conveniente situ ægro resupinato, crutibus & natibus ejus nomihil elevatis adjuvanda sunt, & impedimenta, flatus, stercora, &

alii humores stagnantes removenda sunt, & cùm intestina tenuia tantum probabantur, hinc stagnatio humorum illa circulantium, & ab hac tensio membranarum & spasinodes intestinorum affectus duritiem repræsentantes oriuntur, quæ blandis ac aromaticis fomentis externis resolvenda, & si flatus simul urgent, uti semper fit in hernia intestinali, mixtura quædam carminativa propinanda; exempli gratia:

℞. ʒ. *flor. Chamomill.* ʒij.

*Carminat.* ʒj.

*Essent. carmin.* ʒʒ.

*Flor. Chamomill.* ʒj.

℞. ʒ. *anifat.* ʒʒ.

*Syr. Corr. aurant.* ʒij.

*M. d. ad Vitrum.*

Alvus servetur laxa, vel suppositoriis, vel clysteribus, qui tamen ab initio non semper adhibendi sunt, sed si confirmatus fuerit prolapsus, & symptomata gravia ægrum torqueant. Fotus quoque varii humidi sicque imponantur parti affectæ, & præ aliis convenit linum nendo recentortum in lacte dulci coctum, & calidè applicatum, stercus ovillum dulci lacti incoctum, & applicatum, non continendum usûs erit remedium. Omnia ergo emollientia, blandè discutientia & anodyna, vulgò ita dicta, conveniunt: contra frigida repellentia & adstringentia in prolapsu intestinorum, atro notamus carbone, utpote, quibus remediis ægri ad cymbam sæpe Charontis deducuntur.

Homines provectæ ætatis à tali morbo nunquam, nisi sectione curantur, quæ etiam ipsis sæpe est fatalis. Varia tamen emplastræ regionibus, & inguini applicantur, inter quæ emplastrum *Magneucum Hoffmanni* à nonnullis celebratur, ipseque Autor opere de methodo mendi p. 416. talia profert: In delapso intestinorum in inguina, vel scrotum, arthricioli & perita Chirurgi manus primùm requiritur, quæ intestina in pristinum reducat locum, id quod fit, dum æger ductus crutibus supinus collocatur, & capiti declivior, coxæ vero superior datur locus. Dein fæces induræ emolliendæ, & si summo cum dolore magna quoque vel inguinis, vel scroti, vel utriusque durities conjuncta fuerit, scrotum & inguen decocto rad. alth. sem. lini, flor. melior. aut erit fovendum, ut ita facilius intestina tractentur. Hæc omnia compendiosè supplet emplastrum meum magneti-cum, licet & ipsa iliaca passio unâ adfit, propriâ experientiâ à me deprehensum, inque pluribus diversæ ætatis, constitutionis & sexus, subiectis, eodem etiam malo plures per vices ad desperationem usque aliorum recurrente, multoties non sine fructu probatum, quod satis dilaudare nequeo, lumbis applicatum tormina juxta sopiendo ventris atrocissima, intortia, dislocata & incarcerationa in scroto intestina, quamprimùm incaluerit, in pristinam transfert abdominis sedem, ipsis etiam ægrôtis, non quidem sine molestia, vim ejus attractivam animadvertentibus. Emplastrum est sequens.

℞. *Gummi. de sagapan.*

*Ammoniac.*

*Galban.* aa. ʒij.

*Terebinth.*

*Cera Virgin.* aa. ʒv.

*Magnet. arsen.* ʒj. gr. xv.

*Rad. ari* ʒj.

Tt 3

Gum-

Cura  
Hernia.



*Gummata dissolvantur in ʒ. q. f. & colla in formam emplastri, additis reliquis speciebus, extendantur super alutam.*

Sed ut fatear quod verum est, sæpius id applicari jussi herniosis meis, qui nullum exinde habuerunt levamen, nec scio, quã vim attractoria suum edere possit effectum. Alii absque commodo & effectu ob vim attractoriam pinguedinem leporinam, vel ursinam dorso illitam commendant.

Ne verò Herniæ aperiantur, uti imperiti Chirurgi hernias sæpe pro bubonibus habent, & illas aperiunt, quarum herniarum incautè aperturam exempla videantur apud Rhod. Obs. M. cent. 2. c. 72. Hochstetter. Dec. 10. & imprimis apud Cl. van der Vliet Obs. rarior. cent. 1. Obs. 54. sicuti & hic Casselli hujusmodi casus infelix non ita pridem contigit, dum Chirurgus quidam falso deceptus præjudicio de abscessu inguinali, lancettâ tumorem tam profunde aperuit, ut ipsum intestinum percuteret, quo factò cibus potusque, & alia ingesta per foramen effluerunt, ægerque obitu suo postridie curam absolvit. In his ergo cautè mercari dicat Chirurgus.

Ut verò repositis intestinis peritonæum iterum conglutinetur, & laceratum consolidetur, tum externa, tum interna plura ab Auctoribus narrantur remedia, inter quæ ferè non unicuique veræ fidei respondet, quamvis Hartmannus nimis deprædicet laudibus ballamum suum salis gemmæ, & plura ejusmodi remedia possunt peti ex jam dictis, reliqua verò videri apud Cl. Etmüllerum p. m. 155. quorum præcipua sunt sequentia.

ʒ. Gummi. Carann.

Sem. nasturt. aa. q. f.

Preparentur cum album. ov. q. f. & imponantur.

Emplastrum ex pice navali, resina & laceribus coctis pulverisatis inter se mixtis paratum, item Emplastrum diaphysphuris Rulandi, oleum laceratum, &c. Hernias quidem sanari posse, & imprimis in juvenili ætate, non dubitamus, sed in adultioribus non nisi sectione ab experto Herniotomo institutâ. In juvenibus ergo bonam fasciam, cujus optimam vidimus formulam, cingulum nempe, sive subligaculum abdomini circumligandum, & ex linteo confectum, cui adjunctum est pulvinar ex gossypio, aliquantum durum, & trochleâ scroto affigendum, ne intestinum repositum ulterius prolabatur, emplastro carminante Sylvii absque ✕ parato, & super corium extenso hernicæ prius imposito; & quies hisce juvenibus maxime imperanda est, quæ herniarum panacea est. Remedia interna in hunc finem data peritonæum conglutinare possemus, minimè videntur, sed ejusmodi remedia ex falsa præconcepta opinione per fallacem experientiam sunt excogitata, proinde credulos inani spe lactant, & sperato successu sæpius destituunt.

Sectione ergo adultioribus suadenda, si velint sanari, quæ sequenti modo instituitur: Aegro tabulæ imposito in superiori scroti parte fiat incisio, studiosè tamen hæc instituenda, ne lædatur intestina, tum canalís argenteus pennæ aserinae crassitiem habens, & una parte concavus, altera verò convexus, aperturæ insinuetur, secundum ductum peritonæi dilatati, ut juxta cavitatem ca-

nalis absq; ulla intestinorum læsione aperta ita ila ampliari possit, donec intestina per illam commodè repellantur, quibus restitutus peritonæum profunde satis prehensum connectitur, ne intestina denudò prolabantur, & apertura filo consuitur. Quando verò ob excrementorum inductionem & intestinorum intumesceniam, aliudve quoddam obstaculum intestina per meatum angustiores repelli, & sic debito loco restitui nequeant, canali antedicto, peritonæum dilatatum in altum tollatur, & juxta cavitatem canalís abdomen versus cultello in tantum dilatetur, ut intestina apè restituantur, quo factò vulnus consuitur, & processu ad viam angustandam adeo convenienter consolidetur.

Absque sectione sola punctura nonnulli morbum hunc tollere, & intestinorum prolapsum prohibere tentant, dum superiorem scroti regionem acule longa perforantes, acum hanc per processum adigunt peritonæi, filoque acui inserto per scrotum ligato processum illum ita claudere allaborant, ut nihilominus vasa seminaria cum teste ipso salvo libera permaneant, & æger feliciter sanetur.

Alia verò ab hac est Punctura aurea ita dicta, quod filo aureo processum peritonæi, aut potius meatum iste nimium dilatatus connectatur, & una cum sectione sequenti ratione peragitur. Factâ aperturâ super osse pubis, stylo ferreo infra processum istum adacto ipse processus attolitur, deinde vasa spermatica & musculi cremasteres inquirenda sunt & separanda, hinc processus peculiariter & partes etiam omnes separatæ foras protrahuntur, processus forcipe foraminato prehenditur, & per foramina ista forcipis acule quinque aut sex filis ducente, proximè vasa spermatica & musculorum cremasterem, una cum vulneris labiis secunda vice trahitur, tum fila ab utraque parte contrahuntur, & nodo firmissimo connectuntur, & nodus hic tamdiu propendere permittitur, donec sponte decidat. Sub peritonæo detecto filum aureum bis, vel plumbeum semel artificiosè trajicitur, & mediocriter contrahitur, ut vasis à contusione præservatis & illæsis, processus saltem angustetur, tum filum istud forcipulâ bisterte contorqueatur, & residuum studiosè abscinditur, ne partibus ulla exinde læsio obveniat, tandem ægro lecto imposito, capite decliviori, & pube elevata, ne intestina delabantur, vulnus communi more sanatur. Si enim quidpiam est, quod in curandis herniis summo opere conducit, illud sane apta & conveniens est fasciæ (vulgo ein Bruch-Band) quâ & quidem longæ linæo confecta herniæ insaustum præprimis recenties perfectissimè curari possunt, imprimis si aliquot dantaxat septimanarum quies & decubitus supinus accellerit & applicetur Emplastrum Carminativum Syl. vel nostrum ad rupturam.

Loco sectionis inter dum usurpatur cauterium indolens, dum repulsis intestinis, & testiculo, quantum fieri possit, ad os pubis diducto, hic atramento notatur, postmodum testiculo suu pristino & debito relicto, loco notato imponitur corrosivum, quod ad os ipsum penetrare permittitur, hinc elichara abactâ quantum sufficit de processu peritonæi absconditur, & foramen arte sanatur. Si verò testiculus ipse veniat abscondendus, scroto secundum longitudinem inciditur, per quam incisioem testiculî una cum parte

parte peritonæi dilatata eximuntur, & à scroto debite separantur, vasa sanguifera scroci, quam altè fieri potest, colligantur, & infra ligaturam absconduntur, funiculo usque sponte decidat extra scrotum prominente, quo facto ad consolidationem vulnus sedulo perducitur, ut foramen ita ritè claudatur. Omnibus hisce palnam eripere dicitur nova herniarum cura per arcanum Regis Galliarum (vulgo le secret du Roy) quo Operator Gallus plures restituisse dicitur quod remedium est. — Probe restituitur. qui pro ætatis ratione datur à gr. iij. ad ʒi. in vino rubro, & sumendum est hoc remedium per 21.

dies, applicetur simul fascia conveniens ac firma simplex sive duplex, cui effectum potius tribuo quam remedio interno. — cui salis, qui quidem in sua diuretica seruni superfluum è M. S. præcipitando sanguinem magis spissum efficere potest ut partes affectæ libere quæ liquore magis consistente nutritæ ac firmiores reddatæ se contrahere & in situm naturalem vindicare queant, sed meo iudicio nunquam curabitur hernia solo hoc spiritu exhibito, nisi simul fascia adhibetur, & sola est fascia unde auxilium expectari potest.

## CAPUT III.

## De Ani Procidencia, Fistula, Fissura, Mariscis, Condylomatibus &amp; Atritis.

## §. I.

**E**Xtremis Intestinatorum commodum præbet ostium eliminandis excrementis. quæ egestio cum maximè sit necessaria, ne diutius recentia graviora inferant mala, merito nunc morbos examinamus, qui partem hanc intestinorum ultimam infestando magnas quandoque argè decumbentibus procreant molestias. Ani ergo Procidencia nil aliud est, quam intestini recti prolapsus seu dilatio, quæ fit, quando sub excretionē fecum intestinum rectum multum prominet, & aliquando extorsum hæret, ut non facile possit retrahi, & in locum pristinum restitui.

Ani Procidencia.

**Fistula.** *Fistula Ani* est ulcus sinuosum in intestino recto, ejusdemque vicinis musculis.

**Fissura seu Rhagades.** *Fissuris* seu *Rhagadibus* etiam Anus divertatur, dum cutis ejus aridior existens, à particulis rigidioribus, & salis acidis diffunditur, & fibrarum ejus connexus molestè sejungitur, ut majores quandoque & profundiores in eo sulci suboriuntur.

**Mariscus.** *Mariscus* dicitur tumor natus in ano, ex stagnatione humorum ibidem circulantium. Dicitur etiam *Ficatio*, *Ficosis Tumor*, vel *Ficosa eminentia*.

**Thymus, Condyloma.** Huc refertur & *Thymus*, qui affectus tamen omnes sub nomine Condylomatum possint comprehendi. *Condyloma* autem est tumor, aliis carnis excrescentia callosa circa anum. Condylomata sunt aliquando citra inflammationem & mollia, quandoque verò cum inflammatione & dura dolorificaque. *Hæmorrhoides* quoque *cæcæ*, vel *Protuberantia venæ hæmorrhoidalis* vocantur, hinc condolendum est, quòd antiquitas adeò fuerit curiosa in fingendis nominibus, quibus medicinarum tantum obscuravit, magis enim fuit de vanorum verborum apparatu, quam de rebus ipsis sollicita.

Hæmorrhoides cæcæ.

**Atritis.** *Atritis* seu *Atræta* dicuntur imperforati in utroque sexu, quibus anus aut genitalia perforata non sunt, sive id ex constitutione à primo ortu, sive ex morbo acciderit, carne vel membrana supercrecente, & meatum obstruente.

**Pars afflicta.** §. 2. *Pars afflicta* horum affectuum est Anus, Culus, seu Podex. Intestinum enim rectum, ob rectum incesum ita dictum, in anum terminatur, qui est veluti mensura quedam, quæ illud, quod exterminari debuit, determinata mensurâ

foràs truditur. Hujus exterior pars musculo sphinctere donata, est pars valde rugosa. Habet autem Anus præter sphincterem adhuc duos musculos levatores, quibus excrementa excernuntur, & podex seu anus iterum clauditur. Triplici gaudet tunica, abs qua dependet motus iste vernicularis ad podicem usque, & ab hoc ejectio peragitur excrementorum, quæ in intestinis remorantur, ut foràs eliminentur. Glandulis quoque suis intestinum hoc gaudet minutissimis.

§. 3. *Ani Procidencia* ex relatione ægri facile *Diagnos.*

patet, quando enim ægri hialvum deponunt, facili hanc observant procidenciam, & sæpe coguntur manu, vel linteis calidis ipsam repouere & intrudere, magnamque sæpe percipiunt dolorem, imprimis, si intestinum fuerit inflammatum, & sterora ejicienda existant duriora.

Si *Fistula* sit oriunda, ab initio maximi à sunt dolores, & propter urentem materiam, antequam ipsi exitus conceditur, homines infantes quali reddidit, aperto abscessu materia ichorosa sæpe putrida, & cum sanguine mixta effluit, quæ cuniculos agit, & sic in fistulam abit sæpe dolorificam, unde ægri aliquando neque sedere, neque ambulare, ægreque cubare possunt. Ex fistula tali calculi excissi sunt, uti annotavit Cl. *Geisfrid. Schultzius* in *Eph. Germ. Ann. IX. & X. Obs. 185.*

*Fissura* sive *Rhagades* ani cognoscuntur ex visu & relatione ægri, qui tactu easdem dignovit, sunt enim rimæ quædam profundiores, interdum siccæ, interdum verò instar Ulcusculorum humiditatem quandam exsudantesque saniem, modò superficiaria, modò profunda, vel condylomatis junctæ, vel ab iisdem libere, interdum succi acres in iis collecti, vel liquor intestinalis in easdem depuens & stagnatione corruptus dolorem magnam & puritum excitant, quo ægri valde molestantur.

*Mariscos* seu *Condylomata* sæpissimè, & quasi semper hypochondriaci superveniunt, cum habeant humores spissos ad stagnationem faciles, qui cognoscuntur ex ani ardore, in exoneranda alvo dolore maximo & parturitibus non dissimili, excrementa sunt dura & instar scybalorum, tumores sunt plures, unus altero major, ad sunt insomnia, cum virium prostratione, ægri sunt mæsti, intercludit sæpe tumor talis mole sua exitum excretis illæ erupturis, impediendo rigide,

ne

ne descendat alvus, vel locum deponat vesica, statim & depositionem dolor vehemens insensetur.

*Atrius* seu *Imperforati* ex ano clauso & imperforato facile cognoscuntur; Tres oculorum dari species Practici contendunt, videlicet Angustiam seu Conniventiam intestini recti, ani Clausuram per membranam, & Coelitum, ob quem patientes propriè Atræ sive Imperforati dicuntur. Sed quid quæso prodest hæc divisio, annon secundum magis & minus, & pro causarum varietate sunt iidem affectus.

*Ætiologia morborum horum secundum Galenos.*

§. 4. *Ætiologia* morborum intestini huius recti sive *Ani Galenici* hoc modo peragunt, ut in *Ani Procidencia* acculent tum musculorum & nervorum huius partis imbecillitatem, resolutionem vel paralyfin, refrigerationem, abscessus, tum quancumque causam violentam, irritationem intestinorum vehementem in dysenteria aut tenesmo, conatum magnum in facibus egerendis institutum, lapsum ab alto in dorsum, unde vel nervorum, vel musculorum oriri solet resolutio, ut intestinum hoc ab iisdem ulteriùs haud destineatur.

*Fistularum* Ani causam sive originem referunt ad morbos alios, quos prægreulos & neglectos aut malè curatos fistulæ ipsæ insensuant, aut morbi isti in fistulas terminentur, ut sunt inflammatio, phymata, abscessus, hæmorrhoides, condylomata, fici, rhagades aliique partem hanc intestini recti exulcerantes.

*Fissuræ* sive *Rhagades* causis adscribunt quicquid unitatem partis huius dissolvere potest, confluxum nempe humorum acrium, distensionem cutis nimiam à condylomatibus, conatum magni in detrudendis & excernendis facibus duris aridisque in alvo diutius retentis, coitum præposterum & nefandum, ob quem pariter anus diffindatur.

*Mariscæ* sive *Condylomatæ* causas tribuunt sanguini crasso & lioso, in rugosa aut substantia diutius detento & coacervato, maxime verò fistulis præcedentibus, quibus caro fungosa & rugosa cristarum instar excrescat.

*Atrios* vel in ipso utero ab errore facultatis plasticæ ita progenerari dicunt, vel ab ulceribus ita reddi malè curatis, dum meatus iste in tantum concresecat, ut excernendis nullus, vel difficillimus concedatur transitus.

*Paracelsus.*

§. 5. *Paracelsus* nullam novam in *Ani Procidencia*, ab aliisque jam relatis differentem addere novit causam; in *Fistula* verò accusat sal excrementorum in ano emortuum, quod absque cutis perforatione extremum hoc intestinum profundius pervadat.

*Fissuræ* seu *Rhagades* ex hæmorrhoidibus oriri dicit, dum sal menstruosum se recipit ad locustas, & separationem quamvis salis scissi transire tantum in fissuras, ubi cum alio non fuerit commixtum.

*Condylomata* seu *Fici*, quos & *Verrucas* hæmorrhoidarum nominat, originem habere vult ex hæmorrhoidalibus sanguine: cum nutritivus humor separatus à sustantia sanguinis per porum suum emunctorialem penetret extra materiam propriam, sicque in talem transeat excrescentiam, quicquid enim à succo nutritivo separatur, in suæ substantiæ similitudinem transire refert, ac pro loci vitriolique salis ratione dividi in cancerum.

*Imperforati* in matrice ita generari asserit, ab inæqualitate seminis, & quod natura in liquore vitæ non sit perfecta & integra, maxime verò quod semen, ex quo exitus hic intestini elaborari debet, aut deficiat, aut abundet, unde superfluum in huiusmodi abeat additamentum, quod meatum istum occludat. Alià etiam ratione anum occludi aliquando observavit, dum nempe nonnullis ioco per styptica fuit compressa adeo, ut propter necessitatem excretionis opus fuerit aperiri terebris.

§. 6. *Helmontius* ipse Pylorus non parum ad *Ani Procidenciam* contribuere videtur, utpote cuius regimini cuncta intestina cum podice subiacent, qui vel à felle, vel ab alia quadam causa irritatus in subiecta ista furit, & è sedesua consueta decipiat.

*Fistulas* Ani à latice intestinali corrupto & accescente produci retur, necnon *Fissuræ*, & differentiam solum in diversitate salis consistere, qui in *Fistulis* nondum illum malignitatis gradum obtinet, juxta quem in *Fistulis* intestinum rectum profundius erodit, sinumque callosum ob cruorem intestinum producit.

*Condylomata* à nutritio succo ab acido corrupto, & propter contritiam cutem excrescere putat, *Atrios*que vel in utero ab errore formatricis, & defectu vel indispositione seminis generari, vel meatum ob ulcus aut fistulam callo obducit, aliamve excrescentiam ita angustari, ut excretorum transitus reddatur difficilis.

§. 7. *Willisus* in Recti intestini *Procidencia* *Willisium*, accusat relaxationem fibrarum musculosarum, interdum à purgantium violenta stimulatione & scybalorum duriorum propulsione inductam, nonnunquam verò ab ipso illo conatu in excernendis facibus majori intestinum hoc propelli, ob nimiam fibrarum distensionem, qua simul spiritus alligantur, ut fibræ nimium relaxatæ ulteriùs non contrahantur, nec intestinum hoc in suum debitum reducant.

*Fistularum* originem adscribit latice intestinali multis particulis salis erodentibus imbuto, & ob peculiarem quandam diathesin pravam extremum hoc intestinum profundius aliquando exulcerante.

*Fissuræ* Ani fieri asserit, dum vel cutis ani existit licior, & scybala majora, duriora & asperiora sunt, ut sic in transitu suo cutaneum illum contextum rigidiorum nimium extendendo divellant & findant, vel etiam particulae salinæ sectionem fibrarum inducant.

*Condylomata* ex particulis acidosis salinis ex massa sanguinea ad cutem ani delatis concrecere autumat, & *Atrios* veros in utero ita generari à defectu vel abundantia materie spermatice, & fermenti spirituosius plastici in parte hac elaboranda debilitate, aut aberratione.

§. 8. *Sylvius* inter causas *Ani Prolapsus* inducentes frequentissimam admittit vehementem ventris compressionem, ad faeces alvi duriores, exsiccatas & compactas propellendas frequentius institutam, per quam anus simul ita propellitur.

*Fistulas* & *Fissuræ* Ani ab acido acri in parte hac collecto originem sumere contendit, acriori quidem in *Fistulis*, mitiori in *Fistulis*, quas tamen à nimia extensione & siccitate cutis etiam produci posse concedit.

*Condylomata* oriri dicit à præpostero Veneris ulsa,

usa, & partis hujus actio confictu, live id contingat à personis lue Venerea correptis, live ab aliis sanis, cum non tam lucem ipsam Veneream sequantur, quam nimum & præposterum Venenis usum & abusum, quo cutis hæc rugolâ nimum conficitur.

*Imperforationem Ani* in utroque sexu vitium ait esse conatum, uti imperforationem vaginæ uteri in sexu femineo.

*Cartesiani*  
*not.*

§. 9. *Cartesiani* inter causas *Ani Procidentie* recensent frequentiorum alvi evacuationem, in qua per sæpius repetitam pressionem intestinum propellatur, excrementa duriora, hæmorrhoides cæcæ intumescencia sua meatum intestini hujus recti angustantes, sicque vehementiorem excrementorum expulsionem inducentes, calculum in velica intestinum comprimentem, conatum validum in partu difficili, vel etiam in ipso calculo excludendo, fibrarum intestini relaxationem, ob quam faciliè elabatur, nec in situ debite retinetur.

*Fistula Ani* causam statuunt particulas angulares succorum & vasculis ab ulceribus, tumoribus nimum tendentibus aut violenta commotione & agitatione partis hujus diffractis, intra mûculos anni effusorum, & temporis tractu acescentium, quocumque pertingentes obstructionem tubulorum lateraliûm & duritiem circa eosdem callasum inducentes, intra quam vel cuniculorum, vel speluncarum instar cavitas quedam remaneat.

*Fissura Ani* ab angularibus particulis liquoris intestinalis, vel hæmorrhoidalis acescentis produci existimant, à quibus cutis intestini recti diffringitur, nec non à stercorebus majoribus, durioribus & siccioribus, cutem in eorum exclusionem innum distendentes, ut inde faciliè rumpatur & diffindatur.

*Concylomatâ, Ficus, live Mariscus* enalci didunt, dum à magnitudine acutis erosa cutis foraminatur, ex qua carnea quedam exurgens substantia pro diversitate suæ figuræ hæc repræsentat excrecentias.

*Ani Clausuram* fieri docent, dum vel membrana accrevit foramen obducens & exitum prohibens excernendis, vel cavitas intestini recti nimum angusta est & conivert, vel in totum nulla in utero est elaborata.

*Nostrium*  
*judicium*  
*de causa*  
*Ani Pro-*  
*cidentie.*

§. 10. *Nostro judicio* causa *Prolapsus Ani* ut plurimum est violenta & imia dilatatio & extrusio intestini recti, dein & mûculi plus minus relaxati deficiens retractio, à spirituum animalium circulationis defectu; sic & ubi vasa omnia & nervi sunt nimis à serolis humoribus relaxati; sic in pueris serolis humoribus repletis ejusmodi procidentie pluries observamus. Sic quoque à magno nisu & conatu affectus hic, oritur, cum videmus in pueris vociferantibus, in calculo vesicæ, in parturientibus, in alvo sicca, nec non à crebriori excretionis conatu in teneismo extenduntur ac relaxantur mûculorum levatorum fibræ, omnes etiam humores ibidem stagnantes & fibras irritantes faciliè hunc affectum producere possunt, idemque præstant omnia actia, tum venena, tum purgantia, quæ fibras continuo lacerando & irritando continuum fere elapsum procurant, sæpe enim à supposito acri & enemate nimum frequenter applicato procidentiam notavi. Sic & hæmorrhoides dolentes & nimis fluentes ad hunc disponunt morbum; Procidentia Ani hæc & accedit ali-

quando vitio fibrillarû, mûsculorum & nervorû & in ipsis contentorum succorum, nonnunquam à percussione & casu ab alto supra os sacrum, hunc affectum productum fuisse, notantur Auctores. Diarrhæa longius protracta intestini recti, ac mûsculorum fibras relaxando similem procidentiam inferre valent: quicquid verò herniam, procidentiam uteri, oculi &c. producere solet, & hanc ani procidentiam procurare potest.

Causa *Fistule Ani* est acre quoddam cortosum, à stagnatione humorum & impedita eorum circulatione productum, imprimis circa venas sedales collectum, unde humorum circulantium particule multæ acidiores in carneum vicium transudant per partes magis distensas, & sic simul fibrillis ibi irritatis & post discessis dolor oboritur, & postea ulcera, quæ dein pluribus fibrillis disruptis redduntur profunda, particule enim illæ acide pertinaciter hærentes in poris ac fibris intestini recti, humores alluentes assiduò convertunt in acidos, qui ob tubulos ab ulceribus interruptos, circulationem continuare non valentes, ab humoribus à tergo continuo insequentibus propelluntur foras in cavitatem ulcerum, quam ad summum usque adimplent humore acri, acido ac tenui, cui simul admixtæ sunt particule viscosiores ac magis ramosæ, quæ ramulis suis sibi mutuò implexæ ac hærentes in superficie ulcerum, illa fœdora reddunt. Omnia proinde, quæ particulis scindentibus acidis ac ramosis prædita sunt, eorum auctum impetum sibi rapientia & fibras discedentia, affectum hunc excitare possunt, fractis enim fibris istis circulatio humorum necellariò impeditur, succus ipse redditur acrior, & ita evalatur.

*Fissura* Intestino recto obvenit vel à particulis illis acidioribus, fibras cutaneas amplius, quam par est, dillocantibus & sejungentibus, ut sulci inde oriantur magis aliquando, vel minus interdum profundi. Nascuntur autem acide ulæ particule ex sanguine partibus spiritibus depauperato, vel à peregrino quodam acido infecto, quod non modicum cibo & potu corpori infertur, sed tale quid etiam in præposito & impuro coitu contingere, ubi cum ipermate corrupto particule hujusmodi ad partem hanc ipsam delinunt, & humorem in intestino recto contentum inficiunt. Nefando etiam hoc flagitio fieri solet, ut cutis nimum distendatur & violenter dirumpatur, uti eandem hanc fibrarum rupturam inducant scybala crassiora, sicciora, duriora & asperiora cutem discedentia, quod & faciliè fieri potest, dum ob defectum humoris irrigantis cutis est aridior, & fibræ ejus rigidiores, quo fit, ut conatu majori à scybalorum sicciorum expulsionem fibræ ad relaxationem minus dispolite nimum tenæ rumpantur. In aëre tempore brumali interdu acidum tale latitat nitrolum, quod in excreuendis facibus intestino huic diutius denudato & aperto insinuat, malo huic inferendo satis est accommodatum.

Causa *Condylomatium* sunt particule multæ acide & viscosæ simulque ramosæ, quæ cum humoribus circulantibus ex poris valorum sedalium magis dilatatis ad intestinum rectum delatae fuerint, vel glandulæ intestini recti ab his vicidis humoribus obstruuntur, in quibus & hærent, & dum laterum sinuorum acie fibrillas solito vehementius commovet, dolorem excitant,

Uu

excitant,



citant, atque hoc pacto tubuli vicini aliquatenus distorquentur, unde humores stagnantes brevi mora in glandulis sinu alceant, hinc circulatione impedita alluente humores cumulantur, & sic necessarii tumor oboritur; etenim omnium ferè tumorum causa est obstructio tubulorum & circulatio humorum impedita, hinc melancholici, hypochondriaci, cachectici & omnes ii, qui habent plures succos viscidos & acidos ad stagnationem, & circulationem humorum tardiores reddendam pronos, in affectum hunc ut plurimum incidunt. Sanguis quoque est sepe inspissatus, & per arterias hæmorrhoidales in venas ejusdem nominis transire impotens, partes aut distendit & aneurismata producit, quibus ruptis sanguis emanans fluxus hæmorrhoidalis vocatur. Sæpe tamen varices eodemque in loco conitantur, sed hoc plerumque fit à prægressa alvi constipatione, quâ sanguinis regressus impeditur, ita ut venæ nonnoperè distendantur, tandemque rumpantur.

*Atroisum* *Atrois* veri ita nascuntur in ipso matris utero, dum intestinum hoc in formatione foetus non satis elaboratur, & ad extremum usque excavatur, sed pars quedam spermatica crassior, tenacius coherens massam præbet spissiore, quæ in situ operculi cuiusdam meatum hunc obturat, & quod fistulosum esse deberet, solidum reddit & impervium; vel carne aut membrana quadam cuteve meatui iste obducitur, nonnunquam etiam sphincter connascitur ac carne operietur, quod *Bonvien*, cap. 30. de abd. observavit.

*Pregnasti Ani Proci dentia.* §. 11. Quid de eventu horum affectuum sperandum sit, paucis nunc perspicimus. *Ani* itaque *Procidencia* pro casualium variare vel facilis vel difficilis curatu est, si enim altiores egerit radices, facile in tumorem abit & aliquando inflammatur, imo interdum gangrænam contrahit, ceu bigam exemplorum novimus. Si à resolutione & relaxatione nervorum acciderit, difficillime sanatur; è contra si acciderit pueris & robustioribus, haud adeo difficilis est curatu.

*Fistula.* *Fistula Ani* magnam tum ægris, tum Chirurgis creant molestant, facile enim multiplicantur & duæ vel tres ex una emergunt, insimul tubercula quædam suboriantur dura, meatum istumque intestini occludendo exitum fecum prohibentia. Quæ intestinum perforant & facibus alvinis transitum permittunt, aut in vesicam penetrant, ut urina per fistulam exeat, pessimi sunt ominis, & raro aut nunquam operatam admittunt curationem. Nondum verò penetrantes *Fistulæ* & simplices aliquando sanantur, quamvis cura non sine difficultate institui possit, interdum perfectam sanationem non admittentes majus corpori non inferunt damnum, sed hæmorrhoidum instar sanguinem & saniem emittunt cum incommodo ægri, tractu tamen temporis, si copiosior sequatur effluxus, adeo ut lymphæ ex aliis vasibus ad emunctorium hoc succedat & magna emanet quantitate, atrophiam producant, totalem corporis emaciationem, ipsamque mortem sensim inferentem.

*Fistura.* *Fistura* non sunt negligendæ, ex parvo enim principio magnum exurgere potest malum, & levem hunc ab initio morbum putatum graviora excipere ulcera erodentia, & ipsæ etiam fistulæ. Si verò non negligantur, sed in tempore

idoneis iisdem occurratur remediis, corrigi & in totum auferri possunt. Dolor gravis, qui eadem concomitatur, ob maximas fibrarum irrationes & spirituum dispersionem graviora provocare potest symptomata, succorum in corpore distributioni maximè incommoda, unde & apta nutritio inhibetur, & ægri contabescunt.

*Condylomata* quod attinet, & hi tumores sæpe Medicis negotium faciunt, imprimis cum materia nimis viscidata tenaxque sit, & simul ægri hypochondriaci & morosi; & semel iis abactis facile revertunt; imo humores diu commorantes aciores redduntur, qui dein fibrillas discludunt & facile ulcera & fistulas producant, imo ob maiorem tumorem & inflammationem interdum gangræna, sphacelus & mors oboriuntur, ceu patet ex *Obs.* 122. *Eph. Germ. Ann.* 4. perveniunt enim hi tumores ad eam magnitudinem, ut suppriment ægrotis juxta alvum ac vesicam, quarum tamen partium diu non possumus carere usu, quin carendum sæpe sit simul dulcissimæ lucis uluræ. Eiusmodi lethalem Anitumorem obiectavit *Talpini* lib. 3. *Obs. var. cap.* 10. p. m. 157. *Condylomata* Ani similitudine lethalia observavit *Lesj.* lib. 3. *Observ. Medicinal.* *Obs.* 18. Facile & hæc in bubonem transiunt & redduntur cancrois, hæc ejusmodi tumores lue Venerea infectis frequentius accidunt, aliisque hypochondriacis & scorbuticis.

*Imperforatis* stricte sic dictis puerulis hoc vitium Imperforatum semper ferè lethale est, quod pluribus exemplis, præcipue tamen apud *Talpini*, *Platerum*, *Ephem. Germ.* confirmatur; aliquando & curantur, ceu liquet ex observatione *Ludovici* curiosis communicatâ in *Eph. Germ. An.* 3. *Obs.* 15. Fœmellis verò non tam subito aut frequenter funesta est ani occlusio, quod à *Minado* exemplo puellæ comprobatur, qui cum anus imperforatus esset, & intestinum rectum in pudenda desineret, per id facies nunquam non exercebat, vitam ad annos sex & fortè ulterius protrahens. Ani clausura per membranam, & ubi rimæ adhuc conspiciuntur, facile incisione curatur, hinc *Senftenus* *Observ.* 77. refert, fenoville oblectricem Patavinam, quæ anum totaliter occlusum acicula communi perforare, & foramen turundis ex gentiana ampliari solita fuerit. Infantes sub tormento tam atrocis morbi durare possint ad septimum, decimum, undecimum, & decimum tertium diem. ceu *Hildanus* testatur.

§. 12. His præmissis proximum est, ut paucis quoque vivendi regimine ordinemus. In *Procidencia* igitur *Ani* eligatur aer purus ac calidus, frigidus verò maximè existit noxius, illis enim, qui diutius laxo frigido insident, facillimè anum prolabi, omnes Auctores Medici unanimiter testantur, nec verò sola hæc sessio, sed frigus externum quoque alio modo hæc partes nimium affligens ob acidum suum nitrosum hoc malum producere potest. Victus quoque eligatur acidum temperans, in genere euechymus & eupemptus, videntur salita, infumata, acris, aromatica, piperrata, & omnia ea, quæ salinam in se continent acrimoniam, aut nimis sunt acida. Potus sit cerevisia defæcata, vel vinum generosum dulce, at moderate haustum. Quietis & somno indulgendum. Animi pathemata sunt moderata, animus ipse tranquillus.

tranquillus, exulset ira aliaque commotiones maiores. In *Fistulis* & *Fissuris* eadem convenit fere dicta. In *Condylomatibus* eo incumbendum, ut alvus sit libera.

*Interim  
methodus  
curandi  
Ani Pro-  
lapsum.*

§. 13. *Veteres* in *Procidentia Ani* curatione ita procedunt, ut restitutio ejus quam celerrimè peragatur, ne inflammatio eum prehenda, quà præstante restitutio ista esset difficilis, absterfis quapropter sordibus lixivio quodam ex cinere querno confecto, vel urina pueri calidâ, intestinum nudatum digito indice aut medio in sedem debitam retrudunt, quò firmitus in ea retineatur, nec ab humoribus viscidis depellatur, quia de causa ad firmiorem retentionem idem intestinum vino austero, in quo gallæ immaturæ, nuces cupressi, balauſtia & myrrha incocta sunt, ablucresolent, quo illud confirmari & corrugari promittunt. Ad majorem deinde adstrictionem & constipationem remedia adhibent laxitatem, ad prolapsum multum facientem, prohibentia, pulveremque inspergunt ex gallis immaturis, nucibus cupressi, corticibus pinii, succo acaciæ, hypocistidis, rhoë, fructu ericæ, flor. rosæ balauſtiis, thure, myrrha, cerullâ, alumine & similibus, ex quibus sequens eligi potest formula.

*R. Gallar. immatur.*

*Malicor.*

*Rhois,*

*Balauſtiar. aa. 3℔.*

*Thur.*

*Myrrh. aa. 3ij.*

*Spum. argent. 3iij.*

*M. F. Pulvis.*

Restitutio sic intestino hoc vitanda jubent omnia alvum sollicitantia tum alimenta, tum medicamenta, & ligaturam tandiu admovent, donec omnia sedata & intestinum omnimodo sit confirmatum. Quando verò inflammatio jam præsens tam facilem non permittit curationem, aut intestini repulsionem, majori incedunt remediorum apparatu, acque ad tollendam intemperiem illam cum materia, non modo necessarium impetrant iudicium, sed sanguinem etiam subtrahunt, sectâ venâ in cubito vel talo, & tum statim leviter adstringentia & repellentia adhibent intestino prolapsio, oleum nempe rosaceum omphaciaceum, vel unguentum sandalinum, & post illa ad relaxantiam pergunt, digerentia & dolorem lenientia, fotum instituentes vel balneum ex decocto folior. malvæ, altheæ, fetulæ campanæ, flor. Chamomillæ, meliloti, feniculi, fœnigræ, animumq; oleo chamomelino & anethino, intermisso oleo rosaceo vetusto, illinunt, donec abactâ per remedia hæc inflammatione ad constipationem, adstringentia & siccantia superius indigata transire liceat. A paralyſi tandem, & nervorum ex ossè sacro derivatorum resolutione, à frigore contracta originem habenti *Procidentia Ani* hoc modo obviam ire student, ut præmissis victu calido & sicco, cruditatibusque in corpore abundantibus per debita remedia prius præparatis, post vomitu evacuatis, intestinum prolapsum foveant remediis calefacientibus & siccantibus, potissimum lixivio ex cineribus torismarini, lauri, vel cupressi parato, vel vino generoso, quibus incocta fuerint herbæ calaminth. marubii, beton. puleg. paralyſ. verbasc. fol. myrrh. cupressi, malicor. balauſtia, flores anthos, stoechad. tiliæ, post quem fotum vel inieſtum intestinum in sedem debitam digitis reponunt, & ne denuò

prolabatur, fumo suffiunt ex remediis calidis & siccantibus prunis inspersis, pulvere scilicet, vel trochiscis paratis ex radicibus Cyperti, galangæ, floribus anthos, stoechadis, nucis Moschata, inace, caryophyllis, corticibus thuris, mastiche, ladano, hypocistide, quæ si in trochiscos formari debeant, pulverizata resinâ terebinthinâ igne liquata sunt suscipienda. Pro majori robore nervorum ipsi ano & ossi quoque sacro applicant emplastrum aliquod conveniens ex supradictis, vel sequenti formula paratum.

*R. Thur.*

*Myrrh.*

*Caryophyll.*

*Stercor. caprin.*

*columbin. aa. 3℔.*

*Euphorb.*

*Castor.*

*Mixta terantur, & terebinthinâ guttulis aliquot aqua ardentis irrigata excepta redigantur in formam Emplastri.*

Mastichinum dictum emplastrum eundem in finem à quibusdam solet applicari.

In *Fistula Ani* humores pravos in corpore redundantantes evacuant remediis cuique aliis prædominanti congruis, & vel Phlegmagogis, vel Cholagogis, vel Melanagogis, huic icsarificationes frequentius instituunt in natibus & pedibus, vel hirudines iisdem applicant, aliaque remedia ad tempus aliquod continuant exsiccantia, donec locum invenire præcipiant sordes putridas abstergentia, & carnem corruptam & putridam adimantia, ut sic carne bona restitutâ, perfecta sublequantur consolidatio. Malo verò hoc tam altas agente radices, ut remediis hujusmodi minime cedat, specillo fistulæ immisso altitudinem ejus explorant, quâ cognitâ vel ferramentum aliquod leve & flexile, vel linum crudum tenuissimum quintuplex ad palmi latitudinem ita contortum, ut unitas facta sit. setâ equinâ obvolunt, & specillo stanneo perforato inferunt per fistulam impellunt, inditico digito indice manûs sinistra in anum, vel ferrum istud flexile, vel specillum cum filo occurrentes per intestinum rectum educunt, sicque vel podice extracto carnem, quæ inter fistulam & internam recti intestini superficiem intercedit, scalpello aliquantulum falcato una vice incidunt, ut unus eorum, quæ descendunt, pateat exitus, vel cum specillo extrema parte inclinato simul inserti eidem lini caput prehendant, & cum altero ejus capite bis aut ter vinciant, reliquum verò ex lino dependens intortum ad nodum alligant, jubentque ægrum, ut seipsum secet per vices, quoti die scilicet nodum fortius alligando, donec id, quò dimer duo ora interjacet, eodem modo secetur, ac scalpello factum est, linumque integrum reddatur. Si tamen multa caro inter fistulam & intestinum rectum interponi, aut cum fistula pectentur, per quâ malè speculum penetrare videatur, sectionem minime volunt instituendam, ne dum sectio incautiùs obeatur, simul masculi intestinum confringentes imprudentiùs præcidantur, ægerque fæces delabentes in posterum continere nequeat, sed invitus egerere cogatur. Factâ verò sectione, vulneri isti linamenta induunt ne sua sponte coeat, eademque fistulam eliciant, donec caustico medicamento, autripiente

to nimirum pp. aut alumine usto, quicquid putridum existit & callosum, absumatur, & caro sana per sarcotica, unguentum de minio, de lithargyro, &c. reficiatur. Non penetrantium Anifistularum orificium & ductum dilatant vel radice gentianæ, vel spongia exsiccatâ, &c. si nihil obediat, sinum excidunt, carnemque putridam & callosam cauterio quodam itidem absumunt, cuius loco interdum linum byssinum succo tithymalli magni intinctum, & flore æris usto & contrito inspersum, vel linamenta unguento Ægyptiaco aut pſorico *Mefes* illita & implicata ad fistulæ longitudinem demittunt, vel pastillos ex minio in aqua plantag. aut melle rosato dissolutos linimenti formâ adhibent, aut fistulas aliaque ejusmodi ulcera lixivio ex cineribus farnentorum vitis parato, in quo pariter mel rosatum dissolutum fuit, ablutum, & emplastrum de salice externo eorum orificio imponunt.

*Fistulas.*

*Fissuras* sive *Rhagades* hac ratione tractant, ut humores peccantes & superfluos debitis syriis prius correctos medicamentis catharticis evacuant, vel si inflammatio addit, venâ cubiti dextri internâ vel malleoli dissectâ moderatam sanguinis copiam eliciant, postea ipsi. Rhagadibus callo nondum obduratis topica adhibentes citra morbum & asperitatem siccantia & adstringentia, foris nempe ex decocto fol. plantag. olivæ, rubi, flor. rosar. aluminis, vel vaporem ex vino rubro, cui scoriz ferri candentis inspersa sunt, aut linimentum ex radice diplaci in vino coctis, ad mellis crassitiem contusis, & in vase æreo spatulâ æreâ diutius agitatis, aut adipi anguillæ, dum ea assatur collectæ, immiscunt pulverem pinearum in furno siccatarum abjectis nucleis, & linimenti forma inungunt. Præsentem vero jam callo, eundem absumunt unguento Apostolorum, vel Ægyptiaco. eoque abactio *Fistulas* sequenti obducunt unguento.

℞. *Lithargyr.*

*Ceruf.*

*Plumb. uſt. aa. ʒiſſ.*

*Campbor. ʒſſ.*

*Alum. ovi. ʒj.*

*Ol. lini. ʒiſſ.*

*M. agitentur omnia in mortario plumbeo, pistillo plumbeo, ad justam spissitudinem.*

*Vel:*

℞. *Lithargyr.*

*Ceruf.*

*Plumb. uſt.*

*Alum. uſt.*

*Thur. aa. ʒj.*

*Adip. suill. gallinac. anser.*

*Ol. Papav. aa. ʒj.*

*M. omnia super igne lento, & F. Linimentum.*

Conduet quoque sequens eodem modo adhibetur.

℞. *Succi Lycii ʒiij.*

*Aloes ʒj.*

*Sang. dracon. ʒſſ.*

*Campbor. ʒij.*

*Ceruf. ʒij.*

*Adip. anser. ʒij.*

*Ol. lini parum.*

*Subigantur omnia in formam Linimenti.*

Emplastrum tetrapharmacum in oleo rosar. so-

lutum & linimenti formâ adhibetur, ad consolidationem promovendam a quibusdam singularis exsistimatur efficacia.

Ad *Condylomata* abigenda corporis instituunt purgationem ab humoribus crassis & sæculentis per pilulas de fumariz, electuarium Indum, coisectionem Hamech, & sanguinem sæculentis ejusmodi jam infectum emittunt ad mediocrem quantitatem, ex vena itidem cubiti dextri internâ, tum ipsam condylomatam carnem spongiosam absumere tentant remediis primum levioribus, ne locus niniuum exasperetur, ex quibus sequens valde collaudant.

℞. *Ungu. diapompholyg. ʒj.*

*Alum. uſt. ʒj.*

*Stibii, seu ʒii uſt. ʒiij.*

*Ol. lini.*

*Myrrh. aa. q. f. ut*

*Fiat Linimentum debita consistencia.*

Hoc linimentum excipiunt linamentis & loco affecto applicant, ut eidem diutius adhareat. Eodem modo etiam emplastrum diachalciteos duplicatâ chalcitidis quantitate parant, & in oleo lini vel nucum solutum admovere solent. Imbecillioribus vero hiæc existentibus remediis ad fortiora properant. unguentum nempe Ægyptiacum, vel Apostolorum, aut pulverem sequentem:

℞. *Chalcitid.*

*Alum. aa. ʒj.*

*Auripigment. ʒſſ.*

*Pulv. sabin. ʒj.*

*Hermodactyl. uſt.*

*Myrrill. uſt. aa. ʒiſſ.*

*Pompholyg. ʒiij.*

*Terantur omnia diligentissimè,*

*F. Pulvis subtilissimus.*

quo fungosa excreſcentia adspersatur, & ne parit actior (sensu nimis irritetur, aliquid opii, aut rad. mandragoræ, aut seninis hyoscyami admiscant. Condylomata altiori filo ligant, ut alimentum iis subtrahatur, aut novacula vel alio instrumento commodiori excindunt, & sanguinem aliquantisper effluere permittunt, ut sic de imputatibus ejusdem sæculentis aliquid simul evacuetur, quo factò sanguinem supprimunt & cicatricem inducunt vel ferramento candente, vel pulvere ex malicorio, thure, sangu. drac. bolo, farinâ volatili, & paucò alumine, qua ratione procedunt, si anus condylomatis undiquaq; sit obstitus, excindendo nempe altiora ferramento, & humiliora remediis antedictis absumendo.

*Aritis* membranam istam orificium obducentem dissecant novacula, & speculò insertò meatum dilatant, donec fistulâ plumbeâ unguento de cerussa, vel diapompholygos obductâ ad tempus aliquod inditâ foramen in debita fervent latitudine & cicatrice obducant; qua ratione & illam angustiam corrigere student, quæ post ulcera vel vulnera sanata ob conglutinationem arctiorem fuit illata.

§. 14. *Paracelsi* curatio *Ani prolapsi* eadem ratione perficitur, ut portio illa prolapsa oleo ovorum prius illita pristino loco digito premente restituitur, & adperso pulvere ex scarabæis pilularibus in furno siccatis, aut fumo ex scoriz ferri coctetur, ne denuò decidat.

*Fistularum Ani* curationem peragit ut in aliis *Fistulis*, locis, cum omnium unam eandemque curationem esse affirmet, mundificandis & incarnandis citra omnem corrosionem, live internæ sint potio-

potiones vulnerariæ, siue externa localia, inter quæ aliis præfert remedium istud de quatuor guminis alibi descriptum. A lue Venerea originem ducentibus ea adhibet, quæ carcinomatosis dicata sunt, potissimum vero Realgar alcalizatum & emplastrum de cinnabari, quo curationem absolvit.

Fissuris.

*Fissuras siue Rhagadia* tollere satagit vel pessario ex aloë succotrina & radice aristolochiæ pulverisatis & terebinthinâ exceptis, vel sequenti pulvere iisdem insperso.

℞. Mumia ʒj.

Lacca rubea ʒb.

Pulv. aranciar.

ʒij aa. ʒij.

Chimolca. ʒib.

Cachimia. ʒv.

F. Pulvis.

Asserit etiam eadem curatione hæmorrhoides auferri posse, in qua spodium omnem partem adimpleat, adeo ut sine hoc nullo expectari possit successus.

Condylomatu.

*Condylomatuum* curationem modò duplicem proponit, alteram ductibus corrosivis peragentem, alteram medicamentis stercoralibus, modò eadem unâ cum hæmorrhoidibus eadem curatione auferri posse statuit. Quæ corrosivis peragitur, sit vel corrosivo dulci simplici, vel eodem mixto cum aceto. Corrosivum dulce ita paratur:

℞. Ol. lateris ʒi.

de Juniperis ʒb.

Ol. ex myrrha ʒij.

M.

Corrosivum dulce mixtum cum aceto sequens est.

℞. Ol. lateris. ʒj.

Ag. alaminuj. ʒb.

Vinduitis salis ad pondus omnium,

F. Mixtura.

Curam de stercoribus sequenti modo vult instituendam. ℞. Patientis dejectum stercus misce cum oleo de vitellis ovorum, premat patiens, ut exeat verrucæ fuscæque, quibus tunc medicina superponatur.

Imperforatione.

*Imperforationem & Occlusionem Ani* instrumentis perfodi aut perterebari permittit, cum alia ratione eundem referari posse nunquam cognoverit.

Hæmorrhoidum cura in Anopro. evidenti.

§. 15. *Hæmorrhoides* cum affectis suis *Præcidentiam Ani* restaurari promittunt radice acaciæ, vel pulveris formâ alpersâ, vel foci adhibita, quâ viâ regredientem podicem in vetus conforium recipiat pylorus, & furoris sui immutari conficius factus debito suo regimine pacatius fungi occupiat.

Fistulis.

*Fistulas Ani* conveniens esse remedium assertit ipsum arcanum corallinum *Paracelsi* interius assumptum, sicut aliis ulceribus desperatis optatum afferat auxilium; inter topica verò auspigmentum fixatum dulce aliis præfert, ad ulcera hæc fistulosa maximè conveniens.

Fissuris.

In *Fissuris Ani* singulare quoddam existitur esse remedium confudit ipsum oleum saturni, quo illito laticis corruptio corrigatur & productæ ab eo foveæ sanentur.

Condylomatu.

Ad *Condylomata* tollenda sudorem morientium deprædicat, quo illitæ excrescentiæ illæ corrugentur, & flaccidæ redditæ tandem penitus solent decidere.

*Ani Clausuram* aliis instrumentis aperire permittit, quamvis operationem hanc non semper felicem nancisci succellum respexit, & eandem propterea sæpius fr ultraneam esse fateatur.

Clausura.

§. 16. *Vulnus* restitutionem postulat *Ani prolapsi*, & jam restituti confirmationem, ne ulterius extra sedem convenientem decidat. Restitutio fit remotione impedimentorum tumoris nempe anum regredi vetantem, refrigerationis, flatuum intestinis inhærentium, aliorumque, per foci emollientes & discutientes ex decocto radicis althææ, brancæ ursinæ, lilior, herb. malv. agrimon. marrib. menth. flor. chamomill. verbasc. sem. fœnigr. carvi. bacc. lauri, & retrusio nedigito pericienda, postquam oleo quodam portio intestini recti prominens lubricata fuit, ut facilius retropellatur, chamomeli nempe, lilior. vel hyperici. Anus repositus in situ confirmandus est, ne denuò prolabatur, quod fit epithematis adstringentibus tepidis ex decocto rad. bistort. pentaphyll. symphyt. herb. salv. consolid. Saracen. millefol. fol. querc. lauri, flor. balustior. sem. funach. gallar. bacc. myrth. cort. mespil. inunctione unguenti nervini, & Comitæ, & insperione pulverum ex ladano, mastice, succino, sang. dracon. & croco. ʒis adstringente, quæ remedia ut citius speratum edant effectum, decubitus supra ventrem aut latus aliquod, & quietem ad tempus quoddam protraham ægro sumopere commendat.

Fistulis.

*Fistulas Ani* inveteratas & penetrantes viâ ulam admittere curationem exilimat, & propterea easdem quietas relinquere melius esse, quàm remediis irritare, quæ verò non adeo diu radices egerunt, earum callum absumi pyle censet vel Unguento Ægyptiaco turundâ cavitati immisso, vel ferro candente, per cannulam ferream foraminatam fistulæ intrusam, deinde dilatam fistulam vel cistello falcato discindi vult, vel, si non sit adeo profunda, sed brevis & simplex, eam abstergere præcipit decocto agrimon. apii, cent. min. in quo mel rosatum sit dissolutum, addito pauculo æruginis aris & ʒij præcipitat. sublimat. tum turundam ex unguento diapompholygos asperam pulvere mumia & sacchari ʒi minuat, superimposito emplastro convenienti, vel stiptico Collii, & decoctâ lignorum cum herbis acrimon. scabios. nummular. centaure. aliisque vulnerariis ad tempus aliquod propinat, ut latex acrior corrigatur, & nimia ejus quantitas sudore eliminetur.

*Fissuratum Ani* curationem aggreditur vel *Fissuris*. cutem sicciorē & rigidiorē emolliendo & humectando, foci instituto ex decocto malv. alt. branc. ursin. sem. lin. flor. lilior. deinde unguento vel emplastro parato ex terebinth. cerâ, bolo Armen. & ol. oliv. icybala etiam majora & duriora emollienda sunt clysteribus ex lacte vel decocto lenitivo, additis mucilag. sem. ptyll. & oleo liliorum. Particulas autem salinas acres temperat, & ulcuscula inde producta lesit & consolidat mucilage tragacanth. sem. cydon. unguento de lithargyro, de Thut. pomato, non omittis fortioribus absorbentibus pulveris formâ inspersis ex cerussâ, lap. calam. C. u. c. fust. farco. coll. ubi laticis acrioris major adfuerit copia.

Ad *Condylomata Ani* absumenda etiam interna non negligit remedia ex lignis aliisque diaphoreticis ʒaris, & simul externa absumenda, Uu 3 pul-

Condylomatu.



℞. Succ. Chelidon. maj.  
Scrophular.  
Apii, aa. ʒiij.  
Vini ʒiij.  
Aloes ʒij.

M.

Fistulam bene mundatam carne laudabili opplere student, instillatis, aut turundis ex carbalo intrudendis prius inunctis balsamo de Capaiba, Peruviano, oleo trifolii odorati, unguento aureo, basilico, & superimposito emplastro diachylon, vel diapalmæ, vel de gratia Dei, quibus ipsam etiam consolidationem, & novæ cutis inductionem perficiunt, vel si non sufficiant, adperso pulvere ex calce lota, thutia & terra Oli dulci emplastrum Oppoteljoch F. VVirtus ad perfectam uique sanationem imponunt.

Effusus.

*Effusus Ani* ut rite curent, ipsas causas advertunt, & vel particulas acutas corroderentes & scindentes hebetant spiritu vini camphorato, aqua Ψ., oleo myrrhæ, quibus fissuras istas abluunt, & unguento albo camphorato illinunt; vel tercora duriora emolliunt lenientibus, pinguis & mucilaginosi tum per os assumunt, tum clysteris aliorumque topicorum forma adhibitis, laudaturque juleculum tepidum, vel butyro vel oleo olivarum aut amygdalarum dulcium pinguefactum, addita ʒj. vel altera cremoris & granis aliquot ʒis volat. ʒi, hinc fistulas illinunt vel mucilaginis ex sem. cydon. pilylii, gum. Arab. tragacanthæ, admista pauca quantitate ʒis ʒi, vel oleo ceræ recenti, qua feliciter sæpe perlanantur.

Candylomata.

*Candylomata Ani* eradicare student remediis acutis erodentibus & destruentibus, butyro ʒiij, oleo Oli. ~u ʒis per campanam parato, quibus excrescentias istas quotidie attingunt, donec exsiccatæ decidunt. Extantiores autem filo vel pilo equino ligare solent quotidie fortius constricto, ut hac ratione succo nutriti denegetur transitus, & tubercula alimento privata similiter decidunt, quo impetrato succos emanantes accescere prohibent pulveribus inspersis ex Thutia, censis lithargyro, bolo, æruginis usto, calce lota & similibus, à quibus & cicatrix pro voto simul emergit.

Clausura ram.

In *Clausura Ani* membranam meatum operientem vel unguibus digitorum diserpunt, vel promittis cultello discindunt & meatum aperiunt, inserto postmodum canali plumbeo unguento diapompholygos, aut de lithargyro obducto, ut cicatrix eo citius accrescat, & meatus iste conservetur. In Conniventia frequentius canales aliosque bacillos oleo obductos, vel pestos ex sevo hircino & cera confectos, & oleo raparum obductos podici intrudunt, ut frequentiori ista intrusione & educatione meatus dilateatur. Quando verò podex omnimodò in utero concrevit, curationem impossibilem esse admonent.

Nostra cura in Ani Procidencia.

§. 19. *Nostra* iudicio ad ipsam *Ani Procidencia* rite curandam totius rei cardo in eo vertitur, ut Anus reponatur & repositus firmetur. Reponitur autem optime manus ope, quando indice digito, vel melius linteo in lacte cocto restituitur, quo facto æger diu supra ventrem quietus jaceat, ut ita melius firmetur anus, ad quem scopum facilius obtinendum ille illini potest oleo scarabæorum vel hyperici, superinsperso pulvere gallarum, vel nostro adstringente usuali;

plures sequenti modo feliciter curavimus; si dolores scil. multum urgeant, vel fæces induratae sint, foras instituendus sequens vel similis.

℞. Flor. Verbasci,  
Chamomill. aa. Mij.

Cog. in lacte, & applica, tum sequentem insperge pulverem.

℞. Fol. Verbasci. q. s. indantur crucibulo cooperto alio, & sic concrementur, deinde in pulverem vertantur subtilissimum.

Postmodum æger insideat asseri ex ligno quercus parato, cui inspergatur pulvis subtilissimus ex mastiche, olibano & asphalto paratus, & si simul alvus est obstructa & tercora sunt dura, præter enementa quotidie detur internè ol. amygd. dulc. ʒj. cum cremor. ʒi ʒj. à quo remedium alvus semper servatur aperta. Vel suffumigium instituat ex gum. asphalt. oliban. mastich. vel pulv. alb. græc. & scarabæorum asseri quercino inspergatur & ano excipiat. Deco. agrim. verbasci. cum lact. coct. & appl.

Nostra quoque experientia impedit crebriorem ani prolapsum oleum apum externè illitum, postquam anus extrusus sevo cervino calido fuit illitus & blandè intrusus. Oleum momordici externè applicatum c. linteo est summum & raro fallax remedium.

Ubi malum ab affectu convulsivo aut paralytico fuerit productum, varii fortis externi instituntur ex floribus anthos, Chamomilli, stæchad. Arab. foliis salv. balauistiis in vino chalybeato coctis, in quem finem quoque varii suffitus institui possunt ex succino, mastiche, thure, myrrha, asphalto, fol. rorismarini. flor. rosar. rub. stæchadis Arabicæ. conveniunt theriacæ quibus Principiis quædam feliciter curata est aliis remediis frustra tentatis.

Ex Hæmorrhoidibus affectu hoc prognato, inungatur anus oleo scarabæorum, quod paratur, dum scarabæi in oleo mastiches bullierunt; si verò productus fuerit ex tenebris, conducet oleum mastiches, in quo flores verbasci fuerint cocti.

Alii quidem dorso & lumbis applicant emplastra, at non video, quomodo hac operire, & intestinum rectum in sede debita firmare possint. Sequenti linimento euporisto plures curatos novimus.

℞. Unguent. de linar. ʒij.

Camphor. gr. iij.

Lap. calamina.

Lithargyr. aa. ʒj.

Sacchar. ʒi ʒss.

Cum ol. rosar. q. s. f. Unguentum ano fissi-  
pud illinendum.

In cura *Fistule* eo incumbendum, ut acre corrosivum circa anum imperium sibi rapiens corrigatur & emendetur. In levi exulceratione ani conducunt inunctiones ex oleo rosar. & lumbicorum probe in mortario plumbeo agitatis, & in linimentis consistentiam redactis, item suppositoria ex sevo cervino vel hircino, cum pulvere alcoliatio thuris, thutia, &c. parari possunt, vel illinantur exulcerationes unguento de cerussa, camphora, vel diapompholygos, unà cum pauca quantitate terræ Oli dulcis rite paratæ, quocumque modo vel per se, vel linteis applicatis ano intrusus. Quo melius verò ad fundum ulceris perveniat, cultello instituenda est incitio,

cilio, & sic felicissimè & facillimè curantur hæc ulcera applicatâ sola mixtura externa inferiùs dicenda. Si verò malum altas agat radices, & fistula sit profunda, internis diaphoreticis iuvandum est, ut sic acres particule eliminentur, & sanguis cum succis reddatur fluidior. Conducunt ergo Gum diaphoret. cum chalybe & oculis es. cinnabaris, ut & decoctum lignorum, ex ligno sancto, radicib. salaparill. enul. camp. calami. aromat. herb. scord. nascunt. *Se* Si paratum; sic & salia volatilia, Elixir vitæ cum sale volat. oleof. maximè conveniunt, possum enim testari, solis sudoriferis aliquoties repetitis affectum hunc certò curari posse, è contrapurgantia angue pejus fugienda sunt, ut & Venæ sectio. Externè varia per injectionem, traumatica seu decocta vulneraria ex superioribus capitibus jam cognita infundenda sunt, si quis verò linimentum potius exoptat, is utatur sequenti.

℞. Cinab. nat. ʒj.

Campbor. gr. iij.

Sperm. ceti ʒß.

Pulv. mumie ʒij.

Rad. consolida. m. ʒj.

Terebinth. in vitello ovis solut. aa. ʒß.

Cum ol. lumbicor. & balsam. Capaib.

*F. Linimentum.*

Conveniunt etiam theriæ. Multi magnam quendam Regem ejusmodi affectu diutius vexatum & tandem curatum fuisse referunt.

Alijs fistulæ hæ tractandæ sunt ac aliarum partium fistulæ, hinc lectorem ad caput mittimus quendam Regem ejusmodi affectu diutius vexatum & tandem curatum fuisse referunt.

℞. Spir. vin. c. ʒij.

▽ Regin. Hung. ʒv.

Calc. viv. ʒij.

Sacch. ʒj.

℞. volat. oleof. ʒß.

*M. d.*

Fistulam Ani cum duritie laborum feliciter in rustico curavit celeberrimus D. Obercamp, sequenti modo: Primò instituit incisionem per musculum sphincterem & per labia illa dura fistulæ, dein applicuit externè cum spongia tepidè sequentem liquorem.

℞. Elix. vit. ʒij.

ʒij sublimat. gr. vj.

Tinctur. galban. ʒß.

Campbor. ʒj.

*M.*

Intra sex dies callus & durities evanescabant, & exhibito decocto lignorum plenè convaluit rusticus à fistula liberatus. Balsamum vitæ D. le Mori. hoc in morbo alijs omnibus est præferendus, sequenti ratione præparatus.

℞. Ol. lini ʒxvj.

Aloes ʒj.

Myrrh.

Sandarach.

Mastich. aa. ʒß.

Terebinth. ʒij.

*M. simul, & ponantur in balneo Maria, coq. per hor. ij. materiam sapienti agitando bacillo ligneo, donec planè soluta sint gummatia. Deinde adde*

Campbor. ʒij.

Lithargyr. ʒij pulveris sat. optime ʒij.

*M. simul, & macerentur per ʒ. ʒ. vel 4. ad minimum. Dein clarum à facibus per decantationem separa, & adde isti*

*Ol. Petr.*

*Terr. aa. ʒß.*

*Cera citrin. recent. ʒij. vel iij.*

*M.*

Hoc balsamo Fistulæ Ani tum externè, tum internè probè illinantur, quivi turundæ eodem probè imbutæ fistulis intrudantur.

*Fissurarum Ani* curatio reverà omnium optima, me instituitur mitigatione humoris acidi actis ex tubulis intestinorum manantis, & fibras erodentis, vel spiritu vini camphorato, vel aquâ Ψ. in qua sal ʒi fuit dissolutum, quibus fistulæ hæ diligenter eluendæ & abstergendæ sunt, & correcto isto humore fibræ mitigandæ mucilaginosæ & potissimum enematæ in Rhagadiis probato *Myrschii*, ex ol. viol. ʒv. butyri non saliti ʒijj. macilag. tragacanth. sem. Piyll. cydon aa. ʒiß. sacchar. rub. ʒi. quo non tantum dolor mitigatur, fibræ emolliuntur & sulci sanantur, sed alvus etiam strictior moderatè solvitur, & stercorea duriora, fluidiora redduntur; si verò plura exposcant remedia, unguento de levo hircino ejusdem plures poterunt hoc in casu oppleti parietes, & emplastro ejus de carue bubula etiam atrocissimæ & ulcerosæ perlani. Teneamus quoque sæpe oituri qui curatur optinè internè exhibita mixtura ex ▽ Menth. mastich. puleg. plantag. ol. mastich. destill. gr. v. aut vi. sumpta mane & vespere, non neglectis externis.

In Tumorum seu *Condylomatum* cura prima *Condylomati* opera eò imponenda est, ut circulatio impedita restitatur, & sic materia incassans glandulas & tubulos resolvatur, in quem finem varii institui possunt foci ex floribus Chamomill. verbasc. fol. linariæ in lacte coctis, sacculo inclusis & ano sic applicatis, omnia enim emollientia sic dicta resolvunt discutiantque, & sæpe totam implent paginam, hinc & linimenta emollientia sic dicta optimum in condylomatibus curandis habent succellum, & sequens multa experientia comprobatum est linimentum.

℞. Unguent. de linar.

duob.

Sacch. ʒi aa. ʒj.

Crocioptimi gr. v.

*M. F. Linimentum.* si adest inflammatio & dolor ingens est tunc conducit sequens.

℞. Tur. ppt. ʒj.

sacch. ʒi ʒß.

ungu. de linar. ʒß.

Cernisi. ʒij.

*M. F. Linimentum.*

Internè detur Theriaca coelestis, vel aliud antidotum.

℞. ▽ plantag.

Pomor. redol.

Linar. aa. ʒj.

Sacch. ʒi.

Lap. Calaminar. aa. ʒß.

ʒij dulc. ʒß.

Campbor. gr. v.

*M. d.*

Injectiones etiam institui possunt ex oleo lini, nucum juglandis, addita guttâ unâ ac alterâ balsami ʒis, vel decoctum adhibeatur tapfi barbati, scrophular. chelidon. minor. & beton. aquat. A repellentibus & acerbis in sciendis maxime opere abstinendum. Foci autem & suffitus institui optima & egregia existunt in his casibus.

sibus remedia. Succus chelidonii minoris vires in hæmorrhoidibus tumentibus maxime ab Autoribus deprecantur.

Sed nec interna sudorifera, ac diuretica blandiora negligenda sunt, cum obstructions tumulorum referent, & circulationem humorum restituant, quod & pertinent Martialis & Jovialis; quæ hæc in affectibus magni sæpe sunt usus. Scarificationes, venæsectiones, fonticulos, purgantia tenuissima & exulare volumus, uti præter nostram experientiam etiam testatur *Eph. Germ. An. 4. & 5. Obs. 112.* *Tulpius* in sanguilogis præcipuum auxilium auro appositum ponit, quas exsurgendo sanguinem venas distendentem, simul malignum virus absorbere dicit, sed hoc non semper imitandum esse autor sum. Celeberr. D. *VVedelius*, Fautor ac collega noster colendus, fabarum radicem dorso inter scapulas appensam pro amuleto olim *Bartholino* communicavit, vid. *Act. Hassæ. Obs. 51.*

In Pruritu Ani fortis ex aqua plantaginis, in qua parum aluminis decoctum fuerit, laudatur. Sequens quoque linimentum proderit.

℞. *Tragacanthæ.*

*Lithargyri.*

*Sacch. Si.*

*Ælis circ. aa. 3℔.*

*Cum vin. adjecto ol. rosar.*

*F. Linimentum.*

Sic & dolor ani, qui oritur, si charta piperata, vel alia venenosa acris materia contaminata potius fuerit deterfus, sedatur foris lactis, addita pauca quantitate aquæ rosarum. Unguentum sequens tanquam mirabile ad hæmorrhoides extollitur in *Zod. Gall. Ann. 2. Obs. 11.*

℞. *Stillic. Si.*

*Dissolv. in eo*

*Siis 5j.*

*add. ol. ros. omphacin. 3℔j.*

*Subigantur omnia in formam Nutriti, add.*

*3℔℞. præcipit. rubri subtiliter triti.*

Sed meo iudicio tutius ab hoc & calius huius farinae remediis acidis & fibras irritantibus abstinere, ne crabrones irriterentur, & malum reddatur deterius.

In omnimoda Intestini recti Imperforatione & Imperforatis *Arctis* cura planè nulla cum successu optato instituitur, sæpe enim tam profunde substantia quadam carnosa cavitas intestini oppleta est, & ita consolidata, ut cultellus penetrare nequeat, & infantes ipsa in operatione præ doloris vehementia moriantur, adeoque ubi nullum extat Podicis indicium, suaderent, ut sectio aut punctura planè omittatur, ne proposito male cedente culpa imputetur operatori, sed tota hæc res divina committatur misericordie. Ubi verò sola membrana quadam meatum debitè formatum obteggit, & hic sub ea lateat, membrana ista quantocrys & audacter est dissecanda, ut facibus paretur exitus, foramini postmodum canalus plumbeus unguento de Thutia obductus tandiu est inferendus, donec cicatrix inducta membranae concreticiam prohibeat. Similem curam etiam repositit illa podicis oclusio, quæ à concreticiam intestini recti post ulcerum, fistularem aut vulnere consolidationem enascitur, quamprimum enim angustia talis in agnis huiusmodi perferitur, cutis intestini complurata denudò ditumenda stylo ligneo, vel plumbeo, oleo liliorum obducto, & post convenientem istam separationem canalus plumbeus ratione jam indigitata inferendus, & tandiu in meatu intestinali servandus, donec cicatrice enata unguente nequeat concretescere. Conferantur etiam huic *Ephem. Ann. 1. Obs. 11. Ann. 2. Obs. 22. Ann. 3. Obs. 287. Act. Hassæ. Obs. 84.*

## CAPUT IV.

## De Epatis, Lienis ac Renum Scirrhis, Ulceribus &amp; Vulneribus.

## §. I.

**V**iscera hæc glandulosa & membranis multis referta, multum faciunt ad circulationem humorum, dum per hæc semper segregantur particule crassiores à subtilibus, & sic redduntur succi quicumque circulantur fluidiores, hinc si hæc viscera lædantur, sanitas, quæ consistit in regulari succorum omnium circuitu, periclitatur. Ipsis autem visceribus hæc. Epatis nempe Lienis ac Renibus ob impediam succorum in hisce visceribus circulationem accidunt Scirrhi, Ulcera, & ob continui solutionem ab extra inductam etiam Vulnera.

*Hepatis.*  
*Lienis &*  
*Renum.*

*Scirrhus.*

*Scirrhus* dicitur horum viscerum pororum obstructio, & notabilis inde induratio, ab acido & stagnatione humorum producta.

*Ulcera.*

*Ulcera* sunt Viscerum horum continuitatis dissolutiones ab erosione succorum acrimia productæ.

*Vulnera.*

*Vulnera* horum viscerum sunt ipsorum continui solutiones, à re violenta externa obortæ.

*Pars affecta.*  
*Et.*

§. 2. *Pars affecta* est i. *Hepar*, seu *Secur*, quod est viscus illud magnum situm proxime diaphragma in elatore præcipuoque abdominis

loco, & quidem in dextro hypocondrio, & est conglomerata quadam glandula, quæ in diversa fistula & acinos dividitur. Viscus hoc unico excretorio pollet vase, & determinatum separat succum in cavitatem intestinorum eructandum. Cum Pancreate & Thyro similitudinem aliqualem habet quoad externa signa. Singuli lobuli, quorum sunt tres, vel quatuor, & glandulosi acini gibbam & cavam hepatis regionem constituunt, & pollent pluribus vasibus & propagibus. Plura prodeunt vasa lymphatica tum ex parte concava hepatis, tum ex vesicula fellis, quæ in Receptaculum in lumborum vertebra collocatum deferuntur. Sed & Secur tribus ligamentis est præditum, quæ id in proprio continet situ. Primum arcuè ipsum cum diaphragmate alligat. Secundum ad umbilicum pertingit. Tertium latum, robustum & laxum est, & ad cartilagineum xiphoidem progreditur. Pars ejus exterior convexa, & interior concava est, & parte sua inferiori ventriculi portionem amplexatur, quando ergo stomachus alimentis tumet, compressa vesicula fellis bilis ea ejicitur per canalem cysticum, &

Xx in

in duodenum deferitur ad chylum dissolvendum & fluidiorem reddendum, prout à ventriculo descendit, adeò ut usus Hepatis sit, bilem à sanguine separare ad chylum in intestinis dissolvendum, & à illius alcalicis suis particulis subigendo, & ipsum phlegmate suo diluendo.

§. 2. *Lien* quod attinet, is in sinistro latere sub diaphragmate later è regione Hepatis, & infimam penè congeriem rotundorum rubrorumque corporum exhibet, cum glandulis infinitis, quæ locum & solum sibi nanciscuntur in sinibus & cellulis membranosis, quibus Lienis substantia integratur. Arteria nerveoque unà ingreditur, & vena per eundem locum exeunte fertur. Arteriz istæ disseminantur in cellulas quasdam membranaceas, quarum figura haut male repræsentat filicis folium. Cellulis istis intersperse sunt minutissimæ glandulæ sibi invicem incumbentes, ut uvarum acini. Glandulæ illæ arteriz à trunco arteriz splenicæ, & furculos nerveos à nervo, qui splenem ingreditur, cum arteria mutantur. Usus hujus visceris valde obscurus est, plurimi fermentum aliquod stabiliunt, alii aliud inesse huic visceri dicunt; sed nostro judicio corpori huic glanduloso idem, quod aliis glandulis, est officium, quæ procul dubio ab arteriali sanguine lympham accipiunt per vasa lymphatica, quæ & hic à sinistra parte satis sunt conspicua. Separatus iste humor lymphicus acidiusculus vehitur in cellulas nominatas, ex cellulis fermento acido imbutis in ramum splenicum, & sic ad hepar, ubi in sanguine præcipitat aliquatenus bilem, ut illa in acinis hepatis glandulosis tanto facilius separatur, vel suspicamus etiam, fermentum è glandularum vesiculis effluere, illudque immisceri sanguini, qui lienem pervadit. Fermentum vero istud ita constitutum est, ut à reliquis ejus partibus eas liberet, quæ sunt compendiosa bili idoneæ. In Lienis etiam superficie multa conspiciuntur vasa lymphatica, quæ lympham suam in Receptaculum Pecquetianum apportant.

*Renes* quod spectat, nonnullis Anatomicis eorum substantia absolute fibrosa esse videtur, sed nostro judicio ipsa mera habetur congeries glandularum minimarum; ablata enim membrana, illico occurrunt bifurcatis hinc inde arteriis appensæ nigro & ipsæ colore infectæ glandulæ, & secto per longum rene, inter vasorum urinæ fasciculos & innata etiam interstitia innumeras ferè easdem observabis, quæ sanguineis vasis atro liquore turgidis, in speciosæ arboris formam productis, veluti poma appenduntur; quadragesimum excedunt numerum glandulæ renales, & plures earum sunt rotundæ, ceu piscium ova, de quibus vide instar omnium Anatomicum Celeberrimum *Steph. Blancardum* in sua *Anatom. reformata* cap. 26. de *Renibus*. *Renes* obvolvuntur tunica, quæ toti abdomini communis est, altera tunica *Renes* immediate obtegit, & separatis his tunicis palam fit *Renum* superficies, in qua jucundissime ramificantur vasa sanguifera, quæ *Renes* subeunt ac eorum serobiculo ad aortam & venam concavam vergente. Innumeri nervuli à plexu renali oriuntur, illisque perpetui sunt comites. Ea omnia membranacea vaginâ includuntur & nervi in ejus substantiam dispenantur. Dein vasa illa

externum, *Renum* substantiæ partem excurrunt & minimas glandulas percurreunt, ex quibus integra illa interior substantia est contexta. Glandulæ istæ vasis adnascuntur, ut acini racemi trunco. Hoc modo tubulos fabricant peculiari tunica comprehensos. Tunica ista partim ad capsulam, partim ad *Renum* cavitatem *Pelvis* nomine exportantur. Cuncti hi lobuli exilibus filis tendinosis sibi invicem coherent. Ex minutissimis his glandulis, & quidem singulis prodeunt vasa excretoria. Recta linea ad *Pelvis* usque viciniam descendunt sibi invicem incumbentes. Cum sub tunica, quæ *Pelvis* interiùs circumducit, pervenerint, in plurima vasa coeunt, & majorem tubulum efformant. Tuberculus iste in *pelvis* aperitur, & circa istius orificium advertitur tuberculum, quod *Papillam* nuncupant Anatomici. *Pelvis* quoque cavitatem membrana obvallatur crassissima, quæ ab expansione oritur tubulorum, qui ipsam pervadunt. Adeò angustia deinde reperitur versus *Renis* serobiculum, ut vas effingat penam anse in crassitie. Constant ergo *Renes* glandulis, in quas desinunt arteriolæ, venæ, nec non ramuli ureterum, per arteriolas nempe liquor deferitur in glandulas *Renum*, in quibus separatur urina, ac ramulis ureterum excepta propellitur ad vesicam, instar sequentis experimenti. Si scilicet tepidum per syringem in arteriam injicias emulgentem, pars crassior redibit per venam emulgentem, & serosa portio sequetur in *Renem*, ac per *pelvis* in ureterem deferetur. Unde patet, quòd *Renes* facti sint ad segregandam à sanguine serositatem quandam salam, quæ à glandulis in illorum pelvis depluit, & inde per ureteres à peritonæo & tunica propria productos in vesicam delabitur, qui liquor vulgo *Urina* appellatur.

§. 3. Hactenus partem affectam recensimus, *Diagnosin* nunc *Signa* *Diagnostica* paucis investigare & subijcere incumbit; ubi præmonendum ducimus, non omnia in omnibus concurrere signa, sed nonnulla in his, alia in aliis, prout sæpe causæ secundum magis & minus, & corporum dispositio variant. *Tumor scirrhusosus Hepatis* sæpe cognoscitur à situ partis, ubi è regione Hepatis in hypochondrio dextro dolor occurrit gravans ac obtusus, & simul adest faciei pallor, & ægri cachexia laborant, imò sæpe emarcescunt & tussiculæ per intervalla infestantur, sæpe adest ventriculi tumor, interdum & ascites conjuncta est malo altiores radices habenti, lymphæ enim visceris hujus vasa exsiccatione nimia occlusa, ingredi prohibita, in suis vasibus exundante copia distensis ruptive hinc inde fibris in lacinias laceras desciscere solet, hinc & iucavum abdominis effluere hanc lympham posse, nemo est, qui dubitat. Tumor externè in abdomine haut longè ab umbilico dextram versus tactu aliquando percipitur, respiratio est impedita ob tumorem istum hepatis, ita ut viscera abdominis magis resistent motui diaphragmatis. In obstructione Hepatis decubitus in sinistro latere gravis est, quia tum Hepar ad latus istud vergens & ventriculum comprimendo ciborum digestionem impedit, & ipsum simul dolorem patitur, quòd ventriculus ei fortius resistat.

Sic quoque *Lienis* Tumor *Scirrhusosus* ea *Lienis* dem ferè habet signa, nisi quòd in sinistro *Scirrhusi* latere percipitur tumor, ægri sunt tristes & me-



& melancholici, respiratio est difficilis, semper de frigore conquiescunt. & sepe eadem symptomata patiuntur, quæ hypochondriacosprehendunt. In variis & vehementissimas autem perturbationes incidunt, circuitus enim sanguinis in liene impeditur, ex qua stagnatione varia insequuntur symptomata. In Scirrho Lienis dolor non est acutus, quamvis Lien multos habeat nervos, & hoc inde evenit, quod nervi non rectè ad cerebrum ferantur, sed huc atque illuc transcurrant. Tumor percipitur externè & sepe extendit ad umbilicum.

*Renum  
Scirrh.*

*Scirrhus Renum* ex aliis cognoscitur signis, ægri enim urinam nullam vel paucam excernunt, dolor lumborum adest ferè continuus, & in anteriori affectu aut hydrops sequitur aut atrophia. Sed cum signa hæc omnia sint plerumque fallacia, & non deitur pathognomonica, sed ut plurimum post mortem ægrotantium sectione ex vilcerum induratione, obstructione & colore conspiciantur, plura addere non libet, sed prudentis & circumspècti Medici omnia rite pensantis iudicio committimus.

*Diagnosi  
Vlceris He-  
patis.*

*Vlceris Hepatis* cognoscitur ex dolore ardente, pulsante & mordicante in hypochondrio aut præcordio dextro, tussi molesta & difficili respiratione ob diaphragma compressum; quæ symptomata cum in phthisi etiam occurrant, morbus interque dignosci possunt ratione loci, quem dolor potissimum invadit. Faciei color citrinus apparet aut ictericus, & interdum pustulæ in eadem efflorescunt parvæ, à particulis salinis acidis cutem erodentibus, ex ulcere sanguini & succo nutritivo communicatis productæ. Ulcere cavum Hepatis occupante dejectiones alviæ sunt purulentæ, quibus interdum aliquid cruentum intermixtum est, cum dolore intestinorum, eo quod materia corrodens in transitu suo ipsa vellicet intestina, & hinc affectus hic dysenteriam mentitur, abs quo tamen distingui debet ex eo, quod sensus pungitivus & gravativus hæreat circa ipsum hepar, aliquando etiam portiunculæ quedam hepatis excernuntur. In convexa seu gibba hepatis parte Ulcus si lateat, urina observatur purulenta, absque ullo renum aut vesicæ affectorum indicio. In progressu morbi febris exoritur lenta, tandem in hæticam degenerans, unde æger atrophiam consumitur, & omnium ciborum, maxime verò carnis fastidio laborat, halitus foetet, & tandem frequentibus corripitur animi deliquiis.

*Lienis.*

*Vlceris Lienis* ab Ulcere H. patis distinguitur ob situm partis, purulenta enim materia interdum per alvum, vomitum vel urinam evacuat, dolor tamen pungitivus est in sinistro hypochondrio, nonnunquam se ad diaphragma & sinistram usque humerum extendens, decubitus in latere dextro difficilis est, quod Lien versus intestina procumbat, in sinistro verò adhuc difficilior, quoniam ventriculus & hepar cum intestinis eundem comprimunt, & hinc dolorem augent. Præcessit Ulcus abscessus inflammatione excipiens, ex tumore doloroso in sinistro hypochondrio conspicuus. Situs urget, cibi fastidiuntur, & linguae lentor quidam nigricans adherescit, cum oris amaritie, cutis & potissimum faciei colore fusco. Aliquando febris invadit ægrum intensior, modò tertianam, modò quartanam præ se ferens, & vigilæ ægrotos macerant, donec ipsum succedat delirium.

*Vlceris Renum* cognoscitur ex purulenta materia cum urina perseveranter excreta, cui aliquando particulæ quædam carnosæ seuramenta carnea sunt intermixta. Dignoscitur verò ulcus hoc ab aliarum partium, & potissimum vesicæ exulceratione per situm doloris, qui hoc in affectu circa regionem lumborum cum gravitate quadam percipitur, & in ima spinæ parte & coxendice. Quantitatis materiæ purulentæ in hoc ulcere maior est, quam in ulcere vesicæ, & urinae magis permixta, unde hæc lacti similis profunditur, donec longè post mixtionem pus segregatum in fundo matulæ subsidet. Non adeo etiam urina hic foetet, quam in ulcere vesicæ, nisi exulceratio diuturnior destructis pluribus tubulis liquores corrumperit, & diversorum salium inconveniens facta sit mixtura, & tum urina non modò graviter foetet, sed micosam quandam materiam & lividam intermixtam secum fert. Erolis variis sanguiferis effluit succus contentus, qui urinae commixtus, eam reddit sanguineam, & dumero: i.e. particule carneæ nonnunquam crassiores exsultat, quam ut per ureteres facilius inveniunt transitum, inter meandum dolorem excitant nephriticum per omnia similes, & valde mordicantem, potissimum quando ureteres à materia purulenta acriori jam lacti existunt & aliquantum excoriati.

*Vulnenum* horum vilcerum signa diagnostica *Vulnenum* petuntur ex profunditate vulnerei, si enim est in *Hepatis*, dextro latere tribus u. c. ab umbilico distans, eoque superius, & versus ipsas costas obliquè procedens, estque profundum, si specillum Chirurgi ultra digitum cum dimidio longitudinem intrudatur, *Hepar* esse læsum, facie cognosci potest, si quoque multum sanguinis ex vulnere manat, si dolor intensus est evomunt bilem, & in ventrem melius oecumbunt lauciati.

Si in sinistro latere vulnus profundum fuit *Lienis*, illatum infra ventriculum circa lienis situm, & sanguis ater effluit, de *Liene vulnerato indicium* aliquod haberi potest.

In *Renibus vulneratis* urina vel supprimitur, & *Renum*, vel difficulter redditur, & quæ excernitur, est cruenta, dolor ad inguina extenditur; quæ omnia per conjecturam deprehenduntur, ex situ potissimum vulnerati, ex symptomatum differentia, ex sanguine aliisque excretis.

§. 4. *Causa* horum affectuum magis quam *Ætiologia* gnosis patet: ut tamen pro more nostro ætiologiam ordine constituamus, aliorum sententias ante nostram collocatas prius dabimus expositas, quorum ordinem ducent ipsi *Galenicis* accussantes in *Hepatis Scirrhi* uti & in *Lienis & Renum*, humores crassos, viscidos, & glutinosos, sive pituitosos & melancholicos, vel per fluxionem, vel per congectionem in vilceribus hisce copulatos, & meatus eorundem obstruentes, quales humores sæpius relinqui putant ab inflammatione, vel aliis obstructionibus à bile vel pituita productis, in quibus post resolutionem partium tenuiorum crassiores remanent. Humorum verò crassorum, pituitolorum aut melancholicorum productionem facilitari putant à prava victus ratione, cibis nempe crassis, frigidis & viscosis, ab ipso temperamento

Xx 2

pitui-

pituitoso aut melancholico, & nativa quadam viscerum horum constitutione, juxta quam ex Galeni effatu, Hepar à scirrho facile occupatur, quòd viæ ejus strictæ sint, & sanguine crasso nutriatur, Lien, quòd sanguinem crassum recipiat, & Renes, quòd itidem sanguine crasso nutriantur. Ex inflammatione aliisque tumoribus quòd Scirrhi facile oriuntur, causam adscribunt immodico medicamentorum discentium, vel repellentium usui, quorum priora partes subtiliores dissipant, posteriora verò refrigerando & constringendo materiam incrassant, & resolutionem omnimodò impediunt, quibus omnibus adjungunt materiz morbosæ propriam frigiditatem & crassitatem resolutioni non cedentem, ac partium debilitatem, ob quam humorum attenuationem & transudationem sufficienter nequeant promovere.

*Ulcera.*

*Ulcera* viscera hæc eadem occupantur originem imputant humorum acrimoniz substantiam eorum corrodentem, vel materiz putulentæ acri post ruptum abscessum vel inflammationem in iisdem flabulantem, & in Renibus speciatim calculo extenuitibus suis acutis renes lædenti, & vulneranti vala, ex quibus sanguis effluens abeat in suppurationem.

*Vulneribus.*

*Vulnerari* hæc viscera norunt à causis externis violentis, scindentibus, secantibus, pungentibus vel contundentibus, ut sunt diversimodò armorum & telorum genera iisdem hostili manu, aut infortunio quodam impulsu.

*Paracelsi  
opinio de  
causa He-  
patis, Splen-  
is & Re-  
num Scir-  
rhos.*

§. 5. *Paracelsus* adeò necessariam ad vitæ productionem & nobile viscus existimat esse *Hepar*, ut non modò Jovem ipsum in corpore constituat, & sanguinis originem eidem tribuat, sed tam quoque salutiferum, ut aliquando in istas abreptus fuerit cogitationes, ipsum hoc viscus non laborare, aut overe morbos, sed in regione saltem ejus hucce dominari, distantia nempe à stomacho ad hepar, ab hepate ad renes, & ab intestinis ad latus, sive à colitis ad intestina, qua in regione producti morbi hepatis attribuantur, quod per se non habeat qualitatem, nec infringidet, nec calefaciat, sive elargiatur complexionis & morbos; oppilationes autem hepatis attributas, sive quæ in regione hepatis colliguntur, exoriri à tartaro, vel per substantiam tartari & ab aëre, vias scilicet obstruente tartaro, ut aër elementalís per totum corpus transiturus retineatur, & in crassitudinem & secundam generationem transeat, cùmque simul intermixtum sit sal aliquod vitriolatum fortius indurans, *Scirrhosam* inde emergere statuit duritiem.

*Spleni* non exiguum tribuit malitiam in hoc potissimum constantem, quòd durities generet, febres concitet, putrefactiones, oppilationes, & similia plura, eadem tamen ratione per tartarum, aërem & sal vitriolatum, quæ in hepate jam fuit explicatum.

Similiter ipsis *Renibus* morbum hunc obvenire opinatur, accedente sale vitriolato in lapillos concretescente.

*Ulcere.*

*Ulcera* partibus hisce contingere pronunciat ex eodem sale vitriolato, ob propriam earum debilitatem copiosius suscepto & in his corrupto, adeò ut erodentem vim ex seipso nascatur, & non modò partes primò in tumorem attollat cum dolore in illas agens, sed tumores etiam illos dein erodens ulcera faciat cava, instar vitrioli circumjacentes partes depalcantia.

*Vulnerari* viscera hæc fatetur ab externis telis in regionem eorum tam profunde ictu, pun-gendo, vel explosione adactis, ut viscera ipsa non modò attingant, sed penetrent, & substantiam eorum divellant.

§. 6. *Helmontius* Hepatis sanguinis elaborationi propoliti, Splenis in regendis coctionibus principis, & Renum lotium pro vesica separationum *Scirrhus* originem habere dicit à mucilaginis quadam crassa, post digestionem in visceribus hisce residua, canalibus eorum adherente, & hospiti jus tandem violante, sicque partibus insidante, quem hospitem viscera hæc subigere non valentia. ma ore nilu flagrent cum expellendi, & cùm appetitus hic non stamplicus rationis sive imaginatum, sed in eas quoddam surrexit seminale, propter conceptam ab Archæo ideam sibi impressam, & materiam inducit exoticam in omnem morbosum feminis perfectionem, potestatem licendi dotatam materiam juxta imaginem induta passionis agere incipere in membrum hospitale, eo quòd ipsi jam insit morbus semine efficiente potius, qui tandem pertinaciùs connexus, sæpe victor, vitalem facultatem viscerum horum in sui subigat clientelam, morbosando nimirum, & contagio suo partes has, quibus insidet, conformes reddendo. Cùm verò partes hæc lassationi & hujus termino sint obnoxie, è contra character, sive idea feminalis jam concepta sit indefessa, necesse esse, velut convocatis viribus Archæi morbus ille pro-scribatur per crisin, vel robore morbi sponte exantato orbetur vi agendi, sicutque applica-tiones & Scirrhi, nisi loco victa pellatur, & fiat abscessus, vel præpollenti medicaminis vi pel-latur.

*Ulcera* invadere hæc viscera annuit, ut alias partes, & ab eadem origine pendere, frequentiùs autem ex apostemate pronasci, vel *Vulnere* male curato, quòd ab externa causa lædente violenter per corpus ad viscera hæc pro-trusa inducitur.

§. 7. *Vitis* si consilium de causis morborum præsentium, facile percipimus *Scirrhus* Hepatis, Lienis & Renum à diuturniore eorum ob-struptione pronasci, dum conflumitis partibus spirituosioribus partes sanguinis terrestres remaneant, quas salinæ à volatilitate in acorem degeneres arripientes in tumores scirrholos coagulantur. Ad obstructionem verò hujusmodi humorem nervum imprimis aptum esse, qui adeò depravari possit, ut spiritus deprimitur & partes salinæ in fluorem degenerent, corpuscula terrestria sibi adsciscentes, & mineram quandam tumoris constantes, abs qua liquoris jugiter affluentis supplementa in partem vitiositatis indolem pervertantur. Liquoris autem nervi portionem ad viscera hæc cum sanguine pervenire adierit, in quam, tanquam communem massam variè resiliant liquores, quos in circuitu se-cum ferat, maxime cùm succus nervus quoad particulas suas spirituosas summè necessariis existat ad secretionem in visceribus peragendas, & sic nulla cum difficultate lymphæ immisceri posse, in qua varias excitet mutationes ab ordinario statu quandoque degenerans.

Salinas illas particulas fluorem nascentes, corrodingo viscera hæc in iisdem *Ulcera* excitare statuit; *Vulnera* verò eorundem produci eadem ratione, ut in aliis partibus, duna

*Vulneri bus  
Helmontii  
opinio de  
causis he-  
rum mor-  
borum.*

*Ulcera  
causa  
Heparu,  
Lienis &  
Renum  
Scirrhi.*

*Ulcera  
& Vulne-  
rum.*

dum instrumenta ludentia tam profunde ad viscera hæc intrudantur, & sic cum externis præmunimentis etiam ista lædi eorumque unitatem dissolvi.

*Juxta Sylvium* §. 8. *Sylvii* juxta fundamenta *Scirrhi* Hepatis Lienis & Renum tumorem originem sumunt ex diuturniore eorum obstruktionem ob sanguinis nimiam viscositatem, coagulationem, inspilationem, aut pituitosi humoris intermissi nimiam copiam, quarum causa nec bilis secretio in Hepate, nec sanguinis plusquam perfectio in Liene; nec urinx aut feri separatio in Renibus peragi queat, sed in arterioli aut venis hærens sanguis arctius inspissetur, donec diuturniori mora omnem impediat transitum, potissimum si coagulatio inducta sit ab acido nimis austero, unde sanguis & pituita firmiorem & magis renitentem acquirant duritiem.

*Ulcera & Vulnera.* Ab acido illo acriori vasa & putatum ab eo viscerum horum parenchyma erodi, & *Ulcera* in iisdem excitari statuit, de *Vulnere* ortu cum cæteris planè consentiens.

§. 9. *Cassianus* visceribus hæc. Jecori nempe, Lienis & Renibus *Scirrhus* accidere docent, dum ex sanguine per arteriorum ductus particule crassiores, lanceolatz, paxillares, scabræ, solidiores & inæquales non modo ductilibus, sed acinis etiam glandularibus & cellulis viscerum horum inferuntur, quæ non modo ipsæ ad motum ineptæ sunt, sed volatiliores, ramosas & porosiores in motu impediunt, lymphæque subtiliori à succo nervæo refluxu segregatz se immiscunt, eandem coagulant, & spissam reddunt, unde tubulis obstruuntur, & vel absumunt, vel coagulatis salinis & spirituosius volatilibus fixiores & crassiores juxta succos stagnantes indies accumuluntur, & ab impetu lymphæ de novo affluentis, nec coagulatum resolvere valentis, arctius compingantur, donec in caseosam istiusmodi omne fluidum abeat duritiem, distributione succorum & segregationi bilis in Hepate, liberationi sanguinis à graviore lymphæ sarcina in Liene, & urinx secretioni in Renibus maxime incommodam.

*Excellere* eadem hæc viscera docent, quando particule quædam lymphæ adeo sunt acutz, ut fibras glandularum & tubulorum divellant, ut ii succos reddant contentos, qui multis gladiolis postmodum & ipsi dicati, idem, quod priores, agere pergunt, destruendo nimirum & divellendo tubulos vicinos, quam cladem ætherez particule furiosius concitate per angustatos poros solæ introitum repientes immane quantum promoveant.

*Vulnera* §. 10. *Vulnera* Visceribus hæc inferri concedunt ab instrumentis externis, violenta manu, aut alio quodam infortunio per exteriora corporis integumenta in ipsamet hæc viscera adactis, ut continuas eorum inde dissolvatur.

*Notra sententia de causa Scirrhi hepatis.* §. 10. *Notram* nunc ut aperiamus mentem, asserimus utique causam *Hepatis*, Lienis ac Renum *Scirrhi* ejusdem esse generis, glandulosorum nempe corporum horum tubulorum obstructionem diuturnior, quandoquidem in visceribus hæc æquæ ac in aliis corporis partibus circumfusus humorum circulantium impeditur, quo facto necessario fit tumor. *Scirrhi* enim ut plurimum oriuntur in partibus glandulosis, ab acido coagulatore summo, humores non tantum spissiores & ad circulationem ineptos reddente, sed

ipsam circulationem impediende, in poris enim horum viscerum per acidum nimium & fixius humores coagulans, non duntaxat congeriuntur liquores, sed aliquando in gypseam plarè abeunt duritiem. *Scirrhus* enim accidit, cum humores partem aliquam obstruentes indurantur, partium condensatione simpliciter, partim coagulatione, ob humorum quippe acridineu sanguis corruptus & inspissatus Hepatis machinam permeare impotens, eam obstruktionibus reddit imperviam, & scirrhositatebus obidet, quo enim acidum fixius & simul humores aggreditur spissiores, eo scirrhosus tumor vel durities major est. In Hepatis obstruktionem pleraque vasa capillaria, & tubuli minimi sunt obstruuntur, tum quæ quia sanguis & lymphæ satis copiose non influunt in Hepatis substantiam, pori subidunt, & ita Hepar obstruitur, si verò capillaria vasa obstruantur omnia, necessario sequetur inde magna conturbatio totius economiæ animalis, ob magnam portionem circulationis humorum ablatam aut impeditam.

In Obstruktionem *Lienis* ipsa cavitas occupata. *Lienis*, qui concipiendus est tanquam arteriadilatata. Certum enim est, & lympham in viscere hoc transcolari, verum si lymphæ crassior, viscosior & tenacior evadat, aut particulis terrestribus sit inquinata, vel sale crasso & rigido facta, non raro pori glandularum obstruuntur, cumque particule fluidiores serosæ præ terrestribus & salinis se facilius accommodent angustis glandularum poris, hinc iis secedentibus succellu temporis glandulæ obstruuntur à terrestribus particulis & salinis rigidioribus, quæ se angustis pororum accommodare nequeunt. Hæ glandulæ si à materia tantum viscosa & tenacium terrestribus mixta in visceribus hæc obstruantur, tumores oriuntur, si prædominentur sales, degenerant in abicellic cancriferos, particule verò terrestris si prædominium tenuerint, degenerant in *Scirrhus*.

Eadem ratio est de *Scirrho Renum*, cum enim lympham in renibus collecta crassior sit, & copiosioribus abundet particulis ipissis terrestribus, quàm ut post urinx secretionem & per ureteres amandationem in vesicam tubulos renales transfluere possit, & simul ab acido coaguletur, obstructio primum, & dein ipsa scirrhosa oritur durities.

*Ipsi Hepati & sunt Ulcera*, quæ oriuntur ut plurimum ab inflammatione, chylum enim acidum sanguineum massam ita inspissare posse quis dubitat? unde ad circulandum inepta evadit. Exinde obstrukciones prius in Hepate sunt, particule enim caseosæ chyli in tenerioribus Jecoris canaliculis eodem figunt, imprimis si sunt nimis viscidæ, ut eos tubulos permeare non possint, hinc tubuli obstruuntur, liquores postmodum, qui continua circuitione circa obstruktionem commorari coguntur, incallescere ineipiunt, imprimis percurrente æthere, atque hæc incallescencia inflammatio dicitur. Succus interitum ibi tardius circulantes, vel planè evasit acorem contrahunt, & pus conficiunt, quod nihil aliud est, quàm succus chylois leviter coagulatus, hoc autem si diu in parte stagnet, fiet, hinc pus non unius formæ est, sed cruentum & aquosum, nam vascula erola sanguinem & lympham aliquatenus adhuc adferre solent, non mirum ergo videri oportet, ægros in morbo hoc extreme esse

emaciatos, cum omnis succus nutritius continuo corrumpatur.

#### Lienis.

*Lienis Ulcus* patitur ab obstructione tubulorum & vasorum ejus oboriri potest, quàm inflammationo, & hanc fibrarum vascularium & glandularium disruptio excipit, quoniam violentior rapidioris ætheris transitus, cui solivia quædam patet, sine nova fibrarum fieri nequit sed hæc facile franguntur, ut liquores, quos continent, effundant, qui ab acido illo obstructiones fovente coagulantur, corrumpuntur & in materiam transmutantur corrodentem, vicinas partes affluo destruentem. Absque obstructione prævia viscus etiam hoc exulcerari potest à liquoribus quibusdam valde corrodentibus ex sanguine per arteriolas, in glandulas lienis effusis, quæ ob teneritatem facilius, quàm arteriæ, earumque rami, quos sanguis iste corruptus transfluit, lacerantur & corroduntur.

#### Renum.

*Renum Ulcera* frequentius itidem ab eorum obstructione aut inflammatione, & exinde tubulorum dilaceratione oriuntur, quod & fieri potest à laceratione vasorum, vel à causâ violenta, vel à calculo, vel à pure acri, aliisque succis corrosivis per eos circulantibus, vel stagnantibus.

#### Vulnus viscerum horum.

*Vulneribus* horum viscerum causa, ut quorundam aliorum est continui solutio & divisio facta à vi & instrumentis externis, sunt ergo res externæ vel pungentes, vel scindentes, & continui solutionem in hisce visceribus facientes.

#### Prognosis.

§. II. *Prognosis* quod spectat, *Scirrhi* viscerum sunt curatu difficiles, imprimis Hepatis, qui sæpe transeunt in hydropem, ascitem, cachexiam, icterum; ut Lienis in melancholiam, icterum nigrum; Renum in ischuriam, dysuriam, aliosque morbos chronicos & difficiles curatu; ob hepar enim scirrhosum non tantum vascula splenica immensum usque dilatat, sed ob compressionem adveniens sanguinis, in ipsa intestina effunditur, unde sæpe dejectio cruenta & nigra.

*Ulcera Hepatis* sæpe sunt lethalia, corrupto enim chylo latex serosus intestina nonnunquam erodit, adeo ut sanguinea vasa sanguinem effundant, qui coagulatus per anum excernitur, atque sic extrema sua fata claudere debent, vel à defectu succi nutritii plane emaciantur.

*Ulcera Lienis* per se quidem vitæ tam cito non inferunt periculum, quatenus autem vicina viscera, ventriculum, intestina & hepar inficiunt, & succos corruptos ad eadem transmittunt, magnam excitare possunt malum, & corporis consumptioni facilius præbent animum. Curatio quidem est difficilis, sed si abscessum sequatur ulcus hoc, non omnimodò de ea est desperandum, quamvis diuturniorem interdum repocet temporis moram. Pluribus vasculis & glandulis corrosis, post sanationem ulceris hoc remanet æconomia animalis detrimentum, quod segregatio lymphæ sanguinem onerantis non tam commodè peragatur, & sanguis copiosiores retineat particulas crassas, & hinc non adeo redatur purus. Rarum quidem est ulcus hoc, sed non impossibile, & si in tempore ejus cognitio habeatur, melior ejus obinere curatio, quæ si quando nulla existit, causa est, quod citius non fuerit animadvertum.

*Renum Ulcera* curatu sunt admodum difficilia, imprimis quæ à calculo & erosione sunt excitata, quæ valde sunt periculosa, adeo ut exempla existant Renum omnimodò inde ablutorum, & *W. H. Junstrall, de Urinis cap. 6. p. m. 246.* in illustri Domina loco renis sinistri substantiam membranofam lumbis adnatam observavit vasorum & ureteris extremitatem complecti, ut absque ulla in ductis cavitatem aperturâ serofitas quædam arteriæ emulgentis osculis exsudans in ulcus sinuosum exterioris ferretur. Facile itaque Ulcera hæc in fistulas degenerant, nullam curam ulterius admittentes. Gravem aliquando emittunt factorem & purulenta materia cum urina ejecta stranguriam excitat valde excruciantem. Post diuturniorem materiam ejusmodi purulentæ effluxum, quæ cum multa quoque succi chylosi corrupti copia excernitur, corpus emaciatur, & tum mors sæpe adest in propinquo. Ab inflammatione tamen suppurata quæ producta sunt ulcera, non tam sunt periculosa, quàm priora, sed mitioribus comitantur symptomatis, & faciliorem admittunt curationem. Quo recentiora sunt, eo citius quoque curantur, inveterata verò curatu admodum existunt difficilia, quod etiam contingit ratione ætatis ægrorum, senes enim vix aut admodum difficulte, juniores verò citius & facilius à Renum hac exulceratione liberabuntur.

*Vulnera Hepatis, Lienis ac Renum* maxime periculosa sunt, Hepar enim constat ex acinis glandulosis, in quos desinunt vascula sanguinea apportantia suum humorem, & ramuli peribilarii, qui bilem in glandulis istis acinis separant accipiunt, quibus laevis magnus & sæpe immedicabilis producit affectus. Vulnera tamen Hepatis non omnia esse fatalia, comprobatur etiam *Celsus*. Hepatis vulnus feliciter curatum vidit *Cl. D. Schelhamer. Eph. G. Decur. 2. A. 5. Obs. 9.* Ita verò cum Ulcere Hepatis, Lienis ac Renum comparatum esse puto, ut ea, quæ vasa majora pertingunt, periculosissima sint & lethalia, raro enim sanantur, idque ob vasorum sanguiferorum copiam, præsertim si vasa maxima fuerint læsa, tum enim omnis sanguis in ventrem fluit, & mors insequitur, cui enim perfecta fuerit vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut tenue quoddam intestinum, aut ventriculus, aut jecur, ex *Hippocratis* edicto lethale est. Si verò aliter contingit, inter raro contingentia recensendum est, quia non potest facile hæmorrhagia sisti, ob loci difficilem aditum, si enim hæc magna vasa aperiantur, sequitur hæmorrhagia nullis remediis cedens, & quamvis magna illa vasa non lædantur, attamen vulnus Hepatis quantumvis exiguum, turbabit interim bilis separandæ negotium, quod tamen maxime necessarium est in æconomia animalis. Ubi verò textura membranosa & acinosa solummodo superficietenus, aut ut vulgò dicunt, parenchyma & vasa non adeo magna fuerint læsa, minus periculum est, cum substantiam etiam pulmonum vulneratam iterum coire notum sit, qui tamen in perpetuo notum magnisque arteriis referri longè plus habent difficultatis. Hepar enim, præterquam quod quietum est, paucas etiam arterias habet (ut & Renes) easque exiguas, venas autem plurimas. Quod si in bile sit balsamus quidam, multo facilius quoque ex hoc erit sanatio vulneris Hepatis.

Sic



Sic quoque comparatum est cum vulneribus *Lienis*, & eadem prognosis de hisce ferenda. Cum enim Lien cum suis vasis multum conferat ad sanitatem, quia in ipsis cuditur humor acidiusculus, qui in sanguine precipitat bilem, ut illa in acuius hepatis glandulosis tanto facilius separetur, hinc facile patet, quid mali vulnus Lienis accerfat agrotis. Et cum plures arteriolar. venæ & ramuli in reterum deferantur in Renes, & in illis sequestretur serosa portio à crassiore, quæ urina dicitur, hinc liquet, quàm periculosa sint *Vidua Renum*, & quàm difficulter possint consolidari, unde etiam facile intelligitur, unde proveniat sanguis cum urina excretus in Rene vulnerato.

*Dista.*

§. 12. In *Scirrhis* & Tumoribus istis rebellibus *Dista* volatilis & spiritus in statuenda. Aër vitetur frigidus, ob acidum enim succum malum auget, & majorem visceribus infert ariditatem, magisque coagulat humores, hinc aër fit temperatus. Viçtus sit tenuis & volatilis spirituosus, ut obstructio viscerum referetur, fugiantur acidi & viscidii, item salia. Potus sit laudabilis, & concedi potest vinum Cistatum: tempore æstatis concedi possunt acidula artificiales, vel nativæ maritales, ut sunt VVildungenses hac in vicinia. Svalbaccenses & Pyremontenses, sed modicè hauriantur, & non pro more hæcenus recepto mensuratum, quia fibræ magis inde distenduntur, & rumpuntur. Præ aliis commendo potum Theæ vel Coffæ vel Veronicæ more usitato altimendum. Motus sit moderatus non nimius, quia per exercitia vehementiora sanguis magis movetur & calidior redditur, atque ita magis distendit vasa, & omnes partes tumidiore redditi, & sic quoque tumorem scirrhosum auget obstru. ti Hepatis, Lienis, & Renum, quicquid auctus motum diaphragmatis magis inhibet, & sæpe respirationem plane abolet. Somnus & vigilia modum non excedens, alvus sit libera. Animi motus non sint vehementes, maxime verò hic moror tanquam acidi patronus & comes nocet, maximas enim cordis anxietates inferre potest.

In *Ulceribus* & *Vulneribus* horum viscerum *Dista* eadem conveniunt, quæ in ulceribus & vulneribus in genere observanda est, vitentur omnia nimium acida & salia, ægro in loco detineantur temperato, potus sint decocta vulneraria, vel Theæ, vel Coffæ: cibus juscula hordeacea, avenacea, quibus interdum aliquid mellis est intermiscendum, vigilie arceantur, motus medicritatem non excedat anxietates & exandescientia animi nullatenus occupent, intestinorum adstrictio referetur, quæ maxime nocet, cum purulenta materia ultra debitum retineatur, nec tamen alvi fluxus nimis diutius est permittendus, ne intestinorum fibræ nimis relaxantur, & sphincter intestini recti ad stricturam reddatur ineptus.

§. 13. Restat affectuum præsentium curatio *Pharmacencia-Chirurgica*, quam veteres & *Galenistæ* ita instituerunt, ut in *Hepatis* obstructionibus & tumoribus *Scirrhis* succos crassos debite præparatos à Jecore averterint, & tandem de corpore penitus eliminârint. Ad humores istos debite præparandos in usu habuerunt Symplicia, buglossa, calamentum, eupatorium, scolopendrium, thymo, pennis, bizantinum, oxymel simplex & compositum, quæ miscue-

runt decoctis radicum apii, petroselinii, asparag. buglossi, herb. scolopendr. eupator. fumar. calament. eichor. alkekeng. hyssop. marrub. flor. borag. violar. anthos. sambuci, sem. anis. fœnic. bismalv. additis interdum foliis senæ, epithymo, & polypodio, cujus mixturæ formulam à cupias, sequens tibi sit pro exemplo.

Rad. apii,

Asparag.

Petroselin.

Cort. rad. ebul. aa. ʒj.

Fol. borag.

Cichor.

Scolopendr. aa. Mj.

Eupator.

Marrub.

Hyssop.

Calamenth. aa. Mʒ.

Flor. violar.

Malv.

Sambuc.

Anthos. aa. Pj.

Sem. anis.

Fœnic.

Bismalv.

Alkekeng.

Utric. aa. ʒʒ.

Passular. ʒij.

Fol. Sen. ʒij.

Polypod.

Epithym. aa. ʒij.

Schananth.

Cinamom. aa. ʒij.

Cog. in f. q. aq. simpl. vel pluvial. ad ʒij.

In Colatura dissolv.

Syrup. de pomis,

duob. radicib.

Bizantin.

Oxymel. compos. aa. ʒij.

M. F. *Apozema*, de quo lingulis diebus horâ matutinâ exhibeantur ʒij. vel vj. Humorem crassum & feculentum languini perunctum postmodum ab Hepate averterunt, sectâ scilicet primùm venâ internâ dextri aut sinistri cubiti, prout hæc vel illa magis apparuit. & quidem si sanguis crassus aut ater effluxit, eundem majori copia aucter emiserunt, sin floridus fuit & tenuis, eum citius supprellerunt, & ad alvum sollicitantia progressi sunt, exhibitis primùm lenioribus, ut inannâ, quam mel aliqui vocant æreum, electuar. diacatholico, diafœbsten, diafœnæ; posthac validiora in usum duxerunt, qualia sunt electuarium Indum, de epithymo, Confectio Hamech, vel pilulas, seu catapotia de Ammoniaco, sagapeno, opopanace, scetida, de funaria, de lapide Lazuli, in quorum usu per tempus aliquod perduraverunt, & purgationem sæpius reperiuerunt, interjectis apparantibus, cum succos crassos melancholicos una vice non satis evacuari posse perspexerint. Materiam crassam & induratum *Scirrhi* postmodum magis adhuc emollire & discuere studuerunt internis sinuul & externis remediis, trochiscis nempe de absinthio, rhabarb. cappariibus, eupatorio, laccâ, electuario diacurcuma, adjunctis gummi Ammoniaco, bdellio & sagapeno, vel pulverum, vel Rotularum, vel electuariorum forma intus exhibitis, externè verò Hepati indurato aut hypochondrio dextro vel fuso, vel linimenta, vel cataplasmata, vel emplastra admovent ex ma-

*Galenicum  
vum cura  
in Hepatis  
Scirrhis.*

lactis five emollientibus composita, intermixtis simul leviter adstringentibus ad robur visceris hujus conservandum, prout formulæ quædam sequentes eorum componendi & applicandi modum indigebunt.

*℞. Rad. aristol. rotund.*  
*Irid.*  
*Oryon.*  
*Lil. alb. aa. ʒvj.*  
*Ulm.*  
*Mandrag. aa. ʒij.*  
*Fol. malv.*  
*Alth.*  
*Abfynth.*  
*Hysocyam. aa. Mj.*  
*Flor. Chamomill.*  
*Melilot.*  
*Samoluc.*  
*Rosar. aa. Pj.*

*Sem. lin.*  
*Alth.*  
*Anis. aa. ʒss.*

*Cog. in aqua & vino, & spongia in decocto hoc calido humectata foveatur hypochondrium dextrum.*

Post focum, vel eo etiam non adhibito, si cataplasma imponendum utile visum fuerit, sequenti formulæ compositum maximè putarunt esse convenientis.

*℞. Rad. lil. alb.*  
*Alth.*  
*Irid. nostr. aa. ʒj.*  
*Fol. malv.*  
*Alth.*  
*Origan. aa. Mj.*  
*Flor. Camomill.*  
*Melilot.*  
*Summit. abfynth. aa. Pj.*  
*Sem. cummin. ʒss.*  
*Bacc. linri ʒij.*  
*Spic. nard. ʒiss.*  
*Croc. ʒj.*  
*Butyr. recent.*  
*Axung. anas.*  
*Anser.*  
*Medull. vitul.*  
*Ol. irim.*  
*Lil. alb. aa. ʒj.*

*Gumm. Ammon. in vino alb. generoso solut. ʒj.*

*M. F. Cataplasma,* regioni hepatis aut tumori scirrhoso imponendum.

Quibus verò pro cataplasmate linimentum aliquod placuit, iis sequenti modo suaserunt parandum.

*℞. Gumm. Ammon. in acet. solut. ʒj.*  
*Galban. eodem modo solut. ʒvj.*  
*Medull. cerv. ʒss.*  
*Axung. gallin. ʒss.*  
*Butyr. recent. ʒij.*  
*Ol. amygd. dulc.*  
*Alfynth. aa. ʒiss.*

*M. & F. Linimentum.*

Nimis etiam opereose, sed absque ullo commodo, & minùs proinde prudenter abs quibusdam hujusmodi remediis intermixta fuerunt hepata animalium, & præ aliis lupi, quasi propter analogiam quandam hepatis in corpore humano laboranti illa vigorem quandam sint impetitura, quem tamen post mortem animalis omittunt, &

fuccis potius salibus volatilibus prægnantibus, & ipsibili in acceptis ferendum, quod Antiqui ipsi hepatis corpori & facultatibus ejusdem attribuerunt: sed ignoscamus simplicitati illi, quam defectus experientiarum, & exinde ratio non satis illuminata foverunt, & videamus, quomodo per emplastrum curationi huic colophorem tandem imponere studuerint. Etenim quando vel prædicta medicamenta voto eorum responderent noluere, aut materia scirrhosa ab iisdem emollita ulterius discussione fuerit præparanda aut dissipanda, emplastrum impoluerunt de meliloto, aut de clypeo humida, aut de eupatorio, aut ad scopum magis collinans ex tempore aliquod paraverunt, quale sequens monstrat formulæ.

*℞. Gumm. Ammon.*  
*Ladan.*  
*Mastich.*  
*Styrac.*  
*Propol. aa. ℥ss.*  
*Galban.*  
*Thur. aa. ʒij.*  
*Terebinth. ʒiss.*  
*Ol. nard. &*  
*vin. aa. q. l. ss. f. s. a. Emplastrum.*

Hoc modo Scirrhum traditū hepatis, & eorum eorum ab hac cura differt ea, quam in *Lienis* ea in *Scirrho* instituerunt, nisi quod fortiora quædam *rebo Lienis*.

prioribus addiderint medicamentis, quæ Lienis constitutionem facilius, quam reliqua viscera ferre existimant. Fecerunt autem similiter in morbo hoc exordium ab emollientibus & digerentibus materiam crassam & limosam per Lienis substantiam dispersam, quibus statim evacuantia substituerunt. Inter digestiva & emollientia celebrant decocta ex rad. gentian. peucedan. runc. silvestr. anchus. cynogloss. cort. rad. cappar. tamarisc. salic. hæg. chamodr. scolopendr. culcut. calamenth. trifol. aspalathum redolent. polii, abfynth. sem. periclym. portulac. agni cast. in aqua & aceto, vel aceto solo aut oxymelle parata, in quibus etiam dissolverunt syrupos de scolopendr. dethymo, aut epithymo, vel oxymel quilliticum agris ad tempus aliquod propinquant, aut aquam chalybeatam cum portione quadam acetii aut oxymellis, ob quam facultatem quoque chalybis non parvo in pretio habuerunt aquam depuratum ex cote, dum enses aut gladii chalybei acuntur, defluentem, aut lutum ipsum ex cote naxia dum ferrum accutitur collectum, exsiccatum & pulverisatum in aceto exhibuerunt, & ut citius juvamen aliquod agris impertiantur, ipsius chalybis (scobem, vel scorias ferri pulverisatas in aceto, vino tenui, aut decocto scolopendrii aut tamariscii in usum duxerunt. Folia hederæ cum semine periclymeni in aceto decocta, nec, non gummi Ammoniacum & bdellium in vino soluta, aut trochiscos de bdellio, scolopendrio, laccæ, agrio casto, capparibus in decocto exhibitos valde laudarunt; ulsurpatis ad tempus aliquod incidentibus, aperientibus & digerentibus hisce, ad majorem humorum vitioforum & crassorum abundantiam evacuationem catharticum aliquod præbuerunt, quo tutius & felicius, ut putarunt, postmodum ad priora incidentia iis liceret revertere, cujus gratia ipsis in usu fuerunt infusa ex polypodio & epithymo, cum syrupo aceto

ant

aut melle rosarum laxativo, electuar. diacathol. diaphen. diamann. Indum Confectio Hamech, Hier. diacolocynth, Pilulæ Indæ, ex lapide Armeno, Lazuli. de fumo terre, quorum uno vel altero si vitiosa materia educta fuerit & imminuta, pro meliori emolliente & digestionem tumoris externa etiam præsidia adhibuerunt hypochondrio sinistro, uti sunt fotus cum spongia ex decocto rad. Irid. alch. lil. bryon. fol. icolopendr. malv. summit. aneth. absinth. flor. genist. melilot. chamomill. stoechad. sem. lin. fenigr. tamarsic. in vino albo parum diluto, linimenta splenetica ex oleo lilior. cappar. Irin. amygd. dulc. axung. anser. accipit. ursi, taxi, emplastrum de melilot. diachyl. ceroneum, vel quod sequenti modo paratur.

*℞. Ol. Cappar. ʒij.*

*Pingued. anser.*

*Medull. vitul.*

*Cer. aa. ʒj.*

*Gumm. Ammon.*

*Bdell. aa. in acet. dissolut. ʒij.*

*Acet. acer. ʒß.*

*Cera q. s. ni F. mollioris consistentia emplastrum.*

Ad digestionem etiam maiorem ipse *Galenus* adhibuit fotum ex flos floris in vesica incluso, vel aceto, in quo lapis pyrites fuit extinctus, unde etiam alii ipsum fumum commendarunt, qui ex aceto exhalat, dum lapidibus istis candentibus inspergitur, ut ager ad præcordium sinistrum eundem assumeret. *Archigenes* autem eo usque progressus est, ut ad fortius digerendum, & lienem abundum fæcem aceti acerrimi adhibuerit, cataplasma ex feminibus nasturt. fenigr. calce viv. & nitro melle exceptis, & perseverante malo post cutem in sinistro hypochondrio multis locis fæciditum eidem cucurbitulas imposuerit; *Ascarachab* malagna applicavit compositum ex cera, resina pini, picebrutia arid. arsenic. alum. scissil. calce viva & aceto tandemque amuleti instar ad lienem induratum *Asius* commendat sanguinem ex vena magis apparente post auriculam sinistri ipsius ægotantis extractum, ut lien isto aliquoties illinatur & confricetur.

*In Scirrhis Renum.* Non absimiliratione ad *Renum* indurationem & tumorem *Scirrhus* abigendum emollientia & leviter digerentia remedia necessaria duxerunt, & hinc iura pingua exhibuerunt & decocta rad. alch. polypod. glycyrrhiz. herb. adianth. flor. malv. chamomill. melilot. sem. lini, fenigr. melon. apii, petroselin. tribulor. ut simul urinam provocaretur: in quibus etiam pulverem exhibuerant gummi galbani & Ammoniaci, simulque externa adunxerunt linimenta & cataplasmata ex ol. lil. alb. amygd. dulc. chamomill. lini, radicibus altheæ in hydrelæo, coctis & diligenter subactis, sem. fenigr. flor. melilot. medull. suill. vitulin. cervin. pingued. gallin. ariet. emplastrum ceroneum, ex oesypo simplex & Philagrii, vel alia ex gummatibus & axungis cum cera & oleo lilior. modo superius indigitato composita.

*In Ulcere Hepatis* post abscessum factu diruptum solliciti fuerunt, ut abstersionem peragerent decocto hordei cum melle rosaceo, vel sero lactis, postquam pus per album aut urinam fuerit evacuatum, tum decocta vulneraria usurparunt ex agrimonia, scabiosa, eupatorio, absinthio, rad. Chinæ, caryophyllatæ, &c. Abscessu verò

nondum rupto, & suppuratione ad partem magis externam vergente, emollientia & suppurationem promoventia tum intus, tum foris adhibuerunt, propinando interne decoctum radicis altheæ, feniculi, fol. malvæ, agrimon. sem. anisi, caricarum pinguium in iure pulli potissimum factum; externe regionem hepatis fovērunt decocto florum chamomillæ, meliloti, feminis fenigraci. & cataplasma imposuerunt paratum ex radicibus liliorum alborum, altheæ, foliis malvæ, farinâ feminis lini, fenigraci, hordei, floribus chamomillæ, meliloti, liliorum, butyro recenti & axungia gallinæ; vellempastrum de melilot. cum diachilo mixtum, & tumorem suppurationem externe cultello ignito aperuerunt, ex quo si pus album & bene coctum effluere conspexerunt, spem haurire sanationis, sin rubrum, sæculentum & fœtidum, ad intentum ægri vergere pronunciantur. Quibus ergo de sanatione spes fuit, post abstersionem corroborantia exhibuerunt vulnerariis mixta, decocto nempe radicis caryophyllatæ, tormentillæ, valerianæ, pimpinellæ, herbarum agrimoniz, capillorum ʒis, ceterach, veronica, summit. centaure, min. feminis myrtillor. cum speciebus diatrion. santal. diarthod. Abbatis, & Symplo de hedera terrestri & myrtillorum, quibus interdum ad materiam purulentam evacuationem radicem rhabarbari immiscue runt, & consolidationem nletris emplastro de grana Dei absolvere studuerunt.

*Ulcus Lienis* curationem non multum à *Lienis* priore instituerunt diversam, reiectâ enim materia purulenta aliquando subalbida & cinerea, aliquando sæculenta & livida, interdum etiam nigra & humida, vel tubelcente, vix unquam verò purâ & concoctâ, vel per vomitum vel per fecellum, abstergentia & hic adhibuerunt, quibus visceri huic in specie dicata admiscuerunt, ex radicibus filicis, polypodii, rubiæ, fraxini, capparum. apii, gentianæ, rhapontici, viticis, herbis anagallidis, rutæ murariæ, ceterach, cuscute, cynoglossæ, scolopendrii, fumariæ, agrimoniz, hyssopi, polytrichi, tucuri, verbenæ, urticæ mortuæ, floribus caprifoli, lupuli, schœnanthi, genistæ, buglossæ, feminibus fraxini, charresoli, periclymini. viticis, quæ decocti forma propinquant, insimul species diacapparum & de terra Armena superdederunt, atque topica sinistro hypochondrio applicarunt, in quibus tamen adstringentia non adeo habuerunt curæ, nec diu continuarunt, quod lienem partem æstimarint minus principem, cuius robori tamdiu non sit studendum, emplastrum verò de Ammoniaco, & ut in Hepatis ulcere, ad consolidationem emplastrum de gratia Dei vocatum per tempus aliquod impoluerunt.

*Renum Ulcerum* curationem ita fuerunt ag-  
gressi, ut habita prius partis mittentis, accipien-  
tis & materiz transmissæ ratione, humores  
acres redundaturos vidu tenui prohibuerint,  
jam contractos lenierint & correxerint lacte ali-  
mino vel caprino, pusiana hordacea, emulsionem  
femin. melonum. encurb. decocto glycyrrhizæ,  
malvæ. seminis alkehengi, psalliarum Corinthia-  
carum. amylo, tragacantho, syrupo violarum, en-  
diviæ, nymphæ, quibus per tempus aliquod ultri-  
patis humores istos acres evacuaverunt: ita, cas-  
sia fistula, electuarium diacatholico, diaphanis tunc  
scammonio, syrupo rosarum aut violarum ex multa

multipli infusione paratis, infuso rhabbari, & balnea aquae dulcis instituerunt, non tamen adeo frequentem, ne virium exinde sequeretur solutio. Fortiora detergentia adhibuerunt in ulcere Renum sordido, decoctum nempe hordei cicerum nigrosum, glycyrrhizae, adianthi, parietariae, equiseti, asplenii, graminis, mulsam aut prisanam cum melle rosaceo, vel lac asininum cum conserva rosarum, quibus si ulcus satis mundatum fuerit & deterfuit, exsiccantia praebuerunt & adstringentia, ex radice tormentillae, acetosae, symphyti, herba caudae equinae, spodio, C.C.pp. terra Lennia, lapide haematit. sanguine draconis, corallii, cineribus, corticum cucurbitae, trochiscis de spodio, de alkekengi. de carabe, de terra sigillata, de balauistiis, vel pulverum in cremore petilanae allumtorum. vel tragenatis, vel electuariis, vel tabularum forma, nec decoctum radices Chinæ & ligni Guajaci à quibusdam neglectum, & cataplasmata ex gallis, ualcorio, balauistiis, rosis, plantagine, consolida. polenta, &c. in vino austero coctis, aut emplastrum diachalceos Renibus externè fuerunt impolita.

*Cura Vulnerum Hepatis.*

*Vulnere Hepatis* profundiora ut lethalia solis reliquerunt prognosticis, nec tela isdem adhuc infixa tam citò permiserunt extrahenda, ne subsequuta haemorrhagia copiosa simul effunderetur anima, superficialia verò conseruerunt, & ad praecavendam inflammationem secta vena aliisque topicis adhibitis, epithemate ex succo plantaginis, solani, portulacae, cydoniorum, & scirrhilibus, tum ut deastra illa Natura in consolidando vulnere feliciter progrediretur, eam adjuvant medicamentis adstringentibus & glutinantibus, qualia fuerunt, decocta saniculae, equiseti, caryophyllatae, consolidae, verbenae, mastichis, thuris, sarcocollae, trochisci de spodio, de terra sigillata, de carabe; foris vulnere confuto & abs quavis injuria externa custodito imposuerunt euema barbarum, vel ceratum de Malchitide, aut diaphanicum, & ad inguina transmissio sanguine post abscessus maturitatem tumorem aperuerunt, mundarunt & sinum sarcoticis implerunt, donec cicatrizantibus consolidationem absoluerint.

*Lienis.*

Eandem planè curam etiam instituerunt in *Vulnere Lienis*, adstringentia enim & glutinantia post necessariam vulneris confusionem intus & extus adhibuerunt, additis in superiore vulnere nominatis medicamentis, myrrha, opopanax, aloë, balsamina, pulveres adstringentes albumineovi susceptos vulnere imposuerunt, & consolidationem emplastro diachalceos promoverunt.

*Renum.*

Pari ratione in *Vulnere Renum* se exhibuerunt occupatos, etenim tum indigitata jam praebuerunt adstringentia & consolidantia, tum eadem in usum duxerunt remedia, quae in Ulcere Renum aliis soliti fuerunt usurpare.

*Paracelsi opinio de curando morbo Hepatis.*

§. 14. *Paracelsus* in morbis Hepatis quibuscumque materialem requirit medicinam, quandoquidem opus sit, si Hepati bellum gerendum, ut corpus quoddam, quod suas manus, & suos pedes habeat, pro eo depugnet, & hoc pacto materia adversus materiam procedat, & simile in suum simile agat, ea propter in Hepatis etiam *Scirrhus*, uti in reliquis morbis, eidem visceri ab aliis adscriptis Essentiam Spodii commendat tanquam vim & virtutem ejus singularem.

Ad *Ulcera Hepatis* magnis laudibus evehit

sum Cheiri, quo nihil praefrancius aut conducibilius esse asserit ad sanitatem Hepati conciliandam, hac tamen ratione praeparatum, ut à nigredine sua in albedinem sublimetur, & albedinè hanc cum vino vitæ bibendam esse praecipit, hac cum promissione, quod potu isto Hepatis apostematice natura ac putrefactio tollatur, omnisque ejus corruptio emendetur adeo, ut deinceps probe digerat & sanguinem rectè dispenset, nec illum saltem multum producat, verum etiam bonum & laudatum, nullis morbis fuscipiens idoneum, quin veterem & exoletum sanguinem renovet & ita emundet, ut eam lepra vanescat. Uterius etiam praestans in morbis hifce remedium aestimat anchos luteum per spiritum aquae vitæ resolutum & ita potum, quo univerfas Hepatis noxas & morbos sanatum iri confidit.

In *Vulneribus Hepatis* magnum commodum praestare credit liquorem Alcahest à coagulatione resolutum, & iterum in formam transmutatam coagulatum, tunc enim, si suum simile superaverit, medicinam cum hepatis fieri asserit medicinis omnibus superiorem, qui licet hepar ipsum ruptum & dissolutum esset, loco tamen totius hepatis esset, non secus, ac si nunquam ruptum & solutum fuisset, & propterea medicinæ operam navantibus unice expetendam.

*Splenis* malitia ut eradicetur, industriam lo-splenis eandem esse consulit, ut splen corporis examinatur, & splen externus immittatur, seu inferatur, vitam enim sine splene diuturniorem esse contendit, quàm cum splene, adeo ut homines eo commodè carere possint, hinc practicum omnem huc conferendam esse praecipit, ut beneficio splenis externi, non interni vivant, atque internus existipetur & radicibus consumatur, quod beneficio *Sutratat* fieri posse docet, abs quo liquorem ipsius separandum vult sine corrosivo, per retortam ad validum ignem, postea quinque abstrahendum, hinc *Cobos* omne cum vino vitæ ratificandum & propinandum. In fece quoque abs qua vinum vitæ separatum est, eandem virtutem & operationem querendum esse docet, uti etiam in *Cassa* rectè paratâ, dum videlicet ea in oleo olivæ maceratur, postea cum thî, & quadrante opopanax miscetur, & per alembicum destillatur, quod oleum regioni Lienis illitum splenem omnem auferre, & sic morbos ejus & noxas univerfas adimere, certò promittit.

*Renum* obstructionibus etiam *Scirrhus* li-  
quorem Tartari proficuum vendit qui etiam ipsos *Renes* sine omni noxa tolli posse per *Aroph* confidit, si hic per destillationem in pane in liquorem reducat & ita bibatur, sic omnem malum, quod *Renes* gignunt, auferri. *Ulcernum & Vulnurn* curam optimè fieri censet internâ mumiâ, quæ juvari potest hyperico, centaureâ, & brasellâ potionis formâ adhibitis.

§. 15. *Helmontius* ad oppilationes viscerum praesentium singulariter fontes Spadanos commendat, quibus tartarum coagulatum omnium optimè solvi posse, & spiritui vitæ liberam per omnia irradiationem conciliari promittit, quo facto omne nutrimentum *Scirrhus* tum *Hepatis*, tum reliquorum viscerum adimi, per transpirationem verò argentum quoque vivum *Scirrhus* Hepatis non semel abstulisse aperit pronunciat.

In *Ulceribus Hepatis* & dispositione ejus aposte-



apostematâ, oculos cancerorum diligenter usurpatos magnum præstare iuvantem, & reliquis remediis propterea præferendus esse, confidenter satis eloquitur.

Eosdem etiam cancerorum oculos in *Vulneribus* huius & aliorum viscerum proficuos esse recenset, uti potiones quoque vulnerarias de alcali participantes volatili, utpote cuius virtute omnes herbe vulnerariæ operentur.

*Lienis.*

*Lienis* quæ commoda præstari, & ad eum extra stomachi septa traduci possint admodum rara existere censet, attamen in *Scirrhis* ejus affectu oculos cancerorum vel in aceto solutos, vel in vino bullitos utiliter exhiberi statuit, nec non in ejusdem *Ulcere* & *Vulneribus* potionibus vulnerariis admixtos, propter alcali volatile, quod possident, eos accommodatos esse confidit.

*Renum.*

*Renibus* eosdem oculos prodesse, novit, & in *Scirrhis* & *Vulneribus* eorum laudabiles edere effectus. In *Ulcere* partium harum Spiritum *Œii* præ aliis commendat remediis, tanquam ulteriores destructionem prohibentem, & loca læsa sanantem.

*Œiiflamma  
curatio  
Hepatis,  
Lienis &  
Renum  
Scirrhi.*

§. 16. *Œiiflamma* curatio tumorum *Scirrhis* cum *Hepati*, tum *Lienis* & *Renum* in eo consistit, ut coagulatum corpus humorum inspissatorum resolvatur, & omnis ab hoc facta viscerum istorum referatur obstructio. hinc succorum vitioforum fabrica eliminetur, quo restantes spiritus exalentur, & novus eorum acquiratur proventus. Resolutio coagulati perficitur emollientibus, & partes terrestres diluentibus internis non solum, sed etiam externis remediis, quorum priora formâ decocti, vel destillati, vel potionis, essentia, tinctura, pulveris, electuarii, aliusque compositi parari poterunt. Apozemata, infusa & destillata in *Hepati*, *Scirrhis* componuntur ex radicibus apii, scrofular. cicorii, spic. Celsi rha-pont aristoloch. ebuli cort. fraxin. frangul. herbis marrub. origani, absinthii Pont. centaurei, eupator. floribus malvæ, sambuci, lignis Guajaci, santal. citrino. quibus ad sociatur vinum chalybeatum. In *Scirrhis* *Lienis* materiam præbent hinc medicamentis radices cappari, filicis, lapathi, fraxinellæ, polypod. querc. herbe scolopendriæ, capillor. Œis, chamædr. cochlear. epithymi, rutæ, flores genistæ, buglossi lignum salicis, cortices tamarici semina nasturtii, apii, urticæ, in aqua chalybeata. In *Scirrhis* *Renum* parantur ex radicibus altheæ, eryngii, lappæ majoris, filipendulæ, liquoritæ, malvæ, ononidis, levisitici, pimpinellæ, rubiæ, raphani rusticani, rusc. salic. parigl. herbis scordii, parietariæ, umbilici Œis, tragorigani, chærefolii, hyperici, anagallid. aquat. polytrichi, potentillæ, veronicæ floribus labarum, malvæ arboreæ, summitatibus lycopodi. feminibus altheæ, alkekengi, anethi, fœlicis ocyini. Potiones aliæ misceri possunt ex aquis simplicium destillatis, & syrups, ex quibus Hepati conveniunt aquæ marubii, serpilli, cuscute, agrimonie, chamamelæ, sambuci, Syrupi de eupatorio, de calamentha, & alii aperitivi: Lieni Aqua fumar. flor. genist. centaurei, min. Syrup. de fumar. byzant. de scolopendria; Renibus Aqua chærefol. Alkekengi, abrotani, hyperici, ononidis, verbenæ, urticæ, malvæ, syrupus capillorum Œis, altheæ, liquoritæ, quibus adlociari, aut etiam absque illis per se usurpati

possunt in *Scirrhis* Hepatis & Lienis, Tinctura Œis aperitiva, Œii. essentia agrimonie fumar. Spiritus gummi & salis Ammoniæ, faturni, tartari, Œis Œisatus, Œis Œisatus, terra foliata Œi, limatura chalybis cum Œepp. crocus Œis aperitivus, sal fraxini, tamarici, absinthii, genistæ, electuarium de chalybe Saxon. in *Scirrhis* Renum Spiritus Œi Œis, Œus cal. viv. sal. dulce Junip. Tinctura Œi, ligni salassæ elixir. proprietat. crystalli Œi, pulvis crystalli montani, lapis pumellæ, aselli pp. electuaria ex conservis pimpinellæ, betonicæ, malvæ, conditis radicibus eryngii, enulæ. Inter externa foras approbat ex decocto radicum Ireos, ebuli. cucumer. agrest. bryonia, herbarum chamædrys, mercurialis, florum chamomillæ, sambuci. vel etiam ex aqua calcis vivæ, cum spongia regioni Epatis, Lieni vel Renum adhibitos, nec non unguenta ex oleo Irmo, sambuci, lilior. capparii, Philosphorum, axungia leonum, struthionum, aratis, guttis, medullæ vituli, luccis bryonia, cicutæ, cucumeris agrestis, alii sylvestris, cyclaminis & gummi Ammoniaco, Unguentum de cicutha, de althea, resumitum, spleneticum, & emplastrum diachylon. ceræneum, de cicuta & Ammoniaco, de mucilaginis. Resolutis per medicamenta hæc succis terrestribus aliisque inspissatis, materiam superfluum evacuat per vias insulas aperientibus & laxantibus. fol. sen. sem. cartham. rhabarbaro, turpetho, vel pilulis de Ammoniaco, Tartareis. chalybeatis, & tandem sanguine depurato remedia salibus volatilibus præcæta subjungit, ut spiritus convenienter exalcentur.

*Œiiflamma* vicerum præsentium curæ etiam præstatum, tunc tunc illas corroderes mitigantibus, hinc ulcera abstergentibus & mundificantibus decoctis vel insulis ex radice enulæ, caryophyllatæ, aristoloch. rotund. chinæ, salic. parillæ, serpentaria virginianæ, filicis, graminis, herbarum agrimonie, hepaticæ, betonicæ, carduibenedicti, eupatorie, scolopendriæ, scordii, fâniculæ, marrubii, consolida Saracenica, veronicæ, ligno Guajaco, salassæ, & alvo existente adstrictiore enemata injici, aut ne pravi humores ad Reñes exulceratos copiosius profusant, eosdem aliquando vomitorio evacuari præcipit, tum balsamo de Capaiba, Œi spiritu terebinthina, aliisque balsamicis & traumaticis integrari, si obtineri possit, curationem absolvit.

*Vulnera Hepatis & Lienis* ita tractat, ut venæsectionem in dextro vel sinistro brachio admit-tat, ad sanguinis revulsionem, & congruatio-nem ejus impediendam enemata frequentius immittat intestinis, & confuso vulnere potiones vulnerarias, balsamicas conglutinantes & con-solidantes propinet, aliasque tincturas vel essentias traumaticas; externè verò vel epiphemata, vel emplastra applicet adstringentia, exsiccantia & consolidantia in aliis vulneribus usitata. Reñes vulnerati internè decocta exhibet, ex millesfolio, fânicula, ophioglossio, p. roia, piloteila, cum rad-icibus plantaginis, liquoritæ, quibus pulveres admisceat ex trochiscis de alkekengi, carabe, terra sigillata, ut sanguinis effluxus simul sistatur, & conglutinatio promoveatur. itaque absumtis bal-sami sulphuris aliquot guttas in pulculo præbet absorbendas, & foris cataplasmata, in quibus aut emplastra stictica seu consolidantia vulnere im-ponit ex cera, terebinthina, pice navali, oleo ovo-

ty 1 tun

rum, laurino hyperici, gummi elemi, malthice, thure, succino, aliisque parata, ut iisdem penitus sanentur.

*Sylviu-  
du curan-  
di Hepati-  
Lienis &  
Renum  
Scurrhum.*

§. 17. *Sylviu* in affectibus istis *Scirrhus* *Hepatis* & *Lienis* & *Renum* ad viscositatem humo-  
rum corrigendam, incidendam & attenuandam,  
& sic obstructionem ab iisdē productam fortio-  
rem resolvendam aut referendam *salia* commen-  
dat volatilia frequentius, adeoque etiam in  
prandio & cœna, vino vel liquoribus aliis  
convenientibus indita sumenda, siue sint ex ani-  
malibus deprompta, siue in vegetabilibus conti-  
neantur, & hinc omnia approbat scorbutica,  
tumorque externē olea & unguenta inungit  
emollientia & dissolventia ex oleo laurino,  
Philosophorum, unguento Martiato, vel ca-  
taplasinata ex plantis aromaticis parata, nec non  
emplastrum carminans resolvendis humoribus  
inspillatis perquam idoneum. Ad magis verò  
attenuandos & leviter etiam evacuandos hu-  
mores illos viscidos pilulas suas laudat inagi-  
strales ex gummi galbano, cum ienis, casto-  
reo, croco, aloë rosata, & trochiscis alhandali  
compositis alternis diebus deglutendas.

*Ulcera.*

Ex inflammatione aut abscessu pronata *Ulcera*  
*Hepatis* & *Lienis* decoctis vulnerariis aliis-  
que mixturis oculis cancerorum, antimonium  
diaphoreticum, quibus acidum facis domatur  
& absorbetur, recipientibus abstergit, & tum  
balsamo sulphuris terebinthinato mundificat  
& consolidat. De *Renum Ulceribus* quamvis  
valde dubitet, num spes aliqua sit curationis, ar-  
tamen ad malum leniendum & impediendum ne  
reddatur gravissimum, aliquid usurpari posse  
concedit, eumque in finem nil præstantius se  
reperisse asserit, balsamo sulphuratum anisato,  
tum succinato, tum juniperino, tum terebinthi-  
nato, oleo tamen terebinthinæ Venetæ, aliisve  
optimæ, non vulgaris, parato, à quibus, licet  
viribus non parum fractis, ad *Re*nes perve-  
nientibus ulcus mundari, puris proventum  
minui, adeoque ulceris augmentum plus mi-  
nus impediti docet, cæteris autem omnibus  
hoc in casu balsamum sulphuris succinatum re-  
perit optimum.

*Pulvora.*

Hæc etiam balsama adhibet in *Vulneribus* vi-  
scerum horum, unâ cum decoctis aliisve po-  
tionibus & mixturis vulnerariis alcalicis satu-  
ratis, quin balsama quoque foris instillat, & im-  
posito emplastro consolidante vulnus studiosè  
deligari præcipit.

*Cartesia-  
norum ra-  
tio curandi  
Hepati-  
Lienis &  
Renum  
Scirrhus.*

§. 18. *Cartesianis* euratio affectuum horum  
tali instituitur ratione, ut succi indurati *Scir-  
rhum* in visceribus hæcē producentes emollian-  
tur, coagulum spissius resolvatur, & quicquid  
magis, quàm decet, quiescit, ad motum exci-  
tetur, ita enim non modo omnia reddi fluidio-  
ra sperant, sed poros simul fore apertos, & ex-  
halationem debitam recrementorum iri promo-  
tum, eaque propter digerentia exhibent & ca-  
nales obstructos referantia, cujus formulæ in  
*Hepatis Scirrhus* existunt sequentes.

℞. Ocul. ʒj.  
Croc. ʒs aperitiv. ʒij.  
Arcan. duplicat. ʒj.  
ʒis absinth. ʒß.

*M. F. Pulvis*, qui per vices in sequenti ex-  
hiberi potest mixtura.

℞. Aq. Cichor.  
Fumar. aa. ʒj.

Essent. centaury. min. ʒij.  
ʒis dule. ʒß.  
Syrup. Byzant. simpl. ʒj.

*M.*

Ut indurata melius emolliantur, & obstructio-  
nes aperiantur, insusum aut vinum medicatum  
parant sequenti modo.

℞. Rad. Cichor. ʒvj.  
Pimpinell. ʒß.  
Levistic. ʒij.

*Herb. abrotan.*

Agerat.  
Calamentb.  
Summit. absinth. aa. Mß.  
Flor. fœchad. citrin. P. j.  
Sem. passinar. silvestr. ʒij.  
raphan. ʒj.  
Limanur. Chalyb. ʒß.  
Cass. lign. ʒiij.  
ʒis centaury. min. ʒß.

*M. F. Species pro Nodulo uni mensuræ vi-  
ni impendendo.*

Eadem quoque aut non valde absimilia in  
usum ducunt ad dissolvendum *Scirrhum Lienis*,  
uti sequentes ostendunt formulæ.

℞. Crystall. ʒi ʒß.  
Croc. ʒis aperitiv. ʒj.  
ʒi fulminant. parum edulcorat. ʒß.  
Corall. pp. gr. xvj.

*M. F. Pulvis*, cujus dosis est quantitas  
in mucrone cultri contenta, in sequenti vehi-  
culo assumenda.

℞. Aq. Cuscut. ʒij.  
Cinamon. buglossat.  
Myns. ʒj.  
Tinctur. junip. ʒij.  
ʒi ʒis ʒß.  
Syr. aperitiv. Splenet.  
Zvvelf. ʒj.

*M.*

Vina medicata parant ex radicibus filicis, cappar,  
buglossi, valerian. gentian. rubiz, herbis scor-  
dii, rutæ murar. galeopsis, puleg. sem. fraxini,  
nasturt. ʒo ʒato. ʒco, hisque alia remedia in-  
terdum subjungunt, qualia sunt ʒ splenetico  
*Mynsichi*, terra foliat, ʒri, ʒus chalybeatus,  
Tinctura ʒis aperitiva, Tinctura ʒi, Tinctu-  
ra Cassiæ lignæ, ʒus ʒi volatilis.

*Renibus* à coagulo huiusmodi infarctis, o-  
culos cancerorum laudant cum ʒe ʒi in aqua  
urticæ cum syrupo dialtheæ edulcorata assu-  
ptos, nec non spiritum lumbricorum, ʒe volatili  
succini imprægnatum, decoctum Theæ pluribus  
affectibus à diuturniore obstructione oriundis  
accommodatum. Nonnunquam ʒum diaphore-  
ticum & alia exhibent sudorifera, materiâ prius  
ad fluxum disposita, ut magis adhuc attenuetur  
& resolvatur, & hac de causa etiam externa in  
usum ducunt remedia, uti sunt unguentum de  
althea, unguentum Agrippæ cum camphora &  
sulphure trito, Unguentum Splenetico *Myn-  
sichi*, emplastrum mitigativum & emolliente-  
eiusdem, emplastrum griseum Gale Ang. Sale,  
empl. mucilaginum le Mori, Spiritus gum. Am-  
mon. Spir. ʒis ʒci, matricalis *Blancardi*, ole-  
um galbani, Philosophor. ʒz, camphoræ,  
aliaque penetrantia, multas particulas volatiles  
per poros continuè in sanguinem mittentia, &  
motum succorum promoventia.

*Exul.*

# CAP. IV. DE HEP. LIEN. & REN. SCIR. ULCER. & VULN. 357

Viscera.

*Exulcerationes viscerum horum omni tractant quod, cum morbi sint curati admodum, diffi- ciles, hinc si post inflammationem suppuratio subveniat & deficientia nullum ulterius habe- ant locum, ipsam suppuracionem promovent emolliendo fibras acinorum & glandularum, ut succis corruptis facilius cedere eorumque fer- mentationi locum dare valeant, simulque for- tiores spiculæ hebetentur, adeoque vel deco- ctum propinant ex radicibus chinæ & liquiriti- æ, cum herbis agrimon. malv. tuminitar. ab- sinth. & caricis parantur, vel misturam sequen- tem:*

*℞. Aq. Camomill. ʒiʒ.  
Malv. ʒj.  
Essent. agrimon. ʒij.  
Syr. terebinth. ʒss.  
Tinctur. Croci ʒj.  
Syr. de Alib. ʒv.  
Absinth. ʒiij,  
M. de cochlearum.*

Exhibent etiam aliquando oleum amygd. dulc. cum oculis ʒss. Specinare ceti & ʒe abinthii in jusculo calido. Topica foris adhibent formâ li- nimentorum. emplastrum aut cataplasmatum emollientium aliud de jam cognitorum, & post abscessum vel sponte disruptum, vel instrumento apertum, materia purulenta vel per vomitum, secessum, urinam, aut etiam effluxum per vul- nus artificiale evacuata, abstergentia exhibent ex decocto rad. apii, acetos. petrolelin. herb. agri- mon. fragar. centaur. min. parietar. in hydro- melite parato, aut pulveres absorbentes ex ebore ulso aut Philof. pp. ocul. ʒss., ʒio diaphoret. Sacchar ʒi, ʒe succini, vel trochiscos de cara- be, præsertim in ulcere Renum, in quo etiam trochiscos de Alkekengi cum reliquis approbare solent, & pro meliori mundificatione Tinctu- ram succini cum spiritu terebinthinæ commen- dant, aut sequentem essentiam in potu ordina- tio ad guttulas xx. vel xxx. suadent exhaurire.

*℞. Essent. Hyperic. ʒiʒ.  
Ocul. ʒss. ʒiʒ.*

*M.*

Ad consolidationem utilem ducunt essentiam Plantag. Ang. Sal. Tincturam myrrhæ cum Tinctura Alkekengi usurpatam, nec non spe- cies diaplang. *Mysiceti*, aut sequentem nuxtu- ram cochlearum propinant.

*℞. Aq. Veron. ʒj.  
Alchimill. ʒvj.  
Ψa ʒij.  
Tinctur. ʒiʒ.  
Myrrh. ʒss.  
Syr. de Symplyt. Fern. ʒj.*

*M.*

Emplastrum diapalmæ, de gratia Dei, aut aliud quoddam consolidans regioni visceris exulcera- ti foris imponunt, ut curatio eo facilius impe- tretur.

Vulnura.

Vulnura ipsis hujus visceribus inflicta, modo non sint nimis penetrantia, nec cum contusione aut vasorum majorum dissectione conjuncta, tractare incipiunt imponendo externæ plagæ epithemata tepida ex maceratione herbarum vulnerariarum sale volatili prægnantium in spi- ritu vini, vel solo lineo in spiritu theriacali camphorato immerso, & postmodum balsamum *Locustæ* instillant, aut cum turundis insinuant, & emplastrum stipiticum imponunt, internis ca-

men curationem ipsorum viscerum diligentius peragunt, exhibendo pulveres particulas acutas absorbentes, & hac ratione ascensionem aut congrumationem succorum evasatorum prohi- bentes ex mumia, oculis ʒss, myrrha, lpermate ceti, corallii pp. ebore Philosophicæ præparato, tum balsama consolidationem promoventia commendant, Balsatum Peruvianum, de Ca- paiba. Jacomo de Pinto, sulphuris terebinthi- natum, nec non Tincturas vel essentias trauma- ticas, hyperici, plantaginis, Symphyti, vel mix- turam sequentem.

*℞. Aq. Veron. ʒiʒ.  
Mellefol. ʒj.  
Tormentill. ʒvj.  
Equiset. ʒss.  
Tinctur. Hyperic. ʒiij.  
Mum ʒiʒ.  
Balsam. Ex terebinthinæ. ʒj.  
Syrup. de Alspidula ʒvj.  
Veron. ʒss.*

*M.*

Pilulas de terebinthinâ, succino, mastiche, sac- charo ʒi, & trochiscos de Alkekengi in Renum vulnere singulariter assistant proficua.

§. 19. Ut ex tot Autorum labyrintho nos *℞. Nostra cu- ram Hepa- tis, Lienis & Renum Scirrho.* trahamus, nostram crismâ addere libet. Rejicimus ergo cum aliis prudentioribus Venæsectionem, quia hac celebrata non videtur, quomodo obstru- ctio illa scirrhosa tollatur, potius emissis adhuc volatilibus particulis sanguinis reliqua matia spissior remanebit. Similiter rejicimus purgan- tia ista sæpius exhibita, quia particulae purgan- tis raro eo pertingunt, sed potius in sanguine poros magis invertunt & malum augent, si quid verò obvenendum in cura, hoc per medicamenta incidentia, attenuantia & hinc diaphoretica & diuretica heri debet, & propterea optime ab Au- toribus in affectibus hujus *Scirrho Hepatis, Lienis ac Renum* commendatur decocta ex ligno Guajaco, corticibus radicum capparum, fraxini & Tamarisci, radicibus salisparill. chinæ herb. scolopend. ceterach, &c. quæ par- tis affectivæ variatione eligenda sunt, iisque aliquando interponi possunt sudorifica ex sa- libus & mineralibus, quæ subinde repetenda sunt, quia non una vice, sed lenta digestionem obstructions hæ & scirrhî resolvî possunt, nec nimis sicca sint remedia & calida, sed simul ac- cidum temperantia & viscidum incidentia, quia in scirrhosis hujus tumoribus omnes ferè humores sunt spissi & tenaces, tutò tamen in hujus fluxum usurpari potest Tinctura ʒii volatilis sequenti modo parata.

*℞. Quis aurati, vel  
Succi crudi q. pl.  
Liq. Spi fixi q. s.  
F. l. a. Tinctura.*

Hanc rursum extrahere ʒe volatili ʒi vel C. C. vel alio soluto in aqua distill. sed forti, & hac Tinctura etiam ʒ volatilis exhibet oleo- sum minerale.

Salia volatilia blandiora, ut viperarum C. C. magni usus sunt, hinc in aulis jam usu receptum, ejusmodi sale volatili in mensurati, & certè cum maximo commodo sanitatis. Interponi etiam possunt fixiora quædam, ut Antihæcticum *Pote- rii*, Gum diaphoret. bezoar. minerale; cum ʒe card. bened. arcano duplicato, ʒe centaur. min. tamarisci.

Y y 3

Pet

Per diuretica sæpe materia obstruens viscida evacuari potest, in quem finem ipso varia ægrotorum dispositione diversæ succiei commendantur remedia. ut sunt acidulæ Martiales, vel alia Martialis Chymica, ut Crocus & is aperitivus, vel sequenti modo parata Tinctura & is, cum hæc essent. 3i.

℞. *His essent. vini 3vj.*  
*Liquetur super cineres, adde*  
*℞. li. & 3ij.*

*Mixta ver. antur in pulverem, quem in patina sine, donec ab ære ruber fiat, hinc Tinctura fiat cum Spiritu vini, vel aqua cinamomi spiritibus.*

Salina quoque spiritibus non sunt contemnendi uti, ut ~us ~is Grisei subdulcis, arcanum duplicatum, ~xi, Junip. ~ confortativus n. d. omnia quoque hæc conveniunt, ut sunt ~us & 99 ~i, cremor ~i, ~i, arcanum ~i nostrum, sic & vinum ~iatum prodest nec non silices albi venis flavis aut rubris respersi, candelæ facti in vino extinguuntur, & vinum hoc epotum opem sæpius attulit. A quibusdam commendatur decoctum ex urtica mortua cum vino factum, in Lienis Scirrho ab antiquioribus etiam adeo æstimatum.

Sed externè etiam hostis ille sæpe simul aggrediendus est, ut citius superetur; conveniunt ergo linimenta, in quibus cera abesse debet, quia alias pori obstruuntur, unde magis commendantur liquores volatiles ex Tinctura croci, ~u ~is ~xi volatili parati, interdum aqua calcis vivæ pro fomento potest adhiberi, quam æger tepide cum spongia admoveat debet. Alii commendant emplastrum de succo cicutæ aut mandragoræ cum gummi Ammoniac, sed sequens nostrum emolliens egregii erit usus.

℞. *Cera flav. lbss.*  
*Ol. Olivæ. lbss.*  
*Gumm. Galban.*  
*Ammon. aa. 3ij.*  
*Flor. chamomill. 3j.*  
*Sem. cumin. 3ij.*  
*Rad. Irid. Flor.*  
*Bacc. Lauri aa. 3ss.*  
*Ol. menth.*  
*Sabin. aa. 3ij.*  
*Camphor. 3ij.*

*M. F. Emplastrum, quod valde resolvit & discutit.*

His nihil juvantibus ægri domi diutius defixi ad thermas nitro & eas ablegari possunt, quæ vi sua volatili, & à quibusdam balsamica vocata, sæpe habere ferant obstructions rebelles, seu aliquot novimus exempla: præ aliis autem commendamus Embleses & Carolinas, in quibus non modo duriore corporis partes emolliuntur, sed ex conversatione aliorum & loci mutatione animus exhilarabitur, & spiritus torpidiores excitabuntur; pro pauperibus tamen, quibus hujusmodi non licet adire Corinthum, artificiales parari poterunt ex herbis, mineralibus, aliisque convenientibus, quæ minori pretio adhibebuntur, & de virtutibus earum & ipsi ægri, & Medici esse possunt certiores, faciliq; ad præsentem scopum dirigentur, & operatio earum intenditur aut minuitur, prout ægrotis commodum erit, quod in aliis ab igne centrali è terra propulsis non æquè permittitur, nisi aliis herbarum decoctis permisceantur, nec Medicus

sæpe investigare valet, quibus particulis, & quo pondere lingulis diebus & sunt imbutæ, certum enim est nobis, sæpius eas mutari, & particulas minerales per varios motus, & sicque mutuum in se invicem occursum, varias aliquando nascisci figuras, & nonnullas in motu esse præcipiti, quo tempore venenosam potius, quam balsamicam exercere poterunt operationem.

Si quando contingit, ut post suppuratam inflammationem & ruptum abscessum in *Hepate, Laene vel Renibus* ob particularum acidarum acrim corrodentium in iisdem dominium, exortum fuerit *Ulcus*, curatio ejus admodum existit difficilis, etenim materia purulenta nec commodè potest evacuari, nec ulcus debet detergeri & mundari, quapropter *Severinus* & alii quidam Autores è regione ulceris abdominis instituerunt incisionem, ut per vulnus hoc efflueret pus & fæces; at incitio hæc vix locum solummodo habet, si abscessus in parte gibba Hepatis aut superficie viscerum externa fuerit ruptus, & in ea ulcus sit patulum, & tunc incisiones etiam fieri solent per siphones in ipsa ulcera ex decoctis aliisque liquoribus abstergentibus, mundantibus & vulnerariis; sed ulcere existente aut oñium habente in concava & interiore parte, incitio ista absque commodo instituitur, vix enim audebit Chirurgus ipsa hæc viscera in parte saniore & integra pertundere, ut puri alius exitus pareatur, cum metu excitandæ fistulæ non careret. Eapropter in Ulceribus viscerum horum interioribus remedia internè potius exhibenda, & materię purulentæ per portam sponit inventum exitus est facilitandus, immunita simul ejus acrimonia, quod pulveribus ex oculis cancerorum, Spermate ceti, & ~e ~i vel abstinui, decoctis abstergentibus ex rad. fenic. apii, cichor. filicis, herb. charæfol. heder. tetrest. centa. min. malv. &c. in hydromelite paratis, & enematibus blandioribus præstatur, si per vasa cholidocha pus in ipsa ruat intestina, & per alvum quærat effluxum; vomitu verò si rejiciatur, julecula pinguiora cum oleo amygdalarum dulcium crebrius sunt exhibenda, ut vomitus ille promoveatur, nec æger nimium fatigetur aut debilitetur, aliis enim vomitu existente difficili, conatu vehementiore viscera erosâ latius adhuc rumpuntur, & vasa his adhærentia majora dilacerantur, unde effuso liquore vitali, ægroti de vita ipsa maxime periclitantur. Per ureteres non modo è Renibus, sed aliis etiam visceribus sanguini refluo prius communicata si effluit cum urina, aut loco urina materia ista purulenta, diuretica dentur excretionem hanc promoventia, qualia sunt decoctum radic. pers. sonar. petrolelin. liquirit. herb. parietar. chamædr. fragar. veron. bacc. Junip. setum lactis, emulsiones sem. melon. cucurb. nucleor. persicor. cum aquis fragar. charæfol. agrimon. & parietar. paratæ, succus hederæ tetrest. liquor 3xæ foliar. ~i, Tinctura succini, ~us terebinth. lumbicor. Si stranguriam pus efficiat fibrasque irritet, conducet enull. ex sem. 4. frig. maj. violar. c. 7. fenic. charæfol. adject. ocul. 3. sacchar. Fini, syr. dialth. Post evacuationem hujusmodi puris aliqualem ad abstergentia fortiora pergendum, nec non mundificantia, & tandem vulneraria & consolidantia, ex quibus sequens decoctum singulari cum commodo adhibebitur.

℞. *Rad.*



Rad. aristol. rotund.  
Caryophyllat. aa. ʒiij.  
Chin. ʒij.  
Salsaparill. ʒiʒ.  
Herb. agrimon.  
Veron.  
Heder. terrestr.  
Ophiogloss.  
Centaur. min.  
Chamad.

\* Flor. sen summitat. bogal, hyperic.

rosar. aa. ℞ʒ.

Rasar. lign. sassafr. ʒj.

Glyceria. ʒiij.

Sem. hyper.

plantag. aa. ʒiʒ.

Cog. in aq. simpl.

Colatur. ibiʒ. add.

Essent. ocul. ʒʒ. ʒij.

Syr. capill. ʒiʒ.

veron. aa. ʒʒ.

M. Sumatur pro libitu.

Ut ægri absinturo hoc decocto magis corroborentur, electuaria exhiberi possunt, quæ simul ulcus mundant & sanant, quale sequens monstrat formula.

\* Conserv. Heder. terrestr.

Rosar. aa. ʒʒ.

Veron. ʒiij.

Tormentil.

Rad. enul. condit. aa. ʒij.

Oc. ʒʒ. pp. ʒij.

Ebor. Philol. pp. ʒʒ.

Antihell. Poter. ʒj.

Succin. alb. pp.

Œis ʒi aa. ʒʒ.

Ol. d. melis. ʒʒ. vj.

Syr. Scabios. q. s. ut F. s. a. Electuarium.

Renum Ulceribus convenit conserva florum ononidis & confectio terebinthinata *Mysichiti*, trochisci de Alkekengi, *Gordonii*, *Pilula Barbette*. Nec adeo tenenda est cura lactis pro ulceris jam mundati repletionem & glutinationem, sed ab hac sola sæpius ulcerum horum sanatio felicissime clauditur, si singulis diebus mane & vespere lac caprinum cum inelle rosaceo & guttulis aliquot essentia millefolii cum tertia parte spiritus terebinthinæ mista exhibeatur. Potui ordinario sequens Tinctura instillari potest.

\* Tinctur. rosar. ʒiij.

Hyperic. ʒij.

Œis ʒi ʒʒ.

Essent. agrimon. ʒiʒ.

M. Dos. gutt. XXX. vel XL.

Externa quamvis lento gradu procedant, & internis hoc in casu æquiparari nequeant, eorum tantum auxilium non omnino habendum est frustraneum, præsertim in ulcere Renum, in quo balnea & infusæ approbantur ex decoctis vulnerariis & lenientibus parata, herbis nempe malva, agrimoniz, plantaginis, millefolii, marubii, foliis salicis, floribus Chamomillæ, *Lyfimachiz*, hyperici, semine fœnigræci, &c. quibus subiungantur linimenta ex unguento Apocolorum, vel oleo hyper. mastich. cum sang. dracon. myrrh. levo hircino & oleo terebinthinæ, vel imponatur emplastrum ex terebinthina, gummi elemi, mastiche, sanguine draconis & myrrhâ cum oleo hyperici paratum.

*Vulnera Epatis, Lienis ac Renum*, quatenus viscera sunt nobiliora, curam exposcunt accu-

ratiorum, quàm aliarum externarum partium carnosarum, hinc sæpe internis medicamentis vulnerariis res melius peragitur, quàm solis externis. In *Vulneribus Hepatis* semper ad hæmorrhagiam sistendam respiciendum est, quia ante dictum est, magna vasa sanguifera in Jecinore conspiciuntur, quibus apertis hæmorrhagia oritur vix ullis cedens remediis, etiam si maxima illa non lædantur; statim ergo in his vulneribus exhibeantur sanguinem congruatum dissolventia & simul vasa aperta consolidantia, quapropter conducent oculi ʒʒ., ʒium diaphoret. mumia, lapis Islandicus, hæmatites, bolus Armen. terra sigillata, Essentia vulneraria, quæ internis in viscerum vulneribus mira præstitit, in vulneribus pectoris jam descripta. In hæmorrhagia maxima detur sequens Tinctura adstringens.

\* ʒo ʒi q. v.

V. n. resificat. p. vj.

Digere, decanta, & in B. in spissa, addo ad part. iv. part. i. Tinctur. Catechu, & partem vi. Tinctura anodyna cum solo spir. vin. resificat. parata ex crudo opio & ol. cinamomi guttulis aliquot. Dosis est à guttulis vj, ad xv.

Succus bellidis intro assumtus non parum etiam proderit. Iniectiones ex decoctis vulnerariis instituuntur, & vulnus externè communè deligetur, imposito prius emplastro stiptico *Crolli*, aut oppodeltoch F. *VVirtusi*, quibus curatio ista dextrè absolvetur.

Eodem ferè modo *Vulnera Lienis* solent curari.

Sauciatis quoque *Renibus* occurrendum est vulnerariis hæmorrhagiam sistentibus, urinæ suppressionem præcaventibus, & tandem abstergentibus, mundantibus & consolidantibus, magnique æstimamus oculos cancerorum cum mumia & mastiche mixtos, & pulveris formam exhibitos, eorumque essentiam cum Tinctura Hyperici guttatim alluntam. Probantur etiam decocta vel infusa vulneraria ex agrimonia, hederæ terrestris, veronica, millefolio, pyrola, plantagine, summitatibus & semine hyperici, ligno lentiscino, xylobalsamo, radic. aristolochiz, tormentillæ, consolidæ. Sanguinem congruatum ureteres obstruentem & urinæ transitum denegantem sequens resolvet pulvis.

\* Ocul. ʒʒ. ʒij.

Sem. hyperic. ʒʒ.

Sperm. cet. ʒij.

Succin. pp. ʒʒ.

M. F. Pulvis.

Balsamus de Capaiba ad gutt. iij. in jusculo exhibitus mundationi & glutinationi vulneris optime prospicit, cui subiungi possunt tincturæ mumia, hyperici, traumatica, alkekengi & lequeus mixtura coactilium præbenda.

\* Aq. Millefol. ʒj.

Veron. ʒvj.

Tinctur. A. kekeng. ʒʒ.

Hyperic. ʒiij.

Essent. agrimon. ʒij.

Sps. mastich. ʒj.

Syr. de Symphy. ʒv.

Corall. ʒiij.

M.

Vulnus externum topicis quoque studiosè tractandum est, iniectionibus primò abstergentibus, mundantibus & consolidationem faciliorem

rem parantibus, ex decocto faniculæ, millefolii, equiseti, polygami, radicum liquoriciæ, tormentillæ, symphyti, mastichis, olivani, in vino, cui additur succus plantaginis, mel rosarum & bolus Armenus. Injectionibus hîcæ subjunguntur linimenta aut balsama ex oleo cerebint, abietino, vulpino, feminis hyperici expresso, momordicæ, unguentum nobile *Mysichii*, vel sequens à *Barbette* compositum linimentum.

℞. Resor. pini ʒiij.

Ol. laurini.

cerebint. aa. ʒß.

Gumm. Elem. ʒij. ʒij.

M. F. linimentum.

Ad perfectam usque sanationem & vulneris hîcæ clusionem emplastrum stipticum *Crollii* aut *Mysichii* imponitur & cura vulneris hujus in totum absolvitur.

## CAPUT V.

### *De Vesica Inflammatione, Fistula & Vulnere, item Meatus urinarii Angustia, & Imperforatione.*

#### §. I.

**A**B affectibus Hepatis, Lienis ac Renum transitum ad *Vesica urinaria* morbos faciemus, qui sunt *Inflammatio, Fistula & Vulnere*, hisque ob proximitatem simul addemus *Meatus Urinarii Angustiam & Imperforationem*, quos affectus ordine nobis semel proposito examinabimus.

*Vesica Inflammatio.*

*Vesica* ergo *Inflammatio* describi potest, quod sit tumor partium ejus maxime carnosarum, tum etiam membranarum dolorosus igneus, à succo arterioso in easdem evasato, poros obstruente, & partes vicinas simul distendente.

*Fistula.*

*Fistula Vesica* est ulcus angustum & profundum in collo *Vesicæ* à succis evasatis acefcentibus productum, dum tubuli non modò partium carnosarum eroduntur, sed succi corrupti & Particulæ carneæ dursæ commixti circa ulcus in scirrhosam & callosam duritiem coagulatur.

*Cancer.*

Aliquando *Vesicam* etiam *Cancer* occupat, prout tale exemplum in mercatore quodam Brabando & in muliere habet *Stalpart. Obs. rar. Cent. 1. Obs. 88.* qui nihil aliud est, quàm glandularum *Vesicæ* sphaelus. post fistulas majorem corruptionem inducentes subortus, ejus sævitia vicinas quoque partes sæpe depopulat.

*Vulnere.*

*Vulnus Vesicæ* describitur, quod sit partium *vesicæ* constituentium dissolutio à re violenta producta.

*Meatus urinarii Angustia.*

*Meatus urinarii Angustia* est ejusdem à rebus duris, vel tumoribus, vel scirrhis, oblatio, urinæ suppressionem inducens.

*Imperforatio.*

*Imperforatio* ejusdem *meatus* est, quando vel in totum nullus adest canalis, per quem *urina* effluere possit, sed corpus penis & ostium *vesicæ* colli in penem solidum est, aut introitus vel exitus *meatus* illius membranula quadam obductus est, transitum liquori modò nominato & semini prohibente.

*Partes affectæ.*

§. 2. *Partes affectæ* sunt: a *Vesica Urinaria*, in infima abdominis parte, intra peritonæi duplicaturam collocata intra cavitatem, quam os sacrum coxæ & pubis constituunt, quæ veluti marsupium quoddam est, in quod deferitur *urina* hominis à sanguine in renibus ut plurimum separata, estque illa rotunda & oblonga instar pyri & tunicis tribus combinata, cujus inferior cavitatis quibusdam videtur glandulosis acinis incrustata, ex quibus glandulis an *urina* se cernatur, nondum satis liquet. Interea rei hujus recensio ad ipsam *urinae* viam, de cujus ortu & constitutione hodie dum inter Medicos lis est, me de-

ducit. D. *Bruen* putat in *vesica* adeste poros foris intro spectantes, & reverà per glandulas minuscultas, vel per poros foris intro spectantes *urina* in *vesicam* stillare, plurimis experimentis inductus huc usque credo, & nisi omnis, potior tamen pars à sanguine in renibus separatur. Collum seu cervix *Vesicæ* cingitur mulculo ex fibris circularibus validisque constituto, sphindtere dicto, quo ne *urina* semper exstillet, *vesicam* constringat, & hoc collum viris magis oblongum est, quam sexui sequiori. Omnis generis vasa recipit, & tribus constat tunicis, quarum prima nil aliud est, quàm peritonæi productio, quæ totam ejus extremam superficiem ambit. Ex fibris tendinosis diversimodè intertextus est constituta. Media ex fibris carneis est composita, quarum triplex numeratur ordo: Primus est crassiorum quarundam fibrarum *vesicæ* anteriorem partem accurrentium, & quæ recta linea à fundo ejus ad collum usque deferuntur. Secundus est fibrarum, quæ *vesicam* circulariter cingunt; & tertius circularibus superpositus constat ex fibris, quæ priores oblique secant, à dextra ad sinistram tendentibus, à *vesicæ* fundo ad collum usque, & transversales dicuntur. Tunica interior constata est ex fibris tendinosis, ita constituta, ut illius textura nunquam detegi poterit. Cum *vesica* non tumet, in totum est rugosa, & interior ejus superficies mucilagine semper oblinita. Constat ergo ex hisce, *vesicam* esse mulculum concavum, cujus tunica interior & exterior sunt tendines, & media venter.

β. *Meatus Urinarius, Celfo* *Fistula urinæ*, & communiter *urethra* vocatus, canalis est per universam inferiorem penis partem secundum longitudinem in medio corporum nervosorum productus, eadem cum illis dotatus substantiâ, nervosa nempe, laxâ, densâ, rarâ & molli, à cervice *vesicæ* tanquam longior aliqua cervix, & principio excepto, ad quod paulo capacior & crassior animadvertitur, ejusdem ad glandem usque amplitudinis. A reliquo penis corpore in eo maxime differt, quod corpus nervosum in pene seu cole crassius sit & fungosius, in canali verò tenuioris substantiæ. Distinguitur quoque canalis hic in partem spongiosam & membranaceam. Pars spongiosa inferiori ejus parti copiosa adjacens, & propter fibras tenuiores & copiosiores minores habens poros, membranâ tegitur, quàm corpora nervosa tenuiori & fibris transversis pluribus asperâ, quæ inflata digiti

# CAP. V. DE MORBIS VESICÆ & MEAT. URINARIJ. 361

digiti obinet crassiem, glandem verò approprians magis magisque attenuatur, donec tandem in glande obliteretur. Hæc quoque pars spongiosa inflatis corporibus nervosis statim intumescit, flavescitque verò illis delabitur, hocque singulare corporum horum indicat commercium, multumque ad penis erectionem promtorem contribuit. Pars membranacea interna teres est & cava, quæ propriè à cervice, cui conjungitur, at non ab ea nascitur, incipiens, & ad glandem usque porrecta, eandem tegere videtur. ad sensus vigorem augendum. Ubi glans cum nervosis corporibus jungitur, ibi superficiali quandam habet cavernulam, ad principium verò tria foramina, unum in medio, aliorum duorum respectu majus ex vesicæ cervice prodiens, prope quod alia duo, utrinque unum, sunt augustiora, à ductu, qui à vesiculis seminariis exit, semenque in canalem desit, prodeuntia. Dum urethram hanc contingunt, & amplectuntur corpora penis, sub quibus ponitur & unà cum iis reflectitur, atque ad glandem inde exportigitur, figuram literæ S præferunt solet. Canalis hic & urinæ & semini communi quodam officio effrendis inservit.

**Diagnosi.** §. 3. *Inflammationem Vesicæ* committari solent tensio partium vicinarum, item durities, ardor & dolor in regione vesicæ & pubis, urinæ impeditus fluxus, tenesmus, febris, vigilie, delirium, quæ omnia majora vel minora prout nempe inflammationis vel major vel minor, nec non partes vel membranas, vel carnosas affecterit.

A Vesicæ cervicis in utroque sexu *Exulceratione* non duntaxat purulenta mictio provenit, sed etiam aliquando puris aliqua citra mictionem excretio, maxime si in cervicis vesicæ anteriore parte ulcus selescat, è quo si sordidum sit, magna sæpe puris copia proficiscitur, mucosa ergo illa materia ut plurimum urinæ permixta excernitur; aliquando apparent squamæ & ramenta, & si gravis & consummata est exulceratio, gravis fætor adest in urina. Dolor sæpe adest gravis in pectine & pede: quoties egri mingunt, dysuria adest, sæpe & tenesmus & membri virilis erectio. Si plus præcedatur inam, & aliquando absque urina effluit, vitium in penne est, si verò talia cum urina permisceantur, in vesica vel renibus malum est.

Si Sphincter vesicæ, qui urinæ effluxum cohibet, vulneretur, adest involuntaria mictio, prout in sectione ad calculum è vesicâ extrahendum, vel dilaceratione colli vesicæ in mulieribus sæpe accidit, ut licet vulnus sanetur, mictionem tamen, ob lationem & dilacerationem musculi fibrillarum, differe, & urinam diutius retinere nequeant.

Sic quoque à vulnere vesicæ, urinæ effluxus per viam non destinatam sæpe fit, prout non duntaxat in lithotomia, uti jam dictum sed & si illi alio modo vulnus maxime per abdomen inflatur, accidit. Sicuti circa inguina è vulnere in sectione sacrocoles causâ susceptâ, læsa hoc quoque casu vesicâ, cuidam urinam profluente, & jam per multos annos ex eodem loco promanasse, nec per virgam amplius reddi observavit *Platerius*, qui & juxta pubis ac lumborum regionem è vulnere cornu bovis homini inflicto, corpusque illic penetrante & per vesicam adacto, urinam similiter utrimque profluente notavit.

*Angustia meatus urinarii & Imperforatio fa-*

cilicis ipsi visu, styli exploratione & urinæ omnimoda retentione cognosci possunt.

§. 4. *Causam Vesicæ Inflammationis* statuunt *Aetologia Galenicæ* sanguinis ad eam affluxum nimium, ob intemperiem ejus calidam, aut immoderatam ejus dolorem attractum, & vel in membranosa, vel in masculosa ejus parte tumorem illum tendentem, pulsantem & dolorosum producentem; sin alii humores pro facultatis coctricis & expultricis debilitate alliciantur, diversas intemperierum cum materia, & tumorum species in vesica volunt excitari.

*Ulcera & Fistulas Vesicæ* inducere dicunt humores acres erodentes & putridos aliunde ad vesicam confluentes; calculos apertiores homine se agitante circa orificium vesicæ confictos, unde carnosâ ista pars facile excorietur; cantharides, aliæque medicamenta aut venena acris assumpta vesicam erodentia, aut instrumenta quædam minus dextrè adhibita, quibus collum vesicæ comprimitur, claudatur, & urinæ transitus impediatur, quæ postea acris reddita, partem istam exulceret.

*Vulnera Vesicæ* cum aliis partibus adjacentibus ab externis inferri satentur, uti sunt tela gladii, ictus, aut alia instrumenta Chirurgica, vel studio pro excidendo calculo, vel ex imperitia ineptius in vesicam intrula.

*Meatus urinarii Angustiam*, tum in collo vesicæ, tum ipsius urethræ produci statunt, vel à tumoribus temporis tractu ex humoribus eò confluentibus pronatis. intemperie partis frigida & sicca, remediis adstringentibus vel intensius, vel exterius adhibitis, sanguine concreto humore crasso & viscido, materia purulenta crassa, calculo vel arenula, caruncula post gonorrhœam, vel ulcus circa cervicem vesicæ aut in ipsâ urethrâ progerminante, abs quibus omnibus meatus hic obstruitur & angustietur.

*Imperforationem Meatus urinarii* ipsis adscribunt naturæ exordis, dum ob errorem aut debilitatem facultatis plasticæ canalis hic non satis fuerit elaboratus.

§. 5. *Paracelsus* tres quidem communes *Vesicæ Paracelsi* morbos proponit, Calculum nempe, Exulcerationem & Putrefactionem, possunt tamen ex ejusdem principii etiam reliquorum ab aliis Authoribus animadversorum causæ facile explicari, *Inflammationis* scilicet, partis hujus causam deducendo à sale sanguinis, vel sanguine è vasis suis in vesicæ substantiam effuso & corrupto, sicque apostemationem ibidem producente. *Exulcerationis* Vesicæ causam ipse adscribit urinæ peredenti quinque vel sex loca, & per ea perfluenti. *Putrefactionem* ejus oriri dicit, quando materia lapidis ex coagulo oritur, & tamen lapidem generare non potest, unde statim putrefactio inducitur. *Vulnera* Vesicæ infligi posse concedit à quovis instrumento scindente aut pungente. *Meatum* urinarium angustari credit à qualibet re obstruente, calculo, excrecentiis carnosâ post gonorrhœam, ex succo nutriente per exilam membranâ stillante propullulantibus, pure, sanguine, coagulato, aliisque; tum vicio seminis & aberratione Naturæ, quam potentem Deam cum aliis admittit, præsertim in totali hujus canalis *Obturatione* in matrice sætui oborta, in qua Naturæ isti aberranti totum hoc vitium putat adscribendum.

*Helmon-*  
*ium.*

§. 6. *Helmonius Vesicæ Inflammationem* excitari credit, dum cuspis calculi eidem infigitur, vel sal quoddam fixius Archeum irritat, ut cruor regioni læsæ proximus accurat primus, aliique sanguini affluentis transitum præcipiat, unde hic subsistens ratione spiritus sui vitalis incalcescat, & tumorem in parte hac pullantem & dolorosum producat.

*Ulcera & Fistulas Vesicæ* frequentius contingere putat ab urina falsiore vesicam assidue perlabente, vel propter calculum meatum occultentem diutius ibidem morante, aut ab acido quodam in urina occulto vesicam similiter erodente; quin à calculo nimis acuto vesicam etiam vulnerari posse internè concedit, uti ab externis telis & instrumentis variis, sive læsio hæc fiat studio & animo iuvandi, quamquam minus sæpe feliciter, ut in lithotomia, sive animo nocendi, aut ex improviso, sicut varia misligi etiam huic parti possunt telorum genera.

*Meatum urinarium* aliquando obstrui docet à muco, quem vesica à calculo obfessa ploret, aliquando à carunculis post gonorrhæam productis angustari, nonnunquam à membranula quadam ex errore Archei plastici in utero pronata obduci, vel canalem ex eodem errore totaliter interdum obesse.

*Willisium.*

§. 7. *Willisius Vesicæ Inflammationem* oriri vult à particulis sanguinis sulphureis, in vesicam ob alias quasdam causas antecedentes & prorrentes copiosius illatis & in ea accensis, quales causas antecedentes esse dicit ictus, contusiones, calculum, vulnera, à quibus & partes vesicæ membranæ valde irritari, & liquores ad vesicam confluentes corrumpi possunt, præsertim verò particulis salinis asperioribus urinæ sese particulis istis sulphureis immiscuentibus, & si sua penetrativa iisdem poros aperientibus, ut ita facilius in partes vesicæ introducantur, & hanc inflammationem eo citius ob causas istas induci statuit, quando sanguinis dispositio præ existat biliosa, & copiosis constet particulis heterogeneis, cum cibo & potu interdum illatis, si cibis nimis sit salsus aut aromatibus conditus, potus verò valde generosus aut acris, & lactici urinæ citò communicetur.

Ab ejusmodi particulis salinis asperioribus substantiam Vesicæ inflammata erodentibus *Ulcus & Fistulam* tandem excitari existimat, quæ particulæ aliquando emergunt ex ipsâ Vesicæ inflammatione in abscessum versâ & suppurante, materia enim purulenta acris membranas vesicæ corrodendo continuitatem ejus dissolvit, & si apto tempore non evacuetur & ulcus mundeatur, moram nimiam trahendo aerios redditus cuniculos effodit & Fistulam inducit.

*Vulneribus Vesicæ* communes adscribit causas, instrumenta videlicet externa scindentia, pungentia aut fortiter contundentia, tam alibi penetrantia, ut partium non modò vicinarum & circumjacentium, sed ipsius etiam vesicæ unitatem sequeantur.

*Meatus Urinarii Angustiam*, & quidem ipsius colli Vesicæ, aliquando oriri statuit, dum iphincter vesicæ spasmodyce contringatur, & urinæ transitum impediatur, vel collum vesicæ & peritonæum est inflammatum, ita enim ex tumore meatum comprimi, aut canalis iste in pœceilu obstruitur à pituita crassâ, calculo aut

carunculis seu vesicis post uterem in gonorrhœa erolum prænascentibus.

*Imperforationem Urethræ* nec semini nec urinæ transitum concedentem itidem, ut alii, vel membranulæ adscribit orificio interno supra collum vesicæ, aut externo super glandem penis annatæ, vel totali cavitatis aut canalis in vesica aut pene defectui, in formatione fœtui in utero obtingenti.

§. 8. *Sylvii ex opinione Inflammatio Vesicæ* *Sylvium.*

oboritur à sanguine in vas ipsius, vel ex iisdem intra membranas aut substantiam carnosam effuso stagnante, ut partibus ejus spirituosus absuntis, acidiæ & salinæ acres oleosis mixtæ calore accendant, vel etiam ab ipsis partibus salinis & acidis acerbis in urina existentibus & vesicam erodentibus, & propterea post ulcera, vulnera aut læsionem vesicæ à calculo inflammationem facile sublequi docet, siquidem sanguis erosus vasculis citò effundi, & partes salinæ urinæ oleosis illius partibus misceri possint, quæ statim ita in parte hac accendantur.

*Ulcera & Fistulas* ab utroque hoc, tum salino, tum acido acri erodente origine sumere vult, uti facile contingere possit, dum urina ob calculum viam obstruentem moram diutius trahens acescat & acrimoniâ acquirat, vel ex inflammatione materia purulenta cortolivitate sua partes vesicæ excedat, vel etiam post vulnus sanguis corruptus aciditate sua vesicam hinc inde erodat.

*Vulneris Vesicæ* causas admittit res varias acie sua vesicæ continuitatem dissolventibus, calculos in vesica acutos aut asperos, extra eandem verò foris instrumenta scindentia, secantia, pungentia, &c. cum vesica etiam alias partes eandem præmunites simul lædentia, tum etiam calum & contusionem, ob quas vesica itidem ruptur, & lotium in abdominis cavitatem effundatur.

*Meatum urinarium* angustari docet à calculo collo vesicæ impacto, aut carne ex vesicæ membrana prodeunte excretescentia orificium ejus obturante, aut caruncula circa vesicæ cervicem existente, & in ipsum ejus orificium ob violentam urinæ expressionem eversâ, illudque occludente, vel in ipsâ etiam urethrâ nimium excrecente, aut denique ob vesicæ excoriatæ vel exulceratæ coalitum, à quibus omnibus urinæ effluxus impediatur.

*Imperforationem Urethræ*, sive orificium colli vesicæ aut urethræ externis in glande per membranulam quandam crassiorē coaluerit, sive nullus efformatus sit in pene canalis, per quem semen & urina effluere possint, vixum esse dicit à primo ortu & homini connatum.

§. 9. *Cartesiorum* sententia est, oriri *Inflammationem Vesicæ* à succo chyloso per arteriolas ad partis hujus nutrimentum eò defluente, & in extremitatibus arteriolarum aliisque ductibus incrassato, ut diutius ibidem stagnare cogatur, & ob stagnationem talem particulas acutas in eo contentas à materia æthereâ fortius agitari, & partem in tumorem extolli, canaliculos verò à confusione aut compressione quandoque ita angustari, vel ab ulcere aut vulnere discindi, & extremitates eorum corrugari, ut succis tran-

*Cartesius*  
*nos.*



transitus denegetur, sed circa crispationes illas fibrarum subsistere cogantur, & tum particulas acutas sive acidas augeri, quæ cum porosioribus sive alcalicis sanguinis commixtæ, & utraq; à globulis athereis pressæ motum intestinum, calorem, & fibras fortius ferientes dolorem suscitent. Eiusmodi quoque particulas acutas falsas nonnunquam in urina ob calculum meatum urinarium obstruentem, diutius circa collum vesicæ detentæ existere, quæ corrodendo, aut à materia atheræa suscitata in fibrillas fortius agendo canales dirumpant, & stagnationes varias succorum promoveant.

A fortiori & majori ita casuali à partibus acutis, quales interdum cantharides quoque intrò sunt inferre solent, valide aggratis disruptione, & succorum contentorum effusione ipsæ etiam *Ulcera* in Vesicâ produci credunt, in quibus chylus corruptus & multis angularibus particulis præditus, sicque in materiam abiens purulentam, fibras, præsertim in collo & parte musculosa profundius destruat. atque circa latera depositus in callosam coaguletur duritiem, unde *Ulcus* istud redditur fistulosum.

*Vulnerari* posse Vesicam concedunt à re quavis externa acuta scindente, pungente, pectorebrante aut contundente, per partes exteriores abdominis in vesicam utque penetrante, interdum etiam vesicam urinæ nimis distentam in sublatione oneris gravioris aut casu ab alto distringi.

*Meatus Urinari* *Angustiam* dependere dicunt vel à calculo, vel materia quadam viscida purulenta & glutinosa, vel à carunculis aliisque excrescentiis in collo Vesicæ aut urethræ pronatis canalem hunc obstruentibus, quarum origo libro proxime sequenti copiosius explicabitur. A tumoribus etiam vesicæ, glandularum prostarum, aliarumque partium vicinarum, aut spasmoticis sphincteris vesicæ affectibus urethram comprimere, & meatum ejus ita angustari posse, aliis facile largiuntur.

Totalen *Urethræ Imperforationem*, aut à membranula quadam obductione in formatione factus in utero ideo fieri censent, quod succus quidam adeo crassus extiterit, ut à succis spirituosus in fistulam elaborari nequiverit. aut in extremitatem canalis jam elaborati particula quadam crassa depulsa fuerit, quæ per quietem ibidem indurata meatum hunc ita occluserit.

*§. 10. Nostrâ ex sententiâ causâ Inflammationem* Vesicæ est eadem, quæ aliarum partium, quam à sanguine aliisque humoribus arteriosis & valis suis in poros partium effusus exoriri statuimus, à quibus pori Vesicæ ita obstruuntur, & adeo exigua relinquuntur spatia, ut non nisi spiritibus subtilissimis per ea concedatur transitus, qui ignitâ suâ dispositione & fulminis instar celeritè commoti, non modo parti inflammatae imprimunt roborem, sed cum impetu in poros obstruendos irrumpentes, fibrillas lancinando, maximum etiam excitant dolorem. Inflammationem verò rarius Vesicæ ex causâ interna, sed plurimum ab externa, v. gr. contusione, aut violento ictu in regione pubis vel lapsu, vel supervenit sectionem calculi, aut quando ex quacumque causâ corpus vesicæ laceratur, aut aliquando læditur, fit sæpe quarto die ejus in-

flammatiò, dein gangræna, & intra bidduum mors, aut si malum est minus fistulam perpetuam relinquit. Cantharides denique acrimonia sua rodendo vesicam ad inflammationem disponunt, quia particule hæc igne facili accenduntur, quod observationes testantur *Eph. Cur. Ann.* 2. p. 186. ubi ex vesicatorio ex cantharidibus extraapposito inflammatio Vesicæ fuit oborta.

Ab eodem illo vehementiori impetu in fibrillas partium Vesicam constituentium, & inflammatione jam occupatarum *Ulcus*, & ex hoc tandem *Fistulam* efformari certum est, quatenus ex continua ita pulsatione fibrille rumpuntur, à reliquis separantur, & cum humoribus ibidem subsistentibus commiscuntur, ut omnis generis particule ibidem commulentur, quæ pus constituent, cuius particulis subilionibus absumentis, crassiores ad circumferentiam propulsa & omni uotu delictæ in callosam duricem coagulantur, sub qua sinus ille fistulosus fovetur. Huc etiam referenda est tanquam causâ continuâ illa solutio, dum scilicet ex fibrillis in sectione calculi vesicæ disiectis continuò stillat humor, stillando sibi cavitatem efformans, inde *Fistula* oritur continuè stillans, quod sæpe fit in lithotomia; quibus subjurgenda est urina acris continuò partes hæc vesicæ perlans.

*Veneri* Vesicæ, ut membrorum quorumvis aliorum, est causâ & continuâ partis luvus cum aliis eandem præminuentibus solutio & divitiis facta à vi externa, & cum pars hæc maxime sit membranosa, hinc fit solutio partium nervosarum, quæ maxime est dolorosa.

*Angustia Meatus urinaris* oritur à quacumque re obstruente & coarctante, & quidem inter varia illa mala, quæ scortatoribus adulterisque Justo Dei judicio obveniunt, jure merito recensentur carnosæ excrescentiæ, calli & verrucæ, quæ intus in urethrâ se manifestant, primòque originem nanciscuntur ex pustulis ulcerosis, unde sensim spongiosa quædam excrescit caro, quæ indurefcit, tandem calcescit, nec dolorem tantum maximum ardoremque producit, sed & urinæ impedit exitum. Onere etiam obstructio Urethræ à calculo vel grumo sanguinis, quod cognoscitur ex eo, quando vulnus vel ruptura præcesserit. vel si jam sanguis cum urina effluerit. Obstruitur aliquando à pure, vel materia crassa. Fit quoque hæc angustatio à compressione partis adjacentis, ut intestini, parastatarum vel partium aliarum vicinarum prolapsu & inflammatione, vel à scirrhus colli vesicæ, unde sæpe detentio urinæ, quæ vesicæ paralyfin, & dein gangrænam, sphacelum & sæpe mortem ægris adfert.

*Imperforationis Urethræ* causâ est materiæ spermaticæ in formatione in utero quoddam canalem hunc à spiritibus elaborandum, ob crassitatem suam inconsuetâ distributio, & vel peni soliditas totalis, vel membrana glandem obducens continuata, vel orificii ductus hujus post collum cervicis incipientis consuetudine, ob quæ vitia urinæ omnis denegatur transitus.

*§. 11. Inflammatio, Ulcera & Vulnera* fundo *Prognosis.*

Vesicæ illata valde periculosa sunt, aut ea, quæ collum carnosum Vesicæ occupant, facilius curantur, ob copiam valorum sanguiferorū & multitudinem tubulorum in humores vehementer nutriti. Aliquando quartâ & septimâ die Inflammatio Vesicæ lethalis est, si circa collum inflammatur,

nonnunquam suppuratur, & sic accidit Ulcus vesicæ curatu difficillimum. Facta suppuratio- ne ulcus nunc rumpitur intra vesicam, & tunc pus cum urina effluit, nunc rumpitur externè in cavum abdominis, atque tunc aliquando abscessus fit in inguine. Inflammatio Vesicæ quavis curatu quandoque sit difficilis, facilis tamen quàm ejusdem *Fistula* curatur, hæc enim non facile consolidatur, quoniam urina eam semper alluit & impedit ob acrimoniam suam salinam, quo minùs curetur, urina quoque in *Fistulis* solet involuntariè effluere.

*Ulcera* Vesicæ maxime periculosa sunt, & ut plurimum mortem inferunt, facile enim in gangrænâ & sphacelum terminantur. Vesicæ quoque ulcus facile in anum penetrat in viris, ob partium viciniam, & coherentiam, sicut & uteri in mulieribus.

*Vulnera* Vesicæ pro læsæ partis diversitate magis minùs sunt periculosa, nam quando infima pars ejus, quæve prope collum sunt vulnerantur partes, dubitandum non est, dicente *Roonhuijs lib. 2. p. 180.* qui sanari possint; nec minùs certum est, circa sphincterem vulnus curari posse, cujus exemplum habet N. Tulpus *Obs. lib. 4. c. 29.* hinc vulnera cervici vesicæ illata communiter pro non lethalius habentur, testante *Salmasio Cent. 1. Obs. 22* ob hanc rationem, quòd calculi extractio hoc in loco cum euphoria læpissimè administraretur: quavis non improbabile sit, etiam hæc vulnera, si vala vesicæ sanguiferà majora lacerent, hæmorrhagiam lethalem interdum inducere posse, quale exemplum non ita pridem in milite observavi. Sed fundus membraneus dum vulneratur, à pluribus hæctenus hoc lethiferum creditum fuit, auctoritate antiquissima inductis ipsius *Hippocratis Sect. 6. Aph. 18.* asserentis *ὅτις φανερὸν δυνάσθαι, ἢ. e. vesicam dissecatam habenti lethale esse, & Morb. lib. 1. §. 3.* idem inquit: Si quis vesicâ faucibus fuerit, moritur; & §. 7. Vesica dissecata non coalescit; quale etiam exemplum *Glandorp. Specul. Chirurg. cap. 38.* allegat, & quidem 1. ratione inflammationis, febris & convulsionum mox supervenientium; 2. quòd minùs commodè applicare liceat remedia, & 3. urina abdominis cavitate repleat, testaturque *Roonhuijs p. 177.* fundi lisionem, quàm cervicis, multo esse periculosiorem. Notetur tamen alterisco, vesicæ fundi vulnera aliquando fuisse sanata, aut duntaxat exinde mortem non subsecutam fuisse, qualia exempla *Platerus Obs. p. 849. & 850. Simon Pauli Flor. Danic. part. 2. p. 53. Bauhinus in Append. ad Roussel. p. 192. & VVirtz Chirurg. part. 2. p. 105.* narrant, quò referenda est observatio 18. Cl. D. *Stalpart*, qui de lethaliitate vulnerum horum accurate disserit. Imò ratio potissima, quàm à substantia ejus nerveæ & membraneæ communiter adferunt, haud sufficiens est, cùm & fundus vesicæ tunicam exteriorem fati carnem habeat, cujus intuitu etiam hujus vulnus coalescere potest. Cui accedit, quòd fundi etiam maxima pars peritonæo & musculis abdominis contingua cum his coalescentibus faciliè coæt, seu communem callum induat. Attamen si symptomatica graviora & plura, v. gr. convulsio, delirium, vomitus, &c. oboriuntur, pessimum & lethale est, contrà, si minora aut nulla superveniunt. Vulneribus colli Vesicæ involuntaria mictio acidis, quò quotidie ex-

perimur post lithotomiam, licet enim sanatis vulneribus illis, attamen ægrotantibus sæpe penem involuntariè effluit urina, quoniam in sectione & extractione calculorum plures fibræ musculi sphincteris vesicæ dissecantur ac rumpuntur. Vulnera verò ipsi substantiæ membraneæ iussu ut plurimum periculosa observata sunt, non modò quia hæc magis dolorifica sunt, & inflammationes atque convulsiones plerumque post se trahunt, sed etiam quia uberiore sanguinis & succi nutritii affluxu destituuntur, & propterea difficillimè consolidantur.

*Meatus* Urinarii *Angustia* curatio est difficilis, & *Imperforationis* ferè nulla, si nempe in natiuitate fuerit oborta: & totus penis solidus & absque meatu urinario existat, ubi verò vel in glande, vel in vesicæ orificio membranula sit obducta, & recto tempore operatio peragatur, ita puerulis illa instrumentis discindi aut perforari poterit. Ubi adfuit verrucæ vel excrescentiæ carnosæ meatum urinarium obstruentes vel angustantes, curatio aliquando apparet, prout videmus in lue Venerea infectis, qui sæpe ab his idoneis liberantur remediis.

§. 12. In omnibus his affectibus Aer, quantum possibile, arceatur, præsertim frigidus. Ab acidis & acribus salinis cibis abstinendum est, nam Inflammationes Vesicæ à vini acrimonia productas observavi sæpius, sic & frigidus potus vitetur & crassus, quò nuper Pastor Gallicus sibi maximum accesserit tumorem parastacurum, & subsequenter urinæ detentionem, quam excepit mors. Motus nimius nocet ob partium harum agitationem, unde & ambulationes diuturniores & equitationes vitandæ. Vigiliæ modum non excedant, aliàs succos in corpore reddunt acriores, & morbos hosce detentiores. Alvi adstrictio tempestive solvenda, ne intestinis ab excrementis distentis vesica læsa comprimatur & dolores augeantur. Morsus nocet, nocet & ira & exanimelcentia, abs quibus humores aut ad stagnationem coguntur, aut agitantur, & spiritus aut torpescunt aut irritantur & inordinatè commoveantur; sed animus spe potius laxandus, & quantum possibile, ad salutarem disponendus est hilaritatem.

§. 13. *Curationem* Pharmacæutico-Chirurgicam morborum præsentium ita aggrediuntur *Galenici*, ut in Vesicæ Inflammatione, præmissa victu conveniente, ad prohibendum tumorem in- erentem humores calidos copiosos & in corpore redundantes evacuent cum aversione ab ipsa vesica, larga nimirum venesectione in vena interna utriusque cubiti instituta, pro plenitudine tamen & tolerantia virium patientis, tum uno vel altero die delapsio ad aversionem non modò sanguinis à partibus inferioribus aliis affluxuri, sed in partem quoque jam allapsi derivationem venam in poplite pedis dextræ aut talo utroque aperiunt. Hoc factò axiomatis sui memores ac nimium tenaces, contraria scilicet contrariis curari, ad calorem febrilem domandum & æstum ab Inflammatione Vesicæ illatum tollendum syrupos exhibent refrigerantes, & de enidivâ, violarum, nymphææ, cichorii, vel per se solos, vel cum decoctis refrigerantibus dissolutos, quà præmissâ præparatione ipsos humores calidiores sanguini se immiscentes, adque vesicam ita affectam confluentes laxantibus evacuant, reiectis calidis ac-

Curatio  
Morborum  
Vesicæ  
à Galenico

# CAP.V.DE MORBIS VESICÆ & MEAT. URINARIJ. 365

acrioribus & violentè purgantibus: sola adhibentes temperata, quorum numero inferunt syrupum rosarum ex multiplici infusione paratum, cassiam fistularem recentè extractam, electuarium diaprunis sine scammonio, dialebesen, diacatholicon Nicolai, & enemata ex herbis emollientibus & refrigerantibus. nymphæa, violaria, lactuca, endivia, malva, ad dictis electuariis modò nominatis parata. Ad eam verò magnitudinem & statum morbo jam profecto, ut nullus præservationi locus ulterius existat, ad materiæ inflammationem vesicæ proximè foventis educationem, digestionem ac dissipationem rectè digrediuntur, leviter repellentia ab initio adhibentes, quorum tamen in usu adeò diu non sunt peragenda, ut in parte hac nervola & exsanguis inflammatio vertatur in scirrhum, & proinde locum affectum, sive totum ventrem inferiorem aut inungunt oleo rosaceo omphacino, myrrino, melino, vel per se, vel parato exinde cum lacte & vitello ovi linimento, vel etiam linimento ex cassia recentè extracta, & cum lacte muliebri modò emulso subacta composito, aut vesicæ ipsi infundunt mucilaginem seminis psyllii cum aqua hordei aut lacte albinio probe dilutum, vel lac muliebri cum oleo rosarum mixtum, aut calore non admodum excedente oleum amygdalarum dulcium, quandoquidem emollientia & relaxantia tutius adhiberi possent tandem didicerunt, ut dolor simul leniatur, & urinæ excretio promoveatur, qua refectus instituunt cum spongia ex aqua tepida, cui tertia pars olei communis, aut seminis lini, aut chamomeli, aut scorpionum addita sit, vel decocto radicum & foliorum althææ, florum chamomeli, meliloti, seminis lini, dauci, fenigræci, in hydrelæo facto expressi, ex quo decocto etiam infellum parant, sive encathilimum, ita ut liquor ad umbilicum ægri usque pertingat, in quo sedentem ad urinæ excretionem sollicitant, eamque vesicam manibus comprimendo aut instrumentum aptum in eam demittendo faciunt, & post infellum cataplasmata mollia & calida imponunt, parata ex farina fabarum, hordei, seminis lini, sesamii, pulveribus radicum & foliorum althææ, foliorum sionis, florum chamomeli, addita quarta parte olei chamomeli, vel scorpionum, vel sesamini; quin ad dolorem leniendum & somnum conciliandum vel papaverina exterius apponunt, aut cataplasma ex farina fabarum, foliis hyoscyami & succo mandragoræ compositum adhibent, vel portionem convenientem Philonii Romani, aut Requiei Nicolai saccharo rosaceo permistam offerunt diglutiendam. Vergente verò inflammatione ad suppurationem, etiam hanc promovere solent internis & externis emollientibus & suppurantibus, decocto caricarum & passularum enucleatarum ore exhauriendo propinato, peccini verò & perineo superimposito cataplasmate ex farina althææ, fenigræci, hordei, caricarum cum melle & albumine ovi parato, tum abscellu inde aperto ulcus abstergunt, carne replent & consolidatione curationem totam absolunt.

*Vlcera & Fistulæ Vesicæ* ita tractant, ut humores acres ad partem læsam luxuriosè temperent, tum victu conveniente, tum syrupis decithorio, endivia, violarum, glycyrrhizæ, papaverino, in decocto hordei, malvæ, rubarbarum, &c. dissolutis, vel emulsionibus ex semine citrullorum aut melonum, deinde eosdem expurgent

medicamentis mitioribus, ut mannâ, cassiâ fistulari, syrupo rosarum ex multiplici infusione parato, syrupo violarum, electuario diaprunis sine scammonio, diacatholico, enematis ex decoctis lenientibus, in quibus jam dicta electuaria dissolvuntur; & pro majori humorum ab ulcere aversione venesectionem in cubito dextro interiore instituunt, tantumque sanguinis effluere sinunt, quantum morbus & plethora reposcunt, & vires tolerant. Hinc rectè ad ulceris detersionem progrediuntur, quam peragunt decocto hordei, in quo mel rosatum fuerit dissolutum, decocto asplenii, foliorum alkekengi, sive vesicariæ, cicærum nigrorum, lacte albinio vel caprillo cum melle rosaceo, emulsionem seminis melonum cum saccharo canthio, exhibitis remediis hisce per os, simulque cum syringa per pudendum in vesicam & sic in ulcus ipsum infusis, hac adhibita diligentia, ne syringa alivis instrumentis usurpatis aut vesicæ cervix, aut penis meatus de novo lædatur: tunc ulcere abstergo leviter exsiccatia usurpant & adstringentia, inter quæ thermas laudant. Spadanæ, Embienses, Teuticianas, aliasque, nec non decoctum radicis chinæ & ligni guajaci, vel pulveres ex C. C. bolo Armeno, terrâ Lemniâ, spodio, trochiscis de alkekengi, Andronii: in decocto hordei cum glycyrrhizâ assumunt, & simul in lacte dissolutos per syringam in vesicam injectos. In *Fistula* unguentum Ægyptiacum in decocto hordei vel alio conveniente solutum, per penem mediante syringa instillant, ut callus absumatur, quod difficultè admodum hoc in casu obtineri posse videntur, si verò ulcus foris sit patulum, & Fistula instrumento attingi possit, vel serro caudente callum exiunt vel unguento Ægyptiaco & pauco arsenici absumunt. Hoc facto, & reliquo ulcere commodè siccato, consolidationem promovent decoctis vulnerariis equiseti, faniculæ, symphyti, rhois, malicorii, balauftiorum, tum alluitis per os, tum injectis in vesicam, vel pilulas ex mastiche, C. C. spodio, lapide judaico, sanguine draconis, bolo Armeno, Coralliis, gummi Arabico, tragacantho, sicco symphyti exceptas porrigit deglutendas, & foris peccini imponunt cataplasma ex farina lentium tollatarum, malicorio, balauftiis, gallis in maturis, acacia, hypocistide, alumine, posca parum dilutis, aut succo plantaginis & consolidæ exceptis, aut per syringam injiciunt liquores ex lacte chalybeato, aut succis adstringentibus, in quibus pulvis sit dissolutus ex plumbo usto, cerulâ, thure, amylo, spodio, &c. quibus cicatrix inducitur, & ulcus debite occluditur.

Non absimilem ineunt curationem in *Vulnere Vesicæ*, decocta enim vulneraria jam indigitata mul propinant haurienda, & per syringam instillant, locumque vulneratum pro faciliiori impetranda consolidatione inungunt oleo myrrino, hyperici, masticchio, unguento lantano, & tandem emplastrum triapharnacum, Apostolorum, aut ad herniam consuetum imponunt, si quæ vulnus sit majus, labia artificiosè consunt; ne ab invicem nimis dilatentur ad distorqueantur, sed convenienter conjungantur, & arte ita conjunctæ fortius detineantur.

*Meatus Urinarij Angustia* ut curent, obstacula quævis removet, adstrictionem relaxando lacte tepido, oleo amygd. dulc. decocto malvæ, althææ, idor. Chamomelli, glycyrrhizæ, passularum,

Zz 3, tum

tum per os assumtis, tum per syringam in vesicam infusus, spongia in decocto seminis lini, foliorum malvæ, althææ, parietariæ, florum chamomille meliloti &c. expressis, & pulvis, peccini & perineo tepide imposita, illito postmodum oleo liliorum & scorpionum, quibus interperies frigida & sicca simul aufertur, tumores verò & inflammationem abigendo ratione superius dicta, calculos & pus eximendo, pituitam viscidam incidendo, attenuando, concoquendo. & detergendo decocto capillorum Qis, hyssopi, calamenthæ, betonicæ, salviæ, stæchadis, glycyrrhizæ, additis oxymelle squillitico & syrupo hyssopi, vel electuario Justino, diaspolitico & similibus, quibus præparatos humores abundantes phlegmagogis & clysteribus idoneis evacuant, post quæ medicamenta ad ulteriorem desiccationem & materiæ peccantis expulsionem, aquas thermales commendant, vel in harum defectu diuretica, decocto radicum raphani, oxymel compositum, syrupum de s. radicibus, de limonibus, terebinthinaum, qualia etiam approbant, si ex nimia vesicæ distensione à potu copiosius ingesto meatus comprimitur. Ex crescentia carnositas post ulcus vel gonorrhœam pronatas abscessum remediis leviter corrodentibus ac detergentibus, alumine, chalcantho, viro, antimonio stidiosis adustus, melle rosaceo exceptis, & candela cereæ extremitati illitis, sicque ad carunculam blande demissis repetitis vicibus, donec penitus absolvantur, quod antequam fiat, ne urinae diuturno retento gravius appareat symptoma, ex crescentia istas depiunt, & canalem dilatant stylo plumbeo, ut liberius urinam stillando emittat. Grumos sanguinis in meatu obstruentes dissolvunt rubiâ, mumiâ, pulvere ad casum, ut soluti cum urina facilius expelli possint, & meatus ille ab iisdem liberetur.

*Imperforationem* Meatus Urinarii, sive in Vesicæ collo, sive in pene, ut vitium originale, & aberrationem Dextrae suæ Naturæ, curatu admodum judicant difficile, imò in totum incurabile, si omnino nulla in partibus huius existat cavitas, aut nullum ejus rudimentum; sin cavitas perfecta membranula quadam obducatur, arrepto pene sinistra manu, dextra cultello aut alio quodam instrumento armata eandem discindunt aut perforant, quam operationem difficilius admodum in ipsius Vesicæ meatu institui posse largiuntur. & non nisi præmissa in urethram cannula, per quam instrumentum leniter trudatur, perficiendam volunt. foramini jam facto turundam plumbeam unguento de thutia obductam ad cicatrizationem usque inferendam, & antea, nisi dum urina sit reddenda, non eximendam.

Curatio  
Morborum  
Vesicæ  
ser-  
vandum  
Paracel-  
sum.

§. 14. *Paracelsus* Vesicæ Inflammationis curationem nullam instituit diversam à curatione partium aliarum inflammatarum, potissimum verò mumiâ laudat, & omnia ex eparata remedia intrò sumenda, externè verò emplastrum suum oppodeltch valide deprædicat.

*Ulcera & Vulnera* Vesicæ curationem minis admittere docet, quam pulmonis. sed si fiat excisio, carnem superne annatam conglutinari & coalescere credit, & non Vesicam; *Putrefactionem* verò præcavet, aut si jam adsit, depelli vult trochiscis de Alkalkengi, & de thure, factis sequentibus additionibus, & quidem ad trochiscos ad Alkalkengi:

R. Sem. Læticæ. 3j.

Terpenbina destillata 3℔.

Ad trochiscos de thure addit sequentia:

R. Mumie,

Laccarubæ aa. ʒij.

Sperm. ceti ʒij.

M.

Et his præter putrefactionem istam, aliquando etiam Exulcerationes, sed difficulter curari pronunciat, monetque in Exulceratione hoc solum agendum esse, ut mundificetur, non ut consolidetur.

*Meatus* Urinarii *Angustia* ab opilatione inductam cantharidum ulu referari posse promittit, quamvis non sint laudabile medicamen, ideòque unam solummodo guttam, addito croco, vult exhiberi, sic enim valde penetrare, & urinae effluxum conciliare dicit: Carunculas oleo laterino absumi, sanguinem congruatam mumiâ dissolvi, omnimodam occlusionem in matrice tempore formationis factis factam nulla arte corrigi, membranulam verò canalem obducentem interdum adimi & discindi posse statuit.

§. 15. *Helmontio* curatio Inflammationis Vesicæ peragitur tollendo vel calculum, vel sal illud corrigendo, cujus occasione sanguinis transitus fuit impeditus & Archeus irritatus, per alcalica quædam convenientia rariora, in quorum communicatione nimis vixit avarus.

*Ulcera, Fistulae & Vulnera* Vesicæ admodum difficulter sanari posse pronunciat, siquidem neque lapis cancrosum, neque alia herba vulnerariæ integris viribus ad vesicam peringere possint, sed circa primam stomachi digestionem vim suam amittant, morbos verò hosce non esse ex acore stomachi, verum ex proprio Archei vesicæ vitio & contagio susceptos, & proinde in morbis huius arcanis opus esse inferre pergit, quoquò penetrantibus, quæ tanien revelare cessat. Si quis verò ob icere velit, lapidem cancrosum esse diureticum; ei respondet, non propter ea adventum ejus in vesicam usque sperandum esse, aut vim ejus intactam & intactam manere, verum fat esse, si lapis ille totum potum spoliaret vi accecente, cum tantillum aliis acoris in lotio partibusque illi subservientibus hostile esse possit, quo ab alcalicis istiusmodi correcto, morbis huiusce ulterius præcindi possit incrementum.

*Meatus* Urinarii *Obstructionem* tolli posse existimat educendo mucum illum iisdem remediis, quibus calculus dissolvitur & ejicitur, carunculas mercurialibus absorbere suadet, membranulam discindi aut perungi permittit, defectum verò ipsius canalus nulla arte resarciri posse autumat.

§. 16. *Wilsanus* accensio in vesicæ Inflammatione eo vergit, ut accensio ista quantumvis compescatur, detrahendo ei ulteriorem sonitem & prohibendo ne de novo sulphureum quidpiam ad vesicam deferatur, quod fieri putat sanguinis depuratione, tum per venæsectionem, tum alia remedia biliosa ejus diathesin corrigentia, aquis scilicet nymphææ, malvæ, violariæ, alkalkengi, syrupo limonum, ex quibus julapia parantur, vel emulsiones seminum 4. frigidorum majorum, addito sale prunellæ, vel ʒo Qto, simulque pro dolore leniendo & vesicæ distenta emollienda unguentum illinit ex butyro insulso, axungia asinerina, oleo amygd. dulc. lil. violar. vel unguentum resumptivum cum rosaceo mixtum,



## CAP. V. DE MORBIS VESICÆ & MEAT. URIN. 367

tum, & ne alvi obstructio vesicæ compressioni & urinæ detentioni anſam præbeat, clyſteres emollientes & intestinalia lubrica reddentes aliquoties injici præcipitur, tum cataplaſmata externæ regionis vesicæ imponi curat ex foliis malvæ, parietariæ, radicibus altheæ, dactylis mundatis in aqua decoctis & per ſetaceum tranſmiſſis, additis farina hordei, lini, oleo roſ. violar. liliorum, nec interna omittit materiam peccantem per urinam expellentia, & hanc promovenſia, cui ſcopo ſequens utile ducit apozema.

℞. Rad. gramin.

acetof.

chæreſol.

fenic. aa. ʒj.

Fol. parietar.

fragar.

violar.

malv. aa. p. j.

Paſſul. probè mundat. ʒiſſ.

Limonium dividuum in taleolos conuſum.

Conſtantur paſſula cum Limonio, & coq. in aq. ſont. lbiiij. ad quartam partis conſumptionem, in Colatur. diſſol.

Sacch. canth. alb. ʒiſſ.

de quo bibat æger aliquoties in die ʒiij. pro Doſi. Doloꝛe urgente, ſequentem exhibet potiunculam hypnoticam.

℞. Aq. Nymph. ʒv.

perulac. ʒiij.

corall. pp. ʒj.

Syr. de papav. ſimpl. ʒb.

M. d. una vice.

Properante Inflammatione hac in ſuppurationem, cataplaſmata externè continuat emollientia, & unguentum dialtheæ cum oleo ſcorpionum ſæpius illinit, decoctum hordei cum paſſulis & radice graminis, diureticisq; materiam purulentam expellit, ex quibus ſequentem laudat pulverem extra ſuppurationem etiam locum habentem, ſi urina diutius detineatur, ejusque ſuppreſſio gravius portendat periculum.

℞. Teſt. ovor. ʒiſſ.

Ocul. ʒiſſ.

Sal. prunell. ʒb.

Sacch. canth. alb.

\*M. F. Pulvis, de quo ʒb. exhibeatur una vice in aqua malvæ & fragatiæ.

In Ulcere Vesicæ ex Inflammatione vel aliunde ſuborto mundantia & abſtergentia approbat, quibus particulæ falſæ corrodescentes ſimul per urinam evacuentur, quare pilulas laudat ſequentes.

℞. Pulv. ocul. ʒiſſ.

Myrrh. ʒj.

ʒis prunell. ʒb.

Sem. apii ʒj.

Cum ſ. q. terreb. Venet. lot. fermentur Pilula gr. j. magnitudine.

de quibus xxi. una vice degluantur. Ut uleus poſtmodum ſanetur & materia acris corrigatur, ulterioꝛque illius proventus præcaveatur, vulneraria commendat, cum levis purgantibus, decoctum folior. alkekeengi, ſanicul. agrimon. ligni ſaſſafr. rad. liquirit. graminis, additis inter dum rhabarb. & foliis ſenæ. Ulcere exiſtente ſiſtuloſo injectiones per ſyringam ulurpat ex aqua calcis vivæ & plantagin. cum unguento Ægyptiaco, aut alia quædam lixivioſa, cum paucula quanti-

tate ʒiij. præcipitati, quibus callo abſumto & ulcere ſatis deterſo, balſamica exhibet, maximè balſamum de Capaiba, vel pulveres conſolidantes ex trochiſcis de Alkekeengi, Gordonii, vel ebore uſto, coralliis pp. ſuccino albo pp. & ſanguine draconis, & continuatis ſimul decoctis vulnerariis, quibus ſoluta unitas denuò conjungatur, foramina ſubſtantia carnoſa de novo repleantur, & cicatrice claudantur.

Hæc quoque remedia vulneraria & balſamica adhibet in iſtis Vesicæ Vulneribus; quibus ſubjungit Tincturas vulnerarias ex hyperico, & ʒli. cancris; externè itidem balſamum Pernvianum vel myrrhæ inſtillat, & emplaſtrum ſtupicum imponit.

Meatum Urinarium anguſtatum ob ſpſmodicam ſphincteris Vesicæ affectionem curare ſolet ſpirituofis & nervinis affectibus convulſivis maximè dicatis, aquâ ſalviæ, cum C. C. & ſyrupo paralyſeos: regionem Vesicæ inungit unguento nervino. vel oleo ſcorpionum cum guttulis aliquot olei ſuccini miſtum. Ab alius Vesicæ affectibus oriundum ſi demtis reſerati, promittit, pituitam craſſam canalem obſtruentem diſſolvit aquis chæreſolii, rutæ, tencantii minoris, cum ʒu ʒis dulci. & carunculas abſumit oleo ʒii. ſaccharo ʒi. linimento, vel emplaſtro ex viridi ætis, autipigmento, ʒio dulci, cum lithargyrio & oleo rolarum parato, & candela ceræ in ſummitate illitum aut impoſitum, quæ meatui inferenda, ſimulque decocta ex lignis interius propinat.

Imperforationem à totali colli Vesicæ, aut penis ſoliditate dependentem incurabilem relinquunt, membranulam verò oriſcium occludentem diſcindi permittit modo à ſuperioribus jam propoſito.

§. 17. Sylvius Vesicæ Inflammationem curat. Sylvius, rus maximè in hoc laborat, ut ſanguini in Vesicæ partibus aut vaſis ſubſiſtenti conſuetus reconcilietur. Motus & fluxus. vaſaque inſarcta referuntur, ut ipſe ſanguis liberum per ea inveniatur tranſitum, adeoque præmiſſis enematus emollientibus & aliquando ſtutus diſcutientibus proſpiciat, ne alvi excrementis diutius ſubſiſtentibus velica nimium comprimitur, & hinc non modo urinæ effluxus impediatur, ſed dolor etiam & ipſa inflammatio augeatur, ſimulque acrimonia acida temperetur, & partes ab inflammatione diſtencæ demulceantur, poſt hæc Inflammationi occurrat ſudoriferis ex ʒio diaphoretico. & oculis ʒi. additis opiatif pro ſedandis ſimul doloribus, qua de cauſa etiam externè foris inſtituit ex plantis emollientibus & aromaticis cum ſpongia vel panno laneo regioni Vesicæ calidè adhibendos, & venæſectionem in brachio averſionis, & in pede derivationis gratia celebrat; & hæc quidem ad inflammationem impediendam, quod ſi obtineri nequeat, operam locat ſedulam, quâ ad ſuppurationem promoveatur, non modo fortibus jam indigatis diutius continuatis, ſed cataplaſmatibus etiam ex ſimilibus emollientibus, unâ cum radicibus ſeu bulbis liliorum alborum, cepis prius aſſis & contuſis, facinisque hordei, ſeminis lini, ſenæ, fabarum, &c. in laſte dulci paratis, additis oleis vel unguentis quibusdam emollientibus, liliorum nempe, chamomillæ, meliloti, unguento dialtheæ compoſito, martiato, quibus etiam regionem Vesicæ antea inungit, & injectiones per penem in Velicam parat

ex eodem decocto emollientium, quibus simul via lubricantur & patefiunt, ut materia purulenta facilius effluat, & rupto abscessu in parte vesicæ exteriore, tumorem à materia purulenta effusâ in abdomine exteriore fuscitatum non minus emollit, ut vel per se rumpatur, vel lancetâ aperiri & pus evacuari queat, quo impuritate abstergit & consolidat, ut ulcus reposcit.

Nulla autem meliora in *Ulcere* etiam Vesicæ reperit remedia, quàm terebinthinata, & balsamum sulphuris, potissimum terebinthinatum, internè in iussulo assumpta, mitigatis & correctis prius humoribus acrioribus per emulsionem aut decocta emollientia, hordei maximè cum glycyrrhiza, tum etiam iisdem diureticis per vias urinarias expulsi, oculis nempe cancerorum, & aliis quibusdam remediis aromaticis convenientibus, quibus impetratis, balsamicis antedictis ulceris mundationem & consolidationem pro voto obtineri posse confidit, & ut facilius ulcus occludatur, adstringentia etiam adhibet, ex myrrha, mastiche, lapide hæmatite, succino, corallio, aliisque aromaticis acidum consolidationem impediens domantibus.

Quæ vero ulterius in ulceribus usurpari possint, eadem esse iudicat, quæ *Vulneribus* Vesicæ conveniunt, decocta nempe vulneraria ex radicibus tormentillæ, caryophyllatæ, consolida, pimpinellæ, herbis faniculæ, equiseti, consolida Saracenicæ, Sanguisorbæ, virgæ aureæ, hyperici, ophioglossæ, perfoliatæ, floribus rosarum, balauftiorum &c. in vino rubro parata, & vel per os sumenda exhibita, additis syrupo myrtino, de symphyto, & similibus, vel cum lyminga externè injecta, ut vulnus mundetur, & mundatum consolidetur, quæ de causâ etiam alias mixturas propinat ex aquis plantaginis, equiseti, hyperici, veronicæ, cum pulveribus hæmatitis, coralliorum, sanguinis draconis, & syrups antedictis, & vulneri emplastrum sticticum ad perfectam unionem usque superimponit, simulque fascias aut ligaturas convenientes adhiberi vult, quò ulterius per vulnus urinæ impediatur effluxus, ipsaque cogatur viam suam ordinariam repetere. Absque externo verò vulnere, aut eodem existente exiguo, si vesica sola interius in abdomine fuerit rupta, & lotium in Abdominis cavitatem fuerit insulsum, ut casu aut contusione interdum fieri potest, simpliciter malum pronunciat lethale, quoniam non modò ascites & gangræna vesicam faciliè invadat, sed vulneri etiam consolidando convenientia non possint usurpari remedia.

*Angustiam Meariæ Urinariæ* à calculo in collo vesicæ hærente, induratum auferri & curari posse docet remoto calculo isto candelâ cereâ per penem immisâ, quâ simul carunculas aliasque excrescentias carnosas deprimi, & urethræ coactum post ulcus sejungi possit, ut urinæ fluxus reconcilietur, donec excrescentiæ istæ sensim consumantur, de resectione verò carunculæ instituendâ valde dubitat, ne forsân totum carnis frustum cum interna vesicæ superficiei coherens vi quadam ita avelleretur.

*Imperforationem* totalem & connatam tum colli vesicæ, tum ipsius penis, in quo nulla existit urethra, vitium credit inemendabile; ubi verò sola membrana quadam orificium penis vel vesicæ obturat, hanc commodò quodam instrumento chirurgico perforari, & sic urinæ exi-

tum parari posse sibi maximè habet persuasum.

§. 15. *Cartesianorum Vesicæ Inflammationem* Curatio  
curandi ratio sequentibus innititur indicationibus. 1. Ut particula acutæ, sive acidæ mitigetur & abigatur, 2. Succorum stagnatio resolvatur, iisque motus progressivus deperditus restituatur, 3. Si hic restitui nequeat, suppuratione eorum promoveatur, & tum absterfio fiat, mandatio & consolidatio. Particularum acutarum angularium succos condensantium, & motum eorum inlibentiam mitigationem & ejectionem instituunt porolis, quibus anguli eorum inviscuntur, & cum iis simul per urinam expellantur, & propterea sequentem proponunt pulverem intentionem hanc optimè promoturum.

℞. Ocul. Eb. ʒij.

℞i diaphoret. ʒb.

Sperm. cet. ʒi.

℞i succin. gr. vj.

Camphor. gr. ij.

M. F. Pulvis, in iussulo, potu, vel sequenti mixtura ternis vicibus exhibendus.

℞. Ag. fœnic.

charafol.

petroselin. aa. ʒij.

Tinctur. hyperic.

croci ʒj.

Syr. heder. terrefr. ʒj.

M.

Ubi ex maxima fibrarum vesicæ distensione dolor vehemens suboritur, unum vel alterum granum pulveribus istis addunt laudani opiatum, attenuationi succorum simul utilis. Ut enim stagnatio resolvatur, & succus debitus concilietur motus & fluxus, studiosè allaborant, & hac de causâ salia volatilia frequenter habent in usu, qualia sunt ʘci, C. C. in vino dulci guttatim assumpti, succus nasturtii aquatici, beccabungæ, raphani sylvestris & hortensis, cochleariæ, aqua alkekengi, parietariæ, quibus simul calculus ad exitum promovetur, ne meatum obstruendo urinam diutius subsistere & corrumpi cogat. Pro meliori etiam attenuatione succorum incrassatorum externa adhibent regioni vesicæ, sed penetrantia & calida, ut epithema ex spissitu vini camphorato, cataplasma ex radice cucumeris asinini, raphani, sio aquatico, beccabungâ, petroselino, phellandrio, fl. ribus sambucæ, meliloti, semine dauci, camphorâ in spiritu vini coctis & calidè impolitis, quorum penetrationem si cutis abdominis densior prohibeat, eandem emolliunt & rarefaciunt unguento anodyno, martiato, oleo anethi, liliorum, petræ, &c. Sed si pro fluore & attenuatione impetrantius incassum laboretur, quòd nimia succorum incrassatorum copia & stagnatio eadem prohibeat, & reliqui liquores affluentes eandem compellant, & ad suppurationem cogant, etiam hunc faciunt emollientibus, ut succus purulentus eo citius prorumpat, impositis cataplasmatibus ex foliis parietariæ, althææ, cepis sub cineribus asilis, heubus, fermento, floribus camomillæ, melliloti in ceravisa coctis, additis semine lini & unguento althææ vel basilici, vel emplastro diachylo & de meliloto, oleo liliorum invicem malaxatis. Rupto abscessu in cavitate vesicæ, materiz purulentæ per urinam promovent effluxum, & corruptionem ejus prohibent ʘu terebinthinæ in iussulo sæpius exhibito, vel lequenti mixtura.

℞. Aq.

# CAP.V.DE MORBIS VESICÆ & MEAT. URINARIJ. 369

℞. Aq. Agrimon. 3j.

Sced. 3vj.

Tinctur. propriat. Mynf. 3j.

℞ci succinat. 3℔.

Syr. hyperic. 3℔.

M. d. cochlearum.

In parte Vesicæ gibbâ materiâ purulentâ exitum sibi parante, & tumorem in abdomine producente, cataplasinata emollientia continuant, additis fortioribus quibusdam penetrantibus, ut  $\times$ co,  $\Theta$ e alcali, lapone, quibus si cutis exterior attenuata quidem, sed nondum penitus rupta sit, lancetta vel cunctello acuto eandem aperiant, ut pus effluat, quo factò ulcus mundatum linimento ex terebinthina, gummi elemi, myrrhâ, æruginè, oleo hyperici composito, & emplastro griseo, vel de gratia Dei appellato ulcus penitus sanant.

Et hac ratione in  $\cdot$ lcere quoque Vesicæ curando procedunt, quamvis difficilem hanc esse curationem prænunciem, ubi enim interius solum habeat exitum, reinedus externis & manu nihil vel parum potest præstari, sed remediis internis corruptio prohibenda, ut  $\sim$ u terebinthinæ, Tinctura succini, essentia plantaginis *Angeli Sala*, oculis  $\Theta$ s, myrrhâ, terrâ cæchu, &c. per syringam verò decoctaachimillæ, plantaginis, agrimoniz, glycyrrhizæ, in aqua terebinte facta, additis tinctura myrrhæ, vel essentia aloës & melle rosarum, sunt injicienda. Foramine verò in abdomine existente, unguenta mundantia cum suppiss aut turundis imponunt, & uti in aliis ulceribus procedunt. Pessimum tandem illud estimant ulcus Vesicæ, quod & foris per abscessum, & intus in cavitatem vesicæ meatum possidet, quoniam facile redditur fistulosum, & fistula Vesicæ admodum difficile veram curationem admittit, sed frequentius palliatiua tractari debet, exhibendo interius decocta vulneraria cum lignis, & per catheterem aut syringam injiciendo succum apii & chelidonii majoris, cum alve in vino solutâ, non omittis cataplasmatibus corroborantibus ex fœordio, phellandrio, ruta, centauro minore, hedera terrestris, radice aristolochiæ rotundæ, valerianæ, semine cuminum, sinapi. Quando in fistulas ipsas via conceditur, lapidem alchimiæ in aqua hederæ terrestris & agrimoniz solum per syringam injiciunt.

In Vulneribus Vesicæ, tanquam partis membranose, summo studio convulsiones impediendas aut tollendas volunt, & propterea quamprimam sequentem fauciatæ exhibent mixturam.

℞. Aq. Plantag.

Veron. 2a. 3vj.

Salv. 3℔.

Tinctur. Pæon. 3℔.

℞. C. C. succinat. gr. xij.

Camphor. gr. viij.

Syr. Sympht.

Paralyf. aa. 3℔ij.

M.

Vel sequentem:

℞. Aq. Charfol. 3℔.

Regin. Hungar. 3℔.

Ocul.  $\Theta$ s. 9j.

Corall. 3℔.

Pulv. 3ij. gr. vj.

Camphor. gr. ij.

Sacchar. canib. alb. 3℔.

M. d. cochlearum.

Externè etiam unguenta illinunt nervina, & an-  
tispalmodica, potissimùm verò sequens:

℞. Unguent. nervin. 3vj.

Balsam. Peruvian. 3j.

Ol. Peira 3℔.

rorismatin. 3j.

succin. 3℔.

M. F. Linimentum.

Datis hoc factò induciis, & vulnerato lethi fa-  
cibus erepto, decocta vulneraria suadent vulne-  
ri instillant balsamum italicum, & epithemata  
ex herbis verbenæ, veronica, equisetò, vinçâ  
pervincâ, semine hyperici, &c. in  $\sim$ u vini ma-  
ceratis imponunt, quini fascias adplicant, vulne-  
re ad longitudinem inflecto, & consolidatio-  
nem emplastro oppodeltoch *VVii 1211*, & dia-  
sulphuris *R. dandi* student facilitare.

Angustiam Meatûs Urinarij curari dicunt re-  
movendo ipsam causam obstructentem, veluti cal-  
culum, materiam viscidam attenuantibus &  
diureticis,  $\sim$ u lumbricorum.  $\times$ ci succinato,  
essentia chærefolii, succo nasturii, &c. ablu-  
mendo carunculas internis diaphoreticis, vel  
Galibus, tum fistulam auream, argenteam, vel  
plumbeam optime lævigatam canali penis insin-  
nuant, & per eandem pulveres consuetos immittunt  
ex alumine usto, æruginè,  $\times$ orubro,  
Ae. sabina: ex gr.

℞. Pulv. sabina 3j.

3ij. rub. 3℔.

M. F. Pulv.

Vel stylo mediante unguentum Apostolorum,  
aut aliud quoddam conveniens illinunt ex buty-  
ro terebinthinæ,  $\times$ ro rubro, æruginè, hinc ex-  
crefcentis illis absumtis cuculcula relicta sanant,  
vel pulveribus ex lapide calaminari, terrâ  $\Theta$  li  
dulci, sigillatâ lithargyro, plumbo usto, Tutia,  
camphorâ, vel emplastro diapompholygos, aut  
oppodeltoch *VVii 1211*, eximendo interea, quo-  
ties opus, styllum istum, ne urina diutius de-  
tineatur. Tumores Parastatarum discutientibus,  
& succos stagnantes resolventibus autrunt ex  
superioribus cognitis, sicuti spasmodicos spasm-  
ictis affectus nervinis & cinabarinis idem jam  
indignitatis nôrunt depellere.

Imperforationem, vel defectum meatûs urina-  
rii in vesica vel pene nulla arte, uti nec alii, re-  
stitnere sciunt, & in extremitate verò concretum  
canalem aperiant cunctello acuto, quæ operatio  
ut promptius peragatur, ægri supini glandem si-  
nistram prehendant, & dextra cunctellum tenente  
membranam dividunt, quo factò styllum plum-  
beum lævigatum, & unguento de Tutia illitum  
tandiu insinuant, & nisi urina sit reddenda, in-  
fixum servant, donec inducâ cicatrice meatus  
hic plane confirmetur.

§. 19 Me suadente, Inflammationem Vesicæ *Ex nostra*  
debitè curaturus nihil intermittere operæ, quâ *sententia*  
poros partium ab heterogeneis & silvestribus *curatio*  
particulis ex sanguine evalato & corrupto orium-  
dis liberet, ut sufficiens particulis convenienti-  
bus pateat transitus, quod apud sudoriferis ob-  
tinetur, hinc commendamus  $\sim$ um C. C. volat.  
succini,  $\square$ æ, cum  $\nabla$  chærefolii,  $\Theta$ ia volatilia  
oleosa & alcalia quæcumque. A purgantibus  
& diureticis fortioribus acrioribus omnino ab-  
stinendum puto, imprimis autem noceat as-  
terisco, ut quantum possibile urinae aut al-  
vi suppressio, quæ sæpe malum augent, te-  
moveant.

Aaa

moveantur, hinc enema ex emollientibus & anodynis, aut lacte cum nitro sæpe convenit, & interponendæ sunt ad partes acriores demulcendas emulsiones ex seminibus 4. frigidis, portulac. violar. papav. alb. quibus subjungenda externa quædam dissoluta, particulas coagulatas ex sanguine corrupto resolventia, & acutas obtundentia, quod oleosis temperatis & alcalicis saturatè imprægnatis peragere possumus, quare inungatur pestem oleo rosarum cum camphora, aut applicentur sacculi ex radicibus & foliis malvæ, altheæ, floribus chamomillæ, verbasci, farinâ lini, fabarum, &c. vel fiat infusum in lacte vel decoctionis emollientium, vel instituat focus ex prædictis herbis. In metu Gangrænæ cataplasma ex farina fabarum, & lupinorum in vino decoctis applicetur, addendo aloem, myrrham, &c. aut vini camphoratus sæpius illinatur.

*Vlcus* *Ustula.* Si discussio pro voto obtineri non potuit, sed inflammatio transit in *Ulcus*, & hoc in Fistulam, etiam hic interna sudorifera non negligenda sunt, ex quibus hoc in casu imprimis conveniunt essentia lignorum, vel decoctum ligni sancti, cum radicibus calami aromatici, herbis scordii, nasturtii & *Q*ue *Q*i, essentia orismarini, Tinctura *Q*i Zata, essentia chærefolii, traumatica nostra, post quæ omnia ea hic conducunt, quæ humorum acrimoniam temperant. Ulcus sine morfu abstergunt, & acre aut corruptum quodvis emendant, quò referuntur lacticinia, deturque decoctum sequens vel simile per longum tempus.

*Rad. Scorzon.* 3ß.

*liquirit.* 3ij.

*Horid. mund.* Mß.

*Caricar.* No. vj.

*Herb. agrimon.*

*heder. terrestr.*

*Flor. malv.*

*violar.* aa. P. j.

*Flav. cort. exter. citri.* 3ij.

*F. Decoctio in* *Q* *commun.*

Sic ab aliis decoctum chamæpytheus cum lacte magni æstimatur, ab aliis decoctum *Thoneri* in *Obs. p.* 176. Trochisci *Gordonii* à multis specificè laudantur, nonnulli summis laudibus effertur balsamum *Q*is terebinthinatum & succinatum, alii trochiscos alkekengi, decarabe, alii Gum dulcem. Ad consolidandum Tinctura *Q*is *Q*li, antiphthifica, corallorum cum cera, succini, hyperici, veronicæ, aliaque vulneraria. Ad dolorem leniendum exhiberi possunt varia opiat, papaverina, lacticinia, imprimis si malum fuerit obortum à cantharidibus. Terebinthinata sæpe omnem implent paginam, ex quibus varix cõcinnari possunt formulæ. Acidulæ si modicè assumantur, & mineralia in iis non fuerint fortiora & acria, seu venenosa, opem aliquam asserere possunt, sic exemplo *Tulpii lib. 2. Obs. 53.* ulcere vesicæ vexatum per fontis Spadani usum curatum esse constat, nos tamen thermarum usum illis præferimus, qua de re confer etiam *Scholtz. p. 383.* & *Eismüllerum.* Infundantur etiam liquores idonei partibus ulceratis, imprimis sequens.

*Ælixir. vii.* 3j.

*vin. camphorat.* 3ß.

*Q*is volat. oleos. 3ß.

*R. asfætid.* 3ij.

*Q*is *Q*i 3ß.

*Myrrh.* 3ij.

*Aloes* 3j.

*M.* vel potest dilui aquâ hederæ terrestris. Imponatur liquor hic calidè cum plumacolis. Injicienda etiam convenientia quædam remedia sunt per catheterem vel syringam, uti lac recens, succus plantaginis, *Q* *Q* cum sief albo, vel sequens decoctum.

*Rad. symphyi.*

*bistort.* aa. 3j.

*Sem. hyperic.* Mß.

*Cort. granat.* 3ij.

*Coq. in* *Q* *ferrat. & in eo dissolv.*

*Trochisc. alb. Rhos. f. op.* 3ß.

*bol. Armen.* 3j.

Si sanguis simul prodeat, injici potest cum aqua plantaginis aqua nostra stiptica, quæ terarò faller.

In *Fistula* conveniunt succi centaurei minoris, chelidoni majoris, apii, nasturtii, cum aloë & *Q*io dulci, vel in præcedente decocto dissolvatur lapis medicamentosus, & per syringam itidem injiciatur.

In *Vulneribus* Vesicæ ante omnia aeris accessus impediatur, extraneum quodcumque è vulnere eximatur, symptomata præcaveantur & avertantur, ex quibus hic potissimum timenda sunt ischuria, dysuria & convulsiones. Interdè ergo dentur essentia hyperici, & salviæ. cum *u* C. succini, & oleum terebinthinæ. Vulneri instillantur balsamus de Peru, Capaiva, oleum terebinthinæ, *u* s lumbricor. & camphoratus, vel Elixir vitæ. Consolidatio fit interne decoctis & potionibus vulnariis, ex radice aristol. liquirit. altheæ, herb. veronicæ, agrimonix, plantag. heder. terrestr. flor. malv. arbor. nymph. viol. essentia traumatica. Externe balsamis vulnerariis, sacculis dissolventibus & emplastris aliis sanantibus.

Si Urethra callosis & malignis excrecentiis *Meatus urinarius An-* repleta sit, & urinæ ab his impediatur excretio, illico specillum argenteum inauratum, & undi- *2<sup>a</sup> fig.* ca quæ crenis sive incisuris constans immittendum est, ut urinæ via reddatur libera. Præmittantur etiam sudorifera, & sæpius in lecto sudet æger, candela quoque cerea oleo amygdalarum dulcium oblita quàmleviter immittatur urethræ, quæ commodius sæpe adhibetur, quàm specillum argenteum. Hæc candela Chirurgus inquirat, ubinam obstructio hæc existat, loco sic invento, notanda est longitudo, ad quam candela fuerat immissa, postmodum nonnihil attenuata, massaque quapiam exsiccante, conflumante ac corrodente obducta, candelæ extremitas denud in urethram ad partem usque affectam erit intro mittenda, & aliquoties repetenda. Sunt, qui in hunc finem lammæ ex viridi æris, & *Q*io *Q*to adhibent, ceu videre est in *Eph. Germ. Decur. 1. Ann. 8. obs. 92.* inde enim elichara fit, quæ dein separata urinæ conceditur transitus. Sed me iudice à nimis corrosivis, arsenico, *Q* *Q*li, *Q*is, &c. abstinendum est, quia urethra sensilis admodum est, & ex acris istis corrosivis gangræna facillè proficitur, quia fibrillæ omnes corroduntur, quibus corrosis succi nervi circulatio plane tollitur, & sic necessariò mors partis hujus provenire debet, quale exemplum & nos præter *Hildannum Centur. 4. Obs. 55.* notavimus.

*Car.*



## CAP. V. DE MORB. VESICÆ & MEAT. URIN. 371

Carnosæ hæc excreſcentiæ urethram vel in totum, vel in tantum obſtruentes, oleo ſuccini cum vitello ovi mixto & in urethram intruſo curari poſſunt, vel ad mentem *Riverii Cent. 2. Obſ. 14.* candela cereæ linteolo obducta & ſequenti linimento intincta urethræ ſæpius intrudatur.

℞. Ol. roſar. lb̄ß.

Ceruff. vera ʒij.

Camphora.

Tutia aq. roſ. lot. aa. ʒij.

Lithargyr. Opp. ʒiſſ.

ʒii optimè pulveriſ. ʒvj.

Opi.

thuris.

maſſich.

aloei ſpat. aa. ʒj.

M. omnia, & ſerventur ad uſum.

Cl. D. *Stalpart* quatuor homines, quibus tota ferè occluſa erat urethra, ita ut per anguſtiſſimum tantùm efflueret urina foramen, ſequenti curavit remedio.

℞. Oſ. ſepia,

Tut. pp. aa. ʒij.

C. C. uſſ.

Aloeſ lot.

Ariſtol. ʒ aa. ʒj.

Alum. uſſ. ʒß.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Poſtmodum

℞. Ol. Roſar. ʒij.

Lithargyr. ʒ ʒj.

Fiat decoctio quonſque acquirat Emplaſtri conſiſtentiam, dein ab igne ſepoſito addde illum pulverem, & ab ignem tractato & miſceto, donec medicamentum evadat durifſimum.

Hoc remedium inſtar emplaſtri extremitati candelæ cereæ applicetur, & ſic urethræ intrudatur. *Fabric. ab Aquapendente* hoc in caſu magni æſtimat pulverem ſabinæ, & *Veſalius* pulverem radicis petſiditis. Excreſcentiis iſtis imminutis, ægroti poſſunt, ad exemplum monachi, cujus *Riverius Cent. 4. p. 67.* mentionem inſcit, plumbeum in urethra geſtare tubulum, quem ſenſim ita intrudent, uſque omnia riè peragantur; alii inſtrumentum argen-

teum ſuadent. Si Verruæ adſuerint, quæ obſtructionem faciunt urethræ, eæ tubulo argenteo ſunt exurendæ, & poſtmodum pars affecta alumine conſpergenda, nec non ʒ. roſarum, cui tutiz non nihil admiſtum ſit, ſovenda, vel aqua ʒ-lata, vel atramento tingenda.

*Imperforationem* totalem Urethræ in ipſa formatione in utero productam, ubi nulla planè cavitas pro canali urinario relictæ eſt, ut incurabilem relinquimus, ſiquidem aut mors eandem citò excipit, & ſætuſ ejusmodi occluſione laborans non diu vitam trahit. aut urina alium ſibi paravit exitum in inguinibus, vel parte quadam alia abdominis. Quando verò ſola quadam membranula vel in ſuperiore glandis parte extremo urethræ, vel veſicæ colli oſculo, adcrevit illudque obtegit, uti candela cerea vitium poſterioriſ facile explorari poteſt. membranula iſta lanctæ, vel alio quodam inſtrumento diſcindenda aut perforanda; in oriſicio verò veſicæ inſtrumentum ſatis apertum per canalem argenteum inſinuandum eſt, eâ quidem menſurâ, quæ candela cerea ante operationem fuit explorata, ne profundius juſto intrudatur, itidemque membranula ibi hærens cautè pertundatur, & poſt urinz juxta membranam iſtam morantis effluxum, vel linteo humectato vino, in quo balauſtia, roſæ, folia plantaginis, myrobalani, maſtix, & terra catechu incocta fuerunt, foramen in glande abluatur, vel per ſyringam ad collum veſicæ vinum illud inſpergatur, tum ne labia vulneris huius artificialis conniveant, & antecicatricem circumquaque obductam denuò concreſcant, turunda quædam ex unguento de tutia vel diapompholygos ad debitam conſiſtentiam inſpilata, vel candela cerea, aut ſtylus plumbeus linimento tali, vel alio quodam liquore cicatrificante ex ſucco plantaginis, in quo tutia diſſoluta, obductus, donec callus excreſcat, inſinuetur, æ quoties urina reddenda. extrahatur, eique effuſa reſtituatur. Ad incontinentiam urinz à veſicæ vitio obortam & immedicabilem feliciter adhibetur brachierium, quod deſcribit *D. Nuk.* in *Exeprim. Chir.* quod inſtrumentum conſicit *Mechanicus Lugdunenſis Johannes à Muſchenbrok.*

## CAPUT VI.

### De Perinæ Inflammatione, Abſceſſu, Ulcere, & Gangrana.

#### §. I.

**U**T quacumque Microcoſmi percurramus angulos, & latentes in iſdem in apertum protrahamus affectus, etiam ad Perinæi morbos nunc deſcendimus explanandos, cujus Inflammatio non diſſert ab ea, quæ alias invadit corporis partes, nili quòd majori quandoque ſtipata ſentiat dolorē, & ob vicinitatem colli Veſicæ urinz ſuppreſſionem inducat, propterea tamen peculiari hic non indiget deſcriptione, ſed ex antecedentibus eam jam ſatis facta eſt cognita.

**Abſceſſus.** Abſceſſus Perinæi eſt tumor in ſpatio hoc productus à materia purulenta, ex ſuccis è tubulis ab inflammatione diuturniore deſtructis copioſius effluentiſ, & tractu temporis magis compaſtis oriunda.

Ulcus eſt continuitatis in ſpatio hoc diſſolutio. *vici.* tio, à ſuccis acidis erodentibus induta.

Gangrana Perinæi, eſt partis huius incipiens Gangrana mortificatio, in qua color conſuetus, & ſenſus aboletur, à ſuccorum majori coagulatione dependens.

§. 2. *Pars affecta* eſt Perinæum, ſeu Inter ſcæ-*Pars affe-* mineum locus ſcilicet, ſive pars illa; quæ à Scroti radice extenditur, ex muſculis cute & cuticula obductis, nervis & valis tum ſanguiferis, tum lymphaticis compoſita, in adultis pilis obtecta.

§. 3. *Peculiari* non indigent affectus hi *Diagnofis,* quoniam ipſi morbi ex ſuis indicis alibi prolatis cognosci poſſunt, num verò iidem partem hanc invadant, tum ægri relatio, tum ipſe adſpectus Chirurgi omnium optimè manifeſtabit.

Aaa 2

§ 4. Cauſam

*Ætiologia  
et eundem  
Galenicos.*

§. 4. Causam *Inflammationis* Perinæi adscribunt *Galenici* tum ipsius sanguinis intemperiei calidæ, tum ipsius partis agnationi aut incallescenzæ ab equitatione diuturniore, frictione, collisione, vel aliis quibusdam causis irritantibus externis inductæ, ob quam sanguis iste calidior majori copia in regionem hanc Perinæi alliciat, vel, uti loqui solent, attrahatur, qui partem non modò in tumorem extendat, sed calorem etiam, ruborem, pulsum & dolorem in ea suscitet propter nimiam istam distensionem, & sanguinis dispositionem calidam.

*Abscessus* ejus fit, dum sanguis iste in priori *Inflammatione* corruptus, vel humores eidem intermixti ab aliarum partium facultate expultrice irritati, & partis hujus attrahente validiore, expultrice verò debili transmittuntur, & diutius retenti mediante concoctrice in pus vertuntur, eò quòd in partis nutrimentum facere nequeant.

A pure autem in *Abscessu* acriore reddito, vel succis quibusdam acribus ad partem hanc confluentibus *Ulcus* produci opinantur, dum cutis ab iisdem tandem erodatur, quod etiam ab externis quibusdam rebus, sudore, urina, venenis, vel medicamentis etiam falsis acnibus & corrodentibus fieri solere affirmant.

*Gangranam* parti huic inferri autumant, vel ab intemperie partis nimis calida, aut nimis frigida, aut spirituum interceptione, ne partem hanc influere possint, vel destructione partis ex percussione violenta, aut erysipelas aliorumve morborum perversa curatione, dum nimis frigida loco huic apponantur, aut nimis acria, à quibus omnibus pars hæc corrumpatur, & calor ejus natus extinguitur.

*Paracelsus.*

§. 5. *Paracelsus* Perinæo *Inflammationem* induci fingit à sale quodam arsenicali in locum hunc ex interna quadam minera illato, abs quo calor & rubor exciteretur. *Apostema* verò à sale sanguinis hic collecto, & humores corrumpente, *Ulcus* à sale quodam vitriolico suscitari putat, abs quo cutis erodatur, ut externa quædam fiat apertura, uti *Gangranam* parti huic inferri existimat, si à natura narcotica stupor quidam fuerit inductus, à abolito sensu, & tum calor præternaturalis super venerit, abs quo ignis hujusmodi accenditur.

*Helmontius.*

§. 6. *Helmontii* iudicio Perinæi *Inflammatio* dependet ab Archæo hujus partis ab externa quadam causa, tanquam ipsa, lapsu videlicet, contusione, vel frictione nimium irritato, ut se etiam ipse accendat, & admissio cruore in parte externa signum furoris sui cum dolore & calore appendat.

*Abscessum* Perinæi fieri putat, dum Archæus mucilaginem sextæ digestionis in directè adventanem, & parti huic insidiantem expellere nititur, sed tandem fatigatus cessat, mucilago verò loco pulsa, cruori ab acido, seu ulceris sequuntur radicali fundamento, coagulato mista partem in tumorem distendit.

Tandem verò & *Ulcus* ipsum hoc in loco sequi statuit, quando acidum istud partem hanc exedit, & solitudinem ejus dissolvit, quale acidum sæpius quoque hæret in lactice ab externa quadam occasione prolecto.

*Gangranam* parti huic inferri sibi aliisque persuadere studet à sale quodam corrosivo, degenerante, ex lege, & à vitali republica pro scri-

pto, abs quo ingens in parte exciteretur calor, eandem exiens & interdum erodens.

§. 7. *Villissum* percipimus *Inflammationis* Perinæi causam adscribere sanguini, in partibus hujus interstitiis, vasive minoribus ob lentorem hærenti, eademque obstruenti, aut ab externa, vel interna quadam causa extravasato, & ob turgescenziam ibidem aggesto, sicque calorem, & ratione solutionis continui dolorem acutum inducenti, qualem lentorem sanguini inferre credit frigus externum, ab aere vel aqua parti huic communicatum, sicuti extravasatio promoveri possit ab agitatione nimia, adnotatione rerum calidarum, urina acris, aliisque rebus imprudentiùs applicatis.

Ex *Inflammatione* ista suppurata *Abscessum* suscitari docet, dum particule sanguinis spirituosæ avolant, & sulphureæ, salinæ & terrestres absque ullo vinculo, & dissolutæ inter se invicem fluctuant, donec particule salinæ sibi dominium rapientes cutaneas partes erodant, & materiæ huic exitum parent.

Dum verò erosio ista fit, *Ulcus* produci statuit, quod pro diversitate particularum istarum salinarum modò profundius, cum prostarum & vesicularum seminalium, vel etiam colli vesicæ latione, modò superhæcietus saltem excitatur, & interdum in sinum mutatur fistulosum.

*Gangranam* partis hujus fieri existimat à particulis salinis non modò sanguinis, sed aliorum quoque humorum huc confluentium in fluorem degenerantibus, & sulphureas sibi adfociantibus, adeoque ita destructivis redditus, ut spiritibus deturbatis partem liquore privent vitali, & septica sua vi eandem plane exurant.

§. 8. *Sylvius* in Perinæo *Inflammationem* exci-  
tari posse putat, dum vel ab externo frigore partem hanc ambiente, vel à re quadam frigida admota sanguis ipso motu impeditur, vel à lapsu, contusione, aut alio quodam motu, aut agitatione violentiore vasa vel comprimuntur, vel dilacerentur, ut sanguis effundi & stagnare cogatur, eoque stagnante partes spirituosæ volatiles, salinas acidasque temperantes, evanescere incipiant, unde utraq; acrioris factæ acris in se mutuo insurgant, & ob partes oleosis sanguinis simul præsentibus effervescenziam calidam hoc in loco excitent, & hinc tumor ille igneus dolorosus.

Dum verò temporis tractu ipse illæ partes acidæ & salinæ aciores sanguinem ita corrumpant, ut in pus vertatur, *Abscessum* inde produci docet; ut si partes acidæ acres cutem hanc plane erodant, *Ulcus* emergere solet.

Ab eodem acido acris etiam *Gangranam* partibus hujus oriri pronunciat, dum acrimonia tanta fit, ut cutis inde corrumpi incipiat, & colorem rubrum aut subpurpureum acquirat, sub quo si partis integritas non servetur, & corruptio increseat, ipsum ad eam pervenire nigredinem cum periculo partis perituri.

§. 9. *Cartesii* Perinæi *Inflammatio* produ-  
citur ex succorum incrassatione sanguini trans-  
lanti per ramulos arteriarum hypogastricarum  
circa regionem hanc distributos denegante,  
simulque arteriolas comprimente. Incrassari  
verò succos afferunt, dum motus eorum demum  
consuetus inhihetur à re quadam externa tubulos  
comprimente aut fibras compingente, quales  
sunt

*Corisialis.*  
dei.

sunt conglusiones, mora diuturnior in aqua frigida, in qua cutis perinæ cum seroto, cui contenta est, præ reliqua corrugatur, frictiones, vel alie; abs quibus pori & tubuli angustantur, ut nonnisi æther subtilis per eos transitum repe-riat, abs quo particule porosæ sanguinis, & angulares portionis chylosæ in se invicem nimis agitentur, unde non modo incallescencia oriatur magna, sed motum etiam earum impetuosum fibrarum continuitatem dissolvere, unde dolor, & à succis è tubulis suis effluentibus & stagnanti-bus tumor. Facile verò & hic loci diversorum liquorum fieri posse dicunt effluxum, quoniam & ligamenta ossis pubis, & musculi directores penis acceleratoresque urinae hac in regione sub cute latent, quæ omnia succis suis irritantur, & eosdem in tubulis suis continent, cum pro nutri-mento sui, cum ut pro membrorum motu ab eis-dem debite infleuntur. A particulis salinis cum succis copiosis huc allatis, vel ab ulceribus par-tium vicinarum, aliave de causa allabentibus in cute hac laxiore aliquando pruritus induci asse-runt, pro quo sedando dum homines unguibus locum hunc scalpant, fibris agitatæ maiorem ad-huc cieri succorum affluxum, qui tam promptè per poros tubulosque reverti nequeant, sed stagnare & poros cutaneos in tantum angustare, ut soli æthe-ri subtili permeare liceat, qui adhuc magis eos-dem, & imprimis diversas eorum particulas agi-tando tumorem istum inflammatorium suscitât.

*Abscessum* Perinæ inflammationem quando-que sequi existimant, quoniam succi ita incrassa-ti fuerunt, ut nullo modo attenuari poterint, sed chylus coagulatus accensens fibrulas, & tubu-los dirumpendo citius unitur, sicque cuti ap-proximas materiam præbet purulentam, quæ diutius sub cute densiore, & non aperta detenta, ob succorum novorum particulas porosas secum devehentium affluxum, quibus particule angu-lares chyli accensitæ se immiscunt, & cum eis ef-fervescunt, sicque assiduò in fibras vicinas agen-do, eas, ut priores, rumpunt, & maiorem effor-mant cavitatem, inde interdum abscessus iste magnum capere solet incrementum, cum par-tium vicinarum destructione.

*Ulceræ* in partem hac suscitata originem sumere dicunt vel à materia ista purulenta, sive chylo accensente in abscessu collecto, & cutem dissol-vente, vel à succo quodam multis particulis acu-tis erodentibus prædito per scalptionem, contu-sionem, lapsum, vel alia quadam de causa prole-cto, uti & urinam falsiorem partem hanc diutius humectantem, vel materiam spermaticam corru-ptam in lue Venerea eandem irrigantem, hujus-modi erosionem inducere posse aliis libenter concedunt.

*Gangrenam* parti huic obvenire statuunt à majore tubulorum destructione, compressione, & succorum omnimoda coagulatione, ut ad fluorem planè existant inepti, sicque calor par-tis hujus extingui incipiat; coagulari verò suc-co & tubulos comprimi & destrui asserunt ab externo frigore vehementi partem hanc imme-diatè ambiente, remedium frigidorum impru-denti applicatione, lapsu, aut contusione, abs quibus omnibus liquorum motus inhibetur, & particule eorum stagnantium acutiores ab æthe-ri vehementius agitatæ fibras destrunt, ut de-struatis tubulis, & absumpto calore pars hæc e-moriatur.

§. 10. Ex *Nostri* sententia Inflammatione af-fligitur Perinæum, vel per consensum, quando scilicet illa ab alia parte ipsi communicatur, vel à causa quâdam externâ ea illi inferitur, vel tan-dem à causa interna, sanguinis nimium, lym-phæ, ac aliorum succorum in tubulis stagna-tione, quando enim ductus urethræ incumben-tis à calculo obstruitur, arteriæ sanguinem in mus-culos deferentes, venæ illum ab ipsis referentes, & vasa lymphatica lympham devehentes com-primuntur, sanguisque ac lymphæ cursus im-peditur, eorum autem moram trahentium vola-tiliores particule continuè, quod donantur, motu evaporantur, crassiores verò resistent. Sanguine itaque volatilibus, quæ exhalatæ sunt, & al-calcis depauperato particulis, sulphura in eo contenta acidis in massa ejus superficiibus obfi-scere nequeunt, sed ab eisdem coagulantur. Sul-phura autem coagulata in angustioribus tubulos propulsa in illis commorantur, eosque obstru-unt. Crassa alcalica, quibus ob molem avolare non fuit concessum, à subtilioribus ut antea in motum non acta, patulis suis poris acidia exci-piunt, ex quo coactum producuntur salia: à ma-teria subtilis perpetuo fluxu adveniens, nec per poros aut inversos, aut obturatos liberè per-means, & à novis istis salibus in sanguinem vel lympham reflexa in vehementiorem motum particulas adigit, ipsasque fermentat ac ræfa-cit, nec prius cessat æstus ille, quàm salia perfra-cta fuerint, pristinaque pororum restituta recti-tudo & figura.

Idem exoritur affectus ab urethræ exulcera-tione, tenuiora siquidem salia in pure contenta per urethræ poros elabentia, & ad perinæum usque delata, musculorum ejus & vasorum fi-brillas penetrant, aculeis suis illas vellicant ac lancinant, & in cincinnos contrahunt, fibrillæ itaque violentioribus crebrioribusque suis vi-brationibus sanguinem lymphamque validius exagitant illa rarefaciunt, talis enim liquor amplius, quàm antea, spatium occupans vaso-rum tunicas distendit, & adacta rarefactione eò usque vasorum parietes extendit, ut desinen-te fibrarum illarum elasticâ vi distumpantur tu-nicæ, comprehensæque humor effundatur, quo extravasato, volatiliores ejus particule exhalan-tur, crassiores remanent, coagulantur sulphura, abs quibus obstruuntur tubuli, & procreantur salia ab acidorum cum alcalicis connubio, unde adaugetur sanguinis lymphæque motus, cum materiæ æthereæ liber transitus non conceda-tur. Semen in vesiculis moram trahens, in iisque putrescens, prout fieri solet in lue Venereâ af-fectis, ac fermentum Perinæ inflammationem inferre potest, quum enim semen tenuissimis volatilissimisque salibus sit ditatum, si ipsi ex-itus per ordinarias vias denegetur, volatilia illa salia rapidissimo continuoque motu donata, phlegmata, abs quibus sunt dissoluta, exagitant & attenuant, ac ad evaporationem determinant, sulphurumque, abs quibus colligata detinen-tur, vincula frangunt, & eorum amplexibus li-berantur; sui juris ergo facta vesicularum semi-nalium poros pervadunt, & ad Perinæum accen-dunt, partium illud componentium fibrillas subeunt, illas pungunt & vellicant, ac in spasmo-dicos agitant motus, unde contingit superius jam indigitata sanguinis rarefactio, ejusdemque extravasatio, sulphurumque illius coagulatio,

Aaa 3 abs

*Nostri* sen-tentia de causis Pe-rinæ In-flamma-tionis.

abs quibus tubulorum obstructio oritur, & ob-  
turbatio, saliumque procreatio fermentationem  
istam excitantium.

Calus in Perinæum, vel vehementior lon-  
giorque crurum ductio partis hujusce Inflam-  
mationis causæ esse possunt; si quis enim apertis  
diductisque cruribus in corpus aliquod durum  
cui Perinæum fortiter applicetur, deciderit, par-  
tis quæ in corpus durum impingit, vasa quæ-  
dam dirumpuntur, aut comprimuntur. A prio-  
ribus excernitur sanguis aut lymphæ, in poste-  
rioribus verò stagnat, illorum parietibus pro-  
pius juxta se invicem accedentibus. Eadem con-  
tingit fors muscularum fibrillis, quæ vasibus lan-  
guiferis aut lymphaticis; pressæ siquidem & ar-  
ctius unitæ angustiora inter se relinquunt inter-  
stitia: quibus sanguinis stagnationem adaugent  
validioremque illam efficiunt: at quum materia  
atherea, spiritus animales volatilioresque san-  
guinis vicinorum vasorum particulae in lym-  
phem aut lympham extravasatam impingunt, re-  
nuiores ejus partes abripiunt. & per poros eli-  
minant. Sulphura autem crassa in parte remanen-  
tia ab acidis coagulantur, quæ tubulis angustio-  
ribus impacta in illis cespitant, alcalicorum cras-  
siorum poris ab acidis opplentur, quos cum non  
liceat materiam subtili præterfluere. liquorem ef-  
fusum excitat ipsa. fermentat & rarefacit.

Vehementior longiorque crurum distortio  
Perinæi Inflammationis autor etiam ideo esse  
potest, quod tum temporis muscularum vaso-  
rumque fibrillæ supra modum extensæ, & tan-  
tum de amplitudine sua dependentes, quantum  
de longitudine acquisiverunt. ordinariam liquo-  
rum copiam suscipere nequeant, & debilitatâ  
præ extensionis caliditate earum vi elastica, ordi-  
narium liquoribus motum non concilient, e-  
arum enim vibrationibus eam, quâ par foret. fre-  
quentiam non habentibus, nec requisito robore  
pollentibus, tardior fit liquoris cursus, & hinc  
minor spirituum animalium in fibras nerveas in-  
fluxus, unde sanguis & lymphæ hoc orbatâ sti-  
mulo minime motu donantur, & testudine  
solum gressu circulantur, liquoribus ergo par-  
ticulis volatilibus non ditatis, sulphura ut deceet  
non expanduntur, nec impetuum acidorum  
aculeos, abs quibus coagulantur, declinare pos-  
sunt, crassioribus alcalicis fermè quiescentibus  
impingentia acida effugere non fas est, eaque po-  
ris suis excipiunt; inde contingit tubulorum à  
coagulatis sulphuribus obstructio. liquorisque  
ab impedito materia subtili libero per alcalico-  
rum poros transitu fermentatio & rarefactio.

*Causa Pe-  
rinæi Abs-  
cessus.*

Materia atherea partes universas perpetim  
pervadens, spiritus animales indefinitum fluxum  
corpus irradiantes, & tenuiores sanguinis particu-  
læ per vasorum poros irrequeunt volantes, li-  
quoris extravasati particulas perpetuo motu ex-  
agitant & huc illuc impellunt, & in tubulos a-  
pertos adigunt; si sulphura jam ab acidis coagu-  
ata ita fortiter tubulorum parietibus inhære-  
scent, ut ab illis extrudi nequeant, & acida al-  
calicorum poros opplentia ab ipsis deturbati  
non valeant, nec salia ab acidorum cum alcali-  
corum coactu progenita, præ nimia illorum du-  
ritie ac rigiditate ateri atque perfringi non pos-  
sint, intus fit liquoris effusû motus, quàm  
perpetuum patitur materia subtilis, spirituum  
animalium & particularum tenuior sanguinis  
vicini impulsus, nec ulla via aufugere ipsi va-

cet; & quum perduret pororum alcalicorum ob-  
turbatio & inversio, & ab illis materia subtilis  
in ea prorumpentis propulsio: salia crassa duris  
rigidisque spiculis horrida in partium adjacen-  
tium fibras compulsa, & in earum poros aculeos  
suos insinuantia, illas discindunt & comminu-  
unt, scrobemque sibi excavant, cui *Abscessus* no-  
men vulgò tribuitur. Restant adhuc phlegmata  
quædam, quæ alcalia dissolventia. ac reliquis li-  
quoris effusi elementis intermixta fluiditatem  
materiæ congestæ conciliant, & hæc materia in  
Abscessu comprehensa pus cognominatur, al-  
bedinem præ se ferens, oriaturque (quando in-  
flammatio à sanguine producitur) ex eo, quod  
exhalatis tenuioribus delicatioribusque sul-  
phuribus, quæ sanguinis globulis superextensa  
eius rubedinem faciebant, chylosæ particulae  
sulphure hoc defraudatæ, album conferrent  
colorem.

In *Ulcus* facili transit abscessus, quod vel *Morri.*  
Chirurgi manu inducitur, vel pus proprio mar-  
te carne & cute superjacentibus erosis exitum  
sibi molitur; quod fit, si pus diutius, quàm par  
est, in parte stagnet ac relinquatur; salia siquid-  
em puris huc & illuc acta ambientes partes  
spiculis suis impetunt, earumque fibrillas dif-  
ficant & comminunt: si pus diutius in parte  
relinquatur, subsistente salium actione, fovea  
profundior ac latior devenit, fibrillisque partium  
ad superficiem externam urgentium ut re-  
liquis exelis, ad cutim cuticulæque tandem  
perveniunt, quæ quum non sint ejus densitatis,  
atque duritie, ut salium aculeis resistere valeant,  
ab his tandem discinduntur & separantur, liber-  
que conceditur puri effluxus.

Peristentibus tubulorum obstructionibus, & *Gangrana.*  
à novis coagulatis sulphuribus semper advenien-  
tibus adauctis, crassisque salibus fibrillarum po-  
ris infixis, parciôr fit spirituum animalium in  
partem affluxus; oppleti siquidem vasorum tu-  
buli fibrillas, quibus incumbunt comprimunt &  
coarctant, prohibentque, nec copiosos excipiant  
cavitate sua spiritus, & si qui eas permeant, pori  
fibrillarum à salibus occupati vix illos admit-  
tunt, fibrillæ ergo spirituum subsidio carentes,  
alluctæ nequaquam gaudent tensione, sed concin-  
dunt, & flavescent, ideoque sensu orbantur, de-  
ficiante quoque tensione fibrillæ, eâ quæ cederet  
vi, salium impetus non repellunt, nec ea à poris  
suis excutunt, salia verò perpetuo indefinitique  
motu agitata, fibrillarumque poris infixæ,  
eas discindunt & difflcant.

§. ix. Perinæi Inflammationis idem est finis, ac *Prognosis.*  
aliarum partium, nam si per poros non discutia-  
tur, suppuratur; vel si malè tractetur, in Gan-  
grænâ degenerat; nec quoque periculo vacat  
partium vicinarum, tum externarum, tum inter-  
narum ratione, scroci, testiculorumque nimi-  
um, ani, intestinorum, vesicularum seminalium,  
& urethræ.

*Abscessus* Perinæi nisi brevi aperiatur, carnes  
subjectas exedit, & pus in vicinas partes viam si-  
bi sternit, & in partes usque penetrat internas,  
suppositaque ossa carie inficit, quare maximum  
ab illo imminet periculum.

*Ulcus* Perinæi merito semper timorem incu-  
tere debet, quum pus acrius factum partes cir-  
cumjacentes facili Marte corrodat, & quum  
omnes Perinæi vicinæ partes tum internæ, tum  
externæ, si semel ulcere tactæ fuerint, difficilli-  
mum

nam aut nullam admittant curam, nec temere pronuciare possumus, maximum enim impendit periculum ab ulcere Perinæ. Ulcus pro ea, quam inducit, indole, facilius aut difficilius curatu est, vel etiam pro majori aut minori mora, quam pus in abscessu moram fecit.

Nisi protinus *Gangræna* Perinæ succurratur, vix à mortis faucibus eripi potest æger, propter vicinarum partium dispositionem ac indolem. Sed nulla salutis spes superest, si *Gangræna* à causa interna ortum duxerit.

*Dista.*

§. 12. Cura *Diaetetica* consistit in eo, ut succi incrassati & stagnantes attenuentur, hinc omnia alimenta & potulentia, quæ succum nutritionis exhibent dulcem, angue pejus fugienda; illa enim sunt, quæ obstructions pariunt, & succos circulares inspissant, coagulant ac stagnare faciunt, nec non omnia acida, austera, frigida & viscida, lutosum exhibentia chylum; Aer quoque frigidus ac nebulosus nocet, uti & motus nimis, exulenti animi pathemata vulgò frigida dicta, intus in cor, trititia, terror, &c.

*Curatio  
morborum  
horum  
juxta Ga-  
lenicos.*

§. 13. *Curatio* Pharmaceutico-Chirurgica Perinæ *Inflammationis* instituitur *Galenici* ad sanguinis ulteriorem influxum inhibendum, revulsivis gratia venæsectionem celebrant in brachio dextro vel sinistro, prout ad dextrum vel sinistram latus inflammatio hæc magis inclinat, ad derivandum quoque in talo uno vel altero idem peragunt opus; hinc pro partis accipiens corroboratio, ne plus admittat sanguinis aliunde affluentis, adstringentia admovent medicoria, epithemata nempe ex succis nymphææ, plantaginis, folani, portulacæ, vel linimenta ex oleo nymphææ, rosaceo, omphacino, myrthino, unguentum santalinum, vel cataplasmata ex foliis parietariæ, nymphææ, portulacæ, violariæ, semine endiviæ, dactylis, &c. in aqua decoctis, & diligenter contusis aut conpassatis, additis postmodum farinâ hordei, pulveribus florum chamomillæ & meliloti, cum oleo rosaceo parata. Fortiora adstringentia hoc in loco omittunt, ne restrictio nimis sphinctere vesicæ & meatu urinario dysuria sequatur vehementiora symptomata inferens, quapropter interna quoque adhibent apozemata ex radicibus liquiritiæ, cichorii, ononidis, herbis malvæ, parietariæ, capillorum Veneris, nymphææ, floribus violarum, nenuphar, borraginis, baccarum alkekengi, jujubarum, passularum, feminibus cucurbitæ, melonum, althææ; quin si alvus simul adsit adstrictior, ne perinæ affectum fortius inde prematur, & urinæ effluxus impediatur, eandem solvunt, & lubricam reddunt, vel solâ cassiæ recens extractâ, & vel in jusculo, vel decocto foliorum malvæ propinatâ, vel electuario diacassii cum manna, & tandem incendium in totum extinguere conantur sequenti electuario.

¶. *Conserv. rosar. 3j.*

*violar.*

*nymph. aa. 3ß.*

*Caul. lat. uc. condit. 3ij.*

*Spec. diatr. frigid. 3iß.*

*diatr. santal. 3i.*

*de gemm. frigid. 3ß.*

*M. cum s. q. Syr. nymph.*

*F. s. a. Electuarium.*

Vergente inflammatione ad suppurationem live in Abscessum humorem intus collectum resolovere student cataplasmatibus ex radicibus al-

thææ, liliorum, foliis malvæ, floribus chamomillæ, meliloti in aqua coctis, contusis & colatis, additis fariu fabarum, ervi, oleo chamomillæ & axungia anseris; aliquando locum funul iungunt unguento althææ; quibus si suppuratio fuerit promota, locum aperiant ferro potius, quam ruptorio, ne hac in parte major fiat erosio, & ut puri citò exitus pareatur, partesque adjacentes ab eo liberentur. Foraminis secundum fibrarum longitudinem excitato ad dies aliquot digestivum imponunt, pureque satis evacuato, absterisionem parant, uti ulcus requirit.

In recenti enim Perinæ Ulcere post abscessum modò excitato, post legitimum digestivorum usum absterisionem istam faciliè instituit decocto hordei, in quo mel rosatum fuerit dissolutum; at in ulcere vetusto pluribus aliquando remediis opus esse fateatur. Etenim si ad fistulam inclinare videatur, aut magna adsit materie purulentæ copia, pro meliori absterisione interna quoque offerunt decocta, quorum omnium loco sequens esse poterit exemplar.

¶. *Rad. liquirit. ras. 3ß.*

*cichor.*

*ononid.*

*gramin.*

*pentaphyll. aa. 3ij.*

*Herb. parietar.*

*agrimon.*

*capillor. Vener.*

*plantag.*

*ceterach.*

*fumar. aa. Mß.*

*Flor. nymph.*

*borag.*

*violar. aa. P. j.*

*Granor. a' kekeng. 3ij.*

*Sem. 4. frigid. m. ij. aa. 3iß.*

*Coq. in l. q. aq. commun.*

*In Colatur. ibij. dissolv.*

*Syrup. fumar.*

*cichor. aa. 3iß.*

*Oxymel simpl. 3j.*

*M.*

Vel :

¶. *Decoll. bord. non excori. lbj.*

*Mell. rosar. colat.*

*Syr. de cichor. simpl. aa. 3j.*

*M.*

Non minùs ipsum ulcus topicè abstergunt decocto hordei, in quo mel rosatum fuerit dissolutum, aut si profundius, aut fistulosum existat, simul cum hordeo radices aristolochiæ, Ireos Florent, herbas agrimon, beton, & aliquid thuris coquant, & in decocto hoc aliquid de unguento Ægyptiaco dissolvunt, itaque injiciunt, quibus ulcus probè inundatum carne expleant, & consolidant emplastro de janua, gratia Dei, vel alio quodam huic rei idoneo.

*Gangrænam* hoc in loco valde existimant esse periculosam, & nonnulli ad sanguinem corruptum proliciendum cutem hinc inde scarificant, & ad putredinem prohibendam cataplasma imponunt ex farina lupinorum, ervi, fabarum, tale communi, cum oxymelle paratum quibus aliqui addunt aloën & myrrham. In profundiore *Gangræna* alii focum prius instituiunt ex livio forti & aceto mixtis, in quibus radices aristolochiæ, vincetoxici, Ireos Florentinæ, herbæ abinthium, scordium, ruta, lupini, &c. fuerint inco-

cta,



cta, & post forum demum imponunt cataplasma. Ceterum ut in aliis locis gangræna infectis, ita etiam hic solent procedere.

Cura paracelsi.

§. 14. *Paracelsus* in Perinæ Inflammatione curanda, & decoctum lapidis calaminaris p. p. in aceto calide adhibuit, & Spemiolam laudat; ad dolorem verò urentem sedandum solani succum cum nitro utiliter applicari posse opinatur.

In *Apsfemat* Perinæ & *Ulcere* inde pronato interna sudorifera commendat, ut infectio à morbo hoc introducta mundificetur, tum ad balsamum naturæ corroborandum emplastrum suum oppodetoch. quod ad aposteinata recentia quævis maturanda & mundificanda utilissimum judicat, hinc incarnativis ulceris consolidationem absolvit.

Ad *Gangrenam* etiam hujus regionis Realgar sublinatum in aceto coctum adhibere solet, addito oleo majoranæ, ut linimenti formam acquirit, tum curativis eodem modo procedit, ut in ulceribus corrodentibus approbatque emplastrum ex resina abietis, visco consolidatæ, pauco scammonia, & succo chelidoniz paratum.

Helmontii.

§. 15. *Helmontius* in Perinæ Inflammatione Archaum irritatum pacare studet, & proinde quodcumque admittit ei invisum, quo facilis desinat à furore suo, deinde occasione illa, per quam in furorem istum fuit accensus. quod omnium optimè nitro antimoniato impetrari posse confidit, si interius sumendum exhibeatur, ut ab exardescencia sua desistat, & vela furoris sui retrahat, quo facto pars hæc ab incendio isto liberabitur.

Ad *Apsfema* Perinæ emolliendum & maturandum, vel sanguinem hirci exterius applicat, vel pinguedinem leporis, ut facilius & citius rumpatur, sique cruor corruptus, & in pus conversus necessarium reperiat exitum.

In *Ulcere* hoc realgaria quoque fixa, & colchotar suum vitrioli commendat, ut sanguinis corruptor ab hisdem dometur, quo superato novæ carnis in cavitate succretionem & cicatrizationem pellis subsequutura esse, naturâ illâ omnia sibi parante operatrice, sanctè promittit.

In ipsa partis hujus *Gangrena* lixivialia suadet, loco prius profunde scarificato adhibita, ut pote in gangrænæ causa, acidum scilicet omne emoriatur.

W. Hysli.

§. 16. *W. Hysli* venæ sectionem in Perinæ Inflammatione utiliter institui posse arbitrat, ut sanguis moram contrahens ad motum excitetur, & fomes iste morbi hujus à veris aliquid in anitris rescindatur, resorbeat, & aliò deferatur; postmodum ad leniendum dolorem, & ne alvus constipata malum reddat deterius, enemata injici curat, & apozemata propinat ex radicibus graminis, scorzonæ, acetosæ, liquiritiæ, hordeo, herbis fragariæ, malvæ, violariæ, in aqua fontis parata, additis syrupo violarum, & lapide prunellæ. Urgente alvi adstrictione majorem sui solutionem, decoctum cassiæ cum tamarindis, & floribus rosarum pallidarum ad uncias aliquot bibendum exhibet. Pro sudore movendo, qui præmissis hisce aliquando necessarius est, mixturam simplicem laudat, & externè cataplasmata discutientia & emollientia imponit ex magmate decocti malvarum, betæ, flor. chamomillæ, &c. cum farina seminis lini & unguento dialtheæ, quo dolorem simul mitigari posse confidit.

Facto verò ex inflammatione ista Perinæ Abscessu suppurationem ejus promovet cataplasma,

tis, vel emplastris magis emollientibus & laxantibus ex sariinis frenigæ rei, hordei, fabarum, pulveribus radicis altheæ, pulpæ radicis lilior. albor. capâ contusâ cum oleo lilior. alb. scorpionum & pauca quantitate saponis, tum cutem culcetro dirumpi vult, ut purulenta materia exitum habeat, & *Ulcus* digestivis, aliisque remediis mundari possit, quod si factum fuerit, decocta vulneraria propinat, & præmisso pulvere ex oculis cancrosum, coralliis p. p. & lapide hæmatite p. p. balsamum de Capaibatum intus exhibet in juleculis absorbendum, tum foris inungit, vel si ulcus sit detenus, decocto hordei & lupinorum. in quo vel colchotar & li, vel unguentum Ægyptiacum fuit dissolutum per syringam injicit, vel pannis eodeni humectatis abstergit & mundat, ut eo citius postmodum ulcus carni repleti, & cicatrice obducta consolidari possit, cui rei emplastrum diapalmæ, aut sticticum *Crotus* inservire existimat.

*Gangrena* partis hujus occurrit epichematis ex aqua calcis vivæ, in qua camphora & faccharum saturum fuerit dissoluta, vel in lixivio forti, aut cataplasmate ex farinis lupinorum, fabarum, orobi, herbis absinthio, scordio, menthâ, carduo benedicto in lixivio paratis; additis theriacâ, myrrha & aloë; nec interna omittit sudorifera, qualia sunt theriacâ, dialcordium, cerullâ & li. dialphoreticâ, bezoaticum minerale, & C. C. quibus hoc in affectu non parvam tribuendam esse ducit utilitatem.

§. 17. *Sylvius* in Perinæ Inflammatione haud aliter, quàm in aliarum partium inflammatione procedit, in injectione nempe enematum emollientium, exhibitione diaphoreticorum, institutione venæ sectione & applicatione futuum, unguentorum & cataplasmatum itidem emollientium, quibus si inflammatio inhiberi non poterit, sed Abscessus ad suppurationem pergat, hanc promovere studet cataplasmatissidem emollientibus, additis capis asis & contusis, ut maturatio eo citius expediat, tunc abscessum aperit, mundatis abstergit & consolidat.

*Ulcera* Perinæ invadentia, cum ut reliqua ab acido acri originem sumant, eadem repollicere ait remedia, quæ alis conveniunt, & proinde hic eadem de novo manifestare recusat.

In *Gangrena* Perinæ sudorifera suadet, & externa cataplasmata ex ruta, scordio, nasturtio, absinthio, floribus sambuci, semine urticæ in muria coctis, addito spiritu vini, quæ diligenter vult imponenda, & omni modo sphacelum precavendum.

§. 18. *Cartesiorum* cura in Perinæ Inflammatione hæc est, ut succi incrassati in partium Perinæ tubulis hærentes attenuentur, & particule angulares hebetentur, flectantur & eliminentur, quare alvum modicè solventia hoc in casu non omnino rejiciunt, diuretica verò & diaphoretica planè ducunt necessaria, ex quibus sequens æstimatur mixtura.

℞. Ag. petrosel. ʒj.  
fumac.  
flor. sambuc. aa. ʒvj.  
Ocul. ʒb. ʒj.  
ʒis diaphoret. ʒb.  
Sperm. ceti ʒj.  
Laudan. opiat. gr. ij.  
Sacchar. canth. alb. ʒij.  
M. d. coholexatim.

Spiritus quoq; cochleariæ, lumbicorum, & huiusmodi.

# CAP. VI. DE PERINÆ INFL. ABSCCESS. ULC. & GAN. 377

& hujus generis plura volatilia magnopere laudant, quod valde penetrant, coagulationem quaecunque dissolvant, & tubulos aperiant, unde & eadem externe apponunt formā cataplasmatum ex radicibus asparagi, bryonix, bardanæ, herbis asine, chærefolio, cicutariâ, petroselino, beccabungâ, floribus camomillæ, sambuci, camphorâ, sulphure, spermate ceti, fœce cerevisiæ, spiritu vini, vel linimentum parant ex sulphure, bolo Armeno, croco & camphora cum spiritu vini, quo adhibito tubulos apertum, & particulas angulares correctum & absorptum iri promittunt, ut tumor omnis discutiat, quem scopum etiam emplastrum de minio, de spermate ceti, vel diapalme aliquando attigisse observant.

In Abscessu Perinæ non diu morantur, sed suppurationem promovere student cataplasmatibus emollientibus ex radicibus alii, liliolum, altheæ, bryoniæ, herbis parietariâ, chærefolio, verbasco, betâ, brancâ ursinâ, floribus meliloti, camomillæ, croco, scibus, in cerevisiâ coctis, additis farina fabarum, hordei, fœnigræci, axungia porci, anseris, butyro, oleo liliolum, florum sambuci, terebinthina, opoponace, melle, fermento, fapone, unguento basilico, altheæ, abs quibus omnibus fibræ emolliuntur, tubuli dilatantur, & succi fortius compressi resolvuntur, ut à materia subtili facilius commoveantur; tum ut porcutanei magis reddantur aperti, & materia intus contenta fortius attenuetur, penetrantiora quædam prioribus adjungunt, ut sal tartari, calcem vivam, sal armoniacum, abs quibus si materia purulenta effluxum satis sit disposita, ei exitum parant. cutem cultello vel lancetta aperiendo, & post ejusdem effluxum cavitatem emundant linimentis ex terebinthina cum melle, vel axungia ovis, gummi elemi, myrrha, croco, & oleo ovorum; tandem eandem cavitatem carne opplent, mediante balsamo Italico, vel Peruviano, & emplastro diaphulphuris, cutisque generationem promovenunt unguento diapompholygos, vel emplastro oppodeltoch *PP. utrius*, ut integre ita obtegatur.

Et hac ratione quoque procedunt in Ulcere Perinæ, quod ab apostemate prorigum, expositum modo reposcere dicunt curationem, non multum quoque ab ea discrepantem, si ab externa quadam re corroderet, urinâ falsâ, vel succo spermatico Venereo partem hanc alluente proveniat, his enim ulcusculis pulverem aliquando inspergunt ex C. C. Philosophicè præparato, lapide calamini, terra li dulci, myrrha, cetulla, Thutia, vel aqua calcis vivæ, spiritu vini camphorato & theriacali abluunt, & emplastro de gratia Dei ad perfectam sanationem usque obtegent.

Ad Gangrænam Perinæ tollendam maximè necessaria censent diaphoretica ex theriaca, diascordio, & io diaphoretico, & io sublimato, hinc angulares particulas absorbeat & hebetantia ex oculis & i, terra sigillatâ, spermate ceti, C. G. exhibent, quibus præmissis Perinæ abluunt spiritu vini, in quo vel aloë, myrrha, & i, succus chelidonii, vel unguentum Aegyptiacum fuerint dissoluta; ad separationem partis corruptæ à sana obtinendam, epithema ex ~u maccicali, vel cataplasma imponunt ex scordio, absinthio, ruta, cicutaria, radice aristolochiæ rotundæ, & co in lixivio fortissimo & spiritu vini coctis, additis in fure aloë, myrrha, & aqua vitæ, vel ex calce viva,

& creta in aqua coctis lixivium parant, quo Perinæ fovere solent. Impetrata sic corruptæ partibus à sana separationem, unguento Basilico vel Apostolorum suppurationem institunt, & partem bene mundatam non aliter, ac in ulceribus, carne & cute de novo investiant.

§. 19. Prima nostra in depellenda Inflammatione hujus partis cura est, ut omni opera annitatur, id, quod obcrassiem stagnat, resolvere & attenuare, ne Inflammatio ad suppurationem tendat, & fermentatio, quæ in partibus his excitatur, inter succos stagnantes impediatur. In hunc finem conducunt interna sudorifera tum volatilia, tum fima. item decoctum lignorum. Intèr topica sequens ratio te falset.

Summit. absinth.  
vorissim.  
ruta aa. Mj.  
Semin. cummin.  
levisiæ. aa. ʒij.  
Ois Qi  
\*ci aa. ʒij.

Incis. & comus. coq. in mulsa, vel vino Gallico, ad defacum vini ʒij. & panis viscoli. q. l. pro cataplasmate, quod imponatur calidè & quater in die de novo applicando repetatur. Vel:

Rud. Galang.  
Irid.  
bryon. aa. ʒij.  
Herb. aneth.  
Phelland.  
Abrotan.  
Menth. aa. Mij.  
Bacc. lauri  
Junip. aa. ʒij.  
Ois Qi  
\*ci aa. ʒij.

Coq. in mulsa & aqua, & addito pane viscolio, & Cataplasma; vel cum ~u vini eliciatur essentia, cui addatur ~us vini camphoratus, & cum linteo duplicato epithematis instar adhibeatur. Possunt & addi elixir vitæ, myrrha, & aloë, camphora, & itidem linteis duplicatis sæpius applicari.

Inflammatione verò jam ad suppurationem tendente, factoque Abscessu, sequentibus utendum est remediis.

Cop. alb. sub cinerib. coct. No. 1.  
Herb. malv.  
bismalv. aa. Mij.  
Summit. absinth.  
centaur. min.  
salv.  
scord. aa. Mij.  
Flor. Camomill.  
melilot. aa. P. j.  
Ois Qi  
\*ci aa. ʒij.

Cum hydromel. coq. ad consistentiā cataplasmatizans, addendo medull. panis alb. q. l. & Unguent. Basil. ʒj.

quod suppurationem maximè promovet. Vel à emplastrum desideras:

Emplastr. de Labdan. ʒj.  
Unguent. Basil. ʒj.  
Gumm. Ammon.  
Sagapen. aa. ʒij.  
Tacamahac. ʒj.

M.  
Ad sanguinem attenuandum, acidum temperandum, & sic per consequens circulationem, quæ

Bbb

in partibus his imminuta est , promovendam, imprimis convenit elixir vitæ n. d. abscellui inditum, vel sequens intus exhibeatur, quod constat ex volatilibus aromaticis. salibus, spiritibus, & oleis cum nonnullis alcalibus.

℞. Ocul. es. pulv. ʒj.  
 ʒii diaphoret. ʒß.  
 ʒis absinth. gr. xiv.  
 Sperm. ceti ʒiß.  
 Elixir vitæ ʒj.  
 ~theriac. campß. ʒß.  
 cephal. oleof. n. gr. x.  
 Vin. Hispan. ʒiiij.

*F. Mixtura*, cujus assumat æger cochlear unum & alterum, donec sudor emanare incipit, quod signum erit optimæ circulationis succorum, impedit & febrem, & alia symptomata, febris enim à perturbata mixtione & spissitudine succorum oritur.

In confusio hujus *Ulcerebus* ante omnia succi acres & viscosi stagnantes fluidiores & spirituosiores reddendi sunt, in quem finem conducunt varia volatilia sudorifera, imprimis sequens, vel simile decoctum.

℞. Ligni sancti ʒij:  
 Jalsifr. ʒj.  
 Rad. falsapariil.  
 pimpinell.  
 enul. campß. aa. ʒß.  
 Herb. scord.  
 nasturt. aquat. aa. Mj.  
 ʒis ʒi ʒj.

*Incis. coq. in l. q. ag. & vin.* & assumat æger in hoc potu ~um cephal. oleof. cum elix vitæ, rel dentur simul acidum temperantia ex oculis es. ʒio diaphoret. & myrrh. Inter topica sequens commendamus, imprimis ubi ulcus fordidum est.

℞. Unguent. Apost. ʒß.  
 Extrah. infusiss. centaur.  
 Min. ʒiiij.  
 ~ci gr. x.  
 Elixir vitæ, vel  
 Essent. myrrh.  
 ~ Mastic. aa. ʒß.

*M.*  
 ℞. Rad. Gentian.  
 Angelic. aa. ʒß.  
 Herb. scord.  
 centaur.  
 absinth. aa. P. j.  
 Pulp. colocynth. ʒij.  
 ʒis ʒi.

~ci aa. ʒj.

*Coq. in vino Gallico aut Hispan. add. Elix. vitæ ʒß.*

*M.*

Vel:

℞. Herb. trifol. fibr. Mj.  
 Scord.  
 Card. bened. aa. Mß.  
 Myrrh.  
 Aloes aa. ʒiiij.

*Coq. in vase bene clauso in l. q. Vin. Hispan. Colatur. ad ʒxv. add. Elixir. vitæ ʒß.*

Applicetur quater de die & plumaceolis tegatur.

Vel sequens:

℞. Essent. myrrh. ʒiiij.  
 Aloes ʒij.  
 Spir. vin. campbor.  
 ~. Regim. Ung. ʒj.  
 ʒis alkali, oder Bottaasch ʒiß.  
 Ocul. es.  
 ʒii diaphoret.  
 Camphor. aa. ʒj.

*M.* & calide applicetur sæpius de die.

In curatione *Gangræna* hujus partis semper respiciendum est ad causam occasionalem, & quia sæpe post inflammationem Gangræna oboriri solet, hinc omnia ea quæ obstructions referant, optima sunt, & internæ & externæ conducunt. Internæ ergo sudorifera quæcumque volatilia conveniunt sæpius exhibenda. Inter externa præ aliis hoc in calu sequens conducet.

℞. Herb. Scord.  
 rnia.  
 absinth.  
 salu.  
 levistic. aa. Mß.  
 Phellandr. Mj.

Baccar. lanr.  
 Junip. aa. ʒij.

Sem. fœnic.  
 cummin.

anif. aa. ʒj.

Myrrh.

Aloes aa. ʒv.

ʒis ʒi,

~ci aa. ʒij.

Nuc. Mosch.

Caryophyll. aa. ʒiß.

*Superfund. ~ vin. opt. & extrah. Tinctura, ex residuo verò F. Cataplasma*, quod adjecta camphora sæpius de die erit applicandum.

## C A P U T VII.

### *De Umbilici Hernia, & Musculorum Abdominis Inflammatione.*

#### S. I.

**P**Ariter ac ossa situm suum mutant, molliorum quoque partium contiguitas aliquando dissociatione solvitur, harumque morbi in posito, prout dicunt, contingunt: vel quatenus saltem è loco suo ordinario ad aliam corporis partem transponuntur, & Hernias propriè dictas constituunt, vel quatenus planè extra corporis limites proscibuntur. Umbilicum modeste protuberantem habere decorum est, indecorum verò, imò molestum, sæpe etiam periculosum, si ultra decorem & modum

promineat. Quæ locum duntaxat mutant, frequentius intestina sunt atque omentum, non semper ex laceratione Peritonæi, sed ejusdem etiam extensione; rarius verò alia viscera prædicta elabuntur. *Spigelius de humani corporis Fabrica lib. 8. cap. 14. refert;* Herniam à liene contigisse, quod tamen inter raro contingentia numerandum. Epar extra hypochondrium suum ad umbilicum prociidisse, huncq; in tumorem notabilem elevasse, in sæctu observarunt Auctores. Sic & vas deferens ad scrotum aliquoties delapsum

delapsum fuisse *Barbette Chirurg. cap. 7.* testatur. Spectat & huc illa Hernia à ventriculo, cuius *Hildanus p. 915.* mentionem iniecit, item ab utero, à renibus, aliisque partibus de quibus videatur instat omnium *Hildanus p. 593. Blegny de Arte Herniaria p. 1. S. 1. c. 5. & Z. diac. Ann. 1681. p. 52.* & Caput superius de Herniâ Intestinali & Omentali; hic verò tractamus de illa Herniâ, ubi viscera prolabantur ad Umbilicum, constituuntque *Omphalocelen*, Germanis *ein Nabelbruch* dicitur & latius Umbilici Prominentia. Dilatio, Excrecentia, Egressio, Procidencia, Intumescencia, Tumor, Protuberantia, Extuberantia, Hernia Umbilicalis; sed ad quem usum quæso tot nomina uni rei clare perceptibili imposuere veteres? Extraordinarie tamen illa etiam aliquando supra umbilicum prodeunt, quale exemplum *Hildanus Cent. 5. Observ. 64.* habet, vel in latere umbilici, quale quid *Platerus lib. 3. p. 758.* consignavit, vel supra & infra umbilicum simul, item ad lumbos, ut *Barbette* etiam testatur, vel; quod tanquam singulare *Blegny* profert, in sceminis ad pudendorum labia.

**Musculum Abdominis Inflammatio**  
Contingit etiam aliquando ipsis Musculis Abdominis Inflammatio, que cum regioni huic magnam creet molestiam, & viscerum non modo æconomiam incommodet, sed respirationi quoque sit obstaculo, eandem priori Umbilici Prominentiæ specialius subjungemus examinandam.

**Partes affectæ.**  
§. 2. Partes affectæ sunt 1. Umbilicus, qui constat ex vasis umbilicalibus, ab Anatomicis recentioribus & veteribus nâ dictis, quorum numerus in diversis animalibus varius est & diversus; umbilicus verò hominis constat unâ venâ, arteriis duabus & ligamento, quod vocatur utachus; nonnullis autem præter recensita adhuc alia à Meenterio orta adjunguntur, de quibus omnibus sigillatim videas *Cl. D. Biancardi Anatom. cap. de secund. p. m. 175.*

11. Musculi Abdominis, quorum à nonnullis, rectorum in quatuor dissepcentibus, octo, à pluribus verò quinque recensentur paria, quorum primum est oblique descendendum, secundum oblique ascendendum, tertium, transversorum, quartum rectorum, quintum pyramidalium, abs quibus omnibus pro faciliiori respiratione, succorum in visceribus protrusione, & excrementorum exelusione, abdomen varie constringitur, comprimitur, dilatatur, de quibus plura desiderantibus Anatomicorum scripta pervestiganda.

§. 3. Differentiæ Umbilici Prominentiæ desumunt Veteres à causis propinquioribus, hinc quæ ab aquâ oritur, Hydromphalos dicitur, quæ à flatibus, Pneumatomphalos, quæ ab intestinorum prolapsu, Enteromphalos, quæ ab omenti procidencia, Epiplocephalos, quæ tandem à carne increfcente, Sarcinomphalos, quæ à sanguine fluido ibidem stagnante & collecto oritur, ridicule Hematomphalos appellatur.

**Diagnosis Hernia Umbilicalis**  
§. 4. Dignoscitur hæc Procidencia Umbilici, & ab aliis ipsius tumoribus distinguitur, primo, quod Hernia aquosa sit tumor laxior, & ad digitorum tactum non recedat, adnotâ candelâ pellucidius appareat, ac commotus fluctuationis sonum edat. (2.) Flatulenta digitis cedat, mox tamen redeat, percussu sonum edat ac in quocunque corporis situ eandem formam & molem re-

tineat. (3.) In carnosa durities major sit, quæ digitis nullo modo cedit, semperque eadem sub quovis corporis situ appareat, cum è contra Hernia vera mollior sit, non tamen aqueam, nec duritiem carneam habeat, ac in supinis cedat.

Num verò Umbilici prolapsus ab intestinis, an ab omento exortus sit, concluditur, quod ille mediocrem duritiem & majorem tensionem præferat, circa basin angustior sit, à spiritus cohibitione magis intumescat, & agro resupinato, maxime si manu prematur, cum murmur aliquo detumescat; hic verò, si omentalis, unâ in parte mollior, ac in altera, existat, adeoque si manibus eum quis contrahere velit, hac elabatur, & pressus absque ullo strepitu subideat. Ut hæc omnia clarius appareant, adnotâ candelâ parietem hæc sunt conspiciendæ. Ad Diagnosis quoque hanc magis illustrandam facit *Cl. D. Stalpartii Observ. 53. Cent. 1. Obs. 110.* quæ ita habet, Mariæ Theodori, viduæ Gerardi de Graf, fabri lignarii, anno ætatis 30. tertio partu Hernia Umbilicalis nata, quæ triginta sequentibus annis, quo tempore præter alios illa undecim infantes peperit, ita crevit, ut anno 1681. adulti hominis caput magnitudine longè superaret, adeo ut intestina hoc tumore conclusa externa parte apertè sentiri possent. Maxime illa opprellam se sentiebat, cum nec flatus, nec feces per alvum emittere possent, ac ante 5. vel 6. annos usque adeo obstituta alvo erat, ut oculis versus inferiora transitu, per os erumperent excrementa. Cui malo illam variorum dylietum usus denique exemit. Cumquæ ea erecto sedere corpore, femoribus ejus insinabatur hic tumor, vacuusque omnino fere venterebat, quævis vinculis tumorem assidue frenaret: quò referri potest *Obf. Plateri lib. 3. p. 713. item Benivenii p. 144. c. 5.*

**Musculorum Abdominis Inflammatio**  
In sensu incurrit, & bene distinguendum, num hoc malum fuerit à lue Venerea, in qua omnes Abdominis Musculos aliquando inflammatos observavi; sic & ab externa causa contusione, lapsu, &c. facile oboriri potest, & sæpe excoctatio sequitur cuticulæ. Symptomata autem prout in aliarum partium inflammationibus, v. gr. tumor, calor, dolor pulsatorius, & color in ruborem transmutatus.

§. 5. Etiologiam morborum horum ita formant *Galenici*, ut in Umbilici Hernia accensit vagitus nimium in lpuerulis, contentiorem, retentionem spiritus & clamorem; in mulieribus verò nixum maximam inter parientium, quo tempore uterum, musculorum abdominis, & cutem umbilici extensos esse norunt, aut saltum magnum; & has quidem causas esse dicunt efficientes, & materiales autem referunt intestina peritonæo dilatato extra abdomen egredientia, omentum, flatus, aquam è vasis umbilicalibus pedentem excludantem, in cavitate umbilici collectam, & ibidem coactam, & carnem in eadem cavitate excrecentem, aut aneurisma ex arteriis umbilicalibus recens dissectis pronatum.

Inter Inflammationis Musculorum Abdominis causas recensent tñm sanguinem copiosorem, tum calorem in eodem ascensum, tum agitationem & dolorem musculorum horum, & sanguinem istum vel parum, vel aliis

Bbb 2 humo-

**Musculorum Abdominis Inflammatio**

**Causa Morborum secundum Galenicum**

humoribus, maxime biliosis commixtum attrahentem, uti vel in vulneribus, vel percussionibus, vel ulceribus, aliisve malis partibus liſſe contingebatibus accidere ſoleat.

*Paracelsum.*

§. 6. *Paracellus* Hernia *Umbilicalis* cauſam vel liquorem ſalis huius partis reſoluti in aquoſa ſtatuit, in aquoſa vero præter ſalis reſolutionem, inflationem ſiccæ aſcenſionem. ventumque quendam australem verſus meridiem hanc mæcrocoſini fortiter ſtātem, & in carnoſa liquorem nutritivum à vera membranæ umbilicalis ſubſtantia ſeparatum, & in excrescentiam huiusmodi tranſeuntem.

*Inflammationis* Muſculorum *Abdominis* cauſam adſcribit ſali aſcenſi ad muſculos hoſallopiſo, & eosdem non modo in tumorem elevanti, ſed tanquam ignea quadam vi doloroſe accendenti.

*Helmomium.*

§. 7. *Helmomius* in Hernia *Umbilicali* accuſat nimiam ſtatum inſteſtinalium agitationem multiplici de cauſa excitatam, maxime ob tormina puerorum, hinc valde inclamantium, aut abdominis nimiam diſtentionem à diuturniori halitus retentione in conatibus vehementioribus ſuſcitatam. *Abdominis* Muſculorum *Inflammationem* *Archeo* eorum ab occaſionali quadam cauſa irritato & candefcenti adſcribere conſuevit.

*Willisium.*

§. 8. *Willisius* in *Umbilici Hernia* ut cauſas admittit ſtatim, aquam excrescentiam carnoſam, inſteſtinā vel omentum ob peritonæum à cauſa violenta vel dilatatum, vel ruptum verſus umbilicum collecta aut impulſa, & pelliculam iſtam umbilicalem in grandem aliquando tumorem diſtendendo propellenti.

*Inflammationem* Muſculorum *Abdominis* originem ſumere putat à ſanguine craſſiore in vaſis muſculorum horum diutius hærente, & iſdem tandem diſruptis extravafato, & copioſius aggeſto, uti facile iſta ſanguinis diſpoſitio acquiri poſſit ob nimiam incalſcentiam, à potu calido, motu vehementiori, & ſubitanæ hanc ſequentem refrigerationem diuturniorem, conuſionem aut vaſorum diſruptionem per vulnera, aut alia quædam infortunia inductam.

*Sylvium.*

§. 9. *Sylvius* Herniam *Umbilicalem* à vehementi ventris compreſſione quacumque, ſive propter clamores, ſive expulſionem ſæcum aut fœtus in mulieribus inſtitutā promaſci poſſe proſequitur; *Muſculorum* verò *Abdominis Inflammationem* à ſanguine extravafato, & in iſdem corrupto, & incenſo oriri ſimiliter opinatur.

*Carrifanum.*

§. 10. *Carrifanus* videtur *Umbilici Hernia* produci à vehementi qualibet abdominis diſtentione, vociferatione, clamore, expulſione, inſteſtinorum nimia à potu ciboque repletionem, unde omentum ad exitum aut procidentiam huiusmodi propellatur, quam umbilici laxior religatio promovere ſoleat, frequentius autem in gravidis prominentiam hanc ideo excitari dicunt, quod inſteſtina repleta à fœtu compulſa umbilicum ita premant, ut hac ratione probabatur.

*Muſculorum* *Abdominis Inflammatio* iſis provenit à ſuccorum in arterioliſ incraſſationum ſtagnatione diuturniore, cui anſam præbere dicunt motum corporis nimium & incalſcentiam, unde ſalibus ſuccorum volatilibus evaneſcentibus, craſſiores ad motum minus promptæ remaneant, & tubulos obſtruant, qui non niſi

matariam cœleſtem igneam admittant, quod à frigore ſuccos ad quietem diſponente, conuſione canales & tubulos comprimente & lacerante, aut vulneribus eoſdem dirumpentibus ſimiliter fieri docent, cum extremitates corrugæ ſuccos detineant, & ſtagnare faciant, quapropter materiæ illi ſubtili eadem actio, ut in priori ſtatu, conciliatur.

§. 11. *Me* iudice *Hernia Umbilici* rariffimè oboritur à peritonæi rupturâ, frequentius verò ab ejuſdem laxatione provenit, ad latera deſcriptis muſculis rectis, ob varias eaſque externas & internas cauſas, uti, verbi gratia, ex partu difficiliore Herniam hanc, præter experientiam *Hildani* *Cen.* 3. *Obſ.* 61. & nos ſæpius obſervavimus; ſic & nuper in ſœmina ex caſu, quam & *Bartholinus* *Cen.* 6. *hiſt.* 7. ex colica notavit, & ab imaginæ ſonematis connotam *Sculetus* *Armament. Chirurg. Obſ.* 60. teſtatur, unde rectè *Barbette* *cap.* 74. docet, rariffimè rumpi peritonæum, ſequi in aperius, addit, cadaveribus non ſemel obſervâſſe ac demonſtrâſſe, umbilicum cum inſequentibus inſteſtinis protuberâſſe majori tumore, quān̄ eſt viri caput, ita ut abdominis recti muſculi hinc ad latera preſſi, & à ſe invicem ſeparati eſſent; extenſum tamen tantum erat peritonæum, nullibi autem ruptum. Peritonæum enim mirum in modum extendi ac dilatari poſſe, lippisæ tonſoribus notum eſt, uti illud non diutaxat in hydropticis conſpicitur, ſed & eodem modo ſe res habet circa alias membranas. Sic nimirum maxima ſit extenſio membranæ cerebri in hydrocephalo, nec non membranæ ſerotæ, ortis in eadem herniis. ſerotum enim ad magnitudinem capitis humani extenſum ſæpius vidi. In venis quoque, arteriſque, in aneurifmatibus ſcilicet & varicibz, quarum mirum in modum ſæpe extenduntur membranæ. Sic & per clamores, vomitus, tuſſes, ſaltationes, fortiores ſtatus aut curritum motitationes, equitationes, tubarum inflationes, ponderis gravioris elevationes, internave muſculorum abdominis in partu preſſiones, duriorum ſæcum expulſiones, extenſam ventris contra duriorum quandam materiā preſſionem, peritonæi fieri poſſe dilatationem nemo dubitet, peritonæum enim circa umbilicum tenuiſſimum eſt, ita ut per ejus expansionem inſteſtina verſus effermatam inclinent cavitatem, ſicque Exomphalum producant. A colluvie itidem & ſtagnatione humorum circa umbilicum inſteſtinum ileon laxato peritonæo à ſede ſua elabi, & tumorem produci poſſe, nos ſæpe obſervavimus. Umbilicalis funiculus quandoque etiam dilatatur, ceu conſtat experientiâ plurimorum Chirurgorum. Sic *Clariff.* D. *Blankardus de morb. pueror. obſerv.* 9. de mirando quodam & inſolito pueri cujuſdam anno 1682, nati exomphalo, à tenuiſſimo umbilico præpendebat funiculus, qui longitudinem ulnæ quadrantis cum ſemiſſe, digitique minoris æquabat craſſiſſimè, in cujus extremitate globulus quibzdam rotundus, qui duplicis pugni magnitudinem excedens, tenui obductus erat membrana, per quam motus inſteſtinorum perſiſtentiſſime optime animadverſi poterat. Idem *Obſ.* 11. ejusdem l. i. meminit infantis, qui inſteſtinis extra abdomen præpendentibus natus erat, quia mater quodam ante partum tempore per plateam ob-

*Noftrum  
iudicium  
de cauſa  
Hernia  
Umbilici.*



obambulans selem viderat, cuius corpus curru quodam ita erat protritum, ut extra abdomen propenderet intestina. Simile exemplum observavit Cl. D. Stalpart. Obs. rarior. 33. Cent. possi. Parturientibus quoque à vehementi spiritus cohibitione hernia umbilici oritur, rumpitur aut dilaturur enim violentia peritonæum, & intestina prominentia tumorem pariunt. Maxime tamen affectus hic insutibus est familiaris, si quando umbilicus iis non rite ligatur, vel fortiter attrahitur, aut dum laxatur peritonæum in his delicatulis, & tumores ac flatus spatio se insinuant, ex ejulatu & tussu, abs quibus tenellum peritonæum aliquando etiam rumpitur.

Causæ Musculorum Abdominis Inflammationis sunt vel læsiones externæ, vel spina quædam interna, & sunt utplurimum propter motum humorum circulantium impeditum indeque ortam stagnationem. Læsiones externæ sunt contusiones & conqussationes. Per spina internam intelligimus singulas particulas poris partium harum non conformes, quæ impediunt humores, ne rite circulentur; adeoque stagnatio fit circa musculos hos abdominis, in quibus autem partibus ejusmodi particulatum sit stagnatio, ibi oritur inflammatio.

Musculorum Abdominis Inflammationis.

Prognosis Hernia Umbilicalis.

§. 12. Prognosis quod concernit, *Hernia Umbilicalis* est periculosus affectus, facili enim inflammatio & apostema eandem sequuntur, quæ mors ipsa excipit, quale exemplum non ita pridem observavit optimus senex Cl. D. Michael Angeiocrator, Collega meus colendus, in frœmina 56. annorum, quæ jam hernia umbilicali laborans à motu vehementiore incidit in colicam cum vomitu enormi omnium contentorum, ad quam curandam imposuit herniæ umbilicali ferreum operculum intense calefactum, unde non tantum dolores reddebantur intensiores, sed & simul inflammatio circa herniam cum metu gangrænæ aderat, cui varia adhibita fuere remedia, & quidem optima, sed frustra, circa herniam enim oritur abscessus, qui à Chirurgo aulico nostro *Muntliet* aperiebatur, pus quod effluebat, erat maxime fetidum cum pinguedine, abscessus etiam spontè fuit ruptus, ex quo magna quantitas puris & pinguedinis liquefactæ emanabat, tandem petitonæum unà cum omento & aliis adjacentibus partibus, intestinis nempe, inventa fuere nigra & sphacelata, accessit febris cum angina, vires de die in diem minuebantur, & sic matrona illa halitum ducere desinit. Si tamen malum fuerit adhuc recens & non adeo vehementens, aliquando curari potest. Curantur verò herniæ hæc facilius in iplis infantibus, difficilids in senibus, ita ut rariotibus rectè accenseat *Hildanus*. a. herniosum senioreni sanatum, utur ejus exempla nonnulla ibidem adducat; confet *Hieronymum Fabricium ab Aquapendente*. Facile etiam circa hernias hæc oriuntur fungosi & scirrhosi tumores, de quibus confet *Zodiacus Gall. M. Ann. 1. p. 119*. Multis hoc malo afflictis lethalis tandem ileos supervenit, vel vomitiones diuturnæ, vel tabes, ceu ego novi exemplum. Si diuturna fuerit *Umbilici Proventria*, & sine dolore ad magnitudinem capitis infans procreverit, frustra repulsiotentabitur, & sine curatione per totam vitam geretur. Communiter tamen infantum hæc in parte eminentiæ faciliorem admittunt medelam, quam adultorum, præsertim si gravia in his suble-

quantur symptomata, qualia sunt colicæ & iliacæ passiones, vomitiones, &c.

*Inflammatio Musculorum Abdominis* quoque reventior est, eo faciliorem admittit curationem, quamvis eandem frequentius subsequatur abscessus multa opportuna mala. Quandiu durat, tum respiratio insigni patitur impedimentum, & non sine dolore instituitur, tum succorum in visceribus propulsio, & fecum per intestina exclusio, quæ mediaute musculorum horum motu petagendæ sunt operationes, difficilids procedunt. Sæpe ex interiori quodam abscessu materia purulenta per musculos hosc sibi exitum parans, huic inflammationi anslam præbet, cuius curatio utplurimum est desperata, quandoquidem intestina autalia quædam viscera eo in casu sæpe sunt corrupta, quam inflammationem quoque quàm frequenter gangræna & tandem sphacelus ipseprehendunt. Ab externa quodam causa si fuerit introducta, & peritonæum cum obiectis visceribus planè existat integrum, aut remediis idôneis apto tempore & prudenter adhibitis discuti, aut ad suppurationem promoveri potest, abscessusque non ita difficulter sanari, modò per vehementiorem contusionem plurimi musculorum tubuli & canales non fuerint destructi, & pus intus collectum, absque ulla corrosivitate existat, mite & in omni puncto audabile.

§. 13. *Dia*ta consistit in rerum illarum, sine *Dia*ta, quibus vita nostra commodè trahi nequit, legitimo usu, quem meritò ægri attendere debent. Primò se offert *Aer*, vitandus est frigidus & humidus, nervis enim & membranis, simul & umbilico ac intestinis inimicissimus. Eligatur purus, amœnus, temperatus, nullis inquinatus nebulis, aliisque impuritatibus, fumosus enim aliusque, qui stercutationem excitare potest, herniosis canepeus & angue fugiendus.

*Cibus* cum suggerat succis nostris pabulum lacteum, sit boni succi, pro optimi lactis generatione. Vitentur actès, difficiles, paucique succi, ut sunt frigidi, aquosi, flatulenti, crassi, legumiuosi, incoctiles, salsi, panis non probè fermentatus, carnes fumo iuduratae, fructus asilvi, & omne ciborum genus, quod ventrem constipare & flatus inducere aptum natum est, ne umbilicus protrudatur, errores enim lequentes committi possunt in cibo. 1. Peccatum copiae, in voracitate & ingurgitatione. 2. Peccatum inopiae, cum quis inedia labore, & abstineat cibo, aut eo vescatur, qui non satis nutrit.

*Potus*, qui ut cibo magis necessarius est, ita potest plurimum nocere, quando non confet unquam. Potus sit in herniosis cerevisia Brunnvicensis vel alia optima, ab omni heterogeneitate saculentà acidaque libera, non nimis recens, nec acescens & inveterata, medicata etiam ex herbis traumaticis, vel oculis 55, maritata usum habebit egregium. Sic & vinum modicè, imprimis Gallicum ac Hispanicum concedi potest, vel rubrum Germanicum, stomacho gratissimum. Potus verò Theæ, vel Coffæ, vel Choccoladæ, reliquis potentibus antecedendus in his malis. Caveatur frigidior, qui herniosis aliquando funestus est, ut vitam extinguat subito, ut aliquot novimus exempla, inde enim suscitantur obstructions, convulsiones & stagnationes lethales.

*Mors* quieti oppositus, moderatus & par-

B b b 3

cus suadendus, ut enim taceamus communes noxas in nostro casu, nil magis prolapsui intestinorum ac umbilici velificatur, quàm motus violentior; *Quieti* ergo potius indulgendum est, quàm solâ herniosos curatos novimus, fugiantur verò equitatio, saltatio, cursus, elevatio & gestatio oneris gravioris, jaculatio. & quicquid musculos & ligamenta umbilicunquē extendere & dirumpere valet, procul absit. A clamoribus & vociferationibus sibi maxime caveat, quæ omnia peritonæum tendunt, & gravius excitant malum.

*Somnus* cum functionum animalium quies sit, vires restauret & dolores mitiget, ægro commendatus esse debet, ut sufficiens sit, & sic alterna requies etiam umbilico quietem vel ipso decubita concedat, vigiliæ productæ exulare debent.

*Excreta* aliuntis relpondeant, & curiosè imprimis alvi munus cordi habeatur, ut non cesser, vel si id fiat, admoneatur lenientibus cremore Qi, passulis, clystere, arcano duplicato. &c.

*Animi pathemata* omnia dictamen sanæ mentis sequantur, vitet æger iram, quæ varias spirituum commotiones & dispersiones, succorumque coagulationes producit. Aninus sui sit compus & placidus, pellat timorem, nec dolor adsit.

Inflammationis Musculorum Abdominis Diæta cum prædictâ fere convenit, & cum sæpius inflammationum tradiderimus diætâ, hanc iterum hic repetere non libet, sed videri potest caput generale de Inflammatione.

*Galienus  
rum mo-  
di curan-  
di Herni-  
am um-  
bilici.*

§. 14. *Curationem* Pharmacæutico-Chirurgicam *Umbilici Herniæ* ita aggrediuntur Galenici, ut quodcumque prolapsum est, sive intestinum sit, sive omentum, reprimatur & in situm debitum retrudatur, præmissa emolliitione per fœtus & unguenta; reposita verò ita detineri jubent, ne denuo prolabantur, medicamentis nempe adstringentibus tum internè sumendis, tum foris applicandis ex tragacantho, sanguine draconis, semine myrtillorum, mastiche, consolidâ, plantagine, pulveris formæ exhibitus, & protuberantiæ impositis epithematibus ex decocto malicorri, radicis consolidæ, rhapontici, foliorum hederæ, cupressi, thure, myrrha, aloë, in vino austero, & emplastro ex iisdem cum bolo Armeno, succo hypocythidi, glutino tauri & pice navali, aut cera & oleo abietino, aut terebinthina susceptis, non omisissis pulvinaribus ex linteis cum fasciâ, ut fortius à prolapsu coercerentur. In statu quo copia clysterum aut suppositoriorum usum non contemnunt, & locum protuberantem unguento Agrippæ, oleo laurino, anethino, &c. inungunt, vel fœtus ex camomilla, summittit. Anethi, baccis lauri, semine cumini, auii, aut emplastrum de baccis lauri imponunt. Ad aquam Umbilici pelliculam propellentem ejiciendam aut absumendam, fœtus aut cataplasmata approbant ex petroselinæ, apio, sulphure, nitro, cochleis confusis, stercore caprillo, vel tumorem inungunt unguento de arthanitâ, aut emplastrum ex gummi Ammoniaco, bdello, alumine, pice, terebinthina & cera compositum imponunt, quibus si aqua non consumatur, scalpello foramen efformant, per quod eandem effluere sinunt, & foramen emplastro diapalmæ aut alio quodam vulnerario iterum occludunt. Ab excrecentia carnosa & aneurisinate productâ herniam umbilicalem. ut incurabilem, vix solent attingere.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione*

Venzsectionem necessariam ducunt ad revulsivum in brachio, ad derivationem verò in pede, hinc refrigerantia propinant remedia. inter quæ decoctum hordei cum herbis endiviæ, cichorii, violarum, cum syrupo de rosâ simplicis & violarum commendat, externè temperata apponunt ataplasmata, vel olea unguenta ex rosâcino omphacino, violarum, unguento santalino, aut vergente jam phlegmone ad suppurationem, emollientia apponunt, uti in reliquis apostematibus generibus, & in tempore abscessum aperiunt, ut materia purulenta exitum reperiat, ne diutius retenta per alium tam accrimoniam abdomen erodat, ad interiora vergat & viscera corumpat, post hæc non aliter, quàm in reliquarum partium abscessibus procedunt.

§. 15. *Paracelsus* in Umbilici *Herniæ* non aliam ab ea reliquit curationem, quam in olei herniis instituit, in aquosâ enim sequentia laudat remedia.

℞. *sicum* lbj.  
Ol. *granor.* Junip. ℥iiij.  
sarin. *sabar.* ℥vj.

F. *Cataplasma super ignem*, postea calidiusculè apponendum.

℞. *Farin. sabb.* lbj.  
Sem. psyll.

citon. aa. ℥j.

Consolid. maj. ℥ijj.

*Vini & aceti q. l. ut fiat Emplastrum.*

In Ventosâ curationem per pinguiâ viscosâ que maxime commendat, ex quibus sequens instat omnium esse potest.

℞. *Vifci abietini.* ℥vj.

*Mumia.* ℥v.

Folior. ebulli. ℥j.

M. F. *Catapl.* quod imponatur.

In carnosa resolutentia adhibet ex oleo anethi, lauri, benedicto, gummi potissimum sequens emplastrum.

℞. *Olei lauri.* ℥vj.

*Oppopanac.*

*Gilbar.*

Bdell. aa. ℥ijj.

*Reduc ad formam liquidam cum sequenti additione.*

℞. *Farin. sabb.* ℥ijj.

*Ficuum.* N. iijj.

*Capnura.*

ruta aa. ℥j.

*F. in modum Emplastri.*

*Ad Musculorum Abdominis Inflammationem* tollendam remedia ex lapide calaminari deprompta approbat, ubi verò in apostema abiit, mundificantiâ adhibet, ut in reliquis Phlegmonibus facere consuevit.

§. 16. *Hæmorrhoides* in Umbilici *Herniâ* magnetem laudat, maxime dorsum ejus, quo emplastro & herniæ imposito intestina repelli & herniam decedere promittit.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione Hæmorrhoidi*, quamcumque occasione Atchæum irritantem amoveri vult, hinc sedativæ remedia intus exhiberi & foris etiam idonea unguenta & emplastra applicari, quæ citò resolvi & tumorem valeant emollire.

§. 17. *Villivis* in Umbilici *Herniâ* à flatibus orîa omnia commendat carminativa internè & externè adhibita, porciones ex aqua fœniculi, anisi, menthæ, essentia carminativa, clysteres, linimenta cataplasmata & emplastra ex baccis lauri, camo-

*Cura Pa-  
rascelsi.*

camomillâ, cumino, fenogrecô, anetho, rutâ, ladano, myrrhâ, mastiche, thure. In Aquoâ humorem illum discutientibus, diureticis & diaphoreticis absumit, & cataplasinata ex farinâ fabarum, stercore caprillo & semine sinapi imponit, vel emplastrum ex cerâ terebinthinâ & gummi Ammoniaco. In Camosâ ad excrescentiam istam assumendam internè spiritum salis dulcem exhibet. foris autem emplastrum diachylon cum gummi imponit. Ubi intestinum vel omentum prolapsa sunt. eadem reponere jubet, præmissio fotu emolliente & clysteribus non omittis, iis verò repositis emplastrum de pelle arietinâ, vel aliud contra rupturam imponit & omni modo prohibet, ne denuò prolabantur.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione* Venæsectionem approbat, nec diaphoretica contemnit, & foris idonea imponit cataplasinata, uti inflammatio requirit, & aliunde cognoscî possunt.

Sylvii.

§. 18. Sylvii cura in *Herniâ Umbilicali* hæc est, ut intestina prius ab obstructione liberentur, & fæces eorum indurata clysteribus emollientibus ad exclusionem parentur, quo factò intestinum aut omentum in situm debitum reprimendo reponit, & ne ex eodem relabantur, emplastro ad rupturam ordinario & falsciis aptis studet præcavere.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione* adhuc incipiente ulterius ejusdem incrementum prohibet clysteribus, unguentes, fotibus & cataplasmatibus emollientibus, ut & diaphoreticis internis acidum temperantibus, quæ si irritò conatu adhibeantur & inflammatio ad suppurationem tendat, ad hanc ipsam promovendam fortiora emollientia cataplasmatum formâ imponit, & eodem planè modo hic, ac in alias partes occupantibus inflammationibus procedit.

Cassia.  
geran.

§. 19. *Cassianus* consuetum est, in *Umbilicali Herniâ* infantum eosdem à fletu retinere, & fasciam convenientem cum pulvinari comprimente supra umbilicum corpori circumducere, aut emplastrum ex oxycroco aut pice super alutam extensum formâ rotundâ tunori, emplastro vero chartam densam similiter rotundam imponere, cum linteis quadruplicatis & fasciâ. In adultorum *Herniis Umbilicalibus* causas easdem excitantes & fovescentes remouent, siue flatu sint per carminativa abigendi, siue aqua diureticis internè datis, emplastro de baccis lauri cum stercore caprillo externè, evacuanda, siue alia quædam materia absumenda & emollienda emplastro de spermate ranarum cum mercurio, postea intestinum vel omentum deprimunt & in convenientem situm reponunt, emplastrumque ad rupturam, vel fistulicū umbilico protuberanti admovent cum fasciâ. In gravidis iisdem emplastris ulteriore prolapsu præcavent, & post partum ulteriori ejus curationi perficiendæ incumbunt.

*Musculorum Abdominis Inflammationem* curaturæ attenuationi succorum in tubulis musculorum rectorū vel transversorum stagnantium, & resolutioni quam maximè student, internè exhibitis diureticis & diaphoreticis scopo huic quam maximè dicatis, imprimis sequentem mixturam.

R. Ag. Charesol. ʒij.

Heder. terrestr. ʒij.

petroselin. aa. ʒvj.

Hyperic. ʒij.

Ocul. ʒij.

Sperm. cet. ʒij.

ʒij diaphoret. ʒj.

Sis succin. gr. vj.

Syr. Menih. ʒvj.

M. d. cochlearium.

Hac absumta ad guttas 30. vel 40. sequentem instillant Tincturam.

R. Tinctur. Hyperic. ʒiij.

bellid. ʒj.

— ʒij.

M. d.

Cataplasmata quoque externè imponunt discutientia, uti sequens commonstrat formula.

R. Herb. menth.

absinth.

Charesol.

eupator.

cicuta.

petroselin. aa. Mj.

flor. Camomill.

sambuc. aa. ʒj.

rad. bryon.

cucum. asinin. aa. ʒij.

sem. cumin. ʒij.

— ʒij.

Camphor. ʒj.

Cog. in V. in formam cataplasmati,

inflammationi tepidè imponendi.

Obstante verò succorum induratorum copiâ, ne fluorem redipiscantur, suppurationem promovent emollientibus, cataplasmatibus ex rad. lil. alb. alch. cepis. herb. beta, branca ursina, floribus nieliloti. camomillæ, ficubus, in aqua vel cerevisia coctis, additis farinis hordei, lini, fenigraci, oleo liliorum, buriy & axungia anatis, vel unguento de althæa, aut basilico, nec non emplastro diachylon & de meliloto invicem mixtis, quorum administratione durante, interna diaphoretica repetunt, ut succi chylosi purulenti ad cutem propellantur, & abscessus externè potius, quàm internè rumpatur, apertura facta lancetta in loco protuberante, quo factò mundantia & tandem vulneraria balsama ulcuscūlo insinuant & emplastrum de gratia Dei ad perfectam consolidationem imponunt. Rupto verò abscessu interius, materiam purulentam per urinam expellere satagunt sequenti ves simili mixtura,

R. Ag. Charesol. ʒij.

Petrosel. ʒvj.

Lumbricor. ʒij.

Essent. agrimon. ʒij.

Tinctur. hyperic. ʒij.

Myrrh. ʒj.

— ʒij succinat.

Syr. Veronic.

Heder. terrestr. aa. ʒij.

M. d. cochlearium.

Pure satis evacuato, & urina alium referente colore, existenteque pellucidore, balsama exhibent vulneraria in iusculo intus sumenda, de Capaiba scilicet, vel Peruvianum album, aut pulveres ex oculis ʒ. pp. matre perlarum, myrrhâ, lapide hæmatite, succino & similibus paratos absorbentibus, abstergentibus & aliquantum conglutnantibus.

§. 20. Sicut duæ generales syntheseos sunt indicationes, ita eadem etiam in harum *Herniarum* cura attendendæ sunt; repositio scilicet, & retentio. Curantur enim *me* iudice, tam per repositionem illius, quod è sede suam motum, quam per repositio-

*Nistra en-*  
*dra in Her-*  
*nia Umbi-*  
*lici.*

positi retentionem. Illud, nisi partes prolapsæ inflammatae, seu faecibus repletæ fuerint, aut umbilico coaluerint, facile præstari potest, imò in supinato tantum ægro sponte recedunt, leviter per manum Chirurgi adjuvæ, quibus demum emollientia topica multum auxilii præstant. Removenda verò sunt omnia impedimenta, qualia sunt stercora & stercora intestina replentia, atq; inflammatio, omnisq; humorum stagnatio.

Flatus tolluntur optimè per carminativa, arcan. dupl., partim interne, partim externe usurpata partim ano injecta; stercora resolvantur per emollientia iisdem modis applicata, v. gr. per unguentum Althææ, Martiatum, oleum lihorum alborum, Philosophorum; per hauritum decocti Althææ cum liquore siccæ foliæ Cī. In hunc finem etiam usurpari possunt infusus seu balnea ex lacte, oleo olivarum, vel aquâ, in qua herbæ & radices emollientes fuerint coctæ, nec contemnendi sunt clysteres emollientes.

Uterior verò prolapsus ut impediri debeat, *Parvus & Celsus* aliique docent, & quidem mediante ligatura, cuius applicationes rationes plures ab Auctoribus Chirurgicis describuntur. Unicum tamen omnes scopum habent, ut Umbilici pars dilatata, quæ super ligaturam est emoriatur, quo vero vinculo restricta glutinetur, & cicatricem contrahat. Ast quia operandi modi non duntaxat ratione stricturæ sibi admodum dolorifici, sed propter partis mortificationem periculosissimi sunt, imò ab ipso *Celsus*, aliisque exercitatis Chirurgis pro difficillimis habentur, imprimis si prominentia fuerit major, minor verò cingulo appropriato ita muniri queat, ut si eodem dilatatio hæc non semper curetur, certè fasciâ impediet, quo minùs in pe. orem statum abeat, munisque omnibus latis commodè vacare possit æger, meritò isti suspecti haberi dehent; vide *Blegny* l. 1. Part. 2. Sect. 2. c. 5. & *Eph. Germ. Decur. Ann. 3. obs. 128.*

Describuntur apud Auctores varia vincula ad umbilicum retinendum, nonnulli & fasciæ scapulares addunt, quæ tamen vix necessariæ videntur, commodius erit *melissa* à *Blegny* d. l. p. 2. S. 2. c. 4. & 6. descriptum. Eiusmodi vincula optimè novit efformare Lugduni Batavorum Dn. *Muschenbroek*, qui varia ligamenta pro herniis sibi servat, quæ François nuncupat, & plurimis articulis & trochleis sunt donata. *Aqua pendens* emplastrum insuper adstringens commendat scuto cinguli supponendum, imò in desperatis casibus cura illa palliativa potiùs Hildani, quam per fasciam commodam *Centi. 3. Obs. 64.* adornat, adhibenda erit.

Intestino in locum pristinum reposito, pars affecta fovenda est decoctio usinæ vino rubro facto, superimposito emplastro contra rupturam *Fernelii* oleo mastichino malaxato, non omnis interim internis quibusdam ex conserva symphyti, & similibus paratis: vel imponatur sacculus farina lupinorum, & linteo combusto vino adstringente subactis repletum, cum subligaculo conveniente, intestino impetu facienti resistente. Fasciis necessariò ligandus est Umbilicus, ab initio & parari potest sacculus è musco prunorum silv. bursa pastoris, plantagine in vino rubro decoctus qui umbilico imponatur, & fasciâ ritè firmetur, dein cingulum è linteo confici potest, quo abdomen devinciatur, ei verò circa umbilicum pulvinar exile, sed duriusculum adaptari potest, in cuius centro glo-

bulus corio rubro emineat, ut iste se in umbilicum dilatatum altius insinuans caveret, ne omentum vel intestina denuò prolabantur. Ita in innumèris fere infantibus curata Umbilici prominentia, & crassities cataplasmatæ ex sanicula in vino cocta umbilico imposita, cum ligatione strictiori, & radice consolidæ majoris contusa dorso è regione Umbilici admota, uti testatur *Velschius*. Internè exhibeatur infantibus pulvis radicis scrophulariæ à ʒss. in lacte. Sequens pulvis prominenti inspergatur umbilico.

ʒi. Bol. Armen.

Terr. Catechu.

Myrrh.

Pumphyg. aa. ʒi.

M.

*Job Langius* sequens hoc in casu laudat emplastrum:

ʒi. Pic. Grac. ʒiij.

Colophon.

Resin. aa. ʒi.

Mumia ʒiij.

Tragacanth.

Gum. Arab.

Sangu. dracon.

Mastic.

Balaust. aa. ʒiij.

Aloesepat. ʒiij.

Oliban. ʒss.

Glutin. pisc. ʒiij.

F. l. a. Emplastrum.

Ast cum diversæ herniæ umbilicales etiam diversas agnoscant causas, pro singularum quoque indicationibus diversæ requiruntur curationes.

*Hydromphalus*, qui fit ab aqua inter peritonæum & abdominis cutem collecta hydropicis obveniens, à reliquis distinguitur, si mollis est tumens, & ad compressionem non cedit, neque minuitur, neque augetur. In curatione huius commendandus dissolventia, hancque cataplasma ex pulvere spicæ Celticæ & terebinthina, cui parum olei amygdalarum est admixtum, aus conficiatur sacculus ex spica Celica, & cymino, qui in vino rubro ebulliat, & expressus tumenti umbilico imponatur, vel imponatur spiritus matricis eum quadruplicatis linteis.

Non absumili ratione curatur etiam tumor ille, qui ex sanguine evasato fit, ceu *Coster* observavit, tales enim dari tumores, testatur quoque experientia, ortos ob venæ vel arteriæ ruptionem.

*De Pneumatophala*, hoc est, flatulenta procidentia, superius jam egimus, cognoscitur facillè, si prellus cedit, & protinus refit. relupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet. Sequens emplastrum in Umbilici Procidentia à flatibus oborta conducet.

ʒi. Semin. cymini.

lupinor.

Bacc. Laur. aa. p. ʒij.

ʒiij. ʒi.

*Pulverisata coq. in vino rubro ad pulsiformam, F. Cataplasma.*

Convenient etiam emplastra carminativa sæpiùs jam dicta, aliæque resolventia inferiùs adhuc dicenda. Umbilicus recens natorum ob incuriam obstetricum facillè inflammatur, ac quandoque sphacelatur ceu exemplum novi, cui tantum vin. caq. calc. viv. applicui felici c successu sic pus stillanti umbilico applicari potest ungu. alb. diapompholyg. aa. ʒss. ol. ovorum ʒiij.

M.

In *Exomphali*, vel *Entromphali*, ubi laxato vel rupto peritonæo intestina in umbilicum prolabantur, qualis à *Sebenkio* mirandus observatus fuit, curatione magna diligentia est adhibenda, nec temere statim aperiri debet protuberantia, facta enim apertione prodeunt & effunduntur intestina, maximo sæpe cum ægri malo, nonnunquam etiam morte indefubsequente, quemadmodum & ego his observavi. Confer *Paræum*. Quomodo hæc procidencia curanda sit, superius jam diximus.

Restat adhuc unica expediendi species, quam *Sarcomphalum* dicunt, live caro sit fungosa, live carcinomatæ similis. Facile à reliquis distinguitur, nam tumor durus est, nec preliis cedit, & ad nullum decubitus modum mutatur. Ejusmodi umbilicum quatuor digitis ad penis longitudinem prolongatum vidit *Benvenius*. Fungus verò cum extra cutim sese nudum oculis nostris objiciat, primo mox intuitu cognoscitur. Raræ & admiratione dignam ejusmodi eripientem fungosam excrescentiam literis consignavit *Fabr. Hildanus Cent. 5. Obs. 62. Benvenius* ligatione curavit ejusmodi *Sarcomphalon* per anabrochilismum, carnem enim vinxit, singulisque diebus arctius deligans non prius destitit, quam ea ipsa præmorta penitus excidisset. Idem fecit *Hildanus*, in fungo illo triplici, adhibitis quoque anodynis & decocto adstringente exterius tandemque inspersit pro pleniora cura pulverem adstringentem; quod si non sufficit hoc præsidium, removeri potest per caustica. Cum verò tenella ætas actualia non admittat, potentialibus sic dictis in eis extirpabitur, & sufficiet hunc in finem bolus Armenus cum alumine uto. Feliciter & quandoque sectione manni peniti artificis peracta removeri potest, Carcinoma verò majus incurabile est.

Eadem etiam ratione *Felix Platerus*, Felicis filius ex fratre Thoma Nepos, *Manuss. Observ. selectior. Olf. 44. p. m. 95.* Verrucam in muliere è latere Umbilici dextro, jam à longo tempore gracili radice pendulam extirpavit, jubendo Chirurgum, applicato prius circumcirca emplastro defensivo, serico fortissimè ligare. Hæc quidem ex ligatione mulier ab initio dolorem sensit vehementissimum, sed cum postea fuerit mitigatus, adhuc seuvel paulo inferius & fortius cum setis equinis, continuata semper defensiva applicatione, ligari jussit, unde valde intumuit cum rubore circa ligaturam, quod tamen in crastinum censuit linquendum, timore interea prope vincula incipiente nigrescere, sed dolore exquisito multum remittente, quare adhuc aliquandiu relinqui jussit, cum verus abdomen nullus apparuerit tumor, donec tandem dolore denuò invalescente ligaturam solvit, partique exulceratæ parum unguenti *Ægyptiaci* apoliunt, ligaturâ autem soluta, excrescentia iterum detumuit colore mutato, & quin ægraligationem ferre non potuerit, Chirurgum jussit cauterium potentiale applicare, quo statim elichara fuit inducta & dolor mitior redditus, hinc paulò inferius lapidem infernalembique omni ferè dolore operantem eundem in modum apponi curavit, quo circumcirca elichara curata

fuit, quâ itidem delapsâ idem opus adhuc semel repetere jussit, unde tribus post diebus excrescentia ista sponte decidit de filo adhuc pendens, quo abscessu totaliter separata fuit, substantiâ constans non propriè verrucosa, sed varicosa, venulæ, nervis & glandulis perspersa.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione* Cura Intercura ed dirigenda, ut stagnatio succo-  
rum, & inde facta obstructio tollatur, *scilicet* quod facili matre obtinere possumus per interna æquæ ac externa remedia. Interna egregia sunt diaphoretica ex temperantium materia desumpta, ut sunt invententia, quæ cum consistant in alcali seu volatili, seu fixo, seu puro, quod dicitur sal macrum, seu mixto, & quidem oleoso, pro materia agnoscent omnia alcalia, & ea, quæ alcali quocumque prædita sunt. Ex alcalibus volatilibus conveniunt C. C. fulig. urin. &c. Ex fixioribus proficua erunt salia fixa, & diaphoreticum, ebur Philosophicè præparatum, saccharum si, camphora, aliaque plura, & volatile ososum, ex sale volatili C. C. vel alio cum oleis aromaticis paratum. Exempli gratia:

℞. Zii diaphoret. ʒiβ.

Q. n. ℞. pp. ʒβ.

℞. ii absinth. gr. xxv.

M. F. Pulv.

Vel:

℞. ʒ. Card. bened. ʒviij.

El. diaphor. Fracass. ʒj.

Sperm. cet. ʒj.

Bals. nervin. ʒβ.

℞. theriacal. camphorat. ʒβ.

F. Mixtura cochlearum sumenda.

Conveniunt quoque internè salia volatilia, & volatile osolum cephalicum D. VVedel. & usmatricalis, balsamus nervinus & similia. Inter Topica Spiritus matricalis cum camphora & Spiritu Ois & ci maritatus ferè omnem implet paginam, tepide cum lineis quadruplicatis applicatus, vel flatcataplasma sequens.

℞. Summit. absinth.

Herb. rui.

Phellandr.

Fol. rorismarin. aa. Mj.

Flor. Camomill.

Sambuc. aa. ʒiβ.

Sem. cumin.

anif.

carv. aa. ʒj.

Ois ʒi ʒij.

& ci ʒiβ.

Cog. in vino Gallico, vel mulsâ, adde panis hircos. q. s. pro consistentiâ cataplasmatist. quod sæpius de die tepide applicandum.

Musculi enim Abdominis tractandi sunt ut aliz partes membranosz, copiosis enim venis & arteriis, imo nervis & fibrillis, quæ sunt fila quardam oblonga tenuissima, præditi sunt, hinc exposcunt nervina ac roborantia, quare calidiora applicanda sunt, quæ impediunt causam inflammationis, tollendo obstructionem in vasculis musculorum factam. Spiritus vini camphoratus cum spiritu florum sambuci & aquâ calcis vivæ sæpe sufficiunt.

FINIS LIBRI TERTII.

Ccc

JOH.



abs quibus tubulorum obstructio oritur, & ob-  
turbatio, saliumque procreatio fermentationem  
istam excitantium.

Calus in Perinæum, vel vehementior lon-  
giorque crurum ductio partis hujusce Inflammationis causæ esse possunt; si quis enim apertis  
ductisque cruribus in corpus aliquod durum  
cui Perinæum fortiter applicetur, deciderit, par-  
tis quæ in corpus durum impingit, vasa quæ-  
dam dirumpuntur, aut comprimuntur. A prio-  
ribus excernitur sanguis aut lymphæ, in poste-  
rioribus verò stagnat, illorum partibus pro-  
pius juxta se invicem accedentibus. Eadem con-  
tingit fors muscularum fibrillis, quæ valis san-  
guiferis aut lymphaticis; pressæ siquidem & ar-  
ctius unite angustiora inter se relinquunt inter-  
stitia, quibus sanguinis stagnationem adaugent  
validioremque illam efficiunt: at quum materia  
ætherea, spiritus animales volatilioresque san-  
guinis vicinorum vasorum particulæ in sangui-  
nem aut lympham extravasatam impingunt, tenui-  
ores ejus partes abripiunt, & per poros eli-  
minant. Sulphura autem crassa in partem remanen-  
tia ab acidis coagulantur, quæ tubulis angustio-  
ribus impacta in illis cespitant, alcalicorum cras-  
siorum pori ab acidis opplentur, quos cum non  
liceat materiæ subtili præterfluere, liquorem ef-  
fusum exagitat ipsa, fermentat & rarefacit.

Vehementior longiorque crurum distortio  
Perinæi Inflammationis autor etiam ideo esse  
potest, quòd tum temporis muscularum vaso-  
rumque fibrillæ supra modum extensæ, & tan-  
tum de amplitudine sua dependentes, quantum  
de longitudine acquisiverunt, ordinariam liquo-  
rum copiam suscipere nequeant, & debilitatæ  
præ extensionis caliditate earum vi elastica, ordi-  
narium liquoribus motum non concilient, earum  
enim vibrationibus eam, quæ par foret, fre-  
quentiam non habentibus, nec requisito robore  
pollentibus, tardior fit liquoris cursus, & hinc  
minor spirituum animalium in fibras nerveas in-  
fluxus, unde sanguis & lymphæ hoc orbata si-  
mulo minorem motu donantur, & testudineo  
solum gressu circulantur, liquoribus ergo par-  
ticulis volatilibus non ditatis, sulphura ut deceet  
non expanduntur, nec impetientium acidorum  
aculeos, abs quibus coagulantur, declinare pos-  
sunt, crassioribus alcalicis ferè quiescentibus  
impingentia acidæ effugere non fas est, eaque po-  
ris suis excipiunt; inde contingit tubulorum à  
coagulatis sulphuribus obstructio. liquorisque  
ab impedito materiæ subtilis libero per alcali-  
corum poros transitu fermentatio & rarefactio.

*Causa Per-  
inæi Abs-  
cessum.*

Materia ætherea partes universas perpetim  
pervadens, spiritus animales indefinenti fluxu  
corpus irradiantes, & tenuiores sanguinis parti-  
culæ per vasorum poros irrequite avolantes, li-  
quoris extravasati particulæ perpetuo motu ex-  
agitant & huc illic impellunt, & in tubulos a-  
pertos adigunt; si sulphura jam ab acidis coagu-  
ata ita fortiter tubulorum parietibus inhære-  
scent, ut ab illis extrudi nequeant, & acida al-  
calicorum poros opplentia ab ipsis deturbari  
non valeant, nec salia ab acidorum cum alcali-  
corum coactis progenita, præ nimia illorum du-  
ritie ac rigiditate arteriarque perfringi non pos-  
sint, interior fit liquoris effusæ motus, quàm  
perpetuum patitur materiæ subtilis, spirituum  
animalium & particularum tenuiorum sanguinis  
vicini impulsus, nec ulla via aufugere ipsi va-

cet; & quum perduret pororum alcalicorum ob-  
turbatio & inversio, & ab illis materiæ subtilis  
in ea prorumpentis propulsio: salia crassa duris  
rigidisque spiculis horrida in partium adjacentium  
fibras compulsa, & in earum poros aculeos  
suos insinuancia, illas discindunt & comminu-  
unt, sero hemque sibi excavant, cui *Abscessus* no-  
men vulgò tribuitur. Restant adhuc phlegmata  
quædam, quæ alcalia dissolventia, ac reliquis li-  
quoris effusi elementis intermixta fluiditatem  
materiæ congestæ conciliant, & hæc materia in  
Abscessu comprehensa pus cognominatur, al-  
bedinem præ se ferens, oriurque (quando in-  
flammatio à sanguine produciur) ex eo, quòd  
exhalatis tenuioribus delicatioribusque sul-  
phuribus, quæ sanguinis globulis superextensa  
eius rubedinem faciebant, chylisæ particulæ  
sulphure hoc defraudatæ, album conferrent  
colorem.

In *Ulcus* facili transit abscessus, quod vel *Meris*.

Chirurgi manu inducitur, vel pus proprio mar-  
te carne & cute superiacentibus erolis exitum  
sibi molitur; quod fit, si pus diutius, quàm par  
est, in parte stagnet ac relinquatur; salia siqui-  
dem puris huc & illuc acta ambientes partes  
spiculis suis impetunt, earumque fibrillas dissecant  
& comminunt: si pus diutius in parte  
relinquatur, subsistente salium actione, fovea  
profundior ac latior devenit, fibrillisque partium  
ad superficiem externam urgentium ut re-  
liquis exelis, ad cutem cuticulamque tandem  
perveniunt, quæ quum non sint ejus densitatis,  
atque duritie, ut salium aculeis resistere valeant,  
ab ista tandem discinduntur & separantur, liber-  
que conceditur puri effluxus.

Per sistentibus tubulorum obstructionibus, & *Gangrana*.

à novis coagulatis sulphuribus semper advenien-  
tibus adauctis, crassisque salibus fibrillarum po-  
ris infixis, parciore fit spirituum animalium in  
partem affluxus; oppleti siquidem vasorum tu-  
buli fibrillas, quibus incumbunt comprimunt &  
coarctant, prohibentque, nec opiosos excipiunt  
cavitate sua spiritus, & si qui eas permeant, pori  
fibrillarum à salibus occupati vix illos admit-  
tunt, fibrillæ ergo spirituum subsidio carentes,  
alluctæ nequaquam gaudent tensione, sed concidunt,  
& flavescent, ideoque sensu orbantur, de-  
ficiencia quoque tensione fibrillæ, eà quæ cederet  
vi, salium impetus non repellunt, nec ea à poris  
suis excutiunt, salia verò perpetuo indefinenti-  
que motu agitata, fibrillarumque poris infixa,  
eas discindunt & dissecant.

§. 11. Perinæi Inflammationis idem est finis, ac *Prognosis*.

aliarum partium, nam si per poros non discutia-  
tur, suppuratur; vel si malè tractetur, in Gan-  
grænâ degenerat; nec quoque periculo vacat  
partium vicinarum, tum externarum, tum inter-  
narum ratione, scroti, testiculorumque nimi-  
rum, ani, intestinorum, vesicularum seminalium,  
& urethræ.

*Abscessus* Perinæi nisi brevi aperiatur, carnes  
subjectas exedit, & pus in vicinas partes viam si-  
bi ærnat, & in partes usque penetrat internas,  
suppositæque ossa carie inficit, quare maximum  
ab illo imminet periculum.

*Ulcus* Perinæi merito semper timorem incu-  
tere debet, quum pus acrius factum partes cir-  
cumjacentes facili Marte corrodat, & quum  
omnes Perinæi vicinæ partes tum internæ, tum  
externæ, si semel ulcere tactæ fuerint, difficilli-  
mum

nam aut nullam admittant curam, nec temere pronunciare possumus, maximum enim impendet periculum ab ulcere Perinæ. Ulcus pro ea, quam inducit, indole, facilius aut difficilius curatum est, vel etiam pro majori aut minori mora, quam pus in abscessu moram fecit.

Nisi protinus *Gangræna* Perinæ succurratur, vix à mortis faucibus eripi potest æger, propter vicinarum partium dispositionem ac indolem. Sed nulla salutis spes superest, si *Gangræna* à causa interna ortum duxerit.

*Dieta.*

§. 12. Cura *Dietetica* consistit in eo, ut succi incrassati & stagnantes attenuentur, hinc omnia alimenta & potulenta, quæ succum nutritivum exhibent dulcem, anque pejus fugienda; illa enim sunt, quæ obstructions pariunt, & succos circulates inspissant, coagulant ac stagnare faciunt, nec non omnia acida, austera, frigida & viscida, lutuosum exhibentia chylum; Aer quoque frigidus ac nebulosus nocet, uti & motus nimis, exulenti animi pathemata vulgo frigida dicta, ut marcor, tristitia, terror, &c.

*Curatio morbum horum juxta Galienum.*

§. 13. *Curationem* Pharmaceutico-Chirurgicam Perinæ *Inflammationis* instituituri *Galienici* ad sanguinis ulteriorem influxum inhibendum, revulsionis gratiâ venæsectionem celebrant in brachio dextro vel sinistro, prout ad dextrum vel sinistrum latus inflammatio hæc magis inclinat, ad derivandum quoque in talo uno vel altero idem peragunt opus; hinc pro partis accipientis corroboracione, ne plus admittat sanguinis aliunde affluenti, adstringentia admovent medicocria, epithemata nempe ex succis nymphæ, plantaginis, solani, portulacæ, vel linimenta ex oleo nymphæ, rosaceo, omphacino, myrthino, unguentum santalinum, vel cataplasmata ex foliis parietariæ, nymphæ, portulacæ, violariæ, lennue endiviæ, dactylis, &c. in aqua decoctis, & diligenter contusis aut conquassatis, additis postmodum farinâ hordei, pulveribus florum chamomillæ & meliloti, cum oleo rosaceo parata. Fortiora adstringentia hoc in loco omittunt, ne restrictio nimis sphinctere vesicæ & meatu urinario dysuria sequatur vehementiora symptomata inferens, quapropter interna quoque adhibent apozemata ex radicibus liquiritiæ, cichorii, ononidis, herbis malvæ, parietariæ, capillorum Veneris, nymphæ, floribus violarum, nenuphar, borraginis, baccarum alkekengi, jububarum, passularum, seminibus cucurbitæ, melonum, althææ; quin si alvus simul adsit adstrictior, ne perineum affectum fortius inde prematur, & urinæ effluxus impediatur, eandem solvunt, & lubricam reddunt, vel solâ casti recens extractâ, & vel in jussulo, vel decocto foliorum malvæ propinatâ, vel electuario diacassæ cum manna, & tandem incendium in totum extinguere conantur sequenti electuario.

¶. *Conserv. rosar.* 3j.

*violar.*

*nymph.* aa. 3ß.

*Canl. lactuc. condit.* 3iij.

*Spec. diatr. frigid.* 3iij.

*diatr. santal.* 3j.

*de gemm. frigid.* 3ß.

*M. cum f. q. Syr. nymph.*

*F. f. a. Electuarium.*

Vergente Inflammatione ad suppurationem live in Abscessum humorem minus collectum resolovere student cataplasmatibus ex radicibus al-

thæ, liliorum, foliis malvæ, floribus chamomillæ, meliloti in aqua coctis, contusis & colatis, additis farina fabarum, ervi, oleo chamomillæ & axungia anseris; aliquando locum simul inungunt unguento althææ; quibus si suppuratio fuerit promota, locum aperiant ferro potius, quam ruptorio, ne hac in parte major fiat erosio, & ut purificatio exitus patetur, partesque adjacentes ab eo liberentur. Foramini secundum fibrarum longitudinem excitato ad dies aliquot digestivum imponunt, pureque satis evacuato, absterisionem parant, uti ulcus requirit.

In recenti eum Perinæ Ulcere post abscessum modò excitato, post legitimam digestivorum usum absterisionem istam facile initiunt decocto hordei, in quo mel rosatum fuerit dissolutum; at in ulcere vetusto pluribus aliquando remediis opus esse fateantur. Etenim si ad fistulam inclinare videatur, aut magna adsit materie purulenti copia, pro meliori absterisione interna quoque offerunt decocta, quorum omnium loco sequens esse poterit exemplar.

¶. *Rad. liquirit. ras.* 3ß.

*cichor.*

*ononid.*

*gramin.*

*pentaphyll.* aa. 3j.

*Herb. parietar.*

*agrimon.*

*capillor. Vener.*

*plantag.*

*ceterach.*

*sumar.* aa. Mß.

*Flor. nymph.*

*borag.*

*violar.* aa. P. j.

*Granor. a' kekeng.* 3iij.

*Sem. q. frigid. m. s.* aa. 3iij.

*Coq. in l. q. aq. commun.*

*In Colatur. 1b. j. dissolv.*

*Syrup. sumar.*

*cichor.* aa. 3iij.

*Oxymel simpl.* 3j.

*M.*

Vel :

¶. *Decoct. bord. non excoct.* 1b. j.

*Mell. rosat. colat.*

*Syr. de cichor. simpl.* aa. 3j.

*M.*

Non minus ipsum ulcustopicè abstergunt decocto hordei, in quo mel rosatum fuerit dissolutum, aut si profundius, aut fistulosum existat, simul cum hordeo radices aristolochiæ, Ireos Florent, herbas agrimon, beton. & aliquid thuris coquant, & in decocto hoc aliquid de unguento Ægyptiaco dissolvunt, itaque injiciunt, quibus ulcus probè mundatum carne expleant, & consolidant emplastro de janua, gratia Dei, vel alio quodam huic rei idoneo.

*Gangrænâ* hoc in loco valde existimant esse periculosam, & nonnulli ad sanguinem corruptum prolicidendum cutem hinc inde scarificant, & ad putredinem prohibendam cataplasma imponunt ex farina lupinorum, ervi, fabarum, sale communi, cum oxymelle paratum quibus aliqui addunt aloën & myrrham. In profundiore *Gangrænâ* alii fotum prius instituunt ex lixivio forti & aceto mixtis, in quibus radices aristolochiæ, vincetoxici, Ireos Florentinæ, herbe ablinthium, scordium, ruta, lupini, &c. fuerint inco-

cta, & post forum demum imponunt cataplasma. Ceterum ut in aliis locis gangranâ infectis, ita etiam hic solent procedere.

*Cura Paracelsi.*

§. 14. *Paracelsi* in Perinæ Inflammatione curanda, & decoctum lapidis calaminaris p. p. in aceto calide adhibitur, & Spertioli laudat; ad dolorem verò urentem sedandum solani succum cum nitro utiliter applicari posse opinatur.

In *Apothemat* Perinæ & *Ulceri* inde pronato interna sudorifera commendat, ut infectio à morbo hoc introducta mundificetur, tum ad balsamum naturæ corroborandum emplastrum suum oppodeltoch. quod ad apothematâ recentia quævis maturanda & mundificanda utilissimum judicat, hinc incarnativis ulceris consolidationem abolvit.

Ad *Gangranam* etiam hujus regionis Realgar sublimatum in aceto coctum adhibere solet, addito oleo majoranæ, ut linimenti formam acquirat. tum curativis eodem modo procedit. ut in ulceribus corrodentibus approbatque emplastrum ex resina abietis, visco consolidæ, paucò scammonia, & succo chelidonie paratum.

*Helmontii.*

§. 15. *Helmontii* in Perinæ Inflammatione Archæum irritatum pacare studet, & proinde quodcumque admittit ei in visum, quo facilius desinat à furore suo, deinde occasione illa, per quam in furorem istum fuit accensus. quod omnium optimè nitro antimoniato impetrari posse confidit, si interius sumendum exhibeatur. ut ab exandescencia sua desistat, & vela furoris sui retrahat, quo factò pars hæc ab incendio isto liberabitur.

Ad *Apothema* Perinæ emolliendum & maturandum, vel sanguinem hirci exterius applicat, vel pinguedinem leporis, ut facilius & citius rumpatur, sique cruor corruptus, & in pus conversus necessarium reperiat exitum.

In *Ulcere* hoc realgaria quoque fixa, & colchotar suum virtuti commendat, ut sanguinis corruptor ab his selem dometur, quo superato novæ carnis in cavitate succretionem & cicatrizationem pellis subsequatur esse, naturâ illâ omnia sibi parante operatrice, sanctè promittit. In ipsa partis hujus *Gangrana* lixivialia suadet, loco prius profunde scarificato adhibita, ut pote in gangranæ causa, acidum scilicet omne emoriatur.

*W. Wiffii.*

§. 16. *W. Wiffii* venæsectionem in Perinæ Inflammatione utiliter institui posse arbitratur, ut sanguis moram contrahens ad motum excitetur, & fomes iste morbi hujus à venis aliquantum in anitis rescindatur resorbeat, & aliò deferatur; postmodum ad leniendum dolorem, & ne alvus constipata malum reddat deterius, enemata injici curat, & apozemata propinat ex radicibus graminis, scorzonæ, acetosæ, liquiritiæ, hordeo, herbis fragariæ, malvæ, violariæ, in aqua fontis parata, additis syrupo violarum, & lapide prunellæ. Urgente alvi distractione majorem sui solutionem, decoctum cassiæ cum tamarindis, & floribus rosarum pallidarum ad uncias aliquot bibendum exhibet. Pro sudore movendo, qui præmissis hisce aliquando necessarius est, mixturam simplicem laudat, & externè cataplasmata discutientia & emollientia imponit ex magne decocti malvarum, betæ, flor. chamomillæ, &c. cum farina seminis lini & unguento dialtheæ, quo dolorem simul mitigari posse confidit.

Factò verò ex inflammatione ista Perinæ Abscessus suppurationem ejus promovet cataplasma,

tis, vel emplastris magis emollientibus & laxantibus ex farinis fenigreci, hordei, fabarum, pulveribus radicis althææ, pulpâ radicis lilior. albor. capâ contusâ cum oleo lilior. alb. & corponum & pauca quantitate saponis, cum cutem cultello dirumpi vult, ut purulenta materia exitum habeat, & *Ulcus* digestivis, aliisque remediis mundari possit, quod si factum fuerit, decocta vulneraria propinat, & præmisso pulvere ex oculis cancorum, coralliis p. p. & lapide hæmatite p. p. balsamum de Capaiba tum intus exhibet in juleculis absorbendum, tum foris inungit, vel si ulcus sit detentius, decocto hordei & lupinorum. in quo vel colchotar & li, vel unguentum Egyptiacum fuit dissolutum. per syringam infero, vel pannis eodem humectatis abstergit & mundat, ut eo citius postmodum ulcus carne repleti, & cicatrice obducta consolidari possit, cui rei emplastrum diapalmæ, aut sticticum *Croli* in servire existimat.

*Gangrana* partis hujus occurrit epithematis ex aqua calcis vivæ, in qua camphora & saccharum saturum fuerint dissoluta, vel lixivio forti, aut cataplasmate ex farinis lupinorum, fabarum, orobi, herbis absinthio, scordio, menthâ, carduo benedicti in lixivio paratis; additis theriaca, myrrha & aloë; nec interna omittit sudorifera, qualia sunt theriaca, dialcordium, cerussâ & diaphoretica, bezoarticum minerale, & C. C. quibus hoc in affectu non parvam tribuendam esse ducit utilitatem.

§. 17. *Sylvius* in Perinæ Inflammatione haud aliter, quin in aliarum partium inflammatione procedit, injectionem enim & enematum emollientium, exhibitione diaphoreticorum, instituta venæsectione & applicatione futuum, unguentorum & cataplasmatum itidem emollientium, quibus si inflammatio inhiberi non potuerit, sed Abscessus ad suppurationem pergat, hanc promovere studet cataplasmatissidem emollientibus, additis capis assis & contusis, ut maturatio eo citius expediat, tunc abscessum aperit, mundatis abstergit & consolidat.

*Ulcera* Perinæum invadentia, cum ut reliqua ab acido acri originem sumant, eadem repolcere aitre media, quæ aliis conveniunt, & proinde hic eadem de novo manifestare recusat.

In *Gangrana* Perinæ sudorifera suadet, & externa cataplasmata ex ruta, scordio, nasturtio, absinthio, floribus sambuci, semine urticæ in muria coctis, addito spiritu vini, quæ diligenter vult imponenda, & omni modo sphacelum præcavendum.

§. 18. *Cartesianorum* cura in Perinæ Inflammatione hæc est, ut succi incrassati in partium Perinæ tubulis hærentes auvantur, & particulae angulares hebetentur, flectantur & eliminentur, quare alvum modicè solventia hoc in casu non omnino rejiciunt, diuretica verò & diaphoretica planè ducunt necessaria, ex quibus sequens æstimatur mixtura.

℞. Aq. petroselin. ʒi.  
fumar.  
fior. sambuc. aa. ʒvj.  
Ocul. ʒs. ʒj.  
ʒis diaphoret. ʒʒ.  
Sperm. ceti ʒj.  
Laudan. opiat. gr. ij.  
Sacchar. canib. alb. ʒij.  
M. d. cochleatim.

Spiritum quoq; cochleariæ, lumbicorum, & ci.  
& hu.

*Cura Cartesianorum*

# CAP. VI. DE PERINÆ INFL. ABSCCESS. ULC. & GAN. 377

& huius generis plura volatilia magnopere laudant, quod valde penetrent, coagulationem quamcunque dissolvant, & tubiles aperiant, unde & eadem externe apponunt formā cataplasmatum ex radicibus asparagi, bryoniæ, bardanæ, herbis asine, chærefolio, cicuriar, petroselino, beccabungâ, floribus camomillæ, sambuci, camphorâ, sulphure, spermate ceti, face cerevisiæ, spiritu vini, vel linimentum parant ex sulphure, bolo Armeno, croco & camphora cum spiritu vini. quo adhibito tubulos apertum & particulas angulares correctum & absorptum iri promittunt, ut tumor omnis discutiatur, quem scopum etiam emplastrum de minio, de spermate ceti, vel diapalme aliquando attigisse observarunt.

In Abscessu Perinæ non diu morantur, sed suppurationem promovere student cataplasmatibus emollientibus ex radicibus alii, liliorum, altheæ, bryoniæ, herbis parietariæ, chærefolio, verbasco, betâ, brancâ urtinâ, floribus meliloti, camomillæ, croco, scicubus, in cerevisiâ coctis, additis farina fabarum, hordei, fœnigræci, axungia porci, anseris, butyro, oleo liliorum, florum sambuci, terebinthina, opopanax, melle, fermento, sapone, unguento basilico, altheæ, abs quibus omnibus fibræ emolliuntur, tubuli dilatantur, & succi fortius compressi resolvuntur, ut à materia subtili facilius commoveantur; tum ut pori cutanei magis reddantur aperti, & materia intus contenta fortius attenuetur, penetrantiora quædam prioribus adjungunt, ut sal tartari, calcem vivam, sal armoniacum, abs quibus si materia purulenta effluxum facis sit disposita, ei exitum parant. cutem cultello vel lancetta aperiendo, & post ejusdem effluxum cavitatem emundant linimentis ex terebinthina cum melle, vel axungia ovis, gummi elemi, myrrha, croco, & oleo ovorum; tandem eandem cavitatem carne opplent, mediante balsamo Italico, vel Peruviano, & emplastro diâsulphuris, cuiusque generationem promovent unguento diâpompholygos, vel emplastro oppodeltoch *VVurtzi*, ut integre ita obtegatur.

Et hac ratione quoque procedunt in Ulcere Perinæ, quod ab apostemate prorsum, expositum modo resolvetur dicunt curationem, non multum quoque ab ea discrepantem, si ab externa quadam re corrode, urinâ falsâ, vel succo spermatico Venereo partem hanc alluente proveniat, his enim ulcusculis pulverem aliquando inspergunt ex C. C. Philosophicè preparato, lapide calamini, terra Bli dulci, myrrha, cetullâ, Thutia, vel aqua calces vivæ, spiritu vini camphorato & theriacali abluunt, & emplastro de gratia Dei ad perfectam sanationem usque obtegent.

Ad Gangrenam Perinæ tollendam maxime necessaria censent diaphoretica ex theriaca, diascordio, Zio diaphoretico. Zio sublimato, hinc angulares particulas absorbentia & hebetantia ex oculis zæ, terra sigillata, spermate ceti, C. C. exhibent, quibus præmissis Perinæ abluunt spiritu vini, in quo vel aloë, myrrha, & J, succus chelidonii, vel unguentum Ægyptiacum fuerint dissoluta; ad separationem partis corruptæ à sana obtinendam, epithema ex u matricali, vel cataplasma imponunt ex scordio, absinthio, ruta, cicutaria, radice aristolochiæ rotundæ, & co in lixivio fortissimo & spiritu vini coctis, additis in fine aloë, myrrha. & aqua vitæ, vel ex calce viva,

& creta in aqua coctis lixivium parant, quo Perinæm fovere solent. Impetrata sic corruptæ patris à sana separatione, unguento Basilico vel Apostolorum suppurationem instituunt, & partem hanc mundatam non aliter, ac in ulceribus, carne & cute de novo investiunt.

§. 19. Prima nostra in depellenda Inflammatione huius partis cura est, ut omni opera annitatur id, quod ob crassum stagnat, resolvere & attenuare, ne inflammationis ad suppurationem tendat, & fermentatio, quæ in partibus his excitatur, inter succos stagnantes impediatur. In hunc finem conducunt interna sudorifera tum volatilia, tum fœta, item decoctum lignorum. Inter topica sequens raro te faller.

Summit. absinth. vorumar.

ruia aa. Mj.

Semin. cummin.

levistic. aa. ʒj.

ois Qi

\*ci aa. ʒib.

Incis. & comus, coq. in mulsa, vel vino Gallico, ad desecum vini ʒij, & panis biscotti. q. l. pro cataplasmate, quod imponatur calidè & quater in die de novo applicando repetatur. Vel:

Rad. Galang.

Irid.

bryon. aa. ʒb.

Herb. aneth.

Phelland.

Abrotan.

Menth. aa. Mib.

Bacc. lauri

Junip. aa. ʒij.

ois Qi

\*ci aa. ʒib.

Coq. in mulsa & aqua, & addito pane biscotto, & Cataplasma; vel cum u vini eliciatur essentia, cui addatur u vini camphoratus, & cum lintheo duplicato epithematis instar adhibeatur. Possunt & addi elixir vitæ, myrrha, & aloë, camphora, & itidem lintheis duplicatis sæpius applicari.

Inflammatione vero jam ad suppurationem tendente, factoque Abscessu, sequentibus utendum est remediis.

\*. Cap. alb. sub cinerib. coct. No. 21

Herb. malv.

bismalv. aa. Mib.

Summit. absinth.

centaur. min.

salv.

scord. aa. Mj.

Flor. Camomill.

melilot. aa. P. j.

ois Qi

\*ci aa. ʒb.

Cum hydromel. coq. ad consistentiam cataplasmati, addendo medull. panis alb. q. l. & Unguent. Basil. ʒi.

quod suppurationem maxime promovet. Vel u emplastrum desideras:

\*. Emplastr. de labdan. ʒj.

Unguent. Basil. ʒj.

Gumm. Ammon.

Sagapen. aa. ʒij.

Tacamahac. ʒj.

M.

Ad sanguinem attenuandum, acidum temperandum, & sic per consequens circulationem, quæ

Bbb

in partibus his imminuta est , promovendam, imprimis convenit elixir vitæ n.d. abscessui indicunt, vel sequens intus exhibeatur, quod constat ex volatilibus aromaticis. salibus, spiritibus, & oleis cum nonnullis alicalibus.

℞. Ocul. ʒ. pulv. ʒj.  
 ʒii diaphoret. ʒß.  
 ʒis absinth. gr. xiv.  
 Sperm. ceti ʒiß.  
 Elixir vitæ ʒi.  
 Theriac, campß. ʒß.  
 cephal. oleof. n. gr. x.  
 Vin. Hispan. ʒiiij.

F. *Mixtura*, cujus assumat æger cochlear unum & alterum, donec sudor emanare incipit, quod signum erit optimæ circulationis succorum, impedit & febrem, & alia symptomata, febris enim à perturbata mixtione & spissitudine succorum oritur.

In confinio hujus *Ulcetibus* ante omnia succi acres & viscosi stagnantes fluidiores & spirituosiores reddendi sunt. in quem finem conducunt varia volatilia sudorifera, imprimis sequens, vel simile decoctum.

℞. *Ligni sancti* ʒij;  
 salsæfr. ʒj.  
 Rad. salsaparill.  
 pimpinell.  
 enul. campß. aa. ʒß.  
 Herb. scord.  
 masturt. aquat. aa. Mj.  
 ʒis ʒi ʒj.

*Incis. coq.* in l. q. aq. & vin. & assumat æger in hoc potu ~um cephal. oleof. cum elix vitæ, rel dentur simul acidum temperantia ex oculis ʒ. ʒio diaphoret. & myrrh. Inter topica sequens commendamus. imprimis ubi ulcus fordidum est.

℞. Unguent. Apost. ʒß.  
 Extrah. inspissat. centaur.  
 Min. ʒiiij.  
 ʒci gr. x.  
 Elixir vitæ, vel  
 Essent. myrrh.  
 ~ Mastic. aa. ʒß.

M.  
 ℞. Rad. Gentian.  
 Angelic. aa. ʒß.  
 Herb. scord.  
 centaur.  
 absinth. aa. P. j.  
 Pulp. colocynth. ʒij.  
 ʒis ʒi.

℞ci aa. ʒj.  
 Coq. in vino Gallico aut Hispan. add. Elix.  
 vitæ ʒß.

M.  
 Vel:  
 ℞. Herb. trifol. fibr. Mj.  
 Scord.  
 Card. bened. aa. Mß.  
 Myrrh.  
 Alois aa. ʒiiij.

Coq. in vase bene clauso in l. q. Vin. Hispan. Colatur. ad ʒxv. add. Elixir. vitæ ʒß.  
 Applicetur quater de die & plumacolis tegatur.

Vel sequens:

℞. Essent. myrrh. ʒij.  
 Aloes ʒij.  
 Spir. vin. campbor.  
 ʒ. Regim. Ung. ʒj.  
 ʒis alkali, oder Bottaßch/ ʒiß.  
 Ocul. ʒ.  
 ʒii diaphoret.  
 Campbor. aa. ʒj.

M. & calide applicetur sæpius de die. In curatione *Gangræna* hujus partis semper respiciendum est ad causam occasionalem, & quia sæpe post inflammationem Gangræna oboriri solet, hinc omnia ea quæ obstructions tolerant, optima sunt, & internè & externè conducunt. Internè ergo sudorifera quæcumque volatilia conveniunt sæpius exhibenda. Inter externa præ aliis hoc in calu sequens conducet.

℞. Herb. Scord.  
 ruta.  
 absinth.  
 salu.  
 levistic. aa. Mß.  
 Phellandr. Mj.

Baccar. Laur.  
 Junip. aa. ʒij.  
 Sem. fœnic.  
 cumin.

anis. aa. ʒj.  
 Myrrh.  
 Aloes aa. ʒv.

ʒis ʒi,  
 ʒci aa. ʒij.  
 Nuc. Mosch.  
 Caryophyll. aa. ʒiß.

Superfund. ~ vin. opt. & extrah. Tinctura, ex residuo verò F. Cataplasma, quod adjecta camphora sæpius de die erit applicandum.

## CAPUT VII.

### De Umbilici Hernia, & Musculorum Abdominis Inflammatione.

#### §. I.

**P**ariter ac ossa situm suum mutant, molliorum quoque partium contiguitas aliquando dissociatione solvitur, harumque morbi in positu, prout dicunt, contingunt: vel quatenus saltem è loco suo ordinario ad aliam corporis partem transponuntur, & Hernias propriè dictas constituunt, vel quatenus planè extra corporis limites proscibuntur. Umbilicum modèstè protuberantem habere decorum est, indecorum verò, imò molestum, sæpe etiam periculosum, si ultra decorem & modum

promineat. Quæ locum duntaxat mutant, frequentius intestina sunt atque omentum, non semper ex laceratione Peritonæi, sed ejusdem etiam extensione; rariùs verò alia viscera prædicta elabuntur. *Spigelius de humani corporis Fabrica lib. 8. cap. 14.* refert; Herniam à liene contigisse, quod tamen inter rarò contingentia numerandum. Epar extra hypochondrium suum ad umbilicum procidisse, huncq; in tumorem notabilem elevari, in sæctu observarunt Auctores. Sic & vas deferens ad scrotum aliquoties delapsum



delapsum fuisse *Barbette Chirurg. cap. 7.* testatur. Spectat & huc illa Hernia à ventriculo, cuius *Hildanus p. 915.* mentioneminiijcit, item ab utero, à renibus, aliisque partibus de quibus videtur inflari omnium *Hildanus p. 893. Blegny de Arte Herniaria p. 1. S. 1. c. 5. & Zedici. Ann. 1681. p. 52.* & Caput superius de Hernia Intestinali & Orientali; hic vob tractamus de illa Herniâ, ubi viscera prolabantur ad Umbilicum, constituuntque *Omphalocelen*, Germanis en *Stafelbruch* dicitur & latus Umbilici Prominentia. Dilatatio, Excresecientia, Egressio, Procidencia, Intuinescentia, Tumor, Protuberantia, Exuberantia, Hernia Umbilicalis; sed ad quem usum quæso tot nomina? in rei clarè perceptibili imposuere veteres; Extraordinariâ tamen illa etiam aliquando supra umbilicum prodeunt, quale exemplum *Hildanus Cent 3. Observ. 64.* habet, vel in latere umbilici, quale quod *Platerus lib. 3. p. 78.* consignavit, vel supra & infra umbilicum simul, item ad lumbos, uti *Barbette. l. 2.* testatur, vel; quod tanquam singulare *Blegny* profert, in fœminis ad pudevindorum labia.

*Musculus Abdominis Inflammatio* Contingit etiam aliquando ipsis Musculis Abdominis Inflammatio, quæ cum regioni huic magnam creet molestantiam, & viscerum non modo æconomice incommodet, sed respirationi quoque sit obstaculo, eandem priori Umbilici Prominentiæ specialius subjungemus examinandam.

*§2. Partes affectæ sunt 2. Umbilicus, qui constat ex vasis umbilicalibus, ab Anatonicis recentioribus & veteribus ita dictis, quorum numerus in diversis animalibus varius est & diversus: umbilicus verò hominis constat una venâ, arteriis duabus & ligamento, quod vocatur urachus; nonnullis autem præter recentia adhuc Italia & Mesenterio orta ad; videntur, de quibus omnibus sigillatim videat. Cl. D. Biancardi Anatom. cap. de secund. p. m. 175.*

Partes af-  
fecta,

11. *Musculi Abdominis*, quorū à nonnullis, rectorum in quatuor difpencibus, octo, à plurius vèrò quinque recensentur paria, quorū primum est obliquè descendentium, secundum obliquè adscendentium, tertium, transversorum, quartum rectorum, quintum pyramidum, abs quibus omnibus pro faciliōri respiratione, fucorum in viferibus protrusione, & xcrementorum exelutione, abdomen varie constringitur, comprimitur, dilatatur, de quibus plura desiderantibus *Anatomicorum* scripta pervestiganda.

§. 3. *Differentias Umbilici Prominentiæ* desumunt Veteres à causis propinquoioribus, hinc quæ ab aqua oriuntur, Hydromphalos dicitur, quæ à flatibus, Pneumatomphalos, quæ ab intesti-  
norum prolapsu, Enteromphalos, quæ ab omni-  
tenti procidentia, Epiphiomphalos, quæ tandem à  
carne incremente, Sarcomphalos, quæ à lingui-  
ne fluido ibidem stagnante & collecto oriuntur,  
ridicule Hæmatomphalos appellatur.

§. 4. *Dignoscitur hæc Procidencia Umbilici,*  
& ab aliis ipsius tumoribus distinguitur, primo, quod Hærnia aquosa sit tumor laxior, & ad digitorum tactum non recedat, admodò candellæ pellucidius appareat, ac commotus fluctuationis sonum edat. (2.) Flatulenta digitis cædat, mox tamē redeat, percussa sonum edat ac in quocunque corporis situ eandem formam & molem re-

**Diagnosis**  
**Hernia**  
**Umbilicalis**

100

tineat. (3.) In carnofa durities major fit, quæ digitis nullo modo cedit, semperque eadem sub quovis corporis sui apparet, cum è contra Hernia vera molliem aliquam, non tamen aqueam, nec duritiem carnem habeat, ac in lupinis cedit.

Num vero Umbilici prolapsus ab intestinis, an ab omento exortus sit, concluditur, quòd ille mediocrem duritiem & majorem tensionem præferat, circa basin angustior sit, à spiritus colubitione magis intumescat, & ægro resupinato, maxime si manu prematur, cum murmur aliquo detumescat; hic vero, si ve omentalis, una in parte mollior, ac in altera, existat, adeoque si manibus eum quis contrectare velit, hæc elabatur, & pressus absque ulla strepitus subleat. Ut hæc omnia clarius appareant, adnotat fidele partes hæc sunt conspiciendæ. Ad Diagnosis quoque hanc magis illustrandam facit Cl. D. Stalpart Oberv. 33. Cent. 1. *Observatio*, quæ ita habet; Maria Theodori, viduæ Gerardi de Graf, fabri lignarii, anno ætatis 30. tertio partu Hæmia Umbilicalis nata, quæ triginta sequentibus annis, quo tempore præter alios illa undecim infantes peperit, ita crevit, ut anno 1681. adulti hominis caput magnitudinem longè superaret, adeo ut intestina hoc timore conclusa externa parte aptè sentiri possent. Maxime illa oppressam se sentiebat, cum nec flatus, nec feces per alvum emittere posset, ac ante 5. vel 6. annos usque adeo obstitata vivo erat, ut oculo versus inferiora transiret, per os erumperent excrementa. Cui malo illam variorum Clysterum usus denique exemit, Cumque ea erecto federet corpore, semioribus suis insubebatur hic tumor, vacuusque omnimodè venter erat, quamvis vinculis tumorem illud frenaret, quò referri potest Obs. Platei. lib. 3. p. 219. item Benivenii p. 144. c. 6.

*Musculorum Abdominis Inf.* <sup>1879-1880</sup> facile  
in sensus incurrit, & bene distinguendum, num  
hoc malum fuerit à lue Venerea, in qua omnes  
abdominis Musculos aliquando inflammatos  
obseruavi; sic & ab externa causa contusione,  
aplici, &c. facile oboriri potest, & saepe excor-  
iatione sequitur cuticula. Symptomata adunt  
rout in aliarum partium inflammationibus,  
-gr. tumor, calor, dolor pulsatorius, & color  
ruborem transmutatus.

§. 5. *Ætiologiam* morborum horum ita for-  
mat *Galenicus*, ut in *Umbilici Hernia* accu-  
situr nimium in *l'pueulis*, contentio-  
nem, retentionem spiritus & clamorem; in  
mulieribus verò nixum maximè inter parien-  
tum, quo tempore uterum, musculos abdomi-  
nis, & cutem umbilici extensos esse nòrunt, aut  
altum magnum: & has quidem causas esse  
efficientes, ad materiales autem re-  
ferte intestina peritonæo dilatata extra ab-  
domen egredientia, omentum, flatus, aquam  
ex his umbilicalibus pedetentim exsudantem, in  
cavitate umbilici collectam, & ibidem coacer-  
scant, & carnem in eadem cavitate excrescen-  
tem, aut aneurisma ex arteriis umbilicalibus re-  
surgens discitis pronatim.

Inter *Inflammationis* Musculorum *Abdominis* infas recescent tum sanguinem copiosiore, tum calorem in eodem accensum, tum agitationem & dolorem musculorum horum, sanguinem illum vel parum, vel aliis

humoribus, maxime biliosis commixtum attrahentem, uti vel in vulneribus, vel percussionibus, vel ulceribus, aliusve malis partibus hæc contingenter accidere solet.

*Paracelsus.*

§. 6. *Paracelsus* Herniæ Umbilicæ causam vel liquorem falis hujus partis resoluti in aquosa statuit, in aquosa verò præter salis resolutionem, inflationem siccam arsenicalem, ventumque quandam australem versus meridiem hanc anticrocosini fortiter flantem, & in carnosa liquorem nutritivum à vera membrana umbilicalis substantia separatum, & in excrescentiam hujusmodi transeuntem.

*Inflammationis Musculorum Abdominis* causam adscribit salis arsenicali ad musculos hos allapsum, & eosdem non modo in tumorem elevanti, sed tanquam ignea quadam vi dolorosè accendenti.

*Palmarum.*

§. 7. *Helmontius* in Hernia Umbilicali acculat nimiam statum intestinalium agitationem multiplici de causa excitatam, maxime ob tormina puerorum, hinc valde inflammantium, aut abdominis nimiam distensionem à diuturniori halitus retentione in conatibus vehementioribus suscitata. *Abdominis Musculorum Inflammationem* Archæo eorum ab occasionali quadam causa irritato & candescenti adscribere consuevit.

*Willisium.*

§. 8. *Willisius* in Umbilici Hernia ut causas admittit statim, aquam excrescentiam carnosam, intestina vel omentum ob peritonæum à causa violenta vel dilatatum, vel ruptum versus umbilicum collecta aut impulsam, & pelliculam istam umbilicalem in grandem aliquando tumorem distendendo propellenti.

*Inflammationis Musculorum Abdominis* originem sumere putat à sanguine crassiore in vasis musculorum horum diutius hærente, & iisdem tandem disruptis extravasato, & copiosius aggesto, uti facile ista sanguinis dispositio acquiri possit ob nimiam incalcescentiam, à potu calido, motu vehementiori, & subitanæ hanc sequentem refrigerationem diuturniorem, contusionem aut vasorum disruptionem per vulnera, aut alia quædam infortunia inductam.

*Sylvium.*

§. 9. *Sylvius* Herniam Umbilicalem à vehementi ventris compressione qualicumque, sive propter clamores, sive expulsionem fecum aut foetus in mulieribus institutæ pronasci posse profectur; *Musculorum* verò Abdominis *Inflammationem* à sanguine extravasato, & in iisdem corrupto, & incenso oriri sumit opinatur.

*Carrionum.*

§. 10. *Carrionum* videtur Umbilici Hernia produci à vehementi qualibet abdominis distensione, vociferatione, clamore, expulsionem, intestinorum nimia à potu ciboque repletionem, unde omentum ad exitum aut procidentiam hujusmodi propellatur, quam umbilici laxior religatio promovere solet, frequentius autem in gravidis prominentiam hanc ideo excitari dicunt, quod intestina repleta à foetu compulsa umbilicum ita premant, ut hac ratione probabatur.

*Musculorum Abdominis Inflammatio* iis provenit à succorum in arteriis incalcescentium stagnatione diuturniore, cui ansum præbere dicitur motum corporis nimium & incalcescentiam, unde salibus succorum volatilibus evanescentibus, crassiores ad motum minus pronæ remaneant, & tubulos obstruant, qui non nisi

matariam cælestem igneam admittant, quod à frigore succos ad quietem disponente, concussione canales & tubulos comprimente & lacerante, aut vulneribus eosdem dirumpentibus similiter fieri docent, cum extremitates corrugatæ succos detineant, & stagnare faciant, quapropter materiz illi subtili eadem actio, ut in priori statu, concilietur.

§. 11. *Me* iudice Hernia Umbilici rarissime oboritur à peritonæi rupturâ, frequentius verò ab ejusdem laxatione provenit, ad latera depressis musculis rectis, ob varias easque externas & internas causas, uti, verbi gratia, ex partu difficiliori Herniam hanc, præter experientiam *Hildani Cent. 3. Obs. 63.* & nos sæpius observavimus; sic & nuper in femina ex casu, quam & *Bartholinus Cent. 6. hist. 7.* ex colica notavit, & ab imaginatæ matris tonnatam *Scultetus Armeni. Chirurg. Obs. 60.* testatur, unde rectè *Barbette cap. 74.* docet, rarissime rumpi peritonæum, sequæ in aperitis, addit, cadaveribus non semel observasse ad demonstrasse, umbilicum cum infrequentibus intestinis protuberasse majori tumore, quam est viri caput, ita ut abdominis recti musculi hinc ad latera pressi, & à se invicem separati essent; externum tamen tantum erat peritonæum, nullibi autem ruptum. Peritonæum enim mirum in modum extendi ac dilati posse, lippisæ consoribus notum est, uti illud non duntaxat in hydropicis conspicitur, sed & eodem modo se res habet circa alias membranas. Sic nimirum maxima sit extensio membranz cerebri in hydrocephalo, nec non membranz scroti, ortis in eadem herniis, scrotum enim ad magnitudinem capitis humani extensum sæpius vidi. In venis quoque, arteriisque, in aneurismatibus scilicet & varicibus, quarum mirum in modum sæpe extenduntur membranz. Sic & per clamores, vomitus, tules, saltationes, fortiores status aut currum motationes, equitationes, tubarum inflationes, ponderis gravioris elevationes, internas musculorum abdominis in partem pressiones, duriorum sæcum expulsiones, externam ventris contra duriorum quandam materiam pressionem, peritonæi fieri posse dilationem nemo dubitet, peritonæum enim circa umbilicum tenuissimum est, ita ut per ejus expansionem intestina versus efformatam inclinent cavitatem, sicque Exomphalum producant. A colluvie itidem & stagnatione humorum circa umbilicum intestinum ileon laxato peritonæo à sede sua elabi, & tumorem produci posse, nos sæpe observavimus. Umbilicalis funiculus quandoque etiam dilatur, ceu constat experientiâ plurium Chirurgorum. Sic *Clariff. D. Blankardus de morb. pueror. observ. 9.* de mirando quodam & insolito pueri cujusdam ætate 1682, nati exomphalo, à cuius umbilico propendebat funiculus, qui longitudinem ulnæ quadrantis cum semisse, digitique minoris æquabat crassitiem, in cuius extremitate globulus quidam rotundus, qui duplicis pugni magnitudinem excedens, tenui obductus erat membrana, per quam motus intestinorum peristalticus optime animadverti poterat. Idem *Obs. 11.* ejusdem l. 1. meminit infantis, qui intestinis extra abdomen propendentibus natus erat, quia mater quodam ante partum tempore per placenta ob-

*Notum judicium de causa Hernia Umbilici.*

ohambulans felem viderat, cujus corpus curru quodam ita erat protritum, ut extra abdomen propenderit intestina. Simile exemplum observavit Cl. D. Stalpart. Obs. ravior. 33. Cent. post. Parturientibus quoque à vehementi spiritus cohibitione hernia umbilici oritur, rumpitur aut dilatur enim violentia peritonæum, & intestina prominentia tumorem pariunt. Maxime tamen affectus hic infantibus est familiaris, si quando umbilicus iis non retligatur, vel fortiter attrahitur, aut dum laxatur peritonæum in his delicatulis, & tumores ac flatus spatio se insinuant, ex ejulatu & tussi, abs quibus tenellum peritonæum aliquando etiam rumpitur.

Musculorum  
Abdominis  
Inflammationis.

Causæ Musculorum Abdominis Inflammationis sunt vel læsiones externæ, vel spina quædam interna, & sunt ut plurimum propter motum humorum circulantium impedimentum indeque ortam stagnationem. Læsiones externæ sunt contusiones & conqussationes. Per spinam internam intelligimus singulas particulas poris partium harum non conformes, quæ impediunt humores, ne recte circulentur, adeoque stagnatio fit circa musculos hos abdominis, in quibus autem partibus ejusmodi particulatum fit stagnatio, ibi oritur inflammatio.

Prognosis  
Hernia  
umbilicalis.

§. 12. Prognosis quod concernit, Hernia Umbilicalis est periculosus affectus, facile enim inflammatio & apostema eandem sequuntur, quæ mors ipsa excipit, quale exemplum non ita pridem observavit optimus senex Cl. D. Michael Angeiocrator, Collega meus colendus, in femina 56. annorum, quæ jam hernia umbilicali laborans à motu vehementiore incidit in colicam cum vomitu enormi omnium contentorum, ad quam curandam imposuit herniæ umbilicali ferreum operculum intensè calefactum, unde non tantum dolores reddebantur intensiores, sed & simul inflammatio circa herniam cum metu gangrænæ aderat, cui varia alibi fuere remedia, & quidem optima, sed frustra, circa herniam enim oritur abscessus, qui à Chirurgo aulico nostro Muttili aperiebatur, pus quod effluebat, erat maxime fetidum cum pinguedine, abscessus etiam spontè sunt rupti, ex quo magna quantitas puris & pinguedinis liquefactæ emanabat, tandem peritonæum unà cum omento & aliis adjacentibus partibus, intestinis nempe, inventa fuere nigra & sphacelata, accessit febris cum angina, vires de die in diem minuebantur, & sic matrona illa halitum ducere desuit. Si tamen malum fuerit adhuc recens & non adeo vehemens, aliquando curari potest. Curantur verò herniæ hæc facillimum in ipsis infantibus, difficilium in senibus, ita ut rariotibus rectè accenseat Hildanus, a herniosum seniore sanatum, utut ejus exempla nonnulla ibidem adducat; confet Hieronymum Fabricium ab Aquapendente. Facile etiam circa hernias hæc oriuntur fungosi & scirrhosi tumores, de quibus confet Zoasac. Gall. M. Ann. l. p. 119. Multis hoc malo afflicta lthalis tandem ileos supervenit, vel vomitiones diuturnæ, vel tabes, cæu ego novi exemplum. Si diuturna fuerit Umbilici Proventus, & sine dolore ad magnitudinem capitis infantis procreverit, frustra repulsiō tentabitur, & sine curatione per totam vitam geretur. Communiter tamen infantum hæc in parte eminentiæ faciliorem admittunt medelam, quàm adultorum, præsertim si gravia in his suble-

quantur symptomata, qualia sunt colicæ & illiæ passiones, vomitiones, &c.

Inflammatio Musculorum Abdominis quoque recentior est, eo faciliorem admittit curationem, quamvis eandem frequentius subsequatur abscessus multa apportans mala. Quandiu durat, tum respiratio insignie patitur impedimentum, & non sine dolore instituitur, tum succorrum in visceribus propulsio, & sæcum per intestina exclusio, quæ mediante musculorum horum motu peragenda sunt operationes, difficiliter procedunt. Sæpe ex interiori quodam abscessu materia purulenta per musculos hosce sibi exitum parans, huic inflammationi anam præbet, cuius curatio ut plurimum est desperata, quandoquidem intestina aut alia quædam viscera eo in casu sæpe sunt corrupta, quam inflammationem quoque quàm frequenter gangrænæ & tandem sphacelus ipseprehendunt. Ab externa quædam causa si fuerit introducta, & peritonæum cum obiectis visceribus planè exilati integrum, aut remediis idoneis apto tempore & prudenter adhibitis discutit, aut ad suppurationem promoveri potest, abscessusque non ita difficulter sanari, modò per vehementiorem contusionem plurimi musculorum tubuli & canales non fuerint destructi, & pus intus collectum, absque ulla corrosivitate exillat, mite & in omni puncto audabile.

§. 13. Dieta consistit in rerum illarum, sine Dieta quibus vita nostra commodè trahi nequit, legitimo usu, quem merito ægri attendere debent. Primò se offert Aer, vitandus est frigidus & humidus, nervis enim & membranis, simul & umbilico ac intestinis iniuriosissimus. Eligatur purus, amoenus, temperatus, nullis inquinatus nebulis, aliisque impuritatibus, fumosis enim aliusque, qui fermentationem excitare potest, hietiosis cane pejus & angue fugiendus.

Cibus cum suggerat succis nostris pabulum lacteum, sit boni succi, pro optimi lactis generatione. Vitentur actes, difficiles, paucique succi, ut sunt frigidi, aquosi, flautenti, crassi, leguminosi, incoctiles, salsi, panis non probè fermentatus, carnes fumo induratae, fructus asilvi, & omne ciborum genus, quod ventrem constipare & flatus inducere aptum natum est, ne umbilicus protrudatur, errores enim inequentes committi possunt in cibo. 1. Peccatum copiae, in voracitate & ingurgitatione. 2. Peccatum inopie, cum quis inedia laboret, & abstineat cibo, aut eo vescatur, qui non satis nutrit.

Potus, qui ut cibo magis necessarius est, ita potest plurimum nocere, quando non confert unquam. Potus sit in hietiosis cerevilia Brumavicensis vel alia optima, ab omni heterogeneitate saculentia acidæque libera, non nimis recens, nec acensens & inveterata, medicata etiam ex herbis traumaticis, vel oculis 63, maritata ulum habebit egregium. Sic & vinum modicè, imprimis Gallicum ac Hispanicum concedi potest, vel rubrum Germanicum, stomacho gratissimum. Potus verò Theæ, vel Coffæ, vel Choccoladæ, reliquis potulentis antefectendus in his malis. Caveatur frigidior, qui hietiosis aliquando funestus est, ut vitam extinguat subito, ut aliquot novimus exempla, inde enim succitantur obstructions, convulsiones & stagnationes lethales.

Movis quieti oppositus, moderatus & par-

cus suadendus, ut enim taceamus communes noxas in nostro casu, nil magis prolapsui intestinorum ac umbilici velificatur, quàm motus violentior; *Quies* ergo potius indulgendum est, quàm solâ herniosos curatos novimus, fugiantur verò equitatio, saltatio, cursus, elevatio & gestatio oneris gravioris, jaculatio. & quicquid musculos & ligamenta umbilicūque extendere & dirumpere valet, procul absit. A clamoribus & vociferationibus sibi maxime caveat, quæ omnia peritonæum tendunt, & gravius excitant malum.

*Somnus* cum functionum animalium quies sit, vires restituet & dolores mitiget, ægro commendatus esse debet, ut sufficiens sit. & sic alterna requies etiam umbilico quietem vel ipso decubitu concedat, vigiliæ productæ exulare debent.

*Excreta* assiduis respiciantur, & curiosè imprimis alvi munus cordi habeatur, ut non cesset, vel si id fiat admoneatur linientibus cremore Cæci, passulis, clystere, arcano duplicato &c.

*Animi pathemata* omnia dictamen sanæ mentis sequantur, vitet æger iram, quæ varias spirituum commotiones & dispersiones, sincerorumque coagulationes producit. Animus sui sit compos & placidus, pellat timorem, nec dolor adsit.

Inflammationis Musculorum Abdominis Diæta cum prædictâ fere convenit, & cum sæpius inflammationem tradiderimus diætam, hanc iterum hic repetere non libet, sed videri potest caput generale de Inflammatione.

*Galenicorum modus curandi Herniam Umbilicam.*

§ 14. *Curationem* Pharmacæutico-Chirurgicam *Umbilici Herniæ* ita aggrediuntur Galenicis, ut quodcumque prolapsum est, sive intestinum sit, sive omentum, reprimatur & in situm debitum retrudatur, præmissa emolitione per fœtus & unguenta; reposita verò ita detineri jubent, ne denuo prolabantur, medicamentis nempe adstringentibus tum internè sumendis, tum foris applicandis ex tragacantho, sanguine draconis, semine myrtillorum, mastiche, consolida, plantagine, pulveris forma exhibitus, & protuberantiæ impositis epithematibus ex decocto malicoræ, radicis consolide, thapontici, soliorum hederæ, cupressi, thure, myrrha, aloë, in vino austero, & emplastro ex iisdem cum bolo Armeno, succo hypocyssid. glutino tauri & pice navali, aut cera & oleo abietino, aut terebinthina susceptis, non omittis pulvinaribus ex linteis cum fasciâ, ut fortius à prolapsu coerceantur. In statu quo copia clysterum aut suppositorum usum non contemnunt, & locum protuberantem unguento Agrippæ, oleo laurino, anethino, &c. inungunt, vel fœtus ex camomilla, summittat. Anethi, baccis lauri, semine cumini, anisi, aut emplastrum de baccis lauri imponunt. Ad aquam Umbilici pelliculam propellentem ejiciendam aut absorbendam, fœtus aut cataplasmata approbant ex petroselino, apio, sulphure, nitro, cochleis confusis, stercore caprisso, vel tumorem inungunt unguento de archanitha, aut emplastrum ex gummi Ammoniaci, bdello, alumine, pice, terebinthina & cera compositum imponunt, quibus si aqua non consumatur, scalpello foramen efformant, per quod eandem effluere sinunt, & foramen emplastro diapalmæ aut alio quodam vulnerario iterum occludunt. Ab excrecentia carnosâ & aneurismate productâ herniam umbilicalem. ut incurabilem, vix solent attingere.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione*

Venæsectionem necessariam ducunt ad revulsionem in brachio, ad derivationem verò in pede, hinc refrigerantia propinant remedia, inter quæ decoctum hordei cum herbis endiviæ, rیحوتی, violarum, cum syrupo de rosâ simplici & violarum commendant, externè temperata apponunt ataplasmata, vel olea unguenta ex rosâ, ino omphacino, violarum, unguento santalino, aut vergente jam phlegmone ad suppurationem, emollientia apponunt, uti in reliquis apostematum generibus, & in tempore abscessuum iperitunt, ut materia purulenta exitum reperiat, ne diutius retenta per assumptam acrimoniam abdomen erodat, ad interiora vergat & viscera corumpat, post hæc non aliter, quàm in reliquarum partium abscessibus procedunt.

§ 15. *Paracelsus* in Umbilici *Herniâ* non aliam ab ea reliquit curationem, quam in olei herniis instituit, in aquosâ enim sequentia laudat remedia.

*Cura Paracelsi.*

℞. ficum lbj.  
Ol. granor. Junip. ʒiiij.  
farin. fabar. ʒvj.

F. Cataplasma super ignem, postea calidiuscule apponendum.

℞. Farin. fabar. lbj.  
Sem. psjll.

citon. aa. ʒj.

Consolid. maj. ʒiiij.

Vini & aceti q. l. ut fiat Emplastrum.

In Ventosâ curationem per pinguiâ viscosâ que maxime commendat, ex quibus sequens instar omnium esse potest.

℞. Visci abietini. ʒvj.

Mumia. ʒv.

Folior. ebulli. ʒj.

M. F. Catapl. quod imponatur.

In carnosâ resolutiva adhibet ex oleo anethi, lauri, benedicto, gummi potissimum sequens emplastrum.

℞. Olei lateris. ʒvj.

Oppopanac.

Gilbar.

Bdell. aa. ʒiiij.

Reduc ad formam liquidam cum sequenti additione.

℞. Farin. fabar. ʒiiij.

Ficum. N. iiij.

Capbura.

rute aa. ʒj.

F. in modum Emplastri.

Ad *Musculorum Abdominis Inflammationem* tollendam remedia ex lapide calaminari deprompta approbat, ubi verò in apostema abiicit, mundificantiâ adhibet, ut in reliquis Phlegmonibus facere consuevit.

§ 16. *Helmontius* in Umbilici *Herniâ* magnetem laudat, maxime dorsum ejus, quo emplastro & herniæ imposito intestina repelli & herniam decedere promittit.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione Helmontii*, quamcumque occasione Archæum irritantem amoveri vult, hinc sedativa remedia intus exhiberi & foris etiam idonea unguenta & emplastra applicari, quæ citò resolvi & tumorem valeant emollire.

§ 17. *Villius* in Umbilici *Herniâ* à flatibus orta omnia comendat carminativa internè & externè adhibita, potiones ex aqua fœniculi, anisi, menthæ, elientia carminativa, clysteres, linimenta cataplasmata & emplastra ex baccis lauri, camo-

camomillâ, cumino, sænogræco, anetho, rutâ, ladano, myrrhâ, mastiche, thure. In Aquosa humorem illum discutientibus, diureticis & diaphoreticis absumit, & cataplasinata ex farinâ fabarum, stercore caprillo & semine sinapi imponit, vel emplastrum ex cerâ terebinthinâ & gummi Ammoniac. In Carnosa ad extrescentiam istam assuendam internè spiritum salis dulcem exhibet. foris autem emplastrum diachylon cum gummi imponit. Ubi intestinum vel omentum prolapsa sunt, eadem reponere jubet, præmissis fotu emolliente & clysteribus non omisis, iis verò repositis emplastrum de pelle arietinâ, vel aliud contra rupturam imponit & omni modo prohibet, ne denuò prolabantur.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione* Venæsectionem approbat, nec diaphoretica contemnit, & foris idonea imponit cataplasinata, uti inflammatio requirit, & aliunde cognosci possunt.

Sylvii.

§. 18. Sylvii cura in *Herniâ Umbilicali* hæc est, ut intestina prius ab obstructione liberentur, & fæces eorum indurata clysteribus emollientibus ad exclusionem parentur, quo factò intestinum aut omentum in situm debitum reprimendo reponit, & ne ex eodem relabatur, emplastro ad rupturam ordinario & fauciis aptis studet præcavere.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione* adhuc incipiente ulterius ejusdem incrementum prohibet clysteribus, unguentis, fotibus & cataplasinatis emollientibus, ut & diaphoreticis internis acidum temperantibus, quæ si irritò conatu adhibeantur & inflammatio ad suppurationem tendat, ad hanc ipsam promovendam fortiora emollientia cataplasmatum formâ imponit, & eodem planè modo hic, ac in alias partes occupantibus inflammationis procedit.

Cassia.  
p. 1111.

§. 19. *Cassianum* consuetum est, in Umbilici *Herniâ* infantum eosdem à fletu retinere, & fasciam convenientem cum pulvinari comprimente supra umbilicum corpori circumducere, aut emplastrum ex oxycroceo aut pice super alutam extensum formâ rotundâ tun. ori, emplastro vero chartam densam similiter rotundam imponere, cum linteis quadruplicatis & fasciâ. In adultorum *Herniis Umbilicalibus* causas easdem excitantes & soventes remouent, siue status sint per carminativa abigendi, siue aqua diureticis internè datis, emplastro de baccis lauri cum stercore caprillo externè, evacuanda, siue alia quædam materia absumenda & emollienda emplastro de spermate ranarum cum mercurio, postea intestinum vel omentum deprimunt & in convenientem situm reponunt, emplastrumque ad rupturam, vel sticticum umbilico protuberanti admovent cum fasciâ. In gravidis iisdem emplastris ulteriorem prolapsum præcavent, & post partum ulteriori ejus curationi perficiendæ incumbunt.

*Musculorum Abdominis Inflammationem* curationi attenuationi succorum in tubulis musculorum rectorum vel transversorum stagnantium, & resolutioni quam maxime student, internè exhibitis diureticis & diaphoreticis scopo huic quam maxime dicatis. imprimis sequentem mixturam.

M. Ag. Chæresol. ʒj.

Heder. terrestr. ʒj.

petroselin. aa. ʒvj.

Hyperic. ʒß.

Ocul. ʒj.

Sperm. cet. ʒß.

ʒii diaphoret. ʒj.

ʒis succin. gr. vj.

Syr. Menih. ʒvj.

M. d. cochleatim.

Hac absumta ad guttas ʒo. vel 40. sequentem instillant Tincturam.

M. Tinctur. Hyperic. ʒiib.

bellid. ʒj.

M. d.

Cataplasmata quoque externè imponunt discutientia, uti sequens commonstrat formula.

M. Herb. menth.

absinth.

Chæresol.

eupator.

cicutar.

petroselin. aa. Mj.

flor. Camomill.

Jambuc. aa. ʒj.

rad. bryon.

cucum. asinin. aa. ʒiib.

sem. cumin. ʒij.

M. d.

Camphor. vj.

Cog. in V. in formam cataplasmatum, inflammationi repide imponendi.

Obstante verò succorum induratorum copîâ, ne fluorem redipilcantur, suppurationem promouent emollientibus, cataplasinatis ex rad. lil. alb. alth. cepis. herb. beta, branca ursina, floribus meliloti. camomillæ, ficibus, in aqua vel cerevisia coctis, additis farinis hordei, lini, sænogræci, oleo liliorum, bui yro & axungia anatis, vel unguento de althæa, aut basilico, nec non emplastro diachylon & demeliloto invicem mixtis, quorum administratione durante, interna diaphoretica repetunt, ut succi chylosi purulenti ad cutem propellantur, & abscessus externè potius, quàm internè rumpatur, apertura facta lancetta in loco protuberante, quo factò mundantia & tandem vulneraria balsama ulciculo insinuant & emplastrum de gratia Dei ad perfectam consolidationem imponunt. Rupto verò abscessu interius, materiam purulentam per urinam expellere satagunt sequenti ves simili mixtura.

M. Ag. Chæresol. ʒj.

Petrosel. ʒvj.

Lumbricor. ʒß.

Essent. agrimon. ʒij.

Tinctur. hyperic. ʒiib.

Myrrh. ʒj.

M. d.

Syr. Veronic.

Heder. terrestr. aa. ʒß.

M. d. cochleatim.

Pure satis evacuato, & urina alium referente colore, existenteque pellucidore, balsama exhibent vulneraria in jusculo intus sumenda, de Capaiba scilicet, vel Peruvianum album, aut pulveres ex oculis ʒ. pp. matre perlarum, myrrhâ, lapide hæmatite, succino & similibus paratos absorbentibus, abstergentibus & aliquantum conglutinantibus.

§. 20. Sicut due generales syntheseos sunt indicationes, ita eadem etiam in harum *Herniarum* cura attendendæ sunt; repositio scilicet, & retentio. Curantur enim me judice, tam per repositionem illius, quod è sede sua motum, quam per repositio-

Nistra cu-  
ra in Her-  
nia Umbi-  
lici.



# CAP. VII. DE UMBILIC. HERN. & MUSC. ABD. INFL. 385

In *Exempli*, vel *Enteromphali*, ubi laxato vel rupto peritoneo intestina in umbilicum prolabantur, qualis *Schenckio* micandis observatus fuit, curatione magna diligentia est adhibenda, nec temere statim aperiri debet protuberantia, facta enim apertione prouident & effunduntur intestina, maximo sæpe cum ægri malo, nonnunquam etiam morte indefubsequente, quemadmodum & ego his observavi. Confer *Paræum*. Quomodo hæc procidencia curanda sit, superius iam diximus.

Restat adhuc unica expedienda species, quam *Sarcomphalum* dicunt, live caro sit fungosa, live carcinomati similis. Facile à reliquis distinguitur, nam tumor durus est, nec preliis cedit, & ad nullum decubitus modum mutat. Ejusmodi umbilicum quatuor digitis à penis longitudinem prolongatum vidit *Bemvenius*. Fungus verò cum extra cutem sese nudum oculis nostris objiciat, primo mox intuitu cognoscitur. Rarum & admiratione dignam ejusmodi tricipitem fungosam excrescentiam literis consignavit *Fabr. Hildanus* *Cen. 5. Obs. 62. Bemvenius* ligatione curavit ejusmodi *Sarcomphalon* per anabrochilismum, carnem enim vinxit, singulis quoque diebus artius deligans non prius destitit, quam ea ipsa præmorta penitus excidisset. Idem fecit *Hildanus*, in fungo illo triplici, adhibitis quoque anodynis & decocto adstringente exterius. tandemque inspersit pro plenior cura pulverem adstringentem; quod si non sufficit hoc præsidium, removeri potest per caustica. Cum verò tenella ætas actualia non admittat, potentialibus sic dictis in iis extirpabitur, & sufficiet hunc in finem bolus Armenus cum alumine usto. Feliciter & quandoque sektione manu petiti artificis peracta removeri potest, Carcinoma verò majus incurabile est.

Eadem etiam ratione *Felix Platerus*, Felicis illius ex fratre Thoma Nepos, *Maniss. Observ. feliior. Olf. 4.4. p. m. 95.* Verrucam in muliere à latere Umbilici dextro, jam à longo tempore gracili radice pendulam extirpavit, jubendo Chirurgum, applicato prius circumcirca emplastro defensivo, serico fortissimè ligate. Hæc quidem ex ligatione mulier ab initio dolorem sensit vehementissimum, sed cum postea fuerit mitigatus, adhuc semel paulò inferius & fortius cum setis equinis, continuata semper defensivi applicatione, ligari jussit, unde valde intumuit cum rubore circa ligaturam, quod tamen id in crastinum censuit linquendum, tumore interea prope vincula incipiente nigrescere, sed dolore exquisito multum remittente, quare adhuc aliquandiu relinqui jussit, cum verus abdomen nullus apparuerit tumor, donec tandem dolore denovo invalescere ligaturam solvit, partique exulceratæ parum unguenti *Ægyptiaci* apposuit, ligaturâ autem soluta, excrescentia iterum detumuit colore mutata, & quum ægalisationem ferre non potuerit, Chirurgum jussit cauterium potentiale applicare, quo statim elchara fuit inducta & dolor mitior redditus, hinc paulò inferius lapidem infernalem absque omni ferè dolore operantem eundem in modum apponi curavit, quo circumcirca elchara enata

fuit, quâ itidem delapsâ idem opus adhuc semel repetere jussit, unde tribus post diebus excrescentia illa sponte decidit de filo adhuc pendens, quo abscessu totaliter separata fuit, substantiâ constans non propriè verrucosa, sed varicosa, venulis, nervis & glandulis perspersa.

In *Musculorum Abdominis Inflammatione* Cura incerta est dirigenda, ut stagnatio succo-flammæ-tionis detur, & inde facta obstructio tollatur, scelerum Abdominis, quod facili Marte obtinere possumus per interna æquè ac externa remedia. Interna egregia sunt, diaphoretica ex temperantium materia desumpta, ut sunt inventientia, quæ cum consistant in alcali seu volatili, seu fixo, seu puro, quod dicitur sal inactum, seu mixto, & quidem oleoso, pro materia agnoscunt omnia alcalia, & ea, quæ alcali quocumque prædita sunt. Ex alcalibus volatilibus conveniunt C. C. fulig. urin. &c. Ex fixioribus proficua erunt salia fixa, & diaphoreticum, ebur Philosophicè preparatum, saccharum si, camphora, aliaque plura, & volatile & osolum, ex sale volatili C. C. vel alio cum oleis aromaticis paratum. Exempli gratia:

℞. Si diaphoret. ʒiβ.  
Ocul. ʒss. pp. ʒβ.  
℞i absinth. gr. xxv.  
M. F. Pulvis.

Vel:

℞. ʒ. Card. bened. ʒviij.  
El. diacord. Fracast. ʒj.  
Sperm. cet. ʒj.  
Bals. nervin. ʒβ.  
~ theriacal. camphorat. ʒβ.  
F. Mixtura cochlearum fumenda.

Conveniunt quoque interne salia volatilia, & volatile osolum cephalicum D. VVedel. ~smatricalis, balsamus nervinus & similia. Inter Topica Spiritus matricialis cum camphora & Spiritu Ois & ci maritatus ferè omnem implet paginam, tepide cum linreis quadruplicatis applicatus, vel fiat cataplasma sequens.

℞. Sammit. absinth.

Herb. rui.  
Pheclandr.  
Fol. rorismarin. aa. Mj.  
Flor. Camomill.  
Sambuc. aa. Piβ.  
Sem. cumin.  
anis.  
carv. aa. ʒj.  
Ois ʒi ʒij.  
℞i ʒiβ.

Cog. in vino Gallico, vel mulsa, adde panis bisco. q. s. pro consistentiâ cataplasmati, quod sæpius de die tepide applicandum.

Musculi enim Abdominis tractandi sunt ut aliz partes membranose, copiosis enim venis & arteriis, imo nervis & fibrillis, quæ sunt fila quædam oblonga tenuissima, præditi sunt, hinc expolscunt nervina ac roborantia, quare calidiora applicanda sunt, quæ impediunt causam inflammationis, tollendo obstructionem in vasis musculorum factam. Spiritus vini camphoratus cum spiritu florum sambuci & aquâ calcis vivæ sæpe sufficiunt.

FINIS LIBRI TERTII.

Ccc

JOH.

# JOH. DOLÆI ENCYCLOPÆDIÆ CHIRURGICÆ RATIONALIS.

## LIBER IV.

### DE MORBIS PARTIUM GENITALIUM UTRIVS. QUE SEXUS.

#### CAPUT I.

#### DE MORBIS GENITALIUM IN VIRIS,

& quidem

*De Testium Tumore, seu Inflammatione, Ulceribus, Erosione,  
& Contusione.*

§. I.

**M**edicinam exercere, esse intueri misericordiam humanam, Sapiens quidam verè pronuntiavit. Quot enim quæso morborum genera, quibus mortales quotidie occupantur, Medicis se non sistunt in dubiis quandoque eventus certamen? Audias modò vicum sanum, & feminam incolumem; intra quadrantem horæ corripiturque morbo, interdum is in partibus, quas tegere honestas præcipit, & quarum ratione unius sexus persona ab altera discernitur. Sed cum tam enormiter sæpe etiam hisce suis membris peccare soleant homines, carnis cupiditatibus nimium indulgentes, non mirum est, si à iustissimo Deo peridem, per quod tanta audacter peccant, tam graviter puniantur. Hinc tot morborum partes hæc invadentium emergunt agmina, diversorum generum, specierum, & differentiarum. Corripunt enim peculiare morbi masculos, peculiare etiam feminas, quos ordine nunc exposaturi, initium faciemus de morbis partes genitales in viris occupantibus, & quidem hoc in capite Morbos Testium examinando.

*Testium  
Tumor.*

*Inflam-  
matio.  
Testiculorum  
Venereorum.  
Hernia Ve-  
neris.*

Inter affectus autem atrocissimos, & qui luem comitari solent Veneream, Tumor est Testium, quandoque inflammatorius, qui nihil aliud est, quam extensio vasorum seminalium, aliorumque tubulorum, à succis ibidem stagnantibus oborta; nonnunquam Inflammatio cum rubore & dolore atrocissimo adeit conjuncta. Dicitur & aliquando Testiculus Venereus, Hernia Venereus, Germanicè Sand-oder Venus-Balle / à gravitate testiculi ita dicta. Hujusmodi casum Celeberr. D. Paulini, Amicus noster singularis, in Ephemer. recenset. Faber enim ferrarius in Saxonia Anno 1676. rem cum puella menstruata ebrius habuit, ex quo impuro ac illicito concubitu altero die horrendo dextri testiculi tumore correptus est cum sævissima in-

flammatione, ventris, femorisque, sinistri præsertim. insigni dolore, cui tandem accessit febris, & jam corperat testis nigrescere; qui tamen tumor diaphoreticis internis exhibitis, & externis topicis feliciter sanatus est. Inflammatio Testium verè nihil aliud est, quam obstructio vasorum & tubulorum Testium vel sanguinea, vel lymphatica, imò quandoque spermatica, dum in his vasis sanguis, vel lymphæ, vel sperma, diutius hærent, & eandem obstruunt, hinc motus succorum horum progressus impeditur, & intestinus augetur.

Si Fungosa Excrecentia, vel tumor nodosus Testiculus adnatus fuerit, dicitur Sarcocele, vel Hernia carnea, Germanicè, Gleisbruch / item Hernia varicosa, seu Cirröcele, Germanicè Uderbruch / & Scrotum, nilque aliud est, quam extensio, & aliquando ruptio vasorum Testiculorum, qui tum tumorem excitant; de qua Hernia in proxime præcedente libro verba jam fecimus. Oscheocelen mirandam monstrant Eph. G. Dec. 2. Ann. 7. obs. 242. & 243.

Ulcus Testiculorum est solutio unitatis vasorum spermaticorum, ab acerbis succis in testiculis stagnantibus, tubulos seu canaliculos glomeris Testiculorum corrodentibus ac dicindentibus.

Erosio differt tantum gradu ab ulcere, quia Erosio, membrana testiculorum duntaxat ab acerbis illis, & salinis succis eroduntur.

Contusio Testiculorum est vasorum ac canaliculorum compressio, & sæpe dilaceratio à causa externa violenta oborta.

§. 2. Pars afflicta sunt Testes, quo nomine Pars afflicta abdomen in scroto propendentes, vel quod virilitatis testimonium præbeant, vel quod nullis apud Romanos testari liceret, nisi quibus testes essent, & sexus forent masculus.

masculini. Numero hini sunt Testes, raro unus, quem tamen in filiole Praefecti, & Studiosi Misitico virilitatem satis probante notavit Cl. D. *Vedelius Eph. Germ. Ann. 2. Obs. 136.* rariùs tres, quorum tamen aliqua exstant exempla, quæ allegata odiosa essent; sic in Monacho quodam tres observavit *Borellus*, & in aliis aliis, ut *Roges* & plures Auctores testantur. Testiculorum substantia glandulosa est, sive minutissimorum vaticulorum congeries, semen sequestrantium ex massa sanguinea, quæ si absque ruptione dissoluta sibi invicem conneckerentur, facile 20. ulnarum longitudinem excederent, cœ cum aliis Anatomicis observavit *Celebert. D. Francus* Professor Heideb. Amicus noster singularis: hinc optime comparat glomeri filorum (*cinem Klingel Barn*) quia eodem modo desiliari potest. Vasa habent Testes omnia, sanguifera, venosa ac arteriosa, item lymphatica, seminifica, nervæ, &c.

*Diagnosis.* §. 3. *Tumoris*, seu *Inflammationis* Testium Signa eadem sunt, quæ aliarum partium inflammationum, ut rubedo, calor, dolor, & partes vicinæ propter obstructionem adeo distenduntur, ut in immensum sæpe extendantur tumorem, cœ *Ephem. Germ.* videri potest exemplum. Ordinariò bis Testiculum solum magnitudine superat tumor, sæpe acerbissime dolet, qui dolor aliquando est pulsatior, interdum pungens, nonnquam misere contundens & distendens, atque cum acerbis cruciatu ad lumbos usque protenditur, dolor enim non potest non esse maximus, dum omnes fibrillæ extenduntur, & minutissimæ rumpuntur, quæ inter rumpendum commotionem in anima excitant, & sic ejusmodi incommodum producit, ut judicet, quòd dolor ad sit. Scrotum sæpe in isto latere & ipsam tumet & rubet, ipsa lumborum regio fervere videtur, à stagnatione istarum particularum interdum durities adeit instar lapidis.

Signa *Ulceraum*, *Erosionum* & *Contusionum* ex ipsa inspectione noscipoſsunt, adeit aliquando hæmorrhagia & dolor vehemens, ob membranosa has partes valde sensibiles læsas: in *Ulcere* pus effluit album, in *Erosione* magis excoariorum externarum membranarum conspicitur, in *Contusione* livor apparet, ut quotidie observatur in aliis externis partibus contulis.

*Ætiologia secundum Galenicum.* §. 4. *Causas* horum affectuum ut intimius pernoscamus, variorum colligemus sententias, ex quibus primi in medium procedant *Galenici*, qui de hiis mentem suam exponentes, asserunt, *Tumoris Testium* originem esse ab humoribus pravis in substantia Testium, sive tunicis eorum collectis ex superfluitatibus alimenti, & propter imbecillitatem facultatis Testium concoquantis, & expellentis, tum propter innatam illis laxitatem, aut cavitatem in usangultiam, & aliarum partium expultricem validiorem, humores ejusmodi excrementitios majori copia ad partes has debiles transmittentem, vel à testibus etiam calidioribus humores istos aliunde attrahi fingunt. Pro diversitate humorum istorum diversas etiam Tumorum species produci referunt, si enim sanguis majori copia affluerit, Inflammationem suscitari dicunt, si bilis, tumorem erysipelaceum, si pituita, ordematolum; à semine spermaticum, à fluitibus statulen-

tum, à sero serofum. Abundantiam verò humorum istorum in toto corpore existentem, materiamque præbentem tumoribus præsentibus colligi statuunt ab excessu in cibo & potu multum sanguinem generante, vel pravi iucci similes humores in corpore producente, dein usu Veneris immodico, unde Testes nimium incallescant, & calefacti humores attrahant, vel ejusdem nimia abstinence, & semine inde contra consuetudinem diutius retento; quod paulatim congregatum testes distendat & tumorem excitet, remediis aut rebus quibusdam externis testibus admotis, & intemperiem vel calidam, vel frigidam, vel humidam illis inducentibus, aqua frigida vel excessivè calida in balneis, nimia partium harum frictione, cauterio actuali quacumque de causa adhibito humores ad testes attrahi opinantur. In hydropticis ob nimiam excrementi seroli redundantiam aliquando distillationem hujus fieri dicunt ad testes & scrotum, abs quo suscepto deinde valde distendantur & intumescant. Cum verò sanguis reliquis humoribus longè sit calidior, & proinde magis fluidus, cum etiam frequentius ad partes hæc influere putant, & *Inflammationem* excitare, rubore, calore & dolore pullante in partibus sicut tenellis satis peripicuam.

*Ulceraum & Erosionum Testiculorum* causas acculant humores acres erodentes, vel in testiculis ipsis male passæctis tales pronatos vel aliunde tales ad ipsos allabentes, nec non instrumenta caustica seroto ac testibus adhibita, non modo partes hæc dissolvunt, sed humorum quoque affluxum allicientia, & eosdem acriores reddentia.

*Contusiones Testium* à rebus externis durioribus infligi possunt, dum ictu, vel lapsu & contusione, vel jactatione & explosione instrumenti bellici impetuosius iisdem admoveantur, quas etiam à fortiori manuum compressione per nequiciam aut malitiam instituta contingere posse nolunt negare.

§. 5. Priores proximè sequens *Paracelsus* existimat *Tumoris & Inflammationis* Testium *Paracelsi* originem adscribi posse corruptæ olei constellationi, quam tota regio olei non modo persentiat, sed sydus ejus internum Testes influenza sua attingens eosdem etiam inflammare. In lue Venerea Testes ut variis morbis, ita etiam tumoribus affici posse censet, eo quòd liquor eorum nutritivus corruptus in ulcera abeat imperfecta, & tumorem producat. Sic *Cambucam* partibus hiis obvenire statuit, sive tumorem post actum Venereum in iisdem exurgere cum calore, & in urinâ saniem aliquando cerni, quem provenire vult ex bubonis materia, quæ citius, quàm oportuit, ledem fixit, nec eandem nisi propter locum à bubone disferre.

*Cambucam* tandem in *Ulcerationem* corrasum transire dicit, dum saliva luxuriosa partem erodant & foramina in ea efforment, quæ ulceratio subsequens in unum exeat & putrefactionem inducat.

*Contusionem* Testium à re externa violenta Testes attingente, ut lapsu in rem duram, quo testes offenduntur, percussione, compressione, &c. produci posse, aliis libenter elargitur.

§. 6. Sequitur *Hæmatismus*, qui Testium *Hæmatismus*.

# JOH. DOLÆI ENCYCLOPÆDIÆ CHIRURGICÆ RATIONALIS.

## LIBER IV.

### DE MORBIS PARTIUM GENITALIUM UTRIVSQUE SEXUS.

#### CAPUT I.

#### DE MORBIS GENITALIUM IN VIRIS,

& quidem

*De Testium Tumore, seu Inflammatione, Ulceribus, Erosione, & Contusione.*

##### §. I.

**M**edicinam exercere, esse intueri miseriam humanam, Sapiens quidam verè pronuntiavit. Quot enim quæso morborum genera, quibus mortales quotidie opprimuntur, Medicis se non sistunt in dubiis quandoque eventus certamen? Audias modò virum sanum, & feminam incolumei; intra quadrantem horæ corripiturque morbo, interdum iis in partibus, quas tegere honestas præcipit, & quarum ratione unius sexus persona ab altera discernitur. Sed cum tam enormiter sæpe etiam hisce suis membris peccare soleant homines, carnis cupiditatibus nimium indulgentes, non mirum est, si à iustissimo Deo per idem, per quod tam audacter peccant, tam graviter puniantur. Hinc tot morborum partes hæcè invadentium emergunt agmina, diversorum generum, specierum, & differentiarum. Corripunt enim peculiares morbi masculos, peculiares etiam feminas, quos ordine nunc exposaturi, initium faciemus de morbis partibus genitalibus in viris occupantibus, & quidem hoc in capite Morbos Testium examinando.

*Testium Tumor.* Inter affectus autem atrocissimos, & qui luen comitari solent Veneream, *Tumor* est *Testium*, quandoque inflammatorius, qui nihil aliud est, quam extensio vasorum feminalium, aliorumque tubulorum, à succis ibidem stagnantibus oborta: nonnumquam *Inflammatio* cum rubore & dolore atrocissimo adeit conjuncta. Dicitur & aliquando *Testiculus Venereus*, *Hernia Venerea*, Germanicè *Sand-oder Venus-Balle* / à gravitate testiculi ita dicta. Hujusmodi casum Celeberr. D. Paulini, Amicus noster singularis, in *Ephemer.* recenset. Faber enim ferrarius in Saxonia Anno 1676. rem cum puella menstruata ebrius habuit, ex quo impuro ac illicito concubitu altero die horrendo dextri testiculi tumore correptus est cum gravissima in-

flammatione, ventris, femorisque, sinistri præsertim, insigni dolore, cui tandem accessit febris, & jam cœperat testis nigrescere; qui tamen tumor diaphoreticis internis exhibitis, & externis topicis feliciter sanatus est. *Inflammatio* Testium verè nihil aliud est, quam obstructio vasorum & tubulorum Testium vel sanguinea, vel lymphatica, imò quandoque spermatica, dum in his vasis sanguis, vel lymphæ vel spermæ, diutius hærent, & eandem obstruunt, hinc motus succorum horum progressus impeditur, & intestinus augetur.

Si *Fungosa Excrecentia*, vel tumor nodosus Testiculis adnatus fuerit, dicitur *Sarcocoele*, vel *Hernia carnea*, Germanicè, *Steisbruch* / item *Hernia varicosa*, seu *Circocele*, Germanicè *Uderbruch* / & *Scrotum*, nilque aliud est, quam extensio, & aliquando ruptio vasorum Testiculorum, qui tum tumorem excitant; de qua *Hernia* in proximè præcedente libro verba jam fecimus. *Osteocele* mirandam monstrant *Eph. G. Dic. 2. Ann. 7. obs. 242. & 243.*

*Ulcus* Testiculorum est solutio unitatis vasorum spermaticorum, ab acerbis succis in testiculis stagnantibus, tubulos seu canaliculos glomeris Testiculorum corrodentibus ac diducendentibus.

*Erosio* differt tantum gradu ab ulcere, quia *Erosio*, membrana testiculorum duntaxat ab acerbis illis, & salinis succis eroduntur.

*Contusio* Testiculorum est vasorum ac canaliculorum compressio, & sæpe dilaceratio à causa externa violenta oborta.

§. 2. *Pari afflicti* sunt *Testes*, quo nomine *Pars afflicta* indignantur partes illæ genitales, extra abdomen in scroto propendentes, vel quod virilitatis testimonium præbeant, vel quod nullis apud Romanos testari liceret, nisi quibus testes essent, & sexus forent masculus.

masculini. Numero hini sunt Testes, raro unus, quem tamen in filio Praefecti, & Studiosi. Misitico virilitatem satis probante notavit Cl.D. *Vvedelius Eph. Germ. Ann. 2. Obs. 136.* rariùs tres, quorum tamen aliqua exstant exempla, quæ allegata odiosa essent; sic in Monacho quodam tres observavit *Borellus*, & in aliis aliis, ut *Reyes* & plures Autores testantur. Testiculorum substantia glandulosa est, sive minutissimorum valculorum congeries, semen sequestrantium ex massa sanguinea, quæ si absque ruptione dissoluta sibi invicem connecterentur, facile 20. ulnarum longitudinem excederent, cum cum aliis Anatomicis observavit *Celebert. D. Francus* Professor Heideib. Amicus noster singularis: hinc optime comparat glomeri florum (*einem Kinkel Barn*) quia eodem modo deflari potest. Vasa habent Testes omnia, sanguifera, venosa ac arteriosa, item lymphatica, semina, nervea, &c.

*Diagnosi.* §. 3. *Tumoris*, seu *Inflammationis Testium* Signa eadem sunt, quæ aliarum partium inflammationum, ut rubedo, calor, dolor, & partes vicinæ propter obstructionem adeo distenduntur, ut in immensum sæpe extendantur tumorem, seu *Ephem. Germ.* videri potest exemplum. Ordinariò bis Testiculum solum magnitudine superat tumor, sæpe acerbissime dolet, qui dolor aliquando est pulsatorius, interdum pungens, nonnunquam miserè contuens & distendens, atque cum acerbis cruciatu ad lumbos usque protenditur, dolor enim non potest non esse maximus, dum omnes fibrillæ extenduntur, & minutissimæ rumpuntur, quæ inter rumpendum convulsio nem in anima excitant, & sic ejusmodi incommodum producit, ut iudicet, quod dolor adfit. Scrotum sæpe in isto latere & ipsum tumet & rubet, ipsa lumborum regio fervere videtur, à stagnatione istarum particularum interdum durities adeo instat lapidis.

Signa *Ulceraum*, *Erosionis* & *Contusionis* ex ipsa inspectione nosci possunt, adeo aliquando hæmorrhagia & dolor vehemens, ob membranosas has partes valde sensibiles læsæ: in *Ulcere* pus effluit album, in *Erosione* magis excoctio externarum membranarum conspicitur, in *Contusione* livor apparet, ut quoti die observatur in aliis externis partibus contusis.

*Ætiologia secundum Galenios.* §. 4. *Causas* horum affectuum ut intimius pernoſcamus, variorum colligemus sententias, ex quibus primi in medium procedant *Galenici*, qui de hiis mentem suam exponentes, asserunt, *Tumoris Testium* originem esse ab humoribus pravis in substantia Testium, sive tunicis eorum collectis ex superfluitatibus alimenti, & propter imbecillitatem facultatis Testium concoquantis, & expellentis, tum propter innatam illis laxitatem, aut cavitatem in iis angustiam, & aliarum partium expultricem validiorem, humores ejusmodi excrementitios majori copia ad partes has debiles transmittentem, vel à testibus etiam calidioribus humores istos aliunde attrahi fingunt. Pro diversitate humorum istorum diversas etiam Tumorum species produci referunt, si enim sanguis majori copia affluerit, Inflammationem suscitari dicunt, si bilis, tumorem erysipelaceum, si pituita, œdematosum; à semine spermaticum, à fluxibus statulen-

tum, à sero serofum. Abundantiam verò humorum istorum in toto corpore existentem, materiamque præbentem tumoribus præsentibus colligi ita vult ab excessu in cibo & potu multum sanguinem generante, vel pravi iucci similes humores in corpore producente, dein usum Veneris immodico, unde Testes nimium incallescant, & calefacti humores attrahant, vel ejusdem nimia abstinentia, & semine inde contra consuetudinem diutius retento; quod paulatim congregatum testes distendat & tumorem excitet, remediis aut rebus quibusdam externè testibus admotis, & intemperiem vel calidam, vel frigidam, vel humidam illis inducentibus, aqua frigida vel excessivè calida in balneis, nimia partium harum frictione, cauterio actuali quacumque de causa adhibito humores ad testes attrahi opinantur. In hydropicis ob nimiam excrementi serosi redundantiam aliquando destillationem hujus fieri dicunt ad testes & scrotum, abs quo suscepto deinde valde distendantur & intumescant. Cum verò sanguis reliquis humoribus longè sit calidior, & proinde magis fluidus, eum etiam frequentius ad partes hæc influere putant, & Inflammationem excitare, rubore, calore & dolore pullante in partibus hiis tenellis satis peripicuum.

*Ulceraum & Erosionum Testiculorum* causas acculant humores acres erodentes, vel in testibus ipsis male affectis tales pronatos vel aliunde tales ad ipsos allabentes, nec non instrumenta caustica scroto ac testibus adhibita, non modò partes hæc dissolvunt, sed humorum quoque affluxum allicientia, & eosdem aciores redditura.

*Contusiones Testium* à rebus externis durioribus infligi possunt, dum ictu, vel lapsu & contusione, vel jaculatione & explosione instrummenti bellici impetuosius iisdem admoveantur, quas etiam à fortiori manuum compressione per inequitiam aut malitiam instituta contingere posse nolunt negare.

§. 5. Priores proximè sequens *Paracelsus Paracelsus* existimat *Tumoris & Inflammationis Testium* originem adscribi posse corruptæ olei constellationi, quam tota regio olei non modò persentiat, sed sydus ejus internum Testes influencia sua attingens eosdem etiam inflammare. In lue Venerea Testes ut variis morbis, ita etiam tumoribus affici posse censet, eò quod liquor eorum nutritivus corruptus in ulcera abeat imperfecta, & tumorem producat. Sic *Cambucam* partibus hiis obvenire statuit, sive tumorem post actum Venereum in iisdem exurgere cum calore, & in urinâ saniem aliquando cerni, quem provenire vult ex bubonis materia, quæ citius, quàm oportuit, sedem fixit, nec eandem nisi propter locum à bubone disferre.

*Cambucam* tandem in *Ulcerationem corrosivam* transire dicit, dum salia luxuriosa partem erodant & foramina in ea efforment, quæ ulceratione subsequens in unum exadat & putrefactionem inducat.

*Contusionem Testium* à re externa violenta Testes attingente, ut lapsu in rem duram, quo testes offenduntur, percussione, compressione, &c. produci posse, aliis libenter elargitur.

§. 6. Sequitur *Helmontius*, qui Testium *Helmontius*

Ccc 2



*Tumorem & Inflammationem* attribuit Archæo Testium irritato à re quadam molesta in semine vel latice contenta, unde officii sui immemor laticem feminalem non rectè distribuat, sed eundem cum cruore in Testibus cumulari permittat, ex qua coacturata tumor emergit, tandem molestiæ istius impatiens, eandem expellere conetur, & in nisu isto seipsum accendat, sicque *Inflammationem* subsequi in Testibus & tumorem cum pulsu duro, dolore & calore qualem irritationem in lue Venerea à fermento venenoso per coitum impurum communicato sæpius excitari opinatur.

*Ulcera & Erosiones* Testium ab acido quodam in latice contento, & ab hoc interdum ipsi semini communicato produci, laticem verò aliquando à fermento isto venenoso luis Venereæ corrumpti suspicatur, qui ad Testes perveniens & in iisdem diutius hærens eos erodit & destruat.

A rebus externis variis diversimodè Testes *contunduntur* posttereliquis facile largitur.

*W. illisim.*

§. 7. Medium in consensu hoc locum occupans *V. Villisus* in hanc inclinat sententiam, exoriri *Tumores & Inflammationes Testiculorum* à materia spermatica crassiore ductus eorum obstruente, in quibus cum diutius hæreat, particula salis & sulphureæ cum spiritibus effervescant & *Inflammationem* excitent, donec subtilioribus absintitis crassiores & terrestres relinquantur, quæ temporis tractu aggregatæ ingentem aliquando in testiculis excitent tumorem.

*Exciderari & erodi* ipsos hosce Testiculos credit à salinis particulis in materia illa obstruentionem inducente existentibus copiosioribus, fibras ductuum istorum in Testibus corrosivitate sua dissolvuntibus.

*Contusionem* Testium fieri à re quadam externa dura, & violenter testes attingente, cum cæteris proficitur.

*Sylvium.*

§. 8. Anglis hæc succedit Batavorum Apollo de le Boe *Sylvius*, cuius sententia est, *Tumorem & Inflammationem* Testibus induci à sanguine & lymphâ in vasis testium stagnantibus, quorum consumptis partibus volatilibus salinæ crassiores resistent, & aggregatæ tumorem suscitent, adeoque materiam feminis non satis elaboratam huic morbo producendo aptam esse iudicat, semen enim ex spiritibus animalibus cum parte sanguinis magis salis concentratis produci putat, eaque propter à vi etiam externa fieri posse annuit, ut nervi aliaque vasa lædantur, & hinc varii succi confundantur, spiritusque dispareant, unde tumores & inflammationes faciliè subsequantur.

Testium *Ulcera* ab acido acri ex lymphâ stilante suscitari putat, & *Erosiones* à salinis particulis itidem acribus & continuitatem testium hinc inde dissolvuntibus.

*Contusionem* Testibus obtingere fatetur ab externis rebus impetuosius in easdem irruentibus ex lapsu, ictu, jaculatione, explosione globorum ex instrumentis bellicis, aut alio modo eos fortius comprimentibus, & structuram eorum destruentibus.

*Carrisa-*  
*nos.*

§. 9. *Carrisiani* de causis morborum horum interrogati respondent, *Testium Tumorem* induci ex stagnatione diuturniori succorum, potissimum materię spermaticę in vasculis Testium, & hinc firmiori condensatione, abs qua canales isti obstructi novæ alluenti transitum concedere ne-

quant, sed eandem similiter subsistere cogunt donec à magna ejus collecta copia nimium distendantur & Testes intumescant. Facile autem fieri posse credunt, ut post gonorrhæam, præsertim virulentam, citò nimis inhibitam materię feminali corruptæ via consuetâ obstruatur, quæ è proflatis per venas cum sanguine revertatur in arterias, atque ex iisdem denudò ad Testes perveniens, cum veneno Venereo ibidem commisceatur, sicque excitata effervescentiâ vasa intumescant, & pori eorum succorum in iis contentorum ita transmutentur, ut sola materia subtilis ignea absque globulis secundæ & tertiæ elementi per eos intrans succos eo modo exagitet, ut particule eorum lanceolatæ acutæ vehementius commotæ fibrilas pungant, lancinent & nimium distendendo rumpant, unde non modò tumor, sed dolor ingens cum rubore & pulsu ob compressas arterias exurgat, quibus motu *Inflammatio* se manifestet, tandem verò motu isto intestino vehementiori absintibus aut depressis particulis porosis subtilioribus, at angularibus cum ramosis, ovalibus, reliquisque invicem proximè accedentibus & quiescentibus, succos ita incrassari, ut tumor scirrhosus inde emergat.

Pro diversitate particularum istarum acutarum vasculorum fibras dirumpentium, vel *Ulcus* vel *Erosionem* in Testibus produci opinantur: si enim congeries quædam particularum istarum uno in loco fibras distendere & tandem dilacerare pergat, ut succi effusi, quibus simili figura præditæ particule assiduò communicantur, in lacu seu sulco quodam majori commoventur, ulcus existere indignant, quando verò particule tenuissimæ fortiter acuminatæ huc illuc à vehementiori quadam succorum effervescentia dispersæ in pluribus locis canaliculorum fibras extremas divellant, angustiores hujusmodi continui solutiones, quæ Erosiones communiter appellantur.

*Contunduntur* nonnunquam Testes cum aliis observantur ex infortunio quodam, dū homines lapsi ad rem duram regionem Testium offendant, aut vehementiori & diuturniori equitatione partes illas ita succutiant, ut ex fortiori ista compressione fibræ distorqueantur, vel dissolvantur, & hac ratione aut angustati tubuli succis transitum denegent, aut dilacerati eosdem plane effundant, unde graviora interdum accerantur symptomata, & gangræna vel sphacelus sæpe sit in propinquo. Quibus causis etiam ictum aut percussione, vel offensionem à globulo ex instrumento bellico exploso productam, aliasque res violentas volunt adfocari.

§. 10. Me iudice *Tumor Testium* seu *Inflammatio* oritur non aliter, ac aliarum partium, *judicium de causa Testium tumoris & inflammationis*, à stagnatione sanguinis ac succorum Testium vasa ac canaliculos perlabentium, & per eadem circulantium, abs quibus fibrulæ istæ Testium nimis distenduntur, imprimis quando succis hæc multæ particule angulares & lanceolatæ sunt permixtæ, quæ in convenienti situ & tandem firmiori ad invicem adhæsiōne in tubulis obstructions & varias canalium parium obstructions feminales, sanguineas, lymphaticas & chyloas. Quam verò particule angulares & acutæ rigidæ reliquæ potentiores fibrilas non modò valde distendunt, sed etiam pungunt, & sanguis in compressis vasis arteriosis de-

tentus per extremitates earum transparet, rubedo & Inflammatio partium harum inde perspicitur. Contingit autem aliquando, ut qui semel tumore Testium fuerit vexatus, recidivam patatur, ceu exemplum est in *Eph. Germ. Ann. IX. & X. Obs. 148.* Collierat olim Senator testem sinistrum, dum equo insidere vellet, admodum, ut ægè tum (attamen citra suppurationem) fuerit restitutus, saltem restans duplo majore post annos demum aliquot, & singulis ferè bienniis cum validà febrili invasione erysipelatos inibi oboriebatur inflammatione, eaque intumescencia, ut iustum pueri biennis caput æquaret, aut superaret, altero magnitudine ordinatâ prædito, præputio autem cum glande ægè conspicuo: & hoc fit ob vasorum semel contractam constrictionem, hinc facilius obstructions oboriri possunt. Liquor quoque seminalis stagnans causâ esse potest hujus tumoris, hinc videmus & iis, qui lue Venerea laborant, tumorem hunc contingere. Sic sæpius Tumorem Testium observavi à feminis stagnatione, id enim stagnans crassescit. Ab exulceratione quoque Parastatarum oboriri solet Tumor Testium. Cum enim humor ex parastatis in penem non amplius fluit, stagnare cogitur, hinc Testes duriores, majores & crassiores redduntur, & si succi inter fibras Testium hærentes non statim ab initio attenuantur, indurescit Testiculus instar scirrhj. Plures sæpe canaliculi Testium coarctantur à materiâ stagnante, ut succi intus contenti effluant & producant hyperfarcosum, & Testes hinc in immensum excrecant. In obeso quodam ad dormiendum nimis propenso Testes adeò magnos & ponderosos extitisse, recenset *Platerus Obs. lib. 1. p. m. 6.* ut capitis amplitudinem adæquarint, & propterea fasci involutos colloque appensos eos gestare fuerit coactus.

**Exulceratio.** Exulceratio utplurimum Inflammationem subsequi solet, quatenus fibrulæ istæ nimis tensæ vel punctæ tandem etiam à particulis acutis & cuspidatis, sive acido-salinis planè rumpuntur & discinduntur, sicque in ciuicinnos abeunt & majores elaborantur sulci, in quibus semper acrior colligitur succus, erosione sua pungens, & foramen reddens latius ac profundius, quod videmus toto die in lue Venerea laborantibus, aliisque morbis scorbutico, ubi à salibus illis corrosivis in succis præexistentibus ejusmodi testes in totum corrosos observavimus Francothalii in cive scorbutico morbo detento, ceu testis est *Pater meus Joh. Dolens*, Consul & Practicus Francothalienus. Certum est, succum, quem prostatæ glandulæ segregant, nonnunquam in ipsis proflatis stagnare, imprimis à coitu virulento, unde acrior factus ulcuscula producit, in iis, qui à longo tempore à morbis hujusmodi curati fuerunt, cicatrices relictæ malum illud adjuisse testantur.

**Erosio.** Erosio Testiculorum oritur ab acris succis stagnantibus, & membranas Testiculorum cingentes lacerantibus, talemque exoriationem efficiuntibus, obstructio enim in tubulis hisce Testiculorum aliquando ità vehemens est, ut plures rumpantur canaliculi, ex quibus manant liquores ex stagnatione acres facti, exoriantes membranas exteriores Testiculos ambientes.

**Contusio.** Contusionem Testium veliculi, vel casu à re quadam externa dura, & obtusâ excitari, quis ignorat? Hinc nota est Observatio *VVedelii in*

*Ephem. Germ. Ann. 2. Obs. 285.* ubi vir doctissimus, cum centum & ultra imperiales in capsula equo impetuose vectus gestaret, marsupio inter femora reclinato, continua succussatione adeò læsit genitalia, ut per totam noctem immanem testiculorum, maxime verò dextri, senserit dolorem, ad ipsum umbilicum & renium regionem protensum, intumuit enim tum dexter testis, doloribus per leniter resolutentia & paregorica discutientia sopitis, tandem tamen in suppurationem tendebat Contusionis tumor. In his enim Contusionibus ob evasatum sanguinem, vel alios succos circulantem, vasæque & tubulos compressâ vel lacerata, adeoque succorum motum progressivum impeditum oritur tumor & livor partium contusarum, & utplurimum fit Contusio cum laceratione partium nervosarum, quarum maxima pars constituit substantiam Testiculorum, hinc est dolor valde sensibilis. In graviore Contusione, ubi plures contunduntur partes, necesse est, ut suppuratio subsequatur, quæ nihil aliud est, quàm harum contusarum partium destructio, his enim canalibus & tubulis læsis, necessarij liquores eos percurrentes elabi atque corrumpi debent, hinc & iis partibus facile gangræna & sphacelus oboritur, ceu bigam novi exemplorum. Quævis ergo instrumenta obtusiora Contusionem partibus hisce inferre possunt, si impetu vehementiori in easdem ferantur.

**§. 11. Prognosis.** Medicum admirabilem quidem facit, & si Hippocrati credimus, Deo similem, sed cum solius Dei sit, futura certò præficeret, hinc Medicis in his casibus tantummodo conjecturæ relicte. Tumorem Testiculorum intensum in principio sequitur dolor, quod in parte adeò vel ad levem collisionem sensilis non mirandum est, & Tumores hi interdum in abscessum degenerant, cum multi succi acres ibidem reperiantur. In Scirrhum aliquando transit Tumor, in primis si haud ab initio attenuentur & resolvantur succi stagnantes. Malum est, si vasâ dirumpantur ac hyperfarcosum inducant insanabilem. Inflammatio Testium non est floccipendenda, maximos enim producit dolores, raro suppuratur, & gangræna eam facile sequitur, quare ei obviam eatur idoneis remedijs infra dicendis. A dolore forti ad testes irrutentem tussim siccam solvi Hippocrates testis est *Epidem. lib. 2. Sect. 5.* & vicissim testes affectos habentes tussim siccam tussire, *Epidem. 4. §. 31.* quin ubi testis intumuit, tussis diuturnè cessat, & testis tumor à tussis cessat & allevatur, unde communionem quoque pectorum & genituræ concludit ipse Hippocrates *Popular. 2. Sect. 1. Ulcera & Erosiones* magnam difficultatem præ se ferunt. Sic quoque à *Commune* tumor immedicabilis restare potest, prout superius ex observatione Celeberrimj *VVedelii* constat. A contusione facillè oboritur sphacelus, ceu patet exemplo *Ephem. Germ. Ann. 2. Obs. 237.* Rara utique est illa observatio 44. à *Paschequo* D. Riverio communiscata p. m. 669, ubi quidam testiculos magnos admodum habuit, ut multo intervallo superarent magnitudinem testiculorum equi, & prolem nunquam suscepit; post casum ab equo scrotum intumuit instar spheræ, quâ truuculis luditur, tumor ad suppurationem versus est, ex quo puris insignis copia effluxit. Ulcere perfectè deterio, decidit testiculorum frustula omniuo lapidea, siliceam duritiem æmulantia, & malleolo

Ccc 3 ut

ut ceteri lapides in multas partes diffilierunt, corporis & animi functiones tum quidem parum fuerunt mutatz, tandem verò post aliquot dies febricula supervenit, cum anxietate & siti, quæ paulo pòst caput incrementum, pulsus directo testiculi valde imminuto, & priusquam in alio latere mutaretur, rubor saturatus successit in facie, & exanthemata rubra in corpore universo mortem ipsam brevi adducientia. Per abscessum testium vidi quoque febrem petechialem terminatam. Sic ex febris modicis ab Alcibiade venienti ante iudicationem testis finister intumuit, apud *Hippocratem Epidem. 2. Sect. 2.* & testium tumores febrem ardentem solvunt apud eundem de *iudicationib. §. 11.*

*Dietæ.*

§. 12. Restat nunc *Dietæ*, quæ ut ritè instituat, paucis hunc quoque fontem examinabimus, qui hic maximè est ponderis. Aër ergò sit ab omni inquinamento liber atque purus, temperatus, ad calorem tamen inclinans, contra verò frigidus, crassus, nebulosusque exulet. Cibos eligat æger boni fucci facilisque digestionis, contra verò acidi salis ac dulces vitentur, qui viscosos & crassos succos producere solent; exulent & hic saccharata ac dulcia, utpote quæ acidum vitiosum augent. unde postmodum variæ vitiosæ fermentationes. Idem de potu sentiendum, qui debet esse calidus, hinc convenit potus Theæ, vel Coffæ. Motus & quies, somnus & vigilie, excreta & retenta, item animi pathemata hic observentur ut in aliis hujus generis morbis, cum enim de his ubique abundè dixerimus, Lectorem de remittimus, cum cramben biscotam apponere non lubeat. Hoc interim alterisco notandum est, quòd Venus exulare debeat, ne partes hæc nimium commovendo, ægri gravius incurrant periculum.

*Morbus  
hæc curandi ratio  
secundum  
Galenic.*

§. 3. Properamus jam ad ipsam *Pharmacentico-Chirurgicam* affectus hæc curandi rationem, de qua prius aliorum, quàm nostram in medium proferemus sententiam: & quidem agmen hic denuò ducent *Galenici*, cum reliquis confesum hunc absolventibus tempore se ducant priores, quatenus occasione simul videbimus, quale temporis successu Medicina cøperit incrementum. Innititur autem Veterum morbos hæc curandi methodus sequentibus fundamentis, ut in *Tumoribus* Testium profligandis sedulò causas observent, abs quibus fuerint producti, si enim à sanguinis aliorumque humorum calidorum copia ad testes affluente *Inflammatio* exsurgat, ea quæ nondum sit consummata, ulterius ejusdem prohibent incrementum, tam instituto victu tenui, quàm sanguinis ex vena cubiti interna ejus lateris, in quo testis laborat, vel utriusque, si ambo afficiantur, emissionè ad avertendum. ex poplitum verò venis, & subjuncta malleolorum icarificatione ad derivandum, nec non alvi irritatione per enemata & pharmaca solutiva, attamen non calida, per os sumta; quibus præmissis humores calidiores & tenuiores in corpore reliqui abundantes corrigunt, temperant & aliquantum incassant, ne tam facile ad testes valeant affluere, adhibitis decoctis vel julapiis ex herbis nymphææ, portulacæ, plantaginis, lactucæ, syrupo rosarum simplici, violarum, endivie, quibus si affluxus ipse impediri nequeat, hoc tamen præstari promittunt, ut humores isti ad testes affluentes minus noceant. Inflammatione vero jam facta, & sic præsertione

nullum ulterius inveniente locum, ejus depulsioni & curationi omnibus incumbunt viribus, atque præmissis universis favoribus & potissimum ad materiam in parte affecta redundantis educationem instituta purgatione per calidam recens extractam, electuarium diaprunis solutivum, aut aliud quoddam conveniens, materiam in testibus hærentem retrocedere ad partes, unde venit, cogendam esse ducunt per remedia repellentia, quale epithema est ex oleo aqua & aceto rosaceis invicem mixtis compositum, in quo lintea intincta seroto imponuntur è regione testis laborantis. vel quod conficitur ex succis rosarum, nymphææ, sempervivi, plantaginis, quorum vice eundem etiam locum inungunt oleo rosaceo omphacino, myrrhino, unguento rosato *Mesues*, aut ceratum album *Galenici* componunt, quibus inflammationis fervore aliquantum imminuto ad digerentia pergunt mediocria prioribus adsociata, unde post inunctionem cataplasma superimponunt ex foliis haliacacabi, cannarum viridium, floribus rosarum, foliis hyoscyami contusis & permixtis cum farina lentium, hordei, aut fabarum, oleoque rosaceo. Sed ubi vigor inflammationis jam fuerit transactus, & digerentia videantur necessaria, misis prioribus hæc in usum ducunt, non tamen admodum calida. sed mediocria & dissipantia, uti est cataplasma paratum ex fabis fisis coctis, aut ex farina fabarum, cum decocto seminis fenigraci subacta, vel ex farina feminis lini, melle & oleo chamæmelino, tepide seroto impositum, cui nonnunquam substituitur cataplasma ex pallulis enucleatis cymino in vino maceratis, contusis & malaxatis, nec non unguentum Martiatum aut emplastrum diachalciteo oleo meliloti emollitum. Videntes vero tumorem ulterius non posse disparari, sed Naturæ suæ motu ad suppurationem vergere, etiam hanc promovendi gratia nulli parcunt labori, sed in tempore cataplasma adhibent ex radicibus altheæ, floribus chamæmeli, meliloti, semine lini, farina tritici in aqua coctis, contusis, & oleo amygdalarum dulcium, seu axungia gallinarum, aut fusilla subactis compositum. quo facta suppuratione, materia verò exitum non inveniente, nec pure per se erumpente, locum artificiosè aperiunt, ne testium substantia à pure diutius retento corrumpatur, cavendo regionem ani & non longè ab ea distantem, ne abscessus in fistulam abeat curatu difficilissimam; sin spes sit absque manifesta apertione per instrumentum materiam digeri posse & absumi, cataplasma ex farina lupinorum, orobi & melle, aut cinere brasice, vel pulvere radicis cucumeris agreßis, cymino & vitellis ovorum paratum imponunt. Ab humore pituitoso productum Testium Tumorem Oedematosum jam perfectum, in quo præcautio, cerebri aliarumque partium mittentium, & ipsius humoris correctionem repescens, nullum amplius reperit locum, ità aggrediuntur curandum, ut humorem hunc frigidum & viscidum calefaciant, incidant, concoquant & extenuent per decocta & syrups idoneos ex origano, majorana, veronica, salvia; calamemtha, floribus stoechados, roremarino, &c. ut ita debite præparatus per cathartica & vomitoria evacuari possit, qualia sunt electuaria diacarthami, elefocphi, diaphænicon, succus raphani, & similia; in quo casu etiam venæsectionem approbant in dextro vel

vel sinistro cubito, pro ratione testis affecti in hoc vel illo latere situm habentis, qua una cum sanguine humorem pituitosum in venis redundantem evacuare, & simul præcaveri posse putant, ne reliqui ad testes tam facile prosiluant. Posthæc residuos in testibus humores digerentibus exhaurire student, oleo scilicet chamæmelino, anethino, rutaceo, irino, costino, vel castorei scroto inuncto, vel linimentis ex iisdem & terebinthina, cera, gummi galbano, serapino & semine cymini paratis, aut cataplasmatibus ex emplastro de bacis lauri, stercore caprino, & semine cumini in vino vetusto coctis, vel ex menthastræ, calamenchæ montana, & radice asphodeli coctis, contusis & cum fermento, butyro & sale permixtis, vel ex farinis fabarum, fœnigræci, pulveribus radicis iris, floribus chamomillæ & meliloti in oxynelle & oleo anethino coctis, quibus nulla subsequente attenuatione & discutitione, sed ad suppurationem vergente tumore, ex radice altheæ, foliis brassicæ, floribus meliloti, farinâ fabarum, cicerum, cumino, in pure caricatum pinguium coctis, & cum oleo liliorum, & axungia suilla subactis paratum cataplasma adhibent, & uti in priore procedunt. Ad scirrhum tumorem focus usque erumpit emollientes & leviter digerentes, spongiam scilicet ex decocto foliorum ac radicum malvæ, altheæ, lili, feminis lini, fœnigræci, foliorum parietariæ, brassicæ, expressam, aut imbutam oleo communi, vel liliorum, meliloti, amygdalar. dulc. vel unguenta & liniunt inungunt ex medulla cervina, vitulina, axungia suilla, herodina, gummi Ammoniaci, sagapeno, bdello in vino liquatis aut aceto, cum olypo & oleis prædictis commixtis aut emplastrum admovent ceroneum, vel filii Zachariæ, vel cataplasma ex radicibus altheæ, haliacacabi, mandragoræ, hyoscyami in sapa coctis, contusis & per cribrum transmissis additis gummi modo nominatis, paucâ quantitate styriacis & oleo meliloti, quod calidiuscule itidem imponunt, & materiam crassam aliquantum emolliat exitum parant per manifestam apertionem. Ut tumorem à flatibus productum immineant & planè etiam tollant, carminativa seu status discutientia in usum ducunt, non modò in testibus, sed reliquo etiam in corpore, imprecisus abdomine & ventriculo contentos, qualia sunt semina anisi, fœniculi, cardanomi, macis, galanga, zingiber, electuarium diaction pipereum, diacuminum, diacalamenchæ, michridatum, theriaca, tryphera magna interius assumta, subjuncto haustu vini veteris & generosi, cum elypteres intestinis insinuant status itidem discutientes, & crudas superfluitates simul educentes, quos ex decocto parant carminativo, in quo soluta sint electuar. benedictæ laxativæ, diaphrænicæ, vel diacolocynthidos cum electuario de bacis lauri, aut melle anchofato, oleo rutaceo, anethino, aut cheyrino, quibus ad sociant focus actu calidos cum spongia expressa ex decocto sem. carvi, cumini, anisi, fœli, folior. & baccar. lauri, folior. rutæ, summitatum anethi, florum chamomeli in lixivio factæ, subjungendo cataplasma ex farinis orbi. fabar. lupinor. pulveribus cymini, apii, petroselinii, fœniculi, cardanomi in vino generoso coctis, assusis oleo anethino, vel irino, vel quo d. conficitur ex stercore vacino, sulphure vivo, semine cumini, cum melle anchofato & oleo anethino commixtis, aut em-

plastrum de meliloto & bacis lauri, vel oleo quodam discutiente, anethino, irino, costino, scroto inlinunt. Et ab hac curâ tumoris flauulenti non admodum differentem proponunt in tumore testium producto ab humore seroso; laudant enim focus & cataplasmata ex cumino, petroselino, apio, sulphure, bacis lauri, cochleis contusis, stercore caprino, in lixivio parata, vel inungentum de arthanitâ, aut emplastrum ex passulis rubris enucleatis, flore lapidis Asii cumino, nitro & sulphure invicem contusis paratum, & testis laboranti calidè impostum. Tumori ex hyperfarcosi, ubi scroto simul patet propter ulcus cinerem samentaceum nitro & aqua imbutum solent adhibere.

*Ulcera & Erosiones* Testium mederi student detergentibus & siccantibus, trochiscis de carbæ, de spodio, de terra sigillata in decocto aliquo adstringente & abstergente intus exhibitis, & foris si, ut plerumque fieri solet, scroto simul sit exulceratum & via patefacta Testes, linimenta vel unguenta adhibent ex plumbo ustis, aloë, lithargyrio, pompholyge, scorïa ferri, oleo myrthino & succo plantaginis exceptis, postquam ulcus probe mundatum sit & absterium lavamento quodam, ex decocto balaustiorum, rosarum, myrtillorum & modici aluminis in vino rubro & aqua plantaginis factæ, pluresque unguentum Gordonii sequens ad ulcera hæc tanquam singulare valdè doper commendant.

*Æ. Testes.*

*Lithargy.*

*Cerussot.*

*Cadenia.*

*Sang. dracon.*

*Acacia.*

*Cori. granat. aa. ʒij.*

*Thuris*

*Sarcocolla*

*Aloes*

*Aluminis aa. ʒj.*

*Pulveriscentur, & addatur terra & olei rosi q. s.*

*F. Unguentum.*

Ulcus hoc à lue Venerea si fuerit induratum, in exhibitione remedium huius ipsi dicatum, nec operam, nec tempus omitunt. In *Erosione* Testium unguentum citrinum, vel album singulare commodum allatum esse pronuntiat.

Ad *Contusionem* Testium commendant unguentum Basilicum sepius illitum, vel ubi testes contusi simul valde dolent & tument, cataplasma ex farina & lacte paratum, & absque dolore verò tumentibus aliud ex farinâ fabarum, feminis lini & fœnigræci in lacte coctis imponunt.

§. 14. A *Paracelo* hoc de porranus consilium, Curâ Med. *Paracelo* *Tumoribus* Medicus advertebat, num ad maturitatem per se vergant, an discutient admittant curationem. In prioribus maturationem istam promovendam vult iis remediis, quæ communiter digerentia appellantur, & quidem in propriâ regione, ne ventriculus & intestina propter id inale afficiantur. Immoderate auctos hosce tumores nullis digerentibus superari posse asserit, nec nisi in Ulcera prius mutentur, curari, aliâs in tumoribus mediocribus, etiam inflammatoriis oleum Saturni tam hoc in loco, quàm in aliis corporis partibus valde extollit.

In *Cambuca*, ipsique *Ulcibus* & *Erosionibus*

bus Testium caphuratum approbat, & emplastrum de mumia, quæ remedia sequenti modo parantur.

℞. Caphura ʒij.  
Virell. ovor. ʒiij.

Fiat Mixture, quæ posita super marmor in loco humido vertatur in oleum.

℞. Mumia ʒb.

Resina de botin abluta per aquam rosarum q. s. pro incorporatione, F. Emplastrum.

Ad *Contusionem* etiam Testium commendat internè hirundinariam mumiam & sal gemmæ, ipsam vero Testis regionem perungendam esse præcipit oleo laterino, vel hyperici, & ligandam oleo rosaceo, vel imponendum emplastrum fodicationum, sicuti & reliqua vulneraria hic commode usurpari possent existimat.

*Cura Hel-*  
*monis.* §. 15. Quod ab *Helmonis* de curatione morborum horum *Tyset* invadentium accipimus responsum, paucis admodum comprehenditur verbis, etenim ad sedationem Archæ in *Tumorem* inflammatoris operam potissimum dirigendam esse præcipit, quæ de causâ saccharum Saturni, oculos cancrorum, & simul pro abigendo veneno Venereo Archæum irritante Mercurium diaphoreticum vel corollatum insigni cum utilitate intus exhiberi posse sperat, topicè verò emollientia & maturantia approbat, quæ malis tumoribus & inflammationibus adhibentur. potissimum in tumore duro oleum illud commendat, quod à commodo in strumis abigendis sæpius probato, oleum strumarum appellat.

*Ulcibus & Erosionibus* Testium omnia ea accommodata credit remedia, quæ acidum domant in lacte vel semine existens, ex quibus reliquis palmam præcipiunt colcotharina, & ex his terra vitrioli edulcorata, tum etiam realgaris fixa topicè usurpata, quibus si interna adjuvantur arcana fermentum corruptivum intimius abluentia, eo faciliorem curationem inde subsequuturam esse promittit.

In *Contusione* Testium peculiaris non adfert remedia, sed eadem ipsa, quæ aliarum partium contusionibus conferunt, etiam hic utiliter ad moveri possent, resolutiva scilicet cruorem congelatum, quales sunt oculi cancrorum in aceto soluti, & interiùs assumti, foris autem admotum cataplasma ex bryonia alba rasa, cruorem illum non modò in aquam resolvens, sed promtè etiam exigens.

*Cutis*  
*villosa.* §. 16. Ad vicinum prioris, & conterraneum nunc accurrimus *P.P. lissum*, cuius consilium est, ut ad materię crassioris ductus Testium in *Tumore* obstruentis attenuationem non modò focus admoveantur ex malva, agrimonia, althea, ruta, abrotano, floribus chamomillæ, sambuci, rosarum, semine lini, in aqua & vino coctis, aut stillinantur unguentis altheæ, populi, &c. sed præter venæsectionem interna quoque adsumantur remedia strictiorem materię obstruentis compagem resolutiva, quale sequens proponit apozema:

℞. Ligni *Sassafr.* ʒiij.  
Guajac. ʒij.  
Santal. cur. ʒiib.

Rad. *fanie.*  
Gramin. aa. ʒj.  
Liquirit. ʒb.

Herb. menth.

scabios.

heder. terrestr.

beton. aa. ʒiib.

Sem. *fanie.* ʒiib.

seseli

rut. aa. ʒiib.

Cog. in l. q. ag. & vin. & Colatur. ibij.

add.

Spir. ʒi ʒib.

Syr. *adanih.* Feru. ʒj.

M. Assumantur una vice ʒiij.

Apozemate hoc non modò resolutionem materię incrustatæ, sed ejusdem etiam resolutæ excretionem præstari allerit per urinam & sudorem, interea verò aliam laxandam esse per clysteres monet, ne ejusdem obstructio malo huic noceat. & humorum motui sit obstaculo, proinde sequentem aliquoties injici præcipit.

℞. Rad. alio. ʒb.

bryon. ʒij.

Fol. *matv.*

mercurial.

parietar. aa. Mj.

Sem. lini ʒiij.

cumin. ʒib.

Cog. in ag. simpl.

Colatur. ʒi. add.

Electuar. *benedict.* laxas. ʒj.

Sr. ros. fol. ʒb.

Lap. *prunell.* ʒj.

M. F. Clyster.

Vergente Inflammatione ad suppurationem, cataplasmata ex farinis fabarum, hordei, sennigr. pulverbusrad. altheæ, flor. meliloti, cum cepis assis & axungia suilla, vel oleo chamomillæ de prædicat calidiusculè admota, & clysterum usum aliquantum temporis continuatum, nec vetat Veneri gratum præstare officium, si licitè fieri possit, imprimis semine diutius retento tumoribus ejusmodi materiam præbente. Ubi adhuc discuti potest Inflammatio, valde approbat sequens Huseri unguentum emplastri modo impositum.

℞. Unguent. alb. camphoræ.

de Tur. aa. ʒiij.

Sacch. ʒi ʒij.

Ol. Camphor. gt. iij.

Croc. ʒb.

Ol. rosar. parvum.

M. in mortario plumbeo, donec nigrescat.

Ad *Ulcera & Erosiones* Testium sananda, commoda judicat remedia interna particulas salinas corrodescentes emendantia, mitigantia, partesque læsas mundantia & restaurantia, decocta ex lignis & herbis vulnerariis, nec non diaphoretica & mitigantia, C. C. pp. oculos &c. saccharum ʒi, tum etiam balsamica, maxime balsamum illum de Capaiba, trochiscos de camphora, de Charabe, & alia; ipsum vero ulcus abtergit decocto quodam ex agrimonia, equisetio, plantagine, rois balaustis &c. in quo mel rosarum & bolus Armenius sint dissoluta, cum parte aliqua terræ vitrioli, vel lii fœtidum sit unguentum Aegyptiacum cum camphora & spiritu vini, mundata sanat unguento Apollolorum. In *Erosionibus* ex semine corrupto, vel alio quodam humore nimis acro pro contactu sequentem commendat mixturam.

℞. Aceti,

Spiritus vini aa. lbj.

M. Q.



*M. & defillentur per alembicum;*

*Liquoris defillati.*

*℞. lb℞. in qua dissolv.*

*Terrac. ʒ℞.*

*Terr. sigillat. ʒij.*

*M.*

Intingantur lintea, quæ tepidè admoveantur. Ulceribus ex erosionibus factis sequens accommodatum credit unguentum.

*℞. Mastic.*

*Thur.*

*Alum. ust.*

*℞. is communi. aa. ʒj.*

*Ol. laurin.*

*Aq. vir. aa. ʒ℞.*

*Axung. suill. q. l.*

Consundantur optime in mortario plumbeo, & addatur cum pulveribus ʒiis saliva extincta. ʒ℞.

*F. Unguentum*, quo ulcus illud studiosè est illinendum.

Confusionibus Testium magnum aliquando inducentibus tumorem conveire existimat cataplasmata ex farina fabarum, seminis fenigræci, pulvere cumini, florum sambuci in oxymelite paratis, addito nonnunquam pulvere lithargyri pp. tumetiam sequens linimentum, quod aliquando præmixti, & nihilominus postea cataplasma poterit inponi.

*℞. Ol. flor. sambuc. ʒij.*

*Bacc. laur. ʒ.*

*Spir. lumbrie. gr. iij.*

*Camphor. ʒj.*

*M. F. Linimentum.*

Nec reprobat hoc in casu cataplasma illud extemporaneum, quod fit ex parietaria cum croco in oleo chamomillæ cocta, tepidè impositum, quo dolor brevi leniatur, tumor imminuetur, & omne coagulatum resolvetur, simulque utinæ effluxus optatò promovebitur.

*Sylviæ cura in Testium morbu.* §. 17. Sylvius talem proponit Testium Tumorem & potissimum Inflammationis curationem, quæ sanguinis & lymphæ in testium vasis stagnantium motus restituitur, adeoque iidem coagulati resolvantur per salia volatilia, sudorem & urinam moventia, ex aqua feniculi, petroselinæ, florum sambuci. Spiritu ʒci, laudano opiato, Syrupo capillorum Venetis, de quinque radicibus, quibus simul obstructio aperietur, & sanguis & vasis affusus ante suppurationem removebitur; si vero hæc præcaveri nequit, ipsam maturari vult, & promoveri. Ad resolutionem succorum stagnantium etiam externa approbat remedia, qualia sunt unguenta vel linimenta ex unguento Altheæ, martiato, oleo chamomillæ, laurino, anethino, cataplasmata dissolventia ex plantis acrioribus, nasturtio, chærefolio, mentha foliis sambuci, farina fabarum & lupinorum, cum capis assis contusis, forsetur plantis aromaticis & discutientibus, ut radicibus apii, bryoniæ, foliis menthæ, betonicæ, absinthii, rutæ, majoranæ florum chamomillæ, sambuci in vino coctis, & spiritu vini addito dum adhiberi debent. Suppuratio si præcaveri nequeat, eandem promover cataplasmatibus maturantibus ex pulvere radicis altheæ, bulbis liliorum alborum, foliis malvæ, mercucialis, brancæ ursinæ, farina hordei, seminis lini, fenigræci, caricis, in cerevisia tenui coctis ad emolliationem, qua impetrata contusis omnibus addi vult axungiam anserinam, & butyrum re-

ens. Loco cataplasmatibus emplastrum diachylum cum gummi inponi posse concedit, & factò exinde puritate exitum parati, aperto simul scroto ea in parte, in qua testis suppuratio promota est, quo testis eo facilius aperiri, & materiæ purulente effluxus possit conciliari.

In Ulceribus Testium approbat decocta sudorifera guajaci, herbatumque aromaticarum, quibus simul ulcera illa ablui & mundari possint, tum etiam balsamum sulphuris terebinthinatum, & succinatam, quo non modò mundantur humores acidi acres in ulcere contenti, sed ulcus etiam ipsum optinè consolidatur.

Ad Confusionem Testium ea commendat remedia, quæ sanguinem & vasis dilaceratis effusum & coagulatum resolvere possunt, unguenta nimirum dialtheæ, martiatum, Agrippæ, cum oleo Philosophorum, emplastrum diapalmæ, & clysteum discutientium frequentiore usum, nec non cataplasmata prædicta ex plantis aromaticis, cum farina fenigræci & fabarum, statimque venæsectionem celebrari jubet in pede vel brachio. Si inflans inflammatio discutientibus hinc non potuit præcaveri, eaque suppurationem vergat, temedius modò enumeratis eam vult promovendam.

§. 18. Cariesiani suadent in Testium Tumore Cariesi attenuantibus succorum crassitiam & stagnationem resolvere, & cauales obstructos relaxare, ut succi ita commoti liberius fluant, hinc volatilia magnis extollunt laudibus, si præmixtis terebinthinatis exhibeantur, vel decoctorum, vel aliarum mixturarum formæ, approbantque à VVilfio jam descriptum apozema, cui tamen sequentem commode substitui posse mixturam existimant.

*℞. Aq. flor. sambuc. ʒij.*

*rutæ ʒij.*

*Essent. Sassafr. ʒij.*

*Liq. C. C. succinat. vel*

*℞. ʒci ʒj.*

*Pulv. ʒij gr. iij.*

*Syr. feniculi ʒ℞.*

*M. d. una vice, expectando sudorem.*

Cui pulverum forma lubet, ei sequentem exhibere solent.

*℞. Oc. ʒ. gr. xij.*

*C. C. Philos. pp. ʒ℞.*

*Flor. ʒci gr. viij.*

*M. F. Pulvis.*

Singulariter etiam hoc in affectu celebrant spiritum C. C. volatilem, ad guttulas aliquot in vino dulci generoso assumtas. Non longè quoque ab internis hæc prædicia differunt externa, sed ad magis præsentaneum impetrandum juvenem illis hæc adlociant, focus instituendo ex herbis multo sale volatili præditis in vino decoctis, addito in fine, prout D. Sylvius jam monuit, aliquid spiritus vini, ut eo citius penetrent, vel spiritum ʒci, prout sequens monstrat formula.

*℞. Herb. rutæ,*

*agrimon.*

*nasturt. hortens.*

*beton. aa. Mj.*

*Cog. ex vino dulci ad lbj.*

*Colatur. adde*

*℞. ʒci ʒj.*

*Camphor. ʒ℞.*

*M. pro fotu.*

Ex solis spirituosius etiam tepidè adhibitis humismodi

D d d

jusmodi foris instituunt, cui scopo inserviant spiritus juniperinus, spiritus matricalis, Spir. vini camphoratus, Tinctura Alise foetidae, Essentia Menthae, ruta & Camomillae. A cataplasmatibus quoque non parum expectant subsidii, quorum aliquot communicant exempla,

℞. Farin. fabar. ʒij.

Pulv. fol. rui.

agrimon. aa. Mj.

Sem. Cum. ʒß.

Coq. in aq. & vin. ad debitam consisten-

tiam, & adde

Camphor. ʒij.

℞ci ʒij.

M.

℞. Sterc. vaccin. ʒij.

Fol. rui.

cicent. aa. Mj.

Tabac. ʒj.

Coq. ex aq. ad consistentiam pulvis, add.

Farin. tritic.

Mellis aa. ʒij.

M. F. Cataplasma.

Ex facibus quoque vini & farina, vel pane fecalino cataplasmata cum spiritu vini, vel cerevisia parata maxime laudant, quibus pro faciliiori penetratione admiscunt aliquid salis alcali, vel Armoniaci, ut succi torpidiores eo magis commoveantur, & de sede sua decedant, quæ de causa mercurialis quoque fors admovent, uti emplastrum de spermate ranarum Vigonis cum duplo vel triplo ʒij, emplastrum da baccis lauri, & cumino cum ʒio commissa. Suppuratio Testis promota, vel antedictis, vel aliis cataplasmatibus ex prioribus cognitis, purulentam materiam tum per urinam, tum aperto abscessu per scalpellum evacuant, & reliquam curam instituunt sequenti ratione.

Ulcus Testium remediis aptis emundant, ut ipsa sanatio post hæc optatius perficiatur, hinc pilulas terebinthinatas cum ʒio dulci præmittunt, ut materia virulenta evacuetur, postea sudorifera ex lignis, vel pulveres ex ʒio dulci & cinnabari ʒij propinant, aliasque mixturas purificantes, qualis sequens existit egregia.

℞. Ag. Lapp. major. ʒj.

fumar. ʒv.

vorumar. ʒij.

Essent. lign. sassafr. ʒß.

Tinctur. resin. guajac. ʒß.

Syr. Scabios. ʒj.

M. d. cochlearum.

Quæ foris adhibent, virtute sua iis, quæ interna sumenda propinant, respondere volunt, & propterea aquam Galeam, & calcis vivæ cum saccharo ʒij pro absterfione commendant, vel Spiritum vini camphoratum, cum aloë, ærugine, aut pauca quantitate auripigmenti, hinc ulcera mundata sanant internè & externè usurpato Balsamo Peruviano, aut de Capaiba, nec non unguentis ex Melle rosaceo, terebinthina, myrrha, olibano, sarcocolla, aliisque, si seroto simul exeso commode admoveri queant. Eadem quoque ratione procedunt in Testium *Erosione*, in qua præ aliis pulveres laudant diaphoreticos, in quos dum particulæ corroderes lanceolas suas infigunt, eas faciliè franguntur & hebetantur, ne ulterius adeo noceant, quales sunt pulveres oculorum ʒs, C. C. Philosophicè pp. ʒij diaphoret. Pulver. ʒij, ʒis succin. & id

genus aliorum. Aperto testis inspergunt pulveres itidem porosos, in quos partes corroderes angulares citò incurrant & hebetentur ex thure, myrrha, saccharo ʒij, camphora, albo gæcco, radice aristol. chelidon. maj. gentianæ, vel linteis sequenti mixtura humectatis sæpius attingantur.

℞. Spir. Vin. ʒß.

Oliban. pulverisat. ʒß.

ʒis ʒij.

Camphor. ʒj.

M.

Superata materia corroderens, ulcera sanant emplastro divino. vel diapalmæ regioni testis laborantis etiam supra scrotum impositis, accretum ita corruptum, ut nullam planè admittat sanationem, omnino excindunt, & emplastro sriptico imposito scrotum vulneratum vel exulceratum ad consolidationem perducunt.

Ne in *Coniunctione* ex dilaceratis tubulis effusi liquores corrumpantur, & stagnando nimium incrassent, motum eorum omni studio promoveant fotibus cataplasmatibus ex farina tabacum, cumino, radice symphyti, herb. agrimon. flor. hyperic. camomill. in vino dulci coctis, & ut fibræ dilaceratæ per convenientem suppurationem penitus abradantur, & frustula conglutinari non valentia separata cum pure ejiciantur, unguenta suppurationem istam promoventia seroto, & perinzi regioni admovent, ex ol. rosarum, vitellorum ovi, hyperici, lini, Terebinth. Philosphor. cum succino, gummi elemi & camphora. Facta suppuratione eodem penè modo, ut in ulceribus procedunt. In leviori coniunctione, ubi suppuratione non opus est, epithema calidiusculè admovent ex spiritu lumbricorum, ʒci & camphora, vel etiam ex aqua calcis vivæ, & succo nasturtii hortensis.

§. 19. Perceptis ita Antecessorum consiliis, *Mystrum nostrum* nunc paucis communicabimus. Si ita *confusum* que Testes tumeant cum *Inflammatione*, condu- *pro curant* cent internè diaphoretica, quæ succos incitatos *in Testibus* & stagnantes attenuant, subtiliant ac ad motum *Tumore & Inflammatione* progressivum incitant, ex quibus sola salia volatilia sæpe sufficiunt ex. gr.

℞. Theriac. vet. ʒß.

Ocul. ʒs pp. ʒj.

ʒ volat. succin. gr. iv.

Camphor. gr. iij.

Ol. Junip. gr. v.

Cum ʒ. Card. bened. &

Sambuc. F. Potio.

Vel:

℞. Unicorn. marin. ʒß.

Pulv. bezoard. Senn. ʒß.

Terr. sigillat. pp. gr. xiv.

C. C. Philof. pp. gr. viij.

ʒ. Calendul. ʒij.

Syr. cjsad. ʒß.

M.

Vel:

℞. ʒij diaphoret. vel

Bezoard. ʒalis Ludovici ʒj.

ʒis C. C. volat. gr. vj.

M. F. Pulvis una vice assumendus.

Cum febris sæpe simul urgeat, & cor à particulis acribus cum sanguine eo delatis spasmodicè afficiatur, interponi potest cinnabaris nativa ad gr. viij, vel detur ʒium diaphoreticum, vel pulvis concharum aut ostrearum. Solus sæpe sufficit

sufficit ~ C. C. vel viperar. in vino Malvatico assuntus, quod & referri possunt, ~ Eboris, sanguinis, fuliginis. ❄, ☉ volatile oleosum nostrum, ~ cephalicus n. quæ omnia acidum venenatum, & coagulans obtundunt. Conveniunt etiam diuretica, & imprimis salina, potiusque Theæ calidus assiduus est interponendus.

Hæc præmissis & externatopica accersenda sunt, præprimis autem sequens focus mihi sollemnis esse solet.

- ℞. *Lithargyr. aur.* ʒij.  
*Flor. Sambuc.*  
*rosar. pallid.* aa. Mij.  
*chamomill.* Mj.  
*Coq. ex aq. & vin.* aa. q. l.  
*F. Focis calide applicandus.*

Majoris discussionis gratiâ, si opus fuerit, nobilitari hic focus poterit cum spiritu vini camphorato. qui læpe solus, & si dolores simul urgeant, cum croco commixtus sufficit Spiritus matricalis cum Elixirio vitæ n. saccharo ʒi & camphora sæpius partibus hæc calide applicatus raro me fecellit.

Vel:

- ℞. *Myrrb.* ʒß.  
*Ceruss.* ʒi.  
*Camphor.* ʒj.  
*Farin. fuligin.* ʒj.

M. F. Pulvis, qui vel per se inpergatur, vel cum spiritu vini. F. Cataplasma repide imponendum & sæpius repetendum.

Inflammatione aliquantum sedatâ, postmodum tumori & duritiei obviam eatur, partem affectam balsamo ʒis succinato calidè inungendo, dein emplastrum nostrum de labdano applicando, quod egregium est, vel diaphulph. *Rulandi*, vel de Cimino quod probatum reperi, vel sequens balsamum, magnarum virium in tumoribus duris emolliendis.

- ℞. *Scoriar. regul.* ʒij q. l.  
*Terramur in pulverem, antequam humidis aëris insinuantur, inque effunde*  
*Olei succini terebinth.* aa. q. l. ad eminentiam duorum digitorum transversorum, digerantur ut artis est.

Sic quoque in hæc tumoribus suffumigium ex resolventibus conducet, aut imponantur cataplasmata earundem virium, quorum sequentes existant formulæ.

- ℞. *Fæcum vini* ʒijj.  
*Panis fecalini* ʒiijß.  
*Camphor.* ʒß.  
*ʒis alcali* ʒijj.  
*❄ci* ʒj.  
*Cum vini q. l. F. Cataplasma.*

Vel:

- ℞. *Cerevis.* ʒvj.  
*ʒi Matricalis.* ʒij.  
*❄ci gt.* xij.

Vel:

- ℞. *Nasturt. hort.* Mijj.  
*Buuyr. recent.* ʒj.  
*Fricentur in sartagine ad siccitatem, adde*  
*Camphor.* ʒij.  
*Applicetur repide.*

Vel:

- ℞. *ʒ. ʒ. ʒ. Spir. Matricalis.* ʒijj.  
*Tinctur. Aff. fatid.* ʒß.  
*M. F. Epithema.*

Medicamenta hæc testibus imposita faciunt, ut particulæ tenerimæ & volatiles mediante pressione in vasa tendant, & in crassatos stagnantesque succos ad motum progressivum incitent, qua operatione obtemperata succi isti facilem reperiunt exitum. Ab *Etmüllero* commendatum cataplasma sequens etiam laudabile existit.

- ℞. *Farin. fabar.* ʒijj.  
*Pulv. sem. cumin.* ʒiß.  
*Coq. in l. q. ʒ. & ad consistentiam Cataplasmatum, adde*  
*Lithargyr. pulverisat.* ʒj.

M.

Hoc Cataplasma calidè tumori & scroto imponatur, cuius usu dolor mitigatur, & tumor immineatur.

Vel:

- ℞. *Rad. Alth.* ʒß.  
*Farin. fabar.*  
*Flor. Chamomill.*  
*Fol. scord.*  
*Sem. lini,*  
*Fenigr.* aa. ʒj.  
*Carvi* ʒß.

*Coq. in vino Gallico, & repide applicetur.*

Si tumor non remittat, sed quali scirrholus sit, vel emplastrum nostrum de labdano, vel sequens imponi potest.

- ℞. *Gumm. Ammon.* ~. *volat. solut.*  
*Emplastr. de cicuta.* aa. q. l.  
*Malaxeatur cum l. q. ol. dest. ʒ. vel ligni Guajac. Inducatur super alutam & applicetur loco affecto.*

*Dau. Ludovici* commendat emplastrum de hyosciammo, ut pote insignè simul mitigativum, quod paratur ex oleo ejus expresso, cum turionum expresso similiter succo, pro talium more cocto, addita huic ceræ q. l. terebinthinæque pauxillo. Totum dum adhuc fervet, per linteam colando, separato sic crassamento, sit emplastrum viride.

Epithema sequens contra tumorem testis inflammatorium cum insigni dolore ac ardore ab *Etmüllero* laudibus evehitur, & nostra experientia quoque est comprobatum.

- ℞. *ʒ. Calc. viv.* lbj.  
*Spir. vin. camphorat.* ʒj.  
*Ceruss. vel*  
*Sacch. ʒi* ʒijj.  
*M. F. Epithema.*

Urgentem maximo dolore etiam opii aliquantum addi potest.

Suppuratio, si ad eam tendat tumor, arte promovenda est, & hinc testiculus denuo sanandus, quæ sanatio si obtineri nequeat, testiculus omnimodo excindatur.

Si tumor transeat in Sarcocelen, admodum difficilis ejus est curatio, & sinistro remediorum usu facile transit in carcinoma & cancerum ipsum immedicabilem, uti constat ex *Obs. Wieri lib. 1. p. m. 933 & 934.* ubi refert de cancro latente, qui tandem tanto furore brevi efferebuit, ut ater terriberrimo cum fœtore & frequenti sanguinis fluxu tumoris multam partem depaverit, & miserabilem in modum exederit, ægerque cruciatibus incredibilis continuatione & fœtida putredinis

Ddd 2 exha-

exhalatione victus animam suam Deo liberet redjiderit.

*Cura Testium Viceris.*

In *Ulcerebus* Fistulisque Testium acrimonia corrosiva tum succi nutritii, tum nervei, tum aliorum liquorum testes perfluentium ante omnia est corrigenda & mitiganda, tum internis absorbentibus diaphoreticis cinabarinis, correctâ enim hac acrimonia ulcera ista facilius curantur. Detur ergo decoctum ligni Guajaci, Sassafras, saccharill. vel Tinctura  $\text{Sii}$  n. d. diaphoretica, bezoardica, ~us matricialis, volatilia, quin etiam traumatica, imprimis essentia nostra traumatica cum bezoardica mixta, aliaque generali capite inferius dicenda. Si vero affectus hic suspicionem de lue Gallicâ nobis exhibet, præter decoctâ & alia spiritibus exhibenda præ aliis commendamus ~um matricalem cum elixirio vitæ N. & Extracto Sassafras, & inde sudor excitetur ratione effectû exoptato fallens. Præter interna vulneraria ad topica etiam transeundum, commendamusque imprimis sequens epithema.

$\text{R}$ : Aq. Regin. Hungar.  
fol. sambuci, aa.  $\text{Zij}$ .  
• Calc. viv.  $\text{Zij}$ .  
Balsam. nervin.  $\text{Zij}$ .  
~ Matric.  $\text{Zv}$ .

M.

Cataplasma etiam sequens satis est accommodatum.

$\text{R}$ : Herb. Scord.  
rut.  
Card. bened. aa.  $\text{Mj}$ .  
Coq. in aq. & contusis add.  
Farin. lupin.  $\text{Zij}$ .  
 $\text{Sii}$   $\text{Zci}$   $\text{Zij}$ .  
Camphor.  $\text{Zj}$ .

M. F. Cataplasma.

In fordidioribus verò æuginem æris cum melle rosato, vel aquam viridem Hartmanni, nec non decoctum ligni Guajaci aliaque lue Veneræ convenientia substituiamus, præsertim si malum hoc morbo illi conjunctum sit. Sequens quoque unguentum mundificans erit egregium.

$\text{R}$ : Ol. Hyperic.  
Terebinth. aa.  $\text{Zj}$ .  
Visell. ovi coll. N. ij.

Butyri  $\text{Sii}$   $\text{Zij}$ .

M. F. Unguentum.

Addenda quoque sunt  $\text{Zialia}$ , imprimis sequens.

$\text{R}$ : ~ Matric.  $\text{Zij}$ .  
 $\nabla$   $\Psi$   $\text{Zij}$ .  
Lithargyr.  $\text{Zij}$ .  
Elixir. vitæ  $\text{Zij}$ .  
 $\text{Sii}$  dulc.  $\text{Zj}$ .

M.

Conveniet quoque unguentum rubrum no-

strum super igne calefactum & ulceri immis-

sum.  
In *Erosione* Testium præter prædicta decocta *Chena* lignorum, aliaque diaphoretica, sufficit unguentum nostrum pro excoriatione ex oleo papaveris, cerâ albâ & cerullâ  $\text{Sii}$  paratum, vel sequens epithema.

$\text{R}$ : Spir. vin. camphorat.  $\text{Zij}$ .

flor. sambuci.  $\text{Zij}$ .

Aq. Calc. viv.  $\text{Zj}$ .

M.

Semper tamen in his Testium affectibus eo respiciendum est, ut omnia calidè applicentur, ac rareceatur, quia corpus testium ex meris filamentis nervis compactum, & quasi congeries est fibrillarum, sive congeries minutissimorum funiculorum, vel vasculorum semen venientium, quæ absque ruptione dissoluta & sibi invicem annexa facillimè 20. ulnarum longitudinem excederent in homine, nam gliris testiculus, ceu Celeb. *Muy* testatur ad 15. ulnas extenditur, & *Blankardus* Amstelodamensis, Amicus noster, ad 20. ulnas. Frigida & adstringentia ne adhibeas, circulatio enim humorum per frigida hæc facile retardatur & acrimonia augetur, unde facile abscessus vel ulcus produci potest. Sacculi & pulvres ficci in Excoriatione Testium externe adhibiti non adeò contemnendi usus sunt, ut pulvis liquiritiæ, althææ, florum sambuci, camphoræ, lithargyr.  $\text{Sii}$   $\text{Zci}$ ,  $\text{Sij}$ , lapidis calaminaris, Oli,  $\text{Sii}$  dulcis, ocul.  $\text{S}$ , cretæ, aliaque plura absorbentia, quæ omnia acres succos inbibunt, item volatilia quæcumque, quæ succos stagnantes liquidiore, & sic ad motum progressivum idoneos reddunt.

In *Contusione* Testiculorum eo semper respiciendum est, ut succi stagnantes ac per compressa ac dilacerata vasa effluentes resolvantur ac discutiantur. hinc conducunt varia absorbentia ac diaphoretica, quæ omnem impleant paginam, quia grumos sanguinis aliorumque succorum attenuare ac resolvere possunt, qualia sunt  $\text{Sium}$  diaphoreticum, oculi  $\text{S}$ . C. C. philosophice unicornu fossile, ebrii, mandibulæ lucii, mumia & sexcenta alia. Nec hic negligenda sunt Salia volatilia egregiam opem afferentia, quæ tamen in diead  $\text{Zj}$ . assumenda sunt, aliis non multum opis ab iis expectabis. Inter externa topica sint res solventia, paregorica, discutientiaque, ex quibus eminent cataplasmata ex bryonia, herbis emollientibus, floribus sambuci, meliloti, anthos, summitatibus majoranæ, thyni, &c. Ex mastice, succino ac thure, foliis sabine, aliisque fiant suffumigia. Instituantur etiam fotes, sed præ aliis commendamus ~um vini camphoratum,  $\nabla$  Regin. Hungar. ~um matricalem cum camphorâ,  $\nabla$  an  $\Psi$  calidè aut tepidè cum elixirio vitæ N. applicata.

## CAPUT II.

### De Scroti Hernia, Tumore seu Inflammatione, Excoriatione, Ulcere & Vulnere.

$\text{S}$ .

I.

UT extra corpus pendentes Testiculi, nulloque muro osseo, ut reliqua viscera, præmuniti, ab externis periculis tuti suo fungantur officio, sapientissimi Creatoris providentia pluribus investiantur & involvantur

tunicis, quarum externa crassior sacculus est satis accommodatus, & quasi bursa testiculorum se contentos custodiens, indeque à scorteo, Veteribus usitato quodam sacculo coriaceo, scortum, & per literarum transpositionem *Scrotum* appellatum,

pellatum, quod pro variâ corporis commotione niolle quidem & rugis dotatum esse debuit, attamen à morbis liberum, quos proinde Medico aut Chirurgus quamprimum removere incumbit. Contingit enim haud raro, ut ingentem in molem extendatur, & non modò Testibus sit nocuum. sed incesum quoque impediât, dum à diversis Herniarum aut Tumorum speciebus prehenditur, vel unitas ejus dissolvitur, nec Testes decenter continere valet. Communis quidam morbus ei obtingit, dum Hernia vel Cele vexatur, qui ab Oschei nomine, quo Graeci bursam hanc indignant, in genere *Oschecele* vocatur, cujus species sunt Epiplocele, Enteroccele, Hydrocele, Pneumatoccele, Sarcoccele, Cirioccele.

*Oscheo-Epiplocele* est Scroti nimia distensio ab omento per relaxatum peritonæi procellum è sede suâ in hoc prolapsio inducta.

*Oscheo-Enteroccele* est similis scroti distensio, & magnitudinis ejus inconueniens incrementum, ab intestinis eodem modo prolapsis dependens.

*Oscheo-Hydrocele* est intumescencia scroti à lymphâ evalata & nimia copia in sacculo hoc collecta ortum habens Germ. *ein Wasserbruch*.

*Oscheo-Pneumatoccele* est Scroti ab aere facta nimia distensio, Germanis dicitur *ein Windbruch*.

*Oscheo-Sarcoccele* dicitur, dum Scrotum ob Testes variis nodis aliisque spongiosis excrescentiis inordinatè auctos nimium extenditur.

*Oscheo-Cirioccele* est distensio Scroti à venis testicularum nimium dilatatis, ruptis aut circa testiculos convolutis inducta.

*Tumor Scroti & Inflammatio.* *Tumor Scroti inflammatorius* est ejusdem vitiosum incrementum ex succorum in tubulis ejus stagnantium & in motu suo progressivo impeditorum augmento pronatum, dolore pulsante & urente satis molestum, & colore in rubrum mutato conspicuum.

*Excoriatio Scroti*, est externarum ejus partium, cutis nempe ejusque glandularum dilaceratio à particulis acris corrosivis in lymphâ ut plurimum contentis & ibidem subsistentibus, vel aliunde irruentibus exorta.

*Vlcus Scroti* est solutio unitatis à particulis acris corrosivis, intimiores scroti cutis glandulas ipsasque membranas perforantibus producta.

*Ulcus Scroti* est solutio unitatis à particulis acris corrosivis, intimiores scroti cutis glandulas ipsasque membranas perforantibus producta.

*Ulcus Scroti* est solutio unitatis à particulis acris corrosivis, intimiores scroti cutis glandulas ipsasque membranas perforantibus producta.

*Ulcus Scroti* est solutio unitatis à particulis acris corrosivis, intimiores scroti cutis glandulas ipsasque membranas perforantibus producta.

trahatur & corrugetur, unde facile ratio dari potest, cur in ægrotantibus infantibus corrugetur vel relaxetur hoc scrotum, quando enim mulierculæ scrotum corrugatum conspiciunt, infantem rectè valere judicant, contrâ verò si relaxatum propendeat, ipsum ægrotare dicunt, quod & de viris dici potest. Si *Subjæctum cauda* in Herniis simul lustrare velimus, non aliud, nisi Peritonæum est, ejusque procellus lateralis sinistèr. Subjæctum adequatum, ut dicunt, sunt intestina proximè huic loco accumbentia, & ordinariè ab his thermopylis seclusa, uti per inmechanam notum est, per minores canales concedi posse transitum peculiarem, citra adaptam portam pro aliis quibuscumque. Hic verò ampliori concessio spatio & pondere suo prolabantur mox intestina, & eadem ampliant sibi spatium, comprimis & ipsa magis expanfa, nominandum hinc ileum, quod & longissimum omnium, & lubricitate magis ad exitum pronum, & quod palmarium potest, accubans huic regioni. Locus illapsus est processus peritonæi, quo mediante communicant cum reliquo corpore testes, extra mœnia quasi publica locati, latis illuc valis spermaticis & communi speciei usui & proprio testium dicatis. Procellus ille transitum concedit canalibus feminalibus & per accidens quoque intestinis. facta hic locorum læsione particulari imprimis nimia dilatatione.

*§. 3. Hernia Scroti* cognoscitur ex ipsius tumore sæpe valde magno ac dolorifico, ejusdem cum cute sanâ coloris, termina in abdomine adsint ac ægri evomunt quicquid assument, quando scilicet intestina refritui nequeunt, quæ in scrotum prolapsa ægros molestant, & in ipso incellu impedimento sunt, si verò in locum suum recedunt, ægri nullum sentiunt incommodum. *Oscheo-Epiplocele* ab *Oscheo-Enteroccele* ità discernitur, quod omentum in scrotum prolapsum tumorem reddat magis inæqualem, quin intestina, & diffici-lius, at sine murmure, reponatur, intestina verò levi pressione manus, sed cum rugitu quodam ob statum in se contentos facili in pristinum retrudantur locum. *Oscheo-Hydrocele* nulla manus pressione minuitur, sed figura tantum mutatur, & mollis est, & nisi aqua inter testium uembranas abdita sit, aut propriâ in scroto cystide includatur, tumor hic lumini oppositus perspicuus existit, æqualis & mollis, nullus dolor ferè adest, nisi lymphæ acris existat, vel nimia copîa extensionem maximam inferat, aqua potest hinc inde manum moveri. Si aqua in propria cystide continetur, tumor rotundus est, sin in teste, oblongus magis & ovalis. *Oscheo-Pneumatoccele* facile cognoscitur, tumor enim levior est & mollior, & ex impulsu resonat. In *Oscheo-Sarcoccele* sæpe præcessit causa externa contudens, cujus aliqua adhuc restant vestigia, adest durities & color rufus. *Oscheo-Cirioccele*prehenditur ex venarum flexibus duris, rotundis, & nodosis tactu facile perceptibilibus. In *Oscheoccele* sæpe tumor sensim increfcit, adestque immixta movendi promittudo, partium ob articulationem femoris per accidens ac consensum læsam ob tumorem auctum, qui illam impedit; partim ob tensionem maiorem motu & decubitu graviore inductam, utrobique spiritibus magis defatigatis & impeditis, ægri tentant à pastu doloreni gravatium abdominis ad locum



locum affectum protensum, desidenti vel decumbenti levamen contingit, caput quandoque dolet, extraverso tumore. Aliquando etiam in Scroto calculi observati sunt, est notum mihi exemplum in puero Francosurti undecimum nondum egresso annum, ex cuius Scroto à Chirurgo aperto 60. calculi diversæ figuræ caloris flavi eximebantur.

*Inflammatio* Scroti cognoscitur ex ipsius tumore, dolore, rubore & calore, sæpe conjuncta cum febricula, & eadem hic apparent signa, ut in aliarum partium inflammationibus.

*Excoriationis* Scroti innoteſcit ex dolore urente & cuticulæ ablatione, ipsoque aspectu cuilibet facile patet, Hydropsicis est solennis. per hæc enim loca effluit lymphæ, unde aliquot hydropes hoc modo jam vidi terminatos.

*Ulcus & Vulus* Scroti facile in sensus incurunt, adeo ut non opus sit id, quod satis notum, multis verborum ambagibus obscurum reddere.

*Ætiologia morborum horum secundum Galenum.*

§. 4. *Ætiologia* morborum præsentium ita format *Galenicæ*, ut in *Oſcheo* *Epiploce* tanquam causas acculent quascunque violentias processum peritonæi vel nimium dilatantes, vel planè rumpentes, ut major omenti portio per rimam illam extra inguen in ipsum Scrotum dilabatur, uti in *Oſcheo-Enterocœle* Intestinum aliquod, præsertim cæcum magis quam cætera solutum, quarum violentiarum numero inseruit lapsum ex alto, cursum vehementem, gestationem ponderis aut dimotionem molis gravioris, sæcum siccatum expulsionem, conatum quemcumque magnum, tussim asperitiam, proclinationem maximam, tubarum aliorumque instrumentorum musicorum multam anhelitus contentionem expostulantium inflationem diuturniorem, flatum in intestinis copiosos eadem propellentes, & id genus alias. *Hydrocœlen* Scroti oriri dicunt ab excremento seroso in Scroto paulatim collecto. & vel ex partibus superioribus, & quidem abdomine potissimum in hydropicis destillante, vel ex vasis urinariis rarioribus, vel ab urina acriori erosius transudante, vel ex refrigeratione Scroti & sanguine per vasa spermatica eo delato frigidior, sensim coacervato. *Oſcheo-Pneumatoceles* causam constituunt flatum ab intestinis Scroto ipsi communicatos, quos ob caloris defectum adeoque intestinorum frigi ditatem magna copia in iis generari volunt; *Sarcocœles* Scroti causam vel sanguinem purum aut impurum, vel semen diu collectum & retentum existere dicunt, in excrescentiam ejusmodi carnosam à natura transformatam. *Circocele* Scroti oriri asserunt à sanguine crasso & flatulento, sive melancholico in vasa Scroti copiosius effuso, præsertim in venas, quæ proinde ab eodem ita ampliuntur & dilatantur, ut tumorem istum obliquum præsentent.

A variis humoribus in Scrotum effusis aut in eodem collectis etiam alios ejusdem *Tumores* pronasci statuunt, inter quos *Inflammatio* ejus causam agnoscat sanguinem vel purum, vel bile aut pituita commistum, & ab externâ quadam occasione, contusione scilicet, agitatione aut frictione allectum & in Scroto retentum.

*Excoriationis* Scroti causas recensent humores falsos vel acres, urinam in ipsis infantibus, serum in hydropicis, vapores & impuritates acres circa Scrotum collectas, vel scalptionem abs quibus cuticula Scroti eroditur aut planè abraditur.

Ab iisdem, maxime tamen humoribus acribus interius ad Scrotum irruentibus *Ulcus* ejusdem excitari dicunt, uti *Vulus* ab externis violentiis, secando, pungendo, contundendo, vel urendo continuitatem ejus dissolvitibus.

§. 5. *Paracelsus* quod *Oſcheo-Epiploceles* & *Enterocœle* causas telleram adjicit prioribus, affirmans, eas ab intestino vel omento in *Oſcheum* delapso produci. *Herniam* verò Scroti *Aquosam*, ex eo loco provenire statuit, in quo sita fuerit, esseque liquorem in *Oſcheo* resolutum, productum ab externis accidentibus & causis, cum quisquam læsus fuerit, vel ex abundantia spernatis putrefacti, quod in liquorem sit resolutum, saluatum quodvis resolutum in siuoloco remanere statuit solum, nisi per poros deorsum transeat, quod in *Oſcheo* fieri nequeat.

*Herniam* Scroti *ventosam* ex accidentalibus provenire asserit, esseque arsenicalem inflationem præter salis resolutionem, siquidem omnis inflatio sicca producatur ex arsenico puro.

*Herniam* Scroti *Carnosam* non aliter, quam alcolam vel naphtham originem suam ducere statuit, solumque forma ab eis differre, liquorem quippe nutritivum, quo sustentatur *oscheus*, à verâ substantia separatam, & in excrescentiam transeuntem, herniam carnosam proferte docet. *Herniam Varicosam* ex sale plumoso cum substantiâ resoluta oriri dicit, sæpe ulcus cavernosum Scroti præcedente. Hujusmodi *Hernias* etiam facile sui Gallicæ curatæ succedere putat, quod causam habeat venenum à lue illâ contractum, interdum etiam cum ipsa lue complicari, & tum aquas fluctuantes, tumores, ulcera, verrucas, &c. supervenire, nonnunquam morbo hoc non curato *Herniam pustulosam* adesse commemorat.

*Inflammationem* Scroti ex aluminibus putrefactis, ut in aliis membris, produci asserit, atque ad apostemata accedere, quæ non tantum ad mortem, nec aliam Scroti impotientiam.

*Excoriationis* Scroti originem imputat salicidam foris ad Scrotum vel cum urina, vel sudore delato, aut scalptioni Scrotum superficiei tenus erodentibus, uti ipsum *Ulcus* salicidum adscribit acriori cum liquoribus ad Scrotum pervenienti, & illud ipsum profundius erodenti.

*Vulus* Scroto ab externis quibusdam instrumentis unitatem ejusdem dissolvitibus inferri cum aliis fatetur.

§. 6. *Helmontius* Scroti *Herniam Omentalem Helmontii* & *Intestinalem* ab exorbitatione Omenti & Intestini per foramen inguinale in ipsum Scrotum non sine excandescencia Archæi omentalis aut intestinalis oriri fingit, sicuti *Aquosam* à latice majori copia in Scrotum profluente, *Flatulentam* à Gas silvestri, in quod spermaticum Scroti alimentum fuit transmutatum, *Carnosam* à proprio testium & Scroti nutrimento his in partibus ab Archæo delassato retento & copiosius collecto, & *Varicosam* à vasorum Scroti à sanguine multo cruore reſerto distentione originem sumere sibi imaginatur.

*Inflammationem* Scroti à majori Archæi excandescencia peregrinum aliquod à se depellere nitentis, & propterea cruorem detinentis, signumque furoris sui externè dependentis provenire judicat, *Ulcus* verò & *Excoriationem* ab instrumento externo unitatem Scroti dissolvente.

§. 5. *VVilli*

*W. Illiusm.* §. 7. *VVillusus* in Scroto *Hernia omentalis* & *Intestinalis* dilatationem itidem, vel ruptionem pro-  
cessus Peritonæi accusat, ut vel omentum, vel  
intestinum aliquod per eundem in ipsum  
Scrotum descendat, hocque in tumorem disten-  
dat, ad quam dilatationem, vel ruptionem ci-  
cius inducendam inultum contrahat ipsa Perito-  
næi humiditas & mollities, conatus violentus,  
lapsus & aliæ corporis commotiones vehemen-  
tiores, quibus omentum vel intestina, præter-  
tim cibo & potu nimium repleta, versus Scro-  
tum impetuosi propellantur.

*Hydroceles* Scroti oriri vult à sero copiosiori,  
vel vaporum specie ex sanguine per venas trans-  
sudante, vel propria forma effuso & in Scroto  
collecto, uti in hydropticis sæpe contingere so-  
leat, in quibus etiam latex in abdominis cavi-  
tate collectus per ductum Peritonæi destuat, &  
Scrotum distendat.

*Pneumatocelen* Scroti induci credit ab halitibus  
ex sanguine spirituosiore per arterias delato assidu-  
o in Scrotum decedentibus, vel a viotibus con-  
vulsivis scrotum nimium distendentibus, quod  
distensum deinde flatus occupent copiosiores.

*Sarcocelen* Scroti oriri dicit à succo nutritio-  
copiosius ad testes & scrotum delato, & ibidem  
subsistente, eo quo excrementa huiusmodi tan-  
dem emergat, uti *Cirsoceles* à sanguine faculen-  
to & venarum aliquo in loco compressione, unde  
per ea non facile persulfere possit, sed diutius  
hæreat, & venas distendat.

*Inflammationis* Scroti causam ponit sangui-  
nem in tunica huius vasculi minoribus ac intersti-  
tiis ob lentorem obstructum aut extravasatum,  
& hinc ob turgescentiam copiosius aggestum;  
& effervescendo tumbrem, calorem & dolorem  
excitantem.

*Excoriationem* Scroti, in pueris potissimum  
ab urina falsâ diutius partem hanc inundante,  
& cuticulam tandem erodente produci putat;  
nec non à latice cutaneo acriori, vel scalpione  
alijsve causis acerbis corrosivis.

*Ulcera* Scroto contingere dicit vel ab infla-  
matione suppurata, vel ab humoribus in Scroto  
diutius retentis & tandem corruptis, ut tunicam  
hanc corroderent planè dissolvant.

*Vulnera* Scroto inferri novit ab exter-  
nis instrumentis continuatam ejus dissolven-  
tibus.

*S. 8. Sylvius* ab Omenti vel Intestini orum ve-  
hementiori in Scrotum propulsione *Epiploceles*  
vel *Enterocelen* progenerari dicit, ut in fortiori  
fecum induratum excludente, vel alio quodam  
conatu aliquando contingere soleat. *Hydroce-  
len* à lymphâ à vasculis diruptis in scrotum effusa  
produci vult, uti in Ascite quandoque fiat, in-  
terdum verò particulariter vas lymphaticum in  
scrotum distributa à diuturniori obstructione,  
à pituita stagnante succo proprio dirumpi, ut  
succus contentus ita effundatur & scrotum dis-  
tendat. *Pneumatocelen* ex flatibus in Scroto  
collectis illudque distendentibus. *Sarcocelen*  
ex sanguine bene nutritive ad testes & scrotum  
copiosius allabente, & *Cirsoceles* sanguine in Ve-  
nis propter obstructionem aliquam diutius hæ-  
rente emergere aucterit.

*Inflammationis* Scroti causam statuit sangui-  
nem in vasculis scroti vel glandulis ejus diutius sta-  
gnantem, cujus particulæ acidæ, amissis volati-  
lioribus spirituosius cum oleosis effervescant, &

hæc ratione non modò tumorem, sed calorem  
etiam, tumbrem & dolorem exsuscitent.

*Excoriationem* Scroti Infantibus contingere  
docet ab urina acriori cuticulam erodente, vel  
ab alio quodam humore acri, aut agitatione &  
frictione huius partis, ut cuticula dissolvatur.

*Ulcus* Scroti ab acido acri in lymphâ potis-  
simùm diutius in Scroti partibus stagnante con-  
tento, & *Vulnus* ab externis instrumentis in-  
ferri proficitur.

§. 9. *Cartesiani* nullam aliam constituunt cau-  
sam *Oscheo-Epiploceles* & *Oscheo-En erecles*, *non*  
quàm ampliore Peritonæi dilatationem à cau-  
sis violentis inductam, ut omentum vel intesti-  
num aliquod, maxime ileum, in Scrotum dila-  
tat, & hoc in tumorem distendat.

*Hydroceles* Causam proximam nominant effu-  
sionem lymphæ à vasculis propriis in Scrotum, an-  
tecedentem vasorum lymphaticorum disruptionem,  
remotiores verò lapsum, saltum, equita-  
tiones, contusiones, & quicquid vasâ diffinge-  
re potest, quibus addunt exulcerationes abdomi-  
nis, ex quibus materia serosa per processum Perito-  
næi in Scrotum adinfluat.

*Oscheo-Pneumatocelen* causam alagere solent  
aerem in Scroto contentum, illudque spasmo-  
dicè distendentem, uti *Sarcocelen* originem im-  
putant succorum per arteriolas ad testem af-  
fluentium incastationi & stagnationi, ex inepta  
curatione Inflammationis per refrigerantia &  
incrassantia remedia ductæ, abs quibus tubuli  
constringantur, & de novo affluentibus succis  
transitus denegetur, hinc per diuturniorem sta-  
gnationem indurati, & testiculum cum Scroto  
distendentes excrementa præsentent; nec  
non contusioni testiculorum, ex quorum tubu-  
lis diffractis succi emanantes fibris adhæreant,  
& motu suo destituti coagulentur, sicque in  
ejusmodi abeant excrementa.

*Cirsoceles* causam esse dicunt, aut obturatio-  
nem aut compressionem venarum Scroti & tes-  
ticulorum, unde sanguis continuò per arterio-  
las affluens per venas nequeat profluere, sed in  
iisdem diutius hærens, & temporis succellu au-  
ctus easdem distendat, & oppendo intumescere  
faciat; cui compressioni aniam præbere valent  
contusiones, lapsus, equitationes, aliæque  
causæ remotiores ex superioribus jam cognitæ.

*Inflammationem* Scroti ab induratione seu  
incrassatione succorum oriri statuunt, qui in  
tubulis Scroti ob crassitatem diutius hærentes,  
non modò ob diversas suas particulas, porositas  
nempe & angulares, mediante materia ætherea  
varie bulliant, sed fibræ tubulorum distendant;  
& ita tumorem procreant, quin arteriolas com-  
primendo pulsum reddant auctiorem.

*Excoriari* Scrotum dicunt ab urina particulis  
acutis acidis aut salis, fortiori scalpione, reme-  
diorum aliarumve rerum acrimia admotione,  
lymphâ corrodente in hydropticis, aut hy-  
drocele per Scroti poros exsudante, alijs-  
que cuticulam à cute dissolventibus & dila-  
tantibus.

*Ulcera* Scroti sæpe Inflammationem, alios-  
que tumores subsequi docent, particulis succo-  
rum stagnantium acutis in reliquis dominium  
exercentibus, & fibrulas tubulorum dissolven-  
tibus, tum etiam remedia corrodentia, vel  
Luem Veneream, in qua succi corrupti fibrulas  
erodant, & succorum effluxum promoveant.

*Vul-*

*Vulnerari* norunt Scrotum à rebus externis, quas alii jam indigitarunt.

§. 10. Præmissis hæc, ut pauca quædam addamus, *nostrâ* sententiâ *Causa Epiploceles & Enterocæles* Scroti non aliunde, quam à relaxatione Peritonæi oritur. Hæc verò relaxatio produci-  
*nostra mens de causa Oscheo-Epiploceles & Enterocæles.*

tur, vel quando multi ejusdem tubuli obstruuntur, inque illis stagnant ac coarcentur humores, qui cum tempore se insinuant in fibrillas peritonæi, illudque hoc modo relaxant, vel si vi quadam vehementi omnes fibrillæ una vicelacerantur & distrahuntur, unde necessariò relaxari debet peritonæum, quod fit à causâ quacunque violenta, vel ab efflacione, saltatione, lapsu, ictu, &c. sic etiam à motibus quibuscunque violentis, tusu, sternutatione, vomitu. Fit etiam Hernia sæpe ab aere frigidior & acido, tanquam causâ remotâ poros intestinorum obducit, quod præcipue contingit, quando intestina diutius, quam par est, extra abdomen permanent, in scroto enim minor est calor, quàm in abdomine, hinc pori intestinorum eo modo aliquatenus obcurati faciunt, quo minùs vapores ob minorem calorem etiam aliqua ex parte condensati ex intestinis in scroto latentibus liberè quaquaversum egrediantur, quapropter illi coarcentur sunt in intestinis, illudque distendunt flatibus, videas enim sæpiùs quietè degere herniosos, quando autem aeri frigido exponunt suum corpus, accendi dolorum facies, tumorem augeri, indurari, incarcerari & minitari horrenda alia mala. Huc referri possunt cibi & alimenta, potulentæque nimis frigida, hinc nuper quidam ex tali potu in lethalem incidit herniam. Pertinent etiam huc animi pathemata, alvi constipatio nimia, quæ multum contribuere possunt ad stagnationem humorum. Disrumpi nemo negat in hernia hacce tunicam peritonæi interiorem, expandi verò duntaxat & relaxari externam, adeò ut extensio sit inæqualis.

*Causa Hernia Scroti i Aquosa sive Oscheo-Hydroceles* est: ruptio vasorum lymphaticorum scroti à causâ violenta, vel lapsu, contusione, saltu, equitatione, aliisque, quæ canales hos lymphaticos vi quasi lacerare ac disrumpere queunt, ut lympham contentam effundant, quæ in scroto profluens illud copia sua distendit, & tumidum reddit.

*Oscheo-Pneumatocele* ab aere in scroto retento originem sumit, eo quod partes quædam convulsæ ei transiunt denegent, hinc ab externo frigore scrotum immediate ambiente facillè contrahitur, cujus acidum fibras vellicat, & poros occludit, ut nulla fieri possit exhalatio, adeoque id quod evaporari debebat, intus retentum membranas distendit, & partem reddit tumidam absque insigni duritiæ instar vesicæ aere sive vento repleta & quasi inflatæ, & quidem aer seu ventus hic sæpius inter tunicas testem obvolventes contiuetur, quæ ita inflatæ tumorem hunc etiam in scroto præsentant.

*Oscheo-Sarcocele* frequentius oritur, dum scrotum læditur per contusionem, ut fibris dilaceratis & tubulis destructis succi effusi circa fibras læsas stagnent, & stagnando cumalati tandem coagulentur & indurescant, sicque excrementum ejusmodi exhibent carneam.

*Circoscele* in Scroto generatur, quando circa venarum valvulas portio quædam crassior hæret sanguinis easdem obturans, & aliis sanguini

de novo & assiduò ex arterioliis in venas affluenti denegat transfluxum, quare sanguinis copia in venis relictis easdem in tumorem extollit, quod etiam fieri solet, si ex lapsu, vel alia quadam causâ venæ comprimantur, & per compressionem istam angustentur, nec sanguinem transfluere facillè permittant.

Prioribus Herniarum speciebus *Barbette ad-Spermatocele* huc *Spermatocele* addit, quamvis improprie ita appellatam, quæ fit, quando vas ejaculatorium corrugatum in scroto delabitur.

*Inflammatio* Scroti oritur ab humoribus circulantibus extravasatis, & in Scrotum effusis, in ejusdemque ductibus & glandulis stagnantibus & corruptis. dum pora ita angustantur, ut sola primi elementi materia transgessum per eodem reperiat, quæ igneis suis particulis statim calorem, ruborem, dolorem ac febriculam producit, in quibus præter tumorem ipsâ inflammatio consistere ab omnibus creditur; Tumor verò oritur ab evasatis succis ibidem stagnantibus, & canaliculos Scroti distendentibus.

*Ulcera & Excoriationes* Scroti pronascuntur à particulis valde acutis corrolivis in lymphâ aut sanguine, aut succo nutritio, aut nervo, per scrotum circulantibus existentibus, ipsasque fibras ac glandulas Scroti cutaneas lacerantibus ac dissolventibus, quod sæpe in scorbuto, gonorrhœa, ac lue Venerea contingere solet, uti pluribus exemplis probare possum, si ea non essent odiosa. In *Excoriatione* causa est minor, ulcus enim & excoriatio tantum secundum magis & minùs differunt.

*Vulnere* causa ex superioribus satis sunt perspecta, ut nulla hic indigeat repetitione, sunt enim violentæ, sive ictus à gladio, vel scopeto, vel aliz.

§. 11. *Hernia Scroti* satis periculosus est affectus, imprimis si Omentum vel Intestinum diu extra abdomen permanerit; Omentum enim magnum inter dum sumit incrementum, & pondere suo intestina & ventriculum versus interiora trahit, unde cibi digestio impeditur. Intestinum quoque sæpe gangrænâ afficitur, unde necessariò mors ultima rerum linea præsto est, ceu patet ex observatione Cl. D. *Mays Prax. Chirurg. Rational. Obs. 3. p. m. 195.* ubi refert virum 40. annorum Ultrajectum Arenacum peditem profectum incidisse in herniam scrotum infestantem, (cui herniæ antea etiam obnoxius fuerit, sed tantum in inguine:) & tamen adhuc per 4. horas inaccessibile pedibus, unde tumor valde excreverit, qui valde durus fuerit ac dolens, ægrum interim semper vomuisse, ac frigori expositum in stramine per totam noctem jacuisse apud rusticum, postero die manè advectum fuisse Arenacum continuò vomentem, ubi variis propinatis ægrotum quarto die morbi è medio sublatum fuisse, pullum sensum diminuto. Aperto cadavere intestinum ileum inventum fuit gangrænâ affectum, spithamæ longitudine, ac situm in scroto cum flatibus excrementisque duris; præterea magna pars omenti continebatur in scroto convoluta instar pilæ cum valis sanguiferis valde distentis. Sic li peritonæum ruptum fuerit, curatio est difficilior, quàm si tantum relaxatum fuerit. Quo altiores egerint radices Herniæ, eo difficiliores sunt curatæ. In pueris curatio est citius speranda, quàm in Senibus. Si plures status fuerint conjuncti, tunc

tunc hernia est dolorosa, hinc oriuntur inflammationes, gangræna, morbus iliacus, & sæpe ipsa mors.

Ab initio *Hernia aquosa* curatu faciliior est, quam iam inveterata, per moras enim diuturniores lymphæ acrior reddita facili marte fibras scroti corrodit, unde gangræna oboriri potest. Quo testiculo propior est hernia, quam inter cuticulas, eò difficiliior est curatu.

In junioribus herniæ sunt faciles curatu, solo enim emplastro de labdano, vel alio meo ad hernias, adjecto aliquando alimento plures curatos vidimus, contra in senibus difficiliiores sunt curatu.

*Pneumatocèle* in principio non ita difficulter curatur. nec adeo periculosa est, sed sitientes convulsivæ diutius durent, majus minatur periculum.

*Sarcocèle* & *Circocele* in principio interdum emolliiri possunt, sed valde indurata remediis vix obediunt, & nisi sectione auferri nequeunt.

*Inflammatio*, *Excoriatio*, *Ulcera* & *Vulnera* Scroti non sunt vilipienda, quia pars hæc facili sphacelatur, unde non mirum, quod à *D. Stalpart van der W'iel*, amicus noster expatissimus in suis *Observ.* var. 363. scrotum omne sphacelo ablatum viderit, quod & ego *Franchallii* observavi in viro 40. annorum scorbutico. Si verò optimis & congruis in principio inflammationi Scroti occurrat remediis, non ita difficulter abigi potest, ut & *Excoriatio*, *Ulcera* Scroti curatu quidem sunt difficiliora, adhibitis tamen medicamentis aptis intra diebus plura vidi sanata. Sæpe cum levamine ægrotorum per scrotum observavi serum effluere, & militem novi Hanoviensem hydropicum. qui per scrotum non aliter ac per cybrum viginti sex libras aquæ emittebat, & planè convaluit. In lue Venerea sæpe semper madent hæc partes, & excoriantur.

*Diana.*

§. 12. Ægris his morbis laborantibus omnia acida, frigida, austera; salia ac viscida interdicenda sunt, contra volatilia, calida & liquida præscribenda, hinc enim melius se habebunt homines, & non facili in hos incident Affectus. Imprimis in hernia ab exercitiis vehementioribus abstinendum. saltatione nempe, equitatione, lapsu, &c. Herniæ huic obnoxiiis potus Therac modicè & medicè assumtus optimè conducet. Animi pathemata, quæ ad stagnationem humorum circulantium multum contribunt, vehementiora angue pejus fugienda sunt. Alvus sit semper libera, quod obtinebis, si dictam superius dictam bene observes, hinc enim solvuntur excrementa sponte, & non opus est purgantibus & laxativis, quæ sæpe plus obstant, quam profunt.

Dieta Inflammationis! Ulcerum ac Vulnerum sæpe eadem est, & cum alibi hæc tradiderimus, eam sæpe repetere non licet.

§. 12. Curationem ita instituunt *Galensci*, ut in *Oscheo-Epispacèle* & *Enterocèle* omentum, vel intestinum prolapsum ex Scroto in abdomen, & locum pristinum restituant, quæ restitutio eo melius ut perficiatur, imperata prius inedia, alvum enemate evacuant, & fotibus, balneisque peritonæi meatum adhuc magis relaxant, tum manibus omentum vel intestinum urgent, ut in ventrem sive sedem debitam recedant,

quod si pro voto factum sit, remediis adstringentibus aptisque ligamentis eadem coercent, ne denuò prolabantur, ipsumque peritonæi meatum relaxatum, vel disruptum adstringunt & occludunt remediis internis, & potissimum externis, fovebæ ex herbis plantaginis, polygonii, herniariæ consolidæ majoris, foliis berberis, floribus rosarum, stæchadis, balauistiis, gallis viridibus, nucibus cupressi, corticibus granatorum, radicibus consolidæ, bistortæ, aristolochiæ, aspodeli, narcissi, pentaphylli, rubiæ majoris, semine nasturtii torrefacto, alumine trito in vino rubro, & aqua maceratis, & calidè adhibitis, vel emplastris compositis ex iisdem simplicibus additisque gummi galbano, Ammoniaco, Serapino, tragacantho, Arabico, Sarcocolla, sanguine draconis, thure & mastiche, succino, aloë, myrrha, bolo, terra sigillata, gypso, colophonia, mumia, vermibus terrestribus exsiccat, pilis marinis pilis leporinis, pelle ermacei, blatta byzantina, &c. & vel cum albumine ovi, vel pice navali, cerâ & terebinthina exceptis, vel ichthyocolla in aceto solutâ, in emplastrum redactis & inguinis regioni appositis. Horum operationem ut aliquantum juvant, etiam interna quædam remedia simul in ulum ducunt, quæ pulverum, pilularum, Sympliciorum & electuariorum forma exhibent, & parantur ex herbis balsamina, equiseti, herniariæ, polygonii, caryophyllatæ, radicibus consolidæ, bistortæ, tormentillæ, valerianæ, plantaginis, tubiæ majoris, seminis busanisi, nasturtii tosti, myrtillorum, coriandri ex aceto pp. pilulis cupressi, trochiscis de spodio, decharabe, chalybe pp. & similibus. Hicce verò remediis quando ob majorem peritonæi relaxationem, vel etiam ruptionem nihil proficiat, vel solis vinculis, & imprimis veteribus lupo nominato, intestina & omentum in abdomen repulsa coercent, ne in scrotum relabantur, aut si nihilominus cura ab ægris urgeatur, ad sectionem progrediuntur, quam tamen periculosam exituram præmonere solent, cum præmissis infestationibus emollientibus ægrum aliter alligant, itaque locant, ut caput aliquantum sit declivè, pro faciliiori intestinorum in abdomen regressu, hinc cruribus & genibus ductis inguen ad processum usque peritonæi novacula dilecant, quo facto intestina ab involuero processus liberant, hoc cum teste & vase spermatico aliquando resectis, illis verò repositis, foramen filo factis crasso mediante acu incurvata trajecto meatum constringunt, & vulnus emplastro Apostolico, vel alio quodam conveniente cludunt. Aliqui verò ut tutius proponant remedium feramentum candens circa pubem supra rupturam sæpius admotum, quo curis non modo, sed ipsum etiam peritonæum contrahatur, & meatus constringatur, sicque prohibeatur, ne omentum vel intestina in scrotum denuò delabantur.

*Oscheo-Hydrocèles* curationem ita aggrediuntur, ut in Scroto collectum excrementum scrotosum omni studio evacuent, vel discussione obscura minori quidem negotio, sed minori etiam periculo instituenda, vel effusione manifesta per operosiores Chirurghiæ celebranda. Pro discussione impetranda fotus instituunt calidos sæpius repetendos & componendos ex foliis apii, petruselinii, ebulli, ceterach, baccis lauri,

E e e

semine

Curatio  
Galenio-  
rum in Os-  
cheo Epi-  
spacèle &  
Enterocèle

femine cumini, sale & sulphure in lixivio ad tertias coctis, cum spongia adhibendis, postque eos cataplasma imponunt ex cochleis contusis, baccis lauri viridibus, sulphure, & stercore caprino cum lixivio multo, aut linimenta inungunt ex oleo rutaceo, liliorum, irino, costino, Unguento Agrippæ, de arthanita; veldenique emplastra adhibent ex Ammoniaco, bdellio, pice, cumino, baccis lauri, sulphure, nitro, alumine saccharino, chalcantho, lythargyrio, flore lapidis Asi, oleis & cera, vel cum pallulis rubris enucleatis tritis commistis, quorum sequens esse potest exemplar.

*℞. Lithargyr.*

*Alum. saccharin. aa. ʒi.*

*Asi ʒb.*

*Chalcantb ʒiij.*

*Resin. pin. lb̄s.*

*Bdellis in vinet. quati ʒv.*

*Oleil. hor. ʒiij.*

*Acet. ʒb.*

*Terenda terantur diligentissime, & cum resina, oleo & aceto calcfactis excipiantur, coquanturque in justam consistentiam Emplastri.*

Si materiæ aquosæ discussio remediis hisce impetrari nequeat, apertam eius effusionem instituunt operatione Chirurgica, & quidem vel cauterio scroto adhibito, ut per ulcus studio factum materia aquosa superflua effundatur, vel cultello scrotum à media parte pubem versus dissecando, quam operationem ita aggrediuntur: Ager deorsum pube & scroto, si opus est, supinus in subfello collocatur, natibus linteis multiplici, & spongia magna scroto subiecta. Chirurgus à sinistra parte sedens ministro à dextra sedenti mandante, pene in alteram partem reflexo, scroto pellem sursum versus abdomen extendere, ipse verò hoc facto scrotum à media parte ortus in longitudinem prope pubem usque recta incisione fecit, quæ à linea scrotum dividente æqualiter distet, summaque diligentia ad erythroidem usque descendit, oras plagæ hamis aperit, & specillo herniario & scalpello tunicis dartis ductis erythroidem denudatam per medium dividit, eâ potissimum parte, quæ à testiculo separatur, tum humore vel in totum, vel majori ex parte evacuato erythroidis partem quamque tenuissimam extrahit, & vulnus vel futuris, vel adstringentibus remediis & sarcoticis claudit, aut si Colum scrotum divisum fuerit, solo emplastro barbaro superimposito illud sponte conlescere permittit. Ubi testiculus putredine, aut vitio quodam insanabili affectus fuerit, venis nervo cremasteri annexis prius diligenter alligatis nervum ipsum cum vinculo quocumque præciunt, & testiculum corruptum eximunt. In Biherniis scrotum in utraque parte juxta inguina incidunt, & capitulo per incisionem in innum demisso scrotum insinuant, & scalpelli acie paululum subleant, ut sanguini concreto aut puri exitus paretur, tum specillo linamentum, vel lemniscum trahunt, & ulceribus spongiâ detectis, lanam oleo inspersam per plagam deorsum ad testiculum conjiciunt, aliamque vino, cui oleum additum, madidam scroto, abdomini, inguinibus, inter-

femineis & lumbis extrinsecus imponunt, superaddito linteo triplici, & deligationibus institutis sexticariis, aliisque accommodatis hoc facto, & agro reclinato lanas scroto subiciunt, quo requiescat, iisque alutam mollem ad fomentum, quæ ex oleo calido ad tertium usque diem continuant, in spersionem excipientem sustinent, tertio post die resolvunt, linamentum tetrapharmaco imbutum in vulnus injiciunt, lemniscum ex polline immutant, ob inflammationem extrinsecus madefaciunt, & medicamentum aliquod ad custodiam linamentorum superdant, donec ulcere expurgato, & carne mediocriter superinducta, locum abluant, lemniscum extrahant, & adstringentibus, sarcoticisque integram conglutinationem absolvant.

In *Osteo-Pneumatocele* ad flatuum discussio-  
nem omnem operam & subsidia admovent, scro-  
tum sæpius calidè fovendo cum spongia expres-  
sa ex lixivio, in quo semina anisi, fœniculi, fœ-  
sely, cumini, carvi, bacæ lauri, summitates  
anethi, folia rutæ, flores chamæmeli prius bul-  
lierint, post solum cataplasma adhibent ex farin-  
is fabarum, lupinorum, orobi, pulveribus femi-  
nis cumini, apii, petroselini, cardamomi,  
fœniculi, in vino generoso coctis, addito oleo  
anethino, irino, aut rutaceo, vel aliud ex ster-  
core vaccino, sulphure vivo, pulvere cumini,  
melle anthosato, & oleo rutaceo paratum, quo-  
rum loco etiam emplastrum de meliloto, vel de  
baccis lauri imponunt, aut scrotum oleo ruta-  
ceo, laurino, anethino costino, vel alio quodam  
conveniente inungunt.

Ad *Sarcocelen* nondum adeo confirmatam cu-  
randam remedia adhibent resolventia, tum ad-  
stringentia, repellentia & exsiccantia, ut empla-  
strum diachylon cum gummi, cataplasma ex  
farina fabarum, vel orobi in lixivio cocta, aut  
fomentationibus ex aceto aut decocto adstringe-  
nte, interne quoque absumptia propinant, quæ  
sunt pulvis corticis radicis ononidis per  
plures menses cum vino potus, cortex exsic-  
catum & pulverisatum quotidie in vehiculo ido-  
neo assumunt. Confirmatam verò jam nullâ  
aliâ cura auferte nōrunt, quàm amputatione,  
& quidem eam solam, in qua caro non aliis  
assurrexit, nec inguen occupavit, tum enim  
morbum hunc planè censent incurabilem, cum  
portione iustantillæ relicte adnascatur fungus,  
& malum reddatur deterius. At in tumore  
exiguo, vel mediocri amputationem ita insti-  
tuunt, ut comprehenso toto tumore scrotum  
ad illum usque incidant, hinc totum id corpus  
tumidum, testiculum scilicet cum processu ad-  
hærente à scroto abducunt, tum acum filum va-  
lidum trahentem per medium processum super  
testiculi tumefacti regionem trahunt, & de-  
nuò secunda vice eam per eundem processum  
intrudunt, nexuque facto ambo fili extrema  
connodant, ita ut altera media peritonæi por-  
tio eodem nexu & nodo comprehendatur; qui-  
bus peractis processum eum totum cum testiculo  
concluso rescindunt & exsiccant, fili, quo super-  
ior processus pars revincta est, extremâ è vulne-  
re scroto longiusculè propendere permittentes,  
donec repellentibus, & constrigentibus em-  
plastris vulnere, fasciâ verò & splenio partibus  
vicinis impositis consolidationem & integram  
curationem pro voto obtulerint.

*Circa*



In Scro-

*Circoscelen* recentiorum nec adeo magnum noctam incrementum, tum emollientibus & discutientibus, tum repellentibus & adstringentibus tractant remediis, ad ulteriorem affluxum & venarum incrementum impediendum, uti fuit pro emolliente & discussione fons ex decocto rad. alth. fol. malv. mercurial. flor. chamomill. sem. fœnigræci, lini, cataplasmata ex iisdem, additis farina fabarum & axungia gallinæ, ceratum ægypti, emplastrum diachylum cum gummi, filii Zachariæ, de Ammoniaci *Forests*; pro repulsionem & adstrictione fons & cataplasmata ex nucibus cupressi, corticibus granatorum, radicibus tormentillæ, bittortæ, floribus rosarum, balauistiis, baccis myrti, terra sigillata, bolo Armeno, hypocistide, sanguine draconis, &c. adhibent, & fasciam aur subligaculum admovent, quo pars non modo sustentetur, sed fluxio etiam venarum inflatio inhibetur; quod si fieri nequeat, sed tumor jam sit inveteratus, ad sectionem pergitur ita instituendam, ut scrotum ad varicem duorum digitorum magnitudinem æquante plaga cunctello facta aperiatur, acusque duplex filum ducens sub venam varicosam, quàm altissimè fieri potest, transmittatur, ut radices ejus vinculo comprehendantur, & denuò ad ejusdem venæ partem imam acus eodem modo submittatur, spatio unius digiti inter vincula ista duo relicto, cujus ligaturæ inferioris filum priusquam constingatur, varicem in medio spatii eodem modo, quo venæ sectio instituitur, aperitur, ad sanguinem illum crassum tumorem hunc in scroto excitantem evacuantum, quo factò plagam aliorum vulnerum more tractant, relictiis filiis, donec per se decident, sic inducitur callositas in venæ parte superiori percrebescit, ne sanguis per eam ulterius transeat, sed à tumore hujusmodi existat immunis.

In Scroti  
Inflamma-  
tione.

*Scroti inflammationem* curaturi, ad revulsionem sanguinis & humorum peccantium, ne tanta copia ulterius ruant in partem hanc, venæ sectionem instituitur in cubito dextro vel sinistro interiore, prout in hoc vel illo latere scrotum magis afficiatur, vel in utroque, si totum occupetur, ad derivationem verò venas popliteas secant, & malleolos scarificant, non omittis purgationibus ad humorum vitiosorum educationem, quibus præmissis in principio repellentia adhibere consueverunt, epithemata nempe ex oxymethino, vel succis nymphæ, semperervi, plantaginis, quibus lintea mollissima intincta scroto imponunt, vel ipsum inungunt oleo rosaceo, omphacino, aut myrrhino, aut unguento rosaceo, vel ceratum album admovent, donec inflammationis fervor remiserit, tum prioribus digerentia & dolore in sedantia admittunt, parato linimento ex vitellis ovorum & oleo rosaceo, vel cataplasmate ex farinis fabarum, sem. lini, foliis haliacabi, caninis vici-dibus, floribus rosarum, in succo semperervi & endivie commixtis, addito oleo rosaceo, quibus etiam in dolore vehementi folia hyoscyami albi adjungunt. Ubi remissio omni inflammationis vigore solâ opus est digestionem, cataplasma apponunt ex farina fabarum & orobum decocto flor. meliloti, seminis lini, fœnigræci & oleo chamæmelino subactis, vel ex pastulis enucleatis cum cymino in vino maceratis,

contritis & malaxatis, vel emplastrum diachalcæ oleo irino emollitum. In suppurationem tendente abscessu, hanc promovere cataplasmatibus ex farinis tritici, sem. lini, rad. althææ, floribus meliloti, in aquâ coctis, confusis & oleo amygdal. dulc. vel axungia gallinarum subactis, hinc factò puri exitum parant, si per se eum non inveniatur, apertione scroti sufficienti distantia ab ano concessâ, ne fistulæ ansa detur, tum ulcere mundato & absteriso vulnuscicatrice claudunt.

*Excoriationem* emendare student humorum acrimoniam corrigendo, & nonnunquam cor-piam eorum evacuando, postea topica adhibendo, qualia sunt decoctum plantaginis & rosarum in lacte. Unguentum de tintia, populi-num, rosarum, pulvis ex foliis myrti, & lapide calaminari adpersus, vel emplastrum album coctum impositum.

In *Ulcerebus* Scroti humores peccantes acres interdum evacuant confectioe Hamech, & ulcери ipsi ad mundificationem insinuant unguentum Apostolorum, cum unguento Ægyptiaco commixtum, præsertim si quid malignitatis in sinu gerat, ad carnem corruptam separandam, mundato ulcere adhibent incarnantia, ut unguentum de lithargyrio, detutia, vel quod componitur ex thure, sarcocolâ, aloë, lapide hæmatite, flor. æris, alumine, pulverisatis & oleo rosarum exceptis, donec tandem unguento de minio, aut eo quod in Testiculorum ulceribus descriptum fuit, cicatricem inducant & curam absolvant.

*Vulnera* Scroti simplicia & parva citò ad consolidationem deducunt emplastro Apostolorum vel triapharmaco. quæ verò facta sunt cum contusione, in iis tritula membranæ ad suppurationem disponunt unguento ex terebintinâ, melle vitello ovorum, thure, myrrhâ & croco, tum Vinus ipsum mundant & abstergunt decocto quodam vulnerario, & tandem antedictis emplastris consolidant.

§. 14. *Paracelsus* ipsam *Osteo-Epiptocelen*, & *Paracelsi* *Enterocelen* absque sectione vix curari posse con-cedit, *Herniam* verò *Aguosam* nullo modo vult *fibro-Epi-* aperiri, sed defluxiones intrinsecus per mercurium laxativum averti, post hæc externa sequen-ti modo adhiberi jubet.

℞. Ficum lbj.

Oli. granor. Junip. ℥iiij.

Farin. fabar. ℥vj.

F. Cataplasma super ignem, quod superponatur, quanto calidius pati valeat, manè, sub meridiem & sero, hoc materia ipsa separatur.

℞. Farin. fabar. lbj.

Sem. psil.

Cytionior. 22 ℥j.

Consolid. maj. ℥iiij.

Vini & aceti q. l.

F. Emplastrum.

In *Osteo-Pneumatocelen*, sive *Herniæ* vento. In *Osteo-* sa curatione ritè ineunda ab apertione & rebus *Pneuma-* siccis abstinere jubet, & resolutioni materię potissimum incumbere, qua de causâ sequentia præscribit remedia.

℞. Ficum lbj.

Olei ex baccis Junip. ℥iiij.

Farin. fabar. ℥vj.

M.F. Cataplasma.

Eco 1

Per

Per pinguia quoque & viscosa procedere jubet, non quidem propter duritiem, cum ventus sit, sed quia tumor hic ab arsenico crudo & realgare causetur, quæ oleum amygdalarum dulcium, viscus abietis & emplastrum ex terebinthina mitigent, & quamvis diaciminum ad ventum in ventre clausum optime valeat, in hac tamen cura non esse idoneum serio admonet, sed sequentia potius remedia commendat externa.

℞. Ol. Amygdal. dulc. ℥ij.

Farin. fabar. ℥ß.

fimi columbini,

caprar. aa. ℥iij.

Aceti q. l.

Fiat Cataplasma, quod superponatur manè, sub meridie & sero.

℞. Visci abietis ℥vj.

Mumia ℥v.

folior. ebuli ℥j.

Commisceantur.

℞. Terebinth. lbß.

Cumin. ℥iij.

Sem. Latic. ℥vj.

Cera q. l.

Reduc in Emplastrum.

Sarcocoele  
& Cirsocoele.

Ad Oscheo-Sarcocoeles & Cirsocoeles curationem ex arte administrandam, è contra à rebus pinguius, potionibus vel curis intrinsecis & à superpositione siccorum & exsiccantium abstinendum esse præcipit, sed duplicem curam admittit. per instrumenta scilicet, & medicamenta resolutiva, ex quibus sequens admodum deprædicat.

℞. Ol. lateris. ℥v.

Opopapanac.

Galban.

Bdellii aa. ℥iij.

Reduc. ad formam liquidam cum istâ additione.

℞. Farin. fabar. ℥iij.

siccum N. iij.

Capbura.

Ruta aa. ℥j.

Fiat in modum Emplastri, quod maturat, resolvit, putrefacit, crecere magis non sinit, nec etiam dolorem infert. Hic resolventibus annumerat oleum benedictum, oleum laurinum destillatum, oleum nucum, oleum de feminibus papaveris nigri, oleum aneti, axungiam ceræ destillatam, Alcohol vini destillatum cum fabis, Alcohol destillatum cum feminibus psillii, aquam flammulæ, aquam hirundinariæ, aquam de persicaria rubea, aquam de iringo, succum ex lapatio, liquorem destillatum ex fimo caprino, oleum destillatum rerum pinguium numero plantæ eximit. Ad abscessum etiam colligendum sequentia commendat.

℞. Opopapanac.

Scrapin.

Ammoniac.

Galban. aa. ℥j.

Ol. Philosphor. q. l.

Gummis, ut moris est, dissolvantur in aceto-saeo, & denno incoquantur, ac cum prænominato oleo redigantur in formam Emplastri.

quod toti Herniæ imponendum per tres vel quatuor septimanas; apostematæ verò in loco idoneo collectæ, per se ruptæ, & sub emplastro hoc

resoluto emplastrum tractorium ex gummis & colophonia paratum imponi vult, ut resoluta materia etiam simul expellatur.

Scroti Inflammationem erysipelaceam hoc Inflammatione modo tractat, ut sal acre corrigatur per medicamenta ex lapide calaminari præparato & camphora, in ea verò. quæ cum abscessu conjuncta est, mundificativa adhibet ex gummis, aliaque in Phlegmone usitata.

Ad Excoriationes, Ulcera & V. lnera Scroti arsenicum præparatum singulariter commendat, maxime verò mumiam, balsamum & liquorem ejus, quibus vitia hæc totaliter curari posse nullatenus dubitat.

§. 15. Helmontius curationem Oscheo-Epiplocele & Enterocoeles in mitigatione furoris Pylori consistere dicit, & propterea adeò deprædicat vinum illud, in quo lenina anisi, carvi, fœniculi & coriandri ebullierint, quo virum herniosum quinquagenarium vinculi incuria Enterocoelem passum, quæ ad capitis magnitudinem mox increvit & mirum in modum induruit, facile restituit, quamvis antea tota nocte lacte & stercore vaccino fementa calida renovaverit, ac reponere frustra tentaverit, & tuber unicum durum instar ollæ continuum evaserit, omnemque spem per foramen decuplo minus regredi posse abstulerit, haustu tamen vini prædicti durities statim emollita est, & hernia retrò impelli potuit. Hoc autem si impetrari potest, ad ulteriorem curationem Magnetem emplastrum modo impositum singulari efficacia præditum esse promittit.

Hernia Scroti Aquosæ auferendæ radicem bryoniæ contusam, & instar cataplasmatissimam admodum esse credit proficuum, sicuti in alhi tumoribus aquosis sæpius salutare præstitit juvamen.

Pneumatocelen Scroti per semina status discutientia auferri posse sperat, anethi nempe, carvi dauci, anisi, cymini, cum propter testis injuriam pylorus facili in furorem concitetur, qui niper remedia ista insigiter mitigetur.

In Sarcocoele & Cirsocoele ad duritiem emolliendam, à Paracelso modo proposita emplastra admodum judicat proficua.

Inflammationis Scroti curationem per sedativa Archæi furibundi absolvendam esse censet; Excoriations & Exulcerationi colcotharina, & Vulneribus Scroti Balsamum de Minio adhibet, tanquam rem dia ad morbos hosce tollendos satis accommodata.

§. 16. Willisius nullam aliam in Oscheo-Epiplocele & Enterocoele novit curationem, quam quæ sit omenti aut intestinorum in locum debitum repositione, & repositorum detentione ne denuò delabantur. Ad priorem intentionem focus, & cataplasmata emollientia nonnunquam necessaria esse annuit, quin etiam enemata scy-bala indurata resolutiva, quibus præmissis, manu intestina per dilatatum peritonæi processum in abdomen repelli debere admittit. Posteriori scopo sufficere dicit retinacula & subligacula, pulvinaria nempe, quibus emplastrum lupponitur contra rupturam, sive de pelle arietina, cum cingulo conveniente pulvinaria arctius detinente, ne intestina vel omentum possint prolabi. Interdum Herniotomiam necessariam esse concedit, quam modo à prioribus descripto instituendam esse judicat.

Willisii cura in Scroto Herniæ.

*Hydrocele.*

In *Oscheo-Hydrocele* ad lacteum aquosum nimis copiā in scroto effusum evacuandum remedia approbat ex radicibus ebuli, ireos, Jalapæ, foliis soldanellæ, elaterio, pilulis lunares, nec non diuretica ex beccabunga, nasturtio, raphano, &c. & diaphoretica, quibus præmissis ad ulteriorem lymphæ effluxum prohibendum, emplastrum diaphonis scroto tumido jubet imponere, & remedia hisce nihil proficientibus, etiam Scroti paracenthesin cautè institutam facillè solet approbare.

*Pneumatocele.*

*Oscheo-Pneumatocele* auferte studet enematis discutientibus & parum evacuantibus ex decocto rad. brusci bryoniæ, centaur. min. flor. sambuci, vel communi emollienti. in quibus extractum diacarthami fuerit dissolutum, & guttulæ aliquot spiritus Salis armoniaci additæ sint, post hæc diureticis, infusione millepedum. ~ u Juniperino, tincturâ Quis Qi. ~ u Sisdulci, & similibus succum nervum tenaciorem resolvit, ut spiritus animales in libertatem remissi tumultuati & scroto tumidè desinant, quæ de re etiam forum externum ex floribus salis Armoniaci & crystallo minerali in spiritu vini tenuiori dissolutis, cui pannus laneus intingendus & scroto imponendus, valde approbat, post quem emplastrum diaphonis, si vè de mino cum sapone paratum & super alutam extensum eidem scroto suadet applicare.

*Sarcocoele.*

In *Oscheo-Sarcocoele* tumorem & excrecentiam istam circa testes intra scrotum collectam absorbere jubet remediis succi nutritii moram diuturniorem solventibus, & concretum illud spissius diruentibus, qualia sunt lapis prunellæ, Ononidis, S gemmæ, Spiritus S is interius propinata in aqua Scrophulariæ, externè vero emplastrum diachylon cum gummiis, aut derañis cum Sio approbat. quibus si tumor hic absorbui nequeat, à prioribus proposita operationem chirurgicam tentare permittit.

*Circocele.*

Ad *Circocele* abigendum ea commendat remedia quæ sanguinem spissiores ad stagnationem nimis proclivem attenuare & diluere solent, ut ~ u s fuliginis, \* Ci, S C. C. & externa cataplasmata prius emollientia, tum constringentia, quibus frustra & sine juyamine adhibitis, ad Chirurgiam transire concedit.

*Inflammatio.*

In Scroti *Inflammatione* ad venas deplendas ut sanguinem effusum resorbeant, venæ sectionem laudat in pede instituendam, tum clysteres emollientes adhibet, aliaque remedia interna sanguinis coagulationem resolventia ex aqua graminis, petroselinæ, parietariæ, lapide prunellæ, floribus nitri. quibus phlegmonem sisti promittit, hinc ad lentorem inagis dissolvendum Spiritum tartari, vel Salis Armoniaci in ulum ducit, & externa Cataplasmata emollientia & discutientia ex parietaria, malva, agrimonia, floribus chamomillæ, hyperici, sem. tennigr. vel ex medull. panis albi in lacte cocta, addito croco & vitello ovi, vel focus ex malva, althea, beta, ruta & floribus sambuci in aqua communi coctis tepidè adhibitos, & ad dolorem magis leniendum, vel etiam suppurationem promovendam unguenta dialtheæ populinum, & enplastrum diachylon admodum existimat proficua.

*Excoriatione.*

Ad Scroti *Excoriationem* sanandam omnia lacteni cutaneum acriorem mitigantia, ut pulverem ex C. C. ulso, lapide calaminari, lithargyrio, unguentum populinum de tutiâ, de calce

vivâ in vino extinctâ, aqua plantaginis lota & oleo rosaceo excepta & similia commendat.

In Scroti *Ulcibus* & *Pulneribus* præcipuè laudat decocta Vulneraria, unguenta digestiva, balsamum de Capaiba internè & externè usurpatum, unguentum diapompholygos, emplastrum de lapide calaminari aliaque siptica & consolidantia.

§. 17. Sylvius in Curatione *Hernie Scroti Omentalis* & *Intestinalis* id agendum esse præcipit, ut ipsum omentum vel intestinum prolapsum ex Scroto in abdomen retrudatur, adhibitis clysteribus & fomentis emollientibus, si scybala indurata intrusionem permittere nolint. retrusa verò aptis subligaculis & pulvinaribus detineri vult ne denuò prolabantur, atque ut processus peritonæi dilatatus angustetur, eundem emplastro siptico coarctat. Herniotomiam tanquam actionem valde particulosam summa cautela vult instituendam.

*Hydroceles* curationem instituit tum adstrictione vasorum lymphaticorum, ne majorem aquæ emittant copiam per decocta ex radicibus bistortæ, petasitidis, tormentillæ, foliis plantag. sanguisorbæ, equileti, floribus rosarum, &c. vel pulveres ex terra sigillata, sanguine draconis, chalybe pp. tum lymphæ in scroto jam infusæ remotionem per decocta sudorifera ex ligno Guajaco, juniperino, herb. card. bened. (cord. foliis torismarini, &c. vel per salia volatilia & aromatica, nec non topica externa, præsertim sacculos semine militi Quis, cumini, foliis nasturtii, ebuli, floribus sambuci, sale tosto, cineribus, maxime clavellatis, aut arena repletos & tepidè adhibitos.

In *Pneumatocele* ad pituitam resolvendam & bilis actionem juvandam carminativa deprædicat, ut spiritum nitri dulcificatum, & potissimum spiritum suum caminativum, aliaque flatus discutientia & diaphoretica, nec non externa cataplasmata ex floribus camomillæ, bacris lauri, semine cumini, olea rutæ, nardinum anethi, vel unguentum martiatum & similia scroto adhibita.

In *Sarcocoele* adstringentia commodè admodum posse existimat, ut vasa contracta sanguinem nutrientem tam copiose non admittant, qualia sunt aluminosa, & emplastra aut cataplasmata ex lapide hæmatite, sarcocolla, bolo Armeno & similibus parata cum aqua plantaginis & paucò aceto, qualia remedia etiam in *Circocele* approbat ad venas laxiores constringendas, qui scopus si remediis istis non attingatur, & cura nihilominus ab ægris sollicitè efflagitetur, sectionem instituendam esse concedit, quamvis non sine molestia & periculo hanc institui posse concedat.

*Inflammationem* Scroti avertere conatur diaphoreticis acrimoniam sanguinis acidam corrigentibus, potissimum antimonio diaphoretico, & externis fotibus & cataplasmatibus emollientibus & demulcentibus, ut pars hæc relaxetur, & dolores ita mitigentur, quæ de re & sanguinis missionem è brachii aut pedis venâ institui posse concedit, ut sanguis vel avertatur, vel derivetur, quibus subsidiis frustra adhibitis, ad suppurationem properantem inflammationem promovet cataplasmatibus magis emollientibus ex farinis seminum fabarum, hordei, senigræci, pulveribus radicis altheæ, bulbis hiorum confusis &

Ecc 3 cepis

ceps parum asis, donec ad materiam purulentam eliciendam abfcessus vel per se rumpatur, vel cultello aperiatur.

*Excoriatione.*

Ad succum acrem in *Excoriatione* mitigandum, & cuticulam destructam restaurandam focus proponit ex herbis sale volatili præditis, ut hyperico, mentha, betonica, floribus sambuci, chamomillæ, semine lini in lacte coctis, & post hos illinitionem ex oleo uvorum, vel nucum.

*Vlcere & Vulnere.*

*Ulcus Scroti* prius mundandum vult & tum consolidandum, quem scopum utrumque pro voto ferire promittit, etiam hoc in affectu, balsamum sulphuris terebinthinatum, abs quo spiritus acidus in pure residens obtundatur, ut sanguis purior assiduò affluens partem consumtam restituat, & solutam unitatem optimè consolidet quare etiam in *Vulnere* ipso balsamum hunc proficuum esse sperat, cui simul emplastrum aliquod stipiticum imponere minime tenet.

*Cartesiorum ratio curandi Scroti Epiplocele & Enterocelen.*

§. 18. *Cartesiorum* cura in *Osteo-Epiplocele* & *Osteo-Enteroccele* hæc est omnium rerum prima, ut æ terminis suis elapsum omentum vel intestinum extra territorium alienum in proprium restituant, non omisissis clysteribus & linimentis emollientibus, si viscera rigidiora satis flecti, aut porta durior & angustior absque præfidiis hisce dilatari nequeant, tum manibus omentum vel intestinum per foramen in abdomen retrudunt, ægro commode in tabula disposito, capitemimum declivore, & ano aliquantum elevato, quo facto emplastro quodam ad rupturas, vel stipitico inguini imposito prospiciunt, ut foramen angustetur, & sedulo imperata quiete, cavere volunt, ne commotis aut ad inferiora propulsis intestinis vel omento ansa detur denuò procidendi. Præcipua verò ingredientia ejusmodi emplastrorum sunt olibanum, sarcocolla aloë, mastix, bolus Armenus, cortices quercus, colocothar ☉ li, pix navalis, calx lota, & similia, quæ vel mucilagine radices confolide maj. vel albumine, vel terebinthina fuscipiuntur, & ad justam consistentiam pulverisata prius rediguntur. emplastris adhibitis scuta & vincula per anum & ultra imponunt, singulis ferè menibus novis cum prioribus commutat. Quando verò intestina vel omentum ita restitui nequeunt, resectionem Peritonæi, aliasque Herniotomiz species tentari volunt, quaslibet jam declarant.

*Hydrocele.*

*Osteo-Hydrocele* abigere tentant remediis hydragogis, salibus volatilibus, subadstringentibus & exsiccantibus, emplastro de cumino, meliloti, de ranis cum ☉io, santalino, unguento Comitissæ, desiccativo rubro, cataplasmate aut focu ex radicibus bryoniæ, aristolochiæ, iridis, cucumeris asinini, Spicæ ludæ, foliis chelidoniz majoris, centaurii, rutæ, calaminthæ, chæresfolii, nasturtii, anethi, floribus sambuci, camomillæ, lavendulæ, bacis lauri, semine cumini, Ammoniaci, olivari, bellii, mastiche, myrrha, camphora, sulphure vivo. Stercore caprino, vaccino, ovillo, columbino, quæ si parum præsent acut triangulari filum sericeum ducente scrotum transversim intactis testiculis perpungunt, extracta acu filum relinquunt, quod ad citiorem aquæ effluxum promovendum bis vel ter quotidie huc illuc trahunt, sed iterum aliis symptomatibus, ut dolore, inflammatione, tumore, planè extrahunt, ut hisce eo melius remediis convenientibus occurrant.

*Osteo-Pneumatocele* obviam eunt remediis Pneumocarcinantibus, antispasmodicis & salibus volatilibus aromaticis internis, externisque attenuantibus & facile penetrantibus, ut tubuli & pori facile aperiuntur, & succi fluidiores reddantur, uti focu ex bacis lauri, seminibus cumini, carvi, dauci, floribus camomillæ, &c. in spiritu vini coctis, cataplasmate ex stercore ovillo, bolo Armeno, &c. vivo, aloë & myrrha cum melle mixtis, emplastro de ranis cum ☉io Vigonis, vel diapalmæ spirit. vini dissoluti, atque ad tympanitidem abigendam proficiunt.

In *Osteo-Sarcoccele* nimis indurata, testiculæ resectionem à prioribus jam indigitatam itidem suadent, in molliori verò suppuracionem promovent cataplasmaibus ex farinis, radicibus liliorum & cepis asis cum axungia gallinæ, abfcessum deinde aperiunt, mundant & consolidant.

In *Osteo-Circocele* languinis retentionem in venis, si fieri potest, solvunt, & tumorem simul comprimentibus quibusdam imminuunt, si modo nondum adeo magnum cepit incrementum, & tum sequens laudant emplastrum *Vigierii*, hoc in casu maxime probatum.

☉. Pic. naval. 3ij.  
Colophon. 3ib.  
Lithargy.  
Ammoniac.  
Mastix.  
Terebinth. aa. 3b.  
Myrrh. 3j.  
Boli Armen. 3b.  
Thur.  
Sarcocoll.  
Aloë aa. 3b.  
Corti. Granat. 3ij.  
Glutin. in aq. dissolut. q. s.

#### *F. Emplastrum.*

In malo indurato remediis hujusmodi indomabili operationem Chirurgicam approbant, eo planè modo instituendam, quo vetetes eam delineant.

*Inflammationem Scroti* curant diaphoreticis & diureticis porosis, primò partes angulares fibras distendentes, & succorum motum per tubulos prohibentes frangentibus, attenuantibus & resolventibus, tum salibus volatilibus citò penetrantibus aliunde jam cognitis. quibus subjungunt decocta lignorum cum herbis sale volatili abundantibus, & externa epithemata applicant tubulorum refectioni accommodata, & quosvis mucrones iisdem inhaerentes frangencia, qualia parantur ex Spiritu vini, in quo olibanum & saccharum Saturni fuere dissoluta, vel aqua calces vivæ & Spiritu vini camphorato, nec non linimenta, unguenta vel cataplasmata, ex bolo Armen. Cerussa, Terra ☉li dulci, camphora, sulphure vivo, terra sigillata in Spiritu vini solutis & tepide adhibitis, non modò tenuissimis suis particulis tubulos refectionibus, sed succos etiam spissiores fluidos reddentibus, & acutas eorum particulas per dilatatos porosâ materia subtili expulsa in poros suos absorbeantibus, hebetantibus & alterantibus, aut planè afferentibus, quapropter liberati ab iisdem tubuli scroti absque fibrarum pressione succis commotis facilem posthæc largiantur transitum.

In *Excoriatione Scroti* denudatæ cuti præferenda potissimum incumbunt, eandem ab aëre custodiendo, & particulas succorum ex glandulis

dnlis cutaneis featurientium auctas corrodescentes frangendo, liebetando, temperando & mitigando per pulveres terræ & li dulcis, cennilæ, cretæ, lithargyrii, lapidis calaminaris, vel unguenta diapompholygos, de tutiâ, albiun canphoratum & id genus alia.

*Ulcera.*


Progeneratis omnimodò ab Inflammatione, Excoriatione, Lue Venereâ, vel aliundi Scroti *Ulcerebus* non minus ea adhibent remedia, quæ particulas succorum auctas corrodescentes superant, & Ulcus ab iisdem emundant, qualia sunt ablutio ejus aqua calcisvivæ, vel Mercurialis *Fallopis* per injectionem instituenda, nec non mixtura ex viridi aris, Sublimato. camphora & vino generoso, aut olibano, aloë, myrrha, camphora, & spiritu vini; aut linimento ex melle rolarum, cerebinthina, olibano, aloë, camphora, & paucò spiritu vini composito ulcere immisso, addito nonnunquam grano uno vel altero præcipitæ rubri, cujus vicem aliquando supplet unguentum Apostolorum, & Basilicum, hisque ulcere fatis mundato, subjungunt sarcotica & cicatrici procuranda idonea; ex quibus emplastrum diapalmæ, griseum, de gratia Dei, oppodeltoch *Wurtzii*, aliis notunt præstare

*Vulnera.*

In *Vulneribus* Scroti internè diaphoretica & convulsiones prohibentia exhibent remedia ex Oculis & gio diaphoret. cinab &u Spermeti, & succini, in vehiculo ex aq torismarin. veron. menth. & Syrup. Hyperici parato, externè balsama infillant traumatica, Peruvianum, de Capaiba, Italicum, Sulphuris, vel cy unguento nervino, oleo s. rutæ, roritmarini, & petreæ paratum inungunt, & epithemata ex spiritu vini & lumbricorum in quis massæ. succinum, myrrha & camphora soluta sunt, imponunt, & tandem emplastro Oppodeltoch curam penitus absolvent.

*Notissima  
tentia de  
curacione  
Oscheo-  
Epiplocles  
& Enteroc-  
celis.*

§. 19. Nos in affectum horum curacione ita procedimus. In relaxatione peritonæi circa inguen, oh quam onentum vel intestinum in scroto delapsum est, & vel *Oscheo-Epiplocles*, vel *Oscheo-Enterocelen* constituit, corrigendâ, in adultis sectione ab experto Herniotomo instituendâ opus esse existimamus, in paryulis vero figamento optimo, quale sequens monstrat figura, quo Batavi hoc tempore imprimis utuntur.



A. est clausura vinculi, unctionis & foraminibus priores excipientibus constans, quæ relaxari & construngi potest.

B. est pulvinar trochleæ scroto applicandum, ut onenti vel intestini prolapsus impediatur.

C. Est vinculum circa corpus ligandum. Ejusmodi ligamenta varia ab Autoribus excogitantur.

Prolapsâ verò intestina prius restituenda sunt loco pristino, & peritonæum firmandum & consolidandum remediis in libro priore cap. 2. sufficienter enumeratis, imprimis emplastro ad turturam *Fernelis*, stiptico *Crollii*, vel sequenti:

℞. *Os. li virid.* ʒiſſj

*Aloes.*

*Boli Armen.* aa. ʒß.

*Sarcocoll.* ʒi.

*Calc. lot.* ʒiſſ.

*Terr. Japon.* ʒj.

*Tour.* ʒß.

*Terebint.* q. ſ.

*F. l. a. Emplastrum.*

Nostrum tamen de Labdano aliis antecellit.

In Hernia verò pertinaci, ubi intestinum nimis diu commoratum fuerit in scroto, (commoratur enim sæpe per 9. & 18. dies,) & pori intestini extra ventrem exulantis fuerint obstructi, eò incumbendum est, ut pori recludantur, & vapores aliquo usque condensati ma ori motus ac agitationis quantitate donentur, ut sic rursus incitato gradu circa propria sua centra rotentur, in hunc finem linum nendo recenter contortum, ac nondum coctione depurgatum in lacte coctum calidè parti affectæ applicetur, intestinum blanda manus agitatione in abdomen ægri in bono situ collocati reponatur, dein æger vinculum vel ligamentum ad intestinum retinendum continuo portare potest. Si status urgeant, fons humidificæ ex carminativis parti affectæ imponantur. Ad fovendas partes etiam enemata ex emollientibus & dissolventibus injici possunt, & oleosa internè popinanda sunt. Rarum est, & non semper temerè imitandum, quod *Riverius* annotavit, ubi post multa remedia per plures dies frustra ulurpata intestinum in scroto commoratum repositum fuit feliciter incisione factâ usque ad productionem Peritonæi, quæ intestinum strangulabat, sæpe ultra hoc tempus, sine sectione, idoneis remediis restitui potest, cœu patet exemplo *Cl. Muri* in suo *Podalcrio* communicato, p. m. 94. Non omittantur etiam interna ablorbentia, & carminativa, quæ alibi dicta sunt; in tali casu externè sequens imponi potest cataplasma, quod paratur è pulveribus rad. alth. flor. melilot. chamomill. facin. semlin. hordei in lacte coctis. Internè proderit Tinctura *Os. li* ad rubedinem calcinati, & ~ salis irrigati, & hinc cum *V. extracta*, quæ in flatibus & herniâ magnâ est utilitatis. Pulveres ex oculis *Os. ebore*, corallii rubr. terra sigillat. Japonicâ, femine perfoliatæ, aliisque haud negligendi sunt.

*Oscheo-Hydrocele*, sive *Hernia Scroti Aquosa*, *Oscheo* uti hydrops alius particularis curanda venit per *Hydrocelis*. diaphoretica & diuretica. Inter diaphoretica excellent salia volatilia quæcumque; inter diuretica laudantur Tinctura *Qi*, ~ us lumbricor. liquor *Qi* foliat. *Qi*, & c. Externè varia exsiccantia & resolventia imponi possunt. ex. gr.

℞. *Rad. Aristoloch. rotund.*

*bryon.*

*cucum.* asin. aa. ʒß.

*Fol. aneth.*

*rui.*

*chelidon. maj.* aa. Mj.

*Flor. sambuc.*

*lavendul.*

*chamomill.* aa. Pj.

*Decoq. in Vno, F. Fous, vel Cataplasma* calidè imponendum.

Vel ex bacis lauri, gummi Ammoniaco, olibano, bdellio, myrrha, massiche, fiat Emplastrum, aut ex stercorebus variis paratur cataplasma,



plasma, vel imponatur emplastrum nostrum de Labdano, vel ~us matricalis cum camphora & elixirio vitæ n.d. vel ~us vini camphoratus cum ~u lumbricorum. ▽ Reginæ Hungariæ, &c. Spirituosa volatilia etiam hîc, ut in hernia quacunque, optima sunt, quia poros quoscunque aperiunt. Remediis hujusmodi nihil proficientibus ad operationem ipsam Chirurgicam accendendum est, quæ hoc in casu peragitur, vel scrotum pungendo ac triangulari, vel instrumento ad hydropem usitato, quæ operationes præstant illa, quæ forcipe fit eodem modo, quo foramina ad letacea effodiuntur.

*Osculo-  
Pneuma-  
tocele.*

Cum etiam, ceu in causis dictum, *Osculo-Pneumatocèle* producatur ab obstructione, dum enim succi tenuissimi, sive vapores & exhalationes in scroto per poros nimis contractos, vel ab externo frigore, vel alia causa, exhalare nequeunt, ibidem detinentur, & status vel ventus generatur, indeque si pori scroti contumaciùs obstruantur, tanta subinde ejus oritur intumescencia, ut rupturæ accedat periculum, ceu nuper exemplum observavimus in viro sexagenario. Cura ergo *Pneumatocèles* hujus consistit in deobstructione, hinc internè propinentur varia diaphoretica, ex q̃io diaphoret. antihæctico *Potter.* Bezoardico minerali, Martiali & Joviali, salia volatilia, aromatica ac oleosa quævis, ~us C.C. bacc. ebuli. sambuci, cum aquis carminativis aliisque perpinanda, à sudoriferis enim pori Scroti iterum aperiuntur, motus progressivus succorum augetur, & obstructiones relerantur, quod si aliquid inde incommodi accessisse credant, culpa vel in aërem frigidum statim post sudorem admissum, vel in medicamentum nimis mobile & acre rejiciendum est. Post hæc convenient carminativa, Essentia carminativa *Vvedelii, Muhaels,* &c. præ aliis salutare experti sumus arcanum duplicatum sæpius exhibitum. Absorbentia etiam interponenda sunt. & mixturæ status discutientes exhibendæ, enemataque injicienda carminativa Externè verò in *Pneumatocèle* omnis impendenda opera est, ut discutatur tumor hic statuofus, in quem finem instituantur suffumigia ex masticæ, olibano, foliis sabina, semine anethi, cumini, vel fiat focus ex herbis aromaticis ac emollientibus, ex gr. salviâ, majoranâ, absinthio, floribus chamomillæ. sambuci, summitatibus anethi, flor. meliloti, vebasci, baccis lauri, juniperi, sambuci, &c. addito *Θε. Jco.* vel *Θε. Qi.* vel ex his parentur sacculi sicci irrorandi ~u flor. sambuci, & calide imponendi. Sunto formulæ quædam in juniorum gratiam.

℞. *Fol. variomar.*  
salvia,  
ruta,  
cicutaria.  
Summit. absinth. aa. Mj.  
Sem. cumm.  
anis.  
fenic. aa.  
Bacc. lauri ʒiij.  
Rad. bryon. ʒß.  
Θis Qi.  
℞ci aa. ʒj.  
Cum ~u vin. rectificat. ʒxxxv.

*F. Tinctura*, quæ calide sæpe de die scroto applicetur. Vel fiat cataplasma sequens vel simile.

℞. *Herb. Scord.*  
cicutar.  
Summit. absinth. aa. Miß.  
Semin. carvi.  
cumini.  
Corti, exterior. citr.  
Bacc. Junip. aa. ʒj.  
Θis Qi.  
℞ci aa. ʒij.

*F. Pulvis. coq. in ʒ. malsa, vel vino dulci, non acido, addatur panis biscotti, vel farinæ fabar. q. s. pro Cataplasmate.*

Vel imponatur emplastrum de cumino N. vel de baccis lauri, &c. Spiritus matricalis externè cum camphora applicatus excellens erit remedium. Sunt qui irungunt has partes oleo de baccis lauri, chamomillæ, destillato anethi, & quidem cum fructu. omnia enim medicamenta, quæ gaudent copia salis volatilis. hic conducent sapiùs applicata, & quidem tepide, quæ omnia impediunt quancunque inflammationem, aliaque atrociora symptomata. Ab aperture hujus tumoris plane abstineas.

*Oyhee-Sarcocèle*, seu tumor ille durus ac rotundus ab hyperlarcosi seu supercrescentia carnea plerumque post Vulnèra aut Ulcera scroti, sui semper similis. quæ etiam differt ab Enterocèle & Epiplocele curatur ab initio emollientibus ac resolventibus, hinc variis focus suffumigia, cataplasmata ac, liquores volatiles topicè apponenda sunt. Sequenti feliciter uti sumus:

℞. *Summit. absinth.*  
cicutar.  
centaur. min.  
Flor. chamomill.  
sambuc. aa. Mj.  
Rad. bryon. ʒiij.  
Θis Qi.  
℞ci aa. ʒß.

*M.*

Ex his vel sacculi fiant calidè applicandi, vel cataplasmata, vel coq. in ʒ. vel vino instar focus, vel extrahatur spiritus vini essentia vel tinctura, quæ tepidè applicetur, vel inungantur linimenta ex aromaticis oleosis parata. Ex gr.

℞. *Ol. laurin. ʒß.*  
destill. chamomill. ʒß.  
succin. ʒj.

*M.*

Quibus si non cedat *Sarcocèle*, diviso in partes scroto, carnositas hæc totaliter eximatur. sectio- ne à Chirurgo experto instituta. Hernia hæc car- nosa etiam aliquando in scroto cum aqua intus contenta obvenit, quare benè ab Enterocèle dis- tinguenda est, potest enim apertiri, & per pus promoventia curari. Sic & tumor scroti sæpe mentitur herniam, & tamen apostema est, & ma- turato pure facillè sanatur. Sic legimus *Ephem. German. Ann. 6. & 7. Obs. 47.* quod miles qui- dam insiliens equum testem alterutrum magna vehementia ephippio attriverit. subsequensque fuerit dolor ingens, & apostema in scroto maxi- mum, qui quidem per aliquot dies sensit dolo- rem, tandem doloris impatientis ipse sibi cultro suo scrotum aperuit, & sic postea feliciter un- guento mundificante superimposito convaluit. Hic cautelâ tamen opus est, ne instrumento aperias hoc apostema, nisi certus sis de eo; aliàs si Hernia fuerit, intestinum lades, & agrum morti trades.

*Id*

*Osculo-  
Circosole.* In *Osculo-  
Circosole*, seu Ramicæ varicosæ, in quo vasa sanguine turgentia dilatantur, non adstringentia, ut in aliis herniæ speciebus, adhibenda sunt, sed potius emollientia, discutientia ac resolventia balsamica, quæ constant particulis oleosis & aquosis, hinc conducent interna absorbentia ac resolventia diaphoretica, quæ sæpius exhibenda sunt. nec externa topica negligenda, imprimis balsamum nervinum n. d. vel ~ matricalis tepidè applicandus, quibus pro re nata addenda Elixir vitæ, camphora, spermæci, vel ex vegetabilibus aromaticis parentur focus vel suffragina, vel cataplasinata, vel epithemata, & clidè applicentur, quæ ex herbis absinthii, cicutarie, rutæ, anethi, menthæ, centaurii min. salviæ, flor. sambuci, chamomillæ, sem. cumini, feniculi, baccis lauri, Juniperi, &c. & ~ parari possunt, vel imponatur emplastrum de labdano, de minio, de cinabari, de spermate ceti, quæ cuncta blandè resolvunt, emolliunt, discutunt, omnemque obstructionem tollunt. Sectio quoque hoc in casu pro re nata institui debet, si tumor valdè induratus nullis separat; potest remediis mitioribus, sed maxima hic est difficultas, & operatio ista exercitatum postulat Chirurgum. Constat observatione 97. *Decur. 1. Ann. 6. Ephem. Germ.* Juvenem quandam temperamenti sanguinei passam fuisse herniam varicosam in scroto tunica interna, dilatatus valis spermaticis, cum dolore & pondere, quomodo deambulare, ex cujus vena brachii ob plenitudinem sanguinis aperta ne gutta quidem effluxit, sed ubi pedibus compressit locum affectum, mitigatus fuit dolor, & largissimo rivulo saltavit sanguis acris, valde verò levatus fuit per venæ hæmorrhoidalis median-tibus sanguis jugis apertione.

*Scroto In-  
flammati-  
one.*

In *Inflammatione Scroto* totius rei cardo in eo vertitur, ut ab acido viscido coagulati humores dissolvantur, ad circulationem incitentur, atque obstructiones recludantur, internè ergo ad diaphoretica sæpius laudata accedendum est, imprimis commendamus salia volatilia, item nervina, Baccæ, ~ C. C. volat. mixturis addatur, & dentur decocta ex tart. saparilla, guajaco, salisfras, china, &c. parata, vel detur sequens vel simile sudoriferum.

℞. Aq. fior. sambuc.  
sumar. aa. ʒi.  
~ C. C. volat. ʒss.  
Syr. sumar. ʒij.

M. d. ad usum.

Vel forma pulveris:

℞. Ocul. ʒi.  
ʒii d. a. bo. et. gr. xxv.  
Sis volat. gr. iij.

M. F. Pulvis.

Potus Theæ & Coffæ hac in inflammatione modicè usurpatus non parum præstabit commodum. Topicis etiam res hæc peragi potest, quæ omnia tepidè applicentur, maxime enim hic nocent frigida & repellentia dicta, quia humores magis incitant, & sic ad circulationem & motum progressivum ineptos reddunt, ceu damno ægorum fuorum Chirurghi sæpe experiuntur. Ex sequenti pulvere discutiente dicto plures ejusmodi Inflammationes feliciter vidimus sanatas.

℞. Folior. salvi.  
scord.  
absinth.

salvi.

rosmar.

menth. aa. Muij.

Bacc. lauri ʒiv.

Junip. lb. ij.

Sem. aneth.

cumin. aa. ʒiij.

Sis ~ci deparat. ʒss.

*Incid. & contund. grosso modo, & fiat sacculus ca-*  
lide applicandus, & sæpe repetendus; vel ex iis-  
dem fiat focus vel cataplasma in vino Gallico co-  
ctis, resolvunt enim tumores, & inflammationes,  
sopuntque dolores. Sis quoque ex tempore adji-  
ci possunt Ψ, cineres clavellati, ~cum. ʒi. ~  
volatile, gummi, olea, camphora, &c. Præ aliis  
convenit Spiritus matricalis cum camphora &  
saccharo hi calidè ac sæpius applicatus, vel Spir.  
vini camphoratus cum Ψ. Ψ. Spir. ~ci, Spir.  
flor. sambuci, quæ omnia egregia sunt intumori-  
bus & inflammationibus, ut & emplastrum de  
labdano. Convenit & unguentum nostrum ad  
inflammationes. Sic & Elixir gummatum, si  
cum sale volatili & myrrha, aloe ac camphora  
mixta tepidè applicentur, optima sunt. Si tumor  
magnus conjunctus fuerit, comite febre, cata-  
plasmata discutientia supra dicta & spirituoia ex  
spiritu matricali, aq. Regin. Hung. spir. flor.  
sambuci, spiritui vini camphorat. parata scroto  
& pubi applicari possunt, & si res eo jam rediit,  
ut puri exitus parandus sit, ferrum, cum maxima  
tamen circumspeditione admoveas, hoc est, lan-  
cetta tumorem aperias, & dein procedas uti in  
vulneris curatione, solo imposito emplastro de  
Labdano, addito balsamo de Peru, vel unguen-  
to basilico, vel Elixire vitæ. Ad febrem removen-  
dam internè exhibe absorbentia & diaphoretica.  
Sequens pulvis hoc in casu excellens est.

℞. Ocul. ʒi. pp. ʒss.

ʒii diaphoret. ʒj.

Camphor. gr. iij.

Arcan. duplicat. gr. v.

M.

Detur infrequenti, vel simili mixtura:

℞. Aq. Card. bened.

scord.

prophylact. aa. ʒi.

Mixtur. simpl. ʒss.

Sis volat. ʒj.

~camphor. ʒss.

Syr. card. bened. ʒj.

M. & cochleatum exhibeatur.

Curationem hanc confirmat sequens observatio  
Cl. D. D. Dexbachii, Physici hujus loci ordinarii  
experientissimi, & Amici nostri charissimi. Vir  
enim nobilis annorum 43. dispositione corporis  
acida, vulgo melancholica dicta, Meta Castellæ  
profectus, virum modò laudatum, die 17. febr.  
anni hujus 1688 ad se vocavit, de dolore, & qui-  
dem vespere graviter usque ad diathoras duran-  
te, lassitudine omnium membrorum cum in-  
flammatione insigni scroto, colore nigro jam tin-  
cto, & adstricta alvo conquestus. Causam hujus  
affectus rectè adscriptit obstructioni pororum  
vel tabulorum, quod non solum insensibilis  
transpiratio impedita esset, sed quoque circula-  
tio in vasis lymphaticis, aliisque non rectè peragi  
potuerit, unde ob stagnationem succorum nec-  
cessario allegata inflammatio accedente materia  
subtili primi elementi fuerit exorta. Primum ordi-  
navit enema sequens.

FFF

℞. De-

℞. Decoct. emollient. &

carminat. aa. lb℔.

In quibus dissolv.

Electuar. diacatbol.

Syr. & fol. sen. aa. ℥℔.

Mel. rosar. 3vj.

Liq. C. C. succinat. gr. xv.

℞. C. C. volat. gr. iiii.

Ol. s. menth. gr. xj.

Volat. 3ij.

F. Enema.

2.

℞. Pulv. absorbent. VVedel. 3j.

℞. Qi gr. vij.

℞. i. dnt. gr. v.

Ol. s. cinamom. gr. j.

F. Pulvis pro una dosi mane sumendus.

3.

℞. Pulveris solut. 3sar. Zvvelf.

rec. pp. 3ij.

℞. i. diaphoret. rne pp. &

recent. deonati gr. viij.

℞. Qi gr. iij.

Ol. s. caryophyll. gr. j.

M. F. Pulvis purgans, una vice sumendus.

4. Sudoriferum præscribit sequens.

℞. Aq. card. bened. & succo die 3j.

Theriacal. simpl. 3℔.

Oc. & pp. 3℔.

Bezaard. min. gr. v.

℞. i. & i. dulcificat. gr. v.

Confect. Alkerm. 3℔.

M. F. Potio pro una dosi.

5. Decoctum.

℞. Rasura lign. Guajac. 3ij.

assafr. 3℔.

Rad. falsaparill. 3j.

Chin. 3iv.

℞. i. crud. in pet. ligat. 3℔.

Decoq. in 7. font. q. l.

Colatur. lbij. add.

7. theriacal. simpl. 3j.

Essent. lumbri. terrestr. 3j.

Aq. cinamom. 3℔.

M. Sumat quovis mane 3iiij. expectan-

do sudorem.

2. Topica Scroto inflammato adhibenda præ-

scripsit alcalica & 3ia 3ua volatilia, ex. gr.

℞. 3 sigillat. 3℔.

Ceruf. 3℔.

Camphor. 3℔.

7 q. l.

M. S. Balsamus externus pro epithemate

calide applicando.

Hoc præmisso tumorem sequenti liquore fre-

quentius ablui iussit.

℞. 7 rectificat. camphorat. 3j.

S. Liqueur externus.

3. Cataplasma ordinavit.

℞. Rad. Angelic.

Conitayeru.

Calam. aromat.

Dillamn. Cretic. aa. 3j.

Fol. rut.

Scord.

absinth.

centaur. min.

card. bened. aa. 3ij.

Sem. carvi 3℔.

Farin. fabr. 3ij.

Pulverisata coq. in 7. chalybeat. q. l.

add.

Elect. discord. 3ij.

Camphor. 3℔.

7 rectificat. 3℔.

F. Cataplasma tepide applicandum.

Ad Scroti tumorem duriusculum cum Inflammatione in puerulo 5. annorum variolis graviter laborante, fluent materia impura ad Scrotum, atque in tubulis ejus retento, d. 12 Octobr. 1688. sequentia præscripsit idem vir experientissimus.

℞. 7. rectifi. at. & camphorat. 3ij.

S. Liqueur externus calide adhibendus.

Hinc:

℞. Unguent. nutrit. 3℔.

Bol. Armen. 3ij.

Camphor. gr. xv.

7. rectificat. 3j.

Elect. discord. parum.

M. S. Balsamus Externus.

In Excoriatione Scroti conducunt quoque inter-  
na acrimonia humorum corrigentia, ut sunt

absorbentia. inter quæ pulvis temperans superius dictus solus sufficit, & diaphoretica pro re nata interponi possunt, ex quibus & decoctum ligni Guajaci, falsaparill. rad. Chinæ, aliaque lui Venereæ convenientia conducunt, imprimis verò in matriculis. in quo gummi falsastras ac Guajaci fuerit solutum, & hinc expectandus sudor omnibus his conducibilis: sic & purgantibus aliquando opus est, pulvere scil. laxativo cum 3io dulci exhibendo, adjectis aliquot granis gummi guttæ ad superfluum serum ab absorbantibus correctum eliminandum. Externe sufficit unguentum nostrum ad excoriationem superius in hisloris laborum jam communicatum, quod constat ex oleo olivarum, cerâ albâ & cerussa 3ia, quo referri potest unguentum rubrum, optimum hoc in casu aliisque, & proinde nobis solenne.

In Ulceribus verò scroti præter jam dicta in-  
terna, additis cinabarinis, & præcipuis iis, quæ ad scorbutum tollendum commendantur, sequenti utere iuternè:

℞. 7. flor. sambuc.

beton.

trisol. fibrin. aa. 3ij.

Ocul. & pp.

Corall. rub. pp. aa. 3j.

℞. 3ri fixi alcool. 3j.

Camphor. gr. xv.

℞. 3ri volat. 3℔.

Syr. trisol. fibrin. 3j.

M. dentur 2. vel 3. coctlearia.

Sal volatile oleosum ad 15. guttas datum egre-  
gium est remedium. Ante omnia nempe acrimonia corrosiva, tum lymphæ, tum aliorum liquorum circulantium est corrigenda & mitiganda, hæc enim correctâ ulcera facilius sanantur, ea propter præ aliis hic in usum ducenda veniunt sudorifera, ut decoctum ligni guajaci, falsastras, rad. falsaparill. scabiosæ, veronicæ, card. bened. scord. Tinctura 3ii 3lata, gum diaphoreticum, pulvis temperans, salia volatilia quæcumque, & interponatur semper potus Theæ cum ligno Guajaco, dein his simul usurpatis, topica optima eligenda sunt, convenientique decocta & injectiones vulnerariæ mediante syringa inlinuanda, ex decocto rad. aristol. symphyt. major. fol. heder. terrestr. consol. Saracen. Scabios. pyrol. faniicul. plantag. flor. cheiri, hyperici, laxiti, vel sequens:

℞. Herb.

℞. Herb. Chelidon. maj.  
absinth.  
ruiæ.  
scord.  
menth.

Rad. aristol. o

caryophyll. cum toto aa. ʒi.

Coq. in Aq. commun.

Colat. ℥ij. add.

~ vin. ʒij.

Sacchar. ʒi ʒij.

Camphor. ʒi.

℞ii præcipiat. gr. xij. vel

sublimat. gr. vj.

M. pro plumaceolis & iniectione.

Hic externè convenit unguentum mundificans superiorem capite jam communicatum, vel gryseum nostrum inferius dicendum, sive emplastrum nostrum de labdano, vel, qui meliores sunt, liquores varii tepide ulceri applicandi.

℞. Aq. calc. viv. ʒij.

Spir. vin. camphor. ʒi.

Balf. nervin. n. d. ʒi.

Elixir. vitæ ʒb.

M.

Vel :

℞. ∇. Regin. Hungar. ʒi.

Elixir. vitæ ʒb.

Tinctur. ass. fastid. ʒij.

℞ii ʒi ʒi.

Myrrh. ʒij.

Aloes ʒi.

M. & detur usui.

Medicamento hoc imbuta quater de die calide plumaceola imponantur. Spiritus matricialis cum camphora, saccharo ʒi & ʒio dulci optimus erit sæpius de die calide applicatus.

Vulneri.

*Videtur* Scroti curatur ut aliarum partium vulnera, hoc tamen observato. quòd dum partes hæ non adeò carnosæ, sed potiùs glandulosæ ac membranosæ sunt, eò respiciendum sit, ut succi per eas circulares ad motum progressivum incitentur, nec ad stagnationem diu detineantur, hinc conveniunt balsama volatilia vulneraria applicata, internis simul adhibitis cinabarinis, oculi &c. & calidissimis temperantibus. & acrimoniam corrigentibus dictis remediis, quæ sunt omnia absorbentia, ac diaphoretica sæpius dicta. quare sæpius solis liquoribus vulnera hæc curari possunt; ex. gr.

℞. ∇. ʒi ʒij.

Spir. vin. camphorat. ʒi.

M.

℞. ∇. Calc. viv. ʒij.

Ol. Hyperic. ʒb.

Agitentur, donec F. Linimentum.

Vel :

℞. Terebinth. Ven. ʒb.

Olei Cera ʒb.

Gumm. Elemi ʒij.

Myrrh.

Maſſich. aa. ʒb.

Aq. Regin. Hung. ʒvj.

Elix. vit. ʒi.

M. Applicetur cum plumaceolis scroti vulnerato calide. Imponi quoque potest Emplastrum de Labdano, Sticticum Paracelsi, de Gratia Dei, &c. Balsamus de Hyperico & de Peru etiam commodè applicantur.

In *Contusione* Scroti annitendum est, ut obstructicanealculi referentur, & stagnantes succi resolvantur, quem effectum egregiè præstant omnia aromatica vegetabilia, quæ opè subtilium spirituum, salium volatilium & oleorum, quæ in se continent, humores stagnantes resolvunt, quem in finem sequens præ aliis conducet remedium.

℞. Elix. vit. ʒij.

~ ℞ii ʒi caryophyllat. ʒij.

matricat. ʒij.

camphor. ʒij.

M. &c. applicetur parti contusæ, & quidem tepide. Sic etiam possunt ∇ Regin. Hungar &c. ~ flor. sambuc. applicari. aut cataplasmata ex aromaticis parata, nempe ex salvia, ruta, semine cumini, fœniculi, caryophyllorum, macis, radic. Ireos Florent. Sigilli Salomonis, summitatibus absinthii, bacis lauri, juniperi, &c. cum vino Gallico coctis & applicatis; vel si emplastrum desideras, sequens poterit.

℞. Picis nigr. ʒij.

Gumm. elem. ʒi.

Stryac. liquid.

Terebinth. aa. ʒb.

℞ii ʒi.

*Liqueſcant ſimul*, & F. Emplastrum scroto contuso applicandum. Emplastrum quoque nostrum de labdano & de cumino in contusionibus hæc aliarumque partium egregia sunt, raròque te operato frustabunt effectus. Sic quoque focus ex resolventibus cum herbis, tum radicibus, tum fructibus, seminibusque utiliter parabuntur.

Interna diaphoretica ac resolventia haud negligenda sunt, quæ sanguinem ac succos stagnantes ad motum progressivum suum incitant, hinc salia volatilia, spirituosæ, aliaque diaphoretica, etiam fixiora egregiam navant opem, imprimis spiritus matricialis ad guttas 60. internè exhibitus, item Sium diaphoreticum, bezoarticum minerale, potus quoque calidus Theæ vel Coffæ vel Chocolatæ hic apprimè conducet, motum enim succorum promovet, eos fluidiores reddendo, quo facto necessariò sanguis ac reliqui humores in scroto stagnantes & livorem sæpe exhibentes resolvuntur, & ad circulandum idonei fiunt, unde & spiritus animales recreantur.

## CAPUT III.

## De Virga morbis, Lipoderno, Phimosi, Paraphimosi, Priapismo, Satyriasi, Distortione, Inflatione, Excrefcentiis, Verrucis, Caruncula &amp; Ulceribus.

## §. I.

Lipodermi.

Apella.

Phimosis.

Paraphimosis.

Distortio Peni.

Priapismus.

Satyriasis.

Sicut reliquæ humani Corporis partes omnes variis subiectæ sunt morbis, ita nec Virga ab iisdem intacta relinquitur. Inter morbos hos recensendi veniunt *Lipodermis*, qui dicitur *λίπος & δερμὶς*, hoc est, defectus cutis præputii, quia affectus hic est, quando præputium deest ex morbo vel sectione, vel ab alia causa contractum est, ut glandem amplius tegere nequeat, dicitur & Latinis *Apella*, Romani etiam *Recusitum* vocant, & convenit cum *Paraphimosis*, inter eum à primo ortu pueruli nudâ conspicitur glande, quale exemplum his diebus in propriis vidi ædibus, in quibus infans nobilis natus est, cujus penis instar hastæ erat, & glans nullo operimento dotata, sed penis omni præputio destituebatur.

*Phimosis* est, quando præputio ita fortiter obtegatur glans, ut illud reduci nequeat: Dicitur *φίμωσις*, quod nexum summi orificii sacculorum, cum toto illius ambitu in angustum collecto funiculo clauduntur ac ligantur, significat *Respinctio de Part. Genis. p. 1. c. 30.*

*Paraphimosis* ei contrarium est vitium, cum videlicet ea, quæ ordinario meatu occludunt, opercula & tegumenta ita deducta sunt, ut reduci nequeant. Proprie tamen dicitur de præputio retrorsum adducto, ut glandem tegere nequeat, quod malum ex nervi contractione maxime contingere creditur, vel ex inmodicâ præputii siccitate.

*Distortio Peni* dicitur, quando ipse diu distentus & distortus, & quasi incurvatus permanet: Huc referri potest *Priapismus*, seu priapi sive virilis membri invita erectio, in quo affectu penis, quasi catalepsi ætetero affectus, totus rigidus manet citra appetitum rei venereæ à convulsione productus, inde nonnullis dicitur *Priapismus*, Convulsio particularis, vel rigiditas convulsiva penis, absque stimulo ad libidinem vel coitum, proveniens à Spiritibus flatuosis ac crassis, spongiosos nervosi corporis canaliculos ac meatus occupantibus ac distendentibus. Rara est historia & fascino adscribenda, quam mihi communicavit Cl. Dn. L. J. Augustinus Hæner voltius Phys. Arnstadiensis. Non adeo nuper concubuit cum milite pagani cujusdam uxor, quæ post actum turpem, oppido totum isti suo surrepuit amasio priapum, huncque non sine militis magno cordis & abdominis dolore perditum intra 14 horas, umbilico impositis calidis cineribus, illa restituit Venefica. Intra triplicem membranarum vesicæ complexum inclusi & distensi flatus in alio membrum hoc retraxisse refert *D. Pecul Sorbait Observ. 30. Anno 1. Ephem. nostr.*

*Satyriasis* vel *Satyriismus* est, quando penis libidinosè distenditur & palpitat cum stimulo ad coitum frequentiori, quam alias in statu sano fieri conveniebat, quod contingit ob inflammationem partis hujus, unde fibræ non modo tenduntur, sed variè quoque concutuntur: Vocatur ita à *Satyris*, quibus rigida & ex pruritu

ad Venerem exercendam palpitantia genitalia vulgò adscribuntur.

*Virga Inflatio*, aliis *Emphysema* seu *tumor virga tympaniticus* dictus, est tumor statuosus, sive à flatibus vaporibus crassis, vel ab humoribus circulantibus, & in tubulis penis stagnantibus & partes distendentibus obortus.

*Inflammati* est *tumor virga* cum dolore ac rubore à stagnatione sanguinis ac succorum proveniens.

*Verruca* & *Excrefcentia* sunt vel in summo glandis, vel circa glandis carnem, & sæpè sub ipso præputio protuberantia tubercula, suntque mollia, fungosa, semper seetè nuadent, scetent & indies augentur, iis solennes esse solent, qui morbo Gallico laborant, à succis acris & diu stagnantibus oborta.

*Caruncula* in ipsâ urethra & penis foramine existit, & canalem hunc obstruit, hinc urina impeditur, ob foraminis hujus obstructionem; item lue venerea infectis solennis affectus.

*Ulcer* penis sunt diversa, alia sunt externa, quæ visui patent, & circa glandem & præputium apparent: alia sunt interna in meatu urinario hærentia, imprimis in pelvi glandis, alia altius penetrant, ut æquæ externæ & internæ partes exulcerentur, & ulcus usque ad meatum urinarium penetrat: Alia sunt virulenta, qualia in lue venerea toto contingunt die.

Reliqui affectus peni obvenientes, in sunt *Cancer*, *hamorrhagia*, *gangrena*, *penis duplex*, *excrementorum alvi per penem ejectio*, *penis imperforatio*, &c. cum ex raris contingentibus sunt, non ex professo de his tractare placuit, sed possumus omnia ex generalibus capitibus haberi, ne toties repetendo lecturis nauseam pariamus.

§. 2. *Pars affe*cta est *Penis* seu *Membrum virile*, quod & aliis dicitur *mentula*, quod rigida hæc pars viro mentem quasi eripiat, vel à seriis ad jocosa & Venerem avertat. Quanta æstimatione ac dignitate membrum virile apud *Agyptios* & alios habitum fuerit, videre est in *Risitano*, *Anthropographia libr. II. cap. XXX.* & apud *Linschottum in suo Itinerario*, &c. Membrum hoc situm est in imi ventris parte inferiore, ut commo diùsheret congressus, & aliis partibus impedimento non esset, ortum suum ducit à valido ac robustissimo fundamento, scilicet pubis ossibus. Magnitudo istius penis in ætate pro vectis ordinatio est unius spithamæ, sed maxime variat ista longitudo. Ineptum est illud obstericum dictum, futurum penem majorem, si vasa umbilicalia non proximè ad umbilicum ligentur, abscedanturque in recens natis ob Urachum, qui inter vasa umbilicalia continetur, & vesicæ fundo annectitur, unde existimant retrò membrum id cum vesicâ trahi, quod tamen ob sua vasa & musculos impossibile est. Penis constat ex cuticula, cute & panniculo carnosio absque pinguedine, quæ partes dicuntur ab Anatomicis externæ seu contingentes. Internæ



teræ verò seu contentæ partes ipsi sunt duo corpora nervosa, septimæ, glans, quatuor musculi & vasa. Interna corporum horum nervosorum substantia spongiosa est, innumeris quasi fibris & glandulis mirabili figura hinc inde excurrentibus, ac membranam aqualiter, ne nimium dilatetur, retinentibus componitur, hinc cum penis flaccidus, magnus, vel parvus existat, à majori vel minori sanguinis ac aliorum succorum imprimis spirituum copiâ in corporibus nervosis existentibus dependet. Glans ex carnosiori parte formata est, quæ tegitur præputio, sic vocato, quia præ pudendis existit. Excrescit hæc pars Ægyptiorum Arabumque puerulis, testant *Veslingius in Synonym. Anatomico. c. 6.* in tandem longitudinem, ut Periphimosim metum partem ejus abscondere cogantur, contrâ verò interdum ita immunitur & coarctatur, ut non nisi cum maxima difficultate urina excernatur. Adhæret quoque præputii pars glandi, mediante vinculo, quod ab Anatomicis Frenum dicitur.

Glans ipsa exquisito titillationis sensu prædita est, & magis quàm ulla totius corporis pars, quia plane sere nervosa, cum in finem, ut coitus maximâ cum jucunditate ac titillatione peragi possit. Sic & penis sua vasa, nervos, arterias, venas ab hypogastricis prodeuntes habet. Qui plura cupit adeat Anatomicos celeberrimos *Barbolinus* ac *Blankardus*.

Diagnosi.

§. 3. In tanta morborum unan partem invadentium pluralitate opus est *Dignotione*, ne unus pro alio suscipiatur curandus cum frustraneo quodam conatu. *Lipodermos* igitur cognoscitur ex penis incurvatione, à præputii retractione, & morbo convulso ægrum vexante, quem & Symptomata eadem comitari solent, quæ alios affectus spasmodicos sequuntur; quandoque est à nativitate, & oculorum juvenine ex datis modo signis facillè patet.

*Phymosis* ipso quoque aspectu innotescit, cum glans tegatur præputio, ut retrahi nequeat, urinæ effluviū paucum vel nullum erit, peritonæum distenditur, adest dolor in urethra ob urinæ acrimoniam ibidem detentæ fibrillas lacerantem, cum maximo conatu penis interioris ægri aliquando excernunt urinam.

*Paraphimosis* cognoscitur ex præputii retractione glandem non tegentis, unde dolorem persistenti ægri.

*Distortio* penis accidit iis, qui Veneri nimis indulgent, & distentum diu sibi servant membrum genitale, cum Spiritus & sanguis influentes distendunt canaliculos, & sic sibi viam parant aptam, alibi verò in parte penis cessat hic influxus; hinc ut distortaetur penis, necesse est: facit enim & glandulæ instar protuberare facit. Sic quoque *D. Fridericus Ann. 3. Eph. Germ.* exemplum affert pueruli quinquennalis, in quo penis incurvatus apparebat, qualem *Barbolinus in Anat. reform. p. 149.* observavit, excepto hoc unico, quod glans penis præputio fuerit legitimo modo tecta. In inferiore penis parte interna apparebat glans, filo quasi alligata, quod filum unico ductu per corpus penis ad os pudendi usque sese extendebat, brevis indies factum penem magis magisque incurvabat, ita planè, ut postea difficulter moeretur, qualem etiam causam nuper vidi. Hinc Incurvationes istæ ipso aspectu patent, non opus est ergo pluribus lignis.

Diagnosi  
Inflatio seu Emphysema.

*Inflatio seu Emphysema Penis* cognoscitur ex

ipsius tumore, qui quandoque est pellucidus, indolens, velicæ instar inflatus & vento repletus, à regione pubis ad extremum usque præputii ita inflatur, ut glans penis non amplius in conspectum veniat, sed sere tegatur, omnia hic adsunt signa, quæ ponuntur absauctoribus de tumoribus flatulentis, instar omnium vide *Sennertum l. 5. Prax. Paris. c. 51.* qui tumor in primis glandi accidit in Gonorrhæa virulenta, in qua effluit primò semen tenuius, postea acrius, hinc supervenit dolor super glandem, & urina cum dolore emittitur, liquamen quod effluit, graves dolores producit per universam urethram, liquor effluens fit citrius, tandem cærulescens, supervenit tunc tumor præputii, nam liquor hinc inde reliquias ponit intra præputium, & pululentum tandem tumorem infert.

*Inflammationis* signa sunt eadem, quæ sunt aliarum partium inflammationis, conspiciuntur nempe tumor, rubor, ac dolor, febris, lues venerea seu scorbutus, &c. reliquis autem signa inflammationis ex capite generali peti possunt, huc referenda.

In *Priapismo* virile membrum invictè erigitur, etiam absque appetitu Veneris, & penis convellitur cum dolore aliquo, imò tensio penis à coitu peracto non remittit, uti in *Satyrismi* accidere solet, licet in hac mox nova erectio, eaque sæpius subsequatur. *Priapismus* subinde remittit, mox iterum revertitur, reperiuntur etiam hæc effectus complicati cum aliis morbis, & quidem *Satyrismi* cum inflammatione aut Elephantiasi: *Priapismus* cum gonorrhæa, & salacitas in iis, qui multi roboris sunt.

*Verruca* & *Excrescentia* apparent vel in summitate glandis, vel circa glandem, & sub ipso præputio extuberant; hæc *Excrescentia* sunt sæpe molles, fungosæ, & ut plurimum madent, male olent, & de die in diem excrescunt & augentur: ubi morbus Gallicus, ibi ejusmodi fungosæ *Excrescentia* apparent.

Eodem modo comparatum est cum *carunculis* & *ulceribus*, externa enim ulcera visui patent, aliquando tamen sunt circa glandem & præputium, & propter membri tumorem videri nequeunt; Interna verò ulcera ex dolore à transiente urina acri excitato, & pure ante urinam egrediente, pene tumido & tensio cognoscuntur; etiam aliquando vel ab apostemate inflammationem insequente, vel à calculis asperis transitu lædentibus: Ex ipsa tandem virulenta & fœditate innotescent ulcera antiqua.

§. 4. *Ætiologia* morborum præsentium *Galenici* ita efformant, ut in *Lipodermos* tanquam causas acculerent, facultatis plasticæ aberrationem aut debilitatem, aut materię spermaticæ defectum, unde cutis penis sufficienter ad glandis connectionem non fuerit elaborata, tum quoque abscissionem cutis, qui gentium quarundam, maxime Judicæ, mos est, studio factam, unde cutis abbreviatur, ut ad glandis investituram non sufficiat, vel abscissionem ab humoribus erodentibus, vel spasium, ob quam cutis contrahatur, nec supra glandem valeat diuci.

*Phimosin* fieri dicunt tum ob cicatricem in *Phimosi* præputio factam, unde cutis rigidior reduci nequeat, tum ob carnis accretionem præputium tam fortiter super glandem detinentem, ut hæc denudari nequeat; *Paraphimosin* verò oriri volunt ab inflammatione penis, in qua cute retrò

Diagnosi  
Priapismi.

Galenico-  
rum opinio  
de causis  
Lipodermi.

Phimosi  
& Para-  
phimosi.

abducta glans intumuerit, nec præputium amplius admittat.

*Priapismi & Stryriasi.* *Priapismus* & *Stryriasis* originem habere putant à dilatatis oris venarum & artiarum in pudendo, vel statu vaporoso iuxta nervum antrosum oborto, sive spiritu flatulento ex crassissimis pituitosis humoribus orto, qui nervum fistulosum erectorem Penis inflat & distendit, uti ipse *Galenus lib. 9. cap. 7.* statuit. Sic etiam ob effervescentiam sanguinis arteriosi, simulque copiam, artiarumque rarefactionem, unde copiosus spiritus in penem effunditur. Causæ remotiores ipsi *Galenicus* sunt: cibus euchymus multus & acris, unde sanguinis & seminis copia generatur, item supinus decubitus, abstinentia à Venere; vel etiam fit à partium genitalium inflammatione, ulcere, dolore, &c. hinc materia illa flatulenta magnâ copîâ attrahitur, incurvatur & convellitur membrum, hominesque ad mortem nonnunquam præcipitantur, dolores enim sunt, quales tetanici, & moriuntur ventre inflato, teste *Aetio Serm. 1. c. 31.*

*Priapismi & Stryriasi.*

*Distorsio. in Virgâ.*

*Distorsionem* Penis vel à primo ortu existere dicunt, vel ex convulsione aut immodico Venereis usu postmodum contingere, eo quod parte hæc diutius distenta, spiritus in ligamenti conclusi in aliquam alterius ligamenti partem impetu facientes eam relaxent & protuberare faciant, quapropter quantum huic parti accedat latitudinis, tantum ei detrahatur longitudinis, adeoque impar fiat alteri parti opposita.

*Inflatio in.*

*Inflationis* Penis causam eandem statuunt, quam *Priapismi*, spiritum nempe flatulentum, abs quo adeo distendatur.

*Inflammationis.*

*Inflammationis* Penis oriri volunt à sanguine puro vel impuro copiosius in eum fluente, promoventibus hunc influxum Venere immodica & impetuosâ, casu, aut contusione, aliisque rebus (sanguinem) alientibus.

*Excrecentiarum, &c.*

*Excrecentiarum*, *Verrucarum* *Caruncularum* originem imputant huius Venereæ, vel Ulceris, partes Penis interiores erodentibus ut humor nutritivus extillet, qui demum in crassatissimum ejusmodi abeat protuberantiam.

*Vicerum.*

Ulcera causam proficiunt modo inflammationem suppuratam, modo urinam mordacem, semè acre ac virulenta, unguinem alperum intertransiendum urethram erodentia, modo concubitus impurum, in quo uteris muliebris impuritatis refertus penem inficiat & erodat, modo medicamenta ad callum absumendum adhibita exulcerantia.

*Paracelsi de causis morborum, & de morborum profectibus.*

§. 5. *Paracelsus* Virgæ *Lipodermum* & *Paraphimosis* aut à resectione studio vel necessitate facta, aut à spiritu quodam mercuriali cutis deductionem impediende fieri posse affirmat, unde glans nuda persistere cogatur.

*Phimosis* à vitiosa in utero formatione, in qua præputium supra glandem adeo corrugatum & arcum reddatur, ut deduci nequeat, vel ab accretentia quadam post ulcus produci fatetur, *Priapismus* verò & *Stryriasis* ex luxu vel contractura, uti & *Distorsionem*, *Inflationem* & *Ulcus* à sale quodam vitriolico, cui si sal quoddam sanguinis intermiscetur, *Excrecentias*, *Carunculas* & *Verrucas* pronalci statuit.

*Helmontii opinio de morborum profectibus.*

§. 6. *Helmontius* priorum dicta huius morbis approbans, *Lipodermum* ex resectione aut absumptione à latice acido acris factâ ortum sumere annuit, uti *Phimosis* à vitiosa conformatione in

utero, velex præcedente ulcere, unde partes læsæ crescant; *Paraphimosis* ex glandis intumescencia inflammatoria, ob quam præputio tegi nequeat; *Priapismus* & *Stryriasis* nec non *Distorsionem* & *Inflationem* Penis vel ex spasmo & contractione, vel ex statu à fermento vitioso spermatico producto & virgam variè tendente; *Inflammationem* ex peregrino quodam in pene consistente & cruoris transitum impediante, sicque Archzum in furore concitante; *Excrecentias*, *Carunculas* & *Verrucas* ex custode prodigio nutrimentum partis huius variè dispergente, & *Ulcus* à latice acido acriori cutaneo partem hanc exedente.

§. 7. *SV* illius ut causas admittit in *Lipodermum* ut illius resectionem præputii vel religionis, vel necessitate gratiâ factam, dum pars hæc fuit corrupta, ut auferri deberit; vel absumptionem ab humoribus acris: in *Paraphimosis* glandis intumescencia, cui tegenda præputium non sufficit; in *Phimosis* accretentiam præputii ad glandem vel in utero, vel post partis exulcerationem mediante cicatrice obortam: in *Priapismo*, *Stryriasi*, *Distorsione* & *Inflatione* spasmodicum aliquid subesse existimat, quo membranz partis huius detineatur, dum tubuli ejus vehementi spirituum explosione intumescant. In Partis huius *Inflammatione* causam agere vult sanguinem ob vasorum obstructionem à lentore induratum diuturniorem in interstitiis membranarum extravasatum diutius detentum, & propterea accensum. A sanguine per contagium Venere corrupto & in glandulis impuritates suas deponente non modò *Ulcera* in Virgâ suscitari credit, sed dum succus nutritivus aliquo impuritatis istius immiscetur & cum illis coagulatur, varias inde *Excrecentias*, *Carunculas* & *Verrucas* in penis meatu propellulare.

§. 8. *Sylvius* causam *Lipodermi* imputat vel *Sylvii opinio de causis morborum in Penis.* resectioni, vel absumptioni ab acido acris, ut ita absente præputio glans obtegi nequeat: interdum verò *Paraphimosis* à convulsione oriri posse existimat, quod cutis ita contrahatur, ne convenienter deduci nec glandem investire valeat.

*Phimosis* vel ex malâ in utero formatione, vel ex tumore & humoribus crassissimis ortum habere putat, unde frenum adeo angustetur, ut cutis glandi firmius annexa retrahi, & glans ipsa nequeat denudari.

*Priapismi*, *Stryriasis*, & *Inflationis* Penis originem adscribit statibus nimia copia in penem irruentibus, eumque ita rigidum reddentibus, status verò ex pituita viscidâ & bili invicem commixtis etiam hinc exurgere proficitur.

*Distorsionem* Virgæ ut plurimum ad spasmodum referendam esse contendit, spiritibus animalibus ad unius lateris corpus nervosum, quàm ad aliud copiosius & impetuosius propulsis, & in eo diutius commorantibus.

*Inflammationis* Penis causam esse dicit sanguinem in ductibus Penis diutius subsistentem, ut subtiliores sive spirituosiores particule ejus evanescent, & oleosæ cum acidis & salis incipient effervescere.

*Excrecentias*, *Carunculas* & *Verrucas* post Luen Veneream in Pene emergere dicit, quando cute ab acido erosa, sanguis nutritius per foramina extillat, & in protuberantias istiusmodi convertitur.

*Ulcera* in Virgâ excitari dicit ab acido quodam

dam peculiari, à contagio quodam Venereo frequentius parti huic communicato, eamque periculose & dolorose erodente.

*Cartesia-  
norum de  
causis  
Morbis  
Virga  
sentia.*

§. 9. *Cartesianorum* sententia est, *Lipodermum* oriri à cutis glandemaliâ investientis absentia, vel quòd hac in primâ fœtus in utero formatione adeò curta sit elaborata, ut glandem attingere nequeat, vel postmodum abscissa sit vel religionis gratia, ut in circumfione Judæis est solenne, vel manu Chirurgi ob partis corruptæ amolitionem: vel quòd in ulceribus Venereis à particulis acutis et odontibus fuerit absumpta, ut glans oburgento suo ita destituitur.

*Phimosin* ortum sumere credunt vel ex malâ fœtus in utero conformatione, dum cutis penem & glandem investiens adeò proluxa & glandi annexa fuit, ut glans nunquam, nisi præmissâ medela, denudari possit, vel ex malâ ulcerum curatione, dum cutis glandi exulceratæ per cicatricem adhæreat & inter consolidandum firmiter annascatur.

*Paraphimosin* ab tumore glandis potissimum fieri volunt, impediendam, ne glans ipsa cute abbreviata obtegi possit.

*Priapismi*, *Satyriasis*, *Inflationis* & *Distorsionis* Penem causam adscribunt copiosiori spirituum in tubulos corporum nervosorum influxu, unde & sanguis in vasis & materia spermatica in canali diutius detineatur, compressis nempe tubulis, ut succi tam facile nequeant transfluere, sed fibræ spasmodicè detineantur; hic verò influxus si in unum corpus vehementior sit, quàm in alterum, penem variè distorqueri dicunt, qualis distorsio etiam contingere possit, si post ulcerum perverfam curationem cutis corrugetur, vel alio modo in parte abbrevietur.

In *Inflammationem* sanguini aliisque succis in tubulis Penem stagnantibus imputandam esse volunt, unde tubuli ita angustentur, ut exclusis globulis secundi elementi sola materia subtilis succo ingreditur, abs qua igneus ejusmodi motus suscitetur.

*Excrecentias*, *Carunculas*, *Verrucas* & *Ulcera* Penem plerumque ex Lue Venereâ pronasci statuunt, eo quòd acidum illud venenosum ex impuro coitu communicatum, sive particulæ acutissimæ sibi transversim junctæ in tubulis primo succorum excitent stagnationem, hinc diversæ cum porosioribus succorum partibus commotæ fibrulas distendant & rumpant, unde Ulcera emergant, ex quibus stillantes succi ab acido variè coagulati fibrulas ruptas extra ulcera protendant, quibus succus chylosus nutriende se associans varias istiusmodi producat excrecentias, eo citius emergentes, quòd semen in gonorrhœa vel urina asiduo perfluens ulcerum impediat consolidationem.

*Nostrum  
judicium  
de causâ  
Lipodermi.*

§. 10. Causâ *Lipodermi*, me judice, nihil aliud est, quàm motus convulsivus fibrillarum ac nervorum præputii, à volatu nimio spirituum animalium, seu eorum concitatissima agitatione & dispersione succi nervei ad hæc loca, hinc mortifices fibræ præputii ita inde contrahuntur, ut glans amplius conspici nequeat. Causa mediata proximior aliquando est succus halituosus, elasticus, fixior, indeque enatus vapor spirituum auram interturbans, easdem ad inflandum partes præputii partim irritans, partim coagulans, acidus puta, acris, austerus, & crassior, tenacior & respectivè fixior.

*Phimosin* causa est tumor præputii, in quo sæpe stagnant vel evasunt humores partes præputii distendentes, quæ distensæ obtegent glandem, & impediunt urinæ effluxum, aliæque Symptomata excitant: Quidam dicunt esse vaporem inflativum & convulsivum. Affectus quibusdam est à nativitate, ceu aliquot novimus exempla.

*Paraphimosin* causa est motus convulsivus præputii à materia acra & viscida in nervis vel succo nerveo existente, fibras præputii vellicante obortus, hinc præputium retrorsum trahitur, ut glandem tegere nequeat.

*Distorsionis* penis causa est spasmodica contractio vel discissio vasorum nerveorum, vel fibrillarum, hinc succus nerveus influere nequit secundum ordinem, & sic necellariò penis distorqueri debet, quod etiam fieri potest ab obstructione quadam, vel à tumore, vel viscido acri subsistente succo quodam. Hic & Plastica vis aberrat, & in partibus his ceu in alius distorsionem efficit. Contingit quandoque freni vel præputii vitio: Frenulum quod concernit, si nimis breve est, & tenditur membrum, glans retrahitur, & membrum incurvatur: Præputii ratiō fit, si nimia de glande sit retractio, ut nequeat denuò retrahi, quod sæpius ex violentiori coitu oriri solet.

*Inflatio* & Tumor Penem inducitur tum ob succorum crassitiem ac visciditatem, minus commodè per vasa penis transeuntium, qui humores ob acidum & visciditatem commorantur & stagnant, hinc penem redunt tumentem, vel status succis istis immixti cutem penis distendunt, aut acre quid à coitu impuro sibi contractum fibrillas nerveas, & cutem pungit, dolorem inferit, & tumorem stagnando efficit, uti & ipsum semen stagnando dolorem parit, tumoremque producit.

*Inflammationis* Penem causa eadem est ac aliarum partium, quæ dependet à stagnatione succorum circulantium in penis canaliculis & tubulis, & cum hac causâ ubivis abundè debemus, eam hic repetere tædet.

In *Priapismo* convellitur ac tetano afficitur penis, unde effectus hic partim convulsivus, vel à Spirituum copia vel acrimonia productus. Sæpe affectus hic incidit cum Hernia, Colica, cum multis flatibus, calculo, Epilepsia, &c. aliquando incidit Priapismus subsequente pollutione, id quod etiam in animi deliquio & is evenit, qui laqueo suspenduntur. Huc quoque spectat pollutio nocturna, quæ etiam diuturna est, ac verius diceretur somnola, id est, in somno & insomnio contingens. Causa ergo Priapismi omne id est, quod convulsiones, spasmosque ac tetanum efficere potest, ut sunt omnia, quæ succos acres, asperosque efficere possunt, qui fibrillas convellunt contrugantque, ac talem motum convulsivum inferunt, ut alibi ad nausæam jam dictum est.

*Satyriasis* Inflammationem sequitur, quo-  
niam fibrulæ à particulis igneis non modo nimium tenduntur, sed variè agitantur, & hinc palpitatio exoritur, & simul ad coitum fibræ vellicatæ incitant.

Inter varia illa dolorisque immensi plena, quæ scortatoribus & adulteris iusto Dei judicio obveniunt, uti diximus, sunt præcipuè *Excrecentia* illæ carnosæ in urethra ut plurimum obor-

obortæ, quæ causam agnoscunt succi nutritii, imprimis circa has partes collecti acrimoniæ, accedente simul acido coagulante. hinc perruptis vasis suis coagulatur, & in talem carnem transit substantiam, ex qua coagulatione *Caruncula* oboriuntur, succus enim nutritius evasus facillè accedente acido in circulatione impeditur, & non amplius circulans in carunculam excrescit, quando enim nimia extensio staminum & vasorum violenta sit, tunc fibrillis læsis, alimentum partis proximum ulterius recipitur, diutius retinetur, & magis quàm par est, evasatur, & generatur ejusmodi caruncula urethram obstruens. Seminalis quoque in Gonorrhœa effluens materia in tantum læpe accrescit, ut urethram interdum exulceret & excoriet, in quo loco tum convescit verrucula, quæ vocatur *Caruncula Penis*, quæ tandem meatum obstruendo urinæ excretionem impedit, vel ischuriam, vel stranguriam producit. qualem non ita pridem in viro observavi sexagenario.

*Causa Verrucarum.*

Videntur verò oriri *Verrucæ*, seu jam alibi diximus, à succi nutritii acrimonia, vasa primò perfringente, affluente enim indies novo succo, succellu temporis consuetam sibi parat viam, hinc itaque à glandulis assiduò affluens succus exitum molienti etiam in distortis & ductis fibrillis sibi viam servare potest. unde meatus interior pervius manet, accrescentibus exterius particulis crassioribus tuberculum illud verrucosum solide efficiuntibus, succi acrimonia facillè oriri potest à concubitu impuro, quia in uteri cervicis impura plures hærent succi acres à semine virili æquæ ac liquore muliebri relictis. vel continua irritatione excussi fibrasque rumpentes, hinc effluit succus nutritius, qui tunc in hisce locis obsecens stagnans ejusmodi verrucas producit; hinc affectus hic lue venerea laborantibus, & scortatoribus solennis esse solet, qui toto in corpore suo habent acres succos aniam huic affectui præbentes.

*Penis Ulcerum causa.*

*Penis Ulceris* causa eadem est, ac aliorum ulcerum sæpius jam dicta. Causæ enim sunt succus acris corrosivus, scorbuticus, modò viscidus, & non rectè circulans, & sic in ipso ulcere demum corruptus, hinc & sæpè hic morbus ortum suum trahit, vel à lue Venerea, vel à scorbuto ab iisdem particulis corrosivis, acidis, viscidis in sanguine ac succis existentibus exortus. Producit aliquando ab Apostemate inflammationem insequente, vel ab urina acris, vel à calculis asperis ac cuspidatis in transitu spiculis suis lædentibus fibras, hinc effluunt succi, qui constituunt pus, quod continuo effluit, & acrimoniâ suâ adhuc alios canaliculos ac tubulos perfringit, aperitque. Unde oritur aliquando ulcus fistulosum, quod nuper observavi in rustico Hasso feliciter curato à remediis infra dicendis.

*Prognosis Penis Affectionum.*

§. 11. Affectus hi quævis rarò existant lethales, attamen ægris maximum incommodum afferunt, & si aliis morbis convulsivis associati sunt, periculum majus inferunt: Sic scorbutici alique, qui pleni sunt succis aeribus & viscidis, indeque circulatio succorum tardior, facillè in hos incidunt affectus, ut & ii, qui laborant lue Venerea, quia & hi læsent ejusmodi viscidis acris succis.

*Priapismus* ut affectus convulsivus non facillè curatur, & quandoque in Epilepsiam, Apople-

xiam aliosque morbos lethales transit. *Syrrhis* morbus est lætis periculosus, sæpe enim convulsio in propinquo, & vasa seminalia penitus resolvuntur.

Ob *Distortionem* Penis generatio prolium sæpe impeditur, & dolor oritur aliquando maximus, etque affectus hic pertinax & ferè incurabilis si à nativitate fuerit, semen enim non ita fortiter, nec rectâ lineâ ejici potest, quod tamen ad legitimam generationem requiritur, ut ovum muliebri attingi & fecundari possit contagio spirituosus ac vaporosus seminali.

*Inflatio* Penis malum non adeo magnum existit, nisi comitem habeat alium morbum, facillè enim discutientibus ac diaphoreticis internis, emollientibusque; externis calidè applicitis curatur.

*Inflammationem* Penis facillè insequi solet sphaecelus, vide *Bartholin. hist. 27. ac Centur. 6. hist. 96. Tulp. c. 33.* De putrefactione ejusdem membri à venerea quadam lue orta lege *Forest. l. 26. hist. 6.* Sic quoque, dum hæc scribo, Novellæ referunt de quodam viro, qui Lipsiæ semetipsum castravit absque periculo vitæ, quod & factum est abhinc aliquot annis à viro quodam mentis non planè compote.

*Caruncula ac excrescentia venerea* Penis ac urethræ non facillè sanantur, 1. quia sunt in parte mobili, 2. quia urina acris, seu semen tale viscosum continuo transit, & pelliculam, quam successivè perluit, abradit acrimoniâ suâ corrosivâ. 3. quoniam ibidem Medicamenta commodè applicari nequeunt. Caruncula hæc modò stranguriam, modò disuriam, modò ischuriam efficiunt, hinc difficillimè sunt curatæ, quia sæpè lue Venereæ comitem habent; ob membranosas quoque partes ibi tæm existentes corrosivæ aliæque acris causticæ haud applicari possunt, nec commodus locus est ad excindendas, amputandasque has carunculas.

*Verrucæ* hisce in locis Penis, præsertim interiores, difficillimè sunt sanatæ, exteriores verò facillè curari possunt, modò non oriantur à lue Venerea, quæ seu dictum, difficiliores sunt curatæ, lues enim simul curari debet.

*Ulceræ* his in partibus genitalibus membranosis difficilioris sunt sanationis, quàm in aliis carnosiss, facillè enim transeunt in gangrænam & sphacelum. In quibusdam ægris lue venerea infectis prostratæ glandulosæ ulceratæ, & quasi excoriatæ fuerunt observatæ, nam dum in coitu impuro incalescunt partes genitales, utclercæ vaginæ uterinæ exhalant miasmata acris, quæ se insinuant in cavum urethræ, & penetrant in prostratas glandulosas, dein inquinant lympham dictarum prostratarum, quæ lymphæ inquinata accrescit, acescit, stagnat, degeneratque in virulentiam, hinc à tali specifico acore Venereo liquor corruptus sensim effluens urethram & præputium afficit, pari modo ac videmus quotidie miasmata febrile malignum communicari aliis. Sic *Cl. D. Vogel sanguis, Amicus noster singularis*, nuper invilebat quendam febre maligna laborantem, & postquam manu pulsus ægritægerit eamque admovevit faciei, & imprimis nalo, statim ibidem pustulas à miasmate nactus est, tanquam testes malignitatis: quod etiam accidit Celeb. *D. J. Wuzel* Francofurtensii pustulam variolosam digito attingenti, & faciei similem pustulam admovendo digitum miasmata conspurcatum producenti.

Diana.

§. 12. His in affectibus genitalium externis, *Dietæ* etiam sedulo observanda est, hæc enim neglecta optima medicamenta frustra sæpe applicari solent, & quemadmodum homo aëre destitutus mori debet, ea propter is homini ad vitam conservandam, & sanitatem amissam restaurandam maximè necessarius est, qui tamen frigidus & humidus, ut & nimiscalidus nocere potest, aër enim frigidus, ceu notum est, non tantum sanguinem, sed & reliquos succos circulantibus incrassat coagulatque; aer verò nimis calidus efficit transpirationem nimis vehementem, hinc per sudorem nimium succi subtilis absumuntur, & restantes nimium incrassantur. Ut etiam optimum nutrimentum partibus afferatur, necessè est, utalimienta sint optima, elegantior ergo cibi boni succi & pleni lactis, vitentur contra peccidi, salsi, acres, saccharati & tenaces, qui reddunt chylum viscidiores, & per consequens humores reliquos tenaciores, & ad bonum nutrimentum ineptiores, hinc stagnationem producunt; sic quoque à vino, spiritui vini, aliisque acidis potulentis abstinendum, & potius decoctum ex farsiparilla, china, scorzonera, ligno guajac, cinamomo, sandal citrin. commendandum est, vel cerevisia tenuis medicata, vel potus Theæ vel Caphæ, vel veronica, betonica, salvia, torismar. vel alius herbor. aut ligni appropiati.

Motus corporis haud sit nimius, ne sanguinem ac succos reliquos nimium à corpore per poros cutis elicias & reliquos incrasses, certum enim est iuxta commune ac notum dictum, *Quietæ & abstinentia* imprimis à Venere & aliis peccatis cibis, multi curantur morbi.

Somnus concedendus est ad satietatem, nec his in affectibus pomeridianum atro notamus carbone, vigilæ verò maximè sunt noxiæ, per hæc enim succi circulantibus sunt spissiores actioresque, hinc affectus hi genitales magis augentur, quam diminuntur.

Alvus sit libera cum reliquis excernendis.

Animi passiones, ut sunt invidia, terror, moror, ambitio, in venere propensio seu continua cogitatio de Venere, amor illicitus, maxime per hæc in affectibus genitalibus vitanda sunt, per hæc enim succi actiores viscidioresque redduntur qui tunc autores ac fabri horum affectuum existere possunt; hilaritati, tranquillitati ac modestiæ, pudicitiæque studendum. sua quoque forte quisque sit contentus. hinc à mente hilari succi & liquores circulantibus. imprimis succus nervus, agiliores & ad motum aptiores disponuntur.

Imprimis hiæce in morbis genitalibus à Venere. coitu impuro ac illicito abstinendum est. inde enim sæpius hæc lacrimæ sunt, quoniam partes hæc genitales facillimè à vaginæ uteri exulceratione, pustulis, verrucis, eodem characterè notari possunt, ceu in quotidiana praxi occurrunt ejusmodi exempla plura. quorum etiam morborum à contagio insectorum superius dedimus rationes sufficientes, quas hic repetere non libet nec decet.

Galenicum  
cure  
in Lipodermi-  
mo.

§. 13. *Galenici* in morborum virgæ curationem sequenti aggrediuntur apparatu. In *Lipodermi*, ex *Celsi* monito, glandem nudam facilius obtegi posse promittunt, si æger adhuc puer sit, vitium naturale, glans parva & juxta eam cutis, coles verò spatiosior, quam si patiens fuerit vir, aut

ex more quorundam gentium circumcissus, & glans major, cutis procul ab ea distans, & coles angustior. Ut verò glans denudè retegatur, cutem circa eandemprehendunt & extendunt, usque dum glandem condant, ibique deligant, deinde juxta pubem in orbem terguis incidunt, donec coles nudetur, magnæque cavent curâ. ne vel urinx iter, vel venæ ibidem existentes inclinantur; quo factò cutem ad vinculum inclinant, & instat circuli circa pubem nudant. tum linamenta imponunt, ut caro increseat, & vulnus impleat, sicque latitudo plagæ velamentum aliquod ipsi glandi præstat, servando membrum hoc tam diu vinctum, donec cicatrix sit inducta, in medio exiguo solum relicto urinx itinere. In circumcissis sub circulo glandis cutem ab interiore cole scalpello diducunt, cum non ita doleat, sed summo soluto citra sanguinis profluxum ad pubem usque manu deorsum deduci possit. Cutem resolutam ultra glandem rursus extendunt, multâ aquâ frigidâ foveant, & emplastrum aliquod inflammationem accens circumdant, imperato simul victu tenuissimo, ne partem satietas excitet. Abactâ inflammatione à pube ad circulum usque deligare jubent, & super glandem adverso emplastro imposito inducere, ut ita pars inferior glutinetur, & superior ita, ne inharreat, sanescat.

In *Phimosis* ad glandem contestam aperiendam *Celsus* ita procedit. Subter à summa orâ cutem rectâ lineâ usque ad frænum incidit, ut terguis superius ita relaxatum retrò cedere possit. Si propter angustias aut tergoris duritiem parum sic profectum fuerit, cutem formâ triangulâ ab inferiore protinus excidit, ut vertex ejus ad frænum balis in tergo extremo sit, tum linimenta superdat, aliæque medicamenta ad sanitatem producentia, & ne ambulatorio ulcus fordidum reddat, ad cicatricis celeritorem inductionem necessarium imperat quietem. *Paulus* verò *Æginet. de remed. lib. 6. cap. 55.* talem præscribit processum. Postquam hominem prout convenit collocavit, attracto præputio in anteriorem partem, hamulostres aut quatuor in summum ipsum immittit, eosque ministris tenendos dat, & quantum fieri potest extendere & aperire ipsum jubet; postea si ex cicatrice externa contractio facta fuerit, scapello sectioni venarum apto, aut cultello aculeato, ex internis partibus præputium dividit in tribus aut quatuor locis, juxta internas partes sectiones faciens in directum extensas & æquali spatio inter se distantes, & cum duplex circa glandem præputium sit, osculum internæ in ipso partis dividit, ut ita contractio ex cicatrice oborta præputium abducatur, si verò caro ex internis partibus agnata, contractio nem effecerit, detractio præputio, in omnem carnem scarificationes facit, & eminentias intermedias carnis inter impacta vulnacula deradit, postea verò plumbum canalem papyro sicca obvolutum toti glandi circumdat, ita ut canalis undique æqualiter sit expansus. sic enim propter canalis circumpositionem præputium prohiberi ait, ne rursus inductum concrecat, ut quod præ plumbo, & obvolutâ papyro dissentium confervetur, cum papyrus ex irrigatione intumescens cutem adhuc magis disparet, unde hoc facit, sive propter cicatricem, sive propter carnis excretionem facta fuerit contractio.

*Paraphimosis* inveteratam incurabilem pronun-  
Ggg *phimosis.*



pronunciant, si verò nondum occalluerit, in directum factis vulnificulis tribus, aut quatuor, aut pluribus, & oleo calido multo affuso, ad externam partem præputium attrahunt.

*In Priapismo Satyriasi & Inflatione.* Si ob copiam spirituum & sanguinis, vel seminis, *Inflatio Penis, Priapismus*, aut *Satyriasis* contingat, venam secare jubent, imprimis in porphte, postea Penem & partes ei vicinas aquâ foveant frigida, vel linco plantaginis, nenuphar, vel aliis repellentibus. Si propter medicamenta Venerem irritantia affectus hi fuerint inducti, aquâ tepidâ partem foveant, & poscâ abluunt, si verò ob medicamenta acra, auferunt. repelluntque à parte hac sanguinem attractum. Si ob ulcus Priapismus fuerit abortus, & quidem internum, abluunt id refrigerantque injectâ aquâ nenuphar, myrthi, plantag. vel solatri, & inungunt agris his bibere aquam, & parum comedere. Quod si post immodicum coitum id accidat, oleo rosarum, vel oxyrrhodino penem foveant, frigidisque abluunt pedes, & refrigerant renes; his enim partibus refrigeratis nunquam penem distendi posse contendunt, ob id unguento albo *Galenii* renibus inuncto utuntur, perinzum quoque & plantas pedum, vel unguento populeonis, vel cerato sandalino, vel unguento albo *Rasis* ex cerulla illinunt.

*In Diffusione.* *Diffusionem Penis* à primo ortu existentem vix ullam admittere judicant medelam, eam verò, quæ à convulsione, adeoque aut inanitione aut repletionem nimia. post frequentiore Veneris actum, dependet, ita tractant, ut injectâ Veneris abstinencia ea adhibeant remedia, quæ nervosorum corporum distensionem, aut contracturam nimis conveniunt, in repletionem purgantia & Venæ sectionem præmittentes, in inanitione refocillantia remedia ex speciebus dianthos, diamoschi, & similibus, tum Penem foveant aquâ calida, & oleo simplicialido, vel oleo castoreo, de croco, auxungia vulpina, &c. inungunt. A nodo quodam productam diffusionem curare tentant subalstringentibus foci ex decocto absinthii, fol. myrti, myrtillorum, balaustrorum, corticum myrtobolanorum, nucum cupressi, seminis sumach in vino nigro austro facto, & instrumentum aliquod adhibent, quo Penis denuò rectâ extendi, & inconvenientem formam disponi valeat.

*In Inflammatione.* In Penis *Inflammatione* præmissâ sanguinis à venis malleolorum eductione ad revulsionem, in principio statim ad repellentia sua confugiunt, perfunduntque Penem decocto rosarum & meliloti, vel aquâ, in qua folia aut semen betæ effruerint, quibus apta simul instituitur discussio; adhibent etiam cataplasma ex pane cum palmulis lapâ maceratis, cum paucis olei rosacei, aut ex malicorio in vino cocto ac trito cum pane ac modico oleo rosaceo parato.

*In Excrecentiis, Carunculis, & Verrucis sive Tymosis.* Penis auferunt sectione & ulsione, postquam extirpationem rescicantia admovent remedia, quibus etiam utuntur, quando chirurgia commode nequit institui, qualia sunt medicamentum xeraphium dictum, sequenti modo parandum.

- ℞. Chalced. cruda ʒiſs.
- Mysocind. ʒiſs.
- Squama aris ʒij.
- Alum. sciss. ʒi.
- M. F. Pulv.

Hunc pulverem loco priùs vino eloto siccum inspergunt, vel gallam & alumen trita, aut origanum & radicem rutæ usta & trita eodem modo adhibent, ut excrecentia ista & thymi exsiccati decendant.

*Penis Ulcus* curant præmissis universalibus, *In Vlcere.* purgantibus & Venæ sectione ventrem frequentius leniendo, ut eò derivetur materia peccans, sequentibus vel similibus, Cassiâ recens extractâ, tamarindis, sebesten. electuario catholico, cum syrupo rosarum solutivo ad ʒj. in forma boli, vel decoctione hordei aut prunorum, deinde suadent decocta ad sudorem provocandum, ut ulcus siccetur, sub junctis trochiscis de alkekengi, posthæc ad topica transeunt. observantes, ut, si cum inflammatione aut Phymosi sit conjunctum, medicamenta diluant aquis refrigerantibus; eaque syringâ imitantur. Si ulcus denudari possit, medicamentis fortiter exsiccantibus curare satagunt, unguento nimirum diapompholygos & cortice mali granati, vel cerulâ usta & lora, vel atramento scriptorio, pannum etiam detritum carminatum frequenter mutatum, & ulceribus cavis impostum laudant. Si ulcus pitridum sit, auripigmento in aquis rosar. & plantag. soluto uti solent, ne amplius serpat, vel lixivio cum paucis *Ægyptiaco*, vel ad unguentum Apostolorum, & per vices ad mitiora perveniunt. Si recens est, cum quadam calefactione. leviter detergunt & refrigerant, qua de causâ aquam injiciunt plantaginis, solatri, nymphæ, myrtillorum, vel succum eorum, aut decoctum hordei cum syrupo de rosâ laxativo, serolactis, adduntque trochiscos albos *Rasis*, vel *Alkekengi*, vel decoctum lithargyri injiciunt, vel unguentum pompholygos cum albumine ovi & aqua hordei, vel serolactis. Renibus imponunt refrigerantia, ut urinæ ardor minuat, ut unguentum album *Galenii*, sandalinum, nutritum, album *Rasis*, & quæ ex oleis frigidis, leviterque adstringentibus parantur. Si parum bibant, & parum mejant, citius ægros hocce curandos esse promittunt.

§ 14. *Paracelsus* cum affectis suis in Penis *Paracelsus* *Lipodermo*, *Phymosi* & *Paraphimosis* præcedentium curæ nihil detrahunt, sed eandem quandoque, nihil agere videantur, institui posse autumant. In *Priapismo*, *Satyriasi* & *Inflatione* cataplasmata laudant ex farina fabarum & ruta parata cum aqua nenupharis, & foris Peni imposita. Ad *Diffusionem* proficuum æstimatur galbanetum *Paracelsi* frequentius illitum, vel oleum laurinum aut de Spica, quibus spiritus ille mercurialis Penem occupans dissipatur. Penis *Inflammationi* abigendæ proficuum esse promittit *Crollii* decoctum caulis hieracii cum aqua communi paratum, quotidie haustus ejus calidus assumuntur. Ad *Carunculas*, *Excrecentias* & *Verrucas* absumendas in Pene balsamo utuntur arsenici, uti ad *Vlcera* membri hujus sananda & incarnanda oleo Mercurii, vel sequenti mixtura:

- ℞. Terpentina ʒiij.
- Succs Alk. keng. ʒvij.
- Reduc per ablationem,
- ℞. Hujus ʒiiij.
- Torris ʒß.
- Gallar. ʒiſs.
- F. Mixtura, cujus dosis est ʒß. usque ad ʒj.

§. 15. *Hil.*

*Helmon-  
tiana mor-  
borum Pe-  
nis curatio.*

§. 15. *Helmontius*, & qui eum Duce[m] sibi propolierunt, *Lipodermum*, *Phimosis*, & *Paraphimosis* tanquam vitia originalia in defectu vel abundantia nullis remediis, quàm maximè etiam arcanis, corrigere nòrunt, nec non eadem ipsa, quæ vel refectionem, vel alios quosdam præcedentes morbos causas agnoscunt, quare Chirurgis tractationem eorundem permittunt, correcto simul latice, si hic morbos hoiçe foveat. Ad *Priapismum*, *Satyrasim* & *Inflationem* Penis commendant oleum rutæ frequentius Peni illitum, & alia quædam motus convulsivos placentia, ut oleum succini, castorei, quæ simul in Penis *Distorsione* à spasmo introducta conveniunt. In Penis *Inflammatione* ad Archæum sedandum saccharum Saturni internè & foris adhibuit proficuum existimant. Ad *Carnuncula*, *Excrecentias* & *Verrucas* Penis absumendas remedia ex vitriolo Romano, auripigmento, & alumine parata satis accommodata existere credunt, laudatque Gremisius potissimum sequens;

℞. Calc. viv.

Arsenici rubri, utriusque  
uno die in aceto macerati  
aa. ʒb.

Cerati de mucilagimibz ʒb.

M.

Ad *Ulcera* etiam Penis abigenda realgar fixum in spiritu vini solum et ulceribus hisce inspersum magnopere commendant.

*Cura mor-  
borum Pe-  
nis juxta  
Willisium.*

§. 16. *Willisius* quoque in *Lipodermi* nullam ab ea, quam antecessores jam proposuerunt, diversam exhibet curandi rationem, uti nec in *Phimosis*; solum in *Paraphimosis* ad tumorem glandis auferendum, quo cuius attolli & glandem contegere possit, cataplasinata discutientia approbans ex farina fabarum, lentisculæ palustris, floribus sambuci, melliloti pulverisatis, & aqua nymphaeæ subactis, vel ex mica panis albi, & pauco croci in lacte coctis.

In *Priapismo*, *Satyrasim*, *Distorsione* & *Inflatione* Penis, ubi cum flatibus aliquid spasmodicum intermixtum est, non modo flatu discutientia adhibet remedia, sed etiam antispasmodica, qua de causa præmissis aliquando clysteribus, sequentem propinat potiunculam cochleatim sumendam.

℞. Aq. Rut. ʒi.

menth.

nymph. aa. ʒb.

Essent. absint. ʒij.

Spir. ʒci ʒb.

campbor. ʒb.

Syr. de Portulac. ʒvj.

M.

Epithema Peni adhibet ex lacte in quo ruta, mentha, & semenagni casti incocta fuerunt, vel cataplasma ex foliis rutæ recentis contusis, cum foliis nymphaeæ, semine rutæ, agni casti, cumini, additâ aquâ nymphaeæ, vel solani, vel oleam camphoræ ad discutendum frequentius illinit.

In Penis *Inflammatione* sanguinem ad motum excitat venesectione tum in brachio, tum in pede instituta, ut vasa depleta eum, qui in vicinis stagnat, resorbant, tum lentorem corrigit diaphoreticis, ex cerulâ ʒii, vel spiritu fuliginis, aliisque, vel decocto ex lignis, & externa cataplasinata imponit, ex farina seminis

lini, althææ, floribus camomillæ, sambuci, &c. in lacte coctis, ut ita viæ dilatentur, & succi incrassati emolliantur, qua de causa, & ut simul dolores mitigentur, etiam unguentum, dialthææ aliquoties inungit.

Ad *Carnuncula*, *Excrecentias* & *Verrucas* Penis tum externas, tum internas abigendas, præmisso decocto aliquo sudorifero, vel pulverem inspergit ex lapide calaminari præparato, cerulâ thutia, & pauco aluminis usi, vel eundem cum melle tosto, ut in pulverem redigipossit, commiscet, & cum terebinthina in unguenti formam redigit, & hoc carunculis istis illinit, quod si nondum satisfaciât, vel unguentum Ægyptiacum inspissatum imponit, vel crystallos arsenici emplastro diachylo excipit, & ad verrucasque tangendas Peni insinuat.

In *Ulcere* Penis internè prædepicit decocta sudorifera ex lignis, aliisque vulneraria, nec non balsamum de Capaiba, tincturam ʒis, spiritum ʒi, & similia; inter topica aliis præfert unguentum de thutia, vel pulverem ex thure, aloë, sarcocolla & corticibus pini, nec non oleum myrrhæ guttatim infusillatum, vel aliis unguentis additum, & mediante cerea ulceri interno adhibuit.

§. 17. Juxta *Sylvium* à præcisione factus *Lipodermis* corrigi nequit, sin fuerit à convulsione, *Cura Syl-  
viana.* curatur antispasmodicis humorem acrem tollentibus & absorbentibus, imprimis salibus volatilibz oleosis, quæ summiopere commendat, sicuti & laudibus effert sudorifera, nempe ~um ʒi, cum ∇ Theriacali, aut ~u vini rectificato junctum. Externatopica varia laudat, ut olea & axungias humanam & anguillarum præputio illita, horum namque ope & salis lixiviosi, & spiritus acidi præsertim acrimonia temperatur, causaque doloris proinde ac convulsionis corrigitur. Commendat etiam fomentationes & balnea artificialia ex plantis salevolatilibz, & oleo abundantibus, ut & themas sulphureas, in quibus continetur aqua, oleum, ~usacidus, & sal lixiviosum paucum, quæ vim penetrandi habent egregiam.

*Paraphimosis* curam isdem absolvi vult remediis antispasmodicis, parum enim tum differt hic affectus à præcedenti à convulsione facto.

*Phimosis* verò juxta ipsum curatur, ut alius partitumor resolutentibus, ac internis sudoriferis sale volatili præditis, cum si hoc in casu humores sint crassi, viscosi, qui proinde juxta ipsum attenuatione indigent, ac absterfione, sive incisione quo fluidiores reddantur, nec in præputio alterius hæreant & conglutinentur. Commendat ergo ad humores coagulatos discutientes Penis frictions calore blando institutas. Hinc & sudorifera interna levem tantum sudorem moventia extollit. Externè etiam fons, cataplasmata, aliæque in tumoribus usitata adhibere præcipit.

Penis *Inflatio*, *Priapismus*, & *Satyrasim* juxta ipsam statuum discussionem, & humorum acrim corréctionem aut eductionem requirunt. Flatus autem discutiantur, ad mentem ipsius, vel statuum materiæ pituitæ viscidæ scil. incisione, vel illorum productricis bilis acrisejectione. Ad flatus Penem instantes discutientes commendat quæ interna ac externa remedia carminantia, oleum cort. aurant. feniculi

niculij anisi, &c. cum aqua fœniculi & menthæ, additque ~um Gri dulcem, huncque in finem sequentem vel similem præscribit formulam:

*℞. Aq. Petrosel.*

*fœnic. aa. ʒij.*

*theriacal. simpl. ʒij.*

*~ Gri dulc. gt. viij.*

*Lanaan. opiat. gr. j.*

*Syr. Papav. errat. ʒss.*

*M.* cochleatim porrigatur, donec sudor subsequatur.

Non sine magno successu topica quoque medicamenta in usum revocanda vult, ut sunt pulveres ex foliis & floribus aromaticis parati, & cum lacte cocti, & calide Peni tumefacto impositi, item inunctiones ex oleo rutaceo, liliorum alborum, lumbvicorum, camomillæ, &c. additis oleis stillatitiis ad majorem efficaciam & penetrationem, ut ol. macis, eumini, fœniculi, &c. Emplastrum quoque carminans ipsi solenne Peni impositum laudat.

Penis *Distortionem* iisdem ferè discutientibus curat remediis, præsertim cataplasmatibus ex radice altheæ, liliorum alborum, florum camomillæ, meliloti, in lacte coctis, & calide applicatis.

Penis *Inflammationem* curat Venæsectione instituta, dein varia interna obstructionem solvencia commendat, & externis suppetias ferentia, ut omnia aromatica temperata, & inde vocatas herbas aromaticas, nec non diaphoretica, in quem finem sequentem mixturam cochleatim in Penis Inflammatione exhibet.

*℞. Aq. Serpill.*

*fœnicul.*

*card. bened. aa. ʒj.*

*R. bellid.*

*cinamom. aa. ʒj.*

*ʒij diaphoret. ʒj.*

*~ sambuc.*

*ʒss ʒci aa. gr. xv.*

*℞. Syr. Scord. ʒj.*

*M.*

Præmissis his ad topica confugit, & hic cum aliis sanioribus repellentia ac refrigerantia rejicit, sed potius cito emollientia, attenuantia, incidentia, discutientia, deobstruentia sic vocata sola, aut cum prioribus, si nimis fortè agant, doloresque augeantur, temperata eligit, quibus materies penis corpori impacta incidetur, in halitus resolvetur, insensibiliter evacuabitur, & dolores mitigabuntur, ut ita maturè præveniat suppurationi, qualia multa commendat simplicia, ex. gr. enulam campanam, ablinthium, chamomillam, unguentum dialtheæ, imprimis sequens laudat cataplasma.

*℞. Rad. alth.*

*petrosel. aa. ʒj.*

*Fol. humalu.*

*lupul.*

*aneth.*

*hyssop. aa. M℔.*

*Flor. sambuc.*

*hyperic. aa. P. ij.*

*Farin. bord. Mij.*

*Ol. rapar. per express. ʒj.*

*Cog. s. a. in lactis ebullienti q. s. conquass. & fiat Cataplasma Peni affecto calide imponendum, sæpiusque iterandum. Vel imponit empla-*

strum diachylon simplex, aliaque cutis poros ob-servantia commendat, nec non saccullos siccos & fomenta ex herbis prædictis aromaticis parata.

*Excrecentiarum* Penis curatio ipsi huic Auctori peragitur variis exsiccanantibus remediis, qualia sunt pompholyx, thutia, aloë, myrrha: consolidans quoque decoctum immitendo in Penem per syringam.

Penis *Verrucas*, *Carynenias* ac *Ulcera*, quia plerumque comites sunt luis Venereæ, hanc prius curandam esse existimat Auctor, hinc commendat in lue Venereæ tum vomitoria, tum purgantia, tum diuretica, tum sudorifera, adeo ipsi nulla via est, quæ non conducatur lue huic curandæ; tutius verò ac jucundius curam, peccantiumque in Venereæ lue humorum evacuationem instituit per sudorifera, diuretica, & deorsum purgantia, citius autem at difficilissime eandem perfici aut per salivationem moventia, & quandoque vomitoria, quippe quæ salivationi simul promovenda sunt aptiora, in quem finem phlegmagoga eligit purgantia ex trochiscis althædæ, gummi galbano, lagupeno, opopanax, bdello: commendat etiam ʒila, quæ aliis addere jubet, in primis ʒum dulcem, præcipitatum quoque maxime fixum, tanquam optimum laudat. *Verrucas* verò decocto guajaci cæterorumque lignorum foveri jubet, imprimis verò aliis frustra usurpatis, & volatilium cupri tincturâ imbuto pustulas fœdas ac verrucas feliciter curavit, ac supra propriam expectationem subinde fustulit. Commendat quoque ʒum præcipitatum unguento alicui immistum & forinsecus applicatum.

Quod de Verrucis, Pustulis ac Carunculis modo dictum, idem de *Ulcerebus* Venereis judicat Auctor, ipsa scilicet universali lue curâ, si ritè fiat, simul curari & tolli, tum eâ, quæ per decocta sudorifera, tum eâ, quæ per salivationem cæterisque vacuationes Mercuriales absolvitur. Possunt quoque juxta ipsum ulcera Venereæ ablui ac mundari decocto guajaci & cæterorum aromaticorum potentium, quin tangi possunt Oleo volatili, liquido & cupri tincturâ imbuto. Unguentis etiam feliciter admiscet ʒum tum præcipitatum, tum sublimatum, ac præsertim dulcem, quorum ope postquam mundata sunt satis ulcera Venereæ, cæterorum more facili negotio etiam consolidantur.

*§. 18. Cartesiani* in utero jam productum *Liberum*, quamvis difficulter, aliquando tamen correctionem aliquam admittere credunt, si præmissis fotibus aut epithermatis emollientibus & relaxantibus ex farina seminis lini, altheæ, fœnicis, pulveribus foliorum malvæ, betæ, florum meliloti in lacte coctis, Penis in puerulis pugno comprehendatur, & cutis curta ab inferiori parte abdomen spectante ad glandem propellatur, & si quid circa glandem protuberet, utrimque duobus digitis super ipsam glandem trahatur, donec hæc commodè investiat, quando verò frænulum nimis existit laxum, forcice portioneulam quandam excindunt, ut ita inducta cicatrice strictior reddatur. Reliquam curam ab anterioribus prolatam aliquantulum judicant esse crudelem. A circumcissione vel resectione Chirurgica inductum hunc defectum non adeo commodè restitui posse fatentur, sed si à particulis erodentibus, in Ulceribus Venereis pars hæc absumatur, malum hoc prohibent iis remediis, quæ lue & Ulceri-

*Cartesiani  
verum  
morbus  
hocce Peni  
curandi  
ratio.*

Ulceribus ipsi sunt dicata, aliisque topicis ex aqua Ψα, ~ camphoræ, Ξi, Tinctura myrrhæ, aloë, Spiritu olivæ & huiusmodi remediis pluribus.

*Primus* ex cutis longioris in utero formatione productam nulla alia ratione, quam decurtatione cultello instituendam corrigere norunt, cutem secundum circumlaudem auferendo. & inspersis pulveribus ex malicorio, sarcocolla, thure, thutia, lapide calaminari cicatricem inducendo. A contracto pene inducitur corrigunt, cutem supra glandem digitis aliquoties versus abdomen trahendo, donec commodam formam recuperet. Quando vero post ulcera præputium glandi accrevit, cutem istam versus inferiora trahunt, & cultello separationem instituunt, qua impetratis remediis cicatricem inducentibus lamellam plumbeam ad figuram penis accommodatam obducunt, & tamdiu inter cutem & virgam inferunt, donec cicatrice firmata denudatio & obiectio glandis promte peragatur.

In *Paraphimosis* glandis tumorem auferunt discutientibus, cataplasmate ex farina fabarum, lini, floram sambuci, saccharo Ξi, cum vino adueto aut spiritu frumenti parato, non omittis internis diaphoreticis, vel epitheinata imponunt ex spiritu vini camphorato.

In *Priapismo* & *Satyriasis* spiritibus copiosius in tubulis corporum nervolorum commorantibus facilem parant transitum, ut vel per alios canaliculos resiliant, vel per dilatatos poros exhalent, remediis exhibitis tum internis, tum externis, quorum priorum sequens esse potest formula.

℞. Aq. menth.

rut. aa. ʒj.

Sacch. ʒj. ʒss.

Lap. prunell. gr. ij.

Camphor. gr. iij.

Syr. absinth. ʒss.

M. xl. cochlearim.

Foris etiam epitheinata ex Aqua menthæ, rutæ, nymphææ, in quibus camphora fuit dissoluta, imponunt.

In *Penis inflatione* & *Distorione* sinulia in usum ducunt remedia tubulos dilatantia volatilia, omnem spirituum moram solventia, ex Θe volatili succini, spiritu camphoræ, sambuci, Tri dulcificato, Ξi, quibus internè fumendis propinatis, externè linimenta ex axungia canis castrati, cui olea destillata, rutæ, menthæ, succini, & camphoræ admixta sunt illinunt, vel Epithema ex essentia menthæ, absinthii, rutæ, spiritu vini extracta, in qua parum camphoræ dissolutum sit, imponunt.

*Inflammationem* Penis curaturi tubulos aperiant, & succos stagnantes ad motum sive fluxum sollicitant, penem lacti dulci, in quo camphora sit dissoluta, immittendo, vel aliis decoctis tepidis resolutivis, vel cataplasma imponendo ex bolo Armeno, camphora & spiritu vini, quomediante materia ætherea in camphora contenta, pori dilatentur, ut angulares particule facilius egredi, & in poros boli transire valeant.

Excitatis verò ob dilaceratas fibras & effusos liquores *Ulceribus* detergentia usurpant remedia, portiones fibrarum dilaceratarum auferentia, & particulas succorum corruptorum cuspidatas acutas fortiter hebetantia, frangentia &

destruentia, ut sunt aqua mercurialis, spiritus vini camphoratus, cum sublimato & viridi aris, vel aloë, myrrhæ & olivæ forma injectionis adhibita, vel aquam præcipitati, Ψα, instillant, aut pulverem sublimati præcipitati inspergunt, & internè pilulas de terebinthina cum Gjo dulci, vel præcipitato albo & oculis cancrorum exhibent, & decocti lignorum usum pro eliciendo sudore ad tempus aliquod continuandum præcipiunt.

*Excrecentiis, Carunculis & Verrucis* Penis evertuncandis commoda assentunt Gialia prædicta sanguinem purificantia & decocta sudorifera, quibus simul jungunt topica ex pulveribus æruginis, aluminis ulsi, sabine, præcipitati rubri Gii crudi, terr. Oli dulcis, lapidis calaminaris, camphoræ, catheteri ex sparadrapo parato inspersis & infumatis.

§. 19. Præmissis aliorum sententiis nunc & *Nostram* de affectuum horum genitalium *CHYRA in Penis Lipodermis*, & quidem brevibus contractis velis dabitur, & quidem cum *Lipodermis*, præter operationem manuales ab Antecessoribus nostris jam indigitam, non aliter curari debeat, quam affectus convulsivus, sitque ut plurimum acrimonia cum visciditate conjuncta, hinc ad eam corrigendam & incidendam varia absorbentia Cinnabarina, volatilia, castorina, balsamica oleo, tum interna tum externa adhibemus, & si suspicio sit de Lue venerea, hæc prius curanda est purgantibus, Glibus aliisque decoctis liquoris gummosi salibus volatilibus aliisque sudoriferis Gniatis, imprimis sequente præpiti exhibendo.

℞. Gni diaphoret.

Θ succin. volat. aa. gr. xj.

℞. Pulvis Anglici ʒss.

M.

fiat pulvis tenuissimus pro una vice sumendus, & interponatur sequens vel simile decoctum præmixtum tamen medicamento purgante.

℞. Lign. Guajac.

rad. saraparill. aa. ʒj.

china. ʒss.

Fol. cann. or. ʒiij.

Hermodactyl. ʒj.

C. C. rusp.

Sem. anis.

Cinamom. aa. ʒij.

Lap. alabastr. pulv. ʒss.

Passul. min. ʒj.

Infundantur vel coquantur cum lb v. vini optimi Potest ejusmodi apozemati addi Θ guajac ad ʒj. & ad ʒv. calide assumi. Sunt, qui laudant spiritum matricalem cum oleo ballami rectificati vel oleo guajaci. Præsertim verò commendamus in lipodermis, ubi convulsio notatur, Θ volatile oleosum, seu ~ cephal. cum ol. menth. guajac. balsam Peruv. maritatum, pulverem quoque nostrum temperantem & spasmodicum quibus solis remediis interpositis externis hunc affectum vidimus curatum. Inter externa topica excellent balsam Nervin arthritic. extern. ~ matric. cum ~ ~ ~ combinatus, item Elixir vitæ, vel immergatur penis ~ ~ ~ vini camphorato tepido, vel decocto nervino ex radicibus & herbis pæregoricis parato, vel etiam Thermis artificialibus, Thermæ enim Sulphureæ ac bituminosæ optimæ hoc in casu existunt, focus quoque vari ut & sustinimigia parari possunt, & quidem ex nervinis gummosis

Ggg 3

alii.

aliisque discutientibus, nec non cataplasinata ex resolutivis, additis Olei Crici ac Jci. Si est a nativitate vix curatur.

*Curatio  
Phimosi.*

*Phimosi* curatur ut alius partitumor, eo enim incumbendum est, ut stagnantes in præputio succi attenuentur & ad motum progressivum incitentur per diaphoretica, quæ sæpe omnem absolvent paginam, ut sunt Gummi diaphoreticum, bezoarticum Joviale, Martiale minerale, &c. Salia volatilia quæcumque, item succinata & Mercurialia, quæ simul viscidum incidunt, ut sunt etiam Spir. Jci antholat. vel laventulæ. vel succinat. vel sal volatile oleosum, nec hic excludenda veniunt decocta lignorum. viperina aliaque absorbentia. Cura solis externis sæpe peragitur, & topica hoc præcipue in affectu magni afferunt solamen, opera enim danda est, ut tubuli præputii obstruati referentur, ac acidum coagulans & nervis iniunium corrigatur, convenit ergo ol. balsam. Peruvian. vel nervin. vel arthriticum externus præputio illitus, item Spirituosa proderunt, inter quos excellunt ~ vini Camphorat. calc. viv. lumbricor. Mattical. sambuc. ∇ calc. viv. ∇ fl. sambuc. sperm. ranar. &c. quibus foveatur Penis phimosi laborans, vel lacte calido, in quo flores Chamomillæ fuerint cocti: vel Empl. Vigon. c. Z vel de Labdano, vel aliud acidum absorbens, polychrestum sc. nostrum imponatur, vel stæticum *Croli* vel *Paracelsi*. Oleum ranarum, sambucinum, item olea destillata fl. chamomillæ, anethi, castorii, spicæ, succini &c. egregia sunt: vel instituat focus calidus ex herbis roris marini, majoran. saliv. fl. chamomill. sambuc. melilot. &c. paratus. Sequente remedio nuper cum effectu usus sum in filio nobili.

*R. Aq. Calc. viv. 3ij.  
Spir. Fl. Sambuc.  
Maurical. aa. 3ß.  
Camphor. 3j.*

*M. & applicetur tepide.*

Ubi suspicio est de lue Venerea, in ejus curatione cardo rei vertitur.

*Curatio  
Paraphimosi.*

*Paraphimosi* curatio absolvi debet antispasmodicis medicamentis tam internis, quam externis. Interna sunt volatilia sæpius dicta, nempe liq. C. C. succinar. bals. nervin. ~ Cephal. Sal. volat. oleos. &c. Inter absorbentia conducunt cinnabarina præprimis pulvis noster temperans ac spasinodicus, vel pulv. cephal. *M.* vel C. C. ebur, cran. human. & sexcenta alia, quæ alibi ad nauseam diximus. Cura hujus affectus solis externis sæpe absolvitur, si nempe calide imponatur ~ matricalis cum ∇ Reginæ Hungaricæ, vel ~ fl. tiliz, lumbric. convulsiv. externæ sæpe applicatur: nec hic negligendi sunt focus ex herbis aromaticis Olei volatili ferundis, roremarino, majoranæ, betonica, salvia, serpillio, spicâ, lavendulâ fl. Chamomillæ, meliloti parati, ex his additis farinis et jam cataplasinata concinnari ac applicari possunt. Hic conducit etiam suffumigium ex semine nigellæ, item gummosi sæpius institutum nostrâ experientia comprobatur remedium: Si verò malum a nativitate fuerit, vix restabit remedium ad id tollendum.

*Curatio  
Penis Distorsionis.*

*Distorsionis penis* cura iisdem sæpe absolvitur remediis, discutientibus scilicet, in quem finem conducit focus ex lacte, in quo flores Sambuci ebullierunt, vel cataplasma ex floribus melilot,

Sambuc. Chamomill. herb. parietar. &c. cum lacte coct. & applicat. Si dolores maximi simul conjuncti sint, addi potest crocus & Camphora. Ex. gr.

*R. Medull. panis similag. in lact. coct. 3vj.  
Vitell. ov. n. 3.  
Ol. rosar. 3ij.  
Croc. 3ß.  
Camphor. 3j.*

*M.*

pro cataplasmate, & tepide applicetur peni distorto ac convulso, vel lintea ~ u matricali vel ~ vin. Camph. imbuta imponantur. Quod si verò lues Venerea conjuncta sit per terebinthinata, sudorifera aliaque jam sæpius dicta cura peragenda est. Ubi frenum penis seu præputii nimis breve est; curatur chircugiâ, frenum enim simplici incisione solvitur, sed animadvertendum est, ut aliquid porius detrahatur de membrana præputii, quam de glande, præputii verò cura peragi debet emollientibus, in quem finem instituantur foci superius jam dicti.

Quoniam *Inflatio* sæpe omnis ortum habet ab obstructione pororum, & intus contentis vaporibus seu flatibus, à stagnatione enim succorum circulantium & vaporum, seu subtilium particularum in penis tubulis contentarum sæpe, ceu distum, oritur, & distendendo dilatandoque tunicas dolorem producit, hinc omnis opera impendenda est, ut stagnatio & obstructio hæc impediatur, quod obtineri potest per diaphoretica tum volatilia, tum fixa, quæ simul absorbendo juvant; præprimis hic externa conducunt, suffumigium & focus, qui possunt parari ex rad. alth. fl. chamomill. sambuc. melilot. bacc. juniper. lauri, sem. cumin. carv. O. Jci aliisque herbis paregoricis multo gaudentibus sale volatili; vel foveatur penis inflatus spir. matric. viii camph. ∇ Regin. Hungar. spir. sambuc. ol. Chamomill. maritat. In Juniorum gratiam sit sequens formula:

*R. Spir. matric. 3iß.  
∇ calc. viv. 3j.  
Camphor. 3ß.  
Ol. cumin. dest. gt. xij.*

*M.*

& applicetur linteis quadruplicatis & quidem tepide. Vel imponatur emplastrum de Labdano, vel de cumino in Belgia jam usitatam, vel empl. de gumm omnia enim hic conveniunt quæ referant poros & flatulentiam abigunt.

*Priapismi* curatio consistit in eo, ut motus convulsivus arceatur, quod obtineri potest per antispasmodica, cinnabarina, castorina, camphorata aliaque absorbentia, uti sal Jni elegans est hoc in morbo remedium, emulsionibus vel pulveribus commixtum. Affectus enim hic eodem modo curatur ac Tetanus, quò & lectorem remittimus. Externæ spir. vin. camphor. cum aqua plantaginis, sperm. ranar. S Jni. maritatus convenit tepide sæpius applicatur. focus. cataplasmata, suffumigia, aliaque sæpius jam dicta in usum trahi possunt, imprimis verò ea, quæ *Carstavianus* adscripsimus.

*Curatio  
Priapismi.*

*Inflammationem Penis* curaturi, nihil inter-mittimus operæ, quâ tubulos penis & præputii à crassis istis particulis ex humoribus evasis & stagnantibus oriundis liberemus, ut sufficienti particulis volatilibus pateat transitus, quod conveniuntibus sudoriferis obunetur, imprimis si

*Curatio  
Penis Inflammationis.*

huic



huic malo sociata est lues Gallica, hinc ejusmodi inflammationem virgæ cum lue Venerea conjunctam non ita pridem observavimus, ubi ægri Nobilis viginti annorum totum abdomen fuit simul excoriatum, & penis cum seroto continuo stillabat serum acre, maximè cutem excorians, qui Juvenis absque ulla recidivâ brevi sequentibus à nobis sanabatur. Primò exhibui præmissio Eleqtuario de Hamech, ad 36. Sudoriferum Gniatum cum sale succini volatili, dein Apozerma ex lignis, addito Sale Guajaci paratum exhibui, & interposuimus Decoctum Chinæ cum passulis & liquiritiâ pro potu ordinario, ut sudore maderet æger, qui si copiosius non eruperit, nihil est, quod de successu his sollicitus: ipsa enim dejectione urinæque copiosiore & spissa in fundo matulæ optimo sanè omninè negotium totum ex voto perageat, per tres vel 8, dies continuando, & sic felicitè curatur sæpe huic affectui associata lues Venerea, & quidem absque Mercurio, quo tamen Indi maxima in quantitate uti solent, imprimis dulci. quem ad 3j. & ultra præscribunt; alii Medicici Chirurghi excitant in his morbis salivationem, exhibitò præcipitato rubro ad gr. iß, cum conservâ rosarum vel Teriaca. Alii Q dulcem cum Teriaca vel Elect. Dialcord, exhibitò granis x. ad xx. donec salivatio insequitur. Nonnulli unguento uti solent externo ad inungendos articulos omnium artuum, sed hanc per Mercurialia curam esse palliarivam plures nobis cum autumant, cum ægri vel non diu superstitè maneant, aliisque morbis defaiguntur, vel recidivam pati soleant. Nunc ad remedia externa topica transeamus. Cum itaque sæpè & quidem non sine tumore inflammetur ex impuro concubitu vel ex factâ pollutione & inde flagitante semine, glans aut præputium, sequenti remedio externo virga inflammata tepidè ablui potest.

℞. Vin. generos. vel Gall. 3iv.

Sal. ʒvi. 3j

Campbor. 3j.

M.

Vino substituiere poteris vel ~ matrical. vel spir. vin. camphor vel Aq. Regin. Hungar. vel mirabil. Hañsiac. vel non minus ethicax est sequens remedium ac frequentè experientia comprobatum.

℞. Lañ. vaccin. q. s.

Fi. sambuc.

Ros. rubr. aa. Mß.

Coqu. flores in lacte, colatura adijciendum ☉

ʒni ad gr. ixxx. vel

℞. ~ matrical. 3ij.

∇ calc. viv. 3ij.

Campbor. 3j.

M.

Vel

℞. Ungu. diapomp. 3ß.

Ol. sambucin. 3ij.

Sal. ʒvi. 3ß.

Campbor. 3j.

M.

Cathaplasmata ac fotus, ut & reliqua remedia in capite generali Inflammationis commendata hic prolunt.

Exerescientiarum & Caruncularum in Pene existentium curatio sæpè topicis peragitur, nisi lues Venerea eas comitetur, alias hæc prius curanda, dein facile carunculae hæc destruantur ex-

siccantibus, vel alumine usto, tutia, mandib. lucci, aristoloch. ust. myrrh. vel ungento Egyptiaco pridè super ignem inspissato, vel Elix. vitæ, vel spir. matrical. Interdum verò vel nunquam, vel sedula operatione Chirurghi cum filo attracta commodò instrumentò abscindit, atque sic, non tamen citra molestiam ægni & operationis, auferri potest excrecentia; loco vulnerato adhiberi possunt varia exsiccantia tam dicta, tutia & pompholyx, item spir. matrical. ad auferendas carunculas proficua. Chirurgus habeat candelam ceream oleo amygd. dulc. oblitam, vel catheterem flexilem quam leviter in urethram immittat, ac ubi nam hæc obstructa est, inquirat, mallam ex ungento Egyptiaco inspissato, vel ex viridi æris & Ro sublimato candelæ vel catheteris extremitatè imponas & intrudas usque ad carunculam, hanc enim post momenti circa excrecentiam, moram, mox effehara absque maximo dolore producit, qua postea separata. Urinæ liber conceditur transitus à nimis acerbis corrosivis. Oleo ʒli. ~ ☉ & ʒi abstinendum est, quia urethræ fibræ facillè inde larduntur ac dilcinduntur. Ipse Si alpari van der VV. el quatuor homines. quibus tota ferè oclusa erat urethra, ita ut per angustissimum tantum efflueret urina iocantem, sequenti curavit remedio, & quidem intra paucos dies.

℞. Ossis sepiæ.

Tutia ppt. aa. 3ij.

C.C. usti.

Aves lotæ.

Arist. i. ros. aa. 3j.

O usti 3ß.

f. pulvis subtilissimus: postea

℞. Ol. rosar. 3ij.

I. y. hargyr. aur. 3j.

f. decoct. quonvisque acquirat Emplastri consistentiam, dein ab igne sepositò, adde illum pulverem, & ad ignem tractato ac misceto donec medicamentum evadat durissimum, hoc remedium emplastri habet consistentiam, extremitatè que candelæ ceræ præsertim si illa tenuior facta sit, satis commodè annexi potest. Fider. ab Aquapend. operat. Chirurg. commendat pulverem sabini, D. Velschius pulv. rad. petasitidis Hartmannus sequentem commendat injectionem.

℞. Ser. lact. caprin. 3ij.

Aq. plantag.

Rosar. aa. 3vj.

Coruss 3ij.

M.

pro injectione, Alkali plumbi hic etiam valde conducit.

Verruca penis cum ut plurimum à lue Venereæ ortum suum trahant, hujus præsertim morbi rationem semper Medicus habeat: Verrucæ enim, extrinsecus interdum in glande penis sub præputio hærent, tanta sæpè accrescunt mole, ut quo minus glans tegatur impediatur, hæc ut partium aliarum verrucæ vel per anabrochismum, h. e. filo serico vel lineo lenis comprimendæ sunt, donec decidunt: vel abscidenda, posteaque pars armento vel alio vitriolico conspersione, atrauentum enim in se continet ʒlum & gallas tanquam optima stuprica: conducit etiam aqua rosarum cum tutia momento, qua mixtura fovenda est pars: vel per argenteum tubulum exurendæ sunt verrucæ, vel super eas deslagetur

Curatio  
Penis  
In-  
flam-  
mationis  
&  
Caruncu-  
larum.

tur  $\Delta$ , vel oleo  $\bigcirc$  per deliquium parato tangantur, vel spir. vin. Camph. vel matric. vel Elix. vitæ vel spir. Iumbricor., &c. Rarum est, quod de his scribit *Henric. ab Heerp.* 84. sequenti modo : In una glande cuiusdam viri amputavi verrucas, quarum maxima sexaginta quinque capitella manifesta, siue verrucas minores ostentabat, eratque juglande major, quæ illi etiam cum latissima, coeundi potestatem tollebat, quæ verò ablata ter uxorem duxit, atque ex omnibus sobolem suscepit.

*Curatio  
Penis Exulceratio-  
nis.*

Si in urethra exulceratio percipiatur, quam ex acriore inter mejudum dolore intelliges, ob majoris exulcerationis periculum ad interna æquè, quam externa confugiendum remedia, inter quæ absorbentia & sudorifera alii palmam præcipiunt, autimoniaia scilicet, imprimis R. Zuii  $\bigcirc$  fat. vel Eilent. rorismar. lignorum, &c. A Mercurialibus qui non abhorret, iis uti potest, quia his ulcera valde exsiccauntur. Cinnabarina non negligenda sunt, quia & hæc acres succorum particulas absorbent, præ aliis commendamus pulverem spasmodicum vel pulverem temperantem, vel Gum nostrum Orem. Ad acres istas particulas in urethra stabulantes corrigendas conducit oleum balsam. Peruvian. cum alcali rectificatum ad  $\mathfrak{f}$ . vel pures guttas, in  $\Delta$  ad ardorem urinæ *Myns.* cum syrupo dialth. *Fernel* mixta propinatum : interne itidem exhibeatur  $\sim$  matricalis à 20 usque ad 60. guttulas : salia volatilia oleosa, balsamica hisce in ulceribus sacra anchora sunt, absorbentia ex oculis  $\bigcirc$ . C. C. f.  $\Delta$  sperm. Ceti, ol. amygd. dulc. egregia sunt remedia. Diuretica fortiora negligenda sunt. Si ulcus sit circaglandem penis, instituat simul fots ex decocto florum Chamomill. mellilot. sem. fœnicul. fœnigræci rad. alth. sem. lini, &c. Cautè ergo his in exulcerationibus urethræ incendendum, est, injectiones fiant ex lacte dulci, maxime recenti, additis si lubet  $\ominus$  feni & Camphoræ granis aliquot. Sequens leniter detergit, ac reabsorbet exsiccatque.

$\mathfrak{z}$ . *Aq. hordei*  $\mathfrak{z}$ ix.  
plantag.  $\mathfrak{z}$ ib.  
 $\ominus$  feni gr. xxv.  
Camphor. gr. xij.  
Mell. rosar. col.  $\mathfrak{z}$ j.  
M.

Fiat bis quovis die. injectio Mixturæ hujus. Omnem porro exulcerationem præputii aut glandis aut urethræ sanant citò, tutò, & certo : sequentia unguenta, ex gr. unguentum Tuturæ, Apostolorum, vel Spirituosa, ut  $\sim$ . vin. Camph. matricalis cum  $\nabla$  calcis viv. fl. sambuci & Camphoræ paratum, ex. gr.

$\mathfrak{z}$ . Decoll. calc. viv.  $\mathfrak{z}$ iiij.  
Balsam. nervin.  $\mathfrak{z}$ j.  
 $\ominus$  feni  $\mathfrak{z}$ ib.  
Camphor.  $\mathfrak{z}$ ib.  
M.

Sed si exulceratio quædam curatu longè difficilior contingit, interdum ex neglecta diutius gonorrhœa, vel lue Venerea male ab Empiris curata, aut ab acribus  $\bigcirc$ reis particulis diu cum urina ejectis & in transitu ulcus excitantibus, quale

exemplum in Viro Septuagenario non ita pridem observavimus ; tunc conveniunt ea, quæ in Lue ipsa commendavimus, imprimis spir. matricalis cum oleo bals. Peruv. n. d. maritatus, & ad guttas 20. alumpus. Si in ipso vesicæ collo aut tenerrimo urethræ ductu exulceratio existat, sequens unguentum à *Palmerio* præscriptum laudamus, cum experientia nostra constet, rarò nos id sefellisse.

$\mathfrak{z}$ . Ungu. rosar. Galen. recent. alb. è ceruss. lot.  
aq. rosar. cum Camphora, pomadi ex ca-  
preoli adipea.  $\mathfrak{z}$ j.  
Misc. fiat unguentum molissimum.

Linteolum filo argenteo obvolvatur, ac unguento prædicto illinatur in urethram intrudendum, è quo relicto linteolo filum extrahatur, linteolum autem ipsum quoties reddenda urina educatur, aliud eadem arte filo adaptatum intronittatur. Nonnunquam opus est majori mordacitate, quando scilicet caro magis suppullulat, & ulcus magis est fordidum. Fiat ergo sequens vel similis injectio.

$\mathfrak{z}$ . *Aq. bordei*  $\mathfrak{z}$ ib.  
Alum. nst. gr. xij.  
Sub finem ebullitionis add. fl. ros. rubr.  
P. j. in Colat. dissolv.  
Ung. *Ægyptiac.*  $\mathfrak{z}$ j.  
diapompholyg.  $\mathfrak{z}$ iiij.  
Mell. rosar.  $\mathfrak{z}$ ib.  
M.

Si ulcus probe detersum, ad sanationem accedendum est sequenti remedio :

$\mathfrak{z}$ . *Herb. fœnicul.*  
Veronic. aa. Mj.  
Fl. rosar. P. j.  
 $\bigcirc$  nsti gr. xxv.  
 $\ominus$  feni gr. xv.  
Fiat decoct. in *Aq. & vin.* ad  $\mathfrak{z}$ x.

Curatam autem hyperfarcosin tùm noveris, cùm absque dolore urina iterum redditur, liberque sine offendiculo ad vesicam usque catheter flexilis noster penetrat. Eadem ulcera cum hyperfarcosi spirituosis, ut spir. matric. vin. camph. Elix. vitæ aliisque volatilibus facile aliquando sanantur. Si ulcera inter præputium & glandem externè quidem appareant, facili methodo illa curari possunt, præmissis sc. internis & jam dictis externis. Sequenti linimento ejusmodi ulcera feliciter curata vidimus.

$\mathfrak{z}$ . Ungu. diapompholyg.  $\mathfrak{z}$ ib.  
Ol. sambucin.  $\mathfrak{z}$ iiij.  
Aloes.  
Myrrh.  
 $\bigcirc$  dulc. aa. gr. xv.  
Camphor.  $\mathfrak{z}$ ib.  
Mell. rosar. q. f.  
M. F. linimentum.

Balsamum quoque nostrum divinum omnibus in ulceribus, præsertim verò hisce Penis maxime commendamus.

CAP.

## CAPUT IV.

*De Genitalium in Fœminis morbis, & quidem de Morbis Cervicis Uteri, Tentigine nempe, Cauda, Angustia, Vagina uteri Extensione nimia & Prolapsu, Condylomatibus, Hemorrhoidibus, Ulceribus, Rhagadibus & Verrucis.*

## §. I.

Quamvis universum verum sit Græcæ ex Democriti dictamine Epist. ad Damagnum desumptum proverbium, *Tetushomo morbus est*, maxime omnium tamen duplici veritatis jure id ipsum competit in sequiorem sexum: utpote, qui præter communescum masculino corporis afflictiones, propriorum insuper eorumque innumerabilem penè morborum, quibus exinde *Muliebri* tribuitur cognomen, jugum sufflere cogitur. Accedit, quod omnes hi morbi deprehenduntur implicati, difficiles ac periculosi, id quod omnes norunt, quid de morbis mulierum scripserunt. Procul dubio consistunt in auctiore corporis ab utero apparatu atque onere, & hinc conceptionis & gestationis, iteque pariendi & lactandi munere; quo etiam spectat Creatoris comminatio Gen. 3. v. 16. Facile autem in omnibus istis malis primas tenent sequentes affectus Uteri Cervicis seu Pudendo contingentes, nunc ordine à nobis considerandi, per quod enim sexus lequior sæpe peccat, per id etiam punitur. Inter hos Uteri Cervicis affectus prima acie stat *Tentigo*, quæ dicitur *Mentula seu Clitoridis* in nimiam molem excresecientia, vel intumescientia, vel erectio. *Tentigo* nimia si fuerit absque libidine, *Priapsismus*, dicitur, si vero cum libidine nimia sit, *Salacitas* vocatur, potest etiam dici *Tentigo* fœminarum Oestrum Veneris & amoris dulcedo, Clitoridis agitatio, qui *δύει* & interdum ob nimiam libidinem exira sinum pudoris propendens fœminas ad Venerem nescio quam iucitat.

Tentigo.

*Cauda*. *Cauda* est caro indecens in uteri osculo exorta, quæ muliebria genitalia replet, & nonnunquæ extra insit caudæ propendens in succo nutritio acriori evasato & ibidè coagulato producta.

Cauda.

Angustia Cervicis Uteri.

*Angustia Cervicis uteri* est vel ejusdem vel officii uteri seu per compressionem, seu per coalitionem membranarum obturatio & oclusio, dum ferè hæc angustia à prima conformatione & origine est.

Vagina uteri Extensio nimia, seu Prolapsus.

*Vagina Uteri extensio nimia* seu vaginæ uteri *Procidencia*, cujus à veteribus nulla facta est mentio, cum id viti olim ipsum uterum prociudentem crediderint, est istarum vaginæ membranarum à causa violenta extensio seu dilatatio.

Cervicis uteri Pustula.

*Pustula Cervicis Uteri* sunt tubercula in eâ parte oborta, quæ ab acris succis eò delatis & fibrillas pungentibus pruritum & dolorem producant; inde & dicitur *πριτυς vulvæ*.

Condylomata.

*Condylomata* sunt rugarum nodi seu intumescientia in cervice uteri existentes, cum ardore dolore; vel sunt tubercula à similitudine *ἀνθρώπων ποδῶν* ità dicta.

Hemorrhoides.

*Hemorrhoides Uteri Cervicis* sunt tubercula hæmorrhoidibus ani haud dissimilia, in uteri cervicæ ab acrimoniâ humorum ibidem stagnantium & vasæcorrodentium, oborta.

Ultera.

*Ultera Cervicis Uteri* sunt ejus valorum continui solutio cum sanie & putredine ab humore acru vasa corrodeute producta. Sunt & Ulcera

scula quædam parva & longa, rugosam Cervicis Uteri partem corrodentia, quæ dicuntur *Rhagades*, quæ erore & dolore in coitu facillè innotescunt.

*Tumor* quoque Pudendorum cum aliquâ inflammatione in partu vel primo vel difficile interdum contingere solet puerperis. imò & *ῥυ. κρυμν. πιντα* *Vulva* quandoque in angustis sit, ubi foetus est grandior, & pudendum ita rumpitur, ut vulva & anus fiant unum foramen.

Pudendi & Cervicis Uteri *Verrucæ* dicuntur etiam tubercula, vel *Thymi*, vel *Myrmecia* à figura.

§. 2. Pars affecta in *Tentigine* est *Clitoris* sive glandiforme illud corpusculum in superiore pudoris muliebri sinu situm & à nymphis custoditum, *Avicenna* virga muliebris appellatum, estque Clitoris hæc muliebris insitit vulvæ non relaxatæ, hinc dicitur *Hippocrati* ob similitudinem *Columellæ*, nonnullis Amoris dulcedo, æstrum Veneris libidinis iedes ac irritamentum, propterea quod nulla pars in congressu maiori delectationis sensu afficitur, ac mulieres fricatrices in Venerem inagis quàm illa exagiet. Substantia Clitoridis non est ossæ, quamvis *Bartholinus Hist. Anat. L. 3. Oef. 69.* talem semel observaverit, sed ejusdem constitutionis, ac Penis virilis, ut similiter, dum necesse est, intendiatque relaxari possit, habet & glandem, septum, & corpora nervosa, de quibus vide *Anatomicos* imprimis *Cl. D. Blankardi Anatomium Reformatam*.

Reliquorum affectuum pars affecta est *Vagina*, à quibusdam *Matrix* vocata, item *Uteri osium*. Uteri cervix, sed improprie. Optimo ergo jure dicitur *Vagina uteri*, quoniam virile in se recondat membrum, ut Vagina gladium aut cultrum excipit. Vaginæ orificium cum collo uteri est rugosum, de quibus confer *Anatomicos*, hanc enim partem exactè describere non libet, ne forsitan Juvventuti libidinem illicitam excitemus.

§. 3. Antequam ad causas horum affectuum muliebrium accedamus, ratio ordinis requirit, ut phænomena sive apparentias breviter exhibeamus. Clitoris in *Tentigine* interdum in tantam excresecit molem, ut per rimam pudendi colli inserini crassitie dependeat, & virile referat membrum, & ejusdem sæpe vicem & effectum præstet, de quâ re legi meretur sequens Tulpii Observatio: Henrica Schuria, mulier virilis animi, pertæsa sexus sui, induit vestes viriles, & profecta in militiam, meruit aliquamdiu in Obidione Sylvæ Ducis, sub Friderico Henrico, Celsissimo Aragonensium Principe. Sed domum reveria accusabatur perditæ libidinis, ob clitoridem extra sinum pudoris adeo interdum sese effertentem, ut conata fuerit non semel libidininosè lascivire cum aliis mulieribus, (quod *κλειτορίζω*, appellant Græci,) imò illas ita atterere ac fricare, (quod *τριβάνω* nominant iidem) ut cuidam viduæ, cujus desiderio impensè

H h

flagra-

tur.  $\Delta$ , vel oleo  $\text{Q}$  per deliquium parato tangantur, vel spir. vini. Camph. vel matric. vel Elix. vitæ vel spir. Iumbricor., &c. Rarum est, quod delhis scribit *Henric. ab Heerp.* 84. sequenti modo: In una glande cuiusdam viri amputavi verrucas, quarum maxima sexaginta quinque capitella manifesta, sive verrucas minores ostendebat, eratque juglande major, quæ illi etiam, cum lacissima, coeundi potestatem tollebat, qua verò ablata ter uxorem duxit, atque ex omnibus lobolem suscepit.

*Curatio  
Penis Exulceratio-  
nis.*

Si in urethra exulceratio percipiatur, quam ex acriore inter meendum dolore intelliges, ob majoris exulcerationis periculum ad interna æque, quam externa confugiendum remedia, inter quæ absorbentia & sudorifera aliis palmam præcipiunt, antimoniata scilicet, imprimis  $\text{R}$   $\text{Znii}$   $\text{Q}$  sat. vel Essent. rorismar. lignorum, &c.  $\text{A}$  Mercurialibus qui non abhorret, is uti potest, quia his ulcera valde exsiccantur. Cinnabarina non negligenda sunt, quia & hæc acres succorum particulas absorbent, præ aliis commendamus pulverem spasmodicum vel pulverem temperantem, vel  $\text{Zm}$  nostrum  $\text{Orem}$ . Ad acres istas particulas in urethra stabulantes corrigendas conducit oleum balsam. Peruvian. cum alcali rectificatum ad  $\gamma$ , vel phures guttas, in  $\Delta$  ad ardorem urinæ *Mys*, cum syrupo dialth. *Fern* mixta propinatum: internè itidem exhibeatur ~ matricalis à 20 usque ad 60. guttulas: salia volatilia oleosa, balsamica hisce in ulceribus sacra anchora sunt, absorbentia ex oculis  $\text{C}$ .  $\text{C}$   $\text{f}$ .  $\Delta$  sperm. Ceti, ol. amygd. dulc. egregia sunt remedia. Diuretica fortiora negligenda sunt. Si ulcus sit circa glandem penis, instituat simul forus ex decocto florum Chamomill. melilot. sem. fœnicul. fœnigræci rad. alth. sem. lini, &c. Cautè ergo his in exulcerationibus urethræ incedendum, est, injectiones fiant ex lacte dulci, maxime recenti, additis si lubet  $\text{Hni}$  & Camphoræ granis aliquot. Sequens leniter detergit, acre abiorbet exsiccatque.

$\text{R}$ . *Aq. borderi*  $\text{Zix}$ .  
    *plantag.*  $\text{Ziib}$ .  
     $\text{Hni}$  gr. xxv.  
    *Camphor.* gr. xij.  
    *Mell. rosar. col.*  $\text{Zj}$ .  
    *M.*

Fiat bis quovis die. injectio Mixturæ hujus. Omnem porrò exulcerationem præputii aut glandis aut urethræ sanant citò, tuto, & certò sequentia unguenta, ex gr. unguentum Tutiz, Apostolorum, vel Spirituosa, ut ~. vin. Camph. matricalis cum  $\nabla$  calcis viv.  $\text{f}$  sambuci & Camphora paratum, ex. gr.

$\text{R}$ . *Decoll. calc.* viv.  $\text{Ziij}$ .  
    *Balsam. nervin.*  $\text{Zj}$ .  
     $\text{Hni}$   $\text{Zb}$ .  
    *Camphor.*  $\text{Zb}$ .  
    *M.*

Sed si exulceratio quædam curatu longè difficilior contingit, interdum ex neglecta diutius gonorrhœa, vel lue Venerea male ab Empiris curata, aut ab acribus  $\text{Creis}$  particulis diu cum urina ejectis & in transitu ulcus excitantibus, quale

exemplum in Viro Septuagenario non ita pridem observavimus; tunc conveniunt ea, quæ in Lue ipsa commendavimus, imprimis spir. matricalis cum oleo bals. Peruv. n. d. maritatus, & ad guttas 20. assumptus. Si in ipso velicæ collo aut tenerimo urethræ ductu exulceratio existat, sequens unguentum à *Palmario* præscriptum laudamus, cum experientia nostra constet, ratò nos id fefellisse.

$\text{R}$ . *Ungu. rosar. Galen. recent.* alb. è *ceruss.*  $\text{loz}$ .  
    *aq. rosar. cum Camphora, pomada ex caprelli adipæ* aa.  $\text{Zj}$ .  
    *Misc. fiat unguentum molliissimum.*

Linteolum filo argenteo obvolvatur, ac unguento prædicto illinatur in urethram intrudendum, è quo relicto linteolo filum extrahatur, linteolum autem ipsum quoties reddenda urina educatur, aliud eadem arte filo adaptatum intro mittatur. Nonnunquam opus est majori mordacitate, quando scilicet caro magis suppullulat, & ulcus magis est fœdidum. Fiat ergo sequens vel similis injectio.

$\text{R}$ . *Aq. borderi*  $\text{Ziib}$ .  
    *Alum. nst.* gr. xij.  
    *Sub finem ebullitionis add. fl. ros. rubr.*  
    *P. j. in Colat. dissolv.*  
    *Ung. Egyptiac.*  $\text{Zj}$ .  
    *diapompholyg.*  $\text{Ziij}$ .  
    *Mell. rosar.*  $\text{Ziib}$ .  
    *M.*

Si ulcus probe detersum, ad sanationem accedendum est sequenti remedio:

$\text{R}$ . *Herb. sanicul.*  
    *Peronic.* aa.  $\text{Mj}$ .  
    *Fl. rosar.*  $\text{P. j}$ .  
    *O nst.* gr. xxv.  
     $\text{Hni}$  gr. xv.  
    *Fiat decoll. in Aq. & vin. ad Zx.*

Curatam autem hyperfarcosin tùm noveris, cum absque dolore urina iterum redditur, liberque sine offendiculo ad vesicam usque catheter flexilis noster penetrat. Eadem ulcera cum hyperfarcosi spirituosius, ut spir. matric. vin. camph. Elix. vitæ aliisque volatilibus facile aliquando sanantur. Si ulcera inter præputium & glandem externè quidem appareant, facili methodo illa curari possunt, præmissis sc. internis & jam dictis externis. Sequenti linimento ejusmodi ulcera feliciter curata vidimus.

$\text{R}$ . *Ungu. diapompholyg.*  $\text{Zb}$ .  
    *Ol. sambucin.*  $\text{Ziij}$ .  
    *Aloes.*  
    *Myrrh.*  
     $\text{Q}$  dulc. aa. gr. xv.  
    *Camphor.*  $\text{Zb}$ .  
    *Mell. rosar. q. f.*  
    *M. F. linimentum.*

Balsamum quoque nostrum divinum omnibus in ulceribus, præsertim verò hisce Penis maxime noperè commendamus,

CAP.

## CAPUT IV.

*De Genitalium in Fœminis morbis, & quidem de Morbis Cervicis Uteri, Tentigine nempe, Cauda, Angustia, Vagina uteri Extensione nimia & Prolapsu, Condylomatibus, Hemorrhoidibus, Ulceribus, Rhagadibus & Verrucis.*

## §. I.

Quamvis universim verum sit Græcum ex *Democriti* dictamine *Epist. ad Damagetum* desumptum proverbium, Totus hominem morbus est, maxime omnium tamen duplici veritatis jure id ipsum competit in leviorem sexum: utpote, qui præter communes cum masculino corporis afflictiones, propriorum insuper eorumque innumerabilium penè morborum, quibus exinde *Muliebrium* tribuitur cognomen, jugum susterre cogitur. Accedit, quod omnes hi morbi deprehenduntur implicati, difficiles ac periculosi, id quod omnes norunt, quid de morbis mulierum scripserunt. Procul dubio consistunt in auctiore corporis ab utero apparatu aque onere, & hinc conceptionis & gestationis, itaque parienti & lactandi munere; quo etiam spectat Creatoris comminatio *Gen. 3. v. 16.* Facile autem in omnibus istis malis primas tenent sequentes affectus Uteri Cervicis seu Pudendo contingentes, nunc ordine à nobis considerandi, per quod enim sexus sequior sæpè peccat, per id etiam puniunt. Inter hos Uteri Cervicis affectus prima acie stat *Tentigo*, quæ dicitur *Menstrua* seu *Clitoridis* in nimiam molem excresecientia, vel intumescencia, vel erectio. Tentigo nimia si fuerit absque libidine, *Priapismus*, dicitur, si verò cum libidine nimia sit, *Salacitas* vocatur, potest etiam dici Tentigo fœminarum Oestrum Veneris & amoris dulcedo, Clitoridis agitatio, qui *diu* & interdum ob nimiam libidinem exira sinum pudoris propendens fœminas ad Venerem nescio quam incitat.

Cauda.

*Cauda* est caro indecens in uteri orculo exorta, quæ muliebria genitalia replet, & nonnunquæ extra instat caudæ propendens à succo nutritio acriori evasato & ibidè coagulato producta.

Angustia Cervicis Uteri.

*Angustia Cervicis uteri* est vel ejusdem vel orificii uteri seu per compressionem, seu per coalitionem membranarum obtusatio & occlusio, dum ferè hæc angustia à prima conformatione & origine est.

Vagina uteri Extensio nimia, seu Prolapsus.

*Vagina Uteri extensio nimia* seu vaginæ uteri *Procidentia*, cujus à veteribus nulla facta est mentio, cum id vitii olim ipsum uterum procidentem crediderint, est istarum vaginæ membranarum à causa violenta extensio seu dilatio.

Cervicis uteri Prolapsus.

*Pustula Cervicis Uteri* sunt tubercula in eâ parte oborta, quæ ab acris succis eò delatis & fibrillas pungentibus pruritum & dolorem producant; inde & dicitur *pruritus vulvæ*.

Condylomata.

*Condylomata* sunt rugarum nodi seu intumescentiæ in cervice uteri existentes, cum ardore dolore; vel sunt tubercula à similitudine *αἰνῶ τῶν κερῶν* ità dicta.

Hemorrhoides.

*Hemorrhoides Uteri Cervicis* sunt tubercula hemorrhoidibus ani haud dissimilia, in uteri cervicæ ab acrimoniâ humorum ibidem stagnantium & vasæcorrodentium, oborta.

Ulceræ.

*Ulceræ Cervicis Uteri* sunt ejus valorum continui solutio cum sanie & putredine ab humore acro vasæcorrodente producta. Sunt & Ulceræ

scilicet quædam parva & longa, rugosam Cervicis Uteri partem corrodentia, quæ dicuntur *Rhagades*, quæ eruoere & dolore in coitu facillè innotescunt.

Tumor.

*Tumor* quoque Pudendorum cum aliquali inflammatione in partu vel primo vel difficile interdum contingere solet puerperis. imò & *Ruptura Vulvæ* quandoque in angustis fit, ubi fetus est grandior, & puidendum ita rumpitur, ut vulva & anus fiant unum foramen.

Verruca.

Pudendi & Cervicis Uteri *Verrucæ* dicuntur etiam tubercula, vel *Thymi*, vel *Myrmecia* à figura.

Pari passu.

§. 2. Pars affecta in *Tentigine* est *Clitoris* sive glandiforme illud corpusculum in superiore pudoris muliebris sinu situm & à nymphis custoditum, *Avicenna* virga muliebris appellatum, estque Clitoris hæc muliebris instar ovule non relaxatæ, hinc dicitur *Hippocrati* ob similitudinem *Columellæ*, nonnullis Amoris dulcedo, æstrum Veneris libidinis ledes ac irritamentum, propterea quod nulla pars in congressu majori delectationis sensu afficitur, ac mulieres fricatrices in Venerem magis quam illa exagitet. Substantia Clitoridis non est ossæ, quamvis *Bartholinus* *Hist. Anat. L. 3. Obs. 69.* tam semel observaverit, sed ejusdem constitutionis, ac Penis virilis, ut similiter, dum necesse est, intendiatur relaxari possit, habet & glandem, septum, & corpora nervosa, de quibus vide *Anatomicos* imprimis *Cl. D. Blankardi Anatomiam Reformata.*

Reliquorum affectuum pars affecta est *Vagina*, à quibusdam *Matrix* vocata, item *Uteri ostium*. *Uteri cervix*, sed improprè. Optimo ergo jure dicitur *Vagina nieri*, quoniam virile in se recondit membrum, ut Vagina gladium aut cultrum excipit. Vaginæ orificium cum collo uteri est rugosum, de quibus confer *Anatomicos*, hanc enim partem exactè describere non libet, ne forsitan Juventuti libidinem illicitam excitemus.

§. 3. Antequam ad causas horum affectuum muliebrium accedamus, ratio ordinis requirit, ut phenomena sive apparentias breviter exhibeamus. Clitoris in *Tentigine* interdum in tantam excrevit molem, ut per rimam pudendi colli anserini crassitie dependeat, & virile referat membrum, & ejusdem sæpè vicem & effectum præstet, de quâ re legi meretur sequens *Tulpii Observatio*: *Henrica Schuria*, mulier virilis animi, pertæsa sexus sui, induit vestes viriles, & profecta in militiam, meruit aliquamdiu in *Obsidione Sylvæ Ducis*, sub *Frederico Henrico*, Cellisimo *Arausionensium* Principe. Sed domum reverit accusabatur perdite libidinis, ob clitoridem extra sinum pudoris adeò interdum sese efferentem, ut conata fuerit non semel libidininosè lascivire cum aliis mulieribus, (quod *αἰνῶ τῶν κερῶν* appellant Græci,) imò illas ita atterere ac fricare, (quod *τρίβειν* nominant iidem) ut cuidam viduæ, cujus desiderio impensè

H h h flagra-



flagrabat, usque eo placuerit detestanda ipsius impudicitia, ut nisi per leges stetit, libens ipsi nupsisset, ac dicam lubentius quam marito suo jam defuncto, ex quo tamen sex susceperat liberos. Habuit autē hęc *Tepla* naturalia sua saltem quoad externam faciem, haud aliter conformata, ac alie mulieres, sed intus percipiebatur evidenter, (uti quidem testabantur tres obstrictices.) paulo ante urinz iter glandulosa aliqua caruncula, quam clitoridem vocant Medici, quę licet in aliis fœminis vix unguis exprimat magnitudinem, dicebatur tamen in hac salacifratrice accedere ad longitudinem dimidiati digiti, & crassitudine suā haud malè referre colem puerilem. At verò licet clitoris hęc foris nullum sui perpetuò faceret indicium, apparebat tamen interdum, præsertim ubi vel difficulter micturiret, vel pericula Venereis æstro, rapereur intensius in illicitam hancce cupidinem, quo tempore dicebatur hęc glandula extra ipsius naturalia protuberare vel adinstar dimidiati digiti, vel etiam interdum longius, prout vel maiore vel minore in mulieres exardesceret amore, quod impudicum mulierum genus, scribit Celebris Juris-Consultus *Johannes Paponius* morte puniendum l. xxi. Tit. vii. arrest. 11. sed hęc *Tepla* clementiorem nacta iudicem, cecebat tantum virgis, & relegata in exilium, separabatur longissimè à nequitie suæ consorte, videlicet illa vidua, qua cum libidinosis vixerat.

*Cauda* signa eadem sunt, quę in *Tentigine*, modò fœminæ hęc laborantes coitum ac accessum metuant.

*Angustia* Cervicis uteri signa sunt mensum fluxus suppressio, doloris cum pondere sensus, aliquando urina supprimitur, interdum stranguria adest & dysuria, sic etiam angustia facili ex ipsa inspectione & relatione obstricticis cognoscipoteat.

*Cervicis Precidentia* seu *Dilatationis* nimis signa satis sunt conspicua; si enim relaxata fuerit vagina uterina, propendere solet, quam falso dicunt uteri precidentiam, cum tantum sit vaginæ, seu cervicis ejus. Continuo aliquando propendet, in aliis verò non semper foris conspicitur.

*Uteri Pustularum & Condylomatum* signa sunt pruritus, dolor, & plicæ uteri instar nodorum eminent, quibus si conjungatur inflammatio, dura sunt, sin minus, mollia sunt condylomata, & præcipue lue Venereæ laborantibus obveniunt hęc & *Ulcera*.

In *Hæmorrhoidibus* fœminæ pallent, lassitudine tentantur, & visu, si Speculum matricis adhibeatur, deprehenduntur. Sæpe enim hæmorrhoides uteri se produnt dolore & inordinato sanguinis fluxu, & nunc dicuntur *Cæcæ*, sive non fluentes, nunc *Apertæ*, sive fluentes, nunc cum, nunc sine dolore, & non raro fluxus albus ipsas comitari solet.

*Verruca* cervicis uteri facile cognosci possunt ope Speculi matricis, & si suspicio addit luis Venereæ, visui enim ac tactui patent.

Signa *Ulcærum* Cervicis uteri sunt dolor, & continua in eo loco mordicatio, quæ sensum intenditur, saniosiorum succorum & puris per intervalla, cum sanguine nonnunquam, si scilicet ulcus magnum vel menses prodeant, effluxus, mictio frequens & ardens, si vesicæ orificium simul afficitur, urinz ardor oritur vehementior,

etiam febris supervenit lenta cum crebris horribus. Sequentem habet casum *Cl. D. Blankardus* Obs. 16. in *Anatom. Pract. Rat.* quem ad *Diagnosin* hanc illustrandam addere libet. Matrōna quædam cum bimestri spatio mensium suppressione laborasset, tandem exortus est dolor & inflammatio partium genitalium. Morbo propter verecundiam neglecto, abscessus & *Ulcus* in collo matricis secutum est. Adhibito matricis speculo, ulcus callosum, fœtidum, inæquale lividumque, & ut brevi dicam, cancriform inventum est: postea acutus dolor, aucta febris, inflammatio vigiliz, cibi fastidium & Syncope, & paucos post dies è vita discessit. Cadavere dissecto totum uteri collum plane cancriform erat & exulceratum.

*Fistula* colli uteri cognoscitur, si malum ex ulceris figura, in formam fistulæ protenditur, habetque conjunctum callum, seu labia carnosissima dura, acque simul tenuem, fœtidam pravamque fundit saniem.

Notandum hic, fistulam hanc interdum ad vesicam usque penetrare, nonnunquam ad aum, & tunc excrementa ibidem prodeunt.

§. 4. *Causas* horum Cervicis Uteri morborum ita explicant *Galenicus*, ut in *Tentigine* producenda maximam culpam imputent frequentiori clitoridis, sive mentulæ muliebri agitationi aut contritioni à vestibus, vel digitis factæ, unde sanguinis calidioris & spirituosius promoveatur in partem hanc influxus, quo factò pars hæc in mirandam interdum extendatur magnitudinem.

Eosdem plane natales adscribunt etiam *Caudæ*, influxum nempe humorum majorem in membranam cervicis uteri, abs quo cutis hæc nimium extensa & extra cavitatem propulsa caudæ instar promineat; vel, ut quidam volunt, ipsum uteri orificium ab influxu humorum aut nutrimenti ita extenditur, ut per collum extra pudendum prodeat: vel substantia quædam carnosæ ex abundantia nutrimenti ipsius uteri tantâ magnitudine accrescit, ut etiam foris reddatur conspicua.

*Uteri Prolapsus*, quem reverà contingere omnes ferè opinantur, causas consignant ipsorum ligamentorum laxitatem, ab humorum copia & caloris excessu inductam, vel resolutionem eorundem ac muscilorum, uti fiat in mulieribus senescentibus, quæ plures partus jam ediderunt, vel impulsionem violentam ex lapsu sublimiori in pedes & coxas, non modò ita relaxatis, sed disruptis etiam ex parte ligamentis uterum suspendentibus & cum partibus proximis conjungentibus, nec non secundinarum, aut fœtus mortui violentam extractionem, aut expulsionem, tussim vehementem, sternutationem impetuofam, gestationem ponderis gravioris supra caput, humeros, pectus aut ventrem, omnemque animi perturbationem vehementem.

Ab hoc Uteri Prolapsu interdum Vaginæ uteri *Angustiam* sive occlusionem induci statuunt, quam itidem oriri posse dicunt à relaxatione membranz cervicem investientis, ab humoribus quibusdam copiosis in eam influentibus & ad invicem comprimentibus, vel à flatibus similiter distendentibus & cavitate hanc coarctantibus, aut sinum hunc angustiores reddi ab inflammatione, scirrho, vel aliquoquodam tumore partem hanc occupante, vel à medicamentis

*Ætiologia  
Cervicis  
Uteri mor-  
borum, se-  
cundum  
Galenum.*

mentis quibusdam adstringi, aut ab humoribus tenacibus. crassis & viscidis interdum obstrui reterunt.

*Pustulas* Vaginæ Uteri excitari credunt ab humore bilioso acri, adusto aut inaligno in partem hancfluente, & in membrana ejus ob acrimoniam suam non inodo dolorem, & pruritum producente, sed etiam pustulas & furfures procreante.

*Condylomata* hujus Vaginæ oriri credunt, dum rugæ circa os uteri existentes inflamman- tur, inspurantur & atolluntur, sicque tumorem & crassitudinem quandam in locis efficiant. Rugas verò hæcæ præcipuè post partum, vel dum menses prodeunt, atolli pronunciant.

*Hæmorrhoides* in Cervice etiam uteri à sangui- ne crasso fæcumento copioso pronasci volunt, dum propter menses inordinatos in venas hujus partis profusæ, in iisdemque subsistens ea in tumorem extollat.

*Ulcera* Cervicis Uteri aut ex Inflammatione in abscessum versâ oriri arbitrantur, dum materia purulenta acrior reddita partem affectam erodit, sicque abscessus rumpitur & pus effunditur, vel ab aliis quibusdam humoribus biliosis aut serosis acribus, aut semine corrupto aut medicamentis, vel aliis quibusdam rebus erodentibus parti huic imprudentiùs applicatis.

*Tumorem* Cervicis Uteri causas diver- sos dicunt esse humores ad partem hanc ob propriam debilitatem transmissos, & diutius detentos, sanguinem scilicet bilien, pituitam, aut humorem melancholicum, unde tumor exillat vel inflammatorius, vel erysipelaceus, vel œdematofus, vel scirrhusosus, cui influxui sæpe occasionem præbeat violenta partis hujus extensio in partu difficili, vel alio quodam conatu, unde nimis relaxata humores affluentes faciliùs recipiat.

Ex violenta partis hujus extensione quandoque *Rupturæ* ejus contingere dicunt, uti fiat, si factus grandior egredi nequeat, sed vehementiùs quandoque extrahatur, vel in ejusdem extractione hamuli membranæ cervicis perforantes eandem in extractione vulnerent, & longius dilacerent.

*Rhagades* oriri statuunt internè ab humoribus acribus, secundinis, fluxu albo, semine, sanie, aliisque membranæ cervicis hujus erodentibus; externè verò à coitu violento, penis grossitudine, compressione, vel medicamentis acribus, nigellâ, aliisque parti huic appo- sitis.

*Verrucas* emergere putant ex humore pituito- so, vel melancholico crasso rugis cervicis hu- jus adherente, & in tubercula hujusmodi indu- ratò, qualis humor citius erumpat, si pars hæc per repetitum coitum frequentius agitur, & rugæ ejus atterantur.

§. 5. *Paracelsus* Cervicis Uteri *Tentiginem* ad ulcera referre videtur, eandem in obscuram & pravam distinguens, quam posteriorem Noli me tangere vocat, dicitque ex superfluitate eam oriri salis acetosi, quod in profluvio, vel in mestrui existit: si enim menstruum aut pro- fluvium transeat in salis acuitatem, ex qua produceretur ferrugo, tandem ad matris substantiam eam se couittere dicit, & tentiginem exata- re obscuram.

*Candam* per excrefcentiam novæ generatio- nis pronasci vult, dum natura superfluitatem ex centro generationis producat, quæ juxta cervi- cem hanc, in qua collecta fuerit ex mestrui, accumulata, in excrefcentiam generetur caudæ instar propendens.

*Angustiam* Cervici huic quandoque ex vitio- sa conformatione adesse credit, interdum verò à vicinis partibus morbo laborantibus, præter- tim tumoribus, aut excrementis refertis inte- stinis, vel calculo repleta vesica collum aut cer- vicem hanc comprimentibus, nonnunquam à propriis morbis, excrefcentiis & tumoribus eam angustioiem reddi.

*Uteri Procidientiam* omnium frequentissimè ex partu difficili oriri opinatur, quo fit, ut fre- tus, vel secundina violenter extrahatur, & ipsa simul uteri vagina cum iisdem arripiatur, & ex- tra locum suum foras eliciatur.

*Condylomata* in vulva pronasci vult ex li- quore carnis aut sanguinis, dum locus hic nimio coitu frequentius fricetur, post quam fricationem sæpius repetitam apostema aliquod exsur- gat, per novam quandam generationem excre- fcentiam talem producentis.

*Hæmorrhoides* Cervicis Uteri Autori huic vix differunt à *Ragadiis*, cum hæc in vulva nihil aliud ei videantur, quàm quòd *Hæmorrhoides* sunt in ano, vultque eadem hic provenire ex sale mestrui, cum acule veneris & men- struum simul concurrunt, & sese mutuo com- plectuntur, tandemque ex separatione salis cissi- li eadem transire in fissuras, dum sal hoc cum alio non fuerit commixtum.

*Ulcera* in Cervice hac excitari credit à fluxione quadam arsenicali condylomatosis conjun- cta, quæ propter sal suum partem hanc destruat, & foramen excitet cum effluxu.

*Verrucas* ut Condylomata ex liquore sangui- nis hoc in loco generari asserit, promoven- te earum excrefcentiam coitu frequentiori, unde & interdum in *Tumore* abeant Callicos, si ve- nenosum aliquid ex lue hac iis communice- tur.

§. 6. *Helmontii* ex sententia *Tentigo* adscri- bi debet latici cruoris copiosius in Clitoridem delato, adeò ut pars hæc ab influente isto laticè in magnitudinem aliquando ingentem intumescat, & foras extra sinum pudoris promineat.

Ab eodem laticè in uteri collum aut vaginam nimium effuso, ut dilatata promineat, & foras propendeat, *Candam* oriri suspicatur, præter- tim si multum cruoris latici sit immixtum, unde in substantiam hic carneam abiens novam quasi excrefcentiam producere videat.

*Angustiam* Cervicis Uteri aut à primo ortu esse existimat, aut à variis excrefcentiis tumoribus, compressionibus, vel concretionè laterum hujus cervicis post ulcera, dum partes exelæ ab Archeo irritato fortius compellantur, & medi- ante cruore glutinosiore invicem concrefcent.

Cervicis, siue Vaginæ Uteri *Prolapsum* à vio- lenta quavis commotione exoriri posse concedit, sed ita ut Archeus Uteri valde inde fuerit irrita- tus, ut non modo quòd in domicilio suo per tem- pus custodivit, ejiciat, sed ipsam etiam domum destructis columnis evertat, & tardio quodam effectus è sede & fundamentis suis propellat.

A cruore etiam *Condylomata*, *Hæmor- rhoides* & *Verrucas* propullare statuic.

Hh 2

Causa mor-  
buri bo-  
rum so-  
rum dum  
Helm-  
ontium.

Biologia  
forum dum  
Paracel-  
sum.

dum menstruus diutius detineatur, & à latice interdum corrumpatur, vel à veneno etiam luis Veneræ, ab quo in tubercula hujusmodi corruor ipse facile coaguletur.

Ulcera hujus Cervicis ab ipso quoque latice falsiori, vel à veneno Veneræ indici creditur, cujus fermentum ipsum erorem inficiat, ut in saniem vertatur, & vicinas partes similiter destruat.

Rugarum originem adscribit aut latice falsiori rugas Cervicis hujus discindenti, aut violentæ vaginæ hujus distensionem à pene majori in coitu importuno, vel fortius majori vi extracto, unde rugæ nimium distensæ rumpantur, quod facilis contingat, si ob defectum laticis benignioris membrana rugosa non latis fuerit irrigata.

*Causa morborum Cervicis Vteri juxta Viri. hujus.*  
§. 7. Juxta Viri hujus fieri creditur Tentiginia sine libidine, ab humore lymphatico in Clitoridis glandulis miliaribus contento, & acore donato, cujus particule aciores ac robustiores fibras nervis & musculosis hujusce partis infixæ eas irritant, spiritibusque eas incolentibus inordinatum motum conciliant. Illi verò cæstro perciti, & in fibrarum parietes profluentes ipsas inflant & extendunt, easque in simili statu detinent, quamdiu falsior acriorque latex arteriis à glandulis seceruitur. Si verò humor fibras irrorans easque subiens volatiliior fuerit, ipsas blandè titillat: Spiritus autem jucundo isto mulcimine alleciti turmatim illuc appellant, & in parte, quam in tumorem elevant, quasi consulant & conjubilant. Quum enim in sensorio communi hospitantibus spiritibus parem motum communicent, libidinis sensatione in eo creant.

Cauda in Utero procreatur, quando contingit, ut plures in eo laxiores fibræ copiosiores, quam par est, succum nutritionis excipiant. Ille enim ab admixtis spiritibus animalibus compulsus fibrarum parietes distendit, easque nullo ab anteriori opposito obice elongat. Vasa verò sanguinea indictis fibris conspersa parè patiuntur cum iis extensionem, continuoque sanguinis appulsu, & à nullo rebofante corpore compressa ampliantur, Caudæque molem adaugent. Cauda enim eousque excrescit, donec Vaginæ peripheriam pertingat, quæ eam undiquaque comprimendo, fibrarum ampliorem dilatationem præpedit, copiosioresque succi nutritii proventum inhibet.

Angustia Cervicis Orificiæ Vteri producitur à succo nutritio viscidiori abundantiorique, qui partium illarum fibras subingressus illas iustat ac distendit. Accedentibus hoc pacto propius ad se invicem fibris, & ramolis, quæ per ipsarum poros exsulant, particulis coëuntibus, excrecent fibrillæ, quæ oppositis uteri parietes conjungunt. Quandoque autè crassior spissiorque lymphæ, sanguisq; torpidior, tardiorque motu progrediens in dictis partibus coacervantur. Quum verò spiritus animales in iis hospitantes nec in ea sint copiosi, nec ea polleant virtute tanto ponderi excutiendo necessariis, obruuntur fibræ, earumque tono debilitato relaxantur, & in suppositas partes concidunt, easque comprimunt, viamque anteluc liberam & apertam occludunt.

Extensio nimia, seu Prolapsus Vaginæ Uteri contingit, quando scilicet uteri fibræ à violenta quadam causa nimium elongatis, pori illarum aciores, canalesque angustiores fiunt. Sic

enim angustatis viis, per quas spiritus animales in partem manare consueverunt, parciore copia illam attingunt, nec suppetente ipsis spatio sufficiente ad motus suos explosivos exercendos, relaxatas fibras in pristino statu reponere non valent. Præterea sanguis laxiores istas partes rapidum, ut antea, cursum non obtinens, paucioribusque subtilioribus particulis dictis, sufficienter non advehit spiritibus subsidiariis copias, quibus vis eorum explosiva & reduntegretur, & augeatur. Latex etiam serolus ob spirituum penuriam, tardiusque circumantem sanguinem, abundantius ibi colligitur, relaxationique isti fovendæ & adaugendæ minum confert.

Pustula ortum ducunt ab humore lymphico acido viscidique facto, in glandulis miliaribus vaginæ moram trahente. Quum enim continua fiat reparatio particularum à novis à sanguineo latice profluis, recentes istæ cum veteribus permixtæ, & ab iis maxime differentes, haud facile coeunt, sed mutua facta inter se collisione effervescentiam excitant, cujus beneficio crassiores invicem ununtur, & in materiam recrementitiam faciscunt, quæ in cutis poros cespitans eos implet, cutemque in tumores extollit, qui adaugentur à sanguine è talibus obstructionibus in curriculo suo præpedito, & ad extravagationem eoacto. Quum verò per effervescentiam intensiorem acorem contraxerit massa ista recrementitia, accedine, quæ pollet, fibrillas pungit & irritat, pruritusque excitat.

Originem habent Condylomata à latice seroso glutinosiore atque spissiore, qui, quum per rugarum vaginæ foraminula ob visciditatem prodire nequeat, illorum ostiolo adhærescit. Aquosioribus autem particulis à calore perpetim in vaporem elevatis, quod crassius est, densius coalescit, & in duros tumores nodorum instar coagmentatur.

Hæmorrhoides excitantur à sanguine crasso & faculento, qui ad laxiores vaginæ venas accedens in illis congeritur & remoratur, & pondere suo fibrarum ipsarum laxitatem adauget. Venarum itaque tono debilitato, plus in illas propellitur sanguinis ab arteriis, quam ex iis amandari possit, novæque istâ mole gravatis venis, mirum quantum distenduntur eam tumuicæ, ipsarumque amplitudo supra modum dilatur, efformanturque varices, quæ ob similitudinem Hæmorrhoides cognominantur.

Ulcera causa est humor acris in parte quadam laxiori subsistens, eamque corrodens, & in illa continui solutionem inducens. Quum enim passim reperiantur vasa sanguifera, quadam ex iis erosa sanguinem in partem effundunt, ubi per moram putrescit, & in pus vertitur. Fiunt quoque ulcera, quum sanguis ab obstructione quadam in vas retinetur, in quibus ob stagnationem eum acorem confequitur, qui valè erodendo par sit. Patente ergo ostio sanguis in partem suppositam delabitur, ubi temporis tractu corrumpitur, & in pus commutatur.

Tumor vel in primo, vel in difficili accide partu, à vehementiori illa Uteri partium divulsionem, quæ fit vel ob propriam Uteri angustiam, vel ob grandiori tactum inverso modo procedentem. Tunc enim validis illis, quas patitur Uterus,

Uterus, conqualationibus, violentioribusque fibrarum divulsionibus exprimitur sanguis & vas inter ipsas fibras dispersis. Sanguis verò extravasatus nullam viam, qua regrediatur, reprensens in eo loco, in quem decidit, aggeritur, eumque in tumorem elevat. Deinceps verò in parte stagnans in ea turgescit ac effervescit, inflammationemque parit. In angustis autem fibræ vaginæ musculorumque perineum constituentium densiori ordine sunt dispositæ, atque ad extensionem minus aptæ; quare in difficili partu, diuturniorique mixtu, ac à grandiori sætu ex sapius repetitis conqualationibus continui solutionem patiuntur ac dirumpuntur, illarumque dilaceratio ad anum usque extenditur.

Rhagades inducuntur à seroso latice sale acri imprægnato, qui in fibras vaginæ excurrentes, qua pollet, acrimonia illas corrodit & dilacerat, hilulasque in his progit.

Verrucæ oriuntur à succo nutritio abundantiori cum sanguine permixto, qui fibras aliquot vaginæ subiens, illas inflat, sursumque elevat. Et quum fibræ istæ adjunctis habeant vasorum sanguiferorum furculos, verrucæ sanguine perfunduntur, rubicundoque colore donantur.

§. 8. Syphilium causam Veniginis deducit à copia spirituum animalium ipsam Clitoridem, visibili peni quoad confirmationem non ab similem, nimis distendentium, sicuti non raro ex petulantia contractatione plurimum excrecat, ut ea abuti possint mulieres, hinc aliquando ad colli anserini magnitudinem ipsi observata est. Nec excludit humores alios, qui ipsam Clitoridem tumefacere possunt, imprimis viscidos faciliè stagnantes; quæ ex eadem causâ ipsi etiam Candam produciunt.

Angustia verò Cervicis Uteri, juxta ipsum, à pluribus causis produci potest, nempe vel à nativitate, vel cum collum uteri situm est inter uterum & pudendum, substantiâ prædictum membranacea fungosa rugosique, faciliè obstructio his in locis abortiri solet, hinc sæpe clauditur à substantia membranosa, vel cum rugæ nimis sint extensæ, ac sic claudunt uteri collum exterius.

Nimia Dilatationis Colli Uteri causam deducit ab humoribus serosis, fluxu menstruorum nimio partes Uteri Cervicis rugolâs & fungosas nimis relaxantibus. Refert etiam huc Uteri à nativitate constitutionem laxiorem, & congressum nimium vasa Cervicis uteri omnia nimium distendentem, & partum difficilem.

Pustulas colli Uteri squamosas sæpe ac scabras liquorem acrem sive liquorem simul effundentes, vel siccas aliquando pruritus molestum inferentes deducit ab acido plus minusve fracto ac temperato, prout namque illud plus aut minus infringitur, gravius item, aut levius læviet in cervicem, atque pruritus graviores aut leviores producit. Ubi autem acidum illud acre magis est concentratum, pustulæ produciuntur magis acidæ. Ubi contra idem est magis solutum, minusque concentratum, pustulæ produciuntur madidiores ac serum aliquod stillantes, imò celerius serpentes. Ab acido ergo acrimonia merito ducit uteri cervicis pustulas Venereas, ipsamque Luem Veneream.

Condylomata Uteri ipsi etiam sunt tubercula dura & occalescentia, radioque magis, quam dolore partes affectas molestantia, in vagina muliebri oriri solita à præpostero Venereis usu, &

partium genitalium arcto confictu, sive id contingat in personis lue Venerea correptis, vel aliâs sanis. Condylomata igitur, juxta ipsum, non tam sequuntur luem Veneream, quam nimium Venereis usum & abusum, qui familiaris esse solet iis, quæ lue Venerea sunt correptæ. Hinc ipsi non mirum videtur, si & frequentius lui illi copulentur, postquam rarius evenit, ut quæ Venere nimium indulgent, commercium non habeant aliquando cum infectis. Sunt itaque Condylomata, ad mentem ipsius, non tam lue Venereæ signa propria, quam Venereis frequentioris documenta, unde nil certi quoad causam ipsorum veram determinari posse arguit, communissimè tamen à causa lui Venereæ, sive ab acido acriori deducit.

Hæmorrhoidum Uteri fluxum & quidem symptomaticum derivare solet ab apertione vasorum hæmorrhoidalium, à copioso sero sanguini admixto, & vasa simul relaxante. Cæcæ verò hæmorrhoides à viscida colligi putat pituita vas illa hæmorrhoidalia obstitante.

Ulcera verò Cervicis Uteri inter symptomatica lue Venereæ refert, quæ nullis partibus parent, glandulis autem præ aliis omnibus infecta, & ipsa sensum plus minus celerius tardiusve depascunt, hinc ulcerata ista ab acrimonia acida oboriri contendit, & pluribus comprobatur experimentis, imprimis quod lue Venerea solo mercurio crudo cum unguentis misto & illico felicissimè curetur una cum omnibus suis symptomatibus & ipsis adeo ulceribus, quod ipsum confirmat, luem hanc ab acido produci, postquam illud in se allicit, vel admittit mercurium, moxque per salivationem educit, sicque luem istam cum ulceribus curat.

Rhagadam Cervicis Uteri causam esse dicit humores acido-acres uteri rugas corroderentes, atque fistulas has Rhagades dictas.

Verrucas Cervicis Uteri oriri statuit à materia pituitosa, sed valde tenaci, viscida ac coagulata, accedente acido in uteri service, & ibi non tantum in æqualitatem, sed & ipsa hæc tubercula producente.

§. 9. Cariesanorum hæc de morborum Cervicis Uteri origine stat sententia, produci ipsam Veniginem ab influxu copiosioris sanguinis, & succi nervosi in Clitoridem, inde quidem producto, quod fibræ corporis hujus glandulosi ab acri quodam salso liquore irritati spiritus alliciant, qui per nervos ingredientem partem hanc inflando extendant, & tubulos examplient, quæ de causâ etiam ad Venereis nimis proclives vitio hoc præ aliis insectari putant, quandoquidem partem hanc impudicè contractando fibras relaxent, & sanguinis spiritumque influxum promoveant, vel de rebus istis, quæ partes hæc demulceant vel citulent, assidue cogitando. Spiritus ad partem hanc determinent, ut hi impetuosius irruendo per tubulos musculorum mentulam hanc muliebrem in immanem quandoque distendant magnitudinem. Nec abnuunt, ipsam hanc partem interdum ob inflammationem ex stagnatione succorum productam tumidam reddi, ut magno cum incremento, at non sine dolore, promineat.

Candam excrecere suspiciantur, quando lymphæ succusque chylosus nutrimento partium destinatus, in tubulos membranæ uteri osculum invellentis abundantius fluentes, eandem adeo

H h h 3

disten-

lucis Syphilium Causa vaginæ Uteri est.

Causa morborum Cervicis Uteri secundum Cariesanum.

distendunt, ut succedente per vices novo succo nutriente, fibræ relaxatæ eodem obductæ magnum capiant incrementum, & in vaginam usque propendeat textura ista relaxata. Quod verò fibræ ita tensæ non rumpantur, inde fieri existimant, quia à particulis lymphæ lumbicis emolliuntur, ut succo chyloso, qui idem & ipse hoc in casu mitior est, affluenti cedant, cujus particulæ oleosæ, sive ramosæ fibris istis adhaerentes incrementum hoc valde solent promovere.

*Angustari* Cervicem Uteri referunt, tum à partium vicinarum & adiacentium tumoribus, à quibus vagina uteri valde comprimatur, sicque cavitas ejusdem immineatur; tum ab crescentibus & tumoribus propriis in ipsa vaginæ hujus cavitate rugarum intumescentiâ, condylomatibus & verrucis, quæ quàm magis crescunt, eo magis etiam cavitatem hanc occupant sicque angustior reddant. Nonnunquam à prima conformatione in utero cavitatem hanc valde existere norunt angustam, aut post exulcerationem parietes concretæ, vel fibris spasmodicè affectis, partem hanc nullam partem distensionem.

*Uteri Prolapsus*, vel potius Vaginæ Uteri *Extensio nimia* causas varias solent enumerare, quarum frequentissimam putant partum difficilem, dum caput fetus majus existat, quàm ut facile per vaginam propelli aut protrahi queat. & hinc rugæ vaginæ invicem comprimantur, & versus exteriores partes depellantur, quod citius contingere solet in feminis multis recrementis humidis repletis, abs quibus rugæ istæ relaxantur; & intumescunt. Interdum etiam ipsas hæc rugas relaxatas & intumescentes ab obstetrice imprudenter accipere judicant, & violentè foras protrahunt. Relaxationi huic sæpissime aniam præbere dicunt tum mensium profluvium inordinatum, aut diuturnum, aut fluorem album copiosum & per tempus aliquod ferè perpetuum: Labores itidem magnos, ponderis sublationem, clamores intensiores, tussim violentam, pandiculationes frequentiores, lapsum, tensesum, saltum, contusiones aut percussiones in ventrem morbo huius producendo idoneæ esse fatentur. Quin propter secundinas utero firmius adnatas, & ab obstetrice violentè attractas uterum ipsum sequi & prolabi admittunt, nec non ob ligamenta humoribus aut ulceribus erosa uterum suum mutare posse, aliis placide largiuntur.

*Pustulas* in Vaginâ seu Cervice Uteri excitari putant, à succis quibusdam acidis aut salis, quorum particulæ acutæ fibras quasdam rumpant & erodant, teneriorem verò pelliculam tantummodò distendant & tubercula producant, eo quòd liquor quidam lymphaticus in sulcis diffractarum fibrarum colligatur. Semen virile corruptum vaginæ hujus partibus membranosis communicatum, ob particulas acutas fibras compingentes & poros angustantes, pustulis hæc aniam dare autumat, quandoquidem succus in glandulis cutaneis collectus, & in ipsam vaginæ cavitatem manare solitus ita occluditur, oclusus verò hic illic fibras erodit & pelliculam distendit. Idem hoc à fluore albo acriori provenire posse concedunt.

*Condylomatum* originem esse dicunt à succis acidis, quorum particulæ asperiores acutæ membranam vaginæ erodant, sicque vascula quædam aperiant, ex quibus succus profluens ab aliis

quibusdam angularibus particulis coaguletur, qui coagulatus in excrescentias hujusmodi abeat. Tales verò particulas corrosivas itidem ex semine corrupto parti huic communicari referunt.

*Hæmorrhoides* hac quoque in parte à sanguine crasso & viscido induci rentur, qui cum non satis sit idoneus, ut singulis mensibus effluat, in venis vaginæ hujus subsistat, & easdem protuberare faciat. Partes verò angulares motui sanguinis, sive fluiori ejusdem resistentes multum ad stagnationem hanc contribuere autumat. Post diuturniorem verò hujusmodi stagnationem acutissimas quasdam particulas rodendo fibras venarum dirumpere allerunt, sicque maiori foramine sanguini isti crassiori exitum parati, & hæmorrhoides reddi fluidas.

*Ulcera* in Vagina hac Uteri à variis particulis induci credunt acutis, fibras membranaceas dirumpentibus, sive hæc in sanguine existant menstruo, sive in fluore albo, sive cum semine virili à lue Venereâ infecto communicentur. Ex diuturniore quoque succorum in tubulis vaginæ hujus stagnatione fibras quasdam tandem dirumpi, & consumis particulis porosis angularibus glandulas & fibras ulterius destruere, sicque exulcerationes inducere posse, nullatenus dubitant.

*Rhagades* efformari credunt à fortiori rugarum compressione aut diductione, ut sic fibræ nimium tensæ penitus dirumpantur, uti in coitu violento sæpius contingat, vaginâ hac præsertim existente sicciore, tum enim fibræ rigidiores non facile cedunt, sed impulsui cuius resistunt, donec à vehementiori & frequentius repetito diffingantur.

*Verrucæ* ideo propullulare existimant, quod à particulis quibusdam acutis acerbis erosa membranâ, à succo per tubulos & foramina profluente nutritio fibræ relaxatæ magis distendantur, ut extra circumjacenti membranam promineant, circa quas prominentias assiduò profluens succus colligatur, & hyperfarcinâ quandam efficiat, data enim porta quam liquor iste nutritivus partium liberius promanat, & in excrescentias ejusmodi abit carnosas.

§. 10. Nobis ipsa *Yentis* ut plurimum ob laxitatem valorum ac tubulorum oriri videntur, & sensu de causis morborum Vaginæ Vici duntaxat. quod spiritus frequenti partis hujus contactu alliciantur. Hinc succi omnes circa hanc partem sibi imperium rapiunt, illamque se extendunt & dilatantque; aliquando quid convulsi inter-

*Nobis sensu de causis morborum Vaginæ Vici duntaxat.*

est, & illas non aliter afficit ac Priapismus viros, & fere eadem causa est, de quo affectu superius latius diximus. Convellitur enim hic clitoris acetano afficitur non aliter ac penis, quod non sine dolore aliquando fit, ita ut tensio à coitu peracto non remittat, uti in Satyriasi accidere solet, licet & in hac mox nova erectio eaque sæpius subsequatur. Habet tamen Priapismus id quoque, quod subinde remittat, mox iterum revertatur, unde partim convulsio, partim motus convulsivus est. Reperiuntur verò hi affectus complicati cum aliis morbis, & quidem Satyriasis cum Elephantiasi, Priapismus cum Gonorrhœa, & Salacitas in iis quæ multi roboris sunt. Aliquando incidit Priapismus subsequente pollutione, id quod etiam in animi deliquio viris quibusdam accidit. In Hernia, colica cum multis flatibus, calculo, Epilepsia aliisque affectibus spasmodicis affectus hic conjungitur, sic

etiâ



etiam in viris observatur Priapismus, qui laqueo suspenduntur.

Causa *Cauda* ita dicta sepe cum *Tentiginis* caula eadem est, modo succus nutritius in eo loco magis evaleatur, & ob visciditatem quam conjunctam habet succus nutritius silvestris, quasi caro ac spongiosa nascatur; vasa ac tubuli ad hanc partem tendentes & succum nutritium vehentes, in nonnullis feminis ampliores sunt, hinc & plus nutrimenti accipit hæc pars, & talem magnam efficit caudam.

Causa *Angustia* uteri Cervicis vel est à nativitate, sicut non ita pridem hic Castellis vidi puellam duorum annorum, quæ à nativitate tantum foraminulum habuit, per quod vix acum intrudere potuisset, & urina tantum per hoc concedebatur transitus, quod tamen Chirurgus noster Castrensis *Christianus Hoffmannus* b. m. cultro incisorio aperuit, & impositis plumaceolis liquore quodam imbutis amplius reddidit non absque succellu. Sunt & aliæ causæ, quæ Cervicem hanc actionem reddere possunt, ut calculus magnus in vesica, tumor in intestino recto & ipsa Cervix, item fungus & caruncula ibidem existentes & cervicem obturantes occludentesque.

Cura.

Nunc causam nimia *Dilatationis* seu *Cervicis* vulgò Uteri, *prociensia* videbimus. Est sæpe violenta causa in partu difficili ab obstetricibus, quæ sæpe digito loco secundinæ fœtusve hæc rugas arripit, adducuntq; unde vagina à subiectis avellitur partibus ac prominere incipit, confertur *Wid. Oiserv. rar. p. 295. Obs. 68.* Sic & propendet & relaxatur vagina, quando rugæ vaginæ in quadam saltem parte laxatæ, aut exelæ, aut erolæ nonnihil sunt, tunc enim à sanguinealisque succis in parte relaxata stagnantibus succellivè extra pudendi labia sæpe propendet, ut repræsentet corpus amplum, rotundum angusto collo annexum, quod collum interius intra sinum pudoris se abscondit. Hoc corpus interdum capitis infantis molem æquat, imò interdum usque ad genua propendet, & primum odorem spirat, pondere dolorem infert, congressumque impedit, ex continuo flore albo sæpe laxantur rugæ & fibræ Vaginæ, succi dein stagnantes facile acorem concipiunt, ac dictas partes in ulcera vertunt.

Causa *Pustularum* vaginæ uteri sunt ut plurimum succi acres viscosi, in uteri cervice subsistentes, vel à semine virili corrupto ibidem effuso & acri facto, productæ, quia enim cervix uteri rugosa & glandulosa est, ibidem facile lymphæ acris tubulos suos corrodere dein subsistere, & sic corrodendo pustulas producere potest. Nec eximentis sunt alii succi salinis, muriaticis ac corrosivis particulis repleti ibidem subsistentes, & sic acerrimi facti tubulos suos perfundentes, pustulasque has producentes. Facile & hæc oboriri possunt, si quis à lue Venereâ infectus cum muliere rem habet, omne enim eò datum pustulas producere aptum natum est.

Eadem est causa Cervicis Uteri *Condylomatum* quam Ani, si enim in glandulis Cervicis, vel rugis existant nimis crassi ac lutosi viscosi succi, ii stagnando ejusmodi tumores excitant. Huic quoque morbo sæpius anam dat lues Venerea. Alia sunt cum inflammatione, in quibus dolor & ardor major est ob conjunctam siccorum acrimoniam fibrillas cervicis uteri pungentium,

& condylomata sunt dura; alia sunt sine inflammatione, & sunt instar scrophulorum, quæ & recentia & antiqua seu inveterata dicuntur. Si enim lymphæ in glandulis Cervicis uteri subsistit & crassior redditur, ejusmodi nodosi tumores inde emergunt, ceu videmus in Collo puerorum sæpe scrophulosos tumores ab eadem causa productos, existentes,

*Hæmorrhoides* vaginæ uteri sunt vel apertæ vel cæcæ, uti sunt ani, & causa eadem est. Sanguis enim effluxurus nimis lutosus ac crassius viscidus ab acido factus ibidem stagnando carcas producit uteri hæmorrhoides, ob crassitiem enim sanguis per arterias uteri Cervicis hæmorrhoidales in venas ejusdem nominis transire impotens, partes Cervicis distendit, & aneurismata concitat, quibus planè ruptis vel per acrimoniam sanguinis corrosis, sanguis effluens æquè hic ac in ano apertas hæmorrhoides constituit, hinc fluxus hæmorrhoidalis dicitur.

Causa vaginæ uteri *Exulcerationum* plures sunt tum internæ tum externæ, quæ scilicet acrimoniam suâ corrosivâ continuum in parte illâ rugosâ cervicis uteri solvere possunt. Externæ causæ possunt esse medicamenta corrodentia, partus difficilis & inde orta violenta dilaceratio harum partium tubulorum ac cavaliū ab obstetricis improvidâ, quò referri potest concubitus violentus. Internæ causæ etiam plures sunt, ut secundina sphacelata, vel alio modo corrupta, lochia retenta, fluor uterinus maximè acris & virulentus, lues Venerea, inflammationes in abscessum conversæ, sic etiam si veci circulares omnes acres ibidem congesti & partes has corrodentes ulcera producere valent.

Menstrua quoque muliebricia ex sanguine nimis crasso ac tenui sæpe supprimuntur, sanguis tunc depluens in collum uteri valculis stagnat subsistitque, hinc acrior redditur, præsertim vero lymphæ in glandulis stagnans acriorque reddita facile invadit glandulosas partes exulcerationesque efficit, quod observamus in mammis, aliisque glandulosis partibus, quæ à corrupto sanguine & stagnante lymphæ aliisque succis ita afficiuntur, ut Inflammationes, Cancer aut *Ulcus* inde exoriri possint, Cancer enim nihil aliud est, quàm glandularum Sphacelus, cujus sævitia vicinas partes non raro quoque depopulatur: at ulcus est continui in partibus mollibus solutio, vel à tumoribus, inflammatione, combustione, vel punctura vel contusione lapsu &c. oborta.

Causa *Rhagadum* Cervicis uteri est, vel continui solutio à partu laborioso, vel coitu violento vel alia frictione petulanti, vel ab succis acris ibidem stagnantibus & in partibus hæc rugosis fissuras excitantibus, sequuntur quoque ulcera hæc prægressas inflammationes & condylomata,

Causa *Fistularum Cervicis Uteri* eadem est ac aliarum fistularum, disruptio nempe vel corrosio valorum Cervicis Uteri, unde effluit pus, quod impedit partium coalitum, sunt ergo particulæ acres ibidem stagnantes tubulosque dilacerantes, ex quibus emanat ichor fetidus virulentusque, qui continuo stillans fistulam producit.

*Verruca* sive *Myrmecia* à succis crassis & ferulentis in vaginæ uteri glandulis ac tubulis stagnantibus oriuntur, qui tandem in callosam

istam soliditatem induratur, ac verrucosas has producat eminentias.

*Prognosis.*

§. 11. Quod Prognosis attinet, *Tentigo* & *Cauda* affectus sunt valde periculosi, sed pudicitiam exponunt & haud molesti. *Dilatatio nimia* Cervicis uteri malum per se non est periculosum, attamen metuendum ne subinde in gravia abeat ulcera, aut inflammetur cervix uteri, aut in gangrenam desinat. Quò est recentior, eò facilius curatur, si inveteratus est affectus, palliativè tantum curatur. Si sit à causa interna per successivam relaxationem facilius curari potest, eò quòd sit per violentiam externam: qui sit per impetum obstrictis, insanabilis est.

*Pudendi Angustia*, quæ est à primâ nativitate & conformatione, Medici vel Chirurgi openi si in ætate infantili vix tolli potest, verum aliquando vel à coitu, vel partu magis dilatur. Sepe lethale malum est, si simul urethra seu meatus urinarius in totum occalluerit, si verò urinæ adhuc concedatur transitus per rimulam, tunc faciliorem admittit emendationem.

*Hæmorrhoides* uteri si moderatè, melius est, quàm si nimium fluant; sic cæcæ fluentibus deteriores & difficiliore sunt curatu.

Nullum ulcus præsertim vero vaginæ uteri spernendum, licet exiguum, quia fibrillæ omnes ab acerbis particulis discinduntur, & pars succis suis privata vigore suo necessario destituitur. Sordida, antiqua, quæ in imo hærent, reliquis curatu difficiliora sunt, ut etiam illa ulcera quæ comitem luem Veneræam vel scorbutum habent.

*Fissura* sive *Rhagades* si recentes fuerint, facilius tolluntur, antiquæ verò & quæ jam callu facta sunt ulcera, curatu ut plurimum difficilissima sunt, ut & ea, quæ sequuntur morbum Gallicum.

*Fistula* sunt difficilissimè sanatu, redduntque feminas miserac ærumnosas, idque eò magis, quo fistulæ altiores & diuturniores egerint radices, & anfractuosa fuerint, vel corpus scorbutum, vel lue gallicæ infectum, vel senile cachecticum offendant, tunc enim sanatio nulla speranda est.

*Condylomata* & *Verruca* quo sunt profundiores in uteri vagina, eò difficilias sanantur. Exteriores verò & contra facile tolli possunt, difficilius etiam ea curantur, quæ à lue Venereâ ortum suum agnoscunt, item in iis mulieribus quibus menses subsistunt & cachecticæ vel scorbuticæ sunt, quæ enim in succis suis carent sale volatili, sed loco hujus possident sanguinem viscidum, tenacem ac lutosum, non facile curantur.

*Dietæ.*

§. 12. Non satis est, *Divini Senis* effato, Medicum suum fecisse officium, nisi suum quoque & ipse faciant æger & adstantes, sintque externa omnia ritè comparata. Imprimis enim æger lubenter suo palato blandientes juxta medicamentorum usum. *Dietæ* eo exactior est observanda, quo majus in illa ad morbum sive præcavendum sive curandum positum est momentum. Dietæ ergò in his jam recensitis affectibus muliebris requirit aerem purum, serenum, temperatum, ab omnibus inquinamentis liberum, qui tamen magis ad caliditatem quàm frigiditatem vergat, vitetur marinas, crassus & particulis Salino nitrosis repletus, item fugiantur conclavia & hypocausta, ubi ægroci

imprimis lue Venereâ infecti fuerint, aer ergo corruptus semper per solum corrigatur. Quoad cibos, eligantur cibi euchymi, boni & pleni dulcis succi lactei, ut sunt carnes gallinarum, caponum, vitulinæ, perdicis, alaudæ, alique aves montanæ, item varia jusscula avenacea, hordæata, &c. liquida ac calida solidis ac frigidis præferuntur, præstat enim Ventriculorum imprimis pessimorum ciborum mole non obstruere, feminis etiam magis indecorum est. Embœmmata ex cochlearia, sinapi, nasturtio cum vino Gallico & non acido parata optime conveniunt, quoniam omnia alimenta sale volatili, multo gaudencia optima sunt. Hinc pisces tanquam nutrimentum lutosum aqnosumque rejiciendi sunt, præter laxatiles qui concedi possunt. Vitentur etiam angue pejus omnia acida, nimium salita, fumo indurata, dulcia viscida, & occultum acidum in se continentia, ut saccharata, quæ in aulis jam ita usu quotidiano recepta sunt, ut menses his quasi obteganter, & mille artes excogitantur ad miscellum sexum sequiorum decipiendum, facile enim ab his saccharatis quibus deditæ sunt mulieres, obstructions fiunt, ex quibus affectus muliebres dicti propullulant. Fructus quoque horarii, omnia statulenta crassiora & digestu difficilia exulent. Potus sit ipsis delicatior vinum Gallicum, Vin de Sesterne dictum, vel vinum Hispanicum, vel Tokavienle, vel aliud generosum, quo vero acidius est vinum, eò est pejus. Conducit quoque Cerevisia clara, defæcata ex optima aqua cocta & lupulo debitè condita, denique radicibus & herbis aromaticis ac antiscorbuticis imprægnata. Omnibus verò foemellis, imò puellis & virginibus imprimis his affectibus vexatis commendamus potum Theæ vel Coffeæ, quod potius genus egregium est in his affectibus muliebris. Corporis motio & quies sint juxta virium & affectus conditionem, nemo enim ultra posse obligatur. Somnum & Vigiliis quod attinet, horum ulum *Poeta* sequenti distichio includit:

*Est dormire bonum & vigilare: sed utraque, quævis*

*Optima; si fuerint immoderata nocent.*

Excreta ac Retenta justum modum ac tempus etiam in his affectibus observent necesse est.

Animi pathemata, quibus sexus hic sequior magis obnoxius est, quàm masculinus, sunt temperanda, imprimis verò hic exulet ante omnia Venus, cuius usus etiam in honestis mulieribus hisce affectibus vexatis sit nullus, vel parvissimus. omnes quoque aliæ illecebræ fugiendæ sunt, quæ anam dant hisce affectibus Cervicis Uteri, præsertim si mulieres rem habent cum variis lue Venereâ jam infectis, vel gonorrhœâ inveteratâ laborantibus, tum necessariò in hos dictos affectus incidere coguntur, quoniam per contractum harum partium infectarum in rugis Cervicis Uteri subsistentes succi facillè eodem caractere acri notantur, hinc ibidem stagnantes & eadem acrimoniâ tubulos corrodunt, ac succievasantur, eundem vel similem producant affectum, ceu experientia quotidiana testatur. In inveteratis hisce malis etiam exulcent ira, moror, tristitia, invidia, & amor vesanus præsertim vitandus, quia succus nervus hisce animi passionibus stagnare cogitur, & sua volatilitate privatur, ut per suos tubulos ac canaliculos non

ita ut antea perfluere possit, hinc mille mala emergere possint.

*Galenico-  
rum mo-  
do curan-  
di Tenti-  
gine.*

§. 12. *Galenici* in *Tentigine* curanda potissimum utuntur sectione, sive nymphotomiâ, quam amputandi rationem ex *Ægyptorum* mentis *Actius* *Tetr. 4. Sermon. 4. cap. 103.* sequentibus communicat verbis. Virgini, vel mulieri, in sellâ locatæ, assideat adolescens robustus, qui brachia sua proliis virginitatis subiiciat, cruraque ejus ac totum corpus regat, & cum Chirurgo ante ipsam stans, forcipe ampliori nympham corripiat, & per sinistram manum distendat: per dextram verò prope forcipis dentes refecet, Mesuram autem resectionis eandem, quam in columellæ sectione servandam esse monet, ut ne funditus ea refecetur, sed supervacua tantum pars amputetur; adeoque prope dentes forcipis nympham rescandam esse existimat, quoniam quàm pelliculosa sit, plurimum extendatur, & nili quis diligenter observet, faciliè ultra, quàm oportet, amputationem faceret; atque hinc carunculae decrementum, quod *Rhœdæ* Græci vocant, consequeretur. Peractâ Chirugiâ, suadet, ut spongia ex vino adstringente, aut aqua frigida expressâ vulnus detergetur, manna thuris inspergatur, linamentum poscâ madefactam indatur, & spongia ex poscâ expressâ superdeligetur. Post septimanam cadmiam minutissimè tritam per se, aut cum rosarum floribus, aut pulverem ex lapide Phrygio paratum, aut cinerem ossium palmularum inspergant.

*Caudam.*

Eodem modo *Cauda* resectionem peragunt, muliere enim prior ratione collocata, carunculam prominentem forcipe extendunt, & totam ex basi refecant. Post Chirurgiam eosdem inspergant pulveres, quos in *Tentigine* adhibuerunt.

*Vteri Cervicis Angustiam.*

*Angustiam* Cervicis Uteri emendant, vel loca à nativitate connata dilatando, & sic ferro viam parando, vel locos angustiores dilatando radice gentianæ, vel spongia, pessi forina impressis, ut itâ hisce paulatim auctis, vagina ipsa dilatetur, simul etiam interiora inungunt oleo amygdalarum dulcium, liliorum alborum, lini, irino, sive utque decocto malvæ, althææ, scenigræci, & similibus, ut enollita facilius extendantur. Si virum quidem admittant, sed cum dolore, tragacantha aqua violarum soluta interiora illinunt, qua inflammationem arceri, tensionem leniri, & cavitatem hanc lubricari promittunt, eamque mixta pinguedine capi, vel porci nonnunquam redigunt in unguentum.

*Uterum prolapsum.*

*Uterum prolapsum* restituere student in principio, dum facile dirigitur, & rectè locata permanet, vulvam contrahendo, quod in vigore ætatis facilius perfici, in profectionibus verò eandem quidem contrahi, sed ex levi occasione rursus prolabi inonnet. Ne quoque aut durum stercus in recto intestino diutius retentum, aut lotium in vesica collectum coarctando & compimento impediât, ne uterus repellatur, & in suum proprium reducatur, stercus clystere evacuant, & lotium fistulâ vesicæ adaptatâ similiter evocant, quibus præmissis ægram supinam collocant, coxis alioribus, poplitibus reflexis, ac cruribus disparatis; partemque vteri prolapsam oleo tepido, butyro, vel decocto malvæ, betæ, althææ, scenigræci, seminis lini, aut similibus fovant, lanamque convolutam figurâ ac crassitudine muliebri pudendo correspondentem, lin-

teoloque involutam, & acaciæ aut hypocyssidis succo vino diluto imbutam sive intinctam utero apponunt, & citra violentiam totum, quod prolapsum est, reprimunt, donec tota moles intra sinum recipiatur; postea lanam in pudendum subdunt, & alium lanæ hapsum bino adstringente imbutum superponunt, totumque spongiis ex poscâ expressis integunt, & mulierem reclinant crura extensa & coaptata habentem, itâ ut alterum alteri incumbat. tutius tamen fore judicant, si ad genua usque confringantur. Nonnulli uterum recens prolapsum cucurbitæ domesticæ ac betæ decocto cum urinâ graveolenti, aut aceto acri, aut re aliquâ fœditâ prolunt. Si verò uterus prolapsus temporis progressu intinuerit, plurimoque humore reforescit fuerit, ut præ tumore reduci nequeat, betarum decocto ipsum rigant, deinde acetum affundunt, & saltem tenuissimum adspargunt, sedatque tumore, eodem decocto ipsum persusum retrudunt, cucurbitasque umbilico & utriusque lateri cum plurima flamma affigunt, & odoratis aribus assidue admovent. Die tertia, lana atque intra sinum pudendi existente, mulierem in vino nigro austero aliquatenus tepesfacto, aut in decocto myrti, lentici, rubi ac malicorii prebent insidere. Post infessionem rursus supinam coxis locant altioribus, & sublata ex pudendo priore lana, aliam eodem medicamento imbutam subdunt, forissecus verò cataplasmata imponunt ad inum ventrem, ex palmulis, potentilla, lentacula ac malicorii, cum aceto mullo, quæ tertia die repetunt, usque ad perfectam curationem. Uteros crebro prolabentes poscâ ablunt, & in eadem mulierem diutius insidere jubent. Oblocorum quoque sensus subtilitatem rejecto aceto terram nigram in lentibus repetam aqua diluunt, & ex ea partem affectam plurimam foverunt. Sin uterus ob humorum lentorem difficulter repellatur, vini fecem usant, aut nitrum lixivio permixtum oblunt, & decocto aliquo adstringente, aut terra ista nigra aqua diluta foveant, plurimique cremorem oleo myrteo aut melino admixto parti prolapsæ illinunt, ac in sinum pudendi retrudunt, & locos internos, ægra undique circumsecta, rebus fœtidis suffiunt, naribus autem odoratisima quæque admovent, cibosque boni succi & vina odorata tenua offerunt. Torpedinis corium recens detractum, parti prolapsæ obvolutum, aut pastinacæ marinæ aculeum cum hyoscyami succo illitum iterum repellere nonnulli perhibuerunt. Alvum interea nimium non esse subducendam admonent, ne partes vicinæ exsolvantur & laxentur, uterusque ipse recidat. Si quoque contigerit, ut pars prolapsa temporis progressu per negligentiam computruerit, & ex assidua urinæ irrigatione & adherentibus sordibus fuerit exulcerata, illam citra ullius periculi formidinem auferendam esse præcipiunt, cum totum uterum putrefactum aliquando ablatum esse, & mulierem nihilominus supervixisse noverint.

*Ad Pusillam Cervicis Uteri abigendas alvum Pusillam,* lacte asinio purgant, vomitum à cena institunt, in balneo exudationem & in calidam infusio fieri volunt, locosque vino calido cum nitro eluunt, post vinum aquam calidam infundunt, & lycium Indicum, aut amurcam, aut butyrum cum sulphure, aut ceratum myrteum

cum spuma argenti, aut alumen rodundum cum melle, aut malicorium cum myrrha & melle illiniunt. Ad squamas & furfures extentes, cyclaminis radicem cum melle illitam deprecant.

*Condylomata.*

*Condylomatibus* partis hujus fomenta adhibent adstringentia, pessusque indunt è malicorio & butyro, aut ex lycio Indico & cælypo paratos.

*Hæmorrhoides.*

*Hæmorrhoidibus* Cervicis Uteri varicosas ac malignas dimitunt, duras ac modicum sanguinem fundentes, nec valis annexas statim amputant, multum verò sanguinis emittentes circa fundum circū circa scarificant, vossella elevant, funiculo constringunt, & postea paulatim refecant, quo facto floridum medicamentum siccum inspergunt. Ad easdem verò citra Chirurgiam exciscandas & excercandas pulveres inspergunt ex spodio, rolis ficiis, balauftiis, malicorio, vel terram Lemniam cum aceto illiniunt, vel pastillosex succo mandragore, alumine rotundo, acacia, cum vino tritis paratos & vino dilutos, vel eodem modo adhibent eos, quos sequentes monstrant formula.

℞. *Succi cicuta*

*Hysocyami*

*Alum. fissi.*

*Rubrica Sinopica* aa. ʒij.

*Sandycis* ʒj.

*Cum vino terito & excipito, usque tempore vino diluito.*

vel:

℞. *Diphrygu* ʒvj.

*Cervissæ,*

*Spuma argenti,*

*Plumb. usti & loti*

*Succi hypocistidis* aa. ʒiij.

*Excipe succo cicuta, & cum vino adhibe.*

Infusiones etiam in decoctis adstringentibus commendant.

*Ulcera.*

*Ulcera* Cervicis Uteri curare solent infestationibus, irrigationibus, cataplasmatibus ac pessus, præsertim verò eo, qui paratur ex croco optimo cum lacte muliebritrito ac cerato excepto, ceratque Tyrrhenica, & oleo rosaceo aut sulino, cum adipe asnerino, & medulla cervina; vel ad dolorem magis leniendum sequentem adhibent pessum, paratur ex capitibus papaveris decem in passo diluto per triduum maceratis, deinde donec flaccida fiant, coctis & postea expressis tritis, cum seminibus aut foliorum rosarum ʒv. croci ʒij, & inter terendum ipso decocto admixto, tum cerato ex ceræ sextante, & olei rosacei aut narcissini eadem quantitate parato ad ea affuso, & medicamento in pyxide stannea servato, donec usu expetente oleo rosaceo aut narcissino dilutum & in pessum exceptū subdatur. Ad acrium etiam humorum influxum pruritiginosum inhibendum sequens laudant remedium, vel linimenti, vel pessi forma adhibitu.

℞. *Plumbaginis* ʒij.

*Glauci* ʒj.

*Terantur cum succo hyssocyami, & olei myrrei aut rosacei, q. s. admisceantur.*

Ad *Ulcera* carbunculosā privatim commendant lentes, folia oleæ sine melle, lupinos in vino aultero coctos, & in eorumdem decocto institutas infusiones. In ulceribus furdidis emplastro utuntur *Ægyptiaco* citra æruginem præparato, cum mordacia quarvis & crustas inducentia utero adversa esse cognoverint; parant etiam medicamentum ex melle, terebinthina, oleo

rosaceo aut sulino & butyro, quibus interdum etiam crocum admiscunt, vel ad *ulcera* hæc fortius repurganda radicem iridis *Illyricæ* cum melle imponunt, & decoctum aristolochiæ per se, vel cum melle infundunt, aut sequentem indunt pessum.

℞. *Terebinth.* ʒiij.

*Adipis asnerini* ʒvij.

*Myrrhæ* ʒj.

*Croci* ʒij.

*Medullæ bubulæ.*

*Ossipi* aa. ʒij.

*Mellis,*

*Olei Cyprini, aut Iryni.* aa. ʒij.

*Thuris,*

*Rad. panacæ,*

*iridis.* aa. ʒij.

*Cyperii* ʒiij.

*M. F. Pessum.*

*Ulcera* depalcentia & asserata lacte equino, aut asinino, vel in utriusque defectu, quocumque alio recente & cocto ablunt, addita dimidia quantitate mellis, & postea insperso pulvere ex radice iridis. Vel ablunt eadem aqua mullā, in qua absinthium, aut calamus aromaticus, aut leucauthemū, vel chamæmelum, aut buphthalmum decoctum est, eoque, quod insulum est, excreto, locos decocto malvæ eluunt. pessumque subdunt ex fatina cervi, iridis, lentum aut foliis oleæ in vino tritis, aut cineribus hederæ aureum florem habentis, aut aristolochia longa & rubrica Sinopica hepatis colorem referent, tritis & melle exceptis. Parant quoque pulverem ex semine tamaricis & nitro rubro æqualibus partibus commixtis, tritis, eumque vel aridum inspergunt, vel cum melle rosaceo in linimentum redactum adhibent. Ulceribus repurgatis cicatricem inducunt, vel cerato ex ceræ albæ quadrante, olei rosacei optimi dodrante ad prunas liquefactis, & quadrantem refrigeratis, deinde in mortarium coniectis ac lacte muliebri, aut asinino, aut caprino recens multo affuso, cum pistillo subactis, donec totum inalbescat, deinde lacte priore diffuso, novo denud infuso rursus subactis, & croci drachma una admixta. Si fortius mitigatorium desideretur, accipiunt olei rosacei septuncem, adipis asnerini, & medullæ ejusdem ana unciam unam & invicem miscent, vel pro rosaceo oleum melinum aut sulinum admiscunt. In frequenti etiam usu ad *ulcera* hæc sananda illis est medicamentum ex oreo sequenti modo paratum.

℞. *Ordei usti ac triti,*

*Spuma argenti lotæ,*

*Cervissæ lotæ* aa. ʒbj.

*Adip. asnerini.* ʒiij.

*capræ recent.* ʒiij.

*Ol. myricæ* ʒbj.

*Mellis despumati* ʒssj.

*Terebinthina* ʒiij, vel ʒiij.

*M.*

Ex pompholyge quoque, plumbo usto, cadmia aut ladano parata media hic valde existere ducunt utilia.

In *Rhagadibus* Cervicis Uteri curandis Chirurgiæ & medicamentis mordacibus rejectis, infestationibus simplicioribus ac pessus utuntur, aliisque remediis ex pompholyge, stibio & plumbo usto paratis. Si calloræ fuerint, chartam usquam

*Rhagades*

olens

# CAP. IV. DE MORBIS CERVICIS UTERI. 435

oleo rosaceo dilutam illinunt, vel si acrimonia ejus ferri non possit, isidem Illyricam terebinthinā exceptam indunt. Inductā Ulceribus cicatrice, remediis ex cadmiā, spūmā argenti lota, stibio, aloē, aliisque paratis utuntur, quale sequens exhibet formula.

℞. Spuma argenti lota  
Cerus. lot.  
Plumbi nſſi ℥. lot. aa. ʒxxv.  
Stibilibi ʒix.  
Pompholygi lota ʒvii.  
Cadmiā lota ʒv.

Hæc omnia primū seorsim, deinde simul terunt, & vini ac olei myrtēi aa. lbj. paulatim adstillant, ac probè terunt, & unita in pyxide plumbæ servant ad usum. Archigenes prioribus speciebus adhuc ceræ Tyrchenicæ lbj. & adipis anserini tantundem, alii verò etiam plumbaginis ʒxx. adjiciunt.

Verruca.

Veruccæ & Thymos partium muliebrum recentes ut alias tractare solent, inveteratis verò Chirurgiam adhibent, muliere nempe rectè locatā eminentiam vellellā extentam, totam funditus resecando, deinde curationem cruentis vulneribus aptam aduiniſtrando. Ad thymos in abdito reconditos, & verrucas fornicarias medicamenta usurpant, summūque conferre dicunt humoram ex oculis capræ recens jugulatæ compunctis profluentem, assidue illitum, quo intra sex dierum spatium verrucas fornicarias extirpatum iri pronuntiant. Stercus bubulum calidum illitum easdem sanare referunt. Aetius fumum origani festuæ ad lucernam accensæ & verrucis fornicariis singulis diebus ter admotæ easdem radicibus abstulisse in uxore propria fuit expertus. Soles etiam veteramentarias & cucurbitam siccam sigillatim exurunt, & minutissimè trita paribus portionibus permiscunt, locisque viuis prius elocis inspergunt, hocque remedium experientia satis cognitum esse asserunt. Malignorum thymorum sectionem, ob eruptionis sanguinis periculum reprobant, non malignos autem tuto resecari posse censent, cum nullus in his eruptionis sanguinis timor adsit, cavendum tamen esse monent, ne uterus à scalpri acie lædatur, quod facillè vitari posse existimant. si thymus distensus prope vellellæ dentes amputetur. Resectione factā ad desiccandos locos medicamentum aliquod sanguinem sistens adhibeat, cum humectatio & medicamentorum pinguium usus causa sint, ut thymi regenerentur; quapropter per totam curationem laxantia ac pingvia fugienda esse præcipiunt, & post Chirurgiam protinus gallas tritas, aut alumen scillium cum pari thuris pondere admovent, vel medicamento utuntur florido, ex stomomate ferri, aut flore rosarum & cytinis siccis parato, aliisque contrahentibus, quadantibus repurgantibus & ulcera ad cicatricem perducuntibus.

Paracelsus  
de cura in  
Tentigine  
& Canda.

§. 14. Paracelsus parūm favet in morbis hisce curandis operationibus Chirurgicis, in Tentigine enim ab aliis itā nominata, sive Clitoridis incremento & Canda auferendis, omni instrumento rejecto, solummodo incrementum morborum horum imminuit remediis in Scirrosi aliis ulcatis, inungendo scilicet renes, vasa spermatica & femora mixtura ex oleo myrtillorum, Nucis Moschatæ, axungia junentorum & petreolo. In Tentigine quoque obscura, & prava,

ubi cum fluxu menstruo aqua, & cum urinā sanies. cum dolore pudendorum effluit, qui affectus facillè abit in ulcus, à purgationibus, consolidationibus & mundificationibus itidem abstinentum esse præcipit, sed earum loco triperiticam proponit curam, unam per spallium, aliam per potiones; tertiam per unguenta, quæ parum ab ea, quæ in matricis ulceribus fieri debet, differre solet. Primò verò laudat potiones, sive cardonia, quæ sequenti modo parantur.

℞. Agrimonia,  
Sanicula,  
Pyrolæ,  
Utriusque pervince, aa. ʒj.  
Aristolachia rotunda ʒi.  
Herb. passinaca  
Perdeis aa. ʒj.

Multis non maturi ex vino rubeo, usque ad centum Kist, id est, ducentas mensuras vini, Fiat Cardonium, hoc est, ponantur in mustum herbæ supradictæ, macecentur, & simul repurgentur, de quo vino per medium annum quotidie bibat mulier.

vel:

℞. Consolid. regal. lbj.  
Aristol. rotund. ʒvj.  
Diapens.  
Alchimill. aa. ʒx.  
Serpentin. minor. ad pondus omnium,  
Fiat Cardonium secundum usum.

Componit etiam sal, cujus usum esse vult in omnibus periculis laborantis tentigine matricis, eusque sequentem tradit formulam.

℞. Sal. commun. lbj.  
Thuris;  
Mumia,  
Hamatis aa. ʒij.

Fiat mixtura cum sale, quo condiatur omne, quod ederit.

Spallia sequenti ratione præscribit:

℞. Aq. plantag.  
Serpentin.  
Matricar.  
Hypericon. aa. lbj.  
Lumbricor. terrestr. ʒvj.  
Dragacant. ʒj.  
Consolid.  
Fol. aristoloch. long. aa. ʒiij.

Fiat Spallium optimo saccharo permixtum, hoc est, fiat metrenchita, vel clysterium, quod vulvæ imponatur, perque tres, quatuor, vel quinque horas in ea maneat singulis diebus.

vel:

℞. Succo Hypericon.  
Persicar. aa. lbj.  
Aq. de prunis,  
de cerasis, aa. lbj.  
Terebinth. lot. in aq. rosar. ʒvij.

Fiat Spallium pro matrice, quod indatur in vulvam quolibet die bis; aut pluries, pro necessitate exigentia.

Vel sequens:

℞. Olei Hypericon.  
Persicar.  
Aristol. rotund. aa. lbj.  
Ranar.  
Lumbricor. aa. ʒxij.  
Ol. ex vitellis ovorum ad pondus omnium.

lii 2

Forme-



*Formetur Sparallium*, quod ut in tanta quantitate administraretur ob pinguedinem suam, non opus esse admonet. cum quicquid lubricum est, matris ad se libenter attrahat.

Unguentum insuper ad dorsum tale præscribit.

℞. *Mercurii absque substantiâ frigida, & omni mordicatione correcti* 3℔.

℞. *Boli fissi* 3ij.

*Axung. cervin.* 1℔.

*Ol. aneth.*

*ex vitellis ovorum.* aa. 3vj.

*Fiat unguentum cum cnyâ.*

Medicamina ista, unguentum scilicet, sparallium & cardonium simul, & quidem quolibet die bis vult administrari.

**Angustia.** Cervicis Uteri *Angustiam* à nativitate ita existentem vix curationem admittere judicat, crudele enim feruim, nec temper uale fore existimat. ubi verò aliquod concessum est spatium, oleosis & pingvibus remediis partem hanc temporis tractu adeo disponi posse sperat, ut vel formis convenientibus, vel membro virili in coitu legitimo facile ampliatur. A tumoribus, condylomatosis, excrecentiis aut morbis aliis inductam, iisdem abactis nonnunquam emendari posse aliis non ita difficulter largiuntur.

**Procidencia.** Uteri Cervicis *Procidenciam* aliquando restitui posse sibi aliisque persuadet, in principio nempe, si morbus hic non adeo diu duravit, instillato oleo succini in umbilicum, vel guttis ejus aliquot intus exhibitis, abs quo medicamento uterum optime regi posse censet, nec instrumenta operose quidem, sed incassum ab aliis sæpius excogitata, illud reparare posse statuit, quod illud non potuit in statum meliorem reponere.

**Pustulæ.** *Pustulas* Cervicis Uteri à turgentia prava, vel lue Gallica indutas, tum remediis internis per enunctionem conveniens, imprimis menstruum purgantibus, Auro nempe soluto & Q̄o corporali hæmatino exhibitis, & fumo externo ex mercurio in colorem cinabarinum redacto instituto, & pudendis admo, optime depelli posse opinatur.

**Condylomata.** *Condylomata* Cervicis uteri abigere tentat depilationibus, provocatis mensibus & hæmorrhoidibus, tum externa eadem adhibet, quæ destruendis verrucis sunt idonea.

**Hæmorrhoides.** *Hæmorrhoides* etiam hujus partis tumidas prius incidit, & tum sequentem iis inspergit pulverem, quo omnium optime eas auferri posse promittit.

℞. *Marcescit.* 3℔.

*Alcool vini optime exsiccati* 1℔j.

*Misceantur.*

℞. *Hujus marcescit.* 3ij.

*Sal. gemm.*

*Mumie,* aa. 3j.

*Fiat Pulvis.*

**Ulceribus.** *Ulcerâ* hæc eodem modo tractat, quo Tentiginem pravam superius curavit, cum remediis in eâ nominatis optime mundificentur & consolidentur.

**Rhagadiis.** In *Rhagadiis* Cervici Uteri ad ulcerationem intrinsecam prohibendâ, & ne putrescant in ejectionem saniei, pessaria & sparallia in frequenti habet usu, quorum sequens est compositio.

℞. *Acies succorin.* 3j.

*Rad. Aristol. rotund.* 3ij.

*Terræ.*

*Terebinth. lotæ* q. l.

*F. Pessarum ad sufficientem longitudinem.*

℞. *Terebinth. lot.* 3vj.

*Albi graci* 3j.

*Cera* 3℔.

*Pulv. agrimon.*

*Consolid.*

*Pyrole* aa. q. l. pro incorporatione.

*Fiat Pessarum*, quod Rhagadia tegat, ultetiusque non procedat, nec sit Rhagadiorum loco brevis.

℞. *Mucilag. psyllii* 3j.

*Ol. Amygdalar. amar.* 3ij.

*Succi storum tassi* 3vj.

*Fiat Sparallium hoc modo*: Linteam ejusdem longitudinis, cujus Rhagadia fuerint, huic intinge liquori: postmodum indes in vulvam, in qua per tres horas maneat: his tranfactis iterum intingatur, indureturque.

Aliam adhuc descriptionem sequenti modo adjungit.

℞. *Succor. pyrol.*

*consolid.* aa. 3ij.

*stor. hypericon.*

*prunell.*

*centaureæ* aa. 3j.

*betonica* 3vj.

*Ol. anethin.* 3ij.

*Fiat Mixtura.*

Pulverem insuper adhibet sequentem. non modo Rhagadiis, sed ipsis etiam hæmorrhoidibus hujus partis accommodatum.

℞. *Munia* 3j.

*Lacca rubra* 3℔.

*Pulv. arantiarum.*

*3ii* aa. 3j.

*Chimolca* 3℔.

*Cachimia* 3v.

*Fiat Pulvis.*

*Verrucæ* Cervicis Uteri non aliter ac *Verrucæ* hæmorrhoidarum tractat, nempe vel dulcibus corrosivis, vel medicamentis stercoralibus. Corrosivum dulce est sequens.

℞. *Ol. laterin.* 3j.

*de Juniper.* 3℔.

*ex myrrâ* 5j.

*Misceantur.*

Corrosivum dulce mixtum cum aceto ita paratur,

℞. *Ol. laterin.* 3j.

*Aq. aluminos.* 3℔.

*Viridissus salis* ad pondus omnium.

*Fiat Mixtura.*

Cura de stercoribus sequenti modo peragitur.

℞. *Patientis dejectum stercus,*

*Misce cum oleo de vitellis ovorum.*

Premat patients, ut exeant verrucæ, iisque tunc medicina hæc superponatur.

§. 15. *Helmontium* curationem *Tentiginis* pro *Helmontii* causæ varietate variandam esse innuit, quæ fit, *siانا cura* quando spiritus ex arteriis ad cavernas Clitoridis *in Tentiginis* dirigente voluntate recipiuntur, quæ suscitatur per phantasiam libidinis in splene residentem, tunc suadet omnia Antivenerea, ut sunt succinum, agnus castus, virga cervi, veronica, lepus siccat. Quando autem à spiritus flatuosi mala dispositione, & retentione Clitoridem ita expandente, & Archeum uteri in furorem agente producit, curam consistere ait in tenui victu,

visu, ut ægra lactucam comedat & portulacam, dein portigendum suadet pulverem ex trochiscis de camphora, saccharo fi, semine viticis, radice nymphaeæ, & cataplasma adhibet refrigerans, vultque ut Clitoridis lacte papaveris sæpius foveatur.

**Cauda.** Si verò *Cauda* fuerit à laticis evasione exorta, omnia ea propinanda suadet, quæ laticis hunc effluxum sedant & corrigunt.

**Uteri Cervicis Angustia.** *Angustia* Cervicis Uteri si fuerit propter nativam dispositionem malam, tunc cum aliis auctoribus præter sectionem externam nulla commendat remedia, reliquas verò species emollientibus, lubricantibus & pëssis quibusdam spongiosis nonnullis corrigi posse opinatur.

**Procidencia.** In Cervicis Uteri *Procidencia* Archæum omnium primò placare studet per magisteria perlarum, succini, oculorum cancri, & similia, tum partem prolapsam repellit, & subadstringentibus, foris nempe ex decocto musci, pruni sylvestris, plantaginis, balusthorum eandem cohibet, ne denno prolabatur, siu Archeus nimium irritatus partem retrogredi non permittat, eundem pëssu ex assa fœtida eò dilponit, ut à furore cessans id, quod prolapsum est, in locum debitum diducat.

**Pustula.** Ad *Pustulas* Cervicis Uteri curandas commendat varia depurativa remedia, & omnia è sulphureparata, item Gata, Galia, aut pro re nata realgaria fixa.

**Condylomatus & Hemorrhoidibus.** *Condylomata* & *Hemorrhoides* Cervicis Uteri eodem modo, alani condylomata & hemorrhoides curanda vult, quarum curationem omnium optimè institui cenet per sui mortificationem extinctionemque totalem, attractu & impressione medici agentis & mortificantis sympathetici & magnetici, ut lumen lunare frigidum in eorum collectumq; unicumque per vitrum eas superadians, donec à frigore penetrarent suaviter, adeoque sicut in radice mortificetur, ut deinceps sua sponte evanescant. Commendat etiam in *Hemorrhoidibus* sudorem morientium Cervici Uteri applicandum. Secare tumores hosce strenuè prohibet. Dolorem hunc per amuleta sanari posse non dubitat.

**Ulcera.** *Ulcera* Cervicis Uteri curari ait eodem modo, ac aliarum partium ulcera, sed hic præprimis ablucionem fermenti corruptivi Cervicis Uteri remedijs cum internis arcanis, tum externis suadet instituendam. Ad Ulcerum ergo Cervicis Uteri sabrum & corruptorem enecandum præ alijs realgaria sua fixa summopere commendat. i. e. arsenicum vel auripigmentum primum per Gum fixata, dein ad  $\Delta$  adstringens edulcorata, & mitigata per repetitam ~us vini cohobationem, nec non colcothar  $\Phi$ li, vel terram ejus in  $\nabla$  communi solutam. & Cervici Uteri cum linteis duplicatis applicatam.

**Rhagadibus.** *Rhagadibus* Cervicis Uteri medullosa inniguit, inde pellistrigidior emolliatur, & dissoluta reduciuntur, quæ de causâ medullam cruris vituli in linimentum redactum, convenientis satius existimat esse remedium.

**Verrucis.** *Verrucas* etiam Uteri Cervicis ab affictione pulpe pomi per medium transiisti, & ad putrescendum postea in terram defossi, disparituras esse promittit.

**Villis cur.** §. 16. *Villis* ipsi *Tentigini* curandæ studet, Clitoridis sensum paululum obtundendo, ejus poros aperiendo, salia attenuando, illorum-

que exitum promovendo, quæ omnia obtinentur remedijs diaphoresin adjuvantibus narcoticis associatis. Lactis etiam & balneorum uium in tali affectu non improbat, quibus salium acrimonia mitigetur.

Quod *Cauda* curam spectat, illam pro more *Cauda* solito tractat, nec ab alijs Auctoribus in eâ tolerandâ differt.

Quum Uteri Cervicis *Angustia* à viscidiori tenaciorique nutritio liquore oritur, illi tenuiori fluxiliorique reddendo operam navat, quam metam assequitur diaphoreticis, & quibusdam ex eis volatilibus. Prioris ordinis sunt folia Imperatoris, Valerianæ, card. bened. radic. chinæ, petasitidis, contrayervæ, farsæparillæ, C. C. Philof. Gum diaphoret. bezoard. minerale.  $\Theta$ ablinthi, C. C. volatile. ~us C. C. &c. Ad humoris visciditatem corrigendam, illique fluiditatem comparandam, sequentem commendat mixturam.

$\mathcal{R}$ . *Aq. Card. bened.*  
*Flor. Sambuc.* aa.  $\mathfrak{z}$ ib.  
*Bezoard. miner.*  $\mathfrak{z}$ ib.  
 $\Theta$  volatile. C. C. gr. vj.  
~  $\Theta$   $\mathfrak{x}$ ci  $\mathfrak{z}$ ib.  
*Syrup. Sabios.*  $\mathfrak{z}$ vj.  
*M. Uatur coqueat.*

Uteri Cervicis *Prolapsus* medetur, fibras ejus corroborando & constringendo, spiritus volatiliores reddendo, quo fibras relaxatas facilius percutant, & serolitates partis relaxationem foventes exhauriendo. Hæc peragit cum internis, tum externis medicamentis. Internè volatilia quædam exhibet. qualia sunt  $\Theta$  volatile C. C. fuliginis, viperar. & ~us eorundem, quæ cephalicis adinfuseantur; v. gr. aquæ betonice, majoranæ, melissæ, lilicconvallium, ~ uieusdem, urin. cran. human. Externè lumbos innungit balsamo apoplectico, petroleo, &c. Si Uterus foras prodeat, illum fovet decocto ex folijs salviæ, rorismarini, organi, pulegii, lauri, quercus, florum balusthorum, rolar. rub. parato. Hisce non sufficientibus, pessarium aliquod, uterum magis coercens vaginæ ejusdem solet inferere.

*Pustulas* curat, statim venam secando, & dein sanguinem purificantia, visceraque corroborantia, præmissâ purgatione, propinando. Tale aut simile purgans exhibet.

$\mathcal{R}$ . *Sulphur.*  $\mathfrak{g}$ ij gr. vij.  
*Scamm.*  $\Delta$  v. gr. vj.  
*Cremor.*  $\mathfrak{z}$ ib.  
*M. F. Pulvis*, cum vehiculo exhibendus.

Hujusce verò aquæ usum maximè suadet.

$\mathcal{R}$ . *Summit. abiet.* M. vj.  
*Fol. fumar.*

*agrimon.*  
*elatin.*  
*hepatie.*  
*becabung.* aa. M. iiii.

*Rad. lapath. acut.* lbj.  
*Cort. sambuc.* Mij.

*exterior. vj. anranior.*

*Incisus & confusus affunde ferilactis cum cerevisiæ mediâ facti lbviij. Destil. organ. communi.*  
Sed in casum hæc administrarentur medicamina, si topicorum oblivisceremur, quare hoc unguento pustulæ sunt illinendæ, si ad partem ulque affectum ferri poterit.

℞. Flor.  $\frac{1}{2}$  lb.

Butyr. non salit.  $\frac{3}{4}$  lbj.

Zinzib. pulverisat.  $\frac{3}{4}$  lb.

M. F. *Linimentum*.

*Condyl. matu.*

*Condylomata* curat laticis serosi spissitudinem & crassitiem auferendo & corrigendo, quæ peragit attenuantibus, sanguinique majorem motum conciliantibus. Huic scopo magnopere infervit pulvis sequens.

℞. Rad. Contrajerv.

Serpentar. Virgin.

Petalsuid. aa.  $\frac{3}{4}$  lb.

Coccinell.

Crocicaa.  $\frac{3}{4}$  lb.

M. F. Pulvis, cujus dosi  $\frac{3}{4}$  lb. in vehiculo idoneo.

Pulvis etiam viperarum, extractum card. bened. Guajaci, —us baccar. sambuci, hederæ thieracalis camphoratus, &c. talibus affectibus profligandis opitulantur. Gummi Ammoniacum. Galbanum, emplastrum de meliloto applicari debent condylomatibus, si profundius in utero non fuerint posita.

*Hæmor. rhodibus.*

*Hæmorrhoidibus* auxiliatur, sanguinis motum augendo, ejusque particulas subtiliores reddendo; & laxiores valorum tunicas constringendo; ad hunc finem verò pervenit ope chalybeatorum. oculorum præparatorum, corallorum pp. cum admixtis diaphoreticis adhibitorum. Si *Hæmorrhoides* tumidiore existant, eas ferro, vel hirudinibus, magnâ tamen adhibita cautelâ, vult aperitendas.

*Plasribus.*

Si in *Ulcerebus* adsint carnes putridæ & superflue, ipsas unguento Ægyptiaco aufert, & deinceps illa curat mundificantibus ex apio, & centauro minore, & digestivo ex terebinthinâ Venetâ, vitello ovi dissoluta, oleo hyperici, myrrha & aloë confecto, illudque decocto ex radice gentianæ & aristolochiæ rotundâ, foliis abluithii & summitatibus hyperici lavando, & tandem ipsum ad consolidationem perducit adstringentium beneficio, cujus classis sunt pompholyx, rutia, plumbum ustum, cerussa, lapis calaminaris.

*Tumore.*

Sanguinem in *Tumore* collectum statim dissipare satagit, tum internis, tum externis medicamentis. Internè enim exhibet pulveres ex myrrha, mumia, oculis cancrorum præparatis, corallis pp. & abluithii, antimonio diaphoretico, &c. qui etiam in appropriatis vehiculis dilui possunt. Partem deinceps fovet decocto ex herbis chamomillæ Rom. niellillæ, hyssopi, pulegii, calamint hæ, cerefolii, foliis rorismarini, &c. Sed si sanguis extravasatus nec à venis refoberi, nec per poros evaporari queat, illud ad suppurationem deducit emplastrum diachylon magno cum gummi: abscissum postmodum aperit, & ulcus emplastro diapalmæ & digestivo communi consolidat. Partem per totum curæ tempus contra gangrænam municillam inungendo spiritui vini camphorato, aquæ calis vivæ associato. Solutio continui in pudendis facta, vel in difficiliore partu, vel à grandiori factu, ejus suavis balsamo Arcei, cui admiscetur guttæ aliquot balsami Peruviani aut Tolutani, refarcitur, ægrota constanter tranquillâ & in legitimo situ in lecto decubente.

*Rhagadibus.*

*Rhagades* sanat sanguinis diathesin acido-salinam mutando, serumque acre foras eliminando. Hoc ultimo officio funguntur acidulæ

chalybeatæ, serum lactis, & sequens purgatio.

℞. Rad. Oxylapath. sicc.

Polypod. querc. aa.  $\frac{3}{4}$  lb.

Fol. sen. 3x.

Pharbar.

Mechac. aa.  $\frac{3}{4}$  lb.

Santal. citrin.  $\frac{3}{4}$  lb.

Spic. Cetic.  $\frac{3}{4}$  lb.

Öil  $\frac{3}{4}$  lbj.

Ponantur in vitrum cum vini albi lbj. deinde in usum deprimantur, effundendo quotidie q. l. liquoris clarificati. Fissuras verò hoc limimento illinit.

℞. Ol. ovor.

Pingued. vervec. liquef. aa.  $\frac{3}{4}$  lb.

M. F. *Linimentum*.

Ad *Verrucas* profligandas in auxilium advocat omnia ea, quæ succi nutritii penû imminuere. ejusque remoram in partibus impedire valent. Ab euchymis ergò alimentis abstineri imperat, & sanguinis motum augentibus uti jubet. Verrucas verò hoc pulvere dissipat.

℞. Zuprecipitat. rub.  $\frac{3}{4}$  lb.

Alum. nsti.

Pulv. sabim. aa. gr. xv.

M. F. Pulvis verticis in profligandis.

§. 17. *Tentiginis* cura petagitur, juxta *Syl- sylvius ma-*  
vium, absumendo ac sopiendo spiritus animales *duo entan-*  
nimis circa Clitoridem se viantes. Spiritus ani- *di Tentig-*  
males absumuntur vigiliis perseverantibus, do- *nam.*  
loribus, inquietudine, ac animæ vexatione: & cum ipse Author statuat, à nihilo magis spiritus hos irrequietos reddi posse, quam à sale volatili acriori & quasi ab igne, sale putâ in glandulis Cervicis Uteri forsan hærente. ac ibidem acriori facti, & hinc per volatilem spiritum volatilifato, ac tandem accedente arterioso sanguinis igne majorem acrimoniam nacti, & sensim ad cerebrum elevato, & animalibus spiritibus conjuncto, atque illos in continuâ agitatione agente, & sic deliria excitante, quapropter acrimoniam istam spirituum correndam esse præcipit oleosis, emulsionibus hordei, seminum 4. frigidior. maj. & papaveris, & quandoque amygdalarum, vel, quod juxta ipsum præstat omnibus, Æ pacativo Oli neutiquam narcotico. Pro causâ ergò varietate feligenda esse diversa remedia sæpius præcipit.

*Angustia* verò Cervicis Uteri si fuerit à nativitate, ferro eam aperitendam esse jubet, ut & illam, quæ fit propter obductam membranam validam.

In *Nimia Dilationis* Cervicis Uteri curâ sedulam dat operam, ut causæ externæ nocentes vitentur, atque noxa in utero reptalaxitasque nimia corrigatur. Cavendum ergò imprimis esse vult ab usu vel abusu potius omnium aqueorum nimia copia assumendorum, à balneo nempe aque dulcis & fortibus similibus relaxantibus, cæterisque emollientibus. Utiurpanda è contra præcipit cum alimentis condimenta tum aromatica, tum blandè austera & adstringentia, sed grata. Commendat quoque fissus blandè adstringentes, quos præter fomentis, quæ tamen cum vino rubello, & adstringente, si parentur ex plantis adstringentibus, utiurpari quoque posse autumat. Talia sunt, quæ parantur ex radicibus histortæ, tormentillæ, caryophyllatæ, plantaginis, bellidis, equiseti, foliis quercus, myrti,

*Cervicis Uteri Angustiam.*

*Diffusio- nem nimiam.*

myrti, sorbi, mellepili, &c. floribus rosarum rubrarum, balauſtijs, baccis myrti, gallis, cortice granatorum, Nucce preſſi, terræ ſigillatæ omnes, alumen rupeum, &c. Suſtitus etiam parat ex malliche, thure, roſis ſiccis. Commendat ſimiliter internè medicamenta leniter adſtringentia, & quidem quantitate parua, & vicibus repetitis; juxta ipſum enim, ſi aſſumantur medicamenta blandè adſtringentia, tota ſanguinis maſſa reddetur paulatim caſſior firmiorque, ipſeque adeo uterus conſiſtentiam acquirat humoremque denſiorem.

Puffula.

*Puffularum* Cervicis Uteri cura abſolvitur juxta ipſum iſdem remedijs, quæ in lue Venereâ conducunt, & decoctis nempe tam ſudoriferis, quàm evacuationibus mercurialibus, ac imprimis ſalivatione ritè inſtituta, ſiſ enim convenienter adminiſtratis puſtulis hæcè ſpontè celluſitas eſſe exiſtimat, quas etiam puſtulas, ut cura ſeſumetur, decocto Guajaci aliorumque lignorum ſoveri vult, quibus non proficientibus, *Θ* volatile cupri tinctura imbutum laudat, tanquam arcanum, nec non *Σ*um præcipitatum unguento diapomij hollygos adjuñctum & puſtulis applicatum.

Gonorrhœa.

Cura *Gonorrhœæ* muliebri pudendo in-exiſtentium, præter luis Venereæ curam univerſalem, per medicamenta illis applicata *Σ*alia acriora ipſa conſumentia, cæterosque ſpiritus acidos *Θ*-li, *Σ*is, *Ω*ti, &c. quorum ſpirituum gutta una vel altera tangantur verrucæ, & quidem toties, donec corroſæ ſint & ſiccæ decendant.

R. Aq. plantag.

Rofar. aa ſſb.

O. crudi.

*Σ*is ſuſcit. mat. aa. ʒi.

Miſta in vitro decocta & poſt ſubſidentiam effuſa luteo parti affectæ applicentur.

Hamorrhoides.

In *Hamorrhoidibus* fluxu nimio ſummise vehit laudibus mixturam ſolennem ſequentem cochlearum exhibebant.

R. Aq. Plantag. ʒij.

Cinnamon.

ʒiſſi. aa. ʒſb.

Diſcord. ʒij.

Ocul. *Σ*. pp. ʒb.*Σ*is diapom. ʒj.*Σ*yr. roſ. ruv. ʒj.

M.

Cui conditi forma eſt gratior, et ſequens præſcribitur.

R. Conf. roſ. rml. ʒij.

Diſcord. Frac. ʒib.

Conf. *Σ*. Hyacinth. ʒj.

C. C. uſt. &amp; pp. ʒb.

*Σ*yr. myrrh. q. ſ.

M. F. Condum, de quo aſſumat ægra aliquoties it. die ad nucis inſoſchata quantitatem.

In *Hamorrhoidibus* verò cæcis commendat aperientia, pituitam incidentia ac Matutina hinc inde ad nauſeam jux præſcripta.

Vleera.

*Ulcera* Cervicis Uteri cura convenit cum curatione luis Venereæ, quia uſplurimum ipſius ſunt ſymptomata. quare univerſali luis curæ ipſa ſimul curari & tolli ſtatuit, tum eâ, quæ per decocta ſudorifera, tum eâ, quæ per ſalivationem cæterasque vacuationes ſales abſolvitur. Ea verò etiam decocto Guajaci aliarumque radicum & herbarum aromaticarum potentum abſi ac mundari poſſe ſcribit, tangique vultuſe volatili liquido & cupri tinctura imbuto. Unguentis

etiam admiſcet *Σ*um tum præcipitatum, tum ſublimatum, ac præteritum dulcem, concludit dein conſolidantibus. Ad *Ulcera* verò hæc tam mundanda, quàm conſolidanda, præ alius Anthor commendat balſamum *Σ*is vel aniſatum gratiorem, vel ſuccinum potentiorum, ad guttas duas vel plures in miſtura vel decocto aliquoties in die ſumendum.

*Rbagadam* cura conſiſtit in acrimonia humorum temperanda ac corrigenda, in quem finem commendat oleoſa plura, oleum ipſum, lac quodvis, & alia acidum concentrantia, ut cretam, *Θ*-li, corallia, thutiam, maſtichen, &c. thagabibus perquam uſula, aliaque cataplaſmata hinc indeſam commendata.

*Verrucæ* Vaginæ Uteri curantur ab ipſo, imprimis ſi lues conjuncta eſt. cura univerſali, dein per externa applicata *Σ*alia acriora, & iſas verrucas conſumentia, aliaque acida oppoſita, ut ſunt ſpiritus acidi *Θ*-li, *Σ*is, *Ω*ti, &c. quorum ſpirituum gutta una vel altera tangantur verrucæ, & quidem toties, donec corroſæ ſint & ſiccæ decendant.

ſ. 18. *Carteſiani* curationem *Teniginis* dextrè abſoluturi, morbi hujus gradus ſtudioſa pervolvunt mente, atque ex diuturniori ſpirituum in tuſulis mentula hujus mulieribus detentione productam marſepiam iſam cauteſolventem emollientibus fibras, & dilatantibus poros, ut hac ratione ſpirituum compæ diſpergantur & ventantur inſingam per conciliatam exhalationem, quod commode peragi poſſe obſervant ſotu aliquo inchoati ex lacte calido, quo luteum imbutum, & ſeti hinc limitates egreſſuræ admoveatur, vel decocto quodam ſtœm lambuci, nymphaeæ, corticum ſabaram, herbe ſolani, cui parum additum ſit de camphora, vel terra ſigillata cum camphora, mediante ſpiritu vini unitis paratum parti huic inungunt, ut ſpicule illæ igneæ promptius eſciantur. In ſurore Venereo concitatus æſtum hunc aliquando ſedari & intumeſcentiam imminui poſſe aſſerunt, advocatis ſpirituibus aliorum per ſubitum quendam terrorem, & aſuſione aquæ frigide ex improviſo in Cervicem & ſinum, modo & hinc ne quid agatur nimis, nec totalis liquoris nervoſi circuitus inhibeatur. Reddita denique parte hac ex frequentiori ſpirituum aliorumque liquorum, imprimis chyloſi nutritii, ſæpe libidinoloſa quâdam penſantia promotæ, influxu tam vaſtâ, ut pudoris in ſinu ulterius nequeat tegi; ſed ipſum etiam inceſſum reddat moleſtiorem, ab antiquioribus jam monſtrantem reſectio-nem concedunt inſtituendum, ut abſecta ſic corporis parte ſuperflua, reſiduum ab onere importuno liberetur.

Hoc quoque corrigunt conſilium in *Candâ*, *Candam*, ut portio uteri extra collum propendens, & non adeo magna, diſcutientibus ad formam redigatur decentiorem, vel ſi fibrae ab humorum influxu reditæ ſint laxiores, decocto roſarum, balauſtorum, ſoliorum quercûs, gallarum & aluminis eam aliquoties abluunt mediante ſyringâ; majorem caudam pulveribus cauſticis ex alumine uſto, vitriolo uſto, vel etiam ſublimato aut unguento *Ægyptiaco* per caulem quendam plumbeum aut ſtanneum adhibitis, ne cæteri tangantur facies, abluunt, vel partem ſuperfluan ſoligant, ut ulterius ei nutrimentum deneg-

negetur, & portio flaccescens decidat; aut partem pericula prehensam cultro apto abscindunt, & residuo pulverem ex myrrha, mastiche, aloë, calce viva, & oleo usto adspargunt.

*Cervicis  
Viri An-  
gustiam.*

*Angustiam* Cervicis Uteri leviori in solo digito aliquando corrigi & dilatari posse promittunt, eoque facilius, si oleo prius fuerit intinctus: vel etiam congressu cum viro, sed legitimo & non violento. Ubi partes sunt duriores, & dilatacionem hanc non admittunt, easdem emollientibus foveat ex decocto malvæ, althææ, artemisiæ, feminis lini, & postea pellum velturandam insinuant ex radice gentianæ, vel spongia atq; ligata, ut ita sensim dilatetur. Orificio existente angustiore, digito in ronsillo illud dilacerant, & postea vel solum ovorum oleum, vel unguentum digestivum commune illinunt, aut in hæmorrhagiæ majori pulverem ex thure, bolo armeno, sanguine draconis, mastiche aliisque inspergunt. *Membranam* qua orificium obducitur, decussatim incidunt, & canalem plumbeum linimento cicatrificante obductum tandiu iudunt, donec omnia sint consolidata. Totalem vaginæ defectum, ubi nullum cavitatis adeit vestigium, nulla arte sciunt emendare.

*Vagina  
Proceden-  
tiam.*

*Vagina Procedentiam* curant partem prolapsam in litum convenientem reponendo, & in eodem studiose conservando. Repositionem peragunt muliere in dorsum supina recubante, cruribus distensis & genibus sursum attractis, candela cerea portionem dependentem reprimendo, quod ut facilius voto respondeat, candellam oleo hyperici illinunt, & de hinc adspargunt. Intra partem ipsam candellam, per tempus aliquod in cavitate permittunt, ut ita relapsus prohibeantur, & ut candela commode rursus extrahatur: alteram ejus extremitatem filo alligant, quod extra vaginam propendeat. Parte sic reposita, eam vinculis, pulvinulis compressimentibus, spongiis & emplastro de mastiche, de pelle arietinâ, vel sequenti, ut in situ remaneat, obfirmant.

*℞. Pic. Juiij.*

*Resin. Jij.*

*Baccar. lauri ʒb.*

*Coloc. ʒiij.*

*Gallar. ʒib.*

*Ol. myrsinor. q. l.*

*M. F. Emplastrum.*

*Agram* interea quietam degere volunt, atque à tussi, clamore, incessu frequentiori, conatu validiori in excernendis fecybalis intestinorum penitus abstinere, quâ de causa jubent, ut per octiduum ægra quæta degat in lecto, & ad duoriem alvum solvendum utatur clystere emolliente. Pileolum etiam eburneum debita magnitudine ad detinendam partem prolapsam suadent adhibendum, in superiore parte foraminosum, in parte vero inferiore margine dotatum, per quem vincula tracta sint, quibus dorso alligetur, ut sic urina cum menstruis transfluere possint, & pileolus hic nihilominus firmus permaneat, quem externâ etiam in parte emplastro quodam adstringente obducunt.

*Pustulas.*

*Pustulas* Cervicis Uteri abigere student præmissis internis purgantibus, particulas acutas absorbentibus & eliminantibus, ex oleo dulci, cum confectioe Hamech, nec non similibus diaphoreticis, & quæ ex oleo & lignis comparantur, & pustulas ipsas ablucendo aquâ calcis vivæ,

cum spiritu florum sambuci & camphoræ, vel decocto plantag. flor sambuci, ligni salsatras, olibani & lapidis calaminaris, cui nonnunquam aliquid colcotharis, aut florum ʒis addant. Decoctum quoque farinæ lupinorum in cerevisiâ secundariâ factum, in pustulis hisce salutare existere asserunt, quod præstantius redditur, si myrrha in eo fuerit dissoluta.

In *Condylomatibus* sudorifera magno habent in usu, ut succi superflui iisdem abluantur, tum externa abfumentia inspergant, ut pulverem ex alumine usto, argine, sabina, ʒio rubro, ʒio crudo, terra ʒli dulci, lapide calaminari, quos cum terebinthina & butyro etiam in unguentum redigunt, illudque tuberculis hisce illinunt.

*Hæmorrhoides* Cervicis Uteri nimium fluentes sistunt venæ sectione in brachio instituta, & post hæc remediis internis particulas acutas absorbentibus, & sanguinis fluxum immutentibus, qualia sunt Conserva balustiorum, tormenitillæ, rob. de cornis, bolus Armenus, succinum album pp. semen limach, sanguis draconis, corallia rub. pp. lapis hæmatites præparatus; liquor aureus, decoctum ad hæmorrhagiam uteri *Myrsinor. fubici*. Topica quoque adhibent ex C. C. usto, mastiche, olibano, aloë, cum terra sigillata, vel bolo Armeno, & aqua folior. quercus in linimentum redactis: vel loco aquæ adhibito oleo myrtino, vel cydoniorum. In *Hæmorrhoidibus* vicinæ hujus quæ, tumebantibus & dolentibus purgationem approbant, & sudorifera commendant, tum topica anodyna adhibent, emollientia & discutientia, ex albumine ovi, unguento populeonis, oleo rosarum, axungia anatis, anguillæ; vel radicem scrofulariæ coquunt in butyro infusio donec in mortario lapideo contundi, & in linimentum redigi possit; addito vitello ovi & paucis croci, illudque inungunt. Interdum unimentis istis pulveres adnucunt ex cerussa, lithargyrio, alumine, restis concharum fluviatilium usts, lapide scissili, thure & ejusmodi aliis.

*Ulcera* Cervicis Uteri sanare tentant Galibus rum purgantibus, tum sudoriferis, aliisque ex lignis paratis remediis iustis exhibitis, sæpiusque tincturam tartari satam, & myrrhæ ordinariæ potius instillant. *Ulcera* ipsa detergent aqua mercuriali, spiritu vini camphorato, infuso thuris, aloes, camphoræ & sublimati in spiritu vini facti, ut hisce mediantibus a particulis purulentis destructivis emundentur, quo impetrato residuas particulas acutangulas absorbent porosis ex lithargyrio, tutia, cerussa, lapide calaminari, terra vitrioli dulci, mastiche, myrrhâ, terebinthina, unguento diaphompholygos, linimento ex ebore usto, plumbo in aqua trito, & myrrhâ mediante aqua calcis vivæ parato, quibus optime carne plenitur & consolidantur.

*Rhagades* complanare student rum mucilaginosas fibras rigidiores emollientibus, rum porosis particulis angulares absorbentibus, præmisso sudorifero ex lignis, quapropter linimentum adhibent ex sevo cervino: thutia præparata, camphora, saccharo ʒi & oleo ovorum.

*Verrucas* Cervicis Uteri minores interdum attingunt butyro ʒii, oleo sulphuris, vel ʒio sublimato; longiori collo præditas costructione fili aut resectione cultelli auferunt, & unguento



guento de thutia particulas acutas absorbent & cicatricem conciliant.

*§. 19. Nostali utrim apparatu. In Curatione*  
*Mentula seu Tentiginis* non statim ad sectionem accedimus, ut plures incaute faciunt, sed potius remediis convenientibus eandem, quantum possibile, auferre tentamus. Si affectus fuerit convulsivus, conducunt omnia antispasmodica, ut sunt Cinnabarina, castoreata, succinatu, Camphorata, non quod Camphorata Venerem extinguant. nti Veteres somniant, sed ad tetanum abigendum, omnem enim obstructionem in nervis factam tollunt: pulv. spasinodicus n.d. item Cephal. Mich. ~ eboris, C. C. ligni aloes, liq. C. C. succ. h. succin. castor. ~ si Thiliz, ~ \* ci anthoslat. lavendulat. &c. Suntu formulæ in Juniorum gratiam sequentes.

\* Crystall. ppt. 3i.  
 Dent. hippopotam. ph. ppt. 3ß.  
 Cinab. 3ss gr. xvj.  
 Succin. volar. gr. vj.  
 Camphor. gr. iv.

M. F. Pulv. cui semula impressio adhuc insill.

Ol. dest. rita gr. iij.

Cinnoi. gr. j.

M. F. Pulv. cupiditatem ac per vices capientes,

Vel:

\* Scabios. 3ß.  
 Card. bened. 3j.  
 ~ st. bil. 3ß.  
 Ebor. ph. ppt. 3ß.  
 Unicorn. fossil. gr. xvj.  
 Cinab. 3ss gr. iv.  
 Sp. pæon. 3vj.  
 M. D. Cochlearium.

Externa etiam egregiam afferunt operam, ut spir. matricialis, ~ vini Camphorat. Elixir vitæ, Δ Calcis vivæ, ∇ Regii. Hungar. ~ \* cum Camphora & tepide applicata vel injecta, Simulium verò fuerit à nativitate vel à laxitate vasorum, decocta injiciantur modice astringentia.

Aliquando & aliæ carnez excrecentiæ de pudendo muliebri nascuntur, uti hoc morbo affectæ fœminæ, contra quam fit in *Tentiginel* laborantibus, horrent coitum, eumque præ dolore ferre nequeunt, quæ caro luxurians tutius excindi potest, sinempe hyperfasciosis notetur & propendeat, quæ sectio fit vel filoserico vel equino, vel ferro, semper tamen medicamenta fortiter exsiccantia, ut ~ calcis vivæ, ~ matricialis, &c. præmittenda, si his non cedant, ad fortiora accedere debemus, ubi enim medicamenta non sanant, ferrum sæpe sanare debet.

*in Canda.* Canda est caro spongiosa, quæ vel corrosivis, vel fortiter exsiccantibus tolli debet, ut sunt calx viva, & ejus spiritus, pōmphylox, Tutia, aloë, mastix, succinum, & ex his paratus ~ matricialis, crystalli, mandibulæ lucci, alumen ustum, terra Japon. in formâ pulverum imposita, vel in forma epithematis, vel instar linimenti. Inter composita excellunt unguentum Egyptiacum nostrum correctum & ad duritiem prius coctum, Elixir vitæ, inò sæpe etiam ad acidos corrosivos confugiendum est spiritus, ut ~ Oli, Elis, Δ, &c. Calcis vivæ, cum q. dulci ma-

ritata optimè conducet, imprimis si huic affectui conjuncta fuerit lues Venerea, Mercurialia enim quascunque visciditates acidas absorbendo attenuant.

Quoad nimiam Angustiam Cervicis Uteri, *Cervicis* hæc subinde repetito negotio conjugali solet sanari, sin minus id fiat, per speculum matricis dilatanda venit, si verò fuerit penitus occlusa, methodo Chirurgicâ curatur. Et, si vagina uteri forsitan coalescat, post excoriationem aut exulcerationem, vel à nativitate, difficile, inò plane impossibile est eam citra sectionem curare, quæ cura & sæpe dubia est. Si membrana pudendi orificio vel collo Cervicis annata pudendi fores claudat, institutur sectio, dein applicetur pessarium ex plumbo per triduum, vel applicetur cum linteis duplicatis liquor noster divinus, ne coalescant partes disjunctæ, seu labia: Si post exulcerationem pudendi labia coaluerint, sectio quoque tunc institui potest. Sin verò profundiores partes coaluerint, non absque periculo ejusmodi sectiones instituantur. Si verò pudendum à tumore quodam duro claudatur, tumor ille resolventibus blandis discutiendus, siab excrecentiâ, ea etiam prius tollatur exsiccantibus ita dictis remediis, ut sunt myrrha, aloë, alumen ustum, Martialia, olibanum, aristoloch. flor. ros. sic. balauft &c. vel excompositis ~ matricialis, ~ calcis vivæ, Elixir vitæ, spir. vini Camphor &c. Si verò his tolli nequit, superfluum idoneo instrumento abscindatur, & lege artis consolidetur.

Si nimis patula & relaxata sit vagina, seu cervix uteri, ope balnearum, infusuum, aut infusionum adstringentium aluminosorum aliquando curatur: hinc sequens conducet pro infusiu.

\* Rad. consol. maj.  
 biflori. aa. 3j.  
 Cor. granat. 3ß.  
 Fl. balauft.  
 Fl. quercus.  
 Plantag. aa. Mj.  
 Terr. Hassiac. noster. 3j.  
 Coq. in Aq. simpl. q. l. pro infusiu.

Vel liquor noster ex terra Hassiaca, ex alumine & vitriolo constans, quadruplicatis linteis exceptis calidè imponatur sæpius, hinc enim constringuntur omnia vasa accorugantur. Alii parant ex sîndone rubro sacculos aut pessos coctos in vino rubro pudendo infundendos, Nonnulli frustum aluminis oblongum Vulvæ intrandi jubent, plures Spongiam aceto imbutam applicandam suadent, sed in hisce cautè incedendum, ne ejusmodi acidis noxam partibus hisce membranosis valde sensibilibus intexas. Oleum momordicæ & hic conducit.

*Pustula* Cervicis Uteri, quæ sæpe à lue Venerea ortum habent, curantur diaphoreticis, aliisque remediis sui huic dicatis; conveniunt ergo decocta lignorum, omnia volatilia, item Qlia, quæ acidum hoc morbosum valde domant, in quem finem instituitur sæpe sudor sequenti vel simili remedio.

\* ∇ samar. 3ß.  
 fl. sambuc. 3ß.  
 ~ marical.  
 R 3ss ∇ sar. aa. 3ß.  
 K k k

Beccard,

Beccard. *Med. gr.* iij.

*Syr. fum.* 3ij.

*Misc.*

Potest etiam mixtura diaphoretica per vices & cochleariatum.

℞. *Card.* bened.

*enul.* aa. 3ij.

*Essent. fumar.*

*enul.* aa. 3ij.

*viperar.* 3j.

*Specif. uterin.* n. d. 3j.

*Syr. card.* bened. 3j.

*Misc.*

Sic etiam potui ordinario indi possunt herbæ scabios. fumar. Enul. Saponar. phleg. Rad. bryon. enul. caryophyllat. 3j. crud. vel essent. lignorum, viperarum, vel R. Corallor. cum matricali parata, ad 40. guttas potui instillari possunt. Pustulæ enim hæc non aliter, ac lues gallica, curari debent.

Externæ mixtura ex  $\nabla$  calcis vivæ, plantagin. cum matricali, & dule & Camphora erit instar omnium, vel sequens, quo plures ejusmodi curavimus pustulas virulentas.

℞. *Ol. Sambucin.* 3j.

*Sal. hui* 3ij.

*Camphor.* 3ij.

*Misc. f. Linimentum*, quo imbuta lintea intrudantur vaginæ seu Cervici Uteri, vel decoctum calcis vivæ cum Oleo hui, vel in formâ lotus calidè putulus imponendi.

℞. *Pulv. myrrh.*

*oliban.* aa. 3ij.

$\nabla$  *fl. sambuc.* 3ij.

*Plantagin.*

*Sperm. ranar.* aa. 3ij.

$\Theta$  *hui* 3ij.

*El. diascod.* 3ij.

*Misc.*

& imponatur tumoribus pudendi, vel injiciatur ipsi Cervici Uteri pustulis obfesse.

Vel: ℞. *Ol.*  $\zeta$ . per deliq. cum oleo amygd. dule. permixtum, applicetur, vel decoctum aliquod ex herbis resolutentibus, cui addatur Sal hui, & momentum præcipitati, Camphoræque.

Condylomati.

Cura Condylomatum Uteri Cervicis in eo consistit, ut stagnatio succorum in Cervice Uteri coagulatorum ac collectorum impediatur, quod tum internis, tum externis remediis obtineri potest. Inter interna commendamus varia diaphoretica, stagnationem succorum præ aliis tollentia, inter quæ & varia incidentia eminent, ut sunt matricali. Elixir vitæ, Essent. Nicotian. anthos, essent. enul. fabatiz, meliss. cort. citri; Elix. propr. sine acido spir. Oli  $\sigma$ . pulv. res absorbentes ac incidentes Græci interponendi sunt, non neglectis uterinis & Oleo volatili gaudentibus medicamentis, herbæ ac radices aromaticæ hic quorunque modo convenient. Inter externa conducunt quosque varia tumoribus aliis & quidem induratis convenientia, præ aliis proderit fons ex enollentibus herb. linar. fl. sambuc. chamomill. verbasci, Sem. lini, fœnugræc. &c. adjectis  $\Theta$  \*,  $\zeta$ . &c. institutus. Pro sunt etiam varia linimenta in hæmorrhoidibus cæcis jam dicta, pluresque commendant pulv. testar. cochlear. nostrâ verò experientia lapidis scissilis Anglicus vel Islandicus formâ pulveris vel liquore nostro volatili vel spir. matricali

exceptus calidè super tumoribus his imponatur. Cl. D. Michaelis ex pomo insân. N. j. in minutas partes confuso, addito oleo capparum cocto ad exsiccationem, & vitrid. ær. 3j. c. f. q. ceræ parat unguentum. Emplastrum quoque de Labdano cum oleo lini in formâ linimenti egregium est. Sectionem hic ab Aetio aliisque antiquis commendatam non admittimus, sed potius dissuademus. Lintea aquâ Regiæ Hungariæ additâ camphorâ imbuta apponantur, vel aqua calcis viv. spir. vin. camph. fl. sambuc.  $\Theta$  \* cum calce vivâ paratus, quæ remedia in curandis his condylomatibus egregia sunt.

Hæmorrhoidib.

Curam Hæmorrhoidis Uteri aliam exposcunt cæcæ aliam fluentes, cæcæ & multo sanguinetur, gentes curantur fots ex flor. chamomill. verbasci, herbis linaræ, fabar, vel cataplasmate ex herbis emollientibus malv. alth. parietar. ebul. fl. nymph. chamomill. farinâ hordei, cum lacte parato, vel linimento ex oleo lini verbasci; 7. florum *Myns.* Mitigato dolore. ad exsiccantia remedia accedendum, Sal hui aloën, mastich. & ex his paratum spiritum matricalem, vel spir. vinicamphoratum, &c. Saepè etiam his nihil proficientibus fricentur foliis ficus aut parietaræ. Alii tubercula hæc hæmorrhoidalia saliva illius tollunt. Sic quoque Celeberr. D. *Widellus*, Amicus noster singularis, fabariam de collo suspendere jubet, & quidem cum effectu. Onisci in oleo lini macerati vel insulioleum consueunt anodynum, Specificum contra hunc dolorem hæmorrhoidalem, quem etiam optime curat. Oleum Scarabæorum singularissimum habetur anodynum in doloribus hæmorrhoidalibus cæcis.

In fluentibus verò hæmorrhoidibus Cervicis Uteri, quicquid nimium sanguinis fluxum comitem, habent, fluxus iste ante omnia sistendus est tum internis, tum externis remediis.

Inter interna præ aliis hic commendamus R. Acris, Oli  $\sigma$ , vel R. terr. nostræ Hassiac. vel corallor. cum cerâ paratum, vel terr. Japon. cum spir. matricali paratum, & omnia ea, quæ in nimio Mensium fluxu laudavimus hic proiunt, imprimis sequens:

℞. *Rad. filipendal.*

*Tormentill.*

*Rub. Tinct.*

*Liquirit.* aa. 3ij.

*Herb. menth.*

*Caryophyll.*

*Veronic.*

*Heder. terr.* aa. Mß.

*Fl. bellid.*

*Hyperic.* aa. ʒij.

*Ocul. ss. crud.* 3ij.

*Cog. in Ag. commun.* Colat. ʒij.

add. *Syr. veron. heder. terr.* aa. 3j.

Dentur 3ij. pro una vice.

Inter externa aliis palmam præcipiunt liquor noster stipticus, vel aqua nostræ stiptica, vel liquor terr. Hassiac. per deliquum in cella paratus & tepidè applicatus, vel solutio terræ Oli Martialis, cum linteis quadruplicatis impositus, vel ol. momordicæ, imo sufficit ulquando spir. vini tepidè applicatus Proderunt quoque omnia ea, quæ capite de hæmorrhagiâ prolixius commendavimus, quæ hic repetere non libet.

Ad Procidetiam Cervicis seu potius Pro. Procidetiam lapsus suus pudoris, cutis anguilla ele. tina. gaus habetur remedium, ubi suffitus inde

inde instituat, quo D. Michael felicissimè usus est. Conveniunt verò omnia remedia, quæ atulimus in procidentia uteri, & ani: instituat ergo ante omnia suffusus ex asphalto, mastiche, olibano, &c. spir. matricis cum camphora sæpius valide applicatus in prolapsu vaginæ uteri maximè prodest. item linteum coeruleum madescat in aqua culinari tepide imponatur cervici uteri. Sic & hic ligamenta cum globulis ex cera vel corio confectis nō contemnenda sunt, vel pomū amoris in oleo hyperic. pos. & applicat. conducit. Imprimis in inveteratis procidentis: fatus adstringentes hoc in casu haud negligendi sunt, de quibus alibi ad nauseam diximus, affectus enim hic non aliter curatur, quàm procidentia uteri vel ani. Huic supra dictum oleum mormordicæ elegans erit remedium. Excrecentiæ verò nunc rugosa, nunc carnosæ extra vaginam uterinam enatæ prolapsum uteri mentientes abscessione curatæ sunt, vide *Kerkring.* de vaginæ uteri extensione nimia, & confer *Sialpart.* 296.

Ulcera.

Si *Ulcus* vaginæ uteri fuerit contractum ex reiterato coitu cum maribus lue præ inquinatis, & simul adiit tam prostarum glandularum, quàm vaginæ uterinæ exulceratio, quæ saniem cum insigni dolore, & molestia stillat, ob plures laceratos tubulos succos suos, imprimis nutritum effundentes: curatur hoc ulcus eodem modo, ac gonorrhæa maligna virorum, terebinthinatis & remediis ex lignis, spir. matric. cum resina Guajacæ assilaftras, &c. Inveterata verò non aliter sanabis, quàm ut ipsam luem Veneream tuum per purgantia, Confect. Hamech. &c. dulc. &c. tum per sudorifera spiritibus spiritum Matricalem, Lumbricorum, assilaftras, guajac. & Decoct. Antivenereum nostrum experientia probatissimum.

Inter topica præstat aliis sequens linimentum, quod turundis illitum intrudunt in vaginam uterinam, ut mortificetur ulcus jam productum: vel utere sequenti remedio topico.

℞. *Cal. viv.* lbj.

*Elix. vite* ʒij.

M.

quo eluantur partes exulceratæ.

Vel:

℞. *vin. Camph.* ʒiv.

*Oliban. pulv.* ʒj.

Θ *ʒij.* ʒij.

*O. nst.* ʒj.

*M. sc.* & calidè applicetur.

Vel:

℞. *Ol. hyperic.*

*Sambuc.* aa. ʒij.

▽ *cal. viv.* q. f. Redigantur l. a. per agitationem in fornacem nutriti, quod calidè immittatur ulceri Cervicis Uteri: matricis & hic quoque convenit. Varia itidem decocta ex vegetabilibus parata injici possunt. Theriac quoque in ulceribus hisce inveteratis ac fistulis imprimis efficaces præ optima sunt, tum etiam artificiales, ex similibus paratæ munitur.

Si ulcus fuerit productum à secundinâ putrescente, Elixir propr. sine acido paratum prodest, item ~ matricis ad 6. guttas in ▽ pulegii, meliss. vel arthemiss. &c. sæpius propinatus. Conveniunt quoque suffusus ex gummi hæderæ, Juniperi, Thure, mastiche, myrrha, Labdano,

quibus, si sc. à morbo Gallico ulcus sit, addatur Cinnabaris nativæ vel ʒijii momentum. Huc quadrat sequens casus: Susanna de Fontfroide, uxor pharmacopolæ Nemausensis, 50. annis major, quæ per 15. annos ulcus uteri cum omnium ægritudinis istius Symptomatum syndrome sustinuerat, atrocibus tandem alvi & coccygis doloribus correpta est, quæ per trium aut circiter hebdomadarum spatium noctesque diesque sævientes, deliria, convulsiones, ileumque excitarunt. His sedatis duodecim aut tredecim ossa parvula quidem, verum integra & rectè conformata cum biliosis alvi detectionibus excrevit. Horum figura peculiaris in nullis unquam bipedum quadrupedumque ossibus visa fuit, ne suspicari contigisset ab ægro tante deglutita esse. Desinunt ead. averæ aperto, prædictum uteri ulcus callo obductum inventum est. Abscessus autem steatomatis indolem redolens, uterum inter & rectum intestinum adfuit, sanis interius & inculpatis visceribus donata nullam in partibus carnis offeise lationem præbuit.

*Rhagadarum* cura est pro causæ diversitate varia, si enim vel à coitu violento, vel partu laborioso sint pronatæ, clystere uterino utatur ægra ex decocto aristolochiæ, plantag. cum olibano & terra japonica. Si pruritus vel dolor conjunctus sit, conducet ungu. anodynum ex mucilag. sem. psyll. cydon. malv. cum butyro majali, vel:

℞. *Ungu. diapompholyg.*

*Populeon.*

*Anodyneæ.* ʒiij.

Θ *ʒij.* ʒij.

℞. *dulc.*

*Camphor.* aa. ʒß.

*M. sc.*

Vel:

℞. *vin. Camph.* ʒij.

*Sacch.* ʒij.

*Elix. vite* ʒij.

M.

vel: ~ matric. cum camphora adhibeatur. Ex variis decoctis mundificantiis possunt etiam fieri injectiones in Cervicem Uteri.

*Verrucarum vaginæ Uteri* cura consistit in *Verrucarum* earum ablutione, in quem finem conducunt omnia remedia, quæ potenter exsiccant discutuntque, ut sunt origanum, ruta, scordium, sabina, thus, aloë, Mastix, Thurix cortex, imprimis verò ex his compositis ac cum spir. vini destillatus, spir. matricis, exuvie serpentum cum caricis mixtæ, & applicatæ pro specifico hujus mali habentur. His nihil juvantibus ad potentiora, erodentia nempe accedendum est, ex quibus hoc in casu commendantur succi bryoniæ, cucum. agrestis, elulæ, stercore ovillum & fel hircinum cum Mro. Alii ad acida fortissima transcendendum esse jubent, sed cautè hisce incedendum esse auctor sum. Secutum ac tutum verò remedium est ad abluendas exc. escencias quascumque, liquor noster Gum in ʒ commutans, constans acido nitroso & Galico subtili. Remediis istis nihil proficientibus verrucæ hæ ferro extirpandæ sunt volsellâ scil. vel forcipe, at dein pulvis sanguinem sistens vel liquor noster stipticus imponendus, & vulnus debito modo curandum. Rarisimè vel nunquam formæ

Kkk 2

puclitiâ

pulicitia instructæ hoc in casu admittunt Chirur-  
gum, ea propter negotium hoc mulieribus  
obstetricibus committendum est. Verrucæ mas-  
gis foras propendentes & pensiles pilo equino-  
vel filo sericeo deligendæ veniunt, singulis diebus  
constringendo ut deficiente tandem nutrimento  
plane decident. Vel sæpius applicetur ~ vin.  
Camph. ~ ☉ \*ci cum calce viva destillatus,

Elix. vitæ, ~ matric. ol. ☿ per deliq. & c. quod  
si propter loci profunditatem hoc obtineri ne-  
quit, toris marini vel origani caulibus accenden-  
dus & verrucis admoventus, vel caule ignito  
sæpius tangendæ sunt. Si nec hoc modo abigi  
possint, ad ferrum candens pergendum, quo  
verrucæ istæ, donec exsiccatæ decident aut  
evanescant, aliquoties sunt adurendæ.

## CAPUT V.

*De Uteri Inflammatione, Scirrho, Sphacelo, Ulcere, Vulnere, Di-  
laceratione post partum difficilem, & Fœtus mortui*

Extractione.

## §. I.

**Q**uid est homo? folium caducum, ait  
*Homerus*. Quid est homo? Imbecilli-  
tatis exemplum, temporis spoliū, lu-  
sus fortunæ, mutationis imago, invidiæ & ca-  
lamitatis trutina. Ita sanè est.

*Bulla sumus, levis umbra sumus, lususque  
Deorum.*

Nascimur & morimur, quin igno nascentes  
morimur. Nobis qui viri sumus, quique  
nescio quibus sexus nostri prerogativis ac doti-  
bus ingenii superbis, nobis inquam est cor-  
pus fragile, infirmumque, ac nimis & in mole-  
stis anxius & in timore humilis, & ad labores  
mollis. Nec verò alia est sœminarium, imò pe-  
jor conditio, aut enim iisdem aut parum ceret  
diversis & molestis & angoribus vexantur, præ-  
terea permulta hoc in sexu sequi sint, abs  
quibus viri existunt immunes.

At verò undenam Ilias hæc malorum misellis  
mulieribus suboritur? Indubie non aliunde,  
quàm ex Utero. Quasi & mors ipsamet in vitæ  
seminario conciperetur. Sub durissimâ sanè  
factorem lege nâci videntur fœmellæ: Pereunt  
sæpe nisi pariant, sæpius autem pariendo pere-  
sunt, animas simul ac fœtus enitentes, v. tamque  
amittentes cum dant, sive fruuntur sive careant  
virovum consortio, in pari versantur discrimine,  
nec paucioribus malis obiciuntur, quæ semper  
steriles sunt, quam quæ liberorum multitudine  
abundant. Sapienter itaque magnus Medicinæ  
Princeps *Hippocrates* inquit, *πάθος τῶν γυναικῶν  
ταύτων αἴτια ἐστίν. Uteri omnium morborum mu-  
lierinum scilicet sunt causa*, quorum quidem plu-  
res jam enarravimus in *Encyclopiâ Medicâ*, ali-  
quot tamen restant modò examinandi, inter  
quos primas tenet *Uteri Inflammatio*, quæ de-  
scribi potest, quod sit obstructio tubulorum ac  
canaliculorum, imò omnium partium mem-  
branarum uteri à particulis acutis rigidis ac  
stagnantibus, accedente materiâ subeili primi  
elementi, oborta: omnis enim inflammatio  
præsupponit tumorem, omnisque tumor ob-  
structionem, hinc omni in inflammatione re-  
spicimus ad partes obstructas, obstruentesque  
particulas.

*Scirrhus Uteri* nihil aliud est, quàm obstruc-  
tio pertinacissima glandularum, tubulorum ac  
vasorum minutissimorum Uteri, ab acido aliis-  
que frigidis intempèstivè & sæpe in inflamma-  
tione ulsarpatis, coagulatis, viscidis ac limosis  
terrestribus salinis succis producta.

*Sphacelus Uteri* est obstructio plenaria, seu  
ruptio vasorum, unde est denegatus influxus  
succorum, imprimis nervei, vel circulatio impe-

data ad vasa uterina, hinc necessariò pars meri  
debet, ubi enim tubuli omnes vel obstructi vel  
abscissi sunt, necessariò vita partis perdi debet;  
namque in fluidis consistit vita cujuslibet partis,  
& totius hominis viventis.

*Ulcus Uteri* describi potest, quòd sit distru-  
ptio fibrarum uteri, & evaluatio in iis contento-  
rum humorum, à particulis acribus, salinis,  
corrosivis, discindentibus, vel à quacumque  
causâ violentâ orta.

*Vulnus Uteri* est continui solutio vasorum  
tubulorumque Uteri à causâ violenta quacum-  
que producta. Quò & pertinet *Dilaceratio uteri*,  
à manu obstetricis vel Chirurgi malè ac in-  
cautè applicatâ.

*Fœtus mortui extractio* est operatio Chirurgi-  
ca, sive prudens atque methodica manus appli-  
catio, quâ fœtus mortuus, vivente adhuc ma-  
tre, ope manūs vel instrumentorum, manu Chi-  
rurgi ex Utero matris extrahitur, vel mortuâ  
jam matre mediante dissectione exitur fœtus  
vivus: hinc dicitur *Partus Cæsareus*, sive *Hyste-  
rotomata*. Chirurgiam hanc triplici de cau-  
sâ in usum vocandam esse communiter dicunt,  
vel ubi mater vivit, & fœtus mortem obiit: vel  
matre & fœtu superflite: vel matre mortuâ &  
vivo existente fœtu, de quibus omnibus latius  
in eâ dicemus.

§. 2. *Subjellum* seu *Pars afflata* omnium ho-  
minum dictorum affectuum est *Uterus*, quem ad  
conciendum, conservandumque fœtum in fœ-  
tibus condidit Optimus ille Maximusque Pro-  
toplastes. Partis hujus tanta tamque conspicua  
est dignitas, ut licet ad Individui conservationem  
non sit necessaria, ad Speciei tamen æternita-  
tem, fœtusque *γεννητῶν τῶν ἀνθρώπων*, maxima est  
ejus nobilitas, cujus rei probè conscii Veteres  
plura Utero, quàm ex cæteris animalium parti-  
bus ulli, nomina imposuere, quibus tamen ex-  
plicandis & recensendis non immorabimur cum  
ipsum organica conformatio sit abunde ejus di-  
gnitatem testetur. Non mihi hic animus est ge-  
neralem contexere historiam partium generatio-  
ni in muliere inservientium, id jamdudum ab  
accuratissimis Seculi hujus Anatomiceis, *Svamm-  
merdam*, de *Graaf*, &c. summâ cum fide, ac  
immortali utriusque gloriâ factum. *Uterus*  
situs in hypogastrio, vesicam inter & intestinum  
rectum, tanquam inter duo pulvinaria, ne ossi-  
um duritie lædatur in Utero sæpè detentus tenel-  
lus embryo. Magnitudinem ejus non duntaxat  
variât ætas, corporisque moles, sed & ve-  
neris usus & fœtura. In recens natis annota-  
runt *Hysterotomi* Uterum aliquando 3j. inter-  
dum

*Uteri In-  
flamma-  
tio*

*Scirrhus*

*Sphacelus*



dum 3iss. pendisse, in vetulisverò & virginibus jam viro maturis fuisse magnitudinis, & ut plurimum ab 3j. ad sesqui unciam ponderasse, raro tamen duas excessisse uncias. Substantia est membranacea sive nervea, plicis haud paucis prædita, quæ in gravidis explicatur ad uteri extensionem, contrahuntur verò excluso fœtu; constat enim propria uteri substantia ex carnosio quodam fibrarum contextu, qui conceptu fœtu ob ubertatem succorum spongiz in modum imbutus, & cum uacuerit pariter membranis laxatus, mirandam in gravidis distensionem admittit. simulque, quod æstetico norandum est, quò magis ab angelicente fœtu dilatatur, eò magis indies crassior, carnosior & robustior redditur, ut ultimis gestationis mensibus, duorum ferè digitorum crassitiem æquet, & tamen notum est, tantam uteri molem intra duas vel tres à partu hebdomadas per celebrem lochiorum expurgationem ad pristinam magnitudinem redire. Per uterum etiam discurrunt varia valorum genera, arteriz scilicet, venæ, nervi, lymphæ ductus & tubuli quidam utero peculiare; innumeræ ferè arteriolæ uteri tubulos ingredi, ibidemque terminari conspiciuntur, sed usque adeo exiles, ut sine Microscopii auxilio vel alio artificio instituto, vix discerni queant. Illud etiam notatu dignum est, quòd duplo vel triplo plures & majores, magisque flexuosæ arteriz per uterum ipsum, quam per vaginam, serpant.

*Diagnosi.*

§. 3. Quod *Diagnosi Uteri* ætæduum concernit, *Inflammatio Uteri* cognoscitur ex febre comite, obstructione mensium vel lochiorum, adsunt quoque dolores circa inguen. Constat hanc uteri inflammationem & sicis cum lingua sicca ac inflammata, anxietates, deliria ac sæpe motus convulsivi accedere; interdum citæ uteri regionem apparet tumor, cum ardore & distensione gravitateque locorum muliebrum. Affectus enim hic ferè omnia signa febris malignæ habet.

In *Scirrbo Uteri* humor adest durus & magnus sæpè sinistro in latere è regione umbilici tactui renitens, & pergrande in aliis abdomen tumidumque apparet, ac si gravidæ sint: Post mortem Scircho uteri defunctarum mulierum, uterum in magnam molem distentum, tamque duræ substantiæ invenimus sæpe, ut novaculæ aciem vix admiserit, licet acutissimam, quale quid simile invenit *Regnerus de Graaf*, prout restat in *Observ. 123. in Anno I. Ephemer. German. Curios.* confer etiam *Ephem. Ann. 9. §. 10. Observ. 126.* Sequentem communicat *Celeb. D. Blankardus in Anatom. Pract. Rational. Obs. 12.* Mulier cum intra triduum parete non posset, speculum matricis adhibuit, tumor aderat durus & magnus in sinistro latere è regione umbilici tactui renitens, omnibus auxiliis frustra adhibitis, altero die circa vespere à vita cessavit. Abdomine aperto, uterus in tetrâ (sanâ nimirum parte) disruptus, & infans extra uterum locatus, Scirrhosque insignis magnitudinis à fundo uteri incipiens & ad os uteri desinens reperiens erat.

In *Sphacelo Uteri* signa sæpè adsunt tristitia, febris nempe inflammatoria, dolores nephriticis similes, summa debilitas, & accedunt deliria, convulsiones. &c. imprimis si sphacelus fuerit ab infans in utero denati corruptione productus. De uteri Excrecentia gangranola sequen-

tem habet observationem *Cl. Blankardus Obs. 32. Cent. 2.* Mulier quædam ab aliquo tempore circa Uteri regionem acerbissimis tentatur doloribus, adeò ut se millemodis torqueret, postea vitæ exuvias deposuit. Inspecito abdomine, Uterus ab excrecentia carnosâ & gangranosa ad magnitudinem capitis puerillis intumuit.

Matricis abscessu laboranti faminz pus per foramen ano erosionem illarum effluxit, ex quo etiam pus per intestina spargebatur, annotante *Cl. D. Blankardo.*

*Exulcera Uteri* indefinenter purulenta ac foetida saburra fluere solet, accedunt gravissimi pubis dolores & aliquando convulsionem, vel sæpè sphacelus inde oritur, qui nonnunquam se extendit usque ad pudenda. Confer *Observ. 168. Ephem. Germ. Ann. 6. §. 7.*

*Vulnus Uteri* cognoscitur ex prægressâ causa violenta, dolore & effluxu sanguinis, deliquio animi, tubulentibus aliis signis, vulneribus quihuscunque solemnibus, quæ ex capite generali inferius petantur.

*Dilaceratio Uteri* cognoscitur, si obstetrix inexpecta manum admovent ad eximendas secundinas, & quasi vi cum dolore puerperæ extraxerit, si sanguis floridus continuò stillet, instar hæmorrhagiæ uteri.

Ad *Embryonicum*, sive *Fœtus mortui* extractionem antequam accedat, certus esse debet de morte infantis in utero. Signa autem mortem ejus manifestantia sunt vel antecedanea, vel concomitantia. Inter antecedanea post causas externas & alios matris affectus potissimum est hæmorrhagiæ uteri nimia vel inordinata, si partus tempus instet; Concomitantia petuntur aut à fœtu, aut à matre. Quod à fœtu sunt ejus motus cessans, quamvis etiam fortis satis debilis, ut patrum aut nil moveatur, vivus adhuc existere queat quare digito utero immisso explorari debet, an cerebrum vel potius arteriz illius pulsant, quorum illud circa fontanellam, hoc in temporibus, carpo, flexura genuum & umbilico ritè notari potest. Porro si eodem digito fœtus ori immisso nulla suctio lingvæque motus observetur. Si ventri matris calida & spirituosâ cum aromaticis ac volatilibus imposita aut propinata fœtum haud commoveant, nec si mater spiritum seu anhelitum cohibeat; si funiculus umbilicalis diutius extra uterum propendat, & secunda fœtum præcedat. In Matre autem mors fortis imminet, si hæc à causa nulla externa rigorem subitaneum & vehementem patiat; si circa umbilicum & inguen dolorem percipiat, si de frigore interno conqueratur, si conatu mejendi & alvum deponendi corripatur, item meconium in utero & cervicæ percipiat. Quod si verò diu infans in utero fuerit mortuus, omnia symptomata existunt pejora, olet enim tunc mater cadaver putridum.

§. 4. *Galenicis* videtur Uteri *Inflammatio Galenicorum opinio* oriri à sanguinis eundem collectione, cui occasione præbeant fluxus menstrui suppreffio, lochiorum retentio, frigus externum, plaga, abortus, dolor partus diuturnior, divulsio violenta, vel durior attritatio, que cuncta partem hanc per se sanguinem colligentem morbo isti succipiendi habilem efficiant.

Ex Inflammatione istâ Uterum facillè *Scirrhum* contrahere innuit, humidioribus nempe & subdioribus sanguinis paribus absumtis,

Kkk 3

vel



vel incrassatis, quapropter ob frigus externum tempore fluxus menstrui imprudenter admissum, morbum hunc mulieres sibi facile acquirere dicunt, uti & ob potum frigidum, unde fluxus cohibeatur, & sanguis retentus condensetur & crassescat.

**Sphaceli.** *Sphacelum Uteri* frequentius succedere dicunt inflammationibus magnis, abscessibus, ulceri, vel cancro male curatis, quando color partis hujus vitalis vel suffocetur, vel destruat; suffocari calorem voluit in ipsa inflammatione, quando plus sanguinis affluit, quam calor iste partis valeat digerere aut in pus commutare; destrui vero ab intemperie frigida illum extinguente, aut à calida resolvente ac dissipante.

**Vicariu.** Inter *Ulcera* Uteri causas referunt inflammationem suppuratam & abscessum inde diruptum, humores acres in Uterum confluentes, medicamenta in Uterum immixta, vel alia quaedam assumpta acris & erodentia.

**Vulneru.** *Vulnera* Utero induci fatentur ab externis instrumentis tundentibus, scindentibus, contudentibus & dilacerantibus, vel annuo hostili, vel ex imprudentia adhibitis, ut praesertim in *Dilaceratione* partis hujus contingat, quando vel obstetrix unguibus, vel Chirurgus hamo in foetu mortuo extrahendo partem hancprehendant, & sic continuitatem ejus violenter dissolvant.

**Fetus mortui.** Causis *Fatum* in Utero *enecantibus* accensent lapsum gravidæ, aut percussione ejus in ventrem inferiorem, motorem ejus diuturnum, vel morbos acutos nutrimentum foetus abluentes, medicamenta acris aut nimium amara, fumum extinctæ lucernæ aliumque ingratum partibus etiam inferioribus admotum, partum difficilem, in quo foetus ipse ad exclusionem sui cum matre collaborans tandem viribus deficit & emoritur, vel in locis angustioribus diutius constrictus suffocatur: quod etiam contingere dicunt: si funiculus umbilicalis in partu laborioso circa collum volvitur, & in extractione foetus illud nimium ab eo constringitur. His similibusque de causis si factus fuerit emortuus, ejus extractionem necessariam esse prosentur.

**Paracelsi opinio de causa Uteri Inflammationis.** §. 5. *Paracelsus* ex menstrui diutius suppressi Uteri *Inflammationem* originem habere judicat, sale in iisdem aluminoso resoluto aut liquefacto tumorem & apostema producente.

**Scirrhu.** *Scirrhum* Uteri ex sale Vitriolato oriri putat majori copia in Uteri partibus collecto, & in lapillos quosdam concreto.

**Sphaceli.** *Sphacelum* Utero inferri dicit, quando calor ejus à salibus penitus sit absumptus, ita ut melior Uteri pars penitus destruat.

**Vicariu.** *Ulcera* itidem à salibus sæpe in sanguine menstruo copulatis oriri vult, quatenus Uteri substantiam erodant, cum nullum unquam ulcus existere possit absque corrosione, hæc vero semper sal aliquod pro causa agnoscat.

**Vulnerum & Dilacerationu.** *Vulnera* Utero ab externis inferri novit instrumentis, uti *Dilacerationem* ejus frequentius contingat ex partu difficili, & secundinis ei fortius annatis, quæ dum impetuosius manu vel instrumentis extrahuntur, Uterus ipse dilaceratur, vel instrumenta, pro foetu mortuo extrahendo adhibita ipsam uteri substantiamprehendunt & lædunt.

**Fetus mortui.** *Fatum* à diversis istis causis, quas Antecessores

res jam allegarunt, emori posse, ut extractio ejusdem necessaria sit, facillimè fatetur.

§. 9. *Helmontius* Uteri *Inflammationem* à *Helmontii* solo spiritu casualiter, ab infixâ verò spinâ occasionaliter duntaxat procedere ait, multumque hic conferre *Archeum* Uteri irritatum propter spinam infixam, unde inflammationem cum tumore, & pulsû duro obvenire in Utero haud dubitat.

*Scirrhum* verò uteri ex tartaro peregrino, *Scirrhi*. pertinace coagulationum principe, in Utero sensim collecto coalescere contendit, uti facile contingit, quando aliquid cruroris in Utero existens ineptum fit, aut non sensim disponitur, gradusque subit, ut totum per totum fiat volatile & transvolabile, eo enim momento *scirrhus* in utero concipi arguit.

*Sphacelum* Uteri fieri contendit à terrefacto *sphaceli*. & in rabien succensio Uteri *Archeo*, pro diversitate & constitutione Uteri partium, ad quas *Archeus* subbundus ac terrore plenus *divertit*, unde *sphacelos* deducit Uteri lethales.

Uteri *Ulcera* causam occasionalem ac radi- *Ulcera*. cem eorum dicit esse fermentum Uteri deletorium, atque virus susceptum partibus impressum & insitum, ejusque *Archeo* exoticum, si- que continuitatem Uteri dissolvens.

*Vulnera* ac *Dilacerationem* Uteri post partum *Vulneru*. difficilem sæpe contingere asserit, unde labra sæpetumant doleant; acutè & dolores quasi itabiles affluunt, quosque oriri statuit ab aquâ glaciali, eademque affectuum horum causas violentas Utero illatas cum aliis Auctoribus agnoscit.

*Fatum mortuum*, quem considerat ut ramulum arbori infernum, & quem non raro ipsum Uterum profigibile muliere dudum mortua statuit, à terrore *Archei*, ejusque extinctione produci asserit.

§. 7. *Willemsius* Uterum *Inflammatione* corpi *Willemsii* docet, cum sanguis lentescens in tenuioribus Uteri vas renoratur, & in eorum interfluita extravasatur, aut in iisdem obstructions parit, quandoquidem sanguis ita stagnans turgescat, vehementius exarset, cutem in tumorem eleve, partemque inflamet.

*Scirrhu* Uteri idè excitari credit, quod *Scirrhi*. mollis laxaque ejus structura glandulis confecta, pluribus à sanguine recrementis excipiendis partem idoneam faciat. Succum siquidem ait nutritium copiosus ab impuro sanguine terrestres particulas viscidias associatas mutare, ipsasque ad Uterum devehentem illas ibi deponere, quæ cum ob propriam crassitiem & visciditatem partisque dispositionem exitum sibi parare non valeant, in illâ hæreant, à calore excrescant, indurentur, ac in tumores hosce calculosos excrescant.

*Sphacelu* Uteri juxta Auctorem hunc, *Sphaceli*. contingit, post suppuratam ejus inflammationem, in quâ succi extravasati vehementissimam passim effervescentiam, & in acido-saliam viscidamque summâ acrimoniâ donatam recrementitiam materiam concreverunt. Fibrae nervæ à viscidis particulis obstruuntur, spirituumque à cerebro confluentium subsidio orbatae, ac spiritibus ipsas incoletibus narcosi affectis, concidunt & relaxantur. Materie ergo acrimoniâ à spirituum permixtione nullatenus temperata, neque excussis tensionis ope heterogeneis istis acrioribusque particulis, vim illarum nequaquam

quam declinare possunt, atque ab ipsis corro-  
duntur & dilascantur, absque ulla doloris ensa-  
tione, spiritibus sensus ministris in parte de-  
ficiētibz.

*Vleeris.*

*Latex* ferrosus spissior glutinosiorque acido-  
salis particulis inquinatus in laxiores uteri fibras  
delatus, in iis moram facit, illasque obstruit, &  
corrosiva, qua pollet, virtute hospitium suum  
destruit, partisque substantiam cum vasis san-  
guiferis in illa distributis exedit & dilacerat.  
Sangvis ergo ex apertis suis vasis effluit, & in parte  
aggreritur ac effervescit, purisque naturam in-  
ducit. Oritur etiam *Ulcus* hoc à crassiore san-  
guine minoris vas obstruente, & in iis re-  
manente atque exturgente, eximianque accri-  
moniam ab effervescencia assequente.

*Vulneris.*

*Vulnera* Uteri juxta Authorem hunc nullam  
internam causam agnoscunt, sed ab externis tan-  
tummodo excitantur, quæ pungendi, secandi  
aut contundendi vi donatæ uteri continuum  
solvere valent.

*Dilaceratio.*

Cum in capite præcedenti de Ruptura factis  
fuerit explanatum, quo pacto dilaceretur Ute-  
rus, dicta illa hic loci non repentur.

*Factus mortui.*

Fœtus quoad Authoris hujus placitum, in  
utero materno conclusus sexcentis obnoxius est  
calamitatibus, abs quibus etiam, antequam  
communis aura fruatur, extinguitur. Materita-  
que tristi illo ac inertis onere gravata incassum  
universas suas colligit vires, ut illo sese liberet:  
nullum enim ab ipso fœtu auxilium mutans,  
subsidiarias Chirurgorum manus accersere co-  
gitur, ad quantquam ad sacram anchoram Au-  
thor noster cum veteribus confugere suadet.

*Sylvius opi-  
nus de cau-  
sa Uteri In-  
flamma-  
tionis.*

*S. 9. Sylvius* Uteri *Inflammationis* causam  
deducit à sanguine in vasis & ductibus uterinis  
subsistente, aut ex iisdem in glandularum sub-  
stantiam effuso ac incendio. A lochiis etiam ob  
externa frigoris suppressis vel diminutis morbum  
hunc fieri posse contendit, idem enim lochio-  
rum sanguis ex parte licet in utero hærens atque  
acrior idcirco factus inflammationem producit,  
exituque suo lacerat, mordet, roditque & sic  
dolores nonnunquam producit intolerabiles.

*Accidit.*

*Scirrh* Uteri causam deducit ab acido viscido  
in vasis uteri existente, ibidemque sanguinem ac  
lympham coagulante & inviscante, sicque scirr-  
hum inducente. Cause autem glutinosam illam  
visciditatem acidam in sanguine ceterisque hu-  
moribus producentes sunt cibi visci, im-  
puri pisces marini, aer frigidus, vita sedentaria ac  
curis expers, somnus multus, tardus vel nullus  
fluxus mensium, moror ac terrores, quæ omnia  
juxta ipsum ansam huic affectui præbent suffici-  
entem. Propter spirituum etiam defectum san-  
guis minus fluxilis, crassior minusque tempera-  
tus existit, & cum spiritus ubique sanguini per-  
miseri debeant, & illud maxime in utero requi-  
ratur, ad quem multus sanguis fertur, & quo  
proinde Protoplastes summus multos nervos de-  
dixit, ut copiosius spiritus advehant, non mi-  
nimum, si illis pauciori copia accedentibus sanguis  
adhuc crassior evadat & partes subsistentes ac-  
cescat; & cum quotidie acidiore evadant, san-  
guinem universum incrassant, qui poros glandu-  
larum uteri offitians ac distendens, partem  
tantum fluxilem magis transfluere percutit, ac  
stagnatione diuturniore intra uterum tumor ex-  
oritur, quod si verò motum perseveret, sanguis  
terrestrior sit & acidum fortius existat, febris

accendatur fortior & corpus exsicceatur, indura-  
bitur uterus & scirrhosus evadet, consumta tan-  
dem tumiditate sanguinis, & propter obstructio-  
nem impedito novo ejus ad uterum affluxu.

In *Gangrana* Uteri partium ejus membrano-  
saram corruptionem esse ait incipientem, atque  
talem, ut ad integritatem redire possit uter-  
us. In *Sphacelo* verò, ubi omnia nigra existunt, par-  
tes omnes uteri extremè corruptas esse docet at-  
que enortuas, & spontè separari omnia, hincque  
Author conelamatum esse affectum Sphacelum  
uteri contendit. Omnem corruptionem uteri  
à causis internis obortam vel à falso lixivo, vel  
ab acido pendere existimat.

*Gangrana  
& Spha-  
celis.*

*Ulcus* Uteri causam Auctor dicit esse humo-  
rem acrem & virulentum, circa vasa uterina hæ-  
rentem, sanguinem ac semen aliquando cor-  
rumpentem, atque post ipsius corrupti efflu-  
xum aliqua sui parte in solidis & continentibus  
uteri partibus exulceratis remanentem, atque  
novæ materiz affluentis corruptione nova tum  
ulcus, tum fluxum virulentum perpetuantem.

*Vleeris.*

*Vulneris* Uteri causam eandem dicit cum aliis  
Auctoribus; necne continui solutionem à re  
externa, vel interna violenta, lapsu, contusio-  
ne ac dilaceratione, factis motu nimio, &c.  
quò & pertinet *Dilaceratio* post partum diffi-  
cilem à manu incauta obstetricis facta, quando  
obstetrix nasutula vel temeraria festinansque ad  
mulieres in partus labore versantes urgeat sub-  
inde gravidam necdum in partus conatibus po-  
sitam, ut ad pariendum se compoat, aut intru-  
dat sæpenumero in uteri orificium non tantum  
externum, sed & internum digitos suos, quam  
digitorum in uteri orificium internum intrusio-  
nem valde periculosa pronunciat, quoniam di-  
gitorum ungibus facillimè lædi potest, hinc &  
omne instrumentum, atque adeo matricis spec-  
ulum nimis festinanter in uteri orificium inter-  
num intrusum periculosum esse judicat.

*Vulneris.*

*Factus mortui* extrahendum esse quidem  
autumat, modo de ipsius morte sustineret con-  
suet, quod ipse colligit 1. ex frigore molesto  
gravidæ corpus universum absque causa evi-  
denti aut febrili paroxysmo occupante, 2. ex  
pondere gravativo circa uteri regionem obser-  
vato, 3. ex fœtore post ruptas secundinas una  
cum aquis prodeunte, 4. ex frigore & mollitie  
cadaverosis partium fœtus vel Uteri orificio ap-  
positarum, & obstetricis manu digitivæ explo-  
ratarum, vel per idem orificium prodeuntium  
& idcirco facilius contrahatarum, 5. ex motu  
omni deficiente in fœtu adhuc calente. Quo  
plura ergo ex prædictis concurrunt signa, eo  
certius de fœtus obitu deceteri judicari potest  
obstetrix prudens.

*Factus  
mortui ex-  
trahendum.*

*S. 9. Carstensi* ipsam Uteri *Inflammationem*  
deducunt ab obstructione extremorum arteriarum  
uterum pervadentium ramulorum à succo cras-  
so, cuius particule angulares propter diuturnio-  
rem stagnationem cum porolioribus, mediante  
materia subtili varie commoveantur & efferve-  
scant, unde calor suscitetur, simulque compres-  
sus ita vicinioribus arteriis, succum chylosum  
cum sanguine in transitu suo impediti, & ob  
diuturniorem eorum detentionem & stagna-  
tionem tumorem augeri statuit, qui tumor ar-  
terias comprimendo sanguini difficiliorem effi-  
ciat transitum, sicque pulsum in parte hac ma-  
jorem reddi & frequentiores. Huic autem suc-

*Carstensi  
uterum sta-  
dictum ab  
causa Uteri  
Inflamma-  
tionis.*

corum

corum in crassatione & stagnatione aniam saepius præbere dicunt potum frigidiorē imprudentiū à foemellis aliumtum, abs quo & mensium fluxus cum insigni sanictatis detrimento supprimatur, maxime præcedente quādam corporis & sanguinis incallescencia, particulas enim subtiliores & spirituosiores volatiles extra ambitum corporis per poros ita eliminari sciunt, remanentibus crassioribus ad motum minus promptis. Frigus insuper immediatē in Uterum immittit, & quidem subitaneum, affectui huc producendo sufficiens esse referunt, quemadmodum potissimum in puerperis contingat, dum hiantē adhuc à partu Utero illud copiosius & imprudentius arripiant. A violenta uteri compressione, vel alia ejusdem latione affectum hunc itidem produci dicunt, quatenus coangustatis aut diffractis canaliculis quibusdam succi in transitu suo impediuntur, vel effusi corrumpuntur, & aliis succis impedimento sunt, ut cum reliquis non adeo promptē queant transfluere.

*Scirrhi.*

*Scirrhus* Uteri nonnunquam ex ipsa oriri dicunt inflammatione, absumtis particulis subtilioribus, crassique & angularibus salis relictis, quæ sibi invicem per mutuum morem quietem archius junctæ in spissiore tandem abeant duritiem. Absque verò morbo illo præcedente, à solis istis particulis acutis angularibus acidis, in succis hinc inde existentibus copiosis, & communi illo cum vehiculo sanguine per arterias in uterum delatis, tumorem hunc duriorem in eo suscitari posse annunt, siquidem succus chylosus ab iisdem facile coaguletur, cujus particulae crassiores caesose à reliquis junctæ, & sibi invicem archius unitæ durissimum præbere soleant tumorem.

*Sphaeculi.*

Ab omnimoda succorum in tubulis uterinis stagnatione & coagulatione *Sphaeculum* hujus visceris oriri docent, eūdem à particulis acutis acidis à lymphâ communicatis succorum motus non modò impediatur, sed ipsi quoque destruantur canaliculi, effusique liquores continuo stagnent, & arterias comprimendo sanguinis transfluxum impedian, qui cum transitum non reperiat, itidem in arteriis quiescere & stagnare incipiat, unde viscus hoc debito privetur calore, & præterea ab acutioribus particulis à globulis atheis fortius commotis fibræ dissecantur & dirumpuntur, unde totalis ejusdem partis oritur destructio.

Inflammatione in abscessum abeunde, ex particulis angularibus acutis in materiâ purulentâ contentis continuitatem Uteri dissolventibus, *Ulcus* ipsius prodire autumant; vel abque præviâ Inflammatione ab ejusmodi particulis in succis morantibus & in quādam Uteri parte copiosius collectis illud excitari, interdum à lue Venereâ uterum infici, corrumpi, erodi: aut lapsu, percussione, contusione Uterum lædi, fibras ejus dirumpi, canaliculos destrui, ut succi transitum non reperientes, sed circa destructos canaliculos diutius stagnantes intestino motu agitentur, quo acutiores particulae suscitatur plures fibras rumpunt, & succi quoque chylosi effusionem promoveant, qui corruptus materiam etiam hæc in parte præbet purulentam.

*Vulnerari* Uterum dicunt variis de causis, instrumentis nempe scindentibus, pungentibus, contudentibus, potissimum verò *Dilacerationem* partis hujus post partum contingere ajunt

difficilem, factu fortiori pedibus calcitrando eandem dirumpente, vel obstrictæ secundinas archius annexas violentius extrahente, unde non modò vasa, quibus placenta Uteri adheret, sed ipsæ etiam Uterus nonnunquam dirumpuntur. Ab hamulo in sætu mortuo extrahendo imprudentius applicato & acutiore Uterum aliquando prehensum & dilaceratum suis se observant.

*Fæcus* extractionem triplici potissimum de causa institui posse concedunt; vel ut ex matre mortuus vivus factus, vel hic mortuus ex illa viva, vel fœtus vivus ex matre vivâ, ob utroqueque delibitatem eximatur; mortuum enim ex mortuo extrahere velle, si de illius morte certo constet, laborem ducunt minus necessarium. *Emori* autem fœtus pluribus ajunt de causis, quas inter recensent lapsum gravidæ in ventrem, percussionem violentam, morbos diuturnos, vel merorem continuum, unde debitum fœtus detrahatur nutrimentum, sinus pudoris angustiam nimiam, in qua fœtus valde compressus tandem suffocetur, chorii crassitiem nimiam, ob quam fœtus membranâ hanc nequeat dirumpere, sed post multos labores tandem viribus deficiat & vitam derelinquat; qualem casum D. D. *Vogel* sanguis præterita ætate observavit, ubi puerpera per triduum partis difficultate laboravit, quo factum eniti potuit, quamvis duarum obstetricum subsidio fuisset usâ, accessit tandem Chirurgus post multos fœtum extrahendi conatus portionem quandam attraxit mollisculam, crassitiem tamen digitum facile æquante, quàm cum Chirurgus dignoscere non valeret, quid sit, ipse D. *Vogel* sanguis attingere necesse habuit, & eūdem post fortiori ejus compressionem puerpera nullum sentiret dolorem, eandem audacter forcice incidere jussit, quo facto primum aqua fuit effusa, quam fœtus ipse in sinistra capitis parte plaga seu ecchymomate notatus, flaccidus & valde fœrens statim fuit sequutus.

§. 10. Erant hæc aliorum responsa, restat ut nostram subjungamus sententiam. Aperta igitur hic, ut ubivis, proficere mente, *Inflammationem Uteri* nihil aliud esse, quàm obstruccionem tubulorum Uteri membranaceorum, à particulis acutis rigidis & talibus, quæ non in totum illorum fores opplent, sed spatiola quædam adeo exigua relinquunt, quæ nulli nisi materiz æthere sint pervia, succi enim, qui continua circumductione resistere coguntur, incallescere incipiunt, dum in Utero stagnantes ad motum hunc intestinum occasionem majorem nanciscuntur, quàm eū celerissimo ita huc illic vehabantur. Facile ergò à lochiis detenus vel stagnantibus succis aliis, affectus hic oriri solet, hinc puerperis solennis est, plures enim puerperæ hocce malo moriuntur, quamvis affectus causa lynceos oculos latet, multa enim særo involucri tecta jacent, neque ullis mortalibus omnia scire ac prænosse fas est; inest namque sæpe in incredibili verum, & in verisimili mendacium.

*Scirrhus Uteri* causam agnoscit sanguinem aut alium succum in ipsis vasis Uteri instar coaguli seu gelatinæ coactum ac induratum, omnes enim glandulæ vel tubuli, quos Uterus continet, humoribus viscosis ac terrestribus repleti sunt,

*Fæcus Extrahendi.**Notæ sum. causa de causis. Vag. i inflammationis.*



sunt, obstructionem enim si patiuntur, facile horum succorum aciditas accedit, ac dein facies apparet scirrhusa; quippe succi circulares amplius glandulas permeare non valentes, *scirrhum* efficiunt, qui succi cum notabilem in se contineant salis fixi copiam, magna necessarii fieri debet induratio. Remotè symbolum suum addere possunt menses, vel *lechia*, aliquæ fluxus præter morem restagnantes, accedente acido succo in scirrhum planè mutante.

*Sphaceli.*

*Sphacelus Uteri* est sanguinis & reliquorum succorū, imprimis nervulū, plenaria in valis suis ac tubulis stagnatio, aut ab omnimoda obstructione, vel ab icisione vel laceratione vasorum, aut ab ipsorum succorū crassitie & coagulatione oriunda. In gangræna enim humores esse crassos & tardè circulares quis est qui dubitat? Vasa siquidem magna dilata causam quoque *Sphaceli* inducendo præbent: Omnes enim totius nostræ Machinæ partes continuò sanguinis & succorum affluxu & refluxu gaudent, imò & minimæ, quibus, si desistantur, pereunt. Huc pertinet & fœtus emortuus jam in Utero corruptus & *sphacelatus*, qui uterum facile in consensum trahit ac charectere suo imbutit & eodem stigmate ac malo inficit. Huc etiam referri potest *gangræna* seu *Sphacelus Pudendorum*, prout existant præter quotidianam Experimentiam in *Ephem. Germ. Ann. 9. & 10. Obs. 13.* & *Thom. Bartholin. Cent. 1. Histor. Anatom. 6.* Imò sanguis intra Uterum extravasatus vicinas sæpe comprimit partes, ut tubuli succum nerveum ulterius ad nervos provelere nequeant, quibus hoc modo obstructis necessarii corruptio oboriri debet. Sic quoque quicumque sanguis evasatus concretus ex morâ corruptus non parùm *Sphacelo* ansam præbet, hinc puerperæ improvidæ à potu frigidiore, vel acri frigidiore expositione sibi sæpe *sphacelum Uteri* contrahunt; potus enim frigidus sanguini æstuantis affusus, eundem coagulat, cuius coagulum per Uteri tubulos transitum non inveniens, in iis non tantum stagnat, sed etiam corrumpitur, unde totiusque morbi trageedia, ex qua plures è sequiore sexu moriuntur.

*Veneris.*

*Ulcus Uteri*, ex nostra observatione, oritur ut plurimum ex suppressione mensium ac lochiorum ex sanguine aliisque succis nimis crassis & coagulatis acerbis, præsertim in substantia ejus glandulosa, accedentibus à lymphâ acerbis & corrosivis particulis, à quibus dilacerantur vasa, ac tubuli, quibus dilatis ac dilaceratis necessarii sanies effluit, imò sanguis ipse corrumpitur, ac simul cum pure emanat, acrimoniamque acquirit, & petruendo plura vasa ulcus produci & potest chronicum seu diuturnum. Succus enim tardius in Utero circulates acorem contrahunt, unde pus; quippe pus nil aliud est, quam succus Chylolus evalutus & leviter coagulatus, qui pro mixtura sanguinis ac succorum diversus est.

*Dilacerationis.*

*Dilacerationis Uteri* causa sæpe est manus obstetricis ignara, exemplum enim novi hæc in civitate, ubi ejusmodi incautæ mulieres non tantum Uteri vaginam ejusque vasa, imò ipsam urethram (indeurina continuò stillabat) laceraverunt, sed & ipsam Cervicem extraxerint pro secundinis. Sic sæpe Uteri Cervicem seu vaginam elabentem pro Utero habent. Infans etiam prægrandis aulam sæpe huic dilacerationi mole ac magnitudine sua præbere potest. Sic etiam quam-

cunque causæ violentæ. Frequentius occurrit illa improvida & immanis Uteri dislocatio, quam rudiores obstetricum manus, secundinas violentius eripientes, aut loco harum Uterum accipientes præstant. non sine atrocissimo parturientis in abdomine dolore, inflammatione, convulsionibus & repentina morte, quales casus existant apud *Bartholin. Marchett. Solingen. Mauri can. &c.*

Fœtus extractions causa est ipse fœtus in Utero matris defunctus, cujus gratia ne mater matrum inde contrahat, & ab eodem post diuturniorem retentionem putrescente Uterus inficiatur, operatio hæc à Chirurgis instituitur. Vix enim contractatione violentiore ac instrumentorum applicatione haud lædi debet. Infans facile in Utero materno mori potest, si mater tempore gravidationis perversa victu ratione utatur, hinc infantulis liquores sunt crassiores, qui dein efficiunt obstructiones, ex quibus nullus effectus in tenellulis in Utero materno adhuc existentibus contingere possunt: ut quotidie videmus ex potu nimis frigido vel glacie refrigerato, vel terrore, vel irâ, fœminas abortientes infantes mortuos parere.

§. 11. Quod *Prognosis* affectuum horum muliebrium attinet, ii sumam prudentiam sæpe politicam à Medico requirunt. *Inflammatio Uteri*, certè est affectus periculosus, & facile in gangrænam Uteri transit; consule *Hippocr. Ap. 40. 3. 5.* hinc sæpe *Sphacelus* oritur comitans vultu febre, delirio ac convulsionibus, subsequente morte. Ex hoc enim affectu innumerae intereunt mulierculæ puerperæ.

*Scirrhus Uteri* est affectus curatu difficilissimus, & comitatur sæpe mitelas mulierculasque ad mortem, imprimis si à frigidis ac repellentibus in inflammatione perperam applicatis, fuerit productus.

*Gangræna* ac *Sphacelus Uteri* ut plurimum *Gangræna mulierculis* lethale malum est, imprimis si ipsa substantia Uteri corrupta, & sic omnes tubuli obstructi aut discissi sunt, quamvis aliquando Uterum corruptum vel sponte excidisse, vel sectione sublato fuisse semellis superviventibus scripta tellentur, modò Auctoribus fides sit adhibenda, & non potius portio fuerit vaginæ Uteri, quam ipse Uterus, quem vix absque vitæ periculo excindi posse nobis persuademus.

*Vulnera Uteri* vulgò pro non lethalibus habentur, idè præsertim, quòd partus Cæsarei non raro observati fuerint felicissimi eventus. & quòd Uterus ad vitam non simpliciter necessarius sit, sed propagationi Sobolis tantum prospiciat, non lethalia sibi persuadent, contrarium asserente *Foresto l. 6. Observ. Chir. 5. in Solid.* non tam quòd juxta hunc exanguis, secundum alios membranacea sit ejus compages, sed frejus vasorum sanguiferorum unum alterumque; facietur, per quod sanguis non duntaxat Utero, sed toti quoque subtrahatur, aut in abdomine, in decurtantur Uteri vitærumque individui conservationi destinatorum, cumuletur. Præprimis verò Uterus imprægnatus lesus vulnus lethale infert; fœtu præsertim grandiscente si vulnereur, vel ratione hemorrhagiar, ob vasorum majorum diramationum dilacerationes exorta, proli ac matri lethifera. Illi quidem, quod ultimis præsertim mensibus, totus Uteri cavernosus seu spongiosus ambitus cruento multo turgeat, hinc laceratus ad deliquium ante-

LII

mi

miendum profundat, insequente simul illo quoque, quem vasa tunc temporis per Uteri fundum tumidiora, continebant: Huic verò, quod subsidus materni defraudetur. Si majus existerit vulnus, fetus extra Uterum ad cavitatem abdominis prolabitur, subsequente morte certissima. Non imprægnatum quoque Uterum saltem ratione suorum vasorum hæmorrhagiam & vulnera pati lethalia, ratio suadet.

*Dilacerationis.*

*Dilaceratio Uteri* post partum difficilem est periculosa & ferè semper lethalis, hinc exstat casus sequens apud *Celeberrimum Bohnum*, *Amicum nostrum singularem*, in erudito tractatu de *Renunciatione Vulnerum*. Testantur *Alia Facultatis*, in Juvenula Zittaviensi filii primipara, hujus enim placentam Utero archiùs annexam, dum obstricta imperita violentiore manu educere moliebatur, simul Uteri portionem protrahit, quam pro factu peculiari sen gemello habens, puerperam ad novos conatus urget, nec labori ipsamet in illo educendo parciit, contradicentem illa, de illata vi & evulsionem interaneorum omnimoda conquirente, ac vix elapsa à feliciore aliàs partu horula expirante. Cujus Hypogastrii pelvis Utero hujusque annexis vacua, hic autem ex sinu muliebri ultra spūhamam propendens in cadaveris dissectione cum stupore adstantium cernebatur. Qualis quidem funestus eventus atiolonia non semper sanguinis illa est profusio, ejusmodi impetuosis Uteri evulsionis vasorumque sanguiferorum rupturæ effectus ut in foemina, cujus primò mentionem fecit, annotavit *Mauriceau* l. 2. sed sola aliquando partium necesse est ac sensibilibus maximè tensio dolorifica, & in convulsiones graviores ac mox lethales coniciens: ita quidem ut nihil planè cruenti penes quasdam, nec in harum cadavere, reperitur, observante *Salingen* & Medico qui sectioni puerperæ Zittaviensis præerat.

*Dilacerationem Cervicis Uteri* insequitur ipsius procidentia, quæ sæpè incurabilis est. Si majora vasa fuerint rupta, & hæmorrhagia sit largior cum deliquio animi, malum erit lethale, quale quid nuper in matrona hujus civitatis observavi ab obstrictrice imprudenter productum. Sæpè & fibræ membranæ disrumpuntur. hinc etiam oriuntur convulsiones, anxietates circa præcordia, vomitus, deliria, quæ pessima symptomata, dum hæc scribo in puerpera tristis observavi, quæ & miserè inter lachrymas adstantium vitam finivit, & animam creatori suo placide reddidit.

*Partus extrahi.*

*Fætu mortui Extrahitionem* quod concernit, si mater sit fortis & fætus non diu fuerit mortuus, Operatio hæc sæpè feliciter succedit, quando verò fætus jam ab aliquot diebus extinctus, & vires matris vel à partu, vel ab alia quâdam causâ fuerint debilitatæ, simulque vomitus, convulsiones, atque pudendorum tumor adsit insignis, his in casibus res est desperata, & Chirurgiam sæpè respuit. Noviq. uendam Chirurgum Marburgensem senem, cujus mentionem quoque inquit *Celeberr. D. Walschmid, Epistola quinta*, qui fætus tum vivos tum mortuos manu, vel aliquando duobus tantum digitis in Cervicem Uteri intravit, quàm accuratè eximere solet, quod sæpè cum admiratione vidit prælaudatus *D. Walschmidius*. Alium novimus in Helvetia, qui etiam singulari modo novit extrahere fætus sine violentia, qui modus nobis maxi-

mè arridet, sed non omnibus contingit adire Corinthum.

§. 12. De *Dieta* horum muliebrum affectuum nunc agendum restat, quàm si agræ obſervare nolint, nihil sæpè efficiunt, quod etiam *Hippocrates* innuit *Aph. I. §. 1*. Sitaque non duntaxat suæ sanitati, sed & Medici famæ studeant missellæ, id quod bonam atque probam decet puerperam, caveant sibi oportet. ne vitam intemperanter & inordinate transigant, & ne tempore gravidationis se faciant fructibus horariis acidis, neglectis calidis cibis ac jusculis, sed omnem in *Dieta* fugiant excessum. Sit autem puerperis Aer temperatus ac calidus, frigidus verò ceu pestis fugiendus est. Quod cibum attinet in Morbis Uteri, autè omnia frigida ac acida vitentur, frigida enim sanguinem instar gelatinæ concreſcere faciunt, acida autem eundem coagulant, atque hæc duo sæpius his affectibus anſam dant, ob sanguinis enim mixturam turbatam febris oriri solet, nam si cibis huius vel potulentis puerperæ abutuntur, multum aciditatis ac crudæ in sanguine reliquisque succis acquiritur, quare & nimis viscidæ vitentur. Potus sit decoctum Theriæ, vel Cassiæ, vel jusculum calidum, vel cerevisia calida. Accuratam puerperis regimen præscribit *Celeberr. noster Walschmidius in Monitis suis Medicis*.

Somnus ac vigiliæ moderatæ sint. Somnatio non statim induigendum est. Ira, tristitia, terror cum animi passionibus aliis fortioribus & incongruis angue passio vitentur. Alvus sit pro more. Venus exulet. Reliqua sint mediocria, ne quid nimis, & omnia sana fiant ratione, ut sic anima sana in corpore sano existat, præprimis motus corporis debito modo, si fieri potest, in Scirrho Uteri instituitur. In reliquis verò his affectibus quieti studendum est, optimum enim præservativum est, si puerpera corpore existente quieto, & mente tranquilla ad diem II, usque in lecto detineatur. Singulis Uteri affectibus specialem præscribere curationem Diæticam non libet, quoniam opus esset infiniti laboris, & lecturo duntaxat ædium pareremus, cum hæc generalia de diætâ dicta facillè ad specialem morbum applicari possint.

§. 13. Cura juxta *Galenicos* ita instituitur in Uteri Inflammatione, ut *Philameno*, ex relatione *Aetii*, suadente, in principio ægrotam in domo *Galenici* obſcuro & moderate tepido collocent, quietem imperantes & omni erutum motu interdicentes. Artus deinde manuum contrectatione demulcent, & pedum ac manuum juncturas fovent irrigantque. ac lana pura integunt alvum vero eluunt & infuso molli evacuant. Inflammatione existente vehementiore, nec ætate, nec habitu, nec anni tempore obstante, nec inflammatione post abortum, aut nimiam sanguinis evacuationem superveniente, cubiti venam secant, & sanguinem pro vitium ratione detrahunt. venamque in secunda die incidere, in tertiâ verò detractionem repetere permittunt, & agrâ postea alica ex aqua mulsa, aut pane loto, aut ovo forbili alternisalutis, omnibus moderate exhibitis, fervente inflammatione lanam succidam vino & oleo, aut aceto & rosaceo imbutâ. aut palmas vino incoctas, aut mala cydonia in posca cocta, & cerato melino aut rosaceo admixta imo ventri ac pubi imponunt, & postea cataplasma ex meliloto in passo cocto ac trito, additis vitellis ovorum



ovorum affatorum, & cum rofaceo, aut melino, aut crocino mixto, vel vino diluto palmulas fervefactas cum polente farina & aliquo ex prædictis unguentis terunt & unponunt. Ad inflammationes erysipelatis igneo ardore cognoscibiles cataplasmatibus utuntur ex polenta & intubo, perdicio, umbilico Veneris, sedo, polygono, pampinis vitis, portulaca, plantagine, & similibus præparatis, & lanam aliquo herbarum harum succo imbutam in pendendum subdunt. Cataplasmatum verò onus locis illis non tolerantibus, aquam rofaceo admixto ex modicis intervallis affundunt. In exacerbationis declinatione totum corpus inungunt, & ægrum in aqua tepida usq; ad lumbos insidere jubent, deinde pellos subdunt ex aliquo unguento leniter adstringente. ut rofaceo, melino, lentiscino, aut ænanthino, adjectis ovorum vitellis crudis sive assatis, & croco, aut aliquo ex succis prædictis admixto paratos, & caput rofaceo cum modico aceto irrigant. Inflammatione mitigata mulierem in aqua oleo admixto insidere, & pellos ex narcisso aut sulino unguento subdere, lanamque oleo calido imbutam pectini & lumbis adhibere volunt. Interdum & cucurbitas lumbis affigunt & tumore magno existente scarificationem instituunt. Postquam Inflammatio declinare inceperit, adea deveniunt, quæ laxare ac discutere possunt, quapropter in sænigraci, althææ, seminis lini, & interdum quoque pulegii, marrubii, salviæ, artemisiæ, decoctis ægram insidere jubent, & ad anum ventrem ac pubem farinam hordeaceam cum sænigræco & lini semine in aqua mullâ decoctam imponunt, aut caricarum decoctum adhibent. Ubi curatio procelescit, victum tenuem & parimoniam tollunt, & manifesta jam facta declinatione balneum ac vinum concedunt, cibosque exhibent reficientes. Emplastrum etiam imponunt de mellito, pellosq; subdunt paratos ex sænigraci decocto, adipe asnerino vel gallinaceo, aut decocto capiti papaveris, cum medulla cervina vel sola, vel adjectis pulveribus ex galbano, myrrha, trolo dytica, thure, opio & castæ, aut sequentem pessum aureum dictum hoc in morbo valde existimatum.

¶. *Ovorum affator. vitell. N. vj.*

*Medulla cervin. ʒiiij.*

*Croc. ʒij.*

*Ossipi ʒij.*

*Cera alba.*

*Terebinth.*

*Adipis asnerin. aa. ʒij.*

Crocum cum modico vino dulci terunt, ova trita adiciunt, & liquabilia liquefacta admiscunt & adservant. Usus autem tempore medicamentum oleo nardino dilutum pello excipiunt ac subdunt. Pessum quoque Enneaphasinacû ad Inflammationes hæcæ valde laudant, qui paratur ex adipe asnerino & bubulo, cera alba, terebinthina, butyro, medulla cervina, melle, oleo rofaceo & cicino, omnibus recentibus æquis portionibus liquefactis. Ad Inflammationes ferventiores emplastrum ex succis cum rofaceo liquatum & succo plantaginis, senecionis aut intubi adjecto, in pessum formatum adhibent. Ex floribus lilii in oleo rofaceo tritis, aut mucilaginis seminis lini, sænigraci, radicis althææ, cum croco & arungiis paratos pellos etiam laudibus hic extollunt: omnia tamen recentia esse volunt, cum butyrum, medulla & adipis anti-

qua, dum liquantur, nidorosa fiant, & calidiora evadant; sicque inflammationes potius exacuant. Menies non nisi sedata jam inflammatione provocandos esse movent, cum loci ubi inflammationem conclusi sanguinis transcursum impediunt, Vergente verò Inflammatione in Abscessum, suppurationi student promovenda, imposito cataplasmate ex feminelini, sænigraci, farina hordei, caricis coctis, radice althææ & terebinthina parato, imo ventri & lumbis, interdumque sterco columbinum cum oleo & melle adhibent. Pudendi suum per spongias assidue fovent, & vapores per arundinem operculo ollæ perforato insertam intra pendendum recipi jubent. Infusiones etiam frequentes instituunt, decoctis in aquâ iis, quæ attractoriâ vim habere credunt, uti sunt pulegium, marrubium, salvia, artemisia, laurus, dictamnus, centaurea. Dolore vehementius infestante, papaveris capita in aquâ coquant, & contusa cataplasmatibus admiscunt. & caricæ crudas in mortario cum resina pinus, terebinthina, ac modico nitro tritas imponunt, pessisque utuntur ex terebinthina, myrrha, caryo, ac butyro paratis, vel sequenti singulariter morbo huic conveniente.

¶. *Carnis caricæ, pingv.*

*Adipis asnerin.*

*Olei irini aa. ʒij.*

*Terebinth. ʒij.*

*Ruta ʒij.*

*Myrrhæ,*

*Ardis*

*Nutri aa. obolos duos;*

Excipiuntur lanâ in pessum, qui oleo icirino aut Cyprino tepido tinctus subdatur. Ventrem umiacpectinem decoctis prædictis assidue jubent foveri. Rupto abscessu, si pus ad vesicam fuerit delatum & cum urina excernatur, lactis potum & cucumeris semen propinant; & cataplasmata prædicta, cerataque emollientia ac odorata adhibent, si verò ad intestinum rectum progreditur, & cum stercore, vel per se egerit, lentium & malicorii decoctum per clysterem infundunt; si in pudendi sinum erumpit, & purum est pus, rofaceum aut tetrapharmacum cum butyro recenti ac rofaceo infundunt, & locos rolarum aut lentium decocto, aut pitianæ succo eluunt. Destillante sanie tenui & fetidâ, velut à nomâ & ulcere depascente, magis adstringens infundunt, quale est decoctum laccarum myrti, palmularum, lentium, & malicorii. Permanente post humorum excretionem, inflammatione, cataplasmata quoque & infusiones superius indicatas continuant; si verò in æqualia fuerint, quæ prodeant, somenta & infusiones ex aqua mullâ parant, in qua absinthium, marrubium, ervum, centaureum, aut lentis sunt decoctæ, locos verò pitianæ succo eluunt, addito & melle rofaceo; ac Uteri os & aniterato rofaceo aut butyro inungunt, cui spodiæ, aut stibii, aut plumbaginis, aut spumæ argenti aliquid, cum lacte muliebri sit admixtum. Humore denique profluente fetidissimo, vino mulso sinum pudendi eluunt, & cin eo usque ad exactam curationem solent perseverare.

Ad *Scirrhum Uteri* curandum in principio, si *Scirrhus*, nihil obstitit, nec ætas aut vires prohibuerint, sanguinis mediocrem copiam à cubiti vena secta detrahunt, aut per Hieram Archigenis purgant, postea infestationibus utuntur ex decoctis

fœnigræci, seminis lini, pulegii, artemisæ, foliorum sambuci, radices & foliorum cucumeris sylvestris, aromatum vapore fomentafaciunt, & Uterum oleo lufino, narciflino, irino, glaucino, adipe anferino, gallinaceo, fuillo recent, aliquo unguento admixto, nec non lacte bubulo aut caprino cum adipe anferino colluunt, & cataplafma imo ventri apponunt è caricis, hyfllopo, nitro & ablinthio, & cucurbitas cum fcarificatione affigunt. Emplaftrum etiam imponunt polyarchium, aut de baccis lauri, pellosque subdunt mitigatorios, aperientes & emollientes, è quorum numero fequens exiftat pro exemplo.

℞. Cere alba,  
Terebinth.  
Medull. cervin.  
Adipis gallinac.  
anferin.

Butyri  
Unguenti nardini,  
fufini.

Myrrhæ aa. portiones æquales,  
Excipiuntur melle, & formetur pilulæ.

Inter epithemata imo ventri appouenda fequens fingulariter deprædicant.

℞. Refina pinkis lbij.  
Cera 3xx.  
Apocymatis  
Fermenis acidis aa. lbj.  
Galbani 3ijj.  
Ammoniaci  
Opopanax. aa. 3ij.  
Muria acerrima q. f.

Opopanaxem & Ammoniacum cum muria coquito, & fermentum adicio, ac aliquatenus dilfolvito: dein de liquabilia liquata admifceto, & fpatulâ, donec frigeant, agitato, & in mortarium translata probè subigito. Sequente etiam pellem Archigenis hoc in cafu valde extollunt.

℞. Ol. irin.  
fufin.  
cyprin.  
Cere aa. lbj.  
Mellis Attici 3v.  
Unguent. foliat.  
nardin. aa. 3iiij.  
Adip. anfer. 3ij.  
Medull. cervin.  
Oefypi aa. 3ij.  
Terebinth. 3ib.

Oefypum & medullam cum melle subigito: deinde ceram cum oleis liquefacito, & postea terebinthinam & adipem, & confequenter pretiola unguenta, nardintum ac foliatum addito, & in mortarium translata, probè unito. Hoc non tantummodo ad exactam curationem, fed etiam post adeptam fanitatem aliquando tempore majoris fecuritatis gratiâ utuntur, quin ipfe Soranus etiam pro malagmate forinfecus imponit, & ad prædicta admifcet thuris, ceræ, Ammoniaci, thymiamatis, myrrhæ, floris junci odorati aa. 3vij, picis 3xvj, galbani, opopanaxis, aa. 3iiij. thus, galbanum & opopanaxem vino odorato adstringente terit, & ad oefypum & medullam ac mel adijcit, & omnia fimul rurfus terit: dein de ceram cum pretiofis unguentis liquat, & Ammoniacum tritum, refinamque ac reliqua admifcet; hinc ablato ab igne medicamento ac frigefacto, myrrham & florem junci odorati inſpergit, unit, & ad uſum reponit.

*Sphacelum Uteri* curaturi frequentes inſtituunt ablutiones ex decocto ablinthii. abrotani, rutz, myrrhæ. fyringâ injecto, addito nonnumquam unguento Ægyptiaco, & ventri imo lumbisque cataplafma imponunt ex farinâ orobi, fabar. hordei, lupinorum, ablinthio in oxymelite coctis, additis aloë & myrrhâ. Partem corruptam & emortuam forſep attractam abſcindunt, & reſiduum putrefactioni ſan tradunt, ad vivum uſque unguento Ægyptiaco abluunt, quo factô cicatrifationi ſtudent, & enematâ frequentius injiciunt emollientia, abſtergentia & refrigerantia. Toto inſuper curationis decurſu cordis roborationi incumbunt. tum remediis internis, cum epithematis cordis regioni forinfecus impolitis.

*Ulcus Uteri* curant prohibendo fluxum humorum acrim per venæſectionem in brachio inſtituâ. ſi ægra ſit plethorica, per purgationem verò, ſi ſit cacochymica, utuntur que benignioribus tantummodo catharticis ut foliis ſennæ, rhabarbaro, myrobalanis, tamarindis eleſtuario catholico, quibus præmiſſis decocta propinant vulneraria & abſtergentia ex radice clunæ, ſymphyti, ariſtolochiæ rotundæ, foliis agriſimonie, plantaginis, pin. piuellæ, centinodie, millefolii, artemiſæ, vel terebinthinam exhibent cum ſaccharo roſaceo, & pro majori ulceris exſiccatione pilulas debdellio aut pulverè ex trochilicis alkekengi. Foris verò in ſeſſiones, inſectiones, cataplasmata, pellos & ſuffumigationes adhibent exſiccantia, adſtingentia & consolidantia quæ præparantur ex radice biſtorcæ, conſolidæ, ireos, ariſtolochiæ, herbis abſinthii, ſaniculæ, apii, pilosellæ, millefolii, burſæ paſtoris. vel decoctum hordei, in quo mel roſatum ſit diſſolutum, additâ paucâ quantitate myrrhæ, injiciunt. Pelium quoque adhibent paratum ex croco, oleo roſaceo, adipe anferino & medullâ cervinâ, vel ex plumbagine, glaucum cum ſucco hyoſcyami tritis, additæque quantitate ſufficiente olei myrrei aut roſacei. Ad ulcera Uteri forſidâ repurganda, tum emplaftrô Ægyptio citra anigiem præparato, tum ſequenti utuntur pello.

℞. Terebinth. 3iiij.  
Adipis anferin. 3vij.  
Myrrh. 3j.  
Croci 3ij.  
Medulle bubulæ,  
Oefypi aa. 3ij.  
Mellis,  
Olei Cyprini, aut irini aa. 3xvj.  
Thuris  
Rad. panaceæ,  
iridis aa. 3ij.  
cyperi 3iij.

Incorporentur, & ſerventur ad uſum.  
Pro ſuſſumigio ſequentibus utuntur trochiſcis.

℞. Thuris  
Storacis calamit.  
Myrrh.  
Maſtich.  
Gumm. junip.  
Ladan. aa. 3j.

Cum ſ. q. Terebinth. f. ſ. a. Trochiſci.

Ulcera depaſcentia ſive noias lacte eluunt aſinino recens emulſo, vel in ejus defectu, quocunque alio cocto. cui mel & pulverem radices ireos addunt, & in Uterum inſundunt, aut eodem modo utuntur aquâ mulſâ, in qua abſinthium,

aut

ant calamus aromaticus, aut bupthalmum, aut lecanthemum fuit incoctum, quaterum effusa, locos decocto malva eluunt, & pessum ex farina lentum, vel foliis oleæ in melle titis & melle susceptis insunt. Ulcere satis repurgato, cicatricem inducunt unguento diapompholygos, vel cerato sequenti.

℞. Cera alb. ℥iij.

Ol. rosæ, optimi ℥ix.

Ad prunas liquefacto, & quadantenus refrigerato: deinde in mortarium conjicito, ac lacte muliebri aut asinuo, aut caprino recens multo affuso, cum pistillo subigito, donec totum inalbescat, deinde diffuso priore lacte, novum infundito ac rursus subigito, & croci ℥j. admisce-to. Sequens etiam medicamentum ex hordeo hoc in casu valde collaudant.

℞. Hordeisusti ac triti.

Spuma argenti lota,

Ceruss. lot. aa. lbj.

Adip. aserin. lbiiij.

Capr. recent. lbij.

Ol. myrti lbj.

Mellis despumat. ℥viij.

Terebinth. ℥iij. vel iiij.

M.

**Vulnere & Dilatatione.**  
In *Vulneribus & Dilatationibus Uteri* decocta propinquant vulneraria ex radice tormentillæ, bistortæ, symphyti, herbis mellefolii, artemisiæ, centinodæ, plantaginis, burse pastoris & similibus, pessosque adhibent dolorem lenientes & consolidantes ex cera & oleo rosaceo vel narcisino, quibus subiungunt medicamenta superius in *Ulceribus* jam notata.

**Ratio fac-**  
**ium mor-**  
**inum ex-**  
**trahendi.**  
In *Facilius mortui* extractione ita procedunt, ut mulier supina in lecto reclinetur, & magis ut dorsum vergat, mulieres aut ministræ quædam crura elevata utrinque teneant, vel si hæ non adsint, per vincula quædam thorax mulieris ad lectum deligetur, ne dum attrahitur fetus, corpus ipsius sequens tractus vigorem exsolvat: tum dux aut tres buccellæ panis vino imbutæ offerantur ad arcendum animi deliquium, & in ipso opere assidue facies vino respargatur. Deinde pudendialis per ministrum diductis, Chirurgus manum sinistram, cum robustis ac constrictis digitis, pinguefactam in utero osculum dimittit, ac ipsum dilatat, & infuso in ipsum oleo laxius reddit, & ubi commodè uncus infigi possit, querit. Locos autem ad insigendum uncum commodos in capite recensent oculos, occiput, os palati, mentum, calviculas, & circa costas ac præcordia locos; in pedes verò fetu delato, ossa supra pubem, & costarum spacia intermedia & claviculas, postea uncum manu dextra decerent, & flexuram ipsius inter digitos occalcant, per sinistram manum leniter, & in quodam ex relatis locis insigit, usque ad locum inanem, alterumque huic oppositum, quò æqualis & non ad alteram partem attractio fiat: tum æqualiter trahit, non solum in directum, sed etiam in latera, nec tensionem remittit: postea digito indice pinguefacto, aut etiam pluribus, inter Uteri osculum & corpus impactum, velut si excoriet, in orbem circumducit. Uncus pro ratione sequente, ipsum in partes inferiores transfert, sicque usque ad perfectam fetus extractionem facere pergit. Si manus fetus præmissa sit, & impacta retrudi non possit, obvoluto panniculo, ne ob lubrici-

tatem elabatur, aliquantulum illam attrahit, & ubi prodierit, totam de humero refecat. Idem etiam facit, si ambæ manus præmaneant, similiterque etiam pedes prominentes, reliquo corpore non subsequente, refecat. & postea reliquum corpus dirigere conatur. Facta verò à capite majore obstructione ut fieri solet, si fetus hydrocephalus est, spatula polypis destinata aut aciculâ aut cultello aculeato, inter digitos occultato & variam dividit, quò aqua evacuata cecidit. Capite verò ita naturaliter, ut dicunt, amplo existente, divisam similiter calvariam per torcipes dentibus aut ossibus extrahendis connotandam contundunt, & si supererminent ossa, ipsa eximant. Si protracto capite circa thoracem obstructio fiat, eodem instrumento locos circa claviculas usque ad inanem locum dividunt, quò humore evacuato thorax cecidit, quod si non fiat, factâ dilectione claviculas ipsas autrunt. Si intus venter, mortuo fetu, ut hydrope affecto, inflatus fuerit, eadem ratione humorem unâ cum ipsis intestinis evacuant. Intus qui in pedes deferuntur, inclinationem ad Uteri osculum facile dirigi promittunt, si vero circa thoracem aut abdomen impactus tertus hæreat, panniculo obvoluto eam attrahunt, & eodem modo factâ divisione, ea, quæ continentur, evacuant. Si reliquis ablati caput recurrens detineatur, sinistram manum immittunt, & eandem disparatam fuerit Uteri osculum, manum in profundum demittunt, & repetunt caput digitis ad osculum devolvunt, deinde uno vel altero infixo attrahunt, si vero Uteri osculum ob inflammationem constrictum sit, nullam vim inferunt, sed pinguis ac largi infusus, mellebus, irrigationibus & cataplasmatibus unctum, quò disparato osculo educatur. Fœtu in obliquum prodeunte, liquidum dirigatur, prædictis utuntur modis, sin minus, totum factum intus dissecant & particulatim educunt, diligenter habitâ animadversione, ne quæ particula intus latens relinquatur. Post Chirurgiam, curationibus ad Uteri inflammationem utuntur, omni-que studio sanguinis sistent eruptionem.

§. 14. *Paracelsus* ad Uteri *Inflammationem* *Paracelsi* profigendam magisterium commendat perlarum, lapidem prunellæ & aurum lunificatum in aqua melissæ & florum sambuci propinatum, ad eluendum verò ipsum Uterum decoctum serpilli laudat & cataplasma ex radice & foliis hyoscyami sub cineribus assatis, & cum aceto in pulcrum redactis, quod ipsi abdomini circa regionem Uteri inflammati est apponendum. Si jam in abscellum abierit, unguentum ex oleo ovorum, chamomilla & galbano pello illitum adhibet, & pure evacuato. Locum aqua salis, in quam mel rosaceum fuerit dissolutum, abstergit.

In *Scirrho* Uteri curationem non temere *Scirrho* tentandam esse monet, cum nec digerentibus, nec corrodentibus aliquid præstari possit, sed solum menstruo:um provocationem facilitari posse admittit, eaque de causâ essentiam Martis ægræ oulter exhiberi putat, si verò scirrhum in ulcus transmutari contingat, hujus curationem minori cum periculo suscipi proficitur.

*Sphacelum* Uteri quod concernit, non tam perfectum curare aut abigere aggreditur, quam incipientem prohibere, ne perfectum adipiscatur, quem scopum ut obtineat, frequenter in usu habet aurum lunificatum, quod interne in

LII

aqua

aqua mellis propinat, foris verò lapidem calaminarem præparatum in decocto matricariæ, scordii & salviæ dissolutum inspergit, vel mumiam arsenicalem radici levisitici in formam pelli redactæ illinit, & ad locum usque infectum insinuat.

**Uterus.** Uteri curationem potissimum peragit internis potionibus vulnerariis mundificantibus & abstergentibus ex decocto radicis aristolochiæ, bistortæ, herbarum mellisæ, artemisiæ, perforatæ, petticariæ, millefolii &c. in quo interdum pulverem ex magisterio coralliorum & perlarum exhibet, omnique modo menstruum sal corrosivum domare intendit, postea forinsecutiam lapidem calaminarem præparatum in aqua plantaginis solutum inspergit, & linteum in pessum formatum mumiam arsenicalem imbuunt, eoque ulcus attingere conatur.

**Vulnera.** Vulnera Uteri si tantummodo sint interna, ex Dilaceratione violenta induta, potiones exhibet vulnerarias ex radice aristolochiæ, consolidæ, diapensiæ albæ, angelicæ, herbis mellisæ, betonicæ, salviæ, matricariæ, pyrolæ, alchimiæ, summitatibus hyperici, floribus anthos, cheyri, mastiche, succino albo, myrrha, & similibus cum aqua in cantuario pulve ex farina benelutato paratas; si verò externum simul adsit vicinarum partium vulnus, balsamum parat vulnerarium, ex herbis salviæ, mellisæ, ophioglossi, betonicæ, plantaginis, radice consolidæ, aristolochiæ, lumbriçis, castoreo, succino, in butyro majali tritis, & Soli expositis, donec clarum separari possit, quod vulnere illinit, & postmodum emplastrum fodicationum superimponit.

In **Fætu mortuo** expellendo non statim ad instrumenta Chirurgica transcendendum esse existimatur, sed remedia quædam ad fætum expellendum idonea præmittenda, qualia sunt oleum succini ad 10. guttas in aqua artemisiæ aut pulegii exhibitum. Tinctura cheiri, essentia castorei, fabiæ, borax, decoctum dictamni Cretici in vino, pulvis myrrhæ & croci, quibus si non expellatur, extractionem per manus, & tandem per instrumenta instituendam esse concedit, modo studium adhibeat, ne Uterus ipse lædatur, & una cum fætu mater quoque simul enecetur.

**§. 15. Helmontio Uteri Inflammationis curatio** consistit in eo, ut furor Arcei Uteri placetur, & spiritus furibundi sistantur, quod peragi dicit arcanis internis & topicis externis. Inter priora extollit Gum suum diaphoreticum melle dulciorem & ad ignem fixum, Tincturamque coralliorum volatilis singularem & specifica dote cum Utero symbolizantem. Inter externa, insula commendat ex abrotano, ruta, salvia, veronica, artemisia, floribus sambuci & castoreo parata.

**Scirrhi.** Scirrhi Uteri curationem consistere ait in tartari coagulæ resolutione, quæ peragitur volatilibus gummosis ex olivano, mastiche, gummi Arabico, resina abiegua destillatis, nimis autem calidis remediis Scirrhum Uteri magis in durescere dicit, & ubi affectus internus externum petit subsidium, ut morbus præsens, ungua deforis lapide calefacto, vel arena calida toveri jubet, potenti, enim calore existimat apposita unguenta animari & spiritum Uteri & Archeum, quæ de causa etiam balnea commendat ex Uterinis emollientibus & resolventibus.

Uteri **Sphaceli** curam nullam esse pronunciat, si verò **Gangrana** adfuerit, lixivium, ideo quod acidum necet gangrænæ, in Uterum infundendum esse præcipit.

Uteri **Ulcus** curationem eò dirigendam esse **Flavio** vult, ut venenum & faber ejus, sanguisquis corruptor: acidum nempe, dometur & enecetur, quapropter lapides cancrorum & Gum diaphoreticum interne exhibere suadet, & mundificativa externe Utero immittenda.

**Vulneris ac Dilacerationis Uteri post partum** curationem absolvendam esse refert, quantum possibile, per remedia mansueta & sedativa, virtute balsamica pollentia, quæ Archeo Uteri irritato pacem & quietem conciliant, ideoque internas potiones vulnerarias laudat, quia spiritualis sunt qualitatibus. Lapides quoque cancrorum & ossitragum in spiritu aceti dissolutos, vel in vino bullitos propinat. Externa etiam balsamica Utero infundere præcipit, ut balsama resinatum, herbarum, & florum appropriatorum, ut mellisæ, abrotani, matricariæ.

**Fætu mortui** extractionem admittit, quem tamen muliere dudum mortuam ipse Uterus saepe profingat, cum verò mortuum in tempore cum aliis Auctoribus eximendum esse asserit.

**§. 16. Villisus** in Uteri Inflammatione sanguinem lentescens, & in parte hæc stagnantem sudoriferis attenuat, & ad diaphoretum disponit, eumque aptiorem facit ad venarum oscula subintranda. Partem itaque spiritibus hisce sovet, ut humorum effusorum motum adjuvet.

*℞. Spir. vin. camphorat. ʒij.*

*Junip.*

*Flor. sambuc. aa. ʒj.*

*C. C. succinat. ʒij.*

**M.**

Sed si sanguis effusus nequaquam à venis resorbatur, vel per poros avolet, maturacionem & suppurationem eadem plane ratione, quæ in aliarum partium abscessibus utitur, strenue solet promovere.

**Scirrhum Uteri** curatu admodum difficilem pronunciat, & præter balnea & infusos ex herbis emollientibus parata, emplastrumque diachylum cum gummi Uteri regionis impositum, vix ulterius quidpiam audet tentare.

**Carnes Sphacelo** infectas quantum possibile est, cultro dissecat & tollit, illisque deinceps unguentum Ægyptiacum applicat, ulcusque digestivo tractat & tincturâ ex myrrhâ, & aloë in spiritu vini factâ inungit. Ulcus planè purgatum & mundatum, utalia ad perfectam consolidationem perducit.

In Uteri **Vulneribus & Dilaceratione** vulneraria propinat apozemata, una cum pulveribus ex coralliss pp. oculis ʒss, succino albo, & balsamum de Capabâ sæpius in jusculis exhibet, quin & pellos & injectiones parat, & emplastrum aliquod stipticum è regione partis læsæ foris apponit.

**Fætu mortuum** simili prorsus methodo, ac **Fætu mortuo** alii Auctores, extrahere præcipit.

**§. 17. Juxta Syllium Uteri Inflammationis curatio** in eo consistit, 1. ut compressio vel obstructio valforum Uteri tollatur, 2. ut subsistentis stagnantisque sanguinis motus restitatur. Hippo Auctor hic commendat salia volatilia ex variis animalium partibus parata sæpius exhibenda, quippe quæ omnia singulari ac egregia vipollent

coagu-



coagulata & conglutinata omnia in corpore humano dissolvendi, eademque ad pristinam fluiditatem reducendi, atque insuper sudorem movendi. Propter hæc etiam venæsectionem in talo, vel potius nata in brachio instituendam esse præcipit, sanguinis enim missione sanguini stagnanti motum restituit contendit. Inter topica injectiones commendat ex decoctis emollientibus, ardorem in utero exortum compescentibus, & unguenta, emplastra & cataplasmata externæ Uteri regioni imponenda esse iubet.

Scirrhus.

In Scirrhi Uteri curatione, ubi corpus ægræ humoribus crassis, viscidis, terrenis ac lentis adhuc scætet, incidentia, & attenuantia calidiora, uti aromatica spirituosâ & salia volatilia commendat, & ubi serum maximè peccet, hydragoga laudat, sudorifera & diuretica. Humorem crassum viscidum incidunt aromatica, qualia sunt absinthium, betonica, mentha, radix enulæ, gentianæ, imperatoricæ, centaureum minus, aristolochia, carduus benedictus, crocus, cujus tincturam sive extractum cum vino paratum valde æstimat, ut & Elixir proprietatis Crollii, cum salibus volatilibus paratum. Externè fœtus, emplastra & cataplasmata præscribit ex altheâ, aro, bryoniâ, malva, sigillo Salomonis, Nicotiana, gentiana, sarsaparilla, semini lini, floribus chamomille, meliloti, genitæ, semine agnicasti, polypodio, corticibus cappari, fraxini, frangulæ, foliis ruta, ceterach, semine linapi, myrrhæ, aliisque pluribus. Sic fœtum ex aceto scyllitico ad æctis anaris, centauro minore, absinthio, cum decocto prasii & sigilli Salomonis commendat, vel suffumigia ex galbano, sagapeno, opoponace, bdello, &c.

Gangræna &amp; Sphacelus.

In Gangrænâ ac Sphacelo corruptionem Uteri partium commendat, imprimis in Gangrænâ Uteri incipiente salia volatilia præscribit, ut & oleosa sæpius exhibenda, sic & myrrham, olibanum, mastichem, aloem, aliaque plura, imprimis ex his paratum Elixir proprietatis internè sumendum. Externè infusiones laudat in Uterum injiciendas ex aqua calcis vivæ, vel decoctis herbarum aromaticarum paratas, quò refert foras, suffumigia, aliaque corruptionem integram prohibentia, præsertim theriacalia ac camphorata, quæ ex capite generali sunt petenda.

Vulvus.

Vulvus Uteri curat humores acres corrigendo, in quem finem commendat emulsiones, decocta emollientia ac lenientia ex glycyrrhiza, hordeo, & similibus parata. Ipsa cerebinthinata, ejusque oleum, balsamum Peruvianum, oleum de Capiva dictum laudat, ut & omnia acidum temperantia, inter quæ primum locum tribuit oculis &c. in hoc affectu curando utilissimis. Interdum affectum hunc curandum vult ut luem Veneream, seu gonorrhæam virulentam, quæ etiam sæpe conjuncta est huic ulceri, ejus ergo cura consistit in alteratione ac contemperatione humoris acris ulcus in Uteri valis vel glandulis excitantis, in quem finem præscribit decocta sudorifera, quæ non tantum per sudores, verum per urinas quoque humores peccantes acriores expellunt, ac simul quoque acres acidos simul temperant. Corroborat quoque debilitatas Uteri glandulas per blandè adstringentia & aromatica, sile saltem fixo & acidum frangente donata, caloreum nempe, succinum, myrrham, mastichem, corallia, lapidem hæmatiten, laccaum, quæ internè etiam assumenda studet, &

foris olea quædam, ut mastichinum, & alia convenientia circa perinæum illinit.

Uteri Vulnus vel Dilacerationem à violenta fœtus vel placenta Uterinæ educatione excitatam per medicamenta curat excoarctationem fanantia & consolidantia, qualia sunt omnia blandè adstringentia, bistorta, tormentilla, consolidæ quævis, myrtus, hypericum, corallia, terra sigillata, bolus quælibet, sanguis draconis, lapis hæmatites, &c. ex quibus varias medicamentorum formulas pro ægrota placito parare solet, & præsertim lochiorum fluxu nimio simul præsentè sequenti utitur mixtura.

R. Aq. Plantag. ʒiʒ.

Antepileptica Amstelodamens. ʒvj.

Lap. hæmatit. ʒʒ.

Corall. rub. pp. ʒj.

Laudan. opiat. gr. ij.

Syr. Myrtin. ʒj.

M. & de hac agitata subinde exhibeatur cochlearum unum. Decoctum etiam sequens hoc in casu singularis æstimatefficacæ.

R. Rad. Tormentill.

bistort. aa. ʒij.

Fol. consolid. maj.

fancula.

pyrolæ.

Summit. hyperic. aa. Mj.

Coc. ex aqua ferratâ.

In Colatura ʒxx. dissolv.

Syrup. de Symplyt. Fernel. ʒij.

Aq. Antepilept. vel

Hysteric. Amstel. ʒvj.

M. Exhibeantur bis terve in die ʒij.

Foris etiam unguenta adhibet, linimenta, olea, & emplastra vim leniendi propter dolores ab excoarctatione obortos, & consolidandi habentia, imprimis abdominis parti inferiori, aliquando lumbari quoque regioni illita, vel applicata, qualia existere putat unguentum Martiatum, populeum, adstringens Fernelii, Aureum, calcis, diapompholygos, refrigerans Galeni, &c. emplastrum ad rupturas Fernel. ceratum santalinum, &c. oleum cydoneorum, hyperici, nepethæ, nymphæ, rosaceum, omphacinum, solani, mastichinum, myrcillorum, quibus, ut patet excoarctæ citius consolidentur, & fluxus lochiorum nimis felicius sistatur, etiam opiata solet admiscere.

Ubi proinde satis superque constat de Færibus Partu morbo interitum, jubet Author obstetrici quamvis fœtus partem occurrentem (quantum id partuatus commodè ferre possit) manu prehendere atque allicere, & si reliquum corpus haud sequatur, aut sequi non possit, amputare: atque sic fœtus molem paulatim minuere, donec tandem omnes partes habuerit cum secundis.

§. 18. Cartesians Uteri Inflammatio curatur remediis porolis particulis angularibus sive acies absorbentibus, frangentibus & hebetantibus, ut iisdem ablatis succorum fluxus prohibitus in canaliculis Uterinis restaretur, & omnis stagnatio resolvatur, quapropter sequentem pulverem exhibent, sudorem & urinam promoventem.

R. Ocul. ʒs. ʒʒ.

ʒii diaphoret. gr. viij.

Sperm. cet. gr. vj.

ʒiʒ succin. gr. ij.

Camphor. gr. j.

Cresci



*Croci* gr. iij.

*M. F. Pulvis* insequenti vehiculouñ vice exhibendus.

*℞. Aq. flor. sambuc. ʒ℔.*

*Petrosel. ʒij.*

*Syr. fenic. ʒ℔.*

*M.*

Regionem Uteri etiam fovent discentientibus, ut decocto bryoniae, bardanae, cucumeris asinini, herbarum maticariae, menthae, artemisiae, cicutaiae, petroselinii, feniculi, scordii, ablinthii, charefolii, florum chamomillae, sambuci, meliloti, vel spiritui vini camphorato & crocaro, ex quibus etiam injectiones faciunt in Uterum ipsum, nec non ex aqua calcis vivae, spiritu vini vel matricali, censis, croco & camphora. Abdomen etiam circa regionem pubis & dorsum inungunt unguento martato, dialtheae, oleo camomillae, anethi, terebinthinae, succini, & pessum formant ex emplastro despermate ceti; vel diapalinae, eumque insinuant, vel linteam in formam pelli contortum & filo obductum linimento imbuunt ex bolo Armeno, camphora & spiritu vini, eoque locum inflammatum attingunt. Propterantem verò inflammatione ad suppurationem, foras & cataplasmata adhibent ex radicibus liliorum alborum, althaeae, ceparum, foliis mercurialis, betae, malvae, bractae urinae, floribus meliloti, verbasci, semine fennigraeci, lini, althaeae, farinā hordei, fabarum, dactylis, ficibus, vel unguento Agrippae & basilico locum inungunt & emplastrum de meliloto & diachylum cum gummi invicem mixta imponunt. Ex spiritu matricali cum terebinthinae solum faciunt, cujus sumus per infundibulum ad Uterum inflammatum est dirigendus.

*Scirrhus.*

In *Scirrhus* Uteri ad succos per diuturniorem coagulationem nimium inspissatos incidendos, attenuandos & resolvendos tum martialia laudant, tum spirituosā & salia volatilia, non omnis porosis angulos particularum acidarum coagulantium aborbentibus, frangentibus & hebetantibus, qualia sunt magisterium ovis, oculi cancerorum, ☉ ☿, flores ❄, ☿ succini, feculae bryoniae, myrrha, spiritus matricalis, alla foetida, & id genus alia, ex quibus potissimum remedia in sequentibus formulis exhibita probati erunt usus.

*℞. Facul. bryon. ʒij.*

*Ocul. ʒ. ʒ℔.*

*magister. ovis ʒij.*

*☿ artemis. ʒ℔.*

*Succin. gr. ij.*

*M. F. Pulvis* duobus vicibus assumendus.

Vel:

*℞. Crysal. ☿, ʒij.*

*☿ epur. ʒ℔.*

*☿ li. ☿ ʒij.*

*Flor. ❄ ʒij.*

*M. F. Pulvis*, cui instill. ol. d. macis gr. ij. dividatur, in quatuor doses insequenti mixtura assumendus.

*℞. Aq. matricar. ʒij.*

*mult. ʒij.*

*Essent. rorismarin. ʒ℔.*

*Spir. matric. ʒij.*

*Syr. de Scrophular. ʒij.*

*M.*

Uteri regionem saepius fovent spiritu matricali,

❄, aqua calcis vivae, decocto radicis bryoniae, scrophulariae, cucumeris asinini, herb. ❄, parietariae, atriplicis, cicutariae, florum chamomillae, malvae, meliloti, feminislini, & similium, ex quo etiam injectiones parant uterinas, & cum butyro recenti non salito & oleo liliorum, aliisque, & interdum melle mercuriali enemata, quorum partes subriles per poros intestini in poros Uteri ingredientes, succos inspissatos reddant fluidiores, & coagulatos induratosque resolvant & emolliant. Eadem quoque de causa linimenta & emplastra circa pubem, dorsum & lumbos applicant, ex unguento dialtheae, Agrippae axungiae anatis, gallinae, anseris, oleo terrae, vulpino, laurino, camphorae, emplastro diachylo cum gummiis, de galbano cum croco, vel cataplasmata ex cepis coctis, semine sinapi, sulphore, camphora & spiritu vini parata, hoc in casu quam accommodatissima.

In *Sphacelo* Uteri incipiente maxime allab-  
rant, ut ulterior succorum coagulatio & tubu-  
lorum impediatur obstructio, cum aliis mors  
non procul ablit à foribus, ideoque diaphoretici  
asiduo habent in usu, aliaque spirituosā, por-  
rosa & amara, quorum sequens esse potest for-  
mula.

*℞. Aq. florum sambuc. ʒij.*

*rorismarin. ʒv.*

*theriacal. camphorat. ʒij.*

*Diaf. cord. Fracastor. ʒij.*

*Ocul. ʒ. ʒ℔.*

*Liq. C. C. succinat. ʒij.*

*R Myrris ʒ℔.*

*Syrup. meliss.*

*card. bened. aa ʒij.*

*M. exhibeatur* cochieclatim.

Menses etiam moventia & diuretica frequen-  
tius subjungunt, ut quavis ratione sanguis ad  
motum concitetur & purificetur. In Uterum  
lixiviosa, spirituosā, aloëtica & myrrhata inji-  
ciunt, ut aquam calcis vivae, spiritum matrica-  
lem, theriacalem camphoratum, Decoctum ra-  
dicum angelicae, valerianae, aristolochiae ro-  
tundae, gentianae, Imperatoriae, herbarum ru-  
tae, scordii, alliarum, ablinthii, melissae, salviae,  
maticariae, foliorum rorismarini, florum sam-  
buci, Chamomillae Romanae, hyperici, semi-  
num sinapi, lupinorum, nasturtii, levistici, in  
spiritu vini & lixivio, vel in spiritu vini & succo  
uno vel altero praedictarum herbarum dissol-  
vunt aloën, saccharum saturni, myrrham,  
❄, sumum columbinum, aut unguentum  
Aegyptiacum, uti sequens monstrat formula.

*℞. Spir. vin. ʒij.*

*Succ. rui.*

*chelidon. maj. aa. ʒij.*

*Unguent. Aegyptiaci ʒij.*

*❄ ʒij.*

*M. pro injectione.*

*Sphacelo* vero jam vires & dominium habente, curationem vix salutarem obtineri posse profi-  
tentur, cum mulieres plerumque enecat, lepa-  
rationem enim partis jam emortuae à sanā diffi-  
culter peragi posse hoc in loco, probe norunt,  
& adjacentia viscera nimis citò infici, at totum  
Uterum eximere velle, rem periculosa dicunt  
alea, & rarissime pro voto succedentem, ne  
tamen agram planè neglecturi videantur, inter-  
nè cum Electuario diacordii grana quinque vel  
sex exhibent Mercurii sublimati praecipitati,  
& in-

& injectiones lixiviosas in Uterum instituunt. Facilius interim in ipsa vagina Uteri à sphacelo occupata separationem partis corruptæ à sana institui posse asserunt, cujus rei gratia sæpius per Syringam injiciunt decoctum herbarum antea nominatarum, inlixivio & spiritu vini paratum, additis ꝑeco, saccharo Hi, aloë & myrrha, quibus si separatio nondum pro voto succedat, partem corruptam forcipeprehendunt, & incisiorio conveniente à sana sejungunt, quæ extractâ unguento aureo, Apostolorum, basilico, aliisve suppurationem promovent, & tandem emplastro diapalmæ vel gryseo aut degratia Dei curam absolvent.

Meli.

*Uteri* Uteri ridet ut curent sanguinem purificancia diaphoretica, & diuretica incus exhibent, præsertim ex lignis parata, quæ singulariter etiam prodesse asserunt, quando ex Lue Venereâ originem habuerit, hisque adjungunt porosa & terrestria particulas acutas hebetantia, inter quæ primum locum illis merentur oculi ☿, tum Zium diaphoreticum, terra Melitenfis, vel alia sigillata quævis, ☉ succini, saccharum Hi, camphoræ, aqua calcis vivæ, Tinctura Zii, ☿, quorum formulæ sequentes esse possunt.

ꝑ. ocul. ☿. ʒj.

Zii diaphoret. gr. xv.

Myrrh. gr. vj.

Sperm. cet. ʒb.

☿is succini gr. iij.

Camphor. gr. j.

M. F. Pulvis duabus vicibus exhibendus.

ꝑ. Aq. Matricar. ʒj.

Salv. ʒv.

Calc. viv. ʒiij.

Essent. cent. min. ʒj.

~ matricar. ʒss.

R ☿ ʒar. ʒb.

~ camphor. ʒb.

Syrup. meliss. ʒv.

Card. bened. ʒiij.

F. Mixtura, deur coctileatim.

Per Syringam injiciunt liquores & mixturas detergentes ex aquâ calcis vivæ, mercuriali, spiritu vini camphorato, spiritu simplici, in quo thus & aloë sunt dissoluta, Uteræ benè detergo & mundato, quod læsum est sanant vulnerariis & balsamicis, quibus sequens constat formula.

ꝑ. Conserv. veron. ʒb.

meliss. ʒij.

Lapid. ceratui. ʒb.

Balsam. de Capaib. ʒj.

☿is succin. gr. ij.

Cum l. q. Syrup. meliss.

F. s. a. Eleazarium ad nucis Moschatæ quantitatem una vice exhibendum.

Pulver.

*Vulnera* Uteri curant remediis vulnerariis internis, ut balsamo Peruviano, sulphuristerebinthinato & succinato, Tincturâ Mumiz, Essentiâ traumaticâ, aliisque decoctis vulnerariis & remediis nervinis, qualia sunt decoctum tormentillæ, caryophyllatæ, levistici, salviæ, matricariæ, alehimullæ, betonicæ, verbenæ, faniculæ, quibus aliquando pulveres adsciunt ex coralliis & succino pp. oculis ☿, cinabari Zii, ☿e lumbricorum volatili, vel essentiam rosmarini, spiritum matricalem, tincturam hype-

rici, quæ remedia quoque ordinario potui instillant. Vultus abdominis externum communi tractant more, hoc saltem observato, ut ad Uterum usque læsum nervina infillunt & antispasmodica, qualia sunt oleum lumbricorum, laurinum, balsamus hyperici, oleum castorei, succini, salviæ, macis, rosmarini, vel petreæ, & epicheima ex spiritu matricali calidiusculè imponant. Injectiones vulnerarias ex decocto faniculæ, salviæ, rosmarini, matricariæ, hyperici, cum spiritu lumbricorum succinato, vel essentia castorei singulariter etiam approbant. Dilacerationem Uteri à violenta secundinarum avulsione exortam iisdem curant vulnerariis, propinata internè mixtura ex aquis burse pastoris, tormentillæ, plantaginis, cinamomi cydoniæ. Tinctura terræ catechu, ☿is Oli, spiritus mastiches & syrupo coralliorum. Abdomen forissecus inungunt oleo mallichino, myrtino unguento martiato & epicheima imponunt ex ~ matricali, vel emplastrum sipticum Crollii.

In *Fætum mortuo* eliciendo non statim ad hamulum aliaque accelerant instrumenta, sed convenientibus remediis prius eundem tentant ejicere, quorum felicem operationem, etiam in casibus difficilissimis, ubi nihil quiequam instrumentis obtineri potuit, sæpius experti sunt, qualia sunt horrax Venetus, cassia lignea, sal succini, sabina, castoreum, crocus, semen nigellæ, myrrha, essentia artemisiæ, spiritus lavenderæ, ☿ci succinatus, aqua pulegii, melissæ, serpilli, Dominarum *Myrsicis*. Hæc præmissis vaginam Uteri oleis satis reddunt lubricam, & obstetricem vel Chirurgum manum bene inunctam vaginæ jubent insinuare, & fætum, si possibile est, ita convenienter locare, ut arrepto capite, digitum medium vel ori, vel oculo intrudent, sicque eundem extrahant. Hoc verò si sit impossibile, quem integrum nequeunt, frustulatum conantur eximere, adhibito hac de causa forcipe quadam acuta, qua partes arreptas statim abscindant & extrahant. Econtrâ matris jam emortuæ ventrem distendunt, ut per hysterotomiam hæc fætum vivum e tumba eripiant. Fætum verò mortuum ex matre mortuavelle eximere, si de utriusque extinctione certò constat, rem ducunt esse supervacaneam & nullius planè utilitatis.

§. 17. *Curratio*, me auctore, his in Uteri affe- *Nostri* *curandi* *Uteri* *inflammationem*. *tribus* maturanda, nec moram patiuntur his affectus & symptomata gravia urgentia festinationem petunt. In *Uteri inflammatione* autem omnia eò incumbendum est, ut obstructio in tubulis, valis ac glandulis Uteri facta tollatur, quia in his aperiendis totius inflammationis cura vertitur, & quia acidum sæpè in causa est, hinc commendamus omnia absorbentia, sudotifera ac volatilia, imprimis si malum fuerit à menses vel lochorum obstructione, conveniunt ergo hoc in casu varia Emmenagoga, ut sunt Tinctura lanatica volatilis c. ~ matricali parata, omnia succinata, cinnabarina, pulvis imprimis noster spasmodicus, nyrrhata, aloetica, Camphorata, Castorina, Armoniacalia, Martialia, Zniata, &c. ☿ melissæ, pulegii, cinamomi, arthemisi. ☿ Epilept. Balsam. Embryon. ☿ Regia. Hungar. in pellendis lochiis egregium medicamen. In Uteri Inflammatione, ejusque tumore & instanti gangrena sequentem Essentiam matricalem tanquam polychrestum commendo remedium.

M m m

ꝑ. Gummi.

*Croci* gr. iij.

*M. F. Pulvis* in frequenti vehiculounā vice exhibendus.

*℞. Aq. flor. sambuc. ʒ℞.*

*Petrosel. ʒij.*

*Syr. fœnic. ʒ℞.*

*M.*

Regionem Uteri etiam fovēt discutiētibz, ut decocto bryoniæ, bardanæ, cucumeris asinini, herbarum matricariæ, menthæ, artemisij, cicutarie, petroselinum, feniculi, cordii, ablinthii, chærefolij, florum chamomillæ, sambuci, meliloti, vel spiritu vini camphorato & crocato, ex quibus etiam injectiones faciunt in Uterum ipsum, nec non ex aquâ calcis vivæ, spiritu vini vel matricali, cernisâ, croco & camphorâ. Abdomen etiam circa regionem pubis & dorsum inungunt unguento martiato, dialthææ, oleo canoinillæ, anethi, terebinthinæ, succini, & pessum formant ex emplastro despermate ceti; vel diapalinx, eumque insinuant, vel linteam in fornam pesti contortum & filo obductum linimento imbuunt ex bolo Armeno, camphorâ & spiritu vini, eoque locum inflammatum attingunt. Properante verò inflammatione ad suppurationem, focus & cataplasinata adhibent ex radicibus liliorum alborum, althææ, ceparum, foliis mercurialis, betæ, malvæ, brançæ ursinæ, floribus meliloti, verbasci, semine fœnigræci, lini, althææ, farinâ hordei, fabarum, dactylis, ficibus, vel unguento Agrippæ & basilico locum inungunt & emplastrum de meliloto & diachylum cum gummis invicem mixta imponunt. Ex spiritu matricali cum ~u terebinthinæ fotum faciunt, cujus fumus per infundibulum ad Uterum inflammatum est dirigendus.

*Scirrhum.*

In *Scirrho* Uteri ad succos per diuturniorem coagulationem nimium inspissatos incidendos, attenuandos & resolvendos tum martialia laudant, tum spirituosâ & salia volatilia, non omisit porolis angulos particularum acidarum coagulantium absorbentibus, fragrantibus & hebetantibus, qualia sunt magisterium ovis, oculi cancerorum,  $\Theta$   $\Psi$ , flores  $\Psi$ ci,  $\Theta$  succini, fœculæ bryoniæ, myrrha, spiritus matricalis, alia fœtidæ, & id genus alia, ex quibus potissimum remedia in sequentibus formulis exhibita probati erunt usui.

*℞. Fœcul. bryon. ʒij.*

*Ocul. ʒ℞.*

*magister. ovis ʒj.*

*℞. artemis. ʒ℞.*

*Succin. gr. ij.*

*M. F. Pulvis* duobus vicibus assumen dus.

Vel:

*℞. Crystall. ʒj.*

*℞. ejusd. ʒ℞.*

*℞. li. ovis ʒij.*

*Flor. ʒci ʒj.*

*M. F. Pulvis*, cui instill. ol. d. macis gr. ij. dividatur, in quatuor doses in sequenti mixtura assumendas.

*℞. Aq. matricar. ʒij.*

*mulss. ʒj.*

*Essent. rorismarin. ʒ℞.*

*Spir. matric. ʒij.*

*Syr. de Scrophular. ʒj.*

*M.*

Uteri regionem sæpius fovēt spiritu matricali,

$\Psi$ ci, aqua calcis vivæ, decocto radicis bryoniæ, scrophulariæ, cucumeris asinini, herb.  $\Psi$ alis, parietariæ, atriplicis, cicutarie, florum chamomillæ, malvæ, meliloti, feminis lini, & similibus, ex quo etiam injectiones parant uterinas, & cum butyro recenti non salito & oleo liliorum, aliisque, & interdum melle mercuriali enemata, quorum partes subiles per poros intestini in poros Uteri ingredientes, succos inspissatos reddant fluidiores, & coagulatos induratosque resolvant & emolliant. Eadem quoque de causâ linimenta & emplastra circa pubem, dorsum & lumbos applicant, ex unguento dialthææ, Agrippæ axungia anatis, gallinæ, anseris, oleo terræ, vulpino, laurino, camphoræ, emplastro diachylo cum gummis, de galbano cum croco, vel cataplasinata ex cepis coctis, semine sinapi, sulphure, caniphora & spiritu vini parata, hoc in casu quàm accommodatissima.

In *Sphacelo* Uteri incipiente maximè allabo-  
splan-  
rant, ut ulterior succorum coagulatio & tubu-  
lorum impediatur obstructio, cum aliis mors non procul abest à foribus, ideoque diaphoretica assiduo habent in usu aliaque spirituosâ, porosa & amara, quorum sequens esse potest formula.

*℞. Aq. florum sambuc. ʒj.*

*rorismarin. ʒv.*

*iberial. camphorat. ʒij.*

*Diascord. Fracastor. ʒj.*

*Ocul. ʒ℞.*

*Liq. C. C. succinat. ʒj.*

*R Myrrh ʒ℞.*

*Syrup. meliss.*

*card. bened. aa ʒij.*

*M. exhibeatur coholeatim.*

Menses etiam moventia & diuretica frequen-  
tius subjungunt, ut quavis ratione sanguis ad motum concitetur & purificetur. In Uterum lixiviosa, spirituosâ, aloëtica & myrrhata injiciunt, ut aquam calcis vivæ, spiritum matricalem, theriacalem camphoratum, Decoctum radicum angelicæ, valerianæ, aristolochiæ rotundæ, gentianæ, Imperatoris, herbarum rutæ, scordii, alliarie, ablinthii, melissæ, salviæ, matricariæ, foliorum rorismarini, florum sambuci, Chamomillæ Romanæ, hyperici, feminum sinapi, lupinorum, nasturtii, levisitici, in spiritu vini & lixivio, vel in spiritu vini & succo uno vel altero prædictarum herbarum dissolvunt aloën, saccharum saturni, myrrham,  $\Psi$ cum, simum columbinum, aut unguentum *Ægyptiacum*, uti sequens monstrat formula.

*℞. Spir. vin. ʒij.*

*Succ. rut.*

*chelidon. maj. aa. ʒj.*

*Unguent. Ægyptiaci ʒij.*

~  $\Psi$ ci ʒj.

*M. pro injectione.*

*Sphacelo* verò jam vires & dominium habente, curationem vix salutarē obtineri posse profitentur, cum mulieres pterquam enecet, separationem enim partis jam emortuæ à sanâ difficulter petagi possit hoc in loco, probè norunt, & adjacentia viscera nimis citò infici, at totum Uterum eximere velle, rem periculosa dicunt alia, & rarissimè pro voto succedentem, ne tamen ægram planè neglecturi videantur, inter-  
nè cum Electuario diacordii grana quinque vel sex exhibent Mercurii sublimati præcipitati, & in-



& injectiones lixiviosas in Uterum instituunt. Facilius interim in ipsa vagina Uteri à sphacelo occupata separationem partis corruptæ à sana institui posse asserunt, cujus rei gratia sæpius per syringam injiciunt decoctum herbarum antea nominatarum, in lixivio & spiritu vini paratum, additis æleo, saccharo  $\text{ſi}$ , aloë & myrrha, quibus si separatio nondum pro voto succedat, partem corruptam forcipeprehendunt, & incisioe conveniente à sana sejungunt, quæ extractâ unguento aureo, Apostolorum, basilico, aliisve suppurationem promouent, & tandem emplastro diapalmæ vel gryseo aut de gratia Dei curam absolunt.

*Uteri* ritè ut curent sanguinem purificantia diaphoretica, & diuretica intus exhibent, præsertim ex lignis parata, quæ singulariter etiam prodesse affirmant, quando ex Lue Veneræ originem habuerit, hisque adjungunt porosa & terreftria particulas acutas hebetantia, inter quæ primum locum illis meretur oculi  $\text{ſ}$ , tum  $\text{ſ}$ ium diaphoreticum, terra Melitenfis, vel alia sigillata quævis,  $\text{ſ}$  succini, saccharum  $\text{ſi}$ , camphoræ, aqua calcis vivæ, Tinctura  $\text{ſi}$ ,  $\text{ſ}$ ata, quorum formulæ sequentes esse possunt.

*ſ. ocul. ſ. ſi.*

*ſi diaphoret. gr. xv.*

*Myrrh. gr. vi.*

*Sperm. cet. ſi.*

*ſi succini gr. iij.*

*Camphor. gr. j.*

*M. F. Pulvis duabus vicibus exhibendus.*

*ſ. Aq. Matricar. ſi.*

*Salv. 3v.*

*Calc. viv. ſiij.*

*Essent. cent. min. ſi.*

*ſ. matricar. ſi.*

*R  $\text{ſi}$  gar. 3b.*

*ſ. camphor. 3b.*

*Syrup. meliss. 3v.*

*Card. bened. ſiij.*

*F. Mixtura, detur cochleatim.*

Per syringam injiciunt liquores & mixturas detergentes aquâ calcis vivæ, mercuriali, spiritu vini camphorato, spiritu simplici, in quo thus & aloë sunt dissoluta. Ulcere benè deterfeso & mundato, quod læsum est sanant vulnerariis & balsamicis, quibus sequens constat formula.

*ſ. Conser. veron. 3b.*

*meliss. ſiij.*

*Lapid. ceratit. 3b.*

*Balsam. de Capaib. 3j.*

*ſi succin. gr. ij.*

*Cum l. q. Syrup. meliss.*

*F. f. a. Electuarium ad nucis Moschatæ quantitatem unâ vice exhibendum.*

*Vulnera* Uteri curant remediis vulnerariis internis, ut balsamo Peruviano, sulphuristerebinthinato & succinato, Tincturâ Mumie, Essentiâ traumaticâ, aliisque decoctis vulnerariis & remediis nervinis, qualia sunt decoctum tormentillæ, caryophyllatæ, levisitici, salviæ, matricariæ, alehimillæ, betonice, verbenæ, faniculæ, quibus aliquando pulveres adsociant ex corallii & succino pp. oculi  $\text{ſ}$ . cinabari  $\text{ſi}$ ,  $\text{ſ}$  lumbricorum volatili, vel essentiam roris-marini, spiritum matricalem, tincturam hype-

rici, quæ remedia quoque ordinario potui instillant. Vultus abdominis externum communi tractant more, hoc saltem observato, ut ad Uterum usque læsum nervina instillent & antispasmodica, qualia sunt oleum lumbricorum, laurinum, balsamus hyperici, oleum castorei, succini, salviæ, macis, roris-marini, vel petræ, & epithema ex spiritu matricali calidiusculè imponant. Injectiones vulnerarias ex decocto faniculæ, salviæ, roris-marini, matricariæ, hyperici, cum spiritu lumbricorum succinato, vel essentia castorei singulariter etiam approbant. *Dilacerationem* Uteri à violenta secundinarum avulsione exortam iisdem curant vulnerariis, propinata internè mixtura ex aquis bulcæ pastoris, tormentillæ, plantaginis, cinamomi cydoniatæ. Tinctura terræ catechu,  $\text{ſi}$   $\text{ſi}$ , spiritum mastiches & syrupum coralliorum. Abdomen forinsecus inungunt oleo mastichino, myrtino unguento martiato & epithema imponunt ex matricali, vel emplastrum stipticum *Crollii*.

In *Fætu mortuo* eliciendo non statim ad hamulum aliaque accelerant instrumenta, sed convenientibus remediis prius eundem tentant ejicere, quorum felicem operationem, etiam in casibus difficillimis, ubi nihil quicquam instrumentis obtineri potuit, sæpius experti sunt, qualia sunt horrax Venetus, casia lignea, sal succini, sabina, castoreum, crocus, semen nigellæ, myrrha, essentia artemisæ, spiritus lavendulæ,  $\text{ſi}$  succinatus, aqua pulegii, melissæ, serpilli, Dominarum *Mynsichti*. His præmissis vaginam Uteri oleis satis reddunt lubricam, & obstetricem vel Chirurgum manum bene instructam vaginæ jubent insinuare, & factum, si possibile est, ita convenienter locare, ut arrepto capite, digitum medium vel an, vel oculo intrudent, sicque eundem extrahant. Hoc verò si sit impossibile, quem integrum nequeunt, frustulatum conantur eximere, adhibito hac de causa forcipe quadam acuto, quæ partes arreptas statim abscindant & extrahant. Econtrâ matris jam emortuæ ventrem discindunt, ut per hysterotomiam hanc factum vivum & tumba eripiant. Factum verò mortuum ex matre mortua velle eximere, si de utriusque extinctione certò constat, rem ducunt esse supervacaneam & nullius planè utilitatis.

*ſ. 13. Curatio*, me auctore, his in Uteri affectionibus maturanda, nec moram patiuntur hi affectus & symptomata gravia urgentia festinationem petunt. In *Uteri inflammatione* autem omnia eo incumbendum est, ut obstructio in tubulis, vasis ac glandulis Uteri facta tollatur, quia in his aperiendis totius inflammationis cura vertitur, & quia acidum sæpe in causa est, hinc commendamus omnia absorbentia, sudorifera ac volatilia, imprimis si malum fuerit à menium vel lochiorum obstructione, conveniunt ergo hoc in casu varia Emmenagoga, ut sunt Tinctura lunatica volatilis c. matricali parata, omnia succinata, cinnabarina, pulvis imprimis noster spasmodicus, myrrhata, aloetica, Camphorata, Castorina, Armoniacalia, Martialia,  $\text{ſi}$ niata, &c.  $\text{ſ}$  melissæ, pulegii, cinamomi, arthemif.  $\text{ſ}$  Epilept. Balsam. Embryon.  $\text{ſ}$  Regin. Hungar. in pellendis lochiis egegium medicamen. In Uteri Inflammatione, ejusque tumore & instante gangrana sequentem Essentiam matricalem tamquam polychrestum commendamus remedium.

M m m

*ſ. Gummi.*

R. Gum. Galban.

Ammoniac. aa. ʒiij.

Ol. Juniper. ʒiʒ.

Terebinth. ʒi.

Tacamahac. ʒʒ.

Succini.

ʒ aa. ʒij.

V rectif. alcalif. ʒxii.

Digerantur ad extractionem, dein decantetur. Interne convenit ad guttas x. aut xv. & externe quoque mediante injectione cum aliis liquoribus in Uterum immittit. Sic etiam Spiritus Uterinus Sale volatili & myrrha, aloë ac Camphorâ saturatus, ac cum spongia applicari potest, quem effectum etiam præstat ~ matricalis cum Camphorâ interne ac externe usurpatus. Si patiens fuerit puertpera, res est periculolior, hinc mens reflectenda est ad lochia, num ritè fluant, quòd si non fluant, detur Tinct. myrrh. ʒnii, succini. cum myrrha. Salia quoque volatilia oleosa egregiam sæpè præstant operam; imprimis ~ volat. nostrum cum myrrha paratum, item ~ cephal. cum ol. myrrh. & puleg. maritatus, ~ C. C. compositus, in ʒ scord. mellif. puleg. propinatus. Mixturis his addi possunt ʒ calc. viv. ~ ʒ anthos. succinat. vel Aq. Regui. Hungar. ~ fl. sambuci. Sic si febris adfuerit itidem hoc in calidâ lochia respiciendum est, & ejusmodi remedia exlubenda sunt, quæ horum fluxum promoveret vel saltem non retardant, v. g. C. C. f. ʒ lapid. ʒn. diaphoret. Cinnab. ʒnii, myrrh. ex.gr.

R. ʒ puleg.

fl. cheiri

histeric. aa. ʒi.

Tinct. ʒnii ʒiʒ.

Myrrh ʒi.

Syr. de arthemis. ʒi.

M. Detur coctileum, &amp; quidem per vices.

Sæpius præfenti etiam febris fluunt lochia, sed ob continui solutionem & intus factam stagnationem adeit inflammatio, unde febris & consequenter Convulsiones & mors.

Nihil ergo intermittendum est, sed & ad topica confugiendum. Potest ergo ex herbis salu. scord. rorisinar. menth. sem. aucth. cumini. bacc. Juniper. fl. sambuc. &c. sacculus impleri, & loco affecto calidè imponi, vel decoctum earum calidè per Syringam in Uterum injici; vel:

R. ʒ Calc. viv.

fl. sambuc. aa. ʒij.

~ matricat. ʒi.

Camphor. ʒij.

M. pro Injectione.

Vel fumus excipiat per infundibulum, qui excitari potest ex vaciis gummatibus, Thure, Mastic. Myrrh. succin. scor. regul. ʒnii. &c.

Scurhum.

Cura Scirrhii Uteri ferè eadem est, modò respiciatur hic ad glandularum Uteri obstructionem à sero viscido ac terrestri, obstructio enim in Scirrho est pertinacissima ac non ita facile resolubilis, duro ergo nodo durus applicandus est cuneus. Hoc ergo in affectu conducunt præ aliis interna, imprimis ʒ rea coctilia; ex sequenti Tinctura aperienti egregios obiectavimus effectus:

R. ʒ lios.

ʒ albi. ʒ. aa. lbʒ.

Aq. camini. lbvj.

Coq. agitando ad consistentiam mellis, assun-

de ʒ non rectif. lbvj. digere, decanta & lbj. ab eo evapora, residuum adde Cinamomi ʒij. & fiat Tinctura, dosis à guttis xv. ad xxx. Hoc in morbo instituantur sæpè sudores, imprimis exhibeantur Antimonialia, in quem finem commendamus sequentem Ram ʒnii Orem.

R. ʒ virg. ʒ p. j.

ʒnii vel miner. p. ij.

candefac ʒ in crucibulo, cochleatim injice ʒnium. Stent per horæ quadrantem, fusum adde ʒ ʒiij. vel ʒiij. ad lbj. ubi fluit, effund. & f. Regulus ʒ, quem purifica cum ʒi. ʒ.

R. Reg. ʒ part. iv.

Ori part. j.

funde & assunde, fiatque pulvis, cujus Electri R. part. i. fulminis part. iv. quod fit ex ʒ part. i. ʒ part. 2. & ʒ part. iij. itaque Electrum cum fulmine per vices detonetur in +, funde, effunde & scorias collige à Reg. quem cum novi fulminis part. iv. iterum detona. funde, effunde, scorias collige, Reg. adhuc superstitem eodem modo tracta, donec nihil sit præter scorias, quod si ʒ separetur, adde de novo part. ij. Reg. ʒ & cum fulmine fiant scoriae, ex his extrahe Tincturam primò in liquore ʒ fixi, dein ex hoc cum ʒ rectif. Quòd si minorem sumiseris, quæ melior est, eam tere, aquam assunde, emulge, decanta partem levioiorem & albam, sic portio gravis & bona secedit, eam exsicca. Tinctura hæc Orea maximè est diaphoretica, imò ob utilitatem mirabilis, talis enim Tinctura ad Medicinæ universalis dignitatem aspirat, dosis à gr. x. ad xxx, hujus defectu substituat R. ʒnii Ciata, quæ facilis paratu est, sed purissima, & ab acido ʒris fixata, quæ etiam sua laude non caret, ut & liquor terræ foliæ ʒri. Si hæc aliaque generola non juvant, ad fortiora accedendum est, quæ vitia in lymphâ existentia facile curant, lympham incallatam & stagnantem attenuet & ad motum progressum suum incitant, inter quæ & Mercurialis alius palmam facile præripiunt; sequenti vel simili bolo uti solemus.

R. Conf. ʒ. Hamech. ʒi.

ʒ dulc. ʒi.

ʒ succini volat gr. iv.

M. F. bolus pro una vice assumendus, & sæpe per mensem repetendus. Interponatur vero sequens vel similis mixtura.

R. ʒ Card. bened.

mellif.

arthemis.

puleg. aa. ʒi.

R ʒnii ʒiʒ.

Liq. C. C. succ. ʒʒ.

Syr. de arthemis. ʒi.

M. d. ad vitrum, & cochleatim exhibeatur sapienter per diem.

Injici possunt in Uterum varæ injectiones ex resolutibus paratæ, item decocta tepida, quorum capite generali de Scirrho mentionem injecimus, item fumus ex scoriis Regul. ʒnii. & ex gummatibus aliisque resinosis instituti.

Tubuli nervorum aliorumque vasorum Uteri Gangra si in Gangrana ac Sphacelo Uteri sint vel obstructi, nam ʒ vel angustati, vel abscessi, ita ut debitam Spirituum animalium quantitatem transmittere non valeant, illorum resecratio quantum possibile est, sollicitetur per volatilia incidentia & succum nerveum attenuantia, qui

sape



sæpe nimis existit crassusque, in quem finem sales commendamus volatiles succini, C. C. sangu. human. ~ ❖ ci alcalif. & aromaticis, quibus addi possunt varia Camphorata, ~ vin. Camph. Theriacalis Camph. & Matricalis cum Camphora, qui egregie in *Sphacelo* juvat, ab omni enim corruptione præservat. Uteri partes læsas cunit, & obstructions in nervosis tubulis factas referat, quod & omnia præstant Salia volatilia oleosa, Balsamus Nervinus vel Cephalicus cum oleo bals. Peruvian. maritat. vel Elixire vitæ, & sæpe exhibitus; sudorifera enim quæcumque necessaria sunt, El. dialcord. Tinctura bezoard. &c. Tentetur etiam cura per Mineralia & Metalla fixa, utpote per folia & crocum ❖, arcan. dupl. & diaphoret. Reg. Suii, Arcan. Cinnab. Orat. pulv. spasmod. &c. quæ omnia ex capite generali huc referri possunt.

Inter Topica in affectu hoc tristissimo laudamus inter alia injectiones tepidas in Uterum, quæ sunt ex decocto herb. scord. absynth. Card. bened. Calaminth. meliss. pulg. Sabin. Sem. lupinor. rad. Ostrut. &c. adjectis Camphor. Theriac. dialcord. ~ Matric. vel sequens.

Re. Decoct. calc. viv. lbij.

~ Theriacal. C. 3jv.

fl. sambuc. 3ib.

El. dialcord. 3ib. pro injectione.

M. vel solus injiciatur ~ matricalis cum ❖ calc. viv. adjecta Camphora. Abdomini agri Cataplasmata varia calide imponantur, ad Spiritus animales sepius eliciendos; & obstructions tubulorum nervosorum aperiendas, spirituumque Masticum cottozandorum.

Curatio Uteri in eo consistit, ut particulae acres corriganter ac eliminentur, ad quem finem obtinendum sola diaphoretica ac absorbentia sufficiunt; hic ergo interne conveniunt decocta liquorum, salia volatilia quævis, oculi ❖. C. C. ebur. f. Δ parat. unicornu fossil. imprimis ~ matricalis & quidem sequenti formula præscriptus.

Re. ❖ lignor.

Cochlear.

Puleg. ad 3j.

~ matric. Camph. 3ij.

Elix. vitæ 3j.

~ artemis. 3j.

Syr. sumar. 3j.

M. detur cochlearium, donec sudor prorumpat; Vel ubi purulenta per urinam transeunt.

Re. Ocul. ❖ ppt. 3i.

Ebor. f. Δ ppt. 3ij.

Secul. hyon. 3ib.

~ artemis. 3ib.

succin. volat. gr. iiij.

M. F. pulvis qui exhibetur cuspidatim in vehiculo quodam gratisimo.

Re. ~ matric. 3ib.

Ol. balsam. Peruv. rellif. 3j.

Camphor. gr. xij.

M. detur ad guttas 10. in ❖ mellisæ vel calc. vivæ vel fl. sambuci. Omnia hic conveniunt salia volatilia oleosa, aliaque alibi jam ad nauseam dicta. Inter Topica fiant injectiones ex abstergentibus, camphoratis, aloeticis imprimis ~ matricalis cum balsamo divino nollito maritatus, vel aq. calc. viv. &c. suffumigia etiam instituantur ex variis volatilibus ac resinosis.

Vulnus ac Dilatactio vasorum uterinorum

post partum difficilem eodem modo curari solent: ut ergo tubuli ac vasa lacerata, iterum coniantur, omnia obstacula removenda sunt, ab aere ergo frigido se bene muniat vulnerata, & statim detur restituta aliquod, v. gr. unum vel alterum cochlearium calidi, vel decocti Theæ, qui potus calidus valde refocillat vulneratos, interponantur absorbentia & paululum adstringentia atque traumatica, ut sunt Traumatica, hyperic. corallor. c. cera par. terr. Japon. muniat &c. Essent. veronic. hedet. terr. oculi ❖ cum corall. & terra Japonica egregium hoc in casu existit remedium læpius exhibitum. Si Uterus embryone fuerit repletus & fixatus, tum conducent varia spirituosia reliquis vulnerariis permixta, ut aq. Reg. Inq. cinamomi, balsam. embryon. ~ matric. ol. balsam. Peravian. rellif. decocta vulneraria cum oculis ❖, omnem ferè absolvent paginam 3ij. diaphor. antihæticum Poteri, &c. optima erunt remedia. Inter Topica varia cataplasinata ex vulnerariis & nervinis multo Sale volatili pollentibus parata regionis pubis seu Uteri calide imponantur, ut & emplastra ex gummatosis ac volatilibus oleosis concinnata & applicata. Fortus & suffumigia ex mastiche, olibano, gum. galban. ass. dule. &c. per insudibulum excipiantur. Cum pars Uteri sit valde membranosa, eo semper respiciendum est, ut medicamenta applicentur calidissima, interna etiam sunt simul antispasmodica, in quem finem conducuntur anna Cinnabarina, Castorina, Camphorata, 3iata, pulv. spasmod. hinc & Salia volatilia oleosa, liq. C. C. succ. egregiam navant operant.

Si Signis in Diagnosti superius dictis constet Factum adesse mortuum (si factus enim per 3. vel 4. dies hæserit in partu, meritò habetur pro mortuo); facius est, cum frustratim unicus extrahere, quam ad matris internecionem eum relinquere. Antequam verò ad operationem istam te accingas, permittentium ac prohibentium nonnullarum adhuc habenda erit ratio, & quidem primò considerandum est, num factus iamdum ab aliquot diebus mortuus fuerit; Secundo, an vires Matris vel à partu, vel ab alia causa valde debiles existant; an Vomitus, vel convulsiones adsint, in quibus cunctis casibus res periculi plena est, & vix Chirurgiam admittit. His pensatis in tempore manus applicetur, in selam puerpetis solennem collocet Parturiens, ita ut tibias atque coxas probe retractas habeat, hinc viæ haud lætis patentes laxentur ac dilatentur, vel focu ex herbis emollientibus facto, vel linimentis emollientibus aliisque oleis & axungis inunctis, quo manum inmittere liceat, & quidem tam pro situ fetus explorando, quam eodem protrahendo, quem in scopum ab omnibus Autoribus commendatur instrumentum, speculum Uterinum vocatum, & in *Anatom. Chirurg. Scuteti* descriptum, quod tamen hisce in casibus est ineptissimum, quia fetus per instrumentum hujus expansi apices duriores minusque cedentes magis remoratur, quam ut ipsi transitus paretur liberior, mole enim suâ viam angustat, adeoque nihil, quam dolorem parit, videturque instrumentum hoc dilatatorum saltem præstare ad ulcera aliaque mala profundiori Cervicis Uteri parti inharrentia dignoscenda, ac commodius tractanda, quemadmodum hoc nomine quoque à prudentioribus

ribus Chirurgis admittitur adhibeturque. Confer *Solingen Embryale*, c. 13. *Rohysen Obs.* 1. *Wier. Obsp.* 104. & *Mauriceau* l. 2. c. 33. Commodius vero Cervix cum orificio Uteri interno dilatatur, si labiis pudendorum alterutra manu oleosis innuncta diductis, alterius extensis, simul tamen ita complicati digiti, ut pollicem reliqui absconsum teneant, Uteri vaginæ blandè immittantur, hinc digitis expansis, vagina paulatim ampliatur, usque dum iidem ad ostium Uteri interni pertingat, quod pariter successivè perforant ac dilatant, ita quidem, ut si fœtus caput immineat, inter hoc & posticam Uteri partem, aut sanè à latere ejus digiti ad ipsum Uteri fundum percingant, quod verò corruptum jam est, amputandum, ne pars sincera trahatur, idque vel sectione, vel ulsione, vel ligaturâ, quod tamen difficillimè fieri potest, nisi propendat pars corrupta foras; cum fœtu verò relicto mortuo pro arte incedendum est. Quoniam tamen fœtus mortuus protrahendus, atque situs ejus quandoque diversus sit, hinc quoque fœtus diversimodè movendus ac ad exitum dirigendus est. Si ergo caput ad cervicem Uteri inclinet, in vaginam Uteri immittatur manus oleo quodam innuncta, orificium Uteri internum doloribus accedentibus probe dilates, & si hoc haud sufficiat, aut eadem manu aut utriusque manus digitis anterioribus caput fœtus ponere aures comprehendat, aut eosdem ori imponat Chirurgus, novoque imminente parturienti conatu eum adtrahat, cavendo, ne forsan funiculus umbilicalis collo aut alii ejus parti circumvolutus rumpatur. Extractio tamen hæc tali modo fiat, ut capite in latere agitato, dum hoc egreditur, humeri illius locum obtineant. idque sequatur. Si adest hydrocephalus, vel caput nimis grande, illud per incisionem vel diffissionem dissolvatur, ut per angustias prodire valeat. Aliquando accidit, cum capite fœtus tunicâ cervicis rugosâ simul deprimi, in illis maxime feminis, quæ ad hanc precipitentiam inclinant, in quo casu parturiens non sedet aut ambulet, sed supina decumbat, nec ipsi inficiantur cunæ, uti fieri solet, nec vagina lubricantibus inungatur. sed digitis lateribus Capitis fœtus, uti supra dictum, applicatis. Si dolores recurrant, rugæ vaginæ sursum cogantur, sique fœtui via pareat libera. idem tamen nunquam fortius extrahatur, sed sensim ac blando duntaxat conatu, ut scilicet altera manus eum parum commoveat, dum altera in reponendis rugis occupatur. Si fœtus progressus ratione capitis impeditur, si nempe id ex parte osibus pubis matris immoretur, aut si illo intorto & ad alterutrum humerum aut dorsum reclinato, ita ut facies prius eminens ad exitum nitatur, in priore casu super lectum resupinatâ parturiente humeris apprehensis, fœtus sursum urgetur, ut caput cervicem Uteri plenè & absque ullo obstaculo ingrediat, at quoniam hæc compressio in fœtu vivo facile evaluationem sanguinis aliorumque fœcorum, & sic per consequens Spliculum sæpè producit, hinc genitura tandem enecat, quod si accidat, simili modo, reclinetur femina supina, ita tamen ut si versùs alterutrum latus fœtus caput torqueatur, in oppositum aliquantum decumbat, hinc Chirurgus manum ad latus capitis immittat, illudque sensim reducere conetur, quod verò non respondet, usque ad humerum manum mittat,

iisque paululum retrusis ulterius manus digitos anteriores, reductionem capitis in auxilium vocando. Quando brachium aut manus eminet, resupinatâ clunibus elevatis parturiente allaborandum, ut brachium reponatur, (non tamen, ut fieri solet, in vaginam saltem, sed ipsum Uterum) & secundum corporis latuse extendatur, quo facta sunt, qui pedibus apprehendunt & extrahunt: quia tamen caput orificio Uteri propinquius est in hoc corporis situ, commodius videtur, vel brachio reposito caput adducere, vel idem brachium forcipe excisorio secare, quod factum sæpius observavimus, quo tamen non fuit præstitum, ut reliquæ partes eximi potuerint, sed decrepita adhuc hyeme duæ matronæ hujus civitatis miserè vitam suam cum fœtu deponere coactæ fuere. Abdomine verò aut pectore fœtus orificio Uteri obverso, ut funiculus umbilicalis propendat, manibus pedibusque ad Uteri fundum reflexis, supinata, ut dictum, parturiente, tentandum, an fortasse alium hæc ratione fœtus situm conciliare liceat. Hinc an abdomen, an thorax orificio Uteri propinquior sit, exploretur, ubi in priore casu humero comprehensus fœtus reponendo ita commoveatur, donec caput compareat, sinistrâ manu juvandum. Sin vero inferior tunc pars promineat, pedibus potius fœtus educatur; imò ad mentem *Mauriceau* c. 25. etiam in priori casu, ita tamen ut juxta hunc per dorsum & nates potius manum & pedes deducat Chirurgus, quam ut per abdomen ascendant. In genua vel utraque, vel alterutrum si prodeat fœtus, operatio facilius videtur, cum pedes orificio Uteri magis propinqui sint. Genua itaque sursum compellantur, donec pedem alterutrum successivè educere liceat. Quod si verò genibus tam firmiter is innitatur, ut commoveri nequeat, instrumento accommodato tibia altera resecetur, quo alteri pedi plus spatii, ut & toti corpori regendo comparetur, hinc altero genu extenso fœtus educatur, imò si ne hac ratione procedat negotium, altera quoque tibia amputanda. Quando alterutro pede intra orificium Uteri comparet fœtus, imprimis certus sit Operator, an unus fœtus, an gemelli subsint, ne utriusque gemelli alterutrum pedem apprehendens, partum difficillimum, imò impossibilem reddat. Hunc in scopum secundum ductum prominentis pedis manum Utero immittat, usque ad pubem fœtus: hinc ad extremitatem reitantis per nates declinet: sic enim poterit certus esse, unus corpusculi pedes se arripuisse iisque fœtum tutissimè & facillimè educere, postquam qui primus prehendebatur, aliquo modo retrusus fuerit. Si utroque pede idem orificio Uteri obvertatur, in tali quoque corporis situatione partum adjuvare debet obstetrix, fœtum primò pedibus extremis, hinc tibiis, tandem circa femora & lumbos apprehendendo. Minimeque audiendus est *Dalchamps*, qui eundem invertere & capite educere jubet.

Quod si verò manus & pedes simul exerat fœtus, sunt quidam, inter quos *Ruffus*, qui manus & pedes reponere, ac caput adducere jubent. Verum quoniam nec pedes cum manibus adeò facile sursum impelli, nec caput sine magna difficultate adduci valet, *Mauriceau*, c. 22. & *Solingen*, c. 26. manuum repositionem, & fœtus per pedes extractionem iussit utere jubent, imò si brachia.

brachia non facile retro agi queant, eademali-  
quando refecare convenit.

Hysteromatocia necessaria quoque videtur,  
ubi fortis & Mater vivunt, nec à se invicem alio  
modo liberari valent, seu matris, seu fœtus cul-  
pâ hoc pariter contingat. Interim utut hæc  
omnia ita se habeant, manet tamen dubium, an  
Sectio Cæsarea in Matre vivente absque summo  
hujus periculo administrari queat, quod negant  
*Pareus, Guillemeau, Rolsinc*. Affirmant idem  
alii & quidem per exemplalia, quibus opera-  
tionem hanc feliciter successisse testantur, vid.  
*Cornarius Histor. admirab. 6. & 7. Roussel. de  
part. Cef. S. 1. c. 5. & Roonhuyfen part. 1. Obs.  
Chir. p. 56.* Quorum tamen posteriorum argu-  
mentis, & quidem primò hoc licet reponere,  
quòd in a hirundo non faciat ver, *Roussium* cum  
nunquam & vix ullus post eum vidit. Testatur  
siquidem *Guillemeau*, bis quidem operationem  
illam se celebrasse, & aliquoties ab aliis celebra-  
tam vidisse, ait omnes peritisse: ac *Rolsinc*, se se-  
mel tantum cum infaulto successu eam aggres-  
sum fuisse refert. Periculosissimam proin &  
nunquam exercendam in Matre vivâ hanc dici-  
mus operationem.

Nam autem operatio hæc mortuâ jam Matre  
conveniat, vel alicujus usus sit, dubitare viden-  
tur nonnulli, pro impossibili & abscondito habentes,  
Matre mortua fœtum ad momentum super-  
vivere posse, cum hujus vita ab illius incolumi-  
tate dependeat, quales sunt *Verandus de Morb.  
Mulier. Lib. 2. c. 6. & Baulinus* in Epistol. De-  
dicato. Ronslito præfixa. Imò *Rodericus à Cas-  
stro de Morb. Mulier. l. 4. c. 3.* præcipit, ut ope-  
ratio hæc, antequam Mater plenariè expiret,  
adornetur, quæ tamen præceptis ac observati-  
onibus Anatomicis refragantur, quibus fœtum  
propriâ vitâ vivere constat, ita ut horz, imò diei  
terè spatium intra Uterum matris mortuæ sit ali-  
quando superites observatus fuerit. Matrora  
quædam gravida apoplexiâ illicò extinguitur,  
fœtus altero die se adhuc movebat, me ipsomet  
observante. Ipsam ergo operationem antequam  
aggrediatur Chirurgus, in omnibus cautè pro-  
cedat, ne fœtum lædat. Plura qui de partu aut  
sectione Cæsarea desiderat, *Ronslitem*  
ejusque Interpretem fidelissimum  
*Bambinum* adire ne  
graveatur.

## CAPUT VI.

De Pudendi muliebris Carunculis, Pruritu, Ejus Labiorum  
Tumore, & Imperforatione.

## §. I.

**D**E Partis hujus obsecenæ affectibus tra-  
ctaturi, jubemus hinc procul abesse pro-  
fanos, & arcenos, qui veneceis verbis la-  
scivastitillant aures. Nec etiam moramur mo-  
rosos illos,

*Qui Curios simulant, & Bacchanalia  
vivunt;*

quique mores spectabant ex verbis. Fateatur  
illum moribus non exprime Catonem, qui  
dictione Catullum; sed Medici, ut olim Stoici,  
nullam in verbis turpitudinem aut obsecenita-  
tem agnoscunt. Constitutionis humanæ filii  
audiunt, & candide nihil aliud fœcum dicunt,  
quàm fœcum. Casta meditantibus, castè viven-  
tibus, nos casti, hæc castâ mente legenda pro-  
pinamus ab omni obsecenitate abstinentes.

Pronatantur itaque ex Pudendis muliebris  
bubus aliquando *Caruncula*, quæ sæpè funiculis  
adherent, prout ejusmodi carunculam ex rimâ  
pronatam & duobus funiculis adhaerentem in  
virgine ætatis 45. observavit Illustris D. *Volka-  
merus*, *Præf. Collegii Leopoldini*, *Fantor* ac  
*Amicus noster summo perè colendus.*

Pudendi  
muliebris  
Carun-  
cula.

Pruritus.

Interdum partes hæc genitales sive Vulvam  
vexat *Pruritus*, qui affectus tum puellas, tum  
fœminas juniores, præcipuè verò annosas affi-  
cit, uti plerique inter Practicos statuunt, de  
quo *Mercatus, Actius, Sennertus, Joël & Roder.  
à Castro* distinctis capitibus tractant, cui pro-  
ritui nonnunquam Labiorum *Tumor* solet con-  
jungi.

Labiorum  
Tumor.

Quemadmodum etiam infantes sæpè officio  
ani occluso nascuntur, ita nonnunquam & fœ-  
mellis sinus pudoris in Utero Matris membranâ  
quâdam obducitur, cujus mali observationes  
quædam exstant apud *Schenkinum l. 4. Obs. 12. 13.*

Sinus Pu-  
doris Oc-  
clusus.

14. *Fabr. Hildan. Cent. 3. Obs. 60. Sennert. Insti-  
tur. Med. libr. 5. p. 1. f. 21. 7.* Pudendorum labia,  
& Næhic Castellis vidimus ita coalita, ut mini-  
mum pîsum in cînam vix intrâdi potuerit, quæ  
urinam solùm effluere permittebat, quale quid  
etiam annotavit Celeb. D. *Simon Schulzium* in  
*Eph. Germ. Ann. 3. obs. 3.* ubi Chirurgus quidam  
naturalia puellæ inspiciens, invenit eadem  
membranâ validâ obductâ, vix conspicuâ ri-  
mâ, quasi acn leviter facta ver sus intestinum re-  
ctum apparente, per quam urina in vagina cu-  
mulata non stillabat, sed vix transfudabat; ul-  
terius instrumento illuc intruso invenit mem-  
branam admodum crassam, circuncirca cum  
carnosâ parte femiter tonnexam, imò cum ipso  
meatu conjunctam, unde puella dolorem gra-  
vissimum in urinæ emissionem percipiebat. Uti  
etiam glande non perforatâ puellus nonnullos  
genitos fuisse, à Græcis *Varro* & alijs dictos,  
testantur Auctorum monumenta, quemadmo-  
dum in Polonia D. *Palsius* observavit in *Ephem.  
Germ. Ann. 9. & 10. Obs. 105.* quòd quis fora-  
men aliquod vel potius vestigium foraminis in  
extremitate glandis conspicuum habuerit, quòd  
tamen non pervium fuerit, tam pro urina quàm  
semine effluxuris. Sic dum hæc scribimus infans  
unius mensis nobis offertur, cujus penis rimâ to-  
taliter obstructa est, & urina ad latera penis per  
duas rimulas effluit, & quidem per foramina  
minutissima vix acum admittentia: Itâ clausula  
etiam hæc genitalia muliebra in puellis aliquot  
novi, solâ resistente urethrâ seu ductu urinario,  
ad urinam emittendam apto.

§. 2. *Parti affecta* horum affectuum est *Pu- Parti affe-  
dendum muliebre*, quòd constat fistula magna, An.  
labii, monticulis & pilis, &c. quæ omnia Pu-  
Mam 3 dendo.

dendum nomine indignantur; propterea, quod importuno tempore & loco detecta, feminis pudorem inferant. Dicitur etiam *Vulva*, à valvis, vel aliis à volendo. eò quòd infatigabiliter coitum desideret in lascivis, juxta istud *Prov. cap. 30.* Tria sunt infatigabilia, infernus & os vulvæ & terra. Partis hujus situs, ut opinor, omnibus notus est, & rarò istum sub axillis quærent; sita enim est extrinsecus intra ossium pubis & ani regionem, similemque cum genitalibus virilibus locum occupat, nempe in imi ventris regione, ut coitus tantò facilius peragatur, & ut intestinorum faeces eò commodius sine aliarum partium defæcatione excernantur. Primaria pars pudendorum optimo jure *Rima* sive *Fissura magna* vocatur: quia ab ossium pubis inferiori parte ad anum ulque pertingit, ità ut inter illam & anum spatium, quod Perinæum dicitur, vix pollicis transversæ latitudinem excedat. Quod autem *Fissura* in mulieribus ita magna ordinata sit, ratio hæc est, quoniam externa cutis ad dilatationem haud tam apta existit, quàm membranacea pars, ex qua interna illius fissuræ substantia componitur; difficultati, quæ parturientibus suboriri poterat, prudenter tam amplo prospectum esse aditu. Ulius hujus *fissuræ*, est, canalis modo penem tanquam in fossam dirigere, urinx, mensibus, lochiis aliisque corporis excrementis exitum præbere, & fetus exclusioni inservire. Parietes sive latera hujus Pudendi, *Labia* seu *Labra* dicuntur, quorum cutis inferior ligamentosa ab Anatomicis *freinum* labiorum dicitur, quod in virginibus tensum, in puerperis laxatum plerumque conspicitur. Pubis verò partem, quam montem Veneris dicunt, quia in Veneris caltris militatur, omnium primò hunc conscendere debent, Reliquas verò partes nempe pilos, &c. nunc non examinabimus, quia ad nostros non pertinent affectus.

**Diagnosi.** §. 3. *Caruncula* Pudendi muliebris cognoscuntur ex inspectione & relatione patientis. Sæpius *Excrecentiæ* hæc seu *Caruncula* sunt fungosæ & extra pudendum prominent, quale quid legi potest in *Ephem. Germ. Ann. 2. Observ. 121.* observante *Celeberrimo Dno Segero*, Confer quoque *Ephem. Germ. Decur. 2. Ann. 2. Obs. 186. fol. 413.* Hinc sæpe menses subsistunt, vel maximo cum dolore excernuntur, in hypogastrio præsertim, quos excipit sæpè in pudendo tumor, qui quotidie crescit, ut agræ Medicatrici in consilium vocare adigantur, urina quoque his in casibus difficulter & cum dolore sæpe excernitur.

*Pruritus pudendorum* cognoscitur ex eo, quòd circa vespèram & noctem exacerbetur, hinc sunt sæpè fricatricæ, imò instar scabiei illas vexat hic pruritus, & ipsis valde molestus est, diuque durat, & inde nonnunquam inflammatio hujus partibus accidit, quare de febre, calore & aliquando de Tumore inflammatorio conquerruntur misellæ.

*Tumor labii Pudendi* facile accidit & ipso visu apparet, quem nuper in puellâ quintum annum nondum egressâ, à lue Venereâ, & quidem ex contagio infectâ, observavimus, durissimum scilicet ac intensè rubescens, ut maximos inde dolores pati deberet misella puella, quæ jam peccata suorum parentum luere ac ferre cogebatur. Aliam novimus fo-minam eadem

lue infectam, cuius pudendi labrum dextrum ità intumuit, ut singulare ad id ligamentum efficere debuisset, & sic subligaculo hoc retinere cogere hunc tumorem; Lue enim Venereâ infectis ejusmodi tumores solennes esse solent, ipsisque gressum impediunt, & justo Dei judicio per id puniuntur, per quod peccarunt lascivæ istæ adulteræ.

*Imperforatio* Pudendorum muliebrum à relatione agræ, vel consanguineorum, vel parentum, vel ex ipsa inspectione patet. Quo meatus est angustior, eò & difficultius urina excernitur; si verò urethra planè fuerit obstructa, nullum excernitur lotium; quæ omnia locum accuratè insipienti innotescunt; hinc non opere pretium duximus plura hæc vice de *Diagnosi* adicere.

§. 4. *Galenici* existimant, *Carunculas* Pudendi muliebris ortum sumere à lue Venereâ, muliebris vel ulceribus rugas pudendi interiores erodentibus, ut tumor nutritus extille; qui demum incrassatus ac condensatus abeat in tales carunculas excrecentesque, ad quod etiam faciat affluxus humorum pituitosorum.

*Pruritus* in cervice Uteri, mulieribus præsertim annosis, easdem cruciatus & scalpendi necessitate ità fatigantem, ut somnum adimat, oboriri credunt à congestione aut affluxu pituitæ falsæ, quæ cum in rugas pudendi decumbat, importuno scalpendi desiderio illato multum exhibeat negotii, in alias verò corporis partes sese spargens, ibidem urentem & prurientem faciat scabiem.

*Tumoris* Pudendi muliebris causâ constitunt vel influxum humoris calidi biliosi, vel sanguinei in rugas & musculos partium harum sæpe ab externis causis productum, ut coitu rudiori, vel ipsâ lue Venereâ, vel congestionem humoris pituitosi, vel melancholici ex debilitate facultatis coëctricis non satis elaborati, & expultrici ibidem retenti, vel quoque materię copiam & spissitudinem in senine à facultate formatrice imbecilliore minus justè distributam, unde labia Pudendorum tumida reddantur.

*Imperforationem* Pudendi hujus in ipsis Uteri claustris ab errore facultatis plasticæ produci plenius asserunt buccis, vel ab ulceribus ità reddi male curatis, dum foramen istud in tantum constrictat, ut excernendis & immitendis nullus vel difficillimus concedatur transitus & aditus. Ut plurimum verò adscribunt naturæ exordii, dum ob errorem aut debilitatem facultatis plasticæ foramen hoc non satis fuerit elaboratum.

§. 5. *Paracelsus* Pudendi hujus muliebris *Carunculas* per excrecentiam novæ generationis produci scribit, dum nempe natura abundantiam ex centro generationis proferat, quæ juxta cervicem hanc, in qua accumulata & coacervata fuerit ex mensibus, in carunculas hæc abeat.

*Pruritus* Vulvæ ex luxu & Veneris intemperantiæ sæpè provenire scribit, & aliquando lue Venereæ conjunctum esse asserit. Ipsius verò Pruritus vulvæ origo juxta ipsum ex cruoribus emergit in cervice resolutis, quibus accessit alimen minerale scissum.

*Tumorem* Pudendi produci existimat non tantum à collectione humorum, sed etiam à liquore in pudendi rugis corrupto; aliquando post actum Venereum exurgere cum calore statuit, & in urinx sanien nonnunquam cerni, quem



quam provenire vult ex huiusmodi materia, quæ citius, quam decuit, radices egit, nec eundem propter locum à bubone differt.

*Imperforationem* Pudendi muliebris fieri dicit ab inæqualitate seminis, & quod natura in liquore vitæ haud sit perfecta; ut plurimum verò, quod sperma, ex quo extrusit Uteri elaborari debet, aut defectu, aut excessu peccet; unde in superfluum transeat additamentum, quod meatum hunc Uterinum adeo ad propagandum hominem necessarium occludat, in quo natura aberranti totum hoc vitium existimant ad scribendum.

*§. 6. Helmontius.* Vulvæ *Carunculas* oboriri dicit ab eadem causâ, abs quâ lues Venerea excitatur, imprimis verò à fermento venenoso infolidis & liquidis partibus coagulato, qui morbus aliquando occulte serpit, & si patiens celaverit suspectum conubitum, non facile cognoscitur lues, at per carbunculos, gummata & apostemata se quandoque explicat.

*Pruritus* Vulvæ dicit sal esse pruritivum in partibus hisce genitalibus impetium sibi sapiens, & ab indigestione natum. Salia ejusmodi habere posse existimat rationem salium transmissorum, fermentis viscerum male affectis vel impeditis, quæ transmissa æthereos in furorem concitant, ut ii deinde totaliter incandescant, fermentali veneno pruritivo circa partes hæc producto.

*Imperforationem* quod attinet, cum aliis Authores consentit.

*§. 7. Juxta Willisium* Vulvæ *Caruncula* sunt à commixtis succo nutritio lentefcente, & sanguine abundantius in regionem hanc delatis, partesque, in quibus commorantur, oppletis, atque in his ob visciditatem in *Carunculas* excreveritibus.

*Pruritus* excitatur à seroso humore particulis salinis acerbis infecto. Ille enim ad cutaneas Pudendi glandulas deveniens, tales in ipsis deponit particulas quæ nervas fibrillas in eis dispersas pungentes & vellicantes pruritum sensationem creant.

*Imperforata* in lacem prodeuntes tale secum afferunt vitium in primâ conformatione ipsis communicatum, in his enim vel fibrae Pudendi densiori pressiorque ordine dispositæ, sibi in vicem artius coherentes, rimæ cavitatem adeo angustam reddunt, ut vix in eam pateat aditus. Vel plures nervæ fibrillæ ab Uteri parietibus pullulantes sibi adversam partem petunt, & sibi invicem decussatim incumbentes membranulam efficiunt, quæ vulvæ aut cervicis Uteri ostium occupat.

*§. 8. Sylvius* Pudendi muliebris *Caruncularum* causam reputat materiam pituitosam, sed valde tenacem, viscidam & coagulam, accedente acido austero, eam in *Carunculas* commutante.

*Pruritus* causam dicit humores acres acidosque in partibus Pudendi hærentes, & pruritus doloremque excitantes.

*Tumor* Labiorum juxta ipsum eundem oritur à stagnatione humorum crassiorum ac pituitosorum partes labiorum pudendi in tumorem elevarunt.

*Imperforationem* dicit Auctor hic esse vitium à primo orthæ & connatum, quod dum haud observant in tempore matres, ipsius quoque curam in primâ ætate parvo negotio abolvendam negligunt, quapropter, ubi ad pubertatem venerint puellæ, atque menstruus excitatur fluxus,

nec tamen prodit, verum sensum incommodum parit, prius ad partem affectam non attenditur, tum propter verecundiam, tum quia tale quid non creditur, donec tandem tumor grandis & dolor atrox in pudendis se manifestans cogit etiam maxime pudibundas, auxilii causâ conspectum istarum partium concedere tum Medicis, tum Chirurgis.

*§. 9. Carlesianus* videntur Pudendi muliebris *Caruncula* ex succo chyloso per corollos à parietulis quibusdam acutis tubulos emanante, & absumentis partibus ejus volatilibus à materia subtili easdem auferente, incralato & coagulato pronasci. Communitari verò existimant membro huic particulas istas acutas erodentes vel à semine virili veneno venereo infecto, vel à fluxu albo & liquore glandularum vaginalium acriori, vel urina isdem resecta, abs quibus liquoribus ulcuscula prius exierunt, quæ cum assiduo à præterlabente urinâ attingantur, consolidari nequeant, sed liquoris chyloso nutriti perpetuis concedatur affluxus, quo in superficie subsistente, & per quietem diuturniorem in profuso carnosa hujusmodi exurgant incrementa.

*Pruritus* in Pudendo hoc suscitari putant à particulis quibusdam angularibus subtilioribus & mollioribus, cum aliis quibusdam porosioribus invicem variè, sed leviter & blande fætem commotis, in tubulis membri hujus extremis à liquore quodam fissiore obstructis, unde hæc, ut anguli isti latera fibrularum quarundam nervarum aliquantum quidem fortius, quàm agitati aliàs fuerint, commoveant, sed absque graviore vehementia & circa ullam diffensionem, quapropter in mente sensus ejusmodi excutitur, titillationis, quando verò anguli quidam durescentes cuspidati sint intermissi, qui motu intestino ab ambiente calore lecti vel hypocausti prompto vehementius agitentur, & fibras istas majori in parte attingant, pruritus emergere dicunt dolorosum & pungentem, in vetulis præsertim, quàm in junioribus frequentior, quod succis abundem crassioribus, & ad celeritorem per tubulos transfluxum minus dispositis.

*Tumorem* Pudendi muliebris à succis quibusdam particulis volatilibus depauperatis, & tubulos obstructis oriri pronuntiant, hos enim ad motum minus promptos in tubulis istis stagnare credunt, & novos affluentes circa eosdem subsistere, cum transitus isdem denegetur, sed à collectâ hæc succorum copia fibras distendi & partem in prominentiam quandam augeri. Antequam quandoque obstructioni isti præbere referunt lumen Veneream, liquores acres persistentes, contusiones aliasque offensiones glandulas cutaneas destituentes, quarum succi corrupti incrascentur, stagnent & tubulos infarciunt, res quasdam ineptas admotas, uti frigidas, æthere modo poros occludentes & liquores in fluore & motu suo impeditentes.

*Imperforationem* Pudendi in Utero facti contingere credunt à succis crassioribus & copiosis spiritum efformantem obruentibus, quare fibrae pro rima continuanda jam elaborandæ satis flexi & incurvari nequeant, sed violentius potentia utrinque fortius conglutinentur.

*§. 10. Indagationibus* porro Nobis causam *Caruncularum* Pudendi muliebris primariam dicimus esse succi nutritii, auto & sanguinis aliorumque succorum circulantium circa partes hæc collecto.

tum rubeum.



rum acrimoniam, accedente simul acido coagulante, hinc præruptis vasis, succi isti coagulantur, & cum flagrant, tandem in talem transeunt carneam massam. Remotiores ergo causæ omnes sunt, quæ succos in corpore actiores reddere possunt, hinc *Excrecentia* & *Caruncula* scorbuticis, imprimis verò lue Venerea laborantibus accidere solent, quæ sciant salisacribus, serosis, acidis & corrosivis particulis ad affectum hunc producendum appropinquat.

**Pruritus.** Causa *Pruritûs Pudendi muliebri* est, me iudice, quando particula non adeo tenaces, sed potius volatiles paululum aciores his in partibus genitalibus muliebribus collectæ, per allisionem aliarum particularum alluentium & circulantium appellantur, & appulsio totius massæ sanguineæ aliorumque succorum non fortis, sed tantum debilis est, hinc diutaxat cum miti & blando motu allidunt succi hi, per quem motum blandum fibræ tantum levi modo pulsantur premunturque, exinde ergo potius titillatio, quam dolor sequi debet. Quod verò noctu magis hic pruritus excutitur, ratio hæc est, quia in lecto, quando faciem læ cooperat sunt, corpus earum continuò transpirat, hinc necessariò fermentatio in succis stagnantibus & motus intestinus oboriri debet, quo particula in partibus hisce affectis, imprimis in labiorum vulvæ glandulis commoventur, & ejusmodi produciunt pruritum, ipsis aliquando per tempus gratum, sed & dein valde molestem.

**Labiorum Tumor.** *Tumoris Labiorum Pudendi muliebri* causæ esse possunt vel *interna* vel *externa*, quæ provenire possunt à lapsu, contusione, &c. hinc enim facile stagnatio succorum fieri potest, quam excipit *Tumor*. Causa interna possunt iidem esse plures, à quibus tantum succi in corpore incrassari valent; sic si partes hæc à motu nimio vel violente nimis dilatentur, fibræ aliæque vasa rumpantur, ut succi effluent stagnentque, hinc tumor hic facile oboritur. Sic quoque in Partu difficili, si hæc partes ab obstetrice vel Chirurgo nimis fortiter constrictæ, facili Marte affectus hic produciat exterius, quale quid in pluribus parturitibus observavimus. À particulis item acerbis vel in massa sanguinea, vel aliis in succis hospitantibus, & his in locis obsecenis imperium sibi sapientibus, canaliculos tubulosque perforando Tumor hic inferri potest, hinc videmus lue Venereæ laborantibus facile hunc tumorem obvenire, quia in his succi facile coagulabiles existunt.

**Imperforatio.** *Imperforationis Pudendi muliebri* causa est ipsa conformationis in Utero aberratio, dum particula quædam glutinosiores, & ad motum minus prompte inter fibras pro foramine constituendo sejungendas intercedunt, quæ non permittunt, ut rima hæc exactius elaboretur, aut fibræ latius diducantur.

**Prognosis.** §. 11. *Prognosis Pudendi muliebri* affectuum quod concernit, *Caruncula* hæc maximum inferunt incommodum, coitum impediendo, imò aliquando sanguinis menstrui excretionem ordinariam accendo, & hinc plurima mala, & pessima oboriri solent symptomata, imprimis si fuerint magnæ Excrecentiæ, meumque urinatum premant, & urinae inhibeant transitum. Quandoque Excrecentiæ hæc in gangrenam ac Sphacelum abeunt, quale quid observavit Celeberr. *Sergius* in prædictis *Ephem. Germ. Ann. 2. Obs. 121.*

*Pruritus Pudendi* nihil quidem per se infert periculi, attamen valde est molestus, & particula acres subtiliores à calore sub plumis aucto suscitata quietem turbant, & fibrulas blande vellendo digitorum admotionem expostulant, sed dum partes hæc diutius & fortius scalpuntur, sæpe post factum pariter actum, & voluptatem ipse dolor subsequitur.

*Tumor inflammatorius* partium harum obsecraturum si fuerit à contusione vel aliâ externâ causâ, facilius est curatur, quam si à lue Venereâ fuerit productus, & quasi scirrhosus, tunc enim tumores hi curatu difficillimi sunt, & quandoque feminas ad mortem usque comitantur, nisi iis succurratur remediis convenientibus & lue Venereæ dicatis.

*Imperforatio* malum est non sine magnâ molestia, & interdum nullo modo corrigibile, sæpe ipsam mortem procurans, præsertim quando urinæ vel mensibus exitus præcluditur, & penè ne quidquam reliquæ est canalis, ubi verò internus meatus satis elaboratus solummodo externâ quâdam obducitur membranâ, hæc scalpello peripungitur, urinæ exitus patari, & sic mors ipsa potest præveniri.

§. 12. Quantum ad *Diatam* hisce in affectibus, *Dietæ* nihil aut perparum modo dicemus, quoniam & prolixè, sæpeque ad nauseam, & speciatim his in carunculis, *Pruritu* & *Tumoribus* eam profectum sumus. Generatim tamen fugiendus aer frigidus, impurus, è regione verò eligendus moderatè calidus, purus, tenuis, arte saltem procuratus; cibis sit boni succi, facili digestionis. Vitentur acida salia & viscidula. Potus sit cerevisia medicata ac optimè defæcata, vel decoctum lignorum, vel infusum Theræ, vel Caisæ. Motus & quies iustæ sint moderationis, somnus Vigilis præstat. Alvus & vesica, ut & mensium fluxus ordinario respondeant motui. Ex animi affectibus, præter gaudium vix ullus hic ex usu est; vitetur *Venus*.

§. 13. *Galenici* in curâ *Caruncularum* admodum varia hepatica sanguinem depurantia, interna & externa, auferuntque easdem sectione vel ustione post quam ablationem varia commendant exsiccantia remedia, quibus etiam uti solent, quando operatio Chirurgica rite institui nequit, eumque in finem laudant calcem vivam, calicididem crudam, Mylin crudam, squamam ætis, alumen scissum pudendis immissum, eluuntque pudendum variis lavamentis ex gallis & alumine paratis, vel decocto origani, rutæ, agrimoniz, absinthii, quibus carunculae istæ exsiccant tandem decidunt.

In *Pruritu* Pudendi ad prurientem genitalium uredinem, adpersa & aspersis affricata parti favilla restinguenda inguentum adhibent *Egyptiacum* in  $\nabla$  marina, aut lixivio dissolutum, syringe exprimendum injiciendumque, eodemque imbutos pellos ex stupis cannabinis in Uterum demittunt & sic sanant. Imò cum affectus hic non raro anunt, vetularum præsertim, exerceat, iidem uti solent remediis in forma lavamenti, quo partes hæc eluuntur. Ad salisam pituitam corrigendam & educendam commendant catharsin humoris salis, quam peragunt extracto melanagogo, aliisque atræ bili dicatis purgantibus, alibi jam ad nauseam enumeratis, dein hoc etiam in affectu phlebotomia & scarificationes suadent, imprimis verò diatam refrigerantem ac humectantem præscribunt. Inter topicalaudant unguen-

Cura effectus Pudendi muliebri sergii

## CAP. VI. DE PUDEND. MULIEBR. MORBIS. 465

unguentum enulatum cum mercurio, vel sequens totius corporis pruritus curando accommodatum.

℞. Axung. porc. rec. lbjss.

Sapon. nigr. vel Gallic.

℞is Tri assat.

Sem. staphysagr. aa. ʒß.

℞is vivi ʒj.

Argent. viv. ʒij.

Acet. ros. quart. j.

Incorporentur omnia simul, & f. Linimentum secundum artem.

℞. Alum.

Spir. Vri

℞is vivi aa. ʒvj.

Staphysagr. ʒj.

Dissolvantur omnia in aceto rosato, addendo bmyri recentis quantum sufficit, fiat Linimentum ad usum commemoratum.

In Tumore Pudendi ipsū advertunt humorem peccantem, cujus influxus vel congestio partes has oblcenas reddit tumidas, eumque pro diversitate sua prius emendatum appropriatis, ut existimant, medicamentis eliminant, biliosum nempe cholagogis, melancholicum melanagogis, phlegmaticum verò phlegmagogis jam abunde cognitis; & ne ulterior fiat affluxus humorum, eosdem revellunt frictionibus, cucurbitulis, fonticulis, & setaceis: facultatem concoctricem roborant, & si adfuerit lues Venerea, eam remediis antiveneris appropriatis curant, decocto scil. lignorum, aliisque in superioribus jam dictis. Externè humore influente tenuiori bilioso in causā existente, aliquando repellentia applicant, eodem verò crassiore attenuantia & resolventia, ut unguentum Apostolorum, emplastrum diachylon parvum Mes. Scarificationem etiam in pudendi labiis aliquando instituunt, maxime si humores sunt pertinaciores.

In cura Pudendi Imperforationis eò collimant, ut claustra hæc rursus aperiantur, excernendisque transitis concedatur, & suo tempore intromittendis adiutis, in quem finem membranam istam orificium sæpe pudendi obducentem dissecant, vel foramen minus angustum speculo inserto meatum dilatant, donec fistulā plumbeā unguento de cerussā vel diaphompholygos oblita ad temporis spatium aliquod intrusa, foramen in debitā servent dilatatione & cicatrice obducant. Pari modo etiam illam angustiam emendare solent, quæ post ulcera vel vulnera sanata ob conglutinationem arctiorem fuit illata.

Paracelsum.

§. 14. Paracelsus in Pudendi Carunculis præter alia absumptentia balsamum commendat arsenici, unaque Gum Romanum, auripigmentum & alumen roche magni solet æstimare.

In Pruritu Pudendi à portionibus, digestionibus, purgationibus, à diaphoreticis, ab excoriatis & morbillorum unguentis ægri ut caveant præcipit, & sequentem commendat mixturam.

℞. Alum. plumosi

Emul. aa. lbj.

M.

vel:

℞. Alkali de aluminib.

Sals. fusi aa. q. v.

M.

In curatione Pudendi Tumoris imaturantia

commendat medicamenta, imprimis si Medicus præsens advertat, eundem ad maturitatem per se vergere hinc digerentiā in propriā regione applicari vult; immoderatè verò auctos hosce tumores nullis digerentibus curari posse contendit, nec nisi in ulcera prius mutentur sanari, sed in tumoribus pudendi mediocribus oleum si externe illitum valde extollit.

In curandā Pudendi muliebris Imperforatione & occlusionē aliam non novit rationem, quam ut instrumentis perfodiatur & aperiatur.

§. 15. Helmontius Pudendorum Carunculas Melan. curari ut luem Veneream allicit, & mortificari eodem remedio, nempe hydragyro. Commendat etiam in Carunculis auferendis unguentum de cerussā, cum pulvere corticum granatorum, in umbra siccatorum & Oe saccharino, quo remedio inungendas suadet carunculas, vel sequens adhibet.

℞. Ellebor. nigr.

Stercor. mur.

℞is parium iostj aa. ʒj.

Cerat. de cerussā ʒß.

M. vel:

℞. Calc. viv.

arsenic. rub.

Colchotar. aa. ʒß.

Cerat. de mucilag. ʒß.

M.

℞. Alum. ust.

Vrid. ar. aa. ʒß.

Cerat. de mucilag. ʒß.

M.

Inter experimenta refert, si quis similes excrecentias collecto in conum lunæ lumine per vitru n superadiet, donec frigus intrò senserint, facile deinde sua sponte evanescere ait, rationem addens, quia ejusmodi defectus crescenti auscultant lunæ.

In Pruritu vulvæ eò incumbendum esse dicit, ut sal pruritivum in partibus genitalibus collectum corrigatur, per interna depurativa ac sudorifera, inter quæ laudat Gum suum diaphoreticum, nec non per externa Galia & sulphura depurativa.

Imperforationis curam eandem commendat, quam alii in medium protulerunt, nempe apertionem sectione instituendam.

§. 16. Villisium curationem Caruncularum Villisium iisdem planè peragit remediis, quæ suprā in Uteri Verrucis commendavit, alumine videlicet ust, Glio præcipitato rubro, calce vivā, pulvere sabina, aliisque excrecentias ejusmodi destruentibus.

Pruriti Pudendi subvenit salia illum producentia blandè diaphoreticis attenuando, & per habitum pellendo. Acidulis, lacte, balneisque illorum acrimoniā demulcet, eorumque preventum præcavet, non neglectis purgantibus. Parti affectæ lactepidum iniecit, ad retinendos salium pungentium aculeos.

In Imperforatis fibrillas vaginam occupantes eamque occludentes cultro secat, meatumque illius hoc pacto facit liberum.

§. 17. Sylvius Pudendi muliebris Caruncularum curationem peragit variis visciditatem dissolventibus, imprimis Galibus, tum internis, tum externis, tum per gummata aromatica, tum caustica potentialia & actualia, & per unguenta Galia, ut & foras Guajacinos & Juniperinos.

Nan

Inter

Inter interna præ cæteris commendat farsaparillam & ejus decoctum, curam enim luis univerſalem primario præſcribendam eſſe præcipit, utpote cujus ope Caruncular ſenſum minuantur & tandem in totum tollantur.

*Pruritus* Pudendi curat per ſalia lixiva & imprimis blandiora. vel fixa, quale in calce vivâ reperitur, vel volatilia. Solis quoque externis curatum vidit hoc malum. Imprimis verò commendat aquam ſeu decoctum calcis vivæ cum ſpiritu theriacali camphorato, vel locum pruriginosum abluendum vult decoctis aromaticis, adjectis camphorâ, tutiâ, aliisque abſorbentibus.

Laborum Pudendi *Tumorem* curandum eſſe putat, ut aliis partiſtumorem, & præter interna viſcidam pituitam incidentia, ac volatilia ex animalium partibus variis parata, ſola externa topica commendat, interpoſitis pilulis ſuis ex gummi paratis. Præ aliis laudat ſequens vel ſimile linimentum.

℞. Unguent. alib. compoſ.

Ol. cappar. aa. ʒi.

Philoph. ʒij.

M.

Emplaſtrum ſuum carminans magni etiam facit, tumori impoſitum. Si luis Venereæ ſuſpicio adſit, emplaſtrum Sale laudat, aliaque lui appropriata remedia.

Pudendi *Ocluſionem* instrumentis perforandam eſſe cum aliis contendit.

Carteſia-  
nus.

§. 18. *Carteſianus* Pudendi muliebris *Caruncularum* curatio peragitur internis ſudoriferis tubulos aperientibus & ſuccos craſſiores attenuantibus & reſolventibus, quorum etiam copiam aliquando mercurialibus imminuunt, præſertim lue Venereâ eandem comitante. His præmiſſis ipſas hæc excreſcentias carnoſas auferunt pulveribus, liquoribus vel linimentis externis contextum illum vitioſum deſtruentibus, & ulterio- rem humorum aſſuxum impediuntibus, quorum compoſitionem ingrediuntur æugo, ſulphur, alumen, ʒius ruber præcipit. unguentum Apocrotorum, aliaque ejusmodi conſtantia particulis, quæ motu ſuo celerrimo omnem luccorum iſtorum vitioſorum ſolvant quietem, nec diutius ſtagnare permittant. Sublatis verò ipſis excreſcentiis, nullum omittunt ſtudium, quo ulcuſcula ita excitata quàm citiſſimè conſolidentur, ne ſuccorum vitioſorum novus admittatur aſſluxus, quod peragunt pulveribus ex antimonio crudo, bolo Armeno, cornu cervi uſto, lapide calaminari, plumbo uſto, maſtiche, olibano, Tutiâ, terrâ ʒ-li dulci, camphorâ; vel unguentum opodeltoch imponunt.

*Pruritus* Pudendi ſedare ſtudent remediis ſuccos in tubulis latentes depræſtantibus, & à particulis acutis pungentibus probè liberantibus, quâ virtute pollere dicunt ſudorifera ex ligno Guajaco, ſaliſtæ, radice ſarſaparillæ, lapathi, herbis fumarie, ſcabioſæ, floribus ſambuci, vel pulveribus ex antimonio diaphoretico, floribus ſulphuris, oculis cancrorum, ſale volatili ſuccini & idigenis aliis. Externè linimenta adhibent ex lithargyrio, lacte ſulphuris, nitro, ʒio præcip. rubro, camphora, cum oleo nucum juglandium, vel butyro non ſalto paratum.

Laborum Pudendi *Tumorem* imminuere conantur non tantum ſudoriferis internis, ſed diſcutientibus quoque externis, epithematibus ſcilicet calidis diſcutientibus ex aquâ calcis vivæ,

ſpiritu matricali, ſorum ſambuci, aliisque obſtructionem tubulorum reſolventibus, & ſuccorum motum reſuſcitantibus, quorum ordinem præ aliis exornat ſpiritus vini camphoratus, vel theriacalis camphoratus, in quibus etiam poroſiora terreſtria, ut terra ſigillata, bolus Armenus, creta, aliaque diſſolvi & in linimentum redigi poſſunt, quod tepidè imponendum.

*Imperforationem* Pudendi reſerare ſtudent ſectione, labiisque arte diviſis fruſtulum plubeum unguento quodam cicatrilante obductum inſinuant, ut cum tempore introductâ cicatrice deſectui huic proſpiciatur.

§. 19. Poſtquam itaque aliorum opiniones ad *Noſtra* curativum quali dedimus, reſtat ut & in horum *Pudendorum* affectuum *curationem* *noſtris* principiis immixtam, quantum breviter fieri poteſt, incumbamus. Totius ergo curationis *Caruncularum* Pudendi cardo in ablacione earum vertitur, & ut plurimum conſumentibus ac exſiccantibus externis abſolvitur, præmiſſo medicamento purgante Mercuriali & hydragogo, item ſudoriferis, quare ſpiritus Matricalis, cum elixire vitæ noſtro maritatus, & ſæpe tepidè applicitus raro nos ſeſellit, item unguentum *Ægyptiacæ*, inſpillatam & cum melle roſarum mixturam & appoſitum. Vel ſi fortiora requirit, etiam ad ʒum ſublimatum vel præcipitatum tranſeundum eſt. Alumen uſtum cum variis decoctis abſtergentibus non negligendum, pulveres abſorbentes ex maſtiche, myrrha, calce vivâ, olibano, ocul. ʒs, tutiâ, pompholyge, mandib. lucii, &c. interponendi ſunt. Si lues venerea conjuncta fuerit, ea prius curanda eſt ſudoriferis, aliquando Mercurialibus. Si filo deligari poſſunt, operatio hac aliis ſæpe præſtat remediis. Deini remediis ſarcoticis ita dictis curentur.

In *Pruritu* Pudendorum inſtituantur balnea *Pruritu*, aquæ dulcis, & unguento roſaceo renes & doſum illinantur, atque laventur partes hæc obſcœnæ aquis plantaginis, calc. viv. lacch. ʒni, Camphora aliisque imprægnatis, ut ſic particule aciores ibidem ſubſiſtentes eluantur. Ol. ʒi per deliquium cum ol. amygd. ut & liquore ʒni mixtum optimum erit remedium externum. Ad particulas aciores eliciendas internè dari poteſt Tinctura ʒni ʒi, vel viperinæ. Externè decoctum gallar. vel decoctum ʒ, vel ſequens.

℞. ſol. tuſſilag.

Fl. ſambuc. aa. Mj.

Cog. in ʒ pluviatil. ʒij.

Colatura add.

Lithargyr. ʒʒ.

ʒni ʒi.

Maſtich. ʒij.

+ vini ʒij.

poſſit ſiltrantur per linteum, ut ſubtilior pars pulveris tranſeat, adhibeatur pro externo Epithemate. Vide *Red. à Fencæa* Tom. 2. *Conſult. Med.* 68. in muliere ʒʒ. annorum & *Ambroſ. Paræum Opera* Lib. 23. cap. 64. qui mulierem, quæ vehementem partium genitalium pruritum & uredinem ſuſtinuit, unguento *Ægyptiaco* ſanavit feliciter. Applicentur etiam, me ſuaſore, ~ matricalis, ~ vin. Camph. cum tutiâ, ʒ calc. viv. cum Camphorâ, Sale ʒni & myrrhâ, aliisque. Nec non internè continuentur varia ſudorifera, decoctum lignorum, ~ Matricalis, ʒlia volatilia, quævis Viperina, Cervina ac ʒniata, item ʒ volatile oleoſum. Omnia enim Medicamenta, quæ

quæ in Scabie conducunt, hic etiam prosunt iuvenisque.

*Tumore.*

Curatio *Tumoris* labiorum Pudendi muliebris in eo consistit, ut in his Labris facta obturatio tubulorum ac canaliculorū iterum deobstruatur, quod per interna incidentia ac diaphoretica obtinere possumus; exhibeantur ergo varia decocta incidentia, Græca, ~  $\Theta$  \* c. aromat. ~ matricial. salsia volatilia oleosa quæcumque. Essent. rorismar. fumar. lignor. viperin. liq. C. C. succ. Essent. cent. min. meliss. R. Gni, imprimis si lues Venerea eam produxerit, tunc ad decocta lignorum aliaque fortiora transeundum est.

Inter Topica applicanda sunt varia Cataplasmata ex toremarino, meliss. bacc. lauri, Juniper. angel. enil. camp. herb. Sabiu. oliban. mallich. abrotan. rut. cicutar. sem. cumin. anis.  $\Theta$   $\eta$ , \* ci & c. quæ in vino Gallico vel mulsa coquenda sunt & tumori calide applicanda. Sic quoque ex prædictis speciebus ~ us destillari, vel mediante ~ tu vini Quati per infusionem Essentia parari, ac tepide cum linteis duplicatis applicari possunt. Spiritus etiam Matricialis, vin. Camph. cum  $\nabla$   $\psi$  sæpius applicata egregiam navant operam. Si verò tumor hic à lue Venerea obortus fuerit, Emplastr. Galia aliaque fortiter resolutiva inponenda sunt. Vel sequente utere fottu vel cataplasmate calide applicando.

\*  $\nabla$  si. sambuc.  
sperm. ranar. aa. 3ij.  
cicutar. 3iss.  
pulv. myrrh.  
oliban. aa. 3j.  
croci or. 3j.  
Saceb. Bni 3ss.  
El. diaford. Frac. 3ij.

M. Quod maxime conducit, quo etiam remedio vidi nuper curatam puellam. Forus & suffumigia ex discutientibus resinosis ac volatilibus aliisque non sine commodo institui possunt, de quibus Capite de *Tumoribus* abunde dicemus, quo etiam Lectorem prolixiora desiderantem remittimus.

*Imperforatio.*

Imperforatio, tanquam vitium congenitum, nullo alio remedio præterquam sectione corrigi potest. Puella ergo, cujus pudendum membra-

nā validè obductum fuerit, & duntaxat foraminulum restat, decenter disposita, sectio ab inferiore parte versus superiorem instituat vel scalpello, vel forcipe acuta ad id singulariter forata, partes vulneratae medicamentis partium dolores, partim sanguinem sistentibus sanari debent, liquore nempe stipitico sequenti;

\* Limatur  $\phi$  q. l. affunde  
~  $\Theta$  li q. l. add.  
phlegm.  $\Theta$  li 3vj.  
Colatur. add.  
Solus.  $\bigcirc$  rum  $\nabla$  plurimar.  
fact. lib.

Detur ad vasculum & calide applicetur.

Tandem unguento diaponipholygos impositio cicatrix inducatur. Eodem modo & processit *Chirurgus noster Calicensis Hoffmannus*, & res feliciter cessit. Notandum autem in ejusmodi operationibus magnam impendendam diligentiam esse, ne vel partes versus collum lædantur vel quæ separari debent, intactæ maneant. neve foramen, quoniam angustum fiat, quod postea in Matrimonio constitutis nocere poterit, & tandem ne partes divixæ iterum coalescant, ceu plura exempla ejusmodi casuum, apud Auctores possunt. Similia exempla & operationes vide apud Hier. Fabr. ab Aquapend. Oper. Chirurg. p. 1. c. 82. Joh. Andr. a Cruce Offic. lib. 3. c. 47. Bevervick Chir. c. 3. de Paracensis Henric. van Rombuyssen Obs. p. 1. p. 102. Paulum Barbette p. 1. Chir. c. 13. ut & apud Peccet. & Pignani aliosque. Operatione ergo Chirurgicâ, quæ vocatur *Dieresis*, malum hoc muliebri curari debet, quæ partes corporis vitiosè junctas separat ac disjungit, illasque ut disjunctæ maneant in partibus scilicet præter motem coalitis, & ad discontinuationem ordinariam reducendis, v. gr. in ani oclusi aperture & c. adeoque *Dieresi* opus est, & ferro pudendum muliebri clausum aperiendum est, & dein omni studio & omni operâ impediendum est, ne disjunctæ partes, ceu dictum, iterum coalescant, in quem finem varii pelli, item plumbæ, coela: liquoribus variis, imprimis ~ matrici imbutæ imponentur: sunt qui ex plumbo persum efformant, eumque foramini intrudunt.

## LIBRI QUARTI FINIS.



# JOH. DOLÆI ENCYCLOPÆDIÆ CHIRURGICÆ RATIONALIS.

## LIBER V.

DE MORBIS ARTUUM, SEU VARIARUM CORPORA-  
PARTIUM, TUM MAGNITUDINEM VITIOSE AUGMENTIBUS, TUM  
CUTEM DEFORMANTIBUS.

### CAPUT I.

#### De Corpulentia Nimia.

§. 1.



**N**ec nullum artificiosius fingi potest Automaton, nec ulla machina ita accuratè fabricata præ nostro corpore, cujus tot partium sunt particulae omnes ut sapientissimè extructæ, ita mil e affectibus obnoxie, ut mirum videatur, vel per horæ minutum integrum illam ex toto, citra morbosum defectum subsistere posse. Nihil tamen a què lædit easdem, ac pro conservatione illarum subministratum nutrimentum, vitium si fuerit, cujus primarius error est deficiens digestio, quæ ortum habet in ventriculo, reliquisque partibus digestionis dicatis, nihilominus tamen quibuslibet in assumtis, præter homogeneum nostri Corporis partibus assimilabile, & heterogenei haud parum deprehenditur, cujus sequestrationi maturè incutibendum, cum minus noxium retentum, quàm ingestum vitiosum Oeconomiam turbet nostram. Huic negotio maximè inservit motus partium corporis organicus, cujus ope, dum vehementius agitantur contenta corporis fluida per totum corpus, eo ipso validiori impetu & nisu subeunt tam intimiores recessus partium nutrendarum, quàm etiam tubuli minutissimi recrementis fecerendis apti, per quos penetrant copiosius fecermenta, & ita facilius ac ulterius separantur. Cum verò assumptorum excessu, & excemendorum defectu machina nostra nimis repleatur succis, & earne & pinguedine corpus nimis augeatur, Machina sæpe si non integritas, attemen maximum excitat incommodum, mole suâ extraordinariâ Corpulentia nomine insignitâ, de quo affectu paucis mentem nostram revelabimus.

*Corpulentia nimia.*

Affectus dicitur *Corpulentia nimia*, vel nutritio corporis *anxia*, in quo vitio corpus non quidem in longitudine, sed saltem latitudine & profunditate, seu uno verbo, crassitie excedit, & tales obesi seu corpulenti Germanis dicuntur dicke sette Menschen. Ejusmodi obesorum hominum exempla exstant hinc inde in monumentis Practicorum: hinc obesus hi, quibus

*Pinguis aquilinus propenso sequeipede* annuotari potest ille Germanus, cujus Epitaphium sequens Dursachii inveniri *Crusius in Annal. Svec. Part. 3. l. 12. c. 11.* mentionem facit sequentibus verbis: Anno 65. DEN 4. Nov. starb Frang Erhard, der fremme, redliche und grofse Stadtschreiber / welches Körper gar nahe 6. Centner gewogen hat. Pistor quidam Hano-vienlis K. 400. libras ponderabat civiles. *Sennertum* mulierem 36. annorum 480. lb. & virum 600. pendentes refert. Sic nuper Hagæ Comitum vir obesus mortuus est, qui 500. libras incitæ ponderabat. Qui plura desiderat exempla, conferat *Ephem. Germ. Ann. 2. Obs. 87.* Differentiam plures faciunt inter Corpulentiam nimiam, & obesitatem: priorem dicunt *musculosarum partium autliorem* & posteriorem *pinguedinem nimiam*.

§. 2. Machina nostra ex ovo enata ab initio exiit parva, successivè verò alimenti ope sustentatur, nutritur, ac augmentatur, & corpus per totum vite curriculum conservatur tale, quale est, augmentatur verò per ætatem accrescentem, ut partes organicae machinam nostram componentes, debitam magnitudinem acquirant, quæ aptiores sunt ad actiones debitas, quarum sunt instrumenta, perficiendas. Machina verò nostra constat ex partibus fluidis & solidis, quæ posteriores sunt eius fundamentalia stamina; partes autem fluidæ sunt sanguis ac succi reliqui plures, Partibus solidis nil nisi canaliculi intelliguntur, adeo ut focus homo unus quidam continuus existat tubulis, instar arboris ex uno quodam trunko inferiori in summitate ramos multos & varios proficentis; præcipue hic notandi veniunt peculiaris res tubuli membranacei oleosæ & pingues particulas tantum recipientes, qui noviter detecti sunt. Scirpi omnium vasorum statuitur Cor Arteria ubi terminatur in Cerebro, ab it glandulam, ex glandulâ fit filamentum, ex filamentis nervi, hi verò per musculos reliquasque machinæ nostræ distribuuntur partes. Tubulorum horum longitudo & major minorve extensilitas quarumvis partium longitudinis & actionis normam præscribit, cum & ipsa ossa ex fibris firmius & artius tandem junctis & proximè apposis suis compa-



compagis rudimenta habeant. Ubi ergo textura fibrarum secundum extensilitatem in longum, partium longitudinis fundamentum existit, ita illarum major vel minor numerus fere latitudinis ac profunditatis basin constituit, quam pro eorum copia majori vel minori simul necessario, vel amplioribus circumscribatur pars terminis, vel angustioribus coarctetur limitibus. Dein accedit ipsarum partium nutrimentum, sui appositione quantitatem fibrarum ac tubulorum. adeoque & magnitudinem partium, in specie ratione latitudinis & profunditatis, vel augens sui copiosiore distributione & retentione, vel imminuens sui defectu. Nutrimentum ergo nihil aliud est, quam chylus firmius & uberius circa fibras coagulatus. Sunt præterea, qui carnes partem nonnisi quasdam particulas rubicundas ac rotundas sanguinis grumæ factas & inclusas membranâ subtili, tanquam tenui vasculo, adeoque mentiri tantum carnosam substantiam, asserunt. Adipem quoque uberiorem & carnem copiosiore nunc sociata *Corpulentia nimia*. Subiectum proximum statuenda esse, ex jam dictis constat.

*Diagnos.* §. 3. *Signa Diagnostica* hic apponere superfluum esse existimamus, quia per se patula sunt. Facile etiam discernitur hic affectus à Cachexiâ, Anasarca, ac Leucophlegmatia, quæ signa distinctiva alibi, & quidem suis capitibus peti possunt. Homines corpulenti ad motum tardiores sunt, ut plurimum de difficili conquiruntur respiratione, & anhelosi sunt. Ratum est exemplum obesi hominis, qui non ita pridem Anno nempe 1688. Hæc Comitæ defunctus est, in cujus cadavere pinguedo unum & dimidium pedem æquavit, referente nihil Celeb. Dn. Kiirnero, Amico meo singulari. Plura alia hinc inde extant exempla obesorum hominum, qui vix de loco semovere poterunt.

*Causa* §. 4. Juxta Veteres, & quidem Antesignanum eorum Galenum, ipsius *Corpulentia* hujus nimia continens *Causa* est sanguis propriè sic dictus, aut pinguior & purior ejus pars. Antecedens est epatis musculorumque temperatura moderata, calida scilicet & humida. Externa autem sunt cibi boni succi quiesque nimia; quod etiam apparet ex lib. 14. *Galeni de morbis curandis*, ubi ita refert: Acuta exercitatio & tenuis victus, & id genus medicamenta, & animi cogitatio, temperamentum non solum calidius, sed etiam siccius ac propterea corpus exilius reddunt, confirmatque cum juvene annorum quadraginta, qui oppido obesus ac corpulentus, per exercitationem multam, cursum velocem, victum exsiccantem ac extenuantem, ejusque generis medicamentis fuit curatus.

*Paracels.* §. 6. Ad mentem *Paracelsi* nihil uspiam creatum est, quod non indes suo alimento egeat, imò ipsa stellæ ex suo elemento edere & nutrire hominem verò nutrire terra, de qua est, asserit, atque ex cibo sanguinem suum habere & carnem. Ciborum multitudinem nutrimentum inmodicum corpori inferre refert, quod deinde in immensum ita excrecere possit, ac sic errorem virtutis digestivæ æquât, juxtaque Auctorem hunc faber ac opifex in ventriculo habitat, qui carnem ex eo fingit humanam. Is autem duabus naturis instructus creditur, cum coctio tamen lateris unica sit. Altera natura in eo est, ut si in viro operetur, carnem vitalem gignat,

si operetur in femina, feminæ carnem generet. Quod enim alimentum concernit, id docuit ac subigit Archeus in ventriculo, ac ex eo fingit formatque, quod opus est, siquidem omne, quod edit homo, ipsemet est; hoc est, caro & sanguis, nam illa sumus nos. Corpus enim, quod mortuosum est, non augetur, sed minuitur. Idcirco in *Corpulentia nimia* à Obesitate corpus cibum laudabilem in majore quantitate pro alimento, quam par est, suscipit, & faber Archeus in stomacho residens plus partibus dispensat, quam pro excrementis. Ex succi propterea nutritivi abundantia *Corpulentia* originem ducere ait, tanquam ex boni superfluo, propter excessum in carnem & pinguedinem post hujusmodi succi nutritivi abundantis separationem ab Archeo factam translato.

§. 6. *Helmontius* demonstrat hinc inde, quod *Helmont.* elementorum mixturâ constatum creditur, fieri materialiter ex solo aquæ elemento, quod primordialiter in rebus constitutis cunctis se habet per modum laticis. Cibus ac potum in stomacho assumere materiam chylis affert, cum retentione qualitatibus vitæ medicæ ciborum. Destitui quidem, pergit, pristinum ciborum materiam & approximari ad materiam latici, sive elemento aquæ viciniorem; satagent nimirum ad hoc fermento specifico stomachi, non secus acque fermentum hepatis chylum in cruorem transmutat, cujus comes ac socius, non item pars, est latex. Fermentum stomachi in homine facilius cibos in chylum, quam illorum pinguedines transmutare, eo quod pinguedo remotior sit à latice sive primâ materia, quam sit cibus. Quæ digestio transmutationis in succos aquosos, eo hinc adducta est, quo constat, laticem facile concepto in nobis peregrino semine, membrorumque fermenta, transmutari in alienam prolem, atque ab abundantia hujus laticis homines obesos & corpulentos fieri haud dubitat, nec arbitrari potuit unquam, renes suum habuisse munus transmutandi adipem sub pelle distentum in aquam: quin potius credidit, id illi concedendum facultati, quæ cruorem in adipem formavit, ut scilicet ejusdem sit facultatis læsæ. convertere adipem in laticem, cujus antea officium fuit, & cruore adipem conficere. Itam autem non esse asserit renem dignitatem, quod nos pingues aut macilentos faciant, dum non raro tabidis ac calculosis renibus pinguescant plures. Sæpe namque (inquit) occurrit Capucius longo jejunio gravatus, potuque paucò & parvæ cerevitiæ saturatus, crasso tamen corporis habitu dotatus. Ex adverso autem, cernuntur edaces, lautoque mangonio educati insigniter macilentis. Ut utrumque casum runnet, reperit Auctor fontalem stomachi digestionem gubernatricem cæterarum, velut sibi subalternarum. At mirum ipsi videtur saltem, quo pacto resoluatur adeps oleosus in pristinum aquosum laticem retrorogret, imò in venas, ac tandem ad renes per classicam retrahatur.

§. 7. *Walsley* ex fundamentis sequens *Corpulentia nimia* formari potest ætiologia. Statim à primâ factus in Utero formatione contingit quedam in illo iactura ob motum particulis ejus fluidis communicatum, quas relaxati ab aliis de novo adveniendis necesse est. Sed etiam partes debitam quoque magnitudinem allequi debeant, alias adhuc præter priores illas ipsi

apponi opus est. Duo illa in nutritione nominatim pendere statim Auctor noster, & utrique hinc sim sanguinem satisfacere assitit. Crur autem universas corporis partes pervagans singulis per arteriosos furculos materiam operi illi parem perficiendo largitur. Quum verò liquor iste pigrior hebetiorque existat, quàm ut propria virtute munia sua peragat, alio quodam vegetiore particulis valde activis donato indiget, quo aëtuetur, ac debite disponatur. Talis est humor nervosus spirituum vehiculum, qui iisdem pragnans maximà donatur activitate. Generosior itaque succus iste facultate quadam, quâ pollet, plasticâ, cum delectu quodam materiei nutritioni & accretioni dicatæ particulis destinatis visibus disponit, fibrasque spirituum animalium impositum hospitia futuras efformat. A dictorum autem factorum variâ diathesi diversâ exurgit animalium constitutio, & ab eadem causâ dependet eorum salus, sique omnes, quibus affliguntur, affectus emergunt. Ab utroque enim rite temperato iusta fit dispersitæ substantiæ reparatio, partesque debita proportione protrahuntur. Sed si sanguis mollioribus scateat particulis, uberiorque succus nervosus spiritibus turbidus in partes diffundatur, maximâ factâ ab eo liquoris alibilis in partium substantiam assimilatione, corpus improporcionatâ mole accrescit, produciuntque iste affectus. Corpulentia nimia denominatur.

Sylvius.

§. 8. Cum clarissimus Sylvius sanguine nutrire corpus statuat, hinc omne nutritionis vitium sanguini vitioso adscribit. Nutritionem ergo nimiam tum in carnosâ musculorum excrecentia, tum in obesitate, fieri vult à sanguine multo ac laudabili, concurrente corporis motu, exercitioque moderato, vitâ curis anxii vacuâ, somno mediocri vel protrahente. Alimento rum multi succi ac fermentationis facili assumptione largiuntur. Sic etiam corpus æquè in habitu & superficie, ac interioribus pinguis & magis obesum deducit à sanguine pinguiore, ad ejus productionem juxta ipsum facit corporis constitutio sua quidem, concurrente tamen succo acido satis copioso, sed blando, temperatoque, bile autem parciore minisque acri, motu corporis paucio, vitâ itidem sine curis rodentibus, somno placido & longiore. Alimento rum pinguium assumptione continuâ ac multâ. Existimat etiam Auctor hic, corpus rarius gravari carne multâ vel nimia, frequentius verò pinguedine.

§. 9. Cartesiani ab optimâ omnium partium nutritione Corpulentiam nimiam originem habere referunt, eamque ex redundantia chyli laudabilis emergere. Chylum verò laudabilem eum nominant, qui particulis constat oblongis, ramosis, & paucis levissimè mucronatis, siue aëquos, oleosis & parum salis, optimèque, & ad minimum per duplicem fermentationem elaboratum, qui facile ad corporis partes transfertur, & iisdem assimilari possit. Assimilationem hæc chyli in singulis partibus non ideo promovetur volunt, quod homines ejusmodi variis velsantur cibis, qui omnis generis consentent particulis partibus nutriendis accommodatis, propter homogeneitatem quandam, adeo ut particulæ ossis ossibus, musculosa musculis, pinguioribus & adiposa pinguedini associantur, eorumque augeant substantiam, sed quod fer-

menta quedam in partibus existentia particulas chyli disponant, ut membris aliendis adparentur. Materiam chyli cum reliquis cibum admittunt & potum non modo copia assumunt, sed in ventriculo quoque probe digestum, & in substantiam lacteam chylosum in intestinis transversum, ut sacculus chylosus, siue receptaculum penus quodam nutritivo assiduò abundet. Ut verò particulæ chyli allabentes membris firmius adhaereant, multum contabuerè dicunt vitam desidèrem, animum curis vacuum, labores intermissos, & somnum diutius protrahunt, ut non opus sit liquori nervoso magnam preparare, aut ex chylo tribuere materiam, cum laboribus & mentis & corporis non abstinentur. Hæc enim ratione facile oriri posse asserunt, ut particulæ chylosæ membris per quietem firmius adhaereant, nec tam citò abluantur, quod cum in singulis corporis membris æqualiter contingat, habuit eundem in crassitie, non modo quoad pinguedinem, sed ipsam etiam carnositatem perquam pronunciant augeri.

§. 10. Nos, antequam ad causam Corpulentiam nimiam explicandam accedamus, prius opus nutritionis & succi nutriti indolem explicemus. Vterum & quorundam Recentiorum Medicorum sententia est, sanguinem corporis nostri universale esse nutrimentum. Alii duplex corporis nutrimentum statuunt, sanguinem nempe pro nutritione partium carnalium, & liquorem rosicidum per nervos in partes derivatum pro partibus membranosis seu nervosis, & ita etiam pro pinguedine, ita ut causâ obesitatis nimia futura sit abundantia talis succi per nervos influentis, cujus opinionis defensores sunt Angli plures. Bisfim verò rorem suum tanquam succum nutrimentum agnovit, sed & hujus viri opinio ab Anatomicis hujus sæculi ex exercitiis illius rejecta est, quia motus hujus succi rori planè contrarius est, quàm uti existimavit Bisfim, cum ipsius morte ergo & sententia ista sepulta est. Ut verò Chylificationis opus examine nostro aggrediamur, observamus eam alimentis solidis humiditatem conciliare. Ex Physica didicimus, fluiditatem in divisione & vario motu particularum corporum fluidorum positum esse, itaque oportet ut in hoc opere chylificationis partes alimentorum à se invicem secedant, & diverso motu agantur. Separatio ista siue texturæ turbatio particularum alimentorum peragi nequit, nisi ab attritione aut fermentatione. Nihil in Ventriculo novimus, quod par sit alimentis molendis ac terendis æquè ac necessesse est, ut in chylum faciant; judicandum est ergo, everisionem istam structuræ partium alimentorum à fermentatione induci, sed fermentum constare debet ex principis fermentationem creare valentibus, à quo solvantur Sulphura alcalia & salia. Et cum statuerimus, quia ab alcalicis, aëlia ab acidis, & salia à phlegmatis dissolvi, necessario colligere debemus, fermentum Chylificationis ex acido alcalico & phlegmate constare esse. Si fermentum Ventriculi tale fuerit à primâ alimentorum cum ipso commixtione, ejus acida in illorum alcalia Vires suas exercebunt, & fermentationem, quam in illis excitabant, totius massæ alimentorum dissolutionem exordiantur. Alcalia fermenti sese deinceps infinuantia inter Sulphureas alimentorum partes, ipsas ab invicem sejungent, demum phlegmata dissolutis salibus locum obtrine-

Nostre  
sententia  
de causa  
Corpulentia  
nimia.

obtinebunt inter cunctas alimentorum partes, quarum unio ab actione acidorum & alcalicorum perit. Quando ergo alimenta in ventriculo descendunt, pondere suo comprimunt minimas glandulas, quæ inter tunicam ejus internam & mediam sunt conspersæ. Cum enim ea meræ sint exiguæ vesiculæ, ubi primum comprimuntur, evacuantur, & in ventriculi cavitatem effundunt satis abundantem rorem fermenti, quod commiscetur illis, quæ jam in ventriculo continentur, ipsa fermentat & liquefacit, quod jam liquatum fuit, summum petit, & ventriculi motui peristaltico parens per pylorum elabatur. Dum perdat fermentatio ista, exit aliquid indefinenter, & quando ea absoluta est, animal edere cogitur, vel fami exponitur, quæ oritur ex eo, quod cum fermentum purum ac impermixtum in ventriculo comprehendatur, tunica ejus interiorum vellicet. Fermentum alimentorum partes eorum integrè nunquam dissolvit, quin intenerata aliqua particula evadit, quapropter chylus sub stomachi exitum non percipitur, & quam plurimis partibus inutilibus confunditur. Ea de causa fluit per oblongam intestinorum fistulam, in quibus miscetur variis in locis cum diversis liquoribus, qui inserviunt separandis iis, quæ bona & utilia sunt, ab illis, quæ nocere possent conservationi corporis animati. Chylus à stomacho prodians in ductum pyloro continuum devehitur, qui intestinorum nomine designatur, qui verò chylus magnæ non est liquiditatis à ventriculo erumpere panisper emulatur gluten ex farina cocta cum aqua confectum, subgryseum exhibet etiam, ut illud, colorem, & magnam obtinet visciditatem. Sed diutius non perseverat in tali statu. Præterlapso duodeno ipsi statim admiscetur liquor quidam croceus, summe amaricans, bilis nomine cognitus, qui confus ex multo alcalico fixo, paulo volatili, paucis Sulphure, pauciori adhuc terræ & copioso phlegmate: unde concludere licet, bilem cum chylo permixtum alcalicis suis tum fixis, tum volatilibus, excipere partem quandam acidiorum, quæ Sulphura ejus colligata detinent, & hoc pacto visciditatem illam, quæ in duodeno præditus est, fovet, ita ut deinceps Sulphura Chyli majore patiantur libertate, & se invicem longius sint semota; quare inter particulas suas minus phlegmata suscipiunt, quæ integram massam diluunt, majoremque illi fluiditatem conciliant. Bilis à sanguine in Hepate separatur ad chylum in intestinis perficiendum, Sulphura illius alcalicis suis dissolvit, & ipsum phlegmatis suis diluit. Præter hanc bilem liquor adhuc aliustenuis & limpida aquæ instar in duodenum deplit, vocaturque *succus Pancreaticus*, qui ad lymphæ indolem ferè accedit, videlicet ex Sulphuribus phlegmatis & alcalicis volatilibus est confusus. Ubi primum in intestina decedit, cum Chylo miscetur, si occurrat in Chylo acidis quibusdam, quæ Sulphura ejus colligata teneant, alcali illius volatile ea absorbet, & hoc pacto Sulphurum reliquorum principiorum compedes solvuntur, Sulphura hæc, que in succo pancreatico continentur, inter chyli particulas se inlinuant, & Alcalicorum cum acidis fermentationem attemperant, prohibentque ne violentior evadat, tum enim damna plurima inferret, phlegmata viam sternunt alcalicis ac Sulphuribus. Ut eo melius cum

omnibus chyli partibus commisceantur. Ex his luculentur satis subsequitur, succum Pancreaticum chylum perficere, illumque liquidorem reddere, cujus acida alcalico suo obundit, & eadem viâ Sulphura dissolvit. Adeo necessarium est ad hominis conservationem, ut chylus ab acidis suis expurgetur, ut Summus rerum Opifex quàm multas in minimarum glandularum congeries posuerit in gracilium intestinorum tunicas, quæ in loca ista liquorem succo Pancreatico similem effundunt, qui pernixione suâ cum chylo id complet, quod bilis & succus pancreaticus ita prospère susceperant. Parvi illi glandularum acervi variæ sunt crassitie. Quidam ducentas & amplius glandulas complectuntur, quidam verò ne triginta quidem continent. Omnes chyli partes aptæ natæ non sunt subeundis canaliculis, qui *venæ lacteæ* appellantur. Quædam sunt crassiores, & illæ crallæ excrementa constituunt. Chylus abundat particulis venis lacteis subintrandis idoneis, quando à bile & succo pancreatico præparatus fuit, quapropter massa ejus tantopere in intestino jejunio immineatur, quoniam particule illius subtiliores ab ipso discedunt, & in venas lacteas propelluntur. Videmus etiam copiosiores venas lacteas à jejunio proficisci, quàm à reliquis omnibus intestinis. Sub jejuni terminis excrementa quædam cum multis particulis chylosis permixta reperiuntur. Succus glandulosus illis commiscetur, & dissolvit Sulphura partium chylosarum, quæ iis inhiunt. Quod ita paratum fuit, venis lacteis adhuc excipitur. Dein de excrementa illa in Ileum protruduntur, ubi adhuc in plurimis locis succo glanduloso adsparguntur, qui eundem, quem antea, edidit effectum. Tandem postquam penitus partibus suis chylosis exuta fuere, in crallâ intestina deturbantur. In venis lacteis reperitur lac, quod putus & putus chylus est, qui ab intestinorum cavitatem in venas lacteas compulsus est, quod sequentibus probatur argumentis: 1. Lac, quod in venis lacteis comprehenditur, ab intestinis prodit. Ad oculum patet veritas illa, cum venæ lacteæ digitis premuntur, lacte deplentur, & dein videtur illud ab intestinis venite venam vacuum repleturum. 2. Lac tantum in venis lacteis conspicitur aliquot horis post cibatum animal. 3. Jejunum ferè semper percipitur exinanitum, propter numerosas venas lacteas, quæ ab illo exoriuntur. Denique ex eo, quod reperiuntur excrementa pura in ileo, quæ crassiora adhuc sunt illud intestinum percurrente, quoniam plurimæ venæ lacteæ pluribus donatæ sunt valvulis sibi proximè adiacentibus, quæ ita sunt comparatæ, ut chylo commixtum per venas lacteas in glandulas mesentericas permittant, sed illius refluxui obstant. Copiosæ ab intestinis proficiscuntur, & plurimæ in unum coeunt, prout ulcerius progrediuntur. Hoc pacto truncos paulo crassiores componunt, qui chylum effundunt in vesiculas glandularum mesentericarum. Chylus vesiculas harum glandularum subintrat, ut in iis suscipiat spiritus animales, qui in illas conflant per plurimos nervos à plexu mesenterico oriundos, spiritus isti chylum subtiliorem atque fluidiorem efficiunt alcalico suo volatili, & si qua adit in illo aciditas, eam corrigunt, alcalicis suis ipsam excipiendo & in sal illam commutando. Chylus prætergressis glandularum mesentericarum vesiculis

culis duos tresve canales ingreditur, ex inferiori earum parte exeunt. Deinceps pertingunt ad succum quandam membranaceum in lumborum vertebres positum, *Receptaculum chyli* nominatum, quod idem est, ac lymphæ cisterna. Chylus enim in hoc cum abundantiam lymphæ commiscetur, quæ turgescit receptaculum. Ab ipsâ diluitur & liquidior fit: ut facilius fluat. Denique à Chyli receptaculo præfiscitur canalis quidam, *Ductus Thoracicus* vocatus, qui aliquoties in furcam dividitur, & rami ejus denuò coalescunt, & sæpè etiam simplex observatur advertiturque. Canalis hic implantatur venæ subclaviæ, & supra insertionem ejus adest valvula, ita ut sanguis, qui in vena subclaviâ fuit, super illatrat, nullo chyli ingressui obiceposito. Cum insatur ductus Thoracicus, copiosè conspicitur valvula in illius cavitatē.

Ex quibus concludendum, chylum ex receptaculo suo, in venam subclaviam sinistram deferri, ubi sanguini immiscetur. Cursum ejus insequitur & in venam cavam delabitur, quæ ipsum in dextram cordis auriculam advehit. Auricula illam impellit in dextrum ventriculum, & ut chylus tum temporis sanguinis partem constituit, cum ipso fluit, per totum corpus una circulat. Hæc præmissis facile perspecta est, ex omnibus succis corporis nostri *solum chylum* potissimum corpulentos ac succulentos reddere. Corpus enim nostrum ex ineteris canaliculis constat; quo quis ergo copiam succorum habet abundantiorē, eò major exiit, si enim succi multi vasa transeant, ea sensim ac sensim dilatant, ut plus succi recipere possint; sic homo qui 280. lib. ponderat, plus quàm centum libras succorum habet, estque ponderosior. quàm alius macris homo. Chylus autem ut genuina & vera lactis est materia, ita idem sanguini in axillâ seu subclaviâ sinistra permixtus & aliquoties circulator, non illic in sanguinem mutatur, sed sub lactis suavisissimi formâ aut sanguini infusus, aut sub gelatinæ albicantis formâ à sero vel nutrimenti vehiculoso solutus, mediâ tibus valis sanguiferis in totum corpus distribuitur, omnes ejus latebras perrepat, quia totum corpus ex innumeris & solis tubulis constat, partes æquè membranaceas ac nervosas nutrit, & superfluum paulò à minutissimis membranaceis tubulis receptus per eas transit, & superficie earum hærens in pinguedinem succrescit, imprimis chylus ratione olei, quo abundat, & sic pro amplitudine ac laxitate & constitutione tubulorum pars quasi superflua nutritur, hinc & solum lac nutrit infantes tenellos, eosque impinguit. quod & sæpè videmus in emaciatis, qui solâ lactis curâ ad obesitatem ac corpulentiam restituntur. Nam, ut dictum est, butyrosa, seu oleosa lactis, seu chyli substantia os humerosque similis est pinguedini corporis nostri. Massâ ergo sanguinea copiosior, eaque minus salina, acris & aspera, sed suaviter oleosis temperata existens, & simul blando dulci ac fluido chylo, eoque copioso pingui ac oleoso turgida, existentibus simul tubulis amplioribus & laxatis, & præcipuè circa extremas corporis partes, homines reddit nimis corpulentos; fluidum chylum hunc esse, ut per vasa minutissima fluere possit, necessarium, & aptitudinem partium solidarum respondeat opus est, nempe tubulorum & spaciolorum amplitudo inter fibras partium molliores paulò, ac specia-

tim circa membranaceas & cutis glandulas, imprimis verò circa membranas externas intra panniculum carnosum & cutim fibrasque musculorum Trunci & abdominis. Num verò pinguedo hæc medianibus glandulis in solum hunc usum destinatis, à sanguine malsa fecernatur, & in peculiare tubulos seu vesiculas defluat, sub cute ejusmodi tubulos maximâ in quantitate reperiri quis dubitat? Et membrana carnosa ut plurimum ex ejusmodi tubulis & glandulis constat, quæ tantum recipit & separat oleosas particulas, & si huic oleo plures acidæ & terrestres particule fuerint commixtæ, fit *pinguedo*. Pingues enim istæ particule non manent in suis cellulis sed per alios tubulos refluunt in massam sanguineam. Quorum ergo sanguis multo scaturit acido & salso, isti homines haud sunt obesi, quia ab acido & salso absunt citius oleum: sic & illi, qui laboribus dediti sunt, raro obesi redduntur, quia oleosæ particule avolant, & sanguis ob continuam transpirationem suas perdit particulas subtilissimas. Sunt & alii, qui multum edunt & tamen inanent macri, quia oleum & sulphur in alimentis vix sufficiens est ad acidum, quod in suis succis habent, temperandum, cuius generis hominibus conducunt pinguiæ & non acida. In Corpulentia nimia dum chylus massæ sanguineæ permixtus ad partes dictas alluit, earum porulis minutissimis se infinat, ipsæ membranæ musculorum aliarumque partium lacteo nutrimento implentur, cujus abundantia externè cutem versus irrigat, quia internè fibris musculorum sanguine vestitis adeo commode adherere nequit, ipsa verò cutis ex extremitatibus minutissimis arteriarum, venarum & nervorum reticulatim contexta dum per glandularum interitum ipsi intertextarum excretoria vasa. ut & si qui sint præterea, poros in specie sic dictos insensibiles transpirationis materiam vaporum formâ transire permittit, crassiusculum lacteum nutrimentum cum sanguine allatum externorum pororum angustias cohibet, quod ita introitum versus coercitum successivè in corporis peritoma adiposum densatur, ceu loquitur beatus D. *Escmüllerus Disp. de Corpulentia à nimia*. Male & irritò quodam ausu alii crescendi vim ex cerebro per medullam spinalem derivare conantur. Inter causas remotas referre possumus omnia ea, quæ massam sanguineam lactescentem seu chylousam reddere possunt, huc facit multum optima chylosis & constitutio radicalis succorum & spirituum. Ordinariò quidam ad corpulentiam hanc dispositi sunt, & familiarè reperiunt, in quibus sunt homines obesi, hoc, me iudice, evenit, quia in his à nativitate fibræ ac tubuli extremorum sunt extensiles & ampliores, ob quam causam & formam præ maribus possunt esse magis corpulentæ. Stupenda est ista obesitas pueri recens nati ex imaginatione matris, cujus mentio fit in *Ephem. German. Decur. Ann. 6. p. m. 380.*

Inter res vulgò nonnaturales ita dictas sunt, quæ symbolum suum addunt corpulentie nimie; Aër nempe temperatus, hinc in regione temperatâ, imprimis nonnulli Boreali, obesos reperiuntur homines; qualis enim aër, talis massâ sanguinea, hinc Galli & Itali non sunt ita corpulenti, ut nos Germani; sic & Boëtii sunt pingues, juxta notissimum illud:

*Bœtium in crasso jure aëre natum.* Deinde & potus copiosior & temperatus ingettus, maximè

maximè si digestio simul ritè peragatur, necessa-  
rio homines corpulentiores reddere debet. & Pa-  
nis tanquam optimum nutrimentum, & *Hie-  
montis*. Theriaca alimentorum audit, multum  
facit ad corporis auctiorem. 7. et *paffulas* Co-  
rinthiacas pinguefacere dicit, ut & caricas, sic &  
ob oleositatem, quam habent anygdalæ dulces,  
pistaciæ, pingues ex eorum usu evadunt homi-  
nes, quibus annumeranda sunt miltum, hor-  
deum, triticum, unde crevisit triticeæ & hor-  
deaceæ maximè nutriunt. Lac quoque uti in-  
fantes pingues reddit, sic & adultos inprimis  
cum Thee paratum, nec non butyrum; quò per-  
tinent omnia alimenta ac potulenta insipida ac  
crassiora, ut inter alimenta sunt pulli gallinacei,  
gelatina, uva recentia, aliaque carnes tempe-  
ratæ & mucilaginosa, quæ omnia potentius nu-  
triuunt, & corpulentiam augmentant. Potulen-  
tia etiam multum huc contribuit Liquida, aqua  
enim censetur *Celeb. Malebranche in Explicat.  
f. ad libr. 3. p. 103.* humores nimis crallos resolve-  
re & circulationem sanguinis per omnes corpo-  
ris partes faciliorem reddere potest, huc perti-  
net cerevicia Brunsvicensis, & noster Brya-  
nium. Ut verò laeta & splendida victus ratio  
incremento corporis multum contribuit, ita  
quoque otium & quies affectui huic producendo  
admodum sunt idonea, tempore enim somni &  
quietis circulatio sanguinis, chyli aliorumque  
succorum optimè peragitur, hinc somnus &  
quies homines impinguare possunt: uti vigilia  
& labores succum nutrimenti attenuant & nimis  
per sudorem eliminant, & acrimonium accen-  
dunt. Quidem enim somnus & quies faciunt, hoc  
videre est in Ursis, Taxis, Muribus, qui tempo-  
re hyemali in latebris quiescentes somno sepulti  
pinguiores evadunt. Hinc *Martialis*:

*Dormitis niqum glires, vitulique marini.  
Nil mirum, si vos crassa Minerva premit.*

Rationem addit *Cl. D. Ettmüllerus*, partim quod intra omentum, aliaque viscera interna collecta pinguedo; de qua *suprà*; (successive) attenuata, sub nutritionis partium nervosarum munere, indeque et alia quoque in loca distribuitur, et ibidem sub corpore illo agglutinata aliqualem copiosioris pinguedinis speciem repræsentet, partim quod sanguinorum ex voracitate prægressæ æstatis chylocrassioris abundans, hunc quantum ejus possibile sibi assimilatum, in nutrimentum partium sanguinearum impendat, crudior et quasi pituitosior ejus parte, partes solidas obfidente, et sub habitu plus minus leucophlegmatico, corporis peripheria occupante, ac speciem corpulentioris habitus repræsentante; id quod facile fieri potest, dum sub istâ quiete et rarsa respiratione tardior est motus sanguinis localis, remissior intestinus, unde tarassima sanguificatio, paucissima transformatio, parsissima nutrimenti absorptio.

**Примечание.**

§. 11. *Nimia Obesitas vel Corpulentia* non tantum immaturam aetate feneſcit, cum fuerit pinguedo cumulatâ copioſiſſimè & enormi quantitate per univèrſum corpus ſparſa, verum etiam repentinè ſapius mortis occaſionem dat, unde *Hippocrates*, *Medicinis Patens* & accuratus omnium rerum medicarum Obſervator, optimè inquit: *Qui à pueritate valde ſunt obſi, celerius moriuntur, quam graciles*. Cui noſ ejuſmodi plura, etiam novius exempla, & primò in

Cive Hanovienſis K. 46. annos tantum attingens, & pinguedine ſuffocato; deſign Anſæ Magiſtro Schaumburgico Nannſch dicto 47. anno ſuæ ætatis apoplexiâ ſubitò deſuncto; aliſque pluribus, Expoſiti enim ſunt ejusmodi homines craſſi catarrho ſuffocativo, paralyſi, apoplexiæ, Hydropi, &c. Pingues enim non ad longinquos perveniunt annos, alſi nuperrimè brevior ſunt vitæ. Nam cum illis paucus ſit ſanguis, & ſpiritus ipliſ citò vel minimâ de cauſâ coagulatur & ſtagnat, unde moris, quæ nihil aliud eſt, quàm coagulatio ſeu ſtagnatio omnium ſuccorum circulantium, Exemplo ſit Reverendus iſte Miniſter Johanneſ Majuſius Polonus, cujuſ mentio ſit *Ephem. Germ. Ann. 2. 1787*, ubi poſt Chirurgicali apertione, in abdomine poſta muſculoſam carnem, ſcitè amplam & robuſtam, adeps coloris ad citiſſimum vergentiſ, octo digitorum tranſverſorum craſſitiem ſuperans conſpiciebatur. Similem adipem obſervavi in cadavere *Kochendorferi*, Civis Hanovienſis à me exenterato. Hinc optime *Plinius* inquit: *Pinguia corpora citius ſeneſcere*. Et certè Pinguedo muſculis adnæſcens inter vaſa quæcumque, cum multa eſt, adeo arctè conſtringit Spiritum & ſanguiniſ vaſa, n̄ libera circulatio plurimum impediatur, unde neceſſario anguſtia & ſpirandiſ difficultas, & tandem moris oritur, quod & jam diu agnovit *Galennuſ 2. aph. com. 43.* malus eſſe ſolet ad craſſitudinem exceſſuſ, quod in iſ anguſte ſit cum arteriaſ tunc venæ: atque ob id, qui craſſiſſimi, & tamen omnino ſanguinem habent, atque ſpirituſ adeo, ut quàm ætatē proceſſerint, citò ipliſ, vel parvau ob cauſam vitæ deſſectuar.

§. 12. Quantum tūm à morbis, tūm à morte *Diatæ* præfervationis virium fit in *Diatæ* regimine, quotidiana docet *Experientia*, & *Seneca* id inculcat fequentibus, dicens; *Non accipimus brevem vitam, fed fecimus, nec inopes ejus, fed prædigi fumus: ficut amplæ opes, ubi ad malum Dominum pervenerunt, momento diffipantur, at vero licet modica, fed bonæ cæftæ, tradita funt, crefcunt.* Quare & Nos de re in omni vitâ, maxime verò in cujusvis morbi curatione tam necellariâ, de productione & tractatione *Corpulentia* nimia: folliciti, non quædam ægimus in genere, fed in fpecie designabimus, qualem *diatam* *Corpulentia* nimia conditio poffulet. Atq; ergo ad innuendum *Corpulentiam* nimiam debet elle subtilior ac calidior & ficcior, hujus enim ope fucci magis attenuantur & refolvuntur, hinc plurimæ reliquæ ex chylis in auram avolant & evacuantur, & pars reliqua non tam in copiâ apponi poteft, quapropter obefi eligant calidiores, imprimis, quæ *Tropicis* propinquioreſ funt regiones; huc & referre licet ætrem arte calefactum, ut bulneum ficcum, hypocaſtum, &c. Ut etiam *corpulenti* & *pingues* facilius macrefcant, cibus & potus fit parvus ac paucus, nam abſtinentiâ plures certè curantur morbi, imprimis verò *Corpulentia* nimia. Nulla enim res minuit majori celeritate & ſecuritate *pinguedinem*, quàm ſubtractione fluiti, ſolidi ac humidi. Quoad qualitatem, cibus non fit ſitperpetus; ſed acris, ſalinus & acidus, urticidat, attenuet & refolvat; ſic & ea, quæ vim diureticam habent, multum juvant, ut & omnia aſperiora & alcalica, quæ citò ſanguinem percurrunt tranſeuntque, inter quæ ſunt





hendoque aliquid fomno. 5. usurpando parcius alimenta multi, optinij; succi, horumque loco sumendo, quæ minus nutriunt aut difficilius fermentantur. Corporis verò Obesitatem curat, 1. usurpando sæpius satis abundanter condimenta quævis acris, tum acida, aromatica, hoc est, salsa, vel amara, quæ ràm liquores glandulosos præstent acidiores, quàm bilem magis amarum, & acrem; in quem finem commendata cæcum, succum citri, umfalis, &c. piper, caryophyllos, sinapi, raphanum quævis, imprimis rusticum. 2. Corpus movendo multum. 3. Animum torquendo curis. 4. Somno inlies aliquid detrahendo. 5. ab alimentis oleosis & pinguibus in totum abstinendo; sic enim paulatim non tantum pinguedinem superfluum consumi, sed ejusdem augmentum novum impediri promittit.

Caveat  
ut.

§. 18. *Carsesiam* ad imminuendam *Corpu-  
lentiam nimiam*, primam adhibent curam, ut superfluum non modo, sed consuetum etiam partibus detrahatur nutrimentum. Hoc verò cum chylus sit optime elaboratus, & hic ex cibo & potu facilis concoctionis & probi succi perfectatur, abstinentiam & jejuniæ non parum facere ad nutrimenti immutationem asserunt, siquidem in absumti locum paucum subministratur. Si verò detractio hæc alimentorum nondum sufficiat pro liberatione machinæ humanæ vivæ ab onere tam gravi, agilitati membrorum ejusnagno existente obstaculo, etiam pinguior succos partibus firmius adherentes & crassitatem augentes, absumere tentant, attenuando videlicet eosdem, & à quiete ad motum reducendo, ut particulæ oblongæ lubricitate suâ per tubulos & poros evadant, ramuliores & molles indurecant & frangantur, paxillares verò, acutæ & cuspidatæ augeantur & in priores domum ad adipiscantur, quibus fermenta propria partium benignè in statum deducantur actiorem & acidiorè, sicque per arteriolas ad vectum liquorem chylosum magis fundant, præcipitent. & potissimum in glandulis lymphæ productionem adaugeant, quæ postmodum facilius per poros cutaneos evaporetur, vel ad renes & ureteres delata copiosè eliminetur. Huic scopo maxime accommodatas esse credunt anxias curas & labores, quibus liquor nervosus sive spiritus absumantur, quibus restaurandis dum major succi chylosi pars massa linguineæ sit impendendus, ut ex eadem sufficiens hauriri possit eorum peniti, & circulatio liquorum valde sic reddatur concitior, materia nutrimentorum absumitur, & elaboratio novi chyli non ita ob spiritum defectum peragitur, sed à succo pancreatico non parum eidem communicatur acidi, ad nutritionem augendam satis inepti. Itinera quoque longiora perversiones, & potissimum navigia instituta immutationi huic molli corporeæ admodum credunt proficua, magis verò si cibo & potui consueta simul detrahatur copia, ita enim per succosiones in thedis aut curribus succos corporis non modo agitari, fundi, & lymphæ fluxum ad ureteres promoveri, aut ratione vaporum ex aquâ ascendentem, & inspiratione assumentorum, succos acidos in corpore augeri putant, & portionem non paucam succi nutritivi absumi, sed in absumti locum parum restitui, ut particulæ pinguiorè in partium nutrimentum facile abire debeat. Pronitius verò id peragi putant,

si medicamenta unâ assumentur ramolas particulas frangentia, & unâ cum teretibus magnâ copiâ ad renes & ureteres pellentia, ut per urinam excrementur, & propter hoc in casu acidulas approbant, aliaque remedia particulis constantia acutis, assimilationem succi inhibentia, qualia sunt nitrosa, vitriolacea, arcanum duplicatum, tartarus nitratus, vitriolum Martis, nitrum crudum, fixum, lapis prunelle, quibus omnibus diuresis augetur, cujus gratiâ lixiviosa etiam copiosius propinant, quibus succi chylosi & glutinosiores inciduntur, resolvuntur & attenuantur, ut in lympham citò facillè & per vesicam evacuentur. Non sufficiente diuresi, etiam salivationem excitant, quâ chylus resolutus non minus sub specie salivæ aquosioris copiosè excrentur, eamque mercurialibus facile excitant. Pro majori tandem resolutione & attenuatione succorum alibilibum frequentius institunt sudationes, quibus simul pori cutanei aperiantur, ut succi resoluti viâ brevissimâ evaporentur, ileoque decocta & essentias lignorum, quæ simul validè exsiccant, assidue habent in usu. Sed non prius hujusmodi sudorifera voluit exhibenda, quàm post peractam diuresin, cum aliis succi glutinosiores tam facile nequeant resolvi & attenuari, ut exhibitio sudoriferorum sit eliminetur, & hinc corpulentiores difficulter sudare asserunt, siabque ullâ resolutione tam cito ad sudorem cogantur. Resolutis autem succis & attenuatis, simulque poris cutaneis apertis, exhalationem eorum sponte etiam subsequi, per insensibilem transpirationem confidunt. Purgantia in hoc potius morbo, quàm in ullo alio, concedi posse annuunt, cum glandulas intestinales fortius irritent, ut lympham contentam effundant, quâ emissâ, alia ex vicinioribus assidue assuit, simulque succus chylosus in ipsis intestinis hærens à lymphâ hæc glandulari acriori redditâ cum scybalis durioribus eliminetur, antequam per vasa lactea ad commune devehatur receptaculum. Per amara quoque diutius usurpata pinguedinem simul absumi. & prohiberi credunt, ne nova tam facile colligatur, quibus si salia adjungantur, scopum hunc citius attingi referunt, quapropter, cum essentia absinthii, vel centaurei minoris, vel corticum aurantiorum, vel tincturâ myrrhæ spiritum salis, vel clystum minerale commiscunt, & quotidie ferè ad scrupulum unum vel drachmam dimidiam propinant. In morbo demum contumaciori etiam millepedes & cantharides in usum inducere cum aliis consuecunt.

§. 19. Præmissis his curationem nostram agredimur, initio factò, secundum triplicem methodi medendi indicationem: à *Curatoriâ* malum ipsum respiciente exordientes, & cum contrariis contraria curentur, ut impedimentum & periculum sanitatis ac vite, quod sæpè ex Corpulentia nimia impendit, auferatur, eo iucumbendum est, ne nimium generetur nutrimentum, vel genitum & superfluum per consuetas vias eliminetur, ut & rubuli seu fibræ, tanquam solidæ partes nimis laxæ & extensæ, aliquomodo constringantur, & quasi exsiccantur, ut ita contractiones fiant, & ob poros interceptos angustosque nutrimentum excludant. Alimenti copia ut impediatur necesse est, minuendo assumentorum quantitatem, & emendando eorum qualitatem, ne adeò sint temperata, al-

Nostre  
ratione  
curandi  
Corpu-  
lentiam  
nimiam.

terando sub digestionem chylum, ne adeo insigniter nutritivus, sed potius sudoriferus ac diureticus generetur, reddendo massam sanguineam ex dulcescente acrem asperam & salinam, sic enim citius eliminari potest. Genitus enim succus nutritivus sue assimilatus attenuatur, resolvitur si vel liquefit si vel evacuat ex corpore, si vel per alvum, si vel urinam, si vel sudorem, si vel salivam, si vel insensibilem transpirationem. Abundantia enim succorum seu copia ubi, redundantia sine tumore vasorum & morte existere nequit. quare hanc expungere oportet, cum ejusmodi tumor, & quæ inde consequeretur vasorum ruptio non appareat. Quid quod succorum indies consumptio tanta sit in transpiratione, sudore; alvi ac urinæ ejectione, ut nulla videatur fames, digestio nulla, nulla denique magna ingurgitatio cibi potusque incidere possit, quæ abundantiam vel minimam, taceo eam, quæ per dies aliquot aut menses totumque morbi cursum perseveraret, efficiendo induceret. Addeamus ex pleniore victu aut crapula copiam humorum gigni, quamdiu erit? Sanè vix uno vel altero die, & levius iudicia eam prorsus dissipabit. Quin uno si copia succorum peccaret, una venæ sectione purgationeque, vel una quæ copiose evacuat, morbus prociuss tolleretur, cujus tamen rei nullum est inter observationes exemplum, nullum ab omni memoria repetitum. Verùm opponunt adversarii, suppressi evacuationes, hinc colligi in vasis humores, sed quænam suppressuntur? an transpiratio? Sanè ea non potest fieri absque vitæ extinctione; Jam Urina ubi sistitur? in una lithuria sæpe lethali. Alvus fautor, sæpe constingitur, verùm quæ hinc evacuantur, nullo numero sunt. At ne quis dubio locus sit, statim dirimit omnem licentem, ad pondus enim librati, qui in morbum incidunt, suntne ponderosiores, quàm erant dum erant sani? Nequaquam, sed leviores reperiuntur, & hoc magis. quomodo duntaxat ægrotant. Itaque humores abundantes aut nullum habeant pondus, aut nulla sit abundantia, necessum sit. Certum ergo est nostrâ experientia, de 8. libris alimentorum tandem duas in nutritionem nostram converti, reliquis verò, & quidem potissimum per insensibilem transpirationem ac reliquis vias excerni: quia consumptio per eam, renes & alvum non desinit, aut si alvi intermitte, raro lotium, nunquam verò transpiratio suppressitur. Quid quod si ad ea attenderis, quæ agunt ægri, antequam conqueruntur, comperies ita plerumque eos se componere, ut plus consumant, quàm instarent, etsi quotidie bibant & vorent, ut deinde clarè conficiamus. Tandem pondus ad statetam dubitare nos nequaquam sinit, quia ex victu pleniori vel crapula plurius dierum, imò mensium aut annorum nemo fit ponderosior, omnes verò plus minus leviores. Notum est lippis & tonsoribus, quod corpulentia maximè tollatur sub febris ardentibus, item in Scorbutica salina atrophia, ubi omnes succi corporis sunt acres ac salini, ac calore exedente præsertim febrili liquefcere contenta quælibet, & attenuari magis, oleosæ plus minus cum sint texturæ, non secus ac ipsa pinguedo, nemo facile inficias ibit. Ad Corpulentiam abigendam ergo proficua erunt quæcumque aciora assumpta medicamentosa, ut aromatica, salina, ac acida, accedo omnis est vel acida, vel salia. Diuretica

etiam optima sunt, per urinas enim quosdam omnem suam Corpulentiam exuisse, *Helmontius Tr. jus diuimorat. §. 19.* jam dudum agnovit, & id confirmat diabetes, quæ correpti emaciantur: hinc ex pinguedinis aut totius chylosi liquefacti cum salibus urinariis missi mutua temperatura, & in dulcedinem vergente textura urinæ diabeticorum miram dulcedinem derivandam vult *B. Ettmüllerus.*

Diaphoretica posita sic dicta corpulentos emaciant, hinc illi, qui diata lignorum sudorifera utuntur, extenuantur, ut & illi, qui vehementibus laboribus vel exercitiis corporis sudorem exulando crassiores exiunt habuerint, ut & ægrotantes, qui valde sudant, macrescunt. Purgantia vehementiora & aciora maxime corpora attenuant emaciantque, ceu videre est in illis, qui vel diarrhæa & dysenteria diutius laborant. Per purgissimum corpora etiam insigniter emaciantur testatur lues Venerea, per Mercurialia crebra salivatione curata, præter summum enim quæ per quosvis poros meatusque penetrantiam, acerrimum ejus  $\Delta$  externum penitus destrueret potest & superare  $\Delta$  animale coagulativum nutrimenti, seu ab ejusdem acrimonie adeo mutari concretum coagulati alimenti mollioris pinguedinis & carnis, & coagulatore destructo concretum resolvatur in liqumini viscosi consistentiam. hinc per convenientia cribra transcolandum & excernendum. Ad alteram ergo Massam sanguineam, eamque attenuandam, ac resolvendam, laticem serosum, ejusque contentam gelatinam chylosam fundendam ac evacuatam, & sic Corpulentiam nimiam imminuendam, diximus convenire Purgantia, inter quæ tamen delectus institutus, ne aciora exhibendo magis lædamus, & pro attenuatione corporis mortem acceleremus obelis; hinc rejicimus helleborina, scammoniata, colocynthiaca, elæteria, ac ejusmodi venena potius quàm medicamenta, quomodo verò hæc corpori nostro nocere possint, vide *Epistolam nostram secundam ad Celeberrimum Dn. VValdschmidium datam.* Blandiora tamen aloëtica, quæ vim exsiccativam habent, ut sunt pilul. Francosurtenl. aloëphang. Clavian. &c. in hunc finem concedi possunt cum myrrha mista, quæ uti alia amara, detergiva quasi suâ amaritie luccos attenuare & dissolvere simul, bilem acueret & sic acriorem & amariorem chylum reddere queant, quo major enim bilis acrimonia, quæ nutritio minor est, hinc bilioli raro sunt corpulentum, & pilulæ aloëticæ quæcumque, item ex aloëticis parata Elixiria, Extracta, nec non ex Rhabarbaro aloë & agarico parata insignis hic præstare commodum, unde nemo mirari debet, quod pilulas ex amaris paratas ad Pl. singulis matutinis sumendas adeo suadeat *Plateri Prax. T. 3. p. 51.* quæ sequentes sunt.

*R. Rad. aristoloch.*

*gentian. aa. 3j.*

*rub.*

*Summis. sem. min. aa. 3ß.*

*O crud. 3j. c. succo.*

*Polypos. f. Massa.*

Inter Diuretica alijs præferimus Orea & nitrofa, hinc conducit Ra Nephretica Moebii, & nostra ad Calculum ex  $\Delta$  & nitro confecta, ut & arcanum duplicatum, quod sequenti modo parari potest.

*R. Capni.*

Capit. mori. ex destill.  $\nabla$ . q. pl.

cum  $\nabla$  extrahat  $\Theta$ .

vel:

$\nabla$  part. iij. vel iij.

$\Theta$  li Hungar. p. j.

Funde in Crucibulo & infice fl.  $\Delta$  ad depravat.  
tunc refrigeretur,  $\nabla$  solvatur, filtretur, & in-  
spissetur. vel:

$\nabla$  li in  $\nabla$  salur. q. p.

$\Theta$  q vel  $\Theta$  fix. in  $\nabla$  resol.

q. f. ad punctum saturationis filtra & eva-  
pora.

Sic etiam contra Obesitatem sequens diureticum  
egregium est.

$\nabla$  volat. succini part. iij.

Lapid. prunell. p. iij.

$\Theta$  q fix. p. fl.

M. dosi a gr. x. ad xx.

vel:

$\nabla$   $\Theta$   $\nabla$  iij. fluant,

add.  $\Delta$  3b. deflagret,

add.  $\nabla$   $\nabla$  iij. deflagret.

Acetum etiam sicum Bilichio sic dictum com-  
mendatur a pluribus, nempe q seu  $\Theta$  istud ole-  
um, ex acido vini & fœcibus ejus alcalinis oleo-  
sis solutis enatum, quod potenter absorbit pin-  
guedinem. Alii commendant instar panaceæ con-  
tra Corpulentiam nimiam pulverem ex  $\nabla$  de-  
purat. & cynarum seu julorum Coryli verno  
tempore excrementum æquali portione para-  
tum, mane & vespri sub introitu lecti, quan-  
tum cuspis cultri capit, aceto prius irroratum  
assumendum. Forests sequente pulvere aurifa-  
brum se curasse narrat.

$\nabla$  q 3ij.

Cinamom. 3ij.

Zub. 3j.

Sacch. albiss. 3iv.

M.

Terra foliata q elegans est remedium, post quod  
vel primum locum sibi vendicant  $\Theta$  lata; sic ole-  
um  $\Theta$  li super  $\Delta$   $\nabla$  iij. effusum, indeque per  
retortam destillatum egregium est, cujus destillati  
guttx 8. vel 9. in  $\nabla$  rosatum assumtæ & sæpius  
reiteratæ ejusdam viri obesitatem, qui 4. ulna-  
rum circumferentiam habuit, in tantum dimi-  
nuit, ut 5. ulnæ quadrantum maior redditus  
fuisset, curatam notavit sæpius laudatus *Estimul-*  
*lerus*. Acidulæ quoque Martiales, vitriolacæ,  
nitrosæ maxime conducunt in obesis, quia per  
urinam & sudorem eliminant chyli portiuncu-  
las, ceu patet exemplo calus primi l. 6. *Dn. a*  
*Guldenklees*. Nec Theriacæ exliccantes potæ &  
pro balneo adhibitz inutiles erunt, imprimis  
Embsenses & Carolinæ, quæ hodie magno in  
usu sunt, extrinsecus enim admodum stringunt &  
corrugant plus solito relaxatas fibras, arctantque  
& angustant partium tubulos, quo ipso copio-  
sioris nutrimenti recepto necessario impeditur.  
Ex regno vegetabili præ aliis commendamus po-  
tatum Theæ, qui omnibus indicationibus satisfacit.  
alvum enim follicit, urinam & sudorem  
movet; maxime enim est nitrosus, nostræque  
experientiæ constat, hoc potu, addito simul se-  
mine fraxini, quandam ad duas ulnas in circum-  
ferentia fuisse macilentorem inde ad dimidiam  
ulnam redditam. Sic etiam succus betulæ, se-  
men urticæ cum melle mixtum, item Terebinthi-  
na cum saccharo, gummi Juniperi, vel pilulæ  
ejus Myrsilichti ceu insigniter diuretica & deter-

siva contra obesitatem maxime laudantur.  
Rum Diureticam sequentem tanquam experi-  
entiâ sæpius hoc in casu utilem repertam com-  
mendamus junioribus Medicis.

$\nabla$  Milleped. ppt.

Apum ppt.

Cicad. ppt. aa. 2b.

Cantharid. p. ij.

M. F. Pulvis, & Ra cum liquore  $\Theta$   $\nabla$  fixi,  
hinc cum  $\nabla$  extrahatur. Detur à guttis x. ad xv.

Inter Sudorifera commendamus varia ex li-  
gnis parata, quæ attenuando Massam sangui-  
neam, ejus circulationem rapidiorem reddunt,  
unde superfluum alimentum, seu succus nutri-  
tius sensim liquefactus, lymphæque denuo im-  
bitus, sensim per poros corporis exteritur;  
hinc præter decocta Delicioribus sequentem  
præscribimus Essentiam lignorum ad xxx. guttas  
sæpius exhibendam:

$\nabla$  Lign. sanct. lb.

Cort. ejusd. 3ij.

Sassafras 3v.

Sarsaparill.

Lign. buxi & pini aa. 3ij.

Santal. rubr. & citr. aa. 3i.

Lign. rhod. & nephri. aa. 3b.

Bacc. Juniper. 3vi.

affund. liq.  $\nabla$  fixi q. f. Ra longiore dige-  
stione, qua rursus  $\nabla$  res. f. extrahatur.

Spiritus verò sequens Catarrhalis noster egregias  
possidet vires in Corpulentia nimia abigenda.

$\nabla$  C. C. volat. opt. 3vij.

Oliban.

Mastic.

Myrrh. aa. 3ij.

post 24. horarum infusionem destill.

Dosis à guttis 10. ad 60.

Sequens pulvis Ferdinandi Imperatoris contra  
Obesitatem à pluribus magni æstimatur.

$\nabla$  Pulv. Sarsaparill. 3j.

Coriandr.

Anis.

Cinamom.

Caryophyll. aa. 3ij.

Calam. arom. 3j.

$\nabla$  3b.

Sacchar. alb. q. f. f. Pulv.

$\Theta$  lia volatilia more recepto in mensa accipi pos-  
sunt, imprimis  $\Theta$  C. C. volat. vel succin. quod  
est optimum sudoriferum & potens Diureti-  
cum. Ex  $\nabla$  liabilibus sequentia egregia sunt, cum  
per sudorem & urinam opem ferant. Ra  $\nabla$  iij  
lata optima est, hæc tamen juxta præparatio-  
nes variat, omnes quidem continent  $\Delta$ . sed ma-  
gis vel minus fixum. hinc quoque Ra vel cathar-  
tica, vel diaphoretica, vel diuretica, & tempe-  
rans paratur; sequens verò hic optime conveniet  
Ra  $\nabla$  iij alcalina dicta.

$\nabla$   $\nabla$  iij crud. pulv. q. f.

Liq.  $\nabla$  fixi q. f. ad eminent. 8.

digitorum transversorum, diu digere.

Ram decanta & elice cum  $\nabla$  res. f. cat.

vel:

$\nabla$   $\nabla$  iij crud. q. v.

errora  $\nabla$   $\nabla$  Sale volatili liquido,

& admo  $\Delta$  excrescet  $\Delta$ , quod collige

& extrahat cum  $\nabla$  res. f. cat.

Vel sequens Ra  $\nabla$  iij Regulina.

$\nabla$  Reg.  $\nabla$  iij part. j.

$\nabla$  part. iij.

O o o 3

redi.

redigantur in pulverem, qui detoneat, hinc cum ~ vini rectif. f. Ra. Sic etiam ex *Gnucrud*, part. j. & *Opert. iv. pulverisat.* & detonat, cum ~ rectif. paratur Ra elegans.

Pulveres viperini tam simplices quàm compofiti non minùs conducent, hinc novimus Medicum quendam Empiricum illas pro univerfali remedio venditantem, & modo in formâ Eleâtuarii, modo in formâ pulveris exhibentem, imprimis pro magno arcano æftimantem; Eleâtuarium in omnibus morbis conducibile, quod paratur ex confectione alkermes, paucis guttis ~ Oli. Specif. Cephal. & pulvere viperino, fed ut audio fama ipfius cum pulvere expiravit, & in auram avolvit cum promiffis fuis magnis & audacibus.

Quod attinet reliquis Chyrurgicis Operationes in Obefitate nimia, abdominis fcilicet incifionem, pro imminuenda & tollenda, seu extrahenda pinguedine, cujus mentionem facit *Plinius l. ix. c. 37.* dum inquit: *L. Aproni Confula-*

*ri viri filio detraxit adipem, levatumque nec corpus immobile onere, tantumquam impoffibilem & periculofiffimam, nec unquam inftitutam, rejicimus: venæfeâio verò ad imminuendum chylum, & fic emaciandum hominem per vices inftitui poteft. Sic & fonticuli & fetacea hoc in affectu haud proferibenda, fed potius in ufum vocanda funt; hæc enim promifcue, quicquid inveniunt humoris alluentis, colliquescere faciunt, & ita etiam fucceffivè fuccum nutritivum in forma liquaminis purulenti exhauriant. Fames verò & labores cum animi paflionibus frequentibus, imprimis morore, terrore, &c. egregia remedia funt ad obefos ac corpulentos reddendos macilentiores. Tabacus etiam facit ad imminuendum corpus. Omnia amara, ~ia volatilia, ~ volat. viperar. Effent. abyfth. C. pilule de fandaracha *Myof.* aliis palmam præcipiunt, ut & Ziber in India conditum, aliaque aromatica in Indiâ folennia, quæ ibidem inter potum Theæ maximâ in quantitate affumuntur, hinc Indi funt ferè omnes macris texturæ.*

## CAPUT II.

*De Inflammatione, Abfcefſu & Sinu.*

## §. I.

**S**uccorum in corpore noſtro exiſtentium motus inordinatus, aut varia ejusdem tardatio, non tantùm viſceribus gravia importat mala, ſed externis etiam artubus. Quando enim contingit, ut hæc vel illâ in parte membrorum ob ſtagnationem ſanguis cum reliquis liquoribus diutius, quàm par eſt, ſubſiſtant, in tantum diverſarum in iſdem conimorantium particularum motus inſteſtinus augetur, in quantum progreſſivus imminuitur, non ſine noxâ partis illius, cui ſtagnatio iſta obvenit, inſigni, quippe poris ita à particulis craſſioribus obſtructis, ut globulis cœleſtibus tranſitus denegetur, igneæ particule ſubtiliſſimæ tanto partes contentas cum continetibus percellunt furore, ut magnum aliquando ſuſcitetur incendium, quod conſueto nomine *Inflammationis* Medici indignant.

Eſt autem *Inflammatio* partium externarum, affectus, qui quotidie in praxi occurrit, & Græco nomine *Pblegmone* exprimitur, interdum etiam *Pblegmone* nominatur, quando ſcilicet immoderatus accidit calor in partibus præſertim ſuperioribus, & ſpecialim in facie, ſed ſaltem momentaneus, abſque tumore, qualis ſeorbuticis frequens eſt, ex quo affectu ſuperiùs abunde egimus in capite de Morbis Faciei; ſtriâ verò denotat tumorem in partibus ut plurimùm carnoſis, cum rubore & dolore, à ſtagnatione ſanguinis & reliquorum ſuccorum in tubulis ſuis vel ex iis, vel extra eos in alienis eſaſtorum, & ſic ordinem in motu turbantium productum. Aliter etiam deſcribi poteſt. quòd ſit partis cujuſdam tumor extraordinarius, à ſanguine aliſque ſuccis in eâ ſtagnantibus & ebullientibus obortus. Vel dici poteſt rubedo partis alicujus inordinata. Fixatâ definitione ad leges Logicæ non opus eſt Chirurgo ad curandum ægrum, cum Scholaſticis iſtis temporis inuſitè tantùm teratur. Varia nomina ulterius, & quidem pro ratione loci, in quo hæret, aliorumque accidentium impoſita

fuère à veteribus. Volbere etenim Græculi poſteriores & illi, qui in ſcholarum pulvere conſenuerunt, quum rerum ſcientiâ veteres ſuperare non poſſent, magnâ verborum ſtrux, quibus umbraticam *doxocritias* oſtentabant, luxurare, & per vocabulorum myriades ſæpius rem obſcurare, non enim res, ſed nomina ſepiſſimè abſque neceſſitate multiplicarunt. Dividitur in partium internarum & externarum inflammationem, illa plerumque eſt eryſipelacea & malignis febribus aliſque communis. Veteres quoque diſtinxerunt in legitimam, quæ à ſanguine puro, copiâ tantùm peccante, oritur; & ſputiam, quæ à ſanguine heterogeneo, vel biliſio, vel ſeroſo crudo provenit, quâ tamen diſtinctione non opus eſt, quia conſtat, ſanguinem non ſolum, ſed unâ cum aliis humoribus, quibus permixtus eſt, eſaſari.

Abactis per diuturniorem ſuccorum ſtagnationem particulis eorum ſubtilibus, ſpiculis nempe & ſalibus volatilibus, craſſiores artibus junctæ miſcelam exhibent, quæ partem, in qua hæret, diſtendendo *Abſcefſum* producit, & quamvis vocabulum hoc ſatis generale ſit, omnem tumorem humoralem denotans, cujus cauſa in aliqua membri cavitæte ab humore extraordinariè collecto paratâ aſſervatur. Specialius tamen & *ver. & ex.* illud *Abſcefſus* genus hoc loco indigitat, cujus materia purulenta eſt. Dicitur & *Apoſtoma*. *Abſcefſus* enim eſt à verbo abſcedere, unde partes antea unitas abſcedere indicat, quæ in ſanem abeunt. Deſcribi poteſt *Abſcefſus*, quod ſit Tumor, in quo pus vel aliud extraordinarium latet, & cum ſanie permixtum, ex abſcedentibus fibrillis laceratisque vaſis. Sicque *Abſcefſus* eſt purulenta materia ex humore ſtagnante Tumorem excitante, in partis alicujus cavitæte collectio.

Vocabulum *Abſcefſus* laudis etiam ſumitur, & denotat continuitatis vel contiguitatis ſolutionem, quæ fieri ſolet in Crifi imperfecta ſic dicta à materia

*Inflam-  
matio.  
Pblegmo-  
ne.  
Pblegmone.*

*Abſcefſus.*



materia morbosica ad aliam partem vergente, collecta. *Abscessus* verò nostro sensu denotat, ceu diximus, Tumorem, cuius materia collecta chylosa obacidiu laetens & stagnatione elicitum in pus aut in saniem abit. Distinctio inter *Abscessus* est, quod alii sint *sine*, alii *cum folliculo*; sunt enim huiusmodi tumores in quodam folliculo & membrana inclusi, quorum materia vel speciem pulvis, ut in *Atheromate*, vel mellis, ut in *Meliceride*, vel sevi, ut in *Sreatomate* præ se fert, de quibus particulari Capite inferius agemus. Nonnunquam etiam in *Abscessibus* reperiuntur pili, ceit exemplum Curiosus in *Ephem. Germ.* communicavimus, item carbonem, testem, item plus centum lapilli excreti, ossicula, amurcam, lutum, lapides, chartæ, vermes, araneæ, lacertæ, ranæ, bufones, &c. de quibus omnibus videri possunt *Ephemerides nostra Curiose*. & quidam ipsarum *Annus 4. & 5. Obs. 189.* Quin non tantum superius dicta, sed insignis variorum humorum varietas in apertis *abscessibus* interdum observatur, quorum alius amurcam, alius vini feces, alius aliud quid refert cum deterimento sæpe factore. *Abscessus* etiam duriores inscit partes, hinc *Abscessum* ossis observavit *Bartholinus Al. Hassin. Volum. 3. Obs. 8.*

**Sinu.** *Sinu* nihil aliud est Chirurgicus, quam *Asciscus* exulceratus, inveteratus, quando nimirum in medio carnosarum partium tumor ut plurimum chylosus cum sanguinis effluxu stagnat, & acrimoniâ salinâ sibi exitum quærit, & simul fibrosas partes in liquamen putridum abire facit. *Sinu* est ergo cavitas in carne, producta à pure in quâdam parte diutius stagnante, cuius orificium strictius est, interior verò illius cavitas amplior & latior existit, & in quo cutis adiacens carni subiectæ non coalescit. Differt hic affectus à *Fistulâ*, partem flexuositate, partem callositate, quæ in *Sinu* haud occurrunt, hinc & aliis dicitur *Ulcus sinuosum*, & reverâ nihil aliud est quam *Ulcus*, & non opus fuisse distinctionem hanc, me iudice, in forum Chirurgicum introducere. Inflammationis status est talis, in quo pori partium solidarum ita occluduntur, ut materiz subtilis sensibiliter acceleretur transfluxus, cum dolore tenivo, pungente vel scindente, rubore partium, aliquando cum aliquando sine febris.

**Partes affe-**  
**ctæ.** §. 2. Omnes scetè *Partes* hi affectus occupant, præprimis verò musculosas; Musculi verò ex arteriis, venis, fibris tendinosis & nervosis constant. Primò tunicz illorum externam superficiem pervagantur, illumque perturbant. Penetratâ illâ, statim in subtilissimos ramos distribuuntur, qui fibris tendinosis inosculantur. Nervi aliquoties tendines subintrant, & interdum musculorum ventrem. Postquam in quamcumque ingressi fuerint partem, percipiuntur semper fines ramorum ipsorum fibras tendinosas attingere. Hæ omnes fibræ tendinosæ cavitationem habent, illas siphonis instar percurrentem. Musculi omnes subtilissimâ obducuntur membrânâ, adeo ut tria partium genera compositione Musculorum ingrediantur. 1. Copiosæ venæ & arteriæ in iis apparent. 2. Nervi & 3. tandem fibrillæ, quæ nec sunt arteriæ, nec venæ, nec nervi, sed fila quædam oblonga, tenuissima & tamen robustissima. Modus, quo fibrillæ illæ in musculis sunt dispositæ, quidpiam continet notatu dignissimum. Statim enim in unum coactæ occurrunt, & tum temporis funiculum exhi-

bent, deinde à se invicem desciscunt & inter se varias arteriarum & venarum ramos recipiunt; Denique in unum coalescunt, & funiculum rursus constituunt. Tendinosa membrana est minutissimarum fibrillarum sibi mutuo secundum longitudinem immediatè junctarum certa compages, cuius intermedia pars ab extremis differt consistentiâ, crassitie & calore & ab intermedia parte fibrarum motricium separata est per transversas fibrillas, propriæ musculorum membranae continuas. Prior & posterior funiculi tendines, sive caput & cauda musculorum vocatur. Pars illa, quæ inter caput & caudam jacet, & in quâ fibræ tendinum à se invicem disjunguntur, & ubi inter fearterias & venas admittunt, Venter Musculi dicitur. Inter fibras hæ membranaceas & tendinosas oriuntur ut plurimum *Inflammationes*, *Abscessus* & *Sinu*, quæ sæpe ipsas glandulas tum conglobatas, tum conglomeratas, imò nonnunquam interiora occupant viscera quæcumque, de quibus tamen hic non tractabimus, cum in capitibus specialioribus satis jam fuerint explicata; hic verò de affectibus externarum partium simus dicturi. Ubicumque his in partibus dantur intersticia, in quibus sanguini extra vasa aliquid peregrini confundi potest, & sic necessariò stagnat, ibi etiam *Inflammatio* locum habet: frequenter tamen est in partibus membranaceis. Hinc pro loci varietate Veteres peculiare nomen inpoluere, & propterea aliquot *Inflammationum* nomenclaturas recensebimus. Ubi igitur *Inflammatio* aduatum oculorum tunicam descendat, *Ophthalmiam*, si palpebræ cilium, *Ephoram*, si solum oculi interioris versus nasi radicem angulum, *Agilopa*, & hinc exortam exsectionem, *Sinu* & *Rhyndem* nuncupantur: in auribus *tragias*, in glandulis pone aures, *Parotida*, in gingivis *Parulidem*, in faucibus *Anginam*, &c. Si in externâ cute apparet renitens cum pulsatione dolorificus tumor, *Inflammatio* & *Phlegmone* à *phlegma* vocatur; quæ si mitior, *Oedematodes* dicitur; cui si ardor jungitur, & dolor & rubor latè se extendat, *Erysipelas* est, cui si ardor est intensus & per vices, *Phlegosis* seu *ignis sacer* etit. Externarum & *Inflammationum* nomina iterum subdividunt, & his ipsis nova condunt nomina, sæpius etiam barbara, quibus eas insigniunt, magnâ calliditate verborum strophis sibi eruditionis famam captantes; hinc in glandulis emergens *Inflammatio Phlegmon* seu *Pannus*, *Phyma*, *Bubo*, *Anthrax* seu *Carbunculus* vocatur; subius cutem *Ecchymosis* est, sub Unguibus *Paronychia* seu *Reduvia*: in *Pede Pernio*. Huc refer *Furunculos*, *Epinyctides*, *Herpetes*, *Pustulas* omnes, *scabiem*, ejusque species, *Achores*, *Tineam* & omnè ulcerum ac *Apostematum* genus, *Sreatoma*, *Atheroma*, *Meliceridem*, nec non *Gangrenam* & *Spachelum*, quæ cuncta non tam reapse, quam loco, gradu, nomine, colore & similibus accidentibus differunt, & nihil aliud sunt, quam *Inflammatio* ejusque effecta. Si quis verò Nobis objiciat, Nos ipsos methodum hanc tam strictè non esse secutos, is sciat, juniorum Medicorum captui nos accommodasse, ut de quæcumque parte morbis occupatâ latius & accuratius differuerimus, & quod medicamenta interdum pro loci varietate fuerint varianda, hæc de causa placuit *Veterum* insistere ordini, ut à quolibet omnia ritè intelligantur.

§. 3. Ut

*Diagnosi  
Inflammationis.*

§. 3. Ut in cognitionem morborum praesentium rite perveniamus, ad *Signa Diagnostica* animi sedulo advertamus. Id quod Inflammationem dicimus, est accidens partis alicujus, in qua observatur tumor, calor & rubor, cum pullatione & dolore. Tumor oritur, si in loco aliquo in tubulis angustioribus succus quidam stagnat, & inde canaliculi obstruuntur, & liber succi denegatur transitus, unde quidam tubuli tamdiu distenduntur, donec rumpantur, & sic succum intus contentum effundant, qui succus stagnans tumorem & tensionem efficit. Ex quo nam ubique, seu saepius dictum, arteriae & venae in partibus muscularibus existant, quae tunc per evasum succum in loco, ubi pars intumescit, copiosius expressum maxime comprimuntur, arteriarum inde oritur pullatio, quae aliis arteriis existentibus liberis tam vehementer non percipitur: Similiter cum sanguis quasi vi transeat & circuletur, hinc necessarii calor intensior oriri debet, qui non adesset, si sanguis ac reliquis succis liber concederetur transitus. Adhuc ad pressionem istam sanguinis violentiam per angustiores & exteriori coarctatas arterias & venas, non tantum oritur pullatio & calor, sed etiam dolor, dum scilicet membranae & fibrillae tendinosae violentia quasi preminuntur, & tenduntur, imò saepe planè dirumpuntur, hinc dolor diutius abesse nequit, particulae enim acriores spiculis suis partes membranaceas vellicant, quae fibrillis nervis impacter eas vehementius vibrando conculcunt, quod dum ad nervorum principia usque continuatur, sensorium commune eo, in pote inconsueto, vehementius movetur, & cum avertatione triletem sensationem, rptionis periculum tum minitantes, tum saepius afferentem, anima recipit, quam perceptionem ad sensum relatum dolorem vulgo nuncupamus: qui pro ratione partis affectae, modi afficiendi, sanguinis & particularum concurrentium pungens, rodens, lacerans, lancinans, contundens, gravans, comprimens, distendens, ardens, pulsans in illa parte esse creditur, ex qua vibratio, pressio, & concussio fibrillarum nervearum ad sensorium commune resulat. Magnam Inflammationem etiam febris comitatur, quod liquores in parte inflammata alterati, per ductus venosos reliquae massa sanguinea commixti heterogeneum quandam motum in ea suscitent, similique labe inhiant, ex qua miscela inordinata febris resiliunt, saepe inflammatoriae dictae. *Inflammationis* ergo signa sunt, ut breviter comprehendam, calor, dolor, rubor, febris, renitentia & partis pullatio.

*Diagnosi  
Abscessus.*

*Abscessus* Signa Diagnostica quod spectat, alia sentientem, alia factum designant. Fieri illum patet ex *S. 2. aph. 47. Hippocratis*, quod nimirum calor, dolor atque pullatio in parte augentur: facti vero seu puris confecti plures circumstantiae sunt, sc. primo, si jam dicta accidentia parum remittant, imò tumor etiam aliquantum subsideat; dein si duobus digitis se haud contingentibus tumor contrahatur, ita ut unus illorum leviter premit, alter suspensus magis teneatur. Si materia intus contenta sufficienter maturata, seu ut loquuntur, cocta, ejus fluctuatio & motus quidam, per quem illa de loco in locum propellitur, sub altero & quiescente digito percipitur. Inflammatio etiam ut antè, non adeo est intensa, nec ad rubedinem inclinat, sed subalbet. Tan-

dem in eminentiam fastigiatam & quasi mucronem tumor abit, cuius rei ratio dari potest, quod cum partes Apoplematicae laterales aliquomodo detumescant, & subsideant propter materiam illas hactenus distendentem, nunc verò ad Sinum Apoplematicum depositam, hanc illam tanquam sui receptaculum distendat, atque elevet ad illam quidem plagam, i. e. partem superiorem atque anteriorem, ubi levius est obstaculum. Signa ergo Abscessus sunt vel ipsius sentis vel ejusdem facti. Inflammationem in Abscessum converti denotant dolor & palpitatio in parte cum febre: Ipsum vero factum designant calor immixtus, dolor sedatus, tumor in mucronem elevatus, mollescent & albescens, ac sub digito fluctuans, nisi pars sit crassa, vel materia protumescens nimis lateat.

Abscessus saepe latent circa partes absque calore, dolore ac rubore progressis, sed cum cum sana cute colore convenit, hinc plures Chirurgi sunt, qui vel pro fungoso, vel Emphysematico, vel alio agnoscunt tumore, & eos aperte non audent: hinc pus quod sensum ac sensum colligitur, plures tubulos, imò & saepe ligamenta absumit, quare Chirurghi hic omnes monent, ut rite cognoscant prius humorem, & si ex mollicie ejus pus suspicetur, ad propediem facta incisione emittant, ne pars lincera a puris acrimonia lardatur, & tumor evadat incurabilis. Plura enim ejusmodi novimus exempla, hinc non leve valet regula illa Chirurgorum: *Quod nulla suppuratio fieri possit ubique inflammationis, rubei ac doloris partis.*

*Sinus* facile cognoscitur, ex Abscessu scilicet *Diagnosi* exulcerato & inveterato, vel si nulla callositas observetur, ut in Fistula. Si verò latera fuerint callosa ac dura, tunc proprie *Fistula* appellatur, hoc enim solo differunt *Fistula* & *Sinus*. *Sinus* est vel rectus, vel obliquus, magnus vel parvus, cavus vel superficialis, acclivis aut declivis. Acclivis est, cuius os vergit luctum, fundus dorsum, declivis contrà. Quoties in magnis Abscessibus pus diutius stagnat, sive quod tardius aperi, sive negligentius mundari fuerint, mora longiore corrumpitur, vicinasque carnes ac fibras tendinosas exedit, inde ulcus efficitur *Sinuosum*. Si ulcus unicum non potest, & caro sit spongiosa seu fungosa, si ulcus iam rem reddat nigrum & oleosum, si linteamina, quae sicca imponuntur, quoties remouentur, graveoleant, hinc *Sinus* adesse denotant.

*Sinus* ergo in parte quadam, Abscessu antea afflicta, residere dignoscimus, primò ex eo, quod orificium, cuius consolidatio inducta fuit, breviter aperitur, & materia ichorosa ab illo prodeant. 2. Ex eo, quod turunda, quae statim in angustius orificium inducta fuit, deinde in amplam cavitatem impellatur.

§. 4. *Causa proxima Inflammationis* existit *Galenus* ipse sanguis, & quidem in exquisita bonus & purus, in spuria verò non ita bonus & purus, sed mixtus cum copia quadam humorum aliorum, unde contingat, quod interdum lenior sit, interdum acrior, interdum tenuior, interdum crassior, nec moderatus uti in exquisita deprehendatur. Adeo quoque multum ab his putatur sanguis hic, ut non solum vasa magna, sed etiam parva distendat, & quae prius evidenter non erant, aperte in conspectum veniant, unde cum nequeat ob copiam contineri, et

## CAP. II. DE INFLAMM. ABSCESSU & SINU. 481

ex valis toris modo effundatur, & à parvis foraminibus proximarum partium, maxime laxiorum, uti musculosarum & glandulosarum combatur. Ad causas antecedentes referunt tum partem mittentem validiorem, tum partem recipientem imbecilliolem, quam imbecillitatem vel naturalem esse dicunt, vel adventitiam. Ad priorem referunt substantiæ laxitatem, canalium ad ipsam pertinentium amplitudinem, & sicut in loco inferiori. Posteriori attribunt, quando pars vel nimium dolet, vel nimium calet, unde debilitata ab aliis partibus sanguinem, quamvis non adeo redundantem, ad se allicit. Dolere partem docent, quando vel vulneratur, contunditur, luxatur, frangitur, distenditur, vel vehementem sentit frigoris vel caloris appulum; dolorem vero istum cum natura illa, quam ferè in cunctis adorant, depellere conetur, eandem ab aliis partibus ad affectam unà cum sanguine & spiritibus deferri. Tumorem & calorem inflammationem sequi. ob sanguinis statum copiam in partem effusam, & in eadem retentam; dolorem ob partis distensionem à sanguinis illa multitudine illatam, pulsus molestem, ob calorem auctum, sanguinis enim copiam in loco angustiore facere, ut arteria partem verberet, & ab eadem reverberetur. Febrem interdum excitari putant, quando calor in parte adeo sit intensus, ut ipsum cor appetat, isque vel solus, unde febris diaria, vel cum putredine, unde febris emergat putrida, quæ putredo vel ob magnitudinem, vel viciniam partis affectæ ipsi cordi communicetur.

**Abscessus.** Abscessus in generi considerati causas acculant vel substantiam solidam, vel humorem unum vel alterum ex quatuor, aut omnes simul concretos, ob quæ partes, quæ se contingebant, ab invicem abscedant; in specie tamen hic ipsum pus acculant, quod distendens & rodendo majus sibi faciat spatium. Puris verò materiam constituunt sanguinem, efficientem causam ipsum calorem, uti dicunt, præternaturalem, unde frequentius sequatur inflammationem, quam tumores alios, quoniam sanguis non modo humidus sit, sed calorem facile contrahat, quæ duo ad pepasimum istum, sive concoctionem sanguinis in pus, maxime sint necessaria.

**Sinus.** Sinus fieri docent à pure aciore, quod nimium rodendo sinuet, & partes profundius à se invicem abscedere cogendo majus sibi spatium comparet, hæcque ratione particulam ita excoeriet, & continentia à subiectis separet, ut distantia inter se pristinum statum haud facile queant recuperare.

**laxa Paracelsi.** §. 5. Paracelsi ipsa Inflammatio, sive Phlegmone est apostema, quod non tendit ad mortem, nec ad impotentiam membri, minus ad aliquod aliud accidens. Producentur autem apostemata ista præter corporis detrimentum orientia, juxta Auctorem hunc ex aluminibus liquefactis, & ab aliis apostematibus hoc solo differunt, quod non sint obnoxia morti, nec etiam accidentibus.

**Abscessus & Sinus.** Abscessus ac Sinus cum ex sale sanguinis, tum ex utriusque humorum abundantia oriri statuit, tanquam ex boni superflui propter excessum in apostema translo, post hujusmodi superabundantiam separationem à natura factam, quod cum collectum est; in corruptionem transire cogitur, per locum, in quo situm habet, quia repletus est ultra suum diametrum.

Ubi jam in sanguine superfluitas orta est, ex qua generantur apostemata communia, si cutis eo loci naturale centri foret ejus emunctorium, transiit in apostema, quod aliis per nasum destillaret. Abscessus hujusmodi maximos dolores & putrefactiones præter infectionem excitat, eo quod excessus in sua puritate minime permanere possit: cum superfluum quodvis putrefactionis sit exordium.

**§. 6. Helmontius** spiritum seu Archeum calefacere hominem naturaliter in sanitate existimat, eundemque in febribus afluare ait, affectque sequens exemplum: Spina querna digito infixâ actus & potentialiter frigida mox in digito excitat calorem p. n. Non quidem, quod calidi humores affluant, quasi per spiam eo convocati, expectant spiritus vulnus, & qualis suis sedibus temperari resedissent, siquidem cruor vulnere proximus, primus accurret, aditumque venienti cruori præcipit. Et ipse per se quoque non calet, sed ex gratia vitalis spiritus. Itaque audacter statuit Author, Inflammationem & tumor cum pulsu duro, dolore & calore à solo spiritu casualiter, ab infixâ verò spina occasionaliter duntaxat ortum suum habere. Quamobrem calor p. n. auctus in parte quadam indicium est Inflammationis, non verò ipsa Inflammatio, nec illi ideo inter medendum magnopere insudandum esse arguit. Hinc ideo factum esse putat, quod Hippocrates sermone monuerit, calorem & frigus non esse morbos, neque horum causas, sed causas, (nimirum occasionales) morborum esse amarum, ure, salum, ponticum, &c. spiritum verò esse eum, qui impetus omnes, adeoque & Inflammationem faciat. Materialem verò causam admittit cruoris vel alimenti in partem aliquam evaluationem.

**Abscessus & Sinus.** Abscessus & Sinus causam dicit esse sextæ digestionis mucilaginem, quæ adhæret intra venas & arterias, caualesque quoslibet sua primum qualitate infonset, sed hostilitatis, quatenus indirectè advena est, violentem, unde mox dein ab Archeo parti insisto concipiatur desiderium eam expellendi, cujus conceptus idea in exosam mucilaginem imprimatur. Membrum autem non valens subigere hospitem, sibi invito connexum, majore flagrantem nisu, appetituque expellendi: qui tandem pertinacius connexus sæpe victor vitalem facultatem illius membri in sui clientelam subigat, mortificando nimirum, suoque contagio conformem partem, cui insidet, reddendo. Pars autem cum sit lallationi, hujusque termino obnoxia; è contrâ verò character, sive idea seminalis jam concepta, sit indefectâ, necesse est, velut convocatis viribus Archei, morbus ille proscribatur per crisi, vel robore morbi spontè exantolato, orbetur vi agendi, fiantque oppilationes; vel loco victa pellatur, siatque Abscessus. Sinusque itidem & Abscessus desperatos contingere ait solius sæpe naturæ ductu, quos abscessus etiam per ipsa ossa fieri notavit. Si in Phlegmone cruor vel alimentum solidorum in pus degenerat, Abscessum instare arguit, & apostemata à vitio distributivo, ac stabiles eorum dolores ex indignatione Archei esse pronunciat.

**§. 7. Ex opinione Willisii** sanguinis motus vera est in eo accensa flamma, quæ ab iisdem prius causis ac in igne nostro elementari in illo produ-

P p p

produ-

producitur ac fovetur. Sulphureæ liquidem particulæ jam motu à primo principio donatæ, exquilita eventilatione foventes nitrosas ex ambiente aëre perpetim & abundanter emanantes apprehendunt, atque ab iis expanduntur & accenduntur. Sanguinis autem incendium sibi semper non est consimile, nec in omnibus subiectis eandem servat normam. Alti intensior remissiorve advertitur, pro sanguinis principiorum proportionem & mensuram, eorumque dispositione. In iis enim vividior est flamma, in quibus spiritus & sulphur prævalent, spiracula debita libertate gaudent, nitrosusque pabulum copiosum advehitur. Secus autem accidit illis, quorum sanguis salinus, aquosus ac terrestris existit, paucumque communicatur nitrum, & tenuis sit eventilatio. Si verò sanguinis massa spiritibus turgescat, sulphureoque scateat pabulo, copiosiusque nitrum ab aëre mutuetur, intenditur eius accensio & citius, eoque concitator & rapidior venit cruor, siquidem effervescens ad angustiora adductus vas, eorumque tunicas plus nimio distendens, illisque inhærens ob glutinositatem à sale depresso acquisitam, ab ipsis expelli nequit, sed in eorum alveis retineatur. Vasorum etiam pori à validiore illà distensione, humorisque viscidis remora, & artiores fiunt, & obturantur, quo fit, ut fuligines exitum sibi parare nequeant, & denuò in sanguinem candant, qui fumo & vapore quasi obruptus vehementius ebullit & inflammatur, partique, in quâ stagnat, labem suam communicat, & in eâ *Inflammationem* inducit. Dispositio autem ista inflammatoria à quamplurimis causis cruoris massæ inferitur, quæ cum à sex illis rebus non naturalibus vulgo dictis repeti debeant, ab iis enumerandis hic supersedemus.

*Abcessus.* Furibundus ille atque inflammatorius sanguinis motus sensum immittit, tandemque propemodum extinguitur. Spiritus siquidem indefinenter avolant, partesque sulphureæ perpetuâ, quam patiuntur, collisione atteruntur, earumque subtiliores evaporantur: difficiliore etiam factâ, tum ob poros obstructos, tum ob partis, in quâ subsistit viscidus sanguis & coagulatus, repletionem, materiæ extravasatæ ventilatione, parcius illi committetur pabulum nitrosum, à quo flamma ejus conservetur. Tum temporis autem refluxum salinæ particulæ, quæ à crasso viscidoque sulphure exaltato irrequiuntur, & diuturnâ concoctione in pus commutantur, quod summâ gaudet acrimoniâ ob salis evedi aculeos, à sulphure exaltato actiuos. Putridus itaque ille humor fibras partis, in qua cespitac & fluctuat, spiculis suis attingens, eas exedit ac corrodit, nidumque sibi parat, quem mora adauget atque ampliat, *Abcessumque* producit, & quo aperto prorumpit faculentus fætidusque liquor, ingrato ut plurimum odore nares afficiens, crassioribus particulis sulphureis, spirituum confortio deficiente, turmatim impetuosæque à reliquâ massâ secedentibus, odoratus organum molestè ferientibus.

*Sinus.* Puris materia virtute mirè corrosivâ prædita, si diutius in parte sinatur, altiores semper agit cuniculos. Intestino enim, quo illa agitur, motu in partes circumjacentes perpetuò compellitur. Musculi humori isti circumpositi, continuo spirituum affluxu agitati liquorem premunt, & in laxiorem quandem adjacentem partem por-

tionem ejus alicualem protrudunt. Pus ergo partes carnosas & membranosas subsistens illas exedit & dilacerat, ipsarumque strage alveum sibi cudit. Sed quum tenuiores tantum puris particulæ huc usque attingere poterint, aliis ob molem visciditatemque in foveâ remanentibus, pauca disperduntur fibræ. Carnes verò solæ non destruantur, sed nervorum quoque contingit jactura, à quibus exsiliens succus nervus portioni illi humoris alibilis partibus spermaticis enutriendis destinatæ allociatur, fibras nervas efformat, ambitumque cavitatis illius, *Sinus* nomine, à pure factæ, tunica quadam semicartilagineâ succingit, quæ partes carnosas & membranosas ipsi adpositas à liquoris corrodentis acrimoniâ vindicat.

§. 8. *Sylvio* causa *Inflammationis* continens est *Sylvio* *spis* sanguis vel in vasis suis subsistens & stagnans, vel *mis de con-* extra eadem effusus & corruptus, cujus corruptio *sa inflam-* ptionis exemplum allegat in aqua communi, hæc *marionis,* enim licet sit pura, modò stagnet, aut in val *Abcessus* diutius conservetur, putredinem subit; eodem *& Sinus.* modo illud etiam existimari fieri in corpore nostro, nam sanguis extra vasa sua effusus propter motum ipsi denegatum ibi hæret, subsistit, stagnatque, hinc fit, ut spiritus subtiles ac volatiles tum acidas partes, tum salinas temperare soliti avolent, unde tunc acida ac salia in sanguine existentia evadant aciora, quæ acrius in se agunt & paulatim ita corrumpunt, ut in pus mutantur, uti videre est in præparatione lactis sulphuris, ibi enim sulphur in lixivio forti coctum colorem rubicundum lixivio communicat, huic dum affunditur acetum destillatum, aut quicumque spiritus acidus, color rubicundus mutatur in album; hinc *Abcessus* dicitur, quando scilicet acidum materia deservescere incipit exspirare, avolantibus subinde plus minus particulis volatilibus, & accedentibus hinc inde heterogeneis, sanguis enim ita corrumpitur, ut in pus abeat, acidum verò in pus e maxime accusat. Stagnat verò, juxta ipsum Auctorem, in vasis suis sanguis, quoties eadem sunt obstructa. Obstructio autem illa fit vel ab ipso sanguine propter aërem frigidiorum, ut & ipsa medicamenta acida & austera puta, coagulatos, vel à materia aliqua viscida & pituitosa: existimant enim *Sylvius* pituitam à calore solutam una cum sanguine deferri per totum corpus, imò etiam per vasa minima & capillaria, quòd si tum pass aliqua à frigore externo afficiatur, aut aër potiusque liberaliori haultu assumatur, tum ab eo humor ille pituitosus ac viscidus antea à calore motus & attenuatus, adeoque in illius partis vasa minima propulsus, ibi coagulatur, & eo facilius, quo vasa sunt minora, qui humor pituitosus à frigore coagulatus in vasis subsistit, & sic obstructioem facit, unde tunc à sanguine continuo accedente vasorum illorum diffensio oritur, ubi autem amplius diffendi nequeunt, tunc tandem rumpuntur, & per consequens sanguis ex vasis suis effunditur, qui tunc effusus corrumpitur, & inflammationem facit, nam sanguis juxta ipsum extra vasa sua effusus, in aliqua parte diu hærete nequit, quin acquirit acrimoniâ propter spiritus aheuntes, iis autem abentibus, corrumpitur sanguis. Effunditur ex vasis suis sanguis propter eorum apertiones, aperiuntur autem vel per anastomosis, vel per diæresin, vel per diabrosin. Causa ergo obstru-

obstructionis, & consequenter Inflammationis. antecedens est ipsa pituita, & præsertim viscida abundantius in corpore hærens, quæ ad vasorum sanguineorum taniculos capillares delata, ibique viscidior reddita aut coagulata. fit ejus causa continens, hinc negata sanguinis circulatione, motuve illius impedito. necesse est sanguinea vasâ ita distendi, ut tandem rumpantur. sanguisque contentus effundatur, nunc in vicinâ partis substantiam, nunc in musculi alicujus interstitium, qui sanguis effusus partium suarum actione mutua corrumpitur, & juxta Auctorem hunc inflammationem patit, si verò jam sanguis corruptus fuerit, & in pus mutatus, tunc *Abscessus*, & si sinusolus anfractus sibi parit. *Sinus* ipsi dicitur.

*Caries*. *Caries* saniorum ex sententia Inflammationis oritur, quando humores arteriosi extra vasa in poros & tubulos partium solidarum effusi, partium istarum poros ita obstruunt, & tam exigua spaciola relinquunt, ut non nisi materia primi elementi per ea transire possit, quæ cum ignita sit, parti inflammata ruborem inducit, cunque fulminis instat celerrimè moveatur, & cum impetu irruat in istos minutos poros, laucinando fibrillas istarum partium, dolor iste inflammationem comitari solitus inducitur. Liquor etiam chylosus in ductis arteriolarum extremitatibus stagnans, vicinioribus ductis comprimit, & liquor in iis contentorum transitum impedit, qui circa extremitates istas copiosius collecti, tumorem producent, abs quo cum arteriola comprimantur, & sanguis per ductus restrictiores fluere cogatur, pulsus quoque augetur. Ex succis istis ob stagnationem diuturniorem motu intestino celerius agitata ipsa febricula quandoque suscitatur.

*Abscessus*. *Abscessus* oritur à copiosiore purè intra partem collecto, quod inde generatur, quod materia primi elementi tanto cum impetu irruat in fibrillas partium solidarum, in quibus hærent inflammationes, ut illæ tandem ex continua expulsiōne ista rumpantur, & à reliquis separentur, sicque cum reliquis humoribus ibi stagnantibus misceantur, adeoque fiat ibi quæ confusum chaos omnis generis particularum, quæ ibi quandoque formant cavitatem, & hæc mixtura vocatur pus, quod cruentum fit, quando vascula sanguifera etiam per istas partes dispersa ab acedine istius puris eroduntur, ut sanguinem suum in eandem cavitatem effundant varium; coloratur pus, quando ipsi admiscetur particula biliozæ, aut flavæ sanguinis hætenus innominatæ, quale ulcus fœdum & malignum vulgo nominatur.

*Sinus*. *Sinus* oritur à majori fibrillarum à pure acriori devastatione, unde liquores contenti ex tubulis dilaceratis copiosè effunduntur, quorum particula volatiliores faciliè absumuntur, crassiores verò remanentes lateribus fortius adherentes, sibi invicem firmius sociantur ob quietem diuturniorem, inter quas spatium relinquunt magnum, & fistula quasi amplior elaboratur.

§. 10. Ut præmissæ aliorum de causis sententiarum intelligantur, nostrum nunc submittemus judicium. Optime verò causæ Inflammationis constituentur internæ & externæ. Posteriores referuntur vel ad læsiones externas, quales sunt contusiones, fracturæ, puncturæ, &c. vel ad sex illas res vulgari nomine non naturales indiguitas, quæ Inflammationem excitare valent,

sanguinis particularum ordinis turbationi ansam præbendo, ipsiusque & aliorum succorum stagnationem inferendo. Quando enim pars aliqua contunditur, fibrillæ ipsius comprimuntur, & ad se propius accedere coguntur, sanguis & reliquorum succorum particulae aliquales è tubulis suis exprimuntur, & in fibrillarum interstitia effunduntur. In valida illa sanguinis expressione, partium ejus situs & dispositio invertitur, allicularum enim pori, per quos antea materia æthereæ libere perfluebat, immutantur, fiuntque vel obliqui, vel angustiores in medio, quàm in superficie, aut etiam ab aciculis acidarum, quæ compedibus suis soluta fuerunt, occupantur. Materia æthereæ, quæ partes omnes perpetim præterfluit, viam sibi præclusam repertens, & à nova à tergo insequenti impulsâ, in alcalicarum poros impetu vehementissimo impingit, sed cum obex sibi oppositus fortior sit, quàm ut primo molimine ipsum tollere possit, ab illo reflectitur, & in sanguinem repellitur, eundem velocius agitatur motu; ac in tali perdurat opere, donec sibi liceat recto incedere tramite, seu alcalicis in minutiores particulas perfractis, seu exturbatis acidis ab illorum poris, pristinaque ipsis restituta rectitudine. At cum Sulphura alkalica, à quibus antehac soluta, & à se invicem semota conservabantur, sint delictura, & à phlegmate, cui innatant, undique premantur, sibi invicem propius accedunt, eorumque rami inter se implicantur, & in grumos faciliùs, qui tubulorum orificiis inhaerentes illa occludunt, sanguinisque assuæntis & materiae subtilis ad ventantis cursui obstant. Talis autem subsistit coagulatio, donec alkalica acidis liberata Sulphuribus denuò commisceantur, ipsorumque ramos explicent, & illa ab invicem lemoveant, in fracturis & puncturis, adeo semper vel fibrillarum pressio, quare eadem ratione, quâ in contusione Inflammationem contingere asserere possumus. Omnes ergo Inflammationes non nisi ab humoribus incalcentis exoriantur, quæ pro diversâ fibrarum ac ductuum angustia, ac humorum crassitie & tenuitate, etiam varia phenomena proveniunt. Hæc si patiens comprehendere debeant verbis, dicendum esset, Inflammationem à causâ externâ productam aut ab æthere aut contusione, aut puncturis nervorum, unctione, vulneribus, aut fracturis; ab internâ verò à malâ humorum sive succorum dispositione ac miscelâ. Sic si corpora calefacta, vel à motu nimio, vel ab exercitio violento, subito refrigerantur, Inflammationes faciliè patiuntur; dum enim incalcescimus, succi nostri celerius per corpus propelluntur, postea verò refrigerante corpore ac sanguine, succi minus moventur & magis incalasantur, prout toto die videmus in aqua à frigore in glaciem mutari. Exinde sequitur, motum in corpore vel in aliqua parte immui ex eo, quod influxus ætheris ei denegatur, intumescentiâ ergo diminutâ, etiam vasa ac pori detumescunt ac precluduntur. Hinc apparet, sanguinem prius adeo agitatum ulterius posse fluere, quàm ante calefactionem, nam tempore calefactionis particulae viscida ac crasse adeo fluidæ redduntur, ut vascula etiam illa minima penetrare possint, postmodum autem sanguine refrigerante, tenaces illi succi se ex canaliculis istis excutere nequeunt, adeo ut obstrui cogantur, nam denegato priori motu magis ad invicem à circumstante aëre premuntur.



Certum enim est, Inflammationem oriri ab exhalatis particulis potissimum salinis rigidis, porosque obstruentibus paulo inferius clarius explicandis. In Inflammatione tres circumstantiæ advertendæ sunt, obstructio nimirum in canaliculis ad ductibus minimis, à minori ætheris motu facta, deinde mutationes, quas succi adfiscunt, qui in vasculis obstructi continentur; denique pulsionem ac pressionem sanguinis ac succorum. Omnium Phænomenon Inflammationis facillè causam reddere possumus; Calor enim oritur non duntaxat à motu particularum nimio Inflammationem facientium, aut potissimum à materia subtilis influxu vehementiori: particule enim istæ hoc pacto disponuntur, & ad invicem premuntur, ut interstitiis minimis remanentibus ætheri tantum celesti aditus patefcat, & globuli ætheri excludantur, celesti igitur igne primas tenente, particule pellentes ab eodem agitantur, unde calor oritur, omnis enim calor à motu particularum minimarum vario excitatur.

Sic quoque color iste sanguineus Inflammationibus solennis fit non duntaxat à motu ætheris celeriori partes in superficie ita disponente, ut radii ab iis reflectentes nobis repræsentent rubedinem, sed & oritur à sanguine adfluente & præterfluente, obstructio enim ista & stagnatio seu incallescencia istius Inflammationis premit arterias circumcirca pertransientes, exinde angustantur, & per consequens sanguis allabens patentes vias non repens ibidem magis coærcatur, vascula & membranas extendit, hinc color sanguineus per cutim ipsam apparet; à calore quoque particula istæ sanguineæ accenduntur & moventur impetuosius, hinc calor iste intenditur. Porrò ob angustationem arteriarum majore in copiâ colligitur sanguis, quam per venas reduci potest, hinc oritur intumescencia, seu partis affectæ elevatio, stagnantem autem sanguinem Inflammationem inducere & partem in tumorem elevare quis nescit?

Ob dilatationem & nimiam partis inflammationis expansionem fibræ nervosæ ferè distrumpuntur, hinc dolor, qui ab Animâ percipitur, nam dolor nihil aliud est, quam tristis sensatio, fibræ enim, seu dictum, ab incalcescente materia, vel à sanguine stagnante expanduntur & dilacerantur. Dolor enim solet in principio esse *tensus*, quia per celeritorem ætheris fluxum partes circumjectæ fortius expanduntur, si autem salinæ particulae in partium poris hærentes, iis per celerrimum ætheris fluxum vel per pressionem insequentem, vel aliam ob causam aliud imprimentur, dolor ex *resivo* abit in *scindentem* vel *pungentem*, pro ratione Salium obstruentium, si enim dolor est *fluum*, *scindens*, potissimum oritur ab acidis scindentibus, vel acido-pungentibus particulis, fibrillasque erodentibus; si vero dolor est vagus, pungens, igneus, signum est salis potissimum pungentis alcalici.

Ob inflationem & expansionem inflammationis partis oritur *remittentia*, quæ sæpe non aliter digitis cedit & resulat, quam vesica inflata propter angustationem arteriarum partem inflammationem transeuntium, sanguis non nisi majori vi permeare potest, & arteriarum latera interiora magis ab eodem afficiuntur, hinc *Pulsatio* oritur; quod & referri potest calor & agitatio particularum acidarum arterias convellens & convulsionem ex-

citans, unde motus ac pulsus augeatur, imprimis si simul coagulatione succorum aderit. In Inflammatione vehementiori cor majorem exprimit sanguinis copiam, quam angustas arterias perfluere potest, & sanguis simul existit crassior, hinc à concremento crassioreque sanguine cor perlabente, id quasi convellitur, & *Pulsatio* multum augeatur. Febris autem hæc symptomatica potest oriri, dum hæ particulae, poros obstruentes motum celerrimum ætheris peregrini in corpus introducunt, qui cum sanguine per arteriarum & venarum poros communicatus, motum ejus multum augeat & perturbat, quæ tamen *febris* in omnibus Inflammationibus haud est sensibilis. Hinc haud difficulter percipere poterimus, quare in generatione puris, quam *Inflammatio præcellit*, *febris* sit intensior, doloresque acerbiores, quam generato pure cum ante pus generatum particulae obstruentes hærent in lingulis tubulis, ibique ætheri transeunti viam præcludunt liberiusque. *Inflammatio* in suo vigore constat, tubulis autem per ætheris transeuntis motum saliumque celeri agitatione disruptis, liberior transitus ætheri conceditur, ac proinde febris acuta doloresque atroces & potior *Inflammationis* pars cessat, quæ apprime conveniunt cum illis, quæ *Hippocrates* S. 2. Aph. 47. prædixit, dicens: *Dum pus sit, dolores ac febris accidunt magis, quam consuevit.*

Ex hisce apparet, nec solum sanguinem, nec bilem causam esse Inflammationis, uti veteres existimârunt, sed potius omnem humorem ex canaliculis suis evasatum, ibidem stagnantem, & ob acidum suum cum alkali vel salso effervescente, ruborem, calorem, dolorem & tumorem introducentem. Certum enim est, quo plus humoris ex canaliculis suis effluit, eo tumor fit major, hinc & fibræ magis extenduntur & dolor augeatur. Omnis ergo Inflammatio supponit tumorem, omnisque tumor obstructionem, in omni enim Inflammatione respicimus ad partes obstructas, obstruentesque, particulas, diversa enim est obstructio, & hinc Inflammatio, pro diversitate particularum, à quibus & partis, in quâ producitur, prout enim materia vel est salina alcalica pungens, vel acida pungens, variant Inflammationum Phænomena. Ratione etiam loci partisque affectæ etiam inter se differt, prout enim in diversis partibus observatur, diversis etiam nominibus insignitur; in cute enim *Inflammationis* vel *Erysipelatis* nomine venit, si autem pleuram membranam occupavit, dicitur pleuritis, si vero cerebrum ejusque meningum substantiam invasit, vocatur *phrenitis*, quæ nomine solum variant, in essentia autem conveniunt, omnium enim eadem est ratio, causa eadem esse possunt, five enim obstructio fiat, & hinc acceleratus ætheris fluxus in hac five illa parte, erit tamen *Inflammatio*. Nulla igitur est differentia, quam quæ diversitate spectat salium, prout enim hi variant, sic *Inflammatio* differt. In Inflammatione ergo (ut Tyronibus omnia clare & perspicue proponamus, capropter quandoque hæc repetere libet:) quæcunque diversitas partium observanda est, tubuli enim in una parte sunt firmiorem, quam in alia, hinc patet, quare Inflammatio oculorum sit pertinacior, quam si musculus inflammatus fuerit; 2. una pars plures habet nervos, hinc patet, quare Inflammatio tendinis sit valde dolorifica; 3. Observanda diversitas humorum, quos tubuli vehunt. Alia lymphæ est in glandulis parotidibus, quæ videtur magis viscosa, quam quæ est in

glandulis cutis (miliaribus dictis:) illarum lympharum autem crassior multis particulis ramosis, chylosa conferta est in tubulis musculorum, bilice accedit amplitudo tubulorum, quibus positis, varia jam emergere debent symptomata. Omnes fucci quo crassiores sunt, minus apti sunt ad Inflammationem excitandam, hinc non credimus sanguinem solum extravasatum primariam causam Inflammationis esse, sed præter sanguinem alii etiam humores effunduntur, qui facilius obsequuntur motum ætheris, & hinc Inflammatio. Certe enim persuasissimum, sanguinem extravasari posse sine subsequente Inflammatione. Sic videmus, quod inflammatio tendinis sit omnium petacuta, ratio est, quia lymphæ est omnium tenuissima, est ipse succus nervorum, qui facillime ab æthere agitari potest, non mirari proinde in tali Inflammatione gravissima suboriri symptomata. Et ut Tyrone Inflammationem clare percipiant, ipsis dico, quod Inflammatio ita sit, si sal aliquid adigitur in porum quendam. & interstitia quædam relinquuntur soli ætheri pervia, sal autem illud agitur in porum, quando à motu, vel exercitio corporis humores vehementius agitantur. hinc partes lubricæ facile sequi possunt, non autem rigidæ, quæ tunc hærent & à tergo venientibus premuntur. Hoc idem  $\Theta$  figi potest vel sili in suo motu à frigore confringente poros,  $\Theta$  ibi hærens & agitatum à particulis à tergo, quæ à æthere premente pungit & dissecit tubulos, unde dolor, affluxus autem sit, quia dum sal pungit, fibræ contrahuntur ac quasi convelluntur. Rubor, qui ibidem conspicitur, non est ad mentem veterum à sanguine, aliis eo aperto sanguis exillare debet, quod tamen non observatur, prout omnes Chirurgi testari coguntur. Eas partes, quarum tubuli sunt firmioris texture, minoris diametri, variè intorti, multisque nervorum propaginibus colligati, si contigerit obturari, à particulis cujuscumque generatione molis, figuræ & agitationis, angustæ viæ ordinariæ accommodatis, non crassissimis. (utpote quæ cum glutinosioribus à cæteris secedentes per venas ad cor pergunt) stagnantibus à causâ vel internâ, humidis & spirituosius corpore à nimio corporis motu ac exercitio expulsi, & frigidis crassioribus salis, imprimis acutis ac acidis, in tubulos ampliatos fortiter adactis hærentibus, &c. dicuntur Inflammatione corripì, 1. Si particulæ activæ stagnantes à copiosa congestione compressæ, ab invicem secedentes, avolantibus lubricis & spirituosius in motum turbulentum excitantur ab æthere, per poros constitutos, (ut in feno non debet congesto, floribus sambuci aliarumque herbarum recentibus compressis,) inæqualibus ruente, quo acutæ scindentes ac pungentes acidæ particulæ viscosarum ramosaufferendo, caput exerunt, stagnantem materiam resolvunt, flammæque tubulorum dissecando, eos erodunt, quod non contingit sine dolore, & hinc influxu concitatoris spirituum, ardore, & hinc rubore, (ita determinatâ ab æthere globulorum propensione in motum circularem & retilineum:) nec non sensu pulsationis à compressione arteriolæ, sanguine fortius impingente. 2. Si pori constantiores tubulorum à rigidis in hærentibus à partialiter obturentur, ut per intervalla relicta non nisi subtilissimus celeritè peruat æther, qui cum meras sit ignis,

sufficiatissimus est ad ea, quæ concomitentur Inflammationem, producenda phenomena. Si demum contigerit fibrillas partis inflammatae propter ætheris celeritè transfluxum, & particularum acutarum violentam adactionem rumpi, humores, qui per tubulos cursum suum ordinariò absolvent, extravasantur, atque ita ab irregulari ætheris perturbatione immutantur, ut in pus degenerent, tunc præfens est *Abcessus*, si cutis vel erosa, vel ferro aperta est, pus autem pro diversâ partis Inflammatione, diversâ morâ, diversâ sanguinis constitutione, auctione, &c. particularum, est magis vel minus corrosivum lividum, viride, tenue vel album, tenebriusculum, &c. Porò prædominantibus in sanguine particulis acribus, ab eo derivata materia, vel pus debet acris morando diutius viscosas oleas dividit, seque ab earum amplexu liberans vicinos circumcirca erodit tubulos, sicque

*Sinum* seu concavitatem efformat, sique *Sinus*, non debet cavitas illa mundetur, particulæ purisacris, per interstitia musculorum tubulos obvios ibi pauciores, ac proin minus resistentes erodendo per varios anfractus sibi viam aperient, atque hic illic *Sinus* efformant, qui cum debet mundificari nequeant, & tubulerosi à transiens viscosæ materie portione, (fugatis lubricis & tenuibus,) quasi visco obducti, (impeditâ hinc eorum accretione) callum contraxisse dicuntur, constituunt *Ulcus anfractuosum* vel *stulofum*, quod vel manet in eodem statu, vel ulterius serpit, prout ex apertis & erosis tubulis humor stillans magis vel minus acris, vel aliter constitutus fuerit.

Reinote suum Symbolum addunt res nonnullæ, inter quas Aer primum occupat locum, qui juxta varias suas constitutiones Inflammationum author esse potest, ætuans siquidem particulis summe volatilibus rapidissimoque motu agitata est refertus, quæ cutis poros subeunt sese in fibrillas insinuant, sanguinique immiscuntur, ad quem etiam inspirationis ope advehuntur, vellicantur ab illis tubulorum fibrillæ, quæ in cinninos abeunt à tubulis sanguinem aliosque succos exprimunt, & in spasmodicos quasi motus ab irritatione, quam patientur comitate, vibrationibus suis frequentioribus illum comminuunt, ac ipsius particulas à se invicem dividunt; æris particulæ volatiles alkaliorum poros subintrant, illa exigant, subtilioraque per poros tunc dilatatos foras abripiunt, unde accidit, ut paucioribus in sanguine aliisque succis evasatis resistentibus alkalibus, Sulphura (ut cum Chymicis loquar,) resistere nequeant acidis, à quibus coagulantur, nec phlegmatis, à quibus conglobantur acida reliqua, quæ Sulphuribus non sunt intricata, & à materia subtili, spiritibusque animalibus in partes vicinas appellentibus sunt commota, crassiorum alkaliorum, quibus volare non licuit, poris insiguntur, à quibus omnibus turbatur sanguis, reliquorumque succorum circulatio, materieque subtilis in cursu suo impeditur. Ac frigidior particulis duris, rigidis, acutis, &c. crassis donatis, quæ corporis partibus exceptæ, & tubulorum poris infixæ, illas obturant & confringunt, sanguinis aliorumque succorum alkalica saturant, illiusque sulphura cogunt, & sic succos coagulant & intrassant, præcluditurque hoc modo liber transitus & materie ætheræ & sanguini, reliquis

que succis. Ac̄r nebulosior, humidiorque particulis scatet aqueis, molis nec mediocris, quæ corporis externæ superficiæ appositæ poros ejus obstruunt, impediuntque, ne subtiliores salinæ particule per insensibilem transpirationem avolare allusæ, exhalentur: illa verò in sanguinem repulsæ majorem turbationem conciliant, & in tubulos impingentes acrimoniâ suâ salinâ pungunt, sanguinemque aliosque succos ab ipsis exprimunt: tenuiores aquæ particule, sanguini commixtæ acida & alkalica illius solvunt & enervant, sulphur in grumos cogunt, destructâ ergo acidorum & alkaliorum dispositione. Sulphuribusque in grumos collectis, sanguini, succis, & materiæ æthereæ adventantibus obstituit. Cibibus quandoque Inflammationes inducit; illius enim acidiores particule à ventriculo dissolutæ in chylum laetum conversæ, & sanguini permixtæ alkaliorum poros opplent, aciculis suis Sulphura coagulant, & sic tubulorum officia obstruunt; Cibi verò volatiliores acioresque particulas possidentes in chylum commutati, & sanguini consuli, eadem proflus ratione illius stagnationem & rarefactionem inferunt, quâ aer fervidior. Potus Inflammationum causa est pari modo, quò cibus; Potus acidior, seu nive glacieque refrigeratus particulis abundat acutis, duris & rigidis, quæ alkaliorum poros saturant, Sulphuraque coagulant. Potus autem ex liquoribus ardentibus Inflammationes progignit, ut jam de cibo diximus, ad aeris æstuantis exemplar. Motui concitatori succedere potest Inflammatio, quia quum in eo uberior spirituum animalium copia cum ad eor, tum ad arterias accedat, abundantior sanguis in universum corpus compellitur. Copiosiores etiam determinantur spiritus in reliquis corporis partibus, quarum fibras extendunt, & valido agitant motu. Sanguis in vasis suis contentus velociori agitnr cursu, ab abundantioribus massæ suæ admixtis spiritibus, particulisque illius comminuntur à continuâ vehementique fibrillarum à spiritibus extumescunt in ipsam vibratione, unde sanguis rarefit & attenuatur partium illius situs, earumque pororum dispositio immutatur; subtiliores ejus partes volantes, crassiores verò remanent. Acida, quorum exigua pars, habita alkaliorum proportionem, evaporata sunt, & quæ à spiritibus, quorum ingens facta fuit dissipatio, amplius non continentur, alkaliorum poros subeunt, & Sulphura cogunt, à quibus ocluduntur officia tubulorum, vel canaliculorum, qui angustiores facti sunt, poris illorum ac parietibus à longâ istâ & fortè mutâ afflictione tibi propius admotis. Sed si rapidior motus Inflammationem inferre valeat, desidia etiam quies illum procreare potest; in illa siquidem pauciores determinantur in ventriculum uti in alias partes spiritus animales, ideoque alimenta in ipso minus comminuntur, acidorum spicula debilius atteruntur, & ab alkaliorum poris exterminantur, Sulphuraque paucioribus acidis, à quibus coagulantur, liberantur, chylus è massa istâ elicitus sanguini, cui commiscetur, crassiores apportat particulas ac ad motum ineptiores: quæ quum in minoribus tubulos, eosque tum ob spirituum penuriam minus dilatatos pervenerint, in iis facili negotio remorantur, eosque ocludunt. Nemo nescit in *vigiliis* animam objecto cuidam considerando, vel motui

cuidam exercendo semper esse attentam, hinc spiritus animales copiosiores in partes amandantur ab illo, velocioreque motu donantur, isti sanguini commixti partiumque fibrillas copia sua validius extendentes, sanguinis massam vehementius exagitant, partes illius magis comminunt & attenuant, à frequenti inter se factâ collisione, fibrarumque vibratione. Particulæ subtiliores alkalinæ, & tenuiores phlegmaticæ à reliquâ massa per durabiliorem istum motum separata, foras per patulos poros cum spiritibus exeunt. Cum vero acidorum vis à phlegmatis amplius ut antea, non infringatur, nec à spiritibus subtilioribusque sanguinis particulis in proprio situ continentur, illa crassiorum alkaliorum poros subintrant, & in Sulphurum ramis implicantur, unde fit tubulorum obstructio, materię æthereæ sanguinis, reliquorumque succorum circulationis interruptio, à quibus Inflammatio; quæ omnia de vigiliis immoderatis sunt intelligenda. Nec mirum si à nimia evacuatione insequatur Inflammatio, in ea enim copiosi dependunt spiritus, tenuioresque volatiles avolant sanguinis particule, crassiores verò ad motum ineptiores in eo remanent; quare acida, quæ ob propriam configurationem omnium difficillimè in motum eient, in sanguine remanent, dominumque obviunt, alkalica imprægnant & Sulphura coagulant. Aluectis excretionibus suppressis succedunt ut plurimum Inflammationes. Inter ea enim, quæ ordinariè è corpore nostro eliminantur, Principatu gaudent salia, quæ quum nihil aliud sint, quam alkalia acidis prægnantia, eorumque spiculis horrida, si in tubulis, à quibus excreti debent ob nimiam crassiem, cespitent, materiæ æthereæ & sanguini adventantibus sunt impedimento.

*Animi perturbaciones* Inflammationum cause sunt, vel spirituum subtiliorumque sanguinis particularum dissipationem promovendo, vel cursum ejus tardiores efficiendo, spirituumque proventum præpediendo. Prunas tenent ita, gaudium profusum, &c. Secundæ verò classis sunt timor, tristitia, &c. quum enim ab hisce vel spirituum penus imminuat, & sanguis volatilibus alkalicis exiatur, vel spirituum retardatio inhibeat, Sulphura, quæ ab alkalicis æquè ac antea à se invicem semota non decedunt, ab acidis coagulantur, & alkalica ob torpidiorem suum motum acida nec declinare, nec è poris suis excutere valent.

Causæ internæ respiciunt vel tubulorum obstructionem, vel sanguinis nimiam rarefactionem, ipsiusque in parte aliqua stagnationem, quæ quum supra jam explicata sint, ipsis diutius non immorabimur. A nonnullis causis internæ spirituum interna dicuntur, quia sicuti quomdiu spina parti cuidam infixâ remanet, dolor perlevert, ita etiam perdurat Inflammatio, donec tubuli referati fuerint, sanguis ac reliqui succi pristino fruuntur cursu, liberaque gaudent circulatione.

Si sanguis aliorumque succorum particule tubulos seu canaliculos infarciunt, per diaphoresin expelli nequeant, & acida, alkaliorum poris sint adeò infixa, Sulphurumque acidorum ramis adeò intricata, ut ab illis extrahi haud valeant, materia æthereæ, quæ aliò defectu nequit, continuo impetu in Salia, quæ ab acidorum cum alkalice conubio emiserunt impingit,

git, in motum illa concitat, eaque impellit in partium ambientium fibrillas, quas aculeorum suorum cuspidibus discindunt & dilacerant, foveamque hoc pacto excavant, fibrillis minutim incisilis & canaliculis ruptis, & sic *Alveolus* constituitur. Sed unde quæso pus in Abscessu? Nos asserimus, pus esse lacteam sanguinis partem, in ipso Abscessu plus minus alteratam, cui quædam subinde portiunculæ dilaceratorum tubulorum unâ cum cruore admisceantur.

Quum particula saluæ purissima;orem partem constituent, eademque spiculis duris & acutis sint horrida, & à materia subtili adventante, ac spiritibus animalibus ad partes circumpositas appellentibus in motum agantur, tubulos & canaliculos dictarum partium scindunt, scrobemque excavant, quæ quo latior & profundior sit, eò diuturniorem moram trahit pus in parte, sed non sufficit, ut fovea ampla ac lata sit & profunda, quæ *Sinus* denominatur, sed superficies ejus interior præterea obduci debet pelliculâ vel callo, abs quibus impediatur parietum ejus coactio; quapropter Sulphurâ, quæ in pure estant, ab acidis non succre coagulata, in tubulos & fibrillas à salibus dilaceratos impingentia, ramosos poros & interstitia illarum infigunt, & quum Sulphurum particula flexiles sint, tubulis, canaliculis seu fibrillis superextenduntur, hisque applicantur viscida phlegmata, quæ in pure continentur, materiaque fluiditatem conciliant, at salum acrimoniam attemperant. In particulas Sulphureas acidas tubulis ac fibrillis adnatas impingentia, illas validius in ipsarum poros & interstitia impellunt, ita fortius adjuvant, utrasque inter se artius uniant. Super extensis itaque Sulphureis particulis ac infixis partium circumjacentium fibrillis earumque interstitiis, ipsisque strictè inter se conjunctis efformatur pellicula levis & æqualis, quæ parvos & angustos poros possidet, ab ipsis lædi nequit; sed è contrâ eadem ipsam eò densiorem faciunt, quæ frequentiori impetu in illam feruntur, particulas ex quibus constituitur, artius hoc modo inter se conjungendo, & fibrillis partium applicando, inde fit, ut aliquando totus *Sinus* callo circumdetur, & sic fistula producatur.

Prognosis  
Inflam-  
mationis.

§. 11. Quæ de morbis hîc formati possint præfagia, nunc paucis percipimus. *Inflammatio* partium tendinosarum & membranosarum longiori tantum elapso temporis spatio solvuntur, carnosarum verò brevius finiuntur, de quibus partium specialium Inflammationes videas, ubi earum invenies prognosin. Omnis Inflammatio, quæ per intensilem transpirationem non discutitur, suppuratur, vel si malè tractetur in gangrænam degenerat, & sæpè in ipsam mortem. Inflammatio partium internarum est periculossissima & sæpè lethalis. Quo inflammatio est intensior & partes occupet nobiliores, eò curatu difficilior existit; facilius curatur Inflammatio in Juvénibus, quàm Senibus, quia partes Juvénium sunt molliores & facilius cedunt motui ætheris & partibus obstruentibus quàm in Senibus, ubi omnia sunt rigidiora. A malignitate quoque causarum, item Symptomatum vehementia desumuntur præfagia. Si partes adnoscæ fuerint Inflammatione oblesæ, facile ad concipiendam corruptionem aptæ nate sunt, hinc in gangrænam ac Sphacelum facillimè degenerant. Inflammatio quoque secundum tem-

pore judicatur, nimirum si in principio non respondeat voto, aut statim discutatur, aut resolvatur, neque in fine statûs & inclinationis suppurari velit, sed induretur, quod maximum accessit negotium, quia resolvî vix aut nevix quidem potest, aut planè tendat ad Syderationem, quod absolutè pessimum est, tum quia minatur abscissionem aut subitanam mortem ob sanguinis coagulationem in corde factam. Ex his patet, quod obstrictio Inflammationem præcedens, quo gravior est, eo solet etiam esse gravior Inflammatio, quia talis partium fieri potest obstrictio, ut impeditur humorum ad partem affectam circulantium communicatione, inlequatur gangræna. Dolores quo sunt vehementiores, eo etiam difficilior est, quo autem partes minus tribent, eo etiam faciliior est, quia tantam prognosin partium obstructionem, ac per consequens tantam ætheris agitationem non præsupponit.

Prognosis *Abcessuum* variat vel incuitu causæ, vel partis affectæ; ratione causæ à Veteribus dicitur criticis. qui in morbis acutis observatur, & per causâ aut materiam morbosâ collectionem contingit, seu cum euphoria seu secus hoc fiat; alius non criticus. qui vel à causa externa, saltem internâ locali à vulgo ita dictâ tantum dependet. Ille ergo qui minus criticus est, nihil periculi portendit, ac prolixam in Prognosi circumspeditionem haud desiderat, cum educta materia facillè curetur. Intuitu partis affectæ i. e. membri modò nobilioris, h. e. magis membranosi & sensibilis magis, modò ignobilioris atque minus sensibilis, alius Abcessus erit periculolior, qui prius aliquod genus, alius secior, qui posterius quoddam occupat. Abcessus aperit quo diutius protrahatur, eo pejus est, succedunt enim febres. sinus, ossium subiectorum caries, imò & gangræna. Pus eò laudabilius erit, quo magis ad indolem chyli & sacci nutritii accedet. Sin acorem nimium contraxerit, inficiet sanguinem, febres producet, corrodet atque exedet fluidorum canaliculos. Si pus æquale & tenuem minus aut viscidum fœtidum fuerit, pejoris notæ, nec puris nomine dignum erit, cum contaminatis obstructionis, præcipitationis & putredinis indubitatum perhibeat testimonium.

Sanies seu pus ex *Sinu* profluens valde tenue, malè coloratum, viride, nigrum aut putridum, nihil boni promittit. Pus autem album inflat chyli vel succi nutritii lavæ, æquale, minimeque fœtidum ceret & sanitatem pollicetur; sic & si dolor & tumor dispareat, bonum est. Sed cum pars etiam leviter compressa dolet, subiectas nervosas, fibrosas ac tendinosas ulceratas & tactas esse, non levis est conjectura. Si sanies in *Sinu* exeat valde tenuis, eaque nigra & fœtida, malum est; denotat enim, quod ad os usque caries pervasit. Sin crassa, viscida & similis fœci materia est, signum est solam carnem ulceratam esse. Cum spiritus volatiles particulas cæteras temperantes ardè & amicè continentes avolant, sal tum florem concipit; unde insignis ille *Acor* curiosis linguis perceptus; tum cum *Are* exaltatus nervi odoratorii fibrillas spiculis suis concutit, quod in suum animam sub odoris ideâ recipiens ut ingratum averfatur, id quod tum ad sensum respicientes fœtorem dicimus Sal quoque & *Æira* combinata materiam flavedinem conciliant, quam tum Latiniore dixerant sanem, quod in eâ sanis quid sanguinis adhuc continere.

Prognosis  
Abcessuum.

Prognosis  
Sinus.

tineretur, de cuius à pure differentis eleganter, ut solet, *Celsus* elidit. Interea dum acidum incipit exsuperare, avolantibus subinde plüs minus particulis volatilibus, Inflammationis tragædia Catastrophæ suam sortitur ex Tumore inflammato in oleis purulentum abscedendo, Abscessum & Ulcus *Sinusum* constituens. *Sinus* curatio difficilis est expectanda, sicallum & duritiem contraxerit, at boni ominis est, si pus paucum, bonum, album exeat, & ferè siccus exillat Sinus, nullusque addit amplius dolor.

Dietæ.

§. 12. Quod concernit *Dietam*, Aër fugiatur nimis calidus & frigidus, sit verò temperatus, nimis enim calid' dissipando spiritus, & frigidus coagulando sanguinem fucosque, nocere potest. Alimenta sint optima, abstineatur à nimis calidis, ut piperatis, fluorem quidem & cursum cruori restituentibus, sed maiorem Inflammationi dolorem parientibus, propter angustatas & pressas vias, quia sanguis nimium premens dolorem Inflammationi aget, plus enim sanguinis ibi colligitur, quam venæ absorbere possint, ex illà pressione valè & membræ expanduntur, & fibræ minantur rupturam, hinc difficultas illa dolorem parit, & propterea quidam ad venæ sectionem coguntur descendere, ut nimium sanguinis cursum moderentur, temperantibus itaque uti debemus, ne in illud malum incidamus. Ab acidis quoque salitis, saccharatis & frigidis abstinendum est, præcipuè enim morborum causæ existunt, hinc fugienda sunt. In Inflammationibus potus commendatur Theæ vel Coffex, omnem stagnationem sanguinis & succorum arcens, vitentur vina acida; in assuetis tamen concedi potest vinum, in quo bacca sambuci fuerint infusæ, & sacchari momento ad gratam dulcedinem edulcoratum. Cerevisiæ malè coctæ & veteres, item julepiacidi, qui potius Inflammationem augent, quam minuunt, fugiantur. Pessimè ergo sanitati suæ consulunt ii, qui in Inflammationibus refrigerare tentant, cum hæc in deterius omnia rueret faciant.

Motus quoque nimius, vigilæ immoderate aque pejus fugiantur, cum hæc omnia æquè motum intestinum ac progressum augeant, & sic dolorem & ruborem partis efficiant.

Excreta & retenta sibi invicem respondeant, ne motum excedant.

Animi passiones immoderate, imprimis ira & metus, atro carbone notandæ sunt, & animus potius sit tranquillus, confidens in Deum O. M. fidum illum in re quavis difficili Auxiliatorem; quæ omnia etiam accuratè observanda sunt in *Abscessu & Sinu*.

Galenicorum modis curandi Inflammationem.

§. 13. *Galenici* in curatione *Inflammationis* ex arte constituendâ ad morbum, causam & symptomata solent respicere. Cùm verò cuncta sint auferenda, potissimum verò morbus & causa, quibus ablatis symptoma facile cesset, venæsectionem præsertim existimant necessariam, si quidem sanguine detracto, qui inflammationem facit, tumor, calor, obstructio, vel adstrictio & unitas ulterior solutio desinant. Hac verò præmissa ad calorem nimium in partibus solidis restinguendum refrigerantia nonnulla adhibent, ulterioremque materiam in partem prohibent influxum, remediis in usum ductis repellentibus & digerentibus simul junctis, ne repellentia sola adhibita materiam ad partes nobiliores remittendo, vel sola digerentia, utpote calida, ad par-

tem affectam eandem materiam copiosius attrahendo plus noceant. Habito proinde respectu ad hepatis intemperiem calidiorem, quam temperandam volunt, & victu instituto tenui, omni adhibito studio ulteriorem ad partem affectam sanguinis prohibent influxum, & canque laxiorem corroborant adstringentibus, spongiâ nempe vino madente, vel defensivo ex bolo Armeno, terrâ Lemniâ, oleo rosaceo & aceto parato imposito. Dolorem tamen vehementiorem leniri volunt relaxantibus non nimium humidis, qualia sunt perfusio olei & aquæ calidæ, vel cataplasma ex farinâ triticæ, vel ceratum ex passo, oleo rosaceo & cerâ, vellimentum ex vitellis ovorum, oleo rosarum & croco. Hæc in ipso peragunt principio, in maiori verò incremento digerentia admiscunt repellentibus, & in vigore huius planè omifis solis utuntur digerentibus. Repellentium numero adscribitur remedia frigida & humida, qualia sunt lenticula palustris, alfine, psyllium, portulaca, malva, cucurbita, lactuca, folia hyocyami, succus mandragoræ; vel refrigerantia & adstringentia, ut sunt umbilicus Veneris, sempervivum, plantago, solanum, malicorium, balaustia, hypocistis. Thus, galla immatura, vinum austerrum. Digerentia & simul repellentia illis sunt, myrrhus, lentiscus, abanthum, panetaria, lepis, crocus. Remediis in augmento Inflammationis adhibendi sequens esse potest formula.

R. *Fid. Semperviv.**Lactuc.**Parietar.**Cucurbit. aa. Mj.**Flor. rosar. rub. Mj.**Chamomill.**Melilot. aa. Pj.**Malicori.**Rhois aa. ʒß.**Farin. bord. Mj.**M. Coq. ex aquâ additæque portione quadam olei rosacæ, F. Cataplasma.*

Emplastrum quoque diachalciteos, vel enaxum barbarum ad eundem usum imponunt. Pro derivatione præter venæsectionem cucurbitulas & frictions adhibent. Ad magis digerendum, si opus sit, cataplasmata parant ex uvis passis cum pane & melle, vel ex radicibus altheæ, liliorum alborum, foliis malvæ, floribus meliloti, semine lini, fœnigræci, caricis, farinâ triticæ, oleo chamæmeli & pinguedine suillâ, vel anseris & gallinæ. Si digestio impetrari nequeat, & inflammatio jam sit remissa, humorem crassorem aperto loco affecto; vel si hic aperiri nequeat, loco maxime vicino, effundunt.

Vergente verò Inflammatione in *Abscessum*, propter copiosum pus intus collectum, quod distendendo & rodendo partes antea se contingentes faciat abscedere, concoctionem istam humoris & transmutationem in pus promovere emplasticis & cutim ocludentibus, calidis nempe & humidis pus facile moventibus, ut terebinthina, galbano, bdellio, pice, emplastro diachylo, cataplasmate ex farinâ hordei vel secalis in aquâ decoctâ, in quâ radices altheæ prius ebullierint, additâ adipe gallinacæ vel anserina, aut quod paratur ex caricis in aquâ coctis, & farina tritici, vel quod sequens exhibet formula.

R. *Rad.*



R. Rad. alib.

litor. aa. ʒiij.

Ferment. ʒij.

Farin. sem. lin. ʒi.

Resin. terebinth. ʒʒ.

Croci ʒij.

Ol. chamomill.

Adip. gallin. aa. q. l.

Terenda terantur, &amp; cum pinguius miscantur, ut F. Cataplasma.

Pus probè maturum vel digerentibus & in vapores convertentibus discutunt, vel si hoc fieri nequeat, apertolocho evacuant. Inter digerentia referunt ficos, latiniam hordel, panem ex surfute, terebinthinam, picem aridam, adipem vitulinam, baccas lauri, nitrum rubrum, vel cataplasma aut linimentum ex mucos cochlear, pure, aloë ac myrrha paragon. Si verò ob altitudinem loci, puris copiam vel acrimoniam, vel crassitiem digerentia ista parum queant proficere, loco aperto pus illud manifestè evacuant. Apertionem istam nonnunquam ab ipso pure acciori & in superficie existente fieri norunt, interduum verò medicamentis vel Chirurgia eam instituendam esse præcipiunt. Medicamenta apertionem istam perficere docent, vel extrahendo pus ad partes externas, vel erodendo, vel adurendo. Extrahentia illis sunt propolis, pix, sulphur, radix cucumeris agrestis, bryonia, narcissi, arundinis, aristolochie, emplastrum ex gummi ammoniaco, terebinthina, cera, sulphure & nitro, vel theiaca & mel invicem mixta. Ex erodentibus laudanallium superimpositum, vel fermentum cum cantharide. Aduentium ordini hic accensent saponem nigrum, chalcitidem, oleum chalcantini. Chirurgiam celebrant vel secando locum scalpello, vel adurendo ferramento candente, quo facto pus facile evacuat, sed non prius operationem hanc instituunt, quam pure toto bene confecto, nisi abscessus sit prope anum, aut circa articulos, in quibus materiam subderum evacuant, ne à puris acrimonia vel fistula producatur, vel nervi aut ligamenta etodantur. In minoribus autem abscessibus unicam apertionem sufficere monent, sed in maioribus plures concedunt, respiciente semper foramine inferiora, ut pus commodius evacuetur. Si contingat, ut vena vel arteriola grandiores sanguinem nimis effundant, easdem claudunt emplasticis & crustam indurcentibus, ut albumine ovi, stuppi vel linamento excepto, si dolor affligat, lintea oleo rosaceo madida imponunt; si partes vicinas inflammatio occupet, emplastrum diachalceos oleo rosaceo dilutum illis imponunt; si durum aliquid tæster, illud emplastro tetrapharmaco debite emolliunt. In evacuatione puris monent etiam Hippocratis advertent, nec unà vice illud totum emittunt, ne animæ sequatur defectio, cui fortè supervenienti odoribus, vini potione, & aquæ frigide in faciem asperione statim volunt esse succurrendum.

Sinum.

Sinūs curationem aggrediuntur detergentibus, hinc eundem implent, & cicatricem inducunt, abstinentes semper à pinguius & olei vini habentibus, cum siccandum sit. Detergentem peragunt ablundo Sinum mulsâ, vel vino cum aqua marina mixto, aut cui sal adjectus fuerit, vel terebinthina & farina hordei cum melle, aut squama aris cum vino & melle. Sinum ita mun-

datum carne implent, auferendo impedimenta naturæ suæ opus inhibentia, & difficultatem inferentia, quod perficiunt medicamentis modicè detergentibus, & sine moris siccantibus, ut pulvere ex radice iridis aut aristolochie, manni, thure, myrrha, aloë, aut remedio ex sermone & ostreis ustis & ablutis. Carne sic procreata veram cutem attingente, cicatricem inducunt, prospiciendo simul, ne caro nimis multa procreetur, quod falsius peragunt, easdem à fundo sinus arctando, ut sublimia sedem contingant, ad os verò ejusdem laxiores ducendo, utriusque linamento, emplastro barbaro obducto, & ad sanem effundendam in medio perforato imposito. Ipsum verò os Sinus semper deorsum spectare volunt, ne sanies retineatur, quod si fortè sursum spectet, aut membrum ita collocant, ut in partem inferiorem vergat, aut demisso specillo, quâ pervenit fundum, scalpello aperiunt, ut humor superflues evacuetur, & os superum occultant. Cui tandem à pure diutius retento nimis extenuata, & à carne subiecta separata, victu idoneo & totius corporis purgatione prohibent, ne sinus noxium humorem recipiat, tum medicamentis siccantibus & modicè detergentibus eum cum subiecta carne paulatim agglutinant, compellendo in sinum per velicam bubulam vel siliam, cui fistula alligata sit, emplastrum ex charia combusta aut lino oleo rosaceo liquatum, aut aloen, thuris & myrrham cum melle aut pulverem ex centauro, symphyto, radice iridis, farina ervi cum melle, nec locum nimis comprimunt; sed carne subcrecente paulatim sinum agglutinari.

§. 14. Paracelsus in Pleumone curam commendat mundificantiem, quam sequentibus potissimum peragit remediis:

R. Ol. eor. ʒvj.

Camomelini ʒj.

Serapini.

Galbani aa. ʒvj.

Visci de abiete aut pino ad pondus omnium,

Farin. hordei,

sabarum, aa. quantum sufficit pro incorporatione.

Commiscen formam Unguenti.

Mel etiam rosatum & salis aquam simul permiscet, eoque liquore sero manetque locum jubet lavare.

In curâ Apostematum & Sinuum abstinentiam esse ait à magno magisterio, vel artis Chirurgicæ nimia subtilitate, quæ potius, quam curabunt, inficiunt. In omnium siquidem ulcerum curâ animadvertit, naturam in ipsius esse Medicum, atque medelam innato proprioque suo balano petigi. Sed si fortè balium hoc illi deficeret, vel aliqua parte minutum foret, balium vult introducendum per emplastrum oppositum, quod quidem Apostemata recentia maturando & mundificando curat, vigesima quæ horâ renovando, ligandoque. Ex. gr.

R. Linargyr. collium cerorum ʒij.

de incarnativis quatuor ʒʒ.

de gummi liquescentiis ʒij.

M. F. Emplastrum f. artem.

In principio ait tutum fore prævenire plebotomiis venarum, à quibus Apostema generatur, & situm habet: In enim, inquit, auferitur illis rubedo membrorum per sanguinis diminutionem, & unâ cum ea tollitur superfluitas sanguinis

Paracelsi  
curam in  
inflammatione.Abscessu  
& Sinu.

nis abundantis, nedum in his tantum, verum etiam in omnibus aliis apostematibus. Triavero potissimum in Apostematum curis observanda vult: Primum ut spiritus vitæ fortificetur, ne præ dolore debilis fiat: sicuti solæ in his, qui venenum hauserunt, præservantibus medicamentis noxæ præveniri. Secundum, ut infectio, quam introduxit morbus, diaphoreticis mundificetur & specificis, quæ non solum clarificant, sed etiam dolores mitigant. Tertium, ut locus affectus à toxico præmuniatur. Si carnis aliqua pars à suâ naturâ sit alienata, quod putrefactum est ejus auferri vult, cum ex ejusmodi carnis infectione, juxta Authorem hunc, tale damnum inferatur ei, quale combusto fit ab una parte ligno, & ab alterâ sano.

*Helmontiana cura in inflammatione.*  
§. 15. *Helmontius* Inflammationis cujuscumque partis curam eo dirigit, ut causa occasionalis sive spina tollatur, quâ depulsa *Archeus* ab ulteriores accensione redigitur ad quietem, quapropter internæ arcana sua diaphoretica commendat, externæ verò omnia ea, quæ ex lapide calaminari & camphorâ parantur.

*Abcessu.* In *Abcessu* quocumque emolliationem & maturationem promovet, per medicamenta apostematibus accommodata, imprimis pinguedinem lepotos, maxime vetustam commendat, quæ ea valde emollit & rumpit. Sic etiam sanguinem hircinum externus applicatum ea maturare ait, oleumque strumarum hic magnificat externè illitum, cujus descriptio in capite de Strumis videri potest.

*Sinu.* Sinum hoc modo tractat, ut salacre corrigatur per medicamenta ex lapide calaminari præparato & camphorâ, nec mundificativa omittit ex gummi alisque detergentibus parata.

*Modus curandi in inflammatione.*  
§. 16. *VV. illius* ad Inflammationem quamcumque abigendam, curam eo dirigit, ut sanguinis motus suus iterum reconcilietur, & à lentore suo in statum pristinum restituatur, quod peragi posse putat venesectione, hirudinibus, & nonnunquam cucurbitulis applicatis. Alvum adstrictam relaxandam esse innuit, & reliqua sanguinem temperantia, & æstus ejus sedantia intus assumenda commendat, quia de causâ tum jalapia, tum apozenata præscribit. Ex gr.

℞. Aq. nymph.

Violar.

Papav. errat.

Endiv. aa. ʒij.

Dis ʒss.

Syr. pomor. ʒss.

M. d. ad vitrum.

℞. Decoct. rad. acetos.

cichor.

Endiv.

Ligni santal. citrin.

Raf. C.C.

Pom. Chri N. j.

D.

Omnia ea remedia, quæ sanguinis coagulationem resolvunt, internè commendat Author, imprimis sequens.

℞. Aq. Acetof.

Gramin.

Retrofel.

Parietar. aa. ʒj.

Lapid. prunell. ʒj.

Syr. de Cichor. ʒj.

M. D. cochlearium.

Vel in formâ pulveris.

℞. Lapid. prunell. ʒij.

Flor. Opi ʒss.

Ocul. ʒss. pp. ʒss.

M. F. Pulvis, qui detur cuspidatum.

Ad lentorem sanguinis magis dissolvendum spiritum Qi, vel Ois æci magni æstimas. Inter externa commendat cataplasmata emollientia & discutientia ex scordio, ruta, parietaria, malva, agrimonia, floribus chamomilla, meliloti, verbasci, hyperici, semine fœnigraci, vel ex medullâ panis albi in lacte cocta, sequenti modo.

℞. Herb. parietar.

malv.

agrimor. aa. Mij.

Flor. chamomill.

Hyperic. aa. Piss.

Sem. fœnigr. ʒj.

Medull. panis alb.

Coquantur in lacte ad pulvis consistentiam.

Add.

Vinell. ov. N. ij.

Croci ʒss.

M. F. Cataplasma.

Fortum etiam instituit ex malva, althea, beta, scordio, ruta, floribus sambuci in aqua communi coctis tepide adhibitum, & ad dolorem magis leniendum, vel etiam suppurationem promovendam, unguentum dialtheæ, populinum, & emplastrum diachylon admodum existimat proficua.

In *Abcessu* & *Sinu* internè laudat decocta vulneraria, externè unguenta digestiva, balsamum de Capaiva internè & externè usurpatum, unguentum Basilicum, maturantia scilicet seu suppurantia, ut sunt cataplasmata ex radice altheæ, herbis malvæ, parietariæ, agrimonie, floribus chamomilla, verbasci, meliloti, semine lini, farina fabarum, fœnigraci & fœxenta alibi jam dicta.

§. 17. *Inflammationis*, hinc & *Abcessus Sinus* Sylvii curæ que curationem ad mentem Sylvii quod attinet, in 10. consistit ea 1. in obstructionis vasorum solutione; 2. in sanguinis subsistentis ac stagnantis motus restitutione; 3. in sanguinis eluvi & aliquo modo corrupti correctione; 4. in maturatione *Abcessus* faciendâ; 5. in sanguinis maturati, seu *Abcessus* apertione; 6. in *abcessus* aperti mundificatione; 7. in ejusdem consolidatione. Si ergo obstructio vasorum seu compressio fuerit à vinculis artius parti affectæ circumjectis, illa propediem auferantur. Obstructio verò vasorum à pituita viscosa vel sanguine in ipsis coagulatis solvitur medicamentis, quæ motum sanguinis egregie accelerant, illudque impedimentum, quo sanguis stagnare cogebatur, tollunt, qualia sunt blanda aromatica, & salibus præsertim volatilibus abundantia, nam quatenus ea medicamenta sunt aromatica, ætenuis humor pituitosus attenuatur, ut desinat efficere obstructionem; quatenus autem ea sunt Sale volatili constantia & prædita, uti sunt de Ossibus Cornu cervi, &c. non tantum vim habent coagulata dissolvendi & fluida reddendi, sudorem movendi & sic materiam peccantem expellendi, sed & ipsum sanguinem effusum, & à spiritu suo liberatum, adeoque acidum factum corrigendi, cujus acidi vis dum est infracta, nova coagulatio impeditur, eam



## CAP. II. DE INFLAMM. ABSCESU ET SINU. 491

eam ergo in finem formulam sequentem præscribere solet.

℞.  $\nabla$  *℥ssop.*

*fenicul.* aa.  $\mathfrak{z}$ ij.

*Ther. simpl.*  $\mathfrak{z}$ ss.

—  $\times$  *ci.*  $\mathfrak{xv}$ .

*Gn. diaphoret.*  $\mathfrak{z}$ j.

*Laudan. opiat.*  $\mathfrak{gr}$  ij.

*Syr. papav. err.*  $\mathfrak{z}$ j.

M.

Hujus mixturæ cochleari unum aut alterum sinbide allumendum esse præscribit ægro, ut ea ratione obstructio solvatur. Ad Slein volatiliem quoque refert oculos  $\mathfrak{B}$  mandibulas lucti, os de corde cervi, &c. cum hæc Gle volatili abundant. Omnia quoque Sulphura metallica & mineralia, sed fixa, hoc in calu conducere scribit, imprimis Gnini diaphoreticum ad fixitatem aliquam deductum. Nec tantum hic laudat animalium salia volatilia, sed omnia ex variis plantarum scribaturum & acrium partibus petita, eorundemque vini emulancia, uti sunt succi erysini, cochlearis nasturtii & hortensis & aquatici, taraxaci,  $\nabla$  theriacalis, &c.

Externæ in Inflammatione partium commendat fons ex plantis aromaticis in  $\nabla$  aut vino coctis paratos, vel — vini rectifi. tam simplicem, quam compositum, item olea & unguenta varia, ungu. sc. martiat. alch. ol. lil. alb. chamæmelin. aneth. laurinum, Philosoph. &c. vel cataplasmatamagis dissolventia, quam emollientia, vel maturantia, quorum vis percutis poros penetrat, & sic obstructionem solvit. Exempli loco seq. præscribit.

℞. *Capar. sub cinerib.* aut *sistili vase assatum*  
& *contus.*  $\mathfrak{z}$ ij.

*Fol. erysini.*

*Charesfolii.*

*Nasturt. hort.*

*Sambuc.* aa.  $\mathfrak{M}$ ss.

*Farin. fabar.*

*Lapinor.* aa.  $\mathfrak{z}$ j.

*Nid. hirund.* N. j.

*Albi Grac.*  $\mathfrak{z}$ j.

F. i. a. decoctio in lacte ebutyrate ad cataplasmatum confitentiam. Ejusmodi cataplasma mediocriter calens parti externæ inflammatæ applicandum vult, cujus ope internæ quoque obstruções solvuntur, & observandum vult, quod renovandum sit, quamprimum exsiccati incipiat.

Dein 2. sanguinis stagnantis motum restituit sudoriferis & modo dictis salibus volatilibus, quandoque etiam venesectione, sed in initio, & quidem pro ægrotum constitutione peculiari & viribus per iteratas vices instituit, quatenus in omni sanguinis reductione major motus sanguini concedatur.

3. Sanguinis effusi & aliquo modo corrupti correctionem consistere ait in acidemendatione & sanguinis coagulatione impedienda, quod juxta ipsum præstant oculi  $\mathfrak{B}$  Gn. diaphoret. mumia, Sperma ceti, Gummi. Galbanum, Sappenu, opium, Cerevisia Joppensis dicta; Inter Externa laudat Emplastr. de Ipecun. ceti, cum Gummi. Galbano, ut & fons ex aromaticis paratos.

In Abscessu, ubi materia profundior hæreat, promovendam esse suadet maturationem per emollientia ac maturantia dicta, qualia sunt radicæ alther, herbæ malvæ, bisulvæ, lil. alb.

branc. ursin. atriplex mercurialis, quæ coquenda sunt in lacte, & cujus lactis parva copia est usurpanda, possunt etiam illa maturantia cataplasmatina forma parti dolenti applicari, imprimis seq. cataplasma.

℞. *Farin.* rad. alib.

*border.* aa.  $\mathfrak{z}$ ij.

*Fol. malvæ.*

*branc. ursin.* aa.  $\mathfrak{M}$ ij.

*Sem. lin.* *quifarin.*  $\mathfrak{z}$ ss.

*Curicor. concis.* N x.

Coquantur igne lento ex aqua parva, cerevisia tenuis, aut urgente ardore summo ex lacte ebutyrate ad humiditatis consumptionem ac decoquendum emollientem, tunc contusus omnibus addit.

*Asungia porcine*

*Butyri recent.* aa.  $\mathfrak{z}$ ss.

M. P. Cataplasma.

Commendat quoque Emplastr. diachyl. s. cum Gummi. ut & mucilag. imprimis ubi multâ pituita eaque viscofascet corpus & sanguis. Absoluta sic puris generatione non procrastinandam vult puris educationem, cum pus morâ redatur acrius, atque ab ipsa partes vicinæ magis magisque corrumpantur, sicque Sinus curatu difficilior. efficitur, imprimis ubi multâ vicina corroduntur à pure illi acore facta, & naturâ suâ existente acido, quapropter ubi ex partis affectæ mollietate tactum manifesta, ut & rubedine ac dolore dimmutis puris perfecti præsentia innouit, aut cultello acuto, aut potentiali cauterio puri exitum parat, & quidem in loco tumoris maxime molli ac declivi.

Quod si nimis delicatulus aut morosus fuerit æger, ut apertionem hanc utramque petmittere recuset, tunc sequens Empl. luadet imponendum tumori.

℞. *Mellis opt.*

*Farin. focal.* aa.  $\mathfrak{z}$ j.

*Vitell.* *ovi.* N. j.

Imponantur igitur blandi & agitentur ad Emplastrum formam. Ficus quoque contundi & cataplasmatina modo applicari jubet, quo sic faciliter & promoveatur Abscessus apertio. Ubi autem puris multum continetur in Abscessu, cavendum vult Author, ne omne unâ vice educatur, sed partitum, ne vires ægrotum proflentantur. Ubi verò puris parum, concedit, ut omne effluat, sed sine pressione forti ac diutina, unde plus malit, quam boni emerget. Quoties autem in loco ab apertione remota pus hæret, aut Sinus odumtaxat ductu ad locum apertionis fertur, toties pressione blandâ ipsum foras propellere permittit. In Abscessu ac Sinu consolidationem tum externæ, tum internæ guttam anani vel alteram balsami  $\Delta$  terebinthinati vel anisati commendat summo petere, non solum quatenus & ulcus humidificat, & consolidationem excitat, sed etiam quatenus oleositate sua &  $\mathfrak{B}$  volatili acidum expellit & enervat.

§. 18. *Carciesiani* ad curandam Inflammationem *Carciesi* remediis utuntur attenuantibus. particulas acutas frangentibus, hebetantibus, & coagulationem succorum resolventibus, quibus calor imminuitur, & effervescencia sedetur. Pro sedando dolore vehementi venesectionem admittunt, ne sanguis impetuosi affluens fortiore suâ pressione dolorem adaugeat, nec stagnatione chylum ad suppurationem disponat. Si tamen suppuratio verari nequeat, tandem promoveant.

inovent, & mundationi ac consolidationi in-  
cumbunt. Nonnuquam ad particulas acutas  
sive acidis evacuandas remedia exhibent purgan-  
tia ex radice potissimum Jalappæ, ejusq; terelinâ  
composita, quibus glandulæ intestinales agitate  
magnam emittant lymphæ vitiosæ copiam. His-  
cæ remedia subjungunt sale prædita fixo vel vo-  
latili materiam viscidam incidentia, & ad fluidi-  
tatem disponentia, quorum numero adscribunt  
diaphoretica & diuretica, qualia sunt anti-mo-  
nium diaphoreticum, oculi 33, unicornu, he-  
zoardicum minerale, mandibulæ lucii, ~us  
\*ci, C.C. fuliginis, sperma ceti, crocus, lau-  
danum opiatum, remedia ex herbis nasturtii,  
æquaticæ & hortenlis, cochleariæ, beccabungæ,  
cichorii, taraxaci. Forinsecus etiam resollen-  
tia adhibent, succos stagnantes & incrustatos ad  
fluorem disponentia, qualia componuntur ex  
radicē bryoniæ, bardani, raphani, cucumeris  
alini, iris, foliis absinthii, scordii, cochlea-  
riæ, beccabungæ, chærefolii, cardui sylvestris,  
floribus chamomillæ, sambuci, croci, \*co,  
bolo, cerullâ, creta, camphora, sulphure, sper-  
mate ceti, fermento, spiritu vini, facce ceti visciæ,  
& vini, stercorebus animalium, unguento albo  
camphorato & similibus. Approbatur itaque  
singulaciter linimenta attenuantia & absorbentia  
ex sulphure trito, bolo Armeno, terra 3li,  
camphora & spiritu vini, vel fatus ex facibus  
cerevisiæ, albo Græco. Se \*co, camphorâ, vel  
cataplasmata ex foliis taraxaci, cardui sylvestris,  
cochleariæ, alinæ, lenticiuli palustri, sulphure  
invicem contusis, aut ex radice cucumeris alini,  
baccis lauri, foliis eupatorii, cicutariæ, ta-  
baci, absinthii, petroselinii, chærefolii, floribus  
Camomillæ Romanæ, sambuci, sem. cumini, &  
camphorâ in spiritu vini coctis parata, vel em-  
plasta de spermate ceti, ranarum, diapalmæ  
cum terra vitrioli, de minio, vel in subjectis den-  
sa cute præditis & oleosa tolerantibus unguen-  
tum dialthææ, martiatum, oleum anethinum,  
laurinum, terræ, Philosphorum, Petræ, suc-  
cini, terebinthinæ. Pro exemplo sequentem  
D. D. Dexbachii, Physici Castellani celeberrimi  
Observationem vobis hodie communicatam  
adiungimus. Juvenis enim mercator 39, circi-  
ter annorum per triduum inflammatione totius  
pedis sinistri cum dolore capitis, siti aucta, in-  
quietudine continua, febre atque alvo ob-  
structa, rubore & tumore cum maculis lividis  
afflictus, die nono Calendarum Decembris  
Anno 1688. laudarum modo virum accitavit.  
qui sequentibus remediis acidum vitiosum, suc-  
cos coagulans & in tubulis reilitare faciens corti-  
gentibus, attenuantibus & absorbentibus pristi-  
nam cum restituit sanitati. Ratione enim alvi  
obstructæ sequens præscriptio tenet.

℞. Rad. fœnicul.

Petrosel. aa. ʒʒ.

Contravert. ʒj.

Herb. menth.

Chærefol.

Erysim.

Card. bened. aa. ʒʒ.

Thés P. j.

Flor. sambuc. Mj.

Chamomill.

Hyperic. aa. P. j.

Myrrh. ʒiʒ.

Sem. fœnic. ʒij.

Incis. & contus. affund. Aq. bord. calfatâ. vel  
fervent. q. l.

℞ ʒiʒ.

Sent. per ʒ. horas in digestionem in loco calido,  
dein cog. & exprimantur ad ʒij. in quâ dissolv.

Elect. Diacathol.

Mell. anthosai. aa. ʒj.

Essent. sambuc. ʒʒ.

Elect. Diacord. Fracastor. ʒʒ.

Ol. violar. coll. q. l.

℞ ʒiʒ.

M. F. Enema.

2. ℞. ʒiʒ solubil. ʒj.

Oc. ʒʒ pp. ʒʒ.

ʒiʒ diaphoret. rusc pp. & recenter desona-  
ti gr. ix.

Camphor. gr. j.

℞ ʒiʒ sambuc. gr. iij.

Extr. croci. gr. ʒ.

M. F. Pulvis digestivus pro unâ dosi.

3. ℞. Oc. ʒʒ. pp. ʒʒ.

Corall. rub. pp. gr. v.

Qiemei. rusc pp. Myns. gr. iij.

℞ ʒiʒ C. C. volat.

sambuc. aa. gr. j.

M. F. Pulvis vomitorijs pro unâ dosi mane  
sumendus.

4. ℞. Essent. sambuc.

sumar. aa. ʒʒ.

Tinctur. ʒiʒ ʒiʒ. gr. xv.

~ C. C. rectificat. absque sacore parat.  
gr. xij.

F. Mixtura sudorifera pro unâ dosi.

℞. ʒiʒ flor. sambuc. ʒiʒ.

S. Aqua ad mixturam sudoriferam,  
etiâ pro unâ dosi.

5. ℞. C. C. ʒiʒ. Δ ʒj.

Ocul. ʒʒ. pp.

Flor. pp. aa. ʒj.

ʒiʒ diaphoret. rusc pp. & recenter desonati  
gr. xxiiij.

Myrrh. elect. gr. vij.

Camphor. gr. iij.

℞ ʒiʒ sambuc.

Card. bened.

Scord. aa. gr. v.

M. & divid. in 6. doses æquales.

S. Pulvis absorbens pro 6. dosibus.

6. ℞. Aq. flor. sambuc. ʒvi.

~ antisorbent. n. ʒj.

M. S. Aqua ad pulverem absorbentem, pro  
6. dosibus.

6. ℞. ~ ℞ ʒiʒ succinat. ʒij.

S. Spiritus gentianis usurpandus, pro una  
dosi gutt. vij.

in potu ordinario.

7. Decoctum Thæ per dies 14. usurpavit.  
Remedia externa adhibuit sequentia.

1. ℞. ~ us vin. camphorat. ʒij.

S. Spiritus externus, de die bis sepius  
applicandus.

2. ℞. Rob. sambuc. ʒvij.

Elect. diacord. Frac. ʒij.

Pulv. erysipelat. Myns. ʒvj.

Flor. sambuc.

Chamomill. comm. & Rom. ʒj.

Scord. ʒvj.

Myrrh. ʒij.

Camphor. ʒij.

Creor.



Crocior. ʒj.

— us vini q. l.

F. Cataplasma repide applicandum.

ʒ. R. Herib. beccabung.

Cochlear.

Scord.

Erys.

Alvindh. aa. ʒiʒ.

Flor. sambuc.

Chamomill. comm. &amp; Roman. aa. ʒij.

Pulv. eryspelat. Myrsi ʒiʒ.

Sem. nigell. ʒj.

Creta ʒvi.

Camphor. ʒiʒ.

Croc. or. ʒj.

F. Pulvis ʒiʒ.

S. Pulvis ad 2. facculos, calide applicandus.

4. Secunda vice spiritum vini camphoratum ordinavit, quibus ager Deo auxiliante convaleuit.

Abscessum.

Vergente vero inflammatione ob materiam copiam & crassitatem nimiam, resolutionem quamcumque & attenuationem recusantem, in Abscessum, suppurationem promovent emollientibus particulis suis ab æthere facile mobilibus calorem immineantibus, & chylum corruptum ad exitum propellentibus, qua virtute præstare volunt radices alii, altheæ, hyosmæ, cepæ, cucumeris asinini, filicis, liliorum alborum, folia altheæ, atriplicis, betæ, brancæ, urticæ, brassicæ, chærefoli, malvæ, mercurialis, parietariæ, spinachiz, verbasci, violariæ, farinæ fabarum, hordei, seminis altheæ, fumigræci, lini, ficus, mala dulcia, passulæ maiores, dactylos, flores chamomillæ, croci, malvæ, meliloti, lambuci, verbasci, gummi Ammoniacum, bdellium, galbanum, Opopanax Sagapen, resinam pini, terebinthinam, styracem, ceram, mel, sinum animalium, aloë, myrrham, nec non ex compositis unguentum Altheæ, Agrippæ, Basilicum, emplastrum diachylum simplex, cum gummis, de meliloto, de mucilaginis. de cuminio, de bacis lauri. Pro exemplo sequens existat cataplasma.

R. Cepæ, sub cineribus coct. ʒiʒ.

Herib. betæ Mj.

Ferment. acris ʒiʒ.

Fic. pingv. N. x.

Flor. melilot.

Camomill. aa. Mj.

Coq. ex cerevisia crassa in consistentiam debitan.

Contusis adde

Farina lini.

Unguent. basilic. aa. ʒij.

M. F. Cataplasma; cui interdum portionem quandam saponis immiscunt.

R. Emplastr. diachyl. simpl. ʒij.

de melilot. ʒj.

M.

Ut cataplasinata illa magis penetraret, subtilioribus prædita particulis iisdem immiscunt, qualia sunt nicotiana, semen sinapi, piper Indicum & Brasilense, cinamomum, caryophylli, — us C. C. calx viva, Alcali. Ammoniacum, & aliaq; volatilia. Facta suppuratione, tumorem aperiant vel raptorio ex sapone nigro & calce, aut luna spiritu nitri calcinata, & in lapidem infernalem mutata, vel lancetta aliove cultello acuto, ut materiam purulentam exitus pareatur, qua evacuata,

cavitate mundant remediis sale volatili oleoso, vel alcalico fixo præditis, quamcumque chyli aciescentiam prohibentibus, & fibras disruptas à carne sana leparantibus, qualia sunt radices gentianæ, succus chelidonii majoris, alchimidæ, torismarini, myrrha, sagapenum, balsamus Ais, vitrum, ʒii. mel rosatum, unguentum Apostolorum, Basilicum, c. Elis. vitæ, resina pini, terebinthina, gummi elemi. Mundatione peracta farcoticis & consolidantibus foramen denuo ocludunt, instillato vel oleo Hyper. petræ, balsamo Capayvæ, vel illito balsamo Italico, aut imposito emplastro diaphlphuris, aut oppodeltoch Würtzii, tandemque carnem cute obducunt, cui scopo illis inserviant lithargyrium, cerussa, plumbumustum, tucia, lapis laminaris, unguentum desiccativum rubrum, emplastrum griseum, diapoinpholygos, & oppodeltoch.

In Sinu potissimum eo respiciunt, ut siuecum acidum acrem carnem depauperantem doment, remediis alcalicis & volatilibus, præsertim succo vel melle chelidonii, ex quo pessum formant, eundemque cavitati immittunt, aut absterfiones ex decocto scordi, abinthii, nicotianæ, vel incocinaurii, nasturtii, apii, torismarini in quibus myrrha sit dissoluta, insciunt, vel unguentum Agyptiacum in iisdem dissolvunt & eodem modo adhibent, vel turundis illorum insistant, Petio etiam vel turunda ex melle chelidonis formata ʒium præcipitatum adpergunt, & cavitati ad fundum usque immittunt. Expresstis satis materia purulenta, & callo absumto, ipsaque cavitate probe mundata, farcotica inperius enumerata in usum ducunt, ut coëctius particulis acutis depascenibus, ex chylis he. ignoti nova carne defectus rearciatur, & spelunca ista convenienter occusatur.

6. Prælibatis autem opinionibus, restat ut nostram quoque de morbis hæc curandis subiungamus sententiam. Quam ex supra dictis pateat, Inflammationes tantum prædire extubulorum obstrukcione facta ab alcalicis acidis saturatis, ac ob inæqualem superficiem ad motum ineptioribus, & à Sulphuribus ab iisdem acidis coagulatis, à quibus non tantum sanguis, & reliqui succi in circulo suo retardantur, & materia ætherea in cursu suo sistitur. opera pretium est, quo coram eis absolvamus, ut medicamenta adhibeamus, quæ acida absorbeant, sanguinem & reliquos, luccos volatilibus dicent particulis tubulosque obstruere hoc modo expediant. Curatio enim pro temporis & Inflammationis, status, partis affectu, ac proin materiam obstruentis diversitate variat. Talia medicamenta sunt vel interna vel externa. Interna sunt vel absorbentia dicta, vel sudorifera quæcumque. Prioris ordinis sunt oculi ʒ. carb. tiliz C. C. ust. ʒij. diaphoret. ebur ust. Corall. rubr. crystall. mont. ʒ. lapis Irland. mun. optima ex. gr.

R. Sperm. Ceti ʒj.

Ocul. ʒ. ʒiʒ.

C. C. ust.

Lap. Irland. aa. ʒj.

Sulphur. C. C. vel succin. gr. ij.

M. F. Pulv. divid. in 6. partes aqu. & mane & vespere dosis exhibeat, cum potu calido Theæ vel Caphææ. Alcalia enim tales possident poros & meatus in quibus culpidus particulum

Qiq 3

acida.

Notæ Curatio Inflammationis.



acidarum omni occasione suscipiuntur, adeo ut vel cuspides aliquo modo frangantur, vel saltem obtundantur, atque sic materia stagnans tandem fluidior reddatur. Posterioris ordinis sunt Bezoard. minerale, Joviale, Martiale. Antihecticum Poter. Tinct. bezoard. volat. nost. ~ nitri dule. Theriac. Discord. mixt. f. ~ Theriacal. viperat. &c. Ut autem ipsarum partium obstructum fiat reseratio, materiaque obstruens incidatur, conveniunt omnia incidentia: salia volatilia & fixa oleosa, Diaphoreticis combinata, incidentibus suis particulis, & ratione aetheris perfluentis, poros obstructos aperientia. Talis sudoriferi poterit esse forma sequens:

℞. Regul. ℥ii ℥ss.  
 Card. bened. gr. xij.  
 Prunell. gr. vj.  
 Camphor. gr. iij.  
 M.F. Pulvis.

vel:  
 ℞. Theriac. v. ℥j.  
 Volat. C. C. ℥ss.  
 Bezoard. min. gr. xij.  
 Ol. Juniper. gr. iij.  
 M.F. solus.

Medicamenta enim omnia quae ex plurimimali constant, quae & simili aci lani absorbent, & per consequens fluiditatem sanguini restituant, non negligenda sunt, in quae finem conducunt varia decocta ex rad. chim. Salsaparill. sem. anil. rad. liquor. vel potus Ther. vel Collee, quibus acidum peccans domabitur, rustici vero decoctum flor. sambuci cum albo gaceo cum lacte paratum assumant. In omnibus etiam Inflammationibus mirè juvant Salia volatilia debita in dosi exhibita, quoniam tales particulas obtinent, quae à subtili materia facile agitantur, & vulgo calida nominantur, quae & internè & externè symbolum suum conferunt, qualia sunt scordium, ruta, abrotanum, absinthium, saly. rosmarin. bacc. Juniper. lauri, sem. cumin. levisic. Camphora, Myrrha, Mastix, ~ vin. Camph. ~ ℞. calces vivae, flor. Sambuc. Camphora, Matricalis, &c. Sic & hic maximam opem afferunt Salia volatilia oleosa, quae tales poros habent, quos materia subtilis facillime perfluit. Motus iste, quo sal ille movetur, iterum cutis poros penetrat, eundemque motum particulis obstruentibus adiit, & sic dissolutio peragitur. Ex sale enim volatili oleoso internè & externè exhibitio tumorum inflammationum detumefactum saepius observavimus, & si dolor simul maxime urgeat, tutissimè R. anodyn. nostra c. ~ C. C. volatili circa vespeream propinari potest. Anodyna enim commode cum sudoriferis miscentur, viscositate enim sua acutos salum angulos obtundunt, itaque:

℞. Theriac. rec. ℥ij.  
 Discord. f. ℥j.  
 Sui Diaph. gr. xv.  
 Salia prunell. gr. v.  
 Theriac. cal. gr. j.

M.

Febris curandae ratio consistit in reductione massae sanguinis ad pristinam mixturam, quod optime per sudorifera fixiora, ut regul. ℥ii, bezoard. miner. &c. perficitur. In Inflammationis augmento tentetur attenuatio stagnantis incassatae, non debite mixtae & agitatae materiae, introdu-

cendo particulas fluidas & las, & effluvia oleosa subtilissima (non crassa, ranosa, quibus porus magis contractis, malum potius augetur) spiritulosa, salina, volatilia, (aliquando & acida tenuissima, si viscositas sit iniquenda:) quibus inhibetur effectus acutarum imprimis aciditatum scindendum, particulae inherentes rigide & poris elucuntur, praepremis à lubricis facili se in- & extricantibus, materia coagulata fluidior debite mixta & agitata redditur, immò & tubuli laxantur, & ad hanc sufficienter admittendam convenienter disponuntur, quo ipso discutitur tumor, sique legitima restitutio. Applicatur indicata remedia optime sub forma foris externi vel cataplasmati calide usurpandi, multum enim contribuit calor actualis. Cura ergo inflammationis perfici debet, non, uti veteres solebant, repellentibus, adstringentibus, & resistentibus, quae tantum obstructions tubulorum augment, qui subtilioribus evanescentibus particulis aciores reddit, fibras & tubulos discludunt vel rumpunt, unde aucta obstruente major supervenit tumor, & ad gangrenam via redditur magis expedita. Medis proinde obstrucentem hanc factam tollescalibus volatilibus aromaticis ac balsamicis, ex gr. ~ vin. Camph. item simpliciter rectificato, ut Cato vel crocato. ~ ℞. ci. c. ~ vini & Psarato, auxiliatur etiam vinum & cum vino factum lixivium, Decoct. cale. viv. cum ~ vin. Camph. & Matricali mixtum, sequenti pro usu ordinario nobis servamus.

℞. ∇ Ψ ℥ij.  
 ~ vin. Camph. crocat.  
 Matricali. aa. ℥j.

℞. vii ℥j.

M. D. ad vitrum, quod lineis duplicatis calide saepius applicetur. In Curatione Inflammationis solum ∇ calidum cum sapone venetæ proficuum fuisse observavimus, ut & insusum Ther. Suffumigia ex succino, mastiche, gum. animæ, oliban. saepius instituta non negligenda sunt, vel Epithemata ex scordio. card. bened. absynth. ruta cum quatuor salsis in urina, vel in sero lactis vel in lixivio, vel cum proprio decocto saepius tepide applicata, maxime juvant. Epithema sequens Phlegmoni maxime conveniet:

℞. Summis. ruta  
 Scordii aa. Mj.  
 Rosmar. Mib.  
 Absynth.  
 Alii aa. Mj.

Sem. cumin.  
 Carvi  
 Foenicul. aa. ℥ss.

℞. Cri  
 Scia aa. ℥ss in vin. solut.  
 Spir. vin. rectif. ℥ij.

Extrahe in MB. l.a. Ra.

℞. Hujus Tinct. Phlegmonica ℥ij.  
 Camphor. ℥ij.  
 ~ ℞. ci. ℥j.  
 Sperm. ceti ℥ss.

M. & applicetur calide cum lineis. Cataplasmata enim Nobis magis arident, imprimis sequens vel simile.

℞. Herb. ruta  
 Scordii  
 Absynth. aa. Mib.

Puls.

*Pulv. rad. bryon 3ß. 3ij.*

*Fl. sambuc.*

*Chamomill. aa. Mß.*

*Farin. lupinor. 3j.*

*bucc. lauri 3x.*

*Coq. ad consistent. pulvis mollis, add. ~*

*Θ xci e. cald. vivo. parat 3ij.*

*M.* calide applicandum & bis vel ter in die repetendum. Tinctura myrrhae, aloës, croci, inacis, nec non sinapi, allium, capsa, tabacum &c. quæ in se continent vel volatile ac aromaticum maxime proficua erunt externe applicata. Cum verò vulgus inflammationibus abhorreat à madidum spirituosum, tum cataplasmatibus, hinc ægræ sicca expostulant, in quem finem ex supradictis herbis fl. sambuc. aliisque aromaticis, adjectis *Θlis Q* & *xci* Camphor. &c. sacculi repleti & calide applicari queunt, hæc enim omnia acidum temperant, invertunt ac absorbent, alii farinam vel cretam cum floribus sambuci & cort. inter sambuc. applicant: alia volatilia oleoſa applicari possunt, ut & diascordium & Theriaca, quæ juvant novos inducendo motus. Pars quoque inflammata foveatur crebrius decocto *Æris* cum urinâ, conducitque succus cancerorum fluviatiliū calidè impositus & renovatus. Excellit insuper decoctum ex blandis diaphoreticis ac aromaticis cum spir. vini Camph & *▽* Regin. Hungar. Ad partem etiam fovendam egregium est decoctum Rad. bryoniæ in vino, vel si in eodem decoquantur plantæ aromaticæ, veluti rad. ireos nostr. rosmarin. menth. scord. &c. prodest quoque lixivium sequens vel simile:

*℞. Ciner. Sarmet. vii.*

*Qli aa. 3ij.*

*Θ Q 3ij.*

*cum vino gallic. &*

*▽ fl. sambuc. fl. a.*

*lixivium calide*

*sepius applicand.*

Aliquando & emplastra prore nata applicari possunt, modo non nimis emplastica fuerint, & præ aliis confect. Empl. de Labdano, vel de Cinnabari nostrum, vel diaspulph. vel Empl. de sperm. ceti cum camphora & croco. Melius verò juvat Epithema sequens vel simile.

*℞. Facis cerevis 3v.*

*Θ Qri 3iß.*

*Camphor. 3j.*

*M.* & calide cum linteis applicetur. In Inflammatione semper eò respiciendum est, ne medicamenta nimis sint calida; nam sicuti ignis nimio suo calore res corrumpit ac discindit, ita & fibras plurimas ejusmodi remedia calidiora dirumpunt, ac discindunt, imò in cincinnos abire faciunt, medio ergò tutissimus ibis, quod juniores Medici apprimè notare velim. Ab omni- bus quoque acidis in Inflammationibus abstinendum est; si motus sanguinis nimius est, venæsectionem admittimus, ut & Enemata, imprimis ubi dolor urget. Lac virginis sunt qui calide imponunt, sed videndum ne in vulnus ponatur, quia interdum constat acidis, hinc paribus vicinis tantum imponunt. Si autem pori tam pertinaciter sint obstructi, ut tam subtilibus nolint auscultare, nec se incidi patiuntur, & sic Inflammatio discuti nequeat, suppuratio iisdem remediis procurari potest, solis enim acaliciis & volatilibus tota res perficitur; si enim obstructio partis inflammatae talis existat, ut obstructæ fibræ pe-

nitis rumpantur, particulæ chylosæ effundantur & puris materiam præbeant, tunc suppuratio ac maturatio promovenda est; quibus maturantibus sc. remediis externis pori magis obstruuntur, quâ obstructione factâ interior promoveretur fermentatio, ac proinde ruptis tubulis materia extravasata, quæ in illis stagnabat, in unum focum colligitur, & pus constituit; quæ suppurantia ex viscosis, piugibus mollibus efficiuntur. Post maturationem pus emittitur, ulcus detergatur ac consolidetur, ceu inferius de Abscessu prolixius percipiemus.

Qui sanguinis circulationem norunt à repellentibus, incrassantibus faciliè abstinerebunt, cum sciant particulâs inhærentes non posse per arterias regredi, omniaque acida & austera valde nocere, hinc & repellentia. quæ talibus constant particulis, angue pejus ceu dictum, congiunt, cum acida, ut notissimum, omnes nostros succos coagulent, & conspiciunt potius quàm dissolvant vel repellant. Malè verò faciunt, qui ejusmodi remedia applicant supra partem affectam, frustra impedituri, ne materia ad partem ruat, cum hæc omnia ex ignorantia circulationis sanguinis procedant. Si sanguis hic nimium premens dolorem infert & Inflammationem augeat, quando scilicet plus sanguinis circa partem inflammatam colligitur, quam venæ absorbere possint, & simul ex illâ vehementi pressione membranæ ac vasa extenduntur, & sic fibræ minantur rupturam, hoc in casu V. S. institui potest, ut nimium sanguinis cursum moderemus, & interponenda sunt temperantia, aliâs V. S. plus obest quàm prodest. V. S. enim non in evadendum derivationem sanguinis à parte affecta, cum circulatione detecta sanguinem per partem affectam circulari clarissimum sit, sed V. S. hoc in casu hoc præstabit, quod sanguinis impetum & copiam diminuat, unde arteriarum valvorumque latera collabuntur, porisque eorum minus parvis factis, tanta humorum tractio & pressio fieri non potest, & præcaveatur, quo minus per pressionem à tergo frequentem vel profundiores emergant obstructions, vel ipsarum fibrarum ruptiones. Suffumigia etiam, ceu iam diximus, instituantur, quæ sola sæpè laudabilem præstiterunt effectum, ex pulv. fumal. usitato, additis sabina, tabaco, scordio, roremarino, thure, mastiche, aliisque pluribus.

In Statu Inflammationis, quando vasa à contentâ materiâ modò sunt erosa, vel ubi erosio impediri nequit, & adsum ardor, rubor, tumor, pulsatio, dolor, (phænomenis hæc humoris qualitatem, partem affectam, morbi que statum indicantibus, ut id in tendinis à puncturâ Inflammatione manifestissimum est,) agitatioque particularum modicè adaugenda (non sistenda, ne gangrena suborsatur:) similibus aut fortioribus, quàm in discussione adhibendis, quibus dum maturatio (ut ajunt) seu erosio & fluiditas sunt promota, cutis aperitur, proditque *Exulceratio*; quæ pro sui diversitate, vel curationem vix admittit, vel diversimodè curatur, temperando pus, five materiam, eamque educendo, & quicquid accretionem à ramolis, viscosis, &c. inquantibus se & adherentibus (secundum cursum fluidi,) filamentis tubulorum impedit, auovendo, interne ob intemperiem acrem, vel aliam causam, non bene constitutum sanguinem corri-

corrigentibus: Externè remediis acce quodcunque temperantibus & propterea merito suo appellandis mundificantibus. Tumor quoque Inflammationi adjunctus est durus & nodulus, qui vel discutendus vel maturandus est, in quem finem seq. Emplastum conducit.

℞. *Empl. diaphor. M.*  
de *Ammoniac. For. aa. ʒj.*  
Ol. ʒ. *de sili. nigr. ʒj. M.*

*Curatio Abscessus.*

*Ascessum* cum consideraverimus, vel ut fientem, vel ut factam, duplex etiam instituenda est eius curatio. Ubi primum enim videmus Inflammationem diaphoreticis & resolventibus nequam obtemperare, quamvis omnes ad suppurationem materiz stagnantis promovendam statim confugiant; melius tamen agemus, si quamprimum discutiamus ac Inflammationem ritè curemus, omisissis repellentibus omnibus adstringentibus ac refrigerantibus, cogitationes unice in obstructionem impendentes, cui scopo inserviunt sepius dicta olea volatilia, aromatica, balsamica. tum interna, tum externa, v. gr. ~ vin. Camph. Balsam. Nervin ~ catarrhalis n. d. volatilis, cephal. volat. arthrit. balsam. lithiat. ~ *℞.* ci arom. cum ʒ. calc. viv. Suffragia Sal. volat. oleos. &c. quorum plura superius in Inflammatione enumeravimus. Oleola & pinguis angue pejus vitentur, emollientibus & resolventibus, is que in lacte coctis utendum, quapropter alius vulverem nostrum dissolvemtem, vel Empl. de Cumino in Belgio multo ulrà receptum imponatur. Alii Empl. de meliloto malaxat, cum oleo lil. alb. jam in acutum tendenti tumori ac ad maturationem inclinati imponunt, plures Empl. de melilot. cum diachyl. miscent: Nos alius Empl. de Laidano hoc in casu præferimus. Inter reliqua eminet lac, in quo coctus fuerit Sapo Venetus, cuius dosis pro Inflammationis statu augebitur, aut imminuetur. Decoctum illud parti affectæ cum linteis multiplicatis appositum mirè maturat, & Abscessum aperit: in quem finem etiam ex variis emollientibus fl. chamomill. verbæ. melilot. sem. lini, farin. fecal. mell. vitell. ovor. &c. parari possunt varia cataplasmata ac linimenta calidè imponenda, quo præstantius sequenti vix ullum datur.

℞. *Herb. alb. Mij.*  
*Mentib. Mß.*  
*Fl. Chamomill.*  
*Melilot. aa. ʒij.*  
*Coq. in lact. dnic. lb. ʒ. in fine add.*  
*Mica panis alb.*  
*Farin. lini aa. ʒij.*  
*Ol. diapalm. ʒj.*  
*Vitell. ov. N. liij.*  
*aliquid croci.*  
*F. Cataplasma.*

tepidè applicandum. Quando verò nobis constat pus adesse in sufficienti quantitate, nec in suos canaliculos refluere posse ipsum eliminandum, & foras effundendum est, ne tubulus vel canaliculos plures discindat ac dilaceret, atque ampliorē foveam excaver. Circa Abscessus maturationis tempus cum gummatibus, &c. plurimum ætheris transmittentibus simulque cutis poros obcurantibus, quo intestina agitatio magis continuetur, applicandi. Aperitur dein *Abscessus* vel benignioribus, velut diachyl. cum sem. sinapi & sale, vel sequenti ruptorio nobis leni.

℞. *Mell. ʒß.*  
*Ferment. ʒij.*  
*Ocul. ʒß.*  
*℞ succin. v. gr. vj.*  
*Axung. lepor. ʒij.*

*M.*

vel ferro & cauterio potentiali. Pure evacuato, ulcus ab acido acri liberandum, sive ut vulgares loquuntur Chirurgi, mundificandum est, in quem finem plures utuntur succo apii, centaure. min. agrim. betonic. ablynth. aristoloch. charesol. virg. ʒ. vel eorundem decocto in ʒ. & vino, non verò turundis utendum, sed tantum plumaceolis, si pars non fuerit sensus delicatioris, affociatis rad. aristoloch. ʒ. gentian. ferrogul. dictamn. Omnem verò abiolunt paginam spir. vin. Caniph. ʒ. Regin. ʒ. Balsam. Aris terebinth. vel anifat. Ol. balsam. Peruv. bals. divin. spir. matric. &c. Probè sic purgato ulcere, chylus fiat balsamicus volatilis & duleis, ut parti appositus carni generaret, cui scopo inserviunt pomphol. lithargyr. cerull. ʒ. hni. pulv. aristol. long. ʒ. laca & Onofa eximia etiam sunt balsamica ac absorbentia. Producta carne esse cicatricem inducendam vulgo urgere solent, quod perficiunt exsiccantibus, contrahentibus, adstringentibus & densantibus, quibus tamen me iudice non opus est, quia correcto chilo ab ipso hoc ritè appposito, & ab aere defenso, omnia perfectè consolidantur. Si caro copiosius expulsetur, absumenda est catarrhetica, quæ tamen ita corrigenda est ac temperanda, ne magna nimis ab illis fiat absumptio, utimur hoc in casu aluminotis. ungu. *Egyptiaco* inspissato &c. sed corrigendum est acidum & abundantius serum abiolvendum, hinc & remedia internè in Abscessu adhibenda sunt, varia scilicet volatilia oleola, sal volat. nostr. oleosum, Elxir vitæ, ~ matric. volat. imò hic omnia viperina conducunt, Tinctur. viperin. Vigan. ʒ. niata quoque haud negligenda sunt, Tinct. nostr. ʒ. niata, ʒ. niatum diaphoret. Antihæst. Poter. impetis acidi abiolvenda, hinc sæpe solt suffragia oculi ʒ. in Abscessibus egregiam navantes operam, ut & cryllall. montan. Terr. Japon. &c. imò Balsamica hic enim implent paginam. Præ aliis autem commendamus ol. balsam. Peruvian. ritè cum alkali destillatum, vel Balsam. Chili Anglorum. Potiones quoque vulnerariz, item potus calidus Theæ vel Caffæ appropinquè conveniunt, quia sunt, diuretica, quæ magni ulus sunt, tum in Abscessibus internis, tum externis, ex variis vulnerariis parata, ex gr.

℞. ʒ. *Heder. terr.*  
*Agrim.*  
*Fum. aa. ʒij.*  
*R. Ocul. ʒß.*  
*Bellid. ʒij.*  
*Syr. dialth. F. ʒj.*

*M. F. Mixture* cocticatione assumenda. Ut curam *Sinus* paucis etiam attingamus, statim hic aperiendus est, & materia intus contenta evacuanda, dein expurganda venit cavitas spir. matric. ʒ. calc. viv. vel hord. in qua solum sit mel rosaceum, quo posteriore Galli cum fructu utuntur; & quoniam pellicula vel callus cavitatem illius obducentes carniū agglutinationem inhihent, ipsis auferendis opera danda est. Si in partibus carnosissimis sedem habuerit *Sinus*, totam ejus cavitatem dissecare expedit, at si fetrum

*Curatio Sinus*

# CAP. III. DE BUBONE & CARBUNCULO. 497

ad fundum usq; pervenire non valeat, intingendæ sunt circumdæ lapide caustico liquato & in Sinum immittendæ. Si verò Sinus angustia ferum nequaquam admiserit, hoc uti possumus remedio.

¶ Theriac. ven. in vitell. ov.

diffolut. 3j.

Pulv. Mastice.

Oliban.

Myrrh. aa. 3ij.

Ol. ros. q. s. f. digest. cui miscetur & præcipit. rubr. 3j. alum. ust. 3ij.

M. ad usum. Conducit quoque balsam.

¶ Hinc cum Camphora Sinui imponend. cum lintheis carpit, item confert oleum Gñi. Omnibus verò alis generosis præferimus Balsamum nostrum divinum, ob vires divinas ita à nobis nominatum, quo plures Sinus & hiliulas pro incurabilibus à Chirurgis habitas feliciter curavimus; testis est Chirurgus noster Castrensis, hujus n. balsami

guttulæ aliquot Sinui vel ulceri fistuloso immittantur egregio, & semper felici cum succellu. Ubi callus magnus adit, qui ferro abscindi nequit, sequens adhucendum est:

¶ & Sublimat. correct. 3j.

Op. ii. exsecat. 3b.

Excip. Tragacanth. & formetur trochisci, pisi magnitudine, qui Sinui immittantur, in eoque per 12. aut 24. horas retineantur. Si autem trochisel vehementius agant, opii dosis est augenda, Sinus anfractuosi ferro ad fundum usque, si locus incisioni detur, aperiendi, callosæque latera mitioribus vel fortioribus, prout res opus habet, catharticis auferenda, dein procedendum, ut in Simplici ulcere. Interna cura eò dirigenda est, ut intemperies acris sanguinis aliorumque Succorum corrigatur per aborbentia, sudorifera ac diuretica, superius de Abcessu satis dicta, quæ repetere non libet.

## CAPUT III.

### De Bubone & Anthrace, seu Carbunculo.

§. I.

**P**ROUT in Macrocosmo ardentes & flammantes observantur montes, ut sunt Aetna, Vesuvius, Ganapius, &c. Sic in Microcosmo aliquando tempestuosissimus sanguinis ac succorum confictus & ætus exurgit, unde sæpe ardentes oriuntur monticuli, h. e. Tumores inflammatorii, veluti montes flammivori, modo aperito igne conspicui magis, unde *Anthracum* fluxit nomen, modo occulto, quod in *Bubonibus* visendum est. Ut enim ipsi illi montes modo cæruleas fundunt & præcipitant flammæ, insignissimæ strage accolarum & vicinorum camporum, modo fumante solum tectro easdem sublimant; ita quoque in Tumoribus hæc ut plurimum malignis seres habet. Ut alluvie lucida continuæ, & motu maris perenni fomitem incendii præbent & suggerunt marini fluctus, commoventes Sulphur, ignis matricem: Parilem in modum unda microcosmi desumpta quali ad extimos parietes miasmata unctuosâ, crassiora. Salino-sulphurea, calore, rubore, dolore, per cuniculos elatos incendiû particulare afferentia. Terribilis est uterq; effectus, casus difficilis, & non paucis lethalis.

*Bubo* ab inguine, tanquam ut plurimum existente loco affecto, ita dictus, Tumor est inflammatorius occupans ut plurimum partes glandulosas, hinc potissimum glandulas inguinis, nonnunquam colli vel secus aures, unde parotides emergunt, de quibus supra de Auriuro Affectibus abunde egimus, nunc verò de Bubone in genere pauca dicturi sumus. Vocatur & aliis Tumor inflammatorius erysipelaceus.

Bubo dividitur vulgo in benignum vel simplicem, & malignum, hicque rursus in Venereum & Pestilentialem. Simples Bubones sunt pueris & adolescentibus familiares, unde & vulgo augmenti corporis indices habentur & dicuntur Germanis, *Wach-Drüsen*/ ab abundante sero ibidem stagnante quâcumque de causâ ob laborem, ærem frigidum &c. oborti tumores. Maligni vel pesti debentur, seu fructus & effectus, simulque indicium communissimum; vel lui venereæ, hinc venerei dicti, luen enim hanc comitantur, cum gonorrhæa à virulentâ alisque Symptomatibus, maximam acrimoniam, & viscolitatem feri, & inde obstructione enatam pertinacissimam notantibus.

Quod si *Philosophus* animus sit, ipsa notio melius Tyronibus patebit. Notat verò Bubo extra corpus humanum considerata avem feralem, quo de Poëta:

*Ignaveus Bubo, dirum mortalibus omen.*

Nostrò verò in foro tristis & feralis pestilens virus ut plurimum denotat, sic etiam, ceu diximus, Tumorem glandularum Inguinis benignum indicat. Sunt ergo Bubones Tumores glandularum maligni & dolorifici, in locis magis glandulosi corporis infecti erumpentes, à lymphâ aliisque succis acerbis corrosivis stagnantibus producti.

*Carbunculus* dicitur Latinis à Carbone, nti *Carbun-* Græcis *Anthrax* indigitatur; Carbunculi hi in *culm.*

definitis locis hinc inde palantes visuntur majori ardore & rubore infames, unde Anthrax Ulcus vocatur, crustam habens cum multâ partem circumiacentium Inflammatione. Dicitur hic affectus aliis ignis Periculis, quod Persis hi. solennis, ab *Avicenna* nuncupatur *Præma*, utin Carbo; Germanis dicitur, *Wilde Kugel* oder *eine Carundel-Blatter*/ sine *Præma* Gallis in *Charbon*. Describitur vulgò Carbunculus, quod sit exulceratio cum Inflammatione, aliquando cum ipsa peste conuncta, nonnunquam sine eâ, cum pustulis igneis ardentissimis febre & dolore acutissimo, variis in locis nonnunquam cum plerumq; absque Suppuratione prædictis latius in ambitu serpens, carnem exuens & vitæ veluti Ecliptico inultum relinquens, à stagnantibus acerbis corrosivis succis proveniens. Vel breviter describitur, quod carbunculus sit Tumor à succis acerbis rodentibus ac fermentantibus tubulos lacerantibus proveniens.

Nam ad classem potius Epilemiorum, quam Endemiorum Carbunculus referendus, an sit novus morbus, prout nonnulli somniant, iudicent Critici.

Differentia Bubonis & Anthracis ut plurimum in eo vertitur, ut Bubo occupet partes glandulosas, Anthrax ve extendit. usas.

§. 2. Subjectum huius affectuum sunt partes externæ corporis, non exclusi eum in metui, *Pa. aff.* has enim ahei posse, Experimentâ & ratione comprobatur *Paulus Bar.* etiam enim inquit *d. Feste* p. 415. Rarum admodum, etiam vetum, oculum

R e r

lum, nasum, ventriculorum, imò & intestina ipsa Carbunculo affici posse, absque ullâ curationis spe. De Carbunculo in cervice vesicæ suppressio- nem Urinæ, & tandem mortem inferente, confer eundem *Barbette* loco citato, & paulò inferius. Ut plurimum verò tendinosas corporis partes affici in Carbunculo omnibus notum est, hinc & dolor intensus semper adest. In Bubone verò partes glandulosas ut plurimum affici jam superius indigitavimus, glandulæ istæ corpora sunt rotunda, in quibus tria asterisco digna observantur: Primò, singulas glandulas arteriæ ramum recipere, qui ad illas sanguinem advehit, & ab ipsa proficisci venæ ramum, qui eam sanguinis portionem revehit. Secundo, ex singulis glandulis oriri Canalem, ex quo fluit liquor à sanguine diversus. Tertiò tandem glandularum compositionem duplicem esse, quædam tantum sunt fasciculus aut glomer vasculorum, quæ inutro conjuncta canalem efformant, per quem peculiaris liquor defluit: Illæ verò nihil aliud sunt, quam glandularum minimarum compages. Quibusdam in locis vesiculæ istæ sunt angulares, & inter earum cavitatem mutua conspiciuntur communicatio, ita ut illæ universæ in duas tresque desinant, quarum elongatio canalem, unde fluit liquor à sanguine differens, efficit. In aliquibus aliis locis ex vesiculæ sunt distinctæ, quarum unaquæque singularem canalem emittit. Glandulæ vesiculares sunt, quæ ex vesicularum con- gente solummodo constant. Si tria hæc attentâ mente consideraverimus, & ad eorum examen animum nostrum adjuverimus, nullo negotio glandularum detegetur textura. Arteriæ sangui- nem adferunt, qui irroratis vasculis vesiculisque glandularum retrograditur per venas, quæ ab ipsis exoriuntur. Deinceps glandulæ ex vascu- lis aut exiguis vesiculis liquore à sanguine diver- so repletis suis coagmentatæ. Sed quia hucus- que nullum oculis nostris occurrit vas, quod ali- quid ad glandulam afferat, præter arterias, quæ ad illam sanguinem apportant, jure merito cre- dere possumus, liquorum istum portionem sangui- nis arteriosi quandam esse, quæ ab eo separata fuit, vel à vasculis, vel à vesiculis, & quæ in ipso- rum cavitatem collecta est, unde fit, ut liquor ille semper à glandulâ effluat per canaliculum, qui ab ea proficiscitur, & quem canalem Excretori- um appellamus. Asserere quidem possumus, non solum diversos poros arteriarum glandula- rum non esse pares, verum etiam poros arteria- rum unius glandulæ ab similes esse poris alterius glandulæ, quod liquet eo, quod aliquoties exeat ab unâ glandulâ liquor plane discrepans à liquo- re qui ab alterâ effluit. Notandum deinceps de glandulis, quasdam apparere solitarias, & nulli alii connatas, nominantur ex glandulæ *congloba- ta*, quia considerantur ut globuli, qui liquorem à sanguine sepeant sequebantur.

Sed quando adest glandularum congeries, & universæ unicâ involvuntur tunica, & cuncta eorum vas excretoria in unum coeunt, atque hoc pacto canalem componunt, per quem fluit liquor, quem unanimiter à sanguine separatum existimant, *Glandulæ conglomerata* nuncupantur, quam verò distinctionem *B. Bonet* & *Amicus* noster, dum *ovverei, singulæ, & post busta colen- dæ*, non admittit, qui statuit, omnium liquorum separationes fieri ope glandularum, quæ nihil aliud sunt, quam textura minutissimorum cana-

liculorum, ex minutissimis arteriarum ramis, in quos sanguis nimis crassus non influit, sed tan- tum tenuis succus in tam exiles canales ingreditur. Separatio igitur humorum non per poros peragitur, sed per canales, qui magis apti sunt, quia succi facile ex parvis ductibus in minores intruduntur, & sic premuntur, donec à crasso san- guine & succo separantur. Ab aliis plerumque glandulæ conglomerata dicuntur *Vesiculares*, & ple- rumque conglobatæ vocantur *vesiculares*. Sed ali- quantum in gratiam Tyronum erimus in his pro- lixiores, ut eò melius parte affectâ sic explicatâ, causas & curationes horum affectuum intelligen- rent. In glandulis ergo conglobatis principaliter in inguinibus, & sub axillis prorumpere solent, quorum etiam pertinent Tonfillæ in summitati- bus faucium consistit, lympham deponentes ad humectandum, & lubricandum œsophagum pro- usu deglutitionis, & deglutitorum promotionis, in quibus tonfillis Bubonem observavimus ali- quoties. Dein etiam in collo, submento & prope aures potissimum, interdum in glandulis mam- marum erumpunt. Ut plurimum verò ceu jam sa- pius diximus, in inguine Bubones apparent, hinc à pluribus Pestis Bubonibus comitata *Lues In- guinaria* vocatur. In aliis quoque corporis parti- bus, præsertim in artubus, tales tumores oriri pos- sunt. Sic *D. Gieseler* *Obs. 172. de Peste Brunsv.* in Brachii sinistri medio muculo supra cubitum, Bubonem seu tumorem durum non admodum elatum, sed latum, indolentem & cui reliquæ concolorem, unaque similem sub *Mento* vidit. Sic etiam *P. Barbette* *Obs. 30.* mentionem injicit Bubonis pestilentialis, interius circa brachii sinistri articulum in musculi bicipitis tendini inhaeren- tis. Et *Zacutus Lusitanus* l. 3. *Prax. admirand.* *Obs. 39.* Bubones se observât ille scribit plures, et- jam in capite, nuca, humeris, thorace, umbilico, femore & tibia lethales, eo nomine refutatas à *Diemerbroekio* l. 1. *de Pest. 14.* *Zacutus* enim non magna fides adhibenda est, quoniam in pluribus excedit. Sed veritati semper studendum est, ne Tyrones decipiamus, & à viâ Regiæ declinemus. Carbunculi in omnibus verò corporis nostri par- tibus prorumpunt, non enim habent certa deter- minata loca, in quibus producuntur, sed indisci- minatim modò in collo, modò in abdomine, sa- pius in dorso, frequenter in cruribus, brachiis, pedibus, digitis, qualem Francothali tempore Pestis observavimus, imò in visceribus interio- ribus forsân fuisse abscessus, & non Bubones, ipsis tamen analogi.

§. 3. Quo quis melior in cognitione, eo felici- or erit in curatione, effatum est commune. Opus ergo est signis, quorum ope morbus inno- tescat, quapropter *Signa Diagnostica* Prognosti- cis præmittenda sunt, cum qualis sit morbus, & quæ ejus conditio, doceant. Bubo cum vel simplex sit, vel aliis quibusdam symptomatibus stipatus, utriusque cognitionem nobis comparabimus. Dig- noscitur autem simplex à tumore cum reniten- tiâ, rubore, dolore & febris levicula. Symptoniati- cus cognoscitur, si per se & nullo prægresso morbo oboriatur. Criticus vel ille dicitur, qui morbum alium sequitur, ærque ad ejus eruptionem levatur. Bubo malignus aut Pestilens percipitur tum ex eo, quod ipsius symptomatata sint vehe- mentiora, imò quæ ipsam Pestem comitari so- lent, tum quod vel in Febribus malignis vel sa- viente Peste exoritur, frequentius sub axillis



quàm in Inguine appareat. Bobo Venerus Inguina ut plurimum affligit, & in axillis rarissime videtur; ipsum venerum esse certò scimus, si agrotans cum impuro scorto se rem habuisse fateatur, reliquaque luis veneræ signa appareant. Bubones primò in conspectum dant ex albo rubicundi apparentes, dein brevi rubicundiores, redduntur ac splendidiore, imò sa pius fusci ac ex nigro rubicundi, ardore ac aestu summo præditi; plerumq; altius sub cutelate in glandulis, & in initio hinc inde protrudi possunt, verum statim magis magisque intumescunt, ac incrementum accipiunt, sicq; immobiles redduntur cum tensione, duritie ac velut solido nervo ad partes vicinas sæpe producto: notabile tamen est, aliquando citius oboriri Bubonem, ita ut vel occurrat ante febrem, interdum post eandem; nonnunquam etiam levius ferri, tum quoad totum, tum quoad ipsam partem affectam, quæ singula à diversitate succorum earumque stagnatione eveniunt, & ubivis probe discernenda.

Signa Diagnostica Anthracis sæpius infallibilia esse scribit *Barbette de Peste* p. 477. quia Anthrax seu Carbunculus diversà admodum specie se manifestat. Plerumque tamen, ubi Carbunculus fieri debet, adest pruritus, sequitur pustula major, vel plures minores milii seminis magnitudine & æcerimæ, quæ inde oriuntur, quod non dumtaxat rarius quidam magnus, ubi Anthrax prodit, sit obstructus, sed rari etiam minores, ex quibus pustulae itidem minores erumpunt, & vix conspiciuntur. Nec diu pustula speciem servant Anthracis, quin mox tumore durior in universà sui circumferentiâ ostendant, sicuti in sui medio & centro in ulcus exedens aperitur, quin iudicium numero quaquavertim ambulat, & vicinas partes mirè depalcunt, unde nonnunquam oculos inde excidisse *Sylvius* notavit. Sed & post curam non subinde contingentem, facie ac prægangens cicatrice remanent propter carnis multæ deperditionem. Caro omnis Anthracibus correpta mortificationem gangræne limini patitur. Aliquando verò absque pustula magna oritur Carbunculus, sed ulcus crustosum producit, quod fieri solet à candente ferro, cuius crusta modo nigricantis modo cinerei coloris est. Caro circumposita maxime ardet, & quidem circa vespèrum, & colorem habet nigriorem, quàm in Erysiplæte, & phlegmone. Crusta ablata non semper pus, sed caro aliqua spongiosa occurrit, quæ à lana parte relicto ulcero cavo, abiecit. Colorem pustulis his atropurpureum assignat *Barbette de Peste*, qui ibidem etiam albas pustulas non excludit, hisce prolatis verbis: *At sæpius non nisi pustula alba atque plana se exhibet, quæ pus bona nota continere videtur, compressa vero sicca omnino & dura notatur, profunde admodum subiectam carnem consumens*. Varia Carbunculeum malignum comitantur Symptomata, veluti febris, nausea, vomitus, palpitatio cordis, animi deliquium, delirium, convulsionem, anxietates præcordiorum, &c. ut jam dicta breviter connectamus: Manifestat se Carbunculus quâdam minori albicante pustula, interdum numerosis risque æcerimis & acutissimis doloribus ægros intellantiis, quibus propediem succedit ulcus crustosum, iis non abimile, quæ à ferro candente excitantur. Nonnunquam erumpit ulcus absque præcedente pustula, crutâ modo nigrâ, modo cinereâ obdu-

ctum, quæ sublata profundum apparet Ulcus, putridam carnem circumcirca depalcans & mortificans. Caro ipsi circumposita cum intensâ phlogosi, & ardore circa vespèram ingravescente, effervesceat, unde omnis Carbunculus circulo rubro est circumdatus, qui nihilominus aliquoties lividus est, aut cæruleus in Carbunculis malignis. quibus simul adiunguntur, febris, vomitus, inappetentia, palpitatio cordis, animi deliquia & deliria.

§. 4. Traditâ sic Diagnosti, restat ut causam Galenicam quoque subiungamus, & quidem priusquam notissimam aperiamus sententiam, aliorum Affectuum hocce explicandi rationem præferemus, inter quos ob vetustatem Galenicus primus conceditur vota sua proferendi locus. Hi verò Bubones glandularum inflammationem esse dicunt, quos abscessorios tumores in pestiferos, simplices & prodromos morbi Gallici dividunt. Bubonis pestiferi causam conjunctas duas esse contendunt. Efficacis nempe conjuncta est robur & vivacitas expultricis Facultatis ipsarum partium principalium, quæ expulsiō semper ab illis ad sua emundatoria fit. Causam materialem esse dicunt sanguinem quandam corruptum, & omnino propriâ naturâ privatum, & sæpe adeo alteratum & immutatum, ut à totâ substantiâ nature inimicus sit. Causam huius corruptionis esse ex æceris corruptione apert, qui attractus inficit spiritus & corrumpit sanguinem, atque sic Pestilentes Bubones à putredine quatuor humorum oriri contendunt. Bubonem autem simplicem nihil aliud esse, quàm glandularum inguinalium inflammationem, atque dicunt Hepar sæpe exonerare materiam vitiosam ad inguinâ.

Bubones verò Gallicos in inguinibus obortos, quamvis non noverit Antiquitas, hinc à nonnullis Angli vocantur, Codostella, Tincones & Panochie. Ut plurimum verò tumores hos Gallicos deducunt à materiâ frigidi transmissâ ab Hepate, sed accidit, ut aliquando calidâ portio miscetur, & scilicet dolor, rubor, caliditas apparet, & de isto Bubone venereo prænuunciat celestem & bonam inurationem.

Sanguine verò magis attrahibili existente, ubi sc. ebullit, & ad partem aliquam irruit, Carbunculus oriri asserunt, eosdemque produci apert Galenicis, ex quibusdam popularibus causis, imprimis malignis & pestiferis. Cum Anthrax conspicitur splendicans veluti pix & bitumen, hoc esse extra bile contentum; pestiferum Anthracem esse à materiâ venenatâ non dubitant; velicarum & pustularum in Carbunculis exortarum causam apert esse vapores ibi exhalantes. Alii sunt ex antiquitate, qui Carbunculos fieri autumat ex sanguine crasso & caletastro, alii ceu dictum, ex atrâ bile, h. e. ex massâ sanguinis crassâ vergente ad naturam atræ bilis, alii à putredine quatuor humorum.

§. 5. *Paracelsus* Bubo vel Bisfo est infectio ex Paracelsi duorum similium epimixtione proveniens, & rationem de causa Bubonis, ex tertio in Apollinea generationem, ac per salia luxuriosa tandem in Ulcerationem producta. Cum enim illa duo mineralia simul in matricem veniunt, inde juxta ipsam Aethorem generatur Bubo, tum ex accessione tertii sublequitur Bubo vitriolatus; & causam huius esse dicit, quod Iperma luxuriosius in acie sua infectum est. Anthrax verò ipsi Paracelsi est apollinea, quod ex Realgare Mercurii generatur, & in radice ve-

narum earundem oritur, postea sibi facit exitum, seu centro nihilominus in radice manente. Inde sequi, ait, unamquamque venam hujusmodi minerale Realgar continere. Quare quot venas tot Anthraxes contingere contendit, ut Anthrax salvetella, Anthrax mediana, cephalica &c. Est ergo ipsi Anthrax apostema per sanguinem ex venarum ejus primâ radice pulsus, uti communia cum emunctorio proprio, & est apostema radicale, quod oritur eo tempore quo mineralia venena solent apparere, similisque corruptio est ei, quæ sit in mineralium concavitatibus.

Intra Helmontium causam Bubonum ac Anthracum.

§. 6. Nunc etiam paucis de *Bubonibus* ac *Anthraxibus* audiamus *Helmontium nostrum*, qui *Bubonem* ac *Anthracem* aut *Escharam*, non esse materiam *Pestis* primitivam comprobat, sed effectum ac productum, quod *Pestis* sibi paravit. Negat etiam contra *Scholas*, *Bubones* ac *Anthraxes* pestilentes non nasci à putredine quatuor fictorum humorum, ut neque ex ætæris calore aut frigore, nec ex veneno aliquo abditatum causarum alimmo. Denique advertendum esse ait, quod cum *Tartarus cruoris* sive ultimæ digestionis vitiatæ scoria susceperit fermentum pestilens, non minus quàm cætera transmutata, privilegium habent exhalandi per poros, sive illa post se residua, sive reliquæ capite mortuo, nempe humores fuerint alimentarii, non autem si ipsa solidiorum substantia in *Escharam*, aut *Anthracem* sit ambusta. Quanquam autem *Tartarus cruoris* præfata quoque gaudeat prerogativa, quoties extra vitam *Oeconomiam*, ut infans est proscriptus: attamen dum in pus aut virus saniosum transmutatus est, pellem prius erodit in *Escharæ* speciem, quàm quod vapore tenus transluet. Idque scilicet ob impressam peregrini fermenti labem, qua degeneravit in transmutatum formale. At si odorem fermenti quidem hauserit *tartarus cruoris*, sed nondum sit transmutatus, sunt juxta Authorem nostrum *Glandule* & *Bubones*, quæ sudoris profluvio citra cutis apertionem non raro terminantur, ubi præfata illa nequeunt. *Bubones* venereos facile propagari posse, à sordida Meretrice: *Pestis* ideam facili Marte in glandulas protuberare ait: *Pestiferos* odores in stomacho paratos comitari sæpe *Bubones* in inguine scribit. Sic quoque Terroris imaginem in pelle solo nutu suo, tam diversa à se invicem producta eudere existimat author, qualia ipsi sunt *Anthraxes*, *Bubones*, *eschara*, *vehicula*, tumores ac *vibices*. *Anthraxum* causam à tale caustico vult deducendam.

Willisi opinio de causa Bubonis.

§. 7. *Willisi* opinio de causa *Bubonum* est sequens: dum proportionata subsistit principiorum sanguinis mixtura. motus ejusqueabilis permanet, & universis corporis partibus, quas lustratione continua perluit, succos tum ad vitam, tum ad nutritionem necessarios juxta mensurâ largitur. Sed si ab heterogeneæ cujusdam materiei adventu spiritus in motu suo perturbentur, sanguinem exagitant, & vehementes effervescentes in illo excitant, donec extraneum situm vel domitum, vel foras expulsum fuerit. Turgescit enim sanguis juxta mentem Authoris, quum scilicet irritantur spiritus à retentis fuliginibus, vel eorum penu à generosioribus alimentis locupletatur, vel à Sulphure copiosiori exaltato acciuntur. Tunc enim tumultuarie commovetur sanguineus latex vehementiusque ebullit, atque principiorum ejus solvitur, nec sanguis solus effervescit, eo vitio etiam

contaminantur succi, tum ab eo emanantes aut discedentes, tum ad illius appellentes, varique ex eorum discrasia exsurgunt affectus. Nulla autem cruoris massæ advenit extraordinaria effervescencia, à quâcumque excitata fuerit causa, quin ipsam subsequatur crassiorum, recrementariorumque particularum segregatio. & quò intensior durabiliorque fuerit fervor, eo copiosior fiat materię impuræ separatio, majorque atque auctior ejus coagulatio. In axillarum verò inguinumque glandulis deponitur nonnunquam vitiosa ista materia, ubi ad inmentem *Authoris* *Bubones* excitat, quia vasorum sanguiferorum tunniculis tenuissimis existentibus in illis, venæ impares sunt, sanguis illuc arteriis advecto facile promteque reportando. Ipse autem crassioribus coagulatisque particulis repletus vascula ista permeare non valens, in iis commoratur ac stagnat. Siccus quoque nutritius, cujus adenes receptaculum existunt, & per quas in vasa sanguifera transfunditur, in earum laxiori substantia coagulatas suas particulas deponit, quæ illarum poros adimplentes & obstruentes, cum sanguine jam aggregatis glandulam distendunt, & in tumorem *Bubonis* nomine insignitum elevat.

*Carunculum* verò *Author* dicit à *Miasmate* quodam veneno sanguinem cum acie subingreffo pendere, quia juxta *Ipsum* atomi isti perniciosi cruori permixti, spiritus ejus in motus inordinatos compellunt, partes sulphureas exaltant, febrilemque ebullitionem in eo concitant, partes verò sanguinis tali labe infestæ ab aliis deficient, & in glomulosos coagulantur. Sanguis enim perperam partes universas corporis pervagans, ad superficiem delatus, & in vasa capillaria propulsus in iis sistitur, glomulisque ipsi innatantibus in tenuioribus istis vasis hærentibus, viamque liquoris adventanti præcludentibus. Aggesta verò coagulata ista locum, in quo coeunt, extollunt, & tumorem in eo producant, qui sensim accrescit, à novæ peccantis materię accessu. Immanis autem ardor talenti tumorem commocens oritur, juxta Authorem, ab atroci illi deflagratione in sanguine productâ à spirituosius ejus particulis æstro percitis, & sulphur, summe evectis, à qua potior aquæ portio exhauritur, spiritusque & tenuiores sulphuris partes perpetim volantes dissipantur. Saltaque freno amplius nequaquam temperatur exalatur, spiritibusque ac sulphuri furibundis adjungitur: sed tandem principatum obtinens, & cum terra, crassioribusque quibusdam sulphureis associatis retortidam constituit massam, cujus particula congelata, & in tenuiora quædam vasa delata: in iis celsipiat, & locum, in quo nidulantur adurunt, exedantque; liquor nervosus, à tali contagio interemeratus nullo modo subsistit: quum enim à sanguine tanquam à scaturigine sua ortum ducat, venenata ista miasmata, qui ab ære in ipsum irreperant, in sinum suum suscipit, quibus infectus cerebrum nervosque partes subiens varios irregulares motus in iis parit.

§. 8. *Sylvius* triplicem *Bubonum* mentionem *Sylvio* apponit, pestilentialium nempe, venereorum, & non malignorum dictorum. *Bubonum* omnium causam ipse dicit sanguinem acrem ac viscidum, ob suam acrimoniam vel visciditatem, vel aliud vitium, in conglobatis, (non verò conglomeratis) glandulis hærentem, atque illas in tumorem attolentem, accedentibus pro

viti diversitate symptomatibus diversis. Ipse Author notat etiam, difficilius ad sui maturacionem deduci Bubones pestilentes quam alios, & dolorem ardoremque molestiorem habere ut plurimum comitem, ex ardore autem bilem biliosumque humorem, h. e. sale volatili constantem peccare iudicat. Si proinde in non-maligna dicta inflammatione acidum sanguinis tandem superat ejus amarum, hinc in maligna idem desiderari, & minus potens esse tunc acidum contendit. Hoc est, in malignis pestilentibusque Bubonibus sanguinem bile abundare magis quam decet, habere saltem ipsum acriorem, aut humorem sali volatili similem, & acri constantem, minus vero acidi continere.

Carbunculi.

Carbunculi autem causam Sylvius ab acri, vel ab acido, vel à salso lixivo deducit, & probat per id, quod à salso lixivo ardor rodens produciatur, cui id testantur cauteria potentialia cuti applicata, idem confirmat per butyrum Gñii, quod ardorem urentem ac rodentem cuti applicatum inducat. Butyro verò Gñii inesse acidum acre sal lixivum temperans, & infringens nullus dubitat. Concludit ergo, sal lixivum acre humorem, inexistens Carbunculos producere, hinc caro omnis Anthracibus correpta corruptionem, Gangraenae similem patitur, ad interectionem integramque mortificationem deducitur.

Causa est-  
essentia-  
spécies de  
causa Bu-  
bonis.

Cartesiani adscribunt Bubonum originem succo chyloso in glandulis conglobatis ab acido quodam, sive particulis quibusdam angularibus acutis in lymphâ existentibus coagulato, & propterea in iisdem stagnante, non modo ipsas glandulas, sed partes etiam vicinas distendunt, & tumorem cum dolore, rubore & pulsu, uti in ipsa inflammatione producenti, hic verò succus chyloso cum in glandulis hisce non adeo stultus, ut in aliis partibus, propterea bubones a jure non facile supputari.

Carbun-  
culi.

Carbunculorum causam non tantum obstructionem esse dicunt tubulorum in partibus quibusdam corporis nostri, sed materiam etiam, abs qua obstructio illa inducitur, particulis multis salis corrodentibus repletam esse, partes vicinas destruentibus & mortificantibus. Ejusmodi verò particulis acutis, sive salibus acidis corrosivis tempore pestis aërem abundare dicunt, quæ cum unâ cum aëre assiduò inspirantur, sanguinem non modo incassant, sed particulis etiam chyloso tenuissimis se insinuant, easdem ad similem redigant corrosivitatem; quapropter in extremitatibus arteriolarum subsistentes particulae istae chylosae corrumpuntur, atque à materia caelesti aliter, quam antea commotæ, angulis suis acutis fibras nerveas dissecando, non modo pruritum & inflammationem inferant, sed partes etiam vicinas destruant, mortificent, & hinc inde pustulas fulciant.

Nostri de  
causa ho-  
rum Affe-  
ctionum sen-  
tentia.

§. 10. *Not* ut in causam horum affectuum recensionem eo felicius provehamur, ponemus uterius, quæ ad harum inquisitionem solidiorem faciunt. Constat nempe vitam nostram fundari super circulatione sanguinis ac reliquorum succorum. Cum enim cor in corpore nostro sit instar antliae in machina Hydraulica existentis, hinc cor contractione sua sanguinem ex ventriculis suis in auriculas immittit. Sed quoniam arteriae sensum decreverunt, sanguis in eas injici nequit magno cum impetu, quin eas tumefaci-

at. Cum arteriae hoc modo tumant, ad pristinum redeunt statum fibrarum suarum elatere, & ea ratione partem sanguinis, quem acceperunt, cordis venis impendunt, ut æquilibrium inter sanguinem arteriosum, & venosum, servetur apprimè. Et eum iteratis vicibus sanguinem in arterias protrudat, ita etiam illæ extolli debent & sublidere iteratis vicibus. Motus istarum Pulvis vocatur, circa quem annotandum est, arteriarum dilatationem cordis contractionem concomitari, & arteriarum contractionem ejus dilatationi adjunctam esse. Nos cordi tantum tribuimus munus sanguinem in arterias compellendi, ipsumque præcipuum circulationis instrumentum existimamus. Iis, qui autumant, cor esse sanguificationis organon, permittendum est, incertiori inniti conjecturæ, ut alibi videre licet. Sic quoque lymphæ quæ constat partim ex succo nerveo, partim ex lacte, circulatur ex receptaculo lumbari in cor, & de corde in cerebrum, & sic iterum de partibus externis ad suum receptaculum. Sic & succus nerveus suam habet circulationem, quando ergo unus vel plures ex his succis subsistunt, fit morbus, imprimis vero serum cum sanguine aliquando & aëre indispicuntur in glandulis, hinc oriuntur tumores glandularum Bubones dicti, quorum causa proxima & immediata dicij potest obstructio angustiorum tubulorum, seu canaliculorum glandularum conglobatarum, sive stagnatio lymphæ in suis glandulis ichore secantis acris corrosivæ, à quâ extenduntur & rumpuntur tubuli & canaliculi, ex quibus major evalatur feri viscidioris quantitas, quæ dein stagnat, & hunc tumorem ob particulas aciores conjunctas igneum excitat, hinc & membranae maxime premuntur & extenduntur, unde dolor iste vehemens. Cùmque sanguis cum lymphâ in Peste sæpe maxime corrosivus existat, tantum abest, ut promptè fecerit & revehi amet, ut potius in minutissimis canaliculis glandularum coaguletur, stagnetque, & acribus scindentibus triangularibus suis particulis salinis se insinnet, unde tumor, dolor & ardor ingens seu Bubo excitatur.

Illustrati hæc possunt non solum exemplo Bubonum simplicium benignorum, & venereorum, & pestilentium malignorum, in quibus diversis saltem & remissioribus gradibus causarum, stagnatio consimilis observatur. In morbis & febribus sunt hi tumores per congestionem, dum particulae hæ viscidæ acres malitæ sanguinæ ex volatili acris corrupto oriundæ coagulantur, circa vasa capillaria, & dum sanguini vias intercludunt. Inflammationem talem cum tumore constituunt, tubuli enim glandularum conglobatarum imprimis in Inguine existentium apprimè nati & fabricati sunt, ad ejusmodi tumorem producendum, quod si imprimis circa inguina contingat talis tumor, Bubo tum vocatur. Causa ergo Bubonis est, uti antea jam meminimus, obstructio angustiorum tubulorum glandularum conglobatarum, in quibus is exoritur, à succis quibuscumque crassissimos opplentibus. Febris, quæ Bubonem comitari solet, designat sanguinis particularum dispositionem esse turbatam, ejusque motum esse inordinatum, & in illo fermentationem quandam fuisse excitatam, nulla autem quæ fieri potest in stagnatione succorum ab acidorum cum alcalicis miscelâ, impeditoque libero materię ætheræ

Rit 3 commune.

commeatu. Si enim acidorum penuriam quādam ex se vulgo dictis non naturalibus rebus adactum sit, vel si dissipatis in diuturniori eoque acuto quodam morbo ad maximam partem volatilibus alcalicis, acida imperio potiantur alcalicorum in sanguine subsistentium, poris ab acidis occupantur, sulphuræque ab illis coagulatur, à quibus in tubulos delatis emergit obstructio. Materia ætherea, quæ antelalcalicorum poros absque impedimento permeabat, ab illis acidis oppletis reflectitur, & in sanguinem repellitur, quem vehementius turbat & exagitat, donec vel acida abalcalicorum poris abegrit, vel ipsa alcalia contriverit, partiumque atque earum pororum dispositionem immutavit, adeo ut rectè tendere possit. Sed si acida duriora fuerint altiusque alcalicis infixæ, irriti fiunt materię subtilis conatus, nec penes ipsam est liberam sibi sternere viam. Ex acida illa igitur acidorum cum alcalicis unione exsurgunt salia, quæ cum sanguine in angustis, & à Sulphuribus coagulatis jam obstructos glandularum inguinum aut axillarum tubulos delata, in iis cespitant, & retinentur, particulæ ejusdem ordinis partes hæc indefinenter attingentes, nec ulterius progredi valentes, prioribus ad unguntur, tumoremque conervatione adaugent: qui durior fit, particulis salinis materię ætheræ continuo impetu in ipsas impetient, obstitentibus, ab illa arctius conjunctis, & unitis, comminutisque hac ratione, & expressis phlegmatis ac foras expulsi.

*Causa maligna seu Pestilentis Bubonis.*

Febres malignas, Pestilenciales, & Pestem ipsam per gradus tantum inter se differre jure statuunt Medici, illasque ab eadem causâ, cujus effectus variant, juxta intensiores vel remissiores ejus vires produci fatentur. Præmissis igitur aliorum placitis, existimamus supra dictos morbos produci, à particulis quibusdam duris, rigidis, acutis & scindentibus arsenicæ audientibus, quæ è terræ fodinis in aerem elevatæ, & cum ipso in sanguinem reliquosque succos usque penetrantibus alcalicorum poros subeunt, usque infinguntur, sulphuræque coagulant, à coagulatis Sulphuribus obturantur canaliculis, & impeditur sanguinis ac reliquorum succorum circulatio, ab alcalicorum poris ab acidis occupatis reflectitur materia subtilis, quæ in sanguinem repulsa violentas in eo excitat turbas, vehementissimæque conamine particulas illas salinas ex acidorum arsenicalium, cum sanguinis alcalicis coactis protrudit, validissimæque impetu in reliquas sanguinis & succorum particulas, & partium fibrillas compellit: illæ vero angustis duris & acutis donatæ occurrentes sanguinis particulas atterunt, & comminunt, fibrillasque partium violentius lancinant & convellunt: nec à sanguinis phlegmatis attemperari possunt propter eam, quæ pollet, duritiem & rigiditatem, à quibus potius phlegmata viscida incidunt & attenuant, pauca quoque ex acidis istis arsenicalibus quæ sanguini sunt permixta, in Sulphurum ramis implicantur, quia cum Sulphura particulis mollibus sint donata, acidorum duritiæ & rigiditati resistere nequeunt, atque ab iis scinduntur ac minutim secantur, unde fit, ut Bubonis maligni aut pestilentis Symptomata atrociora multum sint simplicis Symptomatibus. Certum enim est, quando coagulatus sanguis è corde hanc vel illam arteriam obstruit, Anthracis gigni, quæ nihil aliud sunt, quàm gangrænæ & sphaceli, cum enim

sanguis coagulatus ibidem in parte aliqua stagnat, acidum illud acre seu serum acre à sanguine secedit, sicuti serum à lacte, h. e. motu pristino circulari denegato materię subtilis alio modo particulas illas disponit, adeo ut quædam magis ab aere, aliæ minus premantur, habet se vero istud acre, ac si parti elcharoticum fuerit impostum.

Veneri verò Bubonis causa ut plurimum est acidum acre, à pure ulciculorum in mulieris pudendis excavatorum elevatum, & viri urethra ac balano exceptum; quod valorum sanguinis tunicas penetrans illius matris immiscetur, quædam ex illius alcalicis saturat, & quædam Sulphura coagulat, quæ in inguinum & axillarum glandulas cum sanguine circulate advecta, in illarum angustioribus tubulis commorantur, sanguinique affluenti, & materię ætheræ adveniēti sunt impedimento.

Bubo ergo (qui pro pestilentiali ob subjectum Carbunculum intelligendus videtur, visque sine ipsius Pestis expositione sufficienter exponitur) est particularis inflammatio, orta ex obstructione tubulorum angustiorum varique intortorum, in glandulis parotis dum vel axillarum, vel inguinalibus, à secedentibus ex cæterorum contubernio, particulis quibusdam imprimis acutis irregulari figura &c. (ob dissolutum nexum & unionem particularum sanguinem & humores confluentium, vel terrore, & imaginatione, rejecto veneno omni contagioso pestifero speciatim sic dicto, à particulis pestiferis corrosivis & in consueto ab eis, vel cum iisdem adducto æthere:) hærentibus & viscidis, quæ hic ordinariè cum lymphâ secerantur, involutis, hinc veneni pestilentialis corrosiva vis hic non tam effiçax, quàm ubi in glandulis & tubulis cutis vastantem ob diversum diametrum, &c. liquorem continentibus exigua, vel pluribus exilibus pustulis (inflammatione ad suppurationem vergente,) se prodens, non ita irreita, circumvicinorum tubulorum, & subjectorum musculorum filamenta dissecans, efficit, ut iis in cincinnos resistentibus, omnemque humoris adventum, vel transitum denegantibus omnino gangræna, si non perfectus sphacelus, producat.

Carbunculi & Bubones à congenere, h. e. eadem ferè ac Bubonis materia, excitantur, & eadem est earum causa, duoque isti tumores in eo tantum inter se differunt, quòd in Carbunculo materia acrior ardentiorque sit quam in Bubone, & non tantum in glandulosis, sed etiam aliis & variis corporis partibus decumbat. Materia verò Bubonem excitans ut plurimum in inguinum axillarumque glandulis stabulatur. Novimus enim primo, Bubones in glandulis sub axillis, postea aures, aut in Bubonibus sic dictis glandulis produci: notum etiam est genuinis Medicis, non verò lippis & tonsoribus, glandulas constare ex tenuioribus arteriarum canaliculis variè inter se contortis. Oriuntur quoque Bubones hi, quando succi sanguinis nostri male sint commixti, ut fieri solet tempore malignitatis, hinc succi illi per glandulas transire nequeunt, sed in iis manent, ac obstructionem inferunt, quia partem affectam continuo motu discindunt, palpitatio quoque ob arteriam convulsivè affectam percipitur postea, sed tardè ad suppurationem tendit. Ex hac distinctione clare patet, Carbunculi seu Anthracis causam esse particulas san-

*Causa Bubonis Venerei.*

*Causa Carbunculi Anthracis.*

guinis ac succorum corporis nostri secedentes aciores, ac corollivas circa partem quandam exteriorem sibi cavitatem parantes, & tubulos quoscunque corrodentes: & huc referri possunt omnia ea quæ superius de Bubonibus imprimis pestilentibus ac malignis diximus.

*Prognosis  
Buboni.*

§. 11. Cum Signa *Prognostica* Medico magnam famam, si rectè prædixerit, ingens verò vituperium, si secus fecerit, conciliare possint, merito in eo totus esse debet, ut hac in parte, quantum per vices licet, studium suum colloct & cautius dubitat mercari, si aequoret. Curatio *Bubonis* dubia est, si tardius maturetur, quàm in fistulas abeat periculosas, ceu, dum hæc scribo, in Rustico in proximo pago Hohenkirchen habitante observavi, cui neglecto Bubone in inguine in fistulam abiit, ex quâ excrementa liquida continuo effluebant, crassioribus verò per anum. Nisi quoque Bubo Veneris citò curretur, vel si materia illius acrior fuerit, & succedaneam habeat luem Venerem, inasus impendit periculum à maligno ac pestilenti, quàm à simplici, & si negligatur ejus cura, vel si materia vehementioris fuerit acrimoniæ, partis gangræna, ossium subsecutorum caries, imò & ipsa mors subsequi potest. Bubo siquidem affectus est periculosissimus, imprimis in inguine, quod sequens confirmat historia: hic enim Castellis ancilla in inguine prope pudenda, & quidem dextro latere, maximum sensit dolorem, quem sequebatur Bubo, quem autem ancilla ob pudorem neglexit, tandem ob acrimoniæ succorum intus contentorum tubulos omnes corrodentium rumpebatur, ex quo prodibant citidem excrementa, (per alvum excrementa) foetida cum flatibus, quare Chirurgus, & quidem non malè, suspicabatur intestinorum exulcerationem, etenim non solum hæc, sed & peritonæum, pudenda usque ad coxendicem cumnervis & musculis sphecelata & putrida observata fuere: adhibitis tùm internis tùm externis remediis optimis, septimo die morbi prunella alba à Chirurgo sic dicta, accidit, ut & hæmorrhagia ex gangræniosa parte exorta fit adeo vehemens, ut undecimo die circa horam nonam matutinam animam Creatori suo placide reddiderit. Cadavere dissecto repertum fuit intestinum jejunum ad magnitudinem nucis juglandis corrolum ac pertusum, reliqua etiam penitus fuere corrupta. Non tamen semper adeo periculosus affectus hic existit, aliam enim novimus 20. annorum filiam Bubone in dextro coxendicis latere laborantem, ex quo maturato excrementa foetida non duntaxat prodiebat, sed & in appositis Emplastis crudi reperiebantur cibi, quem felicissimè curavit Chirurgus noster aulicus Dn. *Johannes Murtliet*, & quidem intra 8. hebdomadarum spatium: idem & alium curavit militem eodem affectu laborantem. Dicit etiam Hippocrates Medicorum Principes, qui ex offensivibus aut aliis ulceribus aut doloribus proveniunt Bubones, extra periculum sunt: qui verò ex febris (quæ sanè maxime in Peste coincidere solent): pessimi existunt, sive juxta femur, sive sub alis, aut ad collum enati fuerint. Periculum item ex ætate, regione & viribus desumendum esse existimamus, quia delicatulis, item regionibus calidissimis inhabitantibus ac debilibus majus periculum denotat, quàm adultis, regionem incolentibus temperatam tam acrobustis. Maximum item periculum ex-

oriri solet, si ægri Bubones negligant, & nec internis nec externis utantur Topicis, sed soli suæ dextræ naturæ curandos relinquunt. In pestilentibus Bubonibus non levem promittunt spem, quando vires constant, & medicamenta optima non revomunt ægrotantes, sed per sudorem eliminantur, & sic ad emunctoria sua vulgo sic dicta, v.g. sub axillis, prope aures, vel inguimibus, ubi glandularum adest copia; sic & quo citius Bubones apparent, iique constantes, ut minus retrocedant, ac perfectam acquirant maturitatem, eo minus mortis incurrunt periculum ægrotantes; si verò maligniores sunt, citum etiam interitum inferunt. Observantur tamen Bubones ad chronicorum morborum naturam desecere, quando morbo ipso principali jam quiescente aliter saepe septimanas horum consolidatio ob *carceribus* succorum producit, adeoque quæ de abscessibus in universum traduntur in Scholis Medicis, illa possunt intelligi de Bubonibus. Bonus nempe est, qui maturè erumpit, imprimis in inguine, si colore vivido conspicuus est, hinc optime dicit Senex noster: Tubercula extra exuberantia & acuta, & fastigiata, & æqualiter maturascentia, & non obdura, & deorsum vergentia, & non bifida, meliora; contraria verò mala, & quânto plus contraria, pessima. *l. 6. Epid. f. 1. r. 29.* conferri etiam potest *5. Aph. 65. & 67.* Sic vires prostrata, vomitus tum Medicamentorum, tum alumpromptor frequens & continuus, faciei partes subito immutatae & cadaverosæ, hypochondriæ saepe recurrentes, convulsiones, delirium exteriora frigida, interiora calida, alvi dejectiones nimis copiosæ ac diversæ coloris, atræ nempe & ad lividum tendentes, ut & urinæ scædæ ac nigricantes, denotant mortem in olla esse. Sic etiam non absque mortis periculo apparent Bubones in collo & ad aures, cum dolore gutturæ, ac summa deglutendi difficultate conjuncti, de quo tumore egimus superius, de œsophagi tumore, quò Lectorem remittimus. *Parasels. 21. c. 30.* ait de Bubone: Lethale est, tumores repente augeri, & furenti veluti impetu ad debitam magnitudinem pervenisse, summæque omnia doloris, tumoris ac ardoris accidentia subito & momento habuisse. Si Bubones circulum quandam instar iridis habeant, vel si sint lividi ac nigri, mortis sunt prodromi, sed & hæc signa in malignis saepe infida sunt, id quod Autores plures norunt; moriuntur enim non rarò, & quibus rubicundi sunt Bubones, & quibus erodemati, aut cuti concolores, tanta est hujus morbi fallacia. Pessimi quoque omnis signum habetur Bubonum cita evanescencia; Maligniora sunt, inquit Hippocrates *l. 2. Epid. f. 3. r. 136.* qui de repente disparent: item, quando impositum vesicatorium intra 8. vel decem horas nullas plane vesicas excitat, vel humiditate scædet, ægrum in summo versari periculo, certissimum. Hinc quoque periculosiores sunt illi, qui sub axillis & in collo apparent, quàm qui in inguine, ex metu suffocationis. Pessimum est, si locis Bubonum ordinatis Carbunculi, vice eorundem tenentes, occupant. Modus eventus Bubonis cum aliis tumoribus communis est, solent enim terminari vel per discussionem paulatim, neque enim semper in ulcus degenerant, sed saepe per se evanescere solent, sive materia sit paucæ & tenuior, sive per uberes sudores alio verò, ut suo quasi nutrimento privatus tumor excrecere minus possit, & medica-



medicamentis Bezoardicis discutiatur, & in auras exsolvatur, id quod sæpe lentè accidit, prout apparet ex *Barbette Observ.* 4. quatuor sc. septimanarum spatio, vel quod ordinariū est, per suppurationem materię in pus versā, quod eidem genio Succī vel humoris non adeo acris vel maligni est conveniens; vel per necrosin, corruptionem, vel per indurationem, quimodi pessimi sunt, & plurimū lethales.

*Progressus  
Carbunculi.*

*Carbunculorum* curatio ferè nulla expectanda est, si mox evanescant, qui erubuerunt; diffillina, si post febrem pestilentem erumpat anthrax, & quæ ac si niger in emunctoriis, ac prope membra nobiliora prodeat; facilius est ejus cura, si autē febrem pestilentem apparuerit, uti & eorum, qui rubicundi, parvi & soli exoriuntur. Tumorem hunc inflammatorium, Carbunculum dictum, esse valde periculosum, suo etiā exemplo probavit *Consilientius Copronymus Imperator*, qui ex Carbunculo pedi inharrente mortuus est, ut refert *Zuvingerus in Theatro suo vite Humani*, vol. 2. l. 7. p. 326. Atrocitatem affectūs hujus optime cognovit *Quintus Serenus Sammonius*, scribens c. 38.

*Horrendus magis est, peritit qui corpora Carbo,  
Urit hic inclusus, vitalia rumpit acerbus.*

Affectus hic imprimis pestilens, inter acutissimos à Medicis refertur, cū brevi aegris mortem affert. Unde *Quintus Serenus Sammonius* ait, vix ad 7. dies produci posse vitam infecti hoc affectu. Qui in membranis aut nervis sunt, non tantū dolorem maximum inferunt, sed & diutius permanent, ut etiā inflammationes Erysipelatosæ ipsis fiant: non paucis autem ad suppurationem convertuntur, plerisque etiā febres adfunt. Periculosiores sunt Carbunculi interni quàm externi. Omnes Carbunculi qui occupant partes nervosas ac membranaceas, plus periculi, ceu diximus, aliut, quam qui occupant partes carnosas, hinc & pessimi moris habentur, quā in emunctoriis, & glandulis prope membranabilia & principalia extuberant. Periculosos valde est Carbunculus, qui niger, quia maximam denotat partis mortificationem ac necrosin, huic succedit lividus & flavescens; minūs malus est rubicundus; quo pauciores Carbunculi, eò minus periculi est; sic majores minoribus deteriores sunt. Exitiosi etiā habentur, qui ubi erupunt, mox iterum evanescunt. Notandum quoque est, num pestilens Anthrax ante febrem oritur, an verò pestilentiali febre præcedente, demum producat. Prior casus majorem salutis ipem promittit quàm posterior. Buboni accedens Carbunculus pro lethali signo à *Barbette* habetur, qui etiā valde periculosum pronunciat Carbunculum cauda quādam præditum.

*Dietæ.*

§. 12 Jam demum veniendum ad id, cujus gratia reliqua omnia præmittuntur, *Curationem* scilicet, & primò ad Medicinæ organum illud primum, *Dietam* nempe, quæ in omnibus affectibus legitimo uti instituitur modo, opus est. Præmissis eò incumbendum, ut succi omnes corporis nostri liberioriter transcursum habeant, nulli ubique stagnent, quare Aer eligatur temperatus, purus ac copia subtilis materiæ refertus, vitetur e contra frigidus, carens materiā cœlesti multa, acidus ac nebulosus, foetidus squalore ac contagio omni infectus. Cibis sit euehynus & eupeptus, ceteri hinc opus est refocillatione & succorum deficientium restitutione. Pro-

sunt ergò juscūla caporum, pullorum, Gallinarum, & omnia ea alimenta quæ multum salis volatilis in se continent, vitanda acida coagulantia. & acria corrosidentia, & salina fumoquè indurata: potus sit calidus Theæ vel Caffæ, interponendus alius potus consuetus, & cerevisia herbis & radicibus aromaticis ac volatilibus maritari possunt, ex rad. helen. Scorzon. herb. card. bened. scord. rut. betonic. &c. Vigiliæ ac somnus sint ut in statu sano esse solent. Quies corporis sæpè nocet nimia, motionis verò loco corpus moderate confricetur linteis calidis. Venus imprimis illicita, ac cum scortis, & lue Venereâ infectis instituta exulet, nec conversatio tuta est & cum iis, qui morbo pestilenti correpti sunt. Excernendorum sedula quoque habenda est ratio, defectusque, quantum fieri potest, debitis resarciatur remediis. Animus valeat curis & sollicitudinibus necesse est, iraque, timor & terror similique proscribantur. Gaudio potius exultaretur mens nostra in Deum confidens.

§. 13. Nunc ad *Chiram Pharmaceuticam ac Galenicam* accedamus, in quā primus locus *rum cura* debetur *Galenicis*, juxta quos *Bubonum curatio in Bubone*, in eo consistit, ut humorum copia minuat per V. S. & purgantia leniora sæpius dicta, aliaque quæ aram bilem & frigidam hic peccantem corrigunt materiam; non semper hic, ut in aliis tumoribus, ad repellentia consurgunt, ut ne dum repellitur materia, ad proximam recurrat; à discutientibus verò incipiendum esse jubent, quod si nihil prohibeat, velut aras, aut vires, V. S. cum cautione tamen hic institutam suadent, in loco verò affecto fomentis ex decocto Il, Chamomeli aut auri, &c. uti solent. Aster Atticus ipsis est specificum, quam herbam etiā Bubonium ob hoc ipsum vocant, quod non solum impositum, sed etiā colligatum Bubonibus auxiliari credunt.

In Bubonibus malignis incipientibus duos *Galenici* respiciunt scopos, ut non solum impediunt fluentem materiam, sed eam trahant, quoniam materia est maligna & contagiosa; secundò ut dolorem mitigent & laxent locum. Ratione doloris Ol. chamomeli ponunt, ratione verò relaxationis ol. anygd. dule. Alii solent accipere lanam redundantem sordibus, in quā est vis relaxandi & molliendi, & eodem inungunt oleo: sunt, qui recurrunt ad motum, & jubent agrotos, ut se maxime commoveant, ut motu fiat fluxio: accedunt alii ad usum cucurbitularum, quum timent maximam lueni vel infectionem. Bubones etiā maturandos esse ajunt veteres, in quem finem sequens commendat Emplastrum.

*℞. Rad. alth. lbj.*

*Farin. commun. ℥ij.*

*Caricar. coct. in ∇ ℥ij.*

*Sem. lini ℥i.*

*Pingu. Gallin. ves.*

*Portin. aa. ℥ijj.*

*M. & cum decoct. rad. altheæ & Caricar. f. Empl.*

Alii norunt parare Emplastrum ex fermento, capis, lil. alb. coctis melle crudo & alth. laudant quoque Empl. diachyl. ex Gummatibus, cui addunt tria Gummata: armoniacum, bdellium & sagapenum. Sunt qui ad sectionem & cauterium accedunt, dein applicant dolorem mitigantia, in quem finem oleum abietinum impo-

### CAP. III. DE BUBONE & CARBUNCULO. 505

imponunt, ad extra emplastrum maturativum per 3. vel 4. dies applicant, ut si quid relictum est materię congeat, maturetur mitigato dolore, & concoctā materiā, omnia faciunt, ut vulnus servent apertum, & quidem ad 40. dies: vel ungu. Isidis, vel imponunt diapalm. ad movendam fluxionem & impediendam putrefactionem. Aliquando interdunt glandulas tumefactas, & faciunt ut cadant more caruncularū.

*Carbunculus.* Carbunculos verò *Galenici* curari asserunt per venesectionem. sanguinis evacuatione ad animi deliquium usque factā. Scarificare etiam post venesectionem non incommodum fore ajunt. profundioribus vulnerculis impactis ob humoris crassitudinem. Quotidie quoque, seu ad minimum alternis diebus esse facies educendas per alvum lenientia contendunt, ut sunt Confect. Hamech. elect. ros. Mel. elect. de succ. rosar. diacathol. Ad removendam adhesionem corrigendam esse atram bilem dicunt, in quem finem exhibent Syr. de acetos. seu de ejus succo, de soncho, cichor. acetos. f. cum decocto prædictarum herbarum, ut sonchi, cichorei, acetos. endivie, & nunquam omittendam esse volunt scabiosam, quia inter reliquas herbas optimè hæc ineditur, adeo quod si ejus decoctio, aut aqua sola sumatur, hoc in casu apertimè conveniant.

His internis peractis ad locum transeunt affectum, & ei moderatè repellentia ac diffluentia applicant, in quem finem Cataplasma parant ex plantagine, ac lenticulā coctā, cui panis clibanitæ, neque valde puri neque foridæ micæ tenetæ sint adjectæ, super ipsum verò ulcus ex vehementibus aliquid imponunt, velut est Andronis, & Polyidæ, & Pasionis pastillus. Diluantur autem passo ad strigimentitiam compagine. Sed & Massaliolæ pulvillus siccus, aut etiam ipse similiter dilutus. Commendant quoque radicem dracunculi, aut aristolochiæ, aut succum Silphii, aut Cyrenaicum, singula cum aceto illita. Postquam verò Carbunculi ardor remissit, cerata capitalia diluta, & linamentis excepta Carbunculis immittunt. Maximè autem id conducere, quod ex herbis & nitro paratur, & pulvilli sicci nominis dicati tum per se, tum cum rosaceo. Duritie verò Anthracis permanente melino Serapionis utendum esse dicunt. Ante omnia student, ut Carbunculus citissime suppuretur, in quem finem his in die & semel noctu Cataplasmata ac Medicamenta emollientia imponunt. Cæterum ut planè Carbunculi eradicerentur, & à conjunctione cum vicinis adjacentibus exolvantur, mala punica acida confusa in aceto cocta, & fluida trita sicque linteo infarctæ imponunt, ubi verò resuscantur, aceto madefaciunt. Carbunculum suppurare ac rumpere dicunt nucis regię veteris nucleo impolito, item laudant cupressi folia ac germina, & recentes ac teneras pilulas cum polentā, uvas passas vinaceis rejectis, catias in vino coctas, papaveris cornuti flores, succum Silphii cum rutā & modico melle, vel picem liquidam cum uvis passis & adipe suill. vel seq. summis extollunt laudibus.

*Spum. argent.* lbj.

*Olei vitæ.* lbjss.

*Auripigment.* ʒj.

M. quod linamentis illinunt, imponuntque, si adluerit magna crusta in medio Carbun-

culi, Celsus dicit nihil melius esse, quam partem Carbunculo infectam adurere.

§. 14. Si tumor in altero sulco penes pudenda surrexerit cum rubore succedente, viresque deficiant, calor atque frigus invaserint, eadem die transierit appetitus, ut sic Bubonem adesse videat, ejus curam *Paracelsus* per apertionem fieri contendit, & quidem maturatione propriā, postmodum per oppodeltoch curandum esse scribit. Descriptio Maturativi ipsius sequens est.

*De quatuor resinis ʒb.*

*Deliquoribus alibæ.*

*Bismuthi ʒa. ʒij.*

Fiat Mixture superponenda.

Descriptio oppodeltoch ipsius sequens est.

*De quatuor seminib. incarnativis ʒb.*

*Cera.*

*Calophonia ʒa. ʒij.*

*Pici navalis ʒij.*

M. & reduc in Emplastrum.

Cautelam adjungit, cavendum ninirum esse à resolutivis, corrosivis & attractivis Medicamentis.

Cum Anthracis seu apostematis injectio juxta *Paracelsum* privativa confurgit ex Mercurii mineralibus, & est mineralis culibet innatus venæ flux, quæ omnia causantur ex venarum hujusmodi corruptis cavitatibus, hinc in curā ejus primum dicit esse virtutis diaphoreticæ Medicamentum adhibendum illius venæ radici. Postmodum ulstronem circumcirca factam commendat. Deinceps in elcharam ductum Consolidativis curat. Virtus diaphoretica est descriptio Lithontipon, si fuerit separata à sui substantia: quia tum accedit radices venarum, humectat sanguinem excitatum. & tum venit sudor, & ipsi est signum optimum. Species, quæ ingrediuntur Lithontipon, debent à sua substantiā separari per spiritum vini. Diaphoretica Medici-  
*In An-  
thraxis.*

*Vin. correlli ʒx.*

*Theriac ʒb.*

*Myrris rubra*

*Croci singulorum ʒi.*

*Liquorū Zingiberi ʒa. ʒb.*

M. de quo bibatur unica semis in optimo vino.

Realgatis aliisque fugienda esse cauteria monet.

§. 15. *Helmontii* nunc audiamus Consilium in Curā Bubonum ac Anthracum, eò verò incumbendum esse ait, ut omnes digestionum sordes in extimas usque oras persequamur, cum vindictā. Hinc Bubones & Anthracis citra venesectionem, purgationem, folis sudoriferis curari dicit, in quem finem commendat sua diaphoretica specificæ ac arcana.

Externè vero commendat cauterium actuale, nisi deterreat doloris atrocitas, cujus verò vicem implet cauterium potentiale, vel vesicatorium, quorum numerum complet emplastrum arsenicale magneticum. Elcharam mediatis digestivis separandum, ulcusque mundificativis & defensivis tractandum vult, ne venenum latius serpat, unde non raro carnis magna frustra excidere solent, in quem finem Sapphirum circa tumorem ductum commendat. Nullo amplius apparente pure vel veneno, consolidationi studet. Author, & laudat emplastrum Saturni syderati.

§. 16. Per-

*Paracelsi  
cura in  
Bubone.*

*In An-  
thraxis.*

*Helmontii  
cura in Bu-  
boni &  
Carbun-  
culo.*

*Malig-  
na in Bu-  
bone.*

§. 16. Perspectâ Curâ *Helmontii*, nunc paucis andiamus *Villifium*. Bubones juxta ipsum sunt vel maligni vel benigni, illi febribus malignis & pestilentialibus succedunt, vel easdem comitantur, quare cura eorum varîe institui debetâ benignorum curâ; suadet enim illic Auctor noster veneno in illis contento edomando, & materîe aggestæ maturandæ & educendæ: priori siquidem intentioni satisfacere satagens, bisonem, vel ex illo paratum cataplasma imponit. Secundæ ut obscurandæ, escharam vesicatorio parti inurit, reinotaque crustâ emplastr. Magnet. Ang. Salæ imponit, sic apertum Bubonem ad consolidationem producit ope balsami Sulphuris, ungu. Basilic. vel digestivo communi cum Theriacâ. Benignus verò ab eodem suppuratur Medicamentis, quæ vulgo in usum vocantur, ad alias inflammationes suppurandas, qualia sunt cataplasmata ex emollientibus parata, ungu. de alchei &c. Quod interna attinet Medicamenta, in prioribus alexiteria Medicamenta veniunt propinanda, quæ veneno sanguinem infestant resistant: hujus generis sunt ruta, scordium &c. Mithridatium, Diacordium, Theriaca. In posterioribus blandè diaphoretica sunt, ad mentem Authoris exhibenda, quorum beneficio materia aggesta facilius subigatur, citiusque foras eliminetur.

*In Car-  
bunculo.*

*Ambra* omnes malignam naturam obtinere inquit, quapropter in eorum curatione alexipharmaca non negligenda putat *Villifius*. Externè verò idonea auxilia à Chirurgiâ expetantur, ut promptius profugeretur infensus ille hostis. extemplo autem, secundum *Authorem*, ducatur circulus circa Carbunculum butyro antimonii, & caro mortificata separatur; vel excutietur crusta vesicatorio, quâ sublata imponatur empl. Magnet. A. S. vel si hæc præ manibus non fuerint, scarificetur Carbunculus. Ulcus dein mundificetur, reinota escharâ, & diu apertum retineatur, & denique secundum artis leges, & accommodatis remediis consolidetur.

*Sylvi car-  
buncu-  
lone.*

§. 17. *Consilium Sylvi* nunc restat, qui *Bubonum* Venereorum curationem in eo hitam esse contendit, ut maturetur quâpropediem eorum suppuratio & aperio, in quem finem Emplastra varia aromaticis ac volatilibus Gummatibus parata commendat, inter quæ præ aliis Diachyl. Magnum laudat. Quod si segnius procedat suppuratio, ad cauterium potentiale, ad aperiendum scilicet tumorem configit cum aliis Practicis, ne ad interiora pergat venenum in tumore maligno existens.

Bubones verò pestilenciales ut discutiantur jubet Auctor, & si discuti nequeant, ut maturentur & ad suppurationem seducantur, sinat, hinc eos aperiri, mundari tandem consolidari vult. Eadem adhibet Medicamenta, quibus alios glandularum tumores curare satagit. Hic verò imprimis ad venenum respiciendum vult, in quem finem Theriacam, Mithridatium similiaque commendat, quibus aliisque admiscenda præcipit oleum è C. C. destillatum, aliaque tale volatili oleo constans. Unguentum Martiatum cum Theriaca mixtum ad discussionem Bubonis pestilentis reperit præstantissimum, ut & emplastrum Diachylum cum gummatibus compositum; nisi dolor vehemens urgeat, non ad nectit Bubonum scarificationem, multo minus ipsis adhiberi vesicatoria vel cucurbitulas.

Ubi autem grandes sunt Bubones ardentesque, viribus adhuc constantibus, tum cucurbitulas, tum scarificationes permittit, nunquam verò vesicatoria, quia nunquam exinde redundat leishervavit Auctor. Bubonum discussionem & suppurationem forinsecus applicatis & internis temperantibus blandis Medicamentis promovendi vult, ut hisce acrimonia humorum temperetur.

Quamprimum verò suppurati fuerint Bubones, eos aperiendos esse præcipit vel scalpello vel ruptorio, licet scalpellum aliis instrumentis ferreis præfert. Aperto Buboni imponit Balsamum *Aris* terebinthinatum & anisatum, unâ cum unguento Basiliconis & Theriaca, lusus enim ope brevi absolvi Ulceris mundationem scribit. Consolidationem verò Bubonum prædictis Balsamis felicius ac citius evenire ait, superimposito ad cicatricem accelerandam Emplastris diaphorophylogis. Non malignum verò Bubonem curandum esse ait simplici modo tanquam alius partis tumorem, Empl. sc. diachyl. cum gummi. apertum autem mundandum esse communi digestivo, & consolidandum Empl. diachyl. diaphoroph. vel alio consolidante sicco.

*Sylvi Carbunculum* pestilentem curat fer-  
*In Cav-  
pentem partium vicinarum mortificationem le-  
bunculo.*  
parando, partem mortuam mundificandam, & ulcus relictum consolidandam. Ad separandum butyrum *Gui* commendat, si circumcirca parti illinatur affectæ; ad miraculum enim ait listi partium omnium corruptionem serpentelem ac omnia depascentem. Hujc proximum existimat Magnetem Arsenicalem, ex partibus æqualibus Arsenici, Antimonii & *Aris* partium, & Emplastris convenientibus immixtum: cuius ope ad sui separationem disponi partem corruptam haud dubitat. Ad partes verò separatas mundificandas laudat Balsamum *Aris* imprimis anisatum, unâ cum unguento Tetrapharmaco & Basiliconis vocato mixtum, & ulcers applicatum. Ad mundificandum ulcus consolidandum itidem magni facit balsamum *Aris*, ut & alia emplastra vulgaria.

Carbunculum non malignum ferè iisdem curat remediis, impositis etiam emplastris gummosis diachyl. &c. & magnalibus tumoribus solennibus.

§. 18. *Cartesiani* curant Bubones inhiatunt re-  
*Cartesia-  
norum ra-  
tio curan-  
di Bubon-  
um.*  
mediis obstructionem glandularum referantibus, & interdum succos vitiosos evacuantibus, purgantibus nempe ex Jalappa, diaphoreticis ex antimonio, bezoardico minerali, & C. C. florum sambuci, Electuario diacordii, theriacâ, & diureticis ex Tincturâ *Qi*, & u lumbicorum & similibus. Externè Buboni simplici imponunt emollientia & anodyna, quibus sequens constat cataplasma.

*R. Fol. alb. Mj.  
Flor. melior. Mib.  
Farin. sem. lini ʒiij.  
Butyr. recent. ʒij.  
Lactis vaccini, q. l.  
M. F. Cataplasma.*

Vel:

*R. Emplastr. de meacg. ʒij.  
Virell. ovor. n. iijj.  
Butyr. recent. ʒj.  
M.*

Ad effervescentiam sedandam buboni etiam gallinam, columbam vel ranam applicant, & apertionem sequenti promoven emplastro.

*R. Em-*



# CAP. III. DE BUBONE ET CARBUNCULO. 507

*u. Emplast. de mucag.*  
*diachyl. cum gumm. aa. ʒiiij.*  
*Resin. pin. ʒvj.*  
*Unguent. Basilic. ʒiiij.*  
*Sem. sinapi ʒij.*  
*M. F. Emplastrum.*

In Bubonibus malignis fortiori adhibent particulas aciores ad superficiem allicientia, & potissimum vesicatoria ex fermento. cantharidibus, sapone & aceto vini, vesiculas inde productas post 7. vel 8. horas aperiunt, & emplastrum imponunt magneticum, vel loco vesicatoriorum ruptoria adhibent, separatimque elchara foramen ad tempus aliquod apertum servant, ut unguento aureo, basilico, vel Apostolorum probe queat mundari. Duriore scarificant & marginem butyro antimonii obliuunt, ne tumor incresecat.

*Carbunculus.*

Carbunculi curam peragunt internis diaphoreticis particulas acutas lenientes hebetantibus, frangentibus & eliminantibus ex bezoardico minerali, vel ʒio diaphoretico, C. C. Philosophice preparato, Sic volatili viperar. camphora, aqua Scorzoni. flor. thibuc. Card. bened. Electuario diascordii, Theriaca & id genus aliis, foris vero incrementum impediunt butyro ʒii circa tumorem illito, quo simul separationem crustæ influunt, vel peculiariter ea de causa sequentia adhibent emplastra.

*u. Ferment. a. d.*  
*Unguent. ʒij.*  
*Empl. camph. aa. ʒij.*  
*Mell. curru.*  
*Butyr. recent. aa. ʒij.*  
*Erug. ʒij.*  
*Sapon. vult. ʒiiij.*  
*Terebinth.*  
*Res. pin. aa. ʒij.*  
*Croc. ʒij.*  
*M. F. Emplastrum.*

Vel:

*u. Cale. viv.*  
*Cantharid.*  
*Erugin.*  
*Oli Rom. ust. aa. ʒij.*  
*Arsenic. ʒij.*  
*Mell.*  
*Sapon. aa. q. f.*  
*M. F. Emplastrum.*

Crustâ verò adeo exsistente tenaci, ut præscriptis obedire & separari inqueat, eandem ad carnem usque sanam discindunt, & lixivio, aut unguento Egyptiaco in ~ vini dissoluto, abluunt, vel unguento Apostolorum aut Basilico illiunt, balsamoque Δis mundant, & ad perfectam dirigunt sanationem.

*Nostri methodus curandi Bubonem.*

§. 19. Nostro iudicio Bubonis cura cum Anthracis ferè consentit, & omnia quæ in eo conducunt & hic proderunt. Hoc ergo in Inflammatorio tumore commendamus internè omnia volatilia alexipharmaca, imprimis Theriacalia, ut in ~ Theriac. camph. scordii, ~ Theriac. matric. ~ C. C. compos. item Qlat. liq. catarrhal. volat. Nost. omnia enim hic conveniunt & Bezoartica ʒniata, viperina, imprimis pulvis Anglicus ex viperis, rad. contrajervæ aliisque absorbentibus paratus, & ad grana 20. in vehiculo appropriato exhibitus. Sudorifera enim ac absorbentia omniem implent paginam, detur ergo sequens vel similis pulvis cupidatim.

*u. Ocul. ʒppj.*  
*Ebur. ppt.*  
*Unicornus fossil. aa. ʒb.*  
*ʒii d. aphores. ʒj.*  
*Camphor. gr. vj.*  
*u. superar. volat. gr. iv.*  
*M. F. Pulvis alcoisatus.*

Vel in forma Essentia.

*u. ~ C. C. compos. ʒij.*  
*Theriacul. ʒj.*  
*Camph. ʒb.*

M. detur ad 20. guttas per vices in vehiculo convenienti, ~ Icor di vel Card. bened. &c.

Dari etiam potest Theriaca Andromachi, vel Cælestis nostra Castellana, vel dialc. Frac. vel Syl. vii. ex quib. variæ concinnari possunt formulæ.

Externè quoque in Bubonibus simplicibus conducunt variæ foci ac Cataplasmata ex volatilibus aromaticis parata, & capite de Inflammatione commendata calidè imponenda, adjectis Theriac. & diascordii, Empl. de Lahdano, de Theâ, item ~ matric. ~ ~ ~ viii. Camph. succi hyperic. cicut. conducunt tumore perè Bubonibus imposita.

In Bubonibus Venericis conveniunt omnia antivenerica interna, & curari solent instar ipsius *Bubonem* *luis Venericæ decoct. lignorum ac Qlibus. Exter. Venericæ* nec etiam Qlia egregium sæpe præstant effectum, tumorebus ergo his venericis imponatur Emplastrum Vigonis cum quadruplo ʒii, Diachyl. c. ol. Q malax. Diaphoret. cum ʒo. Bubones hi naturati aliquando aperiri possunt, rarissimè enim succedit suppuratio, vel cultro vel cauterio potentiali, scarificationes, vesicatoria, cucurbitulas non semper admittimus. Consolidatio promovetur balsamicis ol. balsam. Peruv. dest. Guajaci, hyper. spir. matric. ~ calc. viv. succ. hyperic. nummular. veronic. myrrh. ungu. de apio, ex his enim parari possunt mixturæ Bubonibus apertis calidè cum linteis excarpis instar plumaceolarum imponendæ. Empl. potest esse divinum, stipticum Par. &c. imponendum, à pinguibus abstinendum est. Sed sequenti meo liquore *dissolvens* sæpè illivi Bubones minores, qui paratur ex spir. vini alcoholato, cinamom. caryophyll. & croc. inferius describendis.

Quod *curatiorem* attinet *Bubonem pestilentium* Methodo medendi innixam, commode illa dividitur in *generalem*, quæ Pesti ipsi in genere debetur, & *Specialem*, quæ Bubonibus ipsis tribuitur. *Generalem* prosequi hic nostri institui non est, cum in *Encyclopiâ Medicâ* de Peste eandem sufficienter tractaverimus. Si ullibi, certè in Bubone Pestilenti alexipharmaca dicta remedia ac sudorifera volatilia & fixa, sola anchora erunt, ad quæ confugiendum est, ut sunt Tinctura Nostra Bezoartica sequens:

*u. Rad. Ag. gel.*  
*Zedair.*  
*Genuar. aa. ʒb.*  
*Myrrha ʒiv.*  
*Croc. ʒj.*  
*C. ʒiij. ʒij.*  
*N. M.*  
*Muc. aa. ʒj.*  
*Caryophyll. ʒb.*  
*F. Pulv. groj. m. d. add.*  
*Camph. ʒij.*  
*Q. f. and.*

SSC 2

liquor.

liquor.  $\text{Q}$  fix. q. f.  
*digere & f. l. a. Tinctura, quam vntsum ex-*  
*trahit ex Ole volatili & V rectificat. Opti-*  
*imum & egregium est sudoriferum, dosi,*  
*à 3ß. ad 3j. 3iß.*

Inter fixa laudamus 3num diaphoreticum,  
 Bezoarticum minerale ac Ole. Antihedonicum  
 Poteri, pulverem Anglicum Bezoarticum No-  
 strum sequentem, qui insignes vires habet,  
 quem junioribus omnibus hic commendamus.

$\mathcal{R}$ . C. C. f.  $\Delta$  ppi. 3j.  
 Terra sigillat. 3vj.  
 Unicornu fossil.  
 rasur. Eboris aa. 3iij.  
 M. F. Pulvis subtilissimus, dosi à 3ß.  
 ad 5ß.

Sic etiam ~ eboris, ebeni (qui præstantis-  
 simus est,) C C. viperarum, alii, cepar. Essent.  
 alexi pharmaca, vel sequens  $\nabla$  cohleatim ex-  
 hiberi potest.

$\mathcal{R}$ . Allii 3iv.  
 Cepar. 3ij.  
 Cumin.  
 $\Theta$   $\times$ ciaa. 3j.  
 Herb. rui.  
 absynth. aa. Mj.  
 Vin. Malv. infund. &  
 destillantur, add.  
 Spir. C. C. compes. 3ij.  
 M.

Salia enim volatilia quæcunque, ut &  $\Theta$   $\times$ i  
 sanguinem ac succos machinæ nostræ attenuant,  
 & simul acidum coagulans temperant. Externè  
 in Bubonibus pestilentialibus instar omnium se-  
 quens magnificimus.

$\mathcal{R}$ . Gummi. Galbani.  
 Empl. Arsenical. aa. 3j.  
 Morrh.  
 Mastic. aa. 3vj.  
 Bdellii 3j.  
 Pulv. caphorb. 3ß.  
 rad pyrethri 3ij.  
 Croci opt. 3ß.  
 Theriac. Andr. 3iij.  
 Ol. Therebinth.  
 Juniper. aa. 3ij.  
 Succi. 3iß.  
 Pulv. scm. cumin. 3ß.  
 sinapi  
 erue aa. 3iß.  
 M. f. l. a. Ceratum.

Et simul interponantur Diaphoretica volatilia  
 superius jam recensita, quæ selectu & respectu  
 habito ætatis, sexûs, virium & aliarum circum-  
 stantiarum, saluberrimam præstant opem, &  
 omnem absolunt paginam, quatenus hæc ipsa  
 vim veneni pestiferi coagulativam solvendo ac  
 cohibendo aculeos hebetant, & quod inordina-  
 ti massæ sanguinæ inest, uti revera est, per cana-  
 liculos cutaneos excludunt & eliminant. An  
 venæsectio in Bubonibus pestilentialibus locum  
 obtineat, à pluribus hodiernis disquiritur. To-  
 ta Galenicorum cohors cum pluribus Neotericis,  
 Langio, Sydenhamio aliisque eam admittit.  
 Langius enim l. i. epist. 18. inquit, apparente  
 Bubone, secare venam in eodem latere, sub  
 ipso affectu nil vetat; cum per venam sectam,  
 ut ille ait, veneni pars, quæ intra vasa contine-

tur sanguini commixta, educi, obstructio expe-  
 diri, febrisque æstus commodè remitti possit.  
 Verùm si in hisce attendamus usum venæsectio-  
 nis collatum cum veneno pestilenti, & præci-  
 pue per cuniculos hosce se jam exerente, sa-  
 tendum est venæsect. consultis omitti, cum noxam  
 potius inferat quàm utilitatem, ceu pluribus  
 exemplis probare satago. Quantitate enim san-  
 guinis ablata, reliqua massa congrumescit magis  
 & vias jam dum debiles satis, vel non suffecturæ  
 magis exhauriuntur. Pestis enim acrimonia  
 coagulativa & aculeata in sanguine, & succis re-  
 liquis corrigi hoc pacto renuit, ut potius parte  
 sanguinis diluente ablata magis sæviat. Motus  
 ad exteriora hoc ipso non promovetur, sed po-  
 tius inhibetur, & quidem non sine præsentaneo  
 vitæ periculo. Sed cum brevitati nos stude-  
 mus, si quis auctoritates, rationes plures & ob-  
 servationes desideret, hanc in rem legi meretur  
 Diemerbroec. Simon. Method. cur. pest. l. i.  
 p. 47. & alii. Quod jam de venæsectione dixi-  
 mus, id quoque valet de cucurbitulis, item de  
 hirudinibus, & præsertim de purgantibus. Non  
 enim in primis viis vel extra massam sanguineam  
 malum residet, quin diarrhææ sæpe malignæ  
 dictæ conjunguntur, nisi enim levis alvi relaxa-  
 tionem per cremorem  $\zeta$  l. amygd. dulc. vel  
 clysteres aliaque mitiora procures, præstat &  
 ab iis abstinere. Purgantia enim ad massam san-  
 guineam delata, in ea non aliter præcipitando  
 fecernendoque particulas, itemque corrodendo  
 effectum præstant, ac ipsa venena, reliqua læta-  
 cea atque icarificationes in torturam hominum  
 excogitata sunt hic non admittenda.

Curacionem Bubonis pestilentialis specialem  
 seu localem externam internæ succenturiandam  
 quod attinet, præmissis supra dictis acrimonia  
 corrigentibus medicamentis, dissolvendæ ac cor-  
 rigendæ sunt particule corrosivæ stagnantes.  
 Equè in benignis ac malignis Bubonibus perfe-  
 cta in initio dissolutio & dissipatio locum habet,  
 in pestilentialibus verò maturatio procuranda.  
 Cura enim variat pro peccantis succi acrimonia,  
 sic in Bubonibus venereis, ubi acidum viscidum  
 magis peccat, conveniunt Olia, & non æquè in  
 Pestilentialibus. Si benigni sint Bubones, nisi dis-  
 solvi ac dissipari possint, maturatori operæ dan-  
 da est; Medicamenta hic conducunt varia matu-  
 rantia, quibus, uti solemus aliis in Inflamma-  
 tionibus ad suppurationem tendentibus, etiam  
 hic utendum est, ut sunt cataplasmata ex emoll.  
 rad. alth. malv. fl. chamomill. sem. lini, sic, inter  
 Composita aliis præferimus ungu. Balsiconis,  
 quod egregie internam promovet fermentationem,  
 non enim, uti Chirurgi loquuntur, hæc  
 attrahunt humores, sed maturativa potius blan-  
 dis suis particulis volatilibus promovent, & ad-  
 juvant fermentationem succorum stagnantium.  
 Emplast. de Melilot. diachyl. f. aliæque mucila-  
 gines commendantur, à pinguius tamen, me-  
 judice, potius abstinendum est, & potius mucila-  
 ginosa & cataplasmata locum inveniunt in la-  
 tere costæ & tepide applicata, ex farina sem. lini  
 fabar. fl. sambuc. verbasc. malv. vitell. ov. cro-  
 co, aliisque possunt etiam his addi Theriaca,  
 cum capis vel diaford. cum Bupone mell.  
 rutæ. &c. Cum jam maturaverit Bubo, aper-  
 tusque si non sponte, cultro tamen fuerit opus,  
 omni autem conatu promovenda est, (ceui jam  
 dictum) Bubonis suppuratio, quæ si vix obtineat



tur cataplasmatibus vel emplastris appropriatis, sunt quæ eam ipsâ velicatoris tentandam esse volunt, licet aliâs vehementiora contra Bubones remedia, ut & alia in Carbunculis scarificationes plus aliquando damni, quàm emolumenti adferant, quæ ut hi quomitiis vel circumspiciunt tractati, eò citius curati observati sunt. Discutendus autem Bubo pestilens non est, uti Bubo simplex, ne sanguinis mixturam turbando advenientibus ex parte affectâ partientis incongruis, imò pestiferis sulphureis corrosivis, (hic ut & alibi verbis venia, modò de re conflet:) periculosiora & sæpe lethalia producantur Symptomata. Etenim semper & ubique expendendum, nun plus mali ab ipsâ exulceratione imminet, nisi fit in omni discussione:) mixturam turbantibus. Quoad Bubones pestilentes ac malignos, qui faciliè patent, dum loca occupant glandulosa, horum eadem est indoles hoc in casu, ac Carbunculorum, nisi sint mitiores, ad quorum acrimoniam casticam venenatam delendam plures Bubonibus calidè applicant butones in aceto maceratos, vel ex istis cataplasma parant, seque imponunt. Alii laudant cucurbitulas, velicatoria, setacea alii, quorum omnium dicunt securissimum esse remedium, quod setaceum aliquando cum fructu inflicturn vidimus. Si dolor in Bubone imprimis pestilentiali maxime urgeat, sequens Cataplasma tepidè applicatum eximè erit utilis.

*R. Herb. scord.*

*ruia*

*cicutar.*

*Fl. Chamomill. aa. Mj.*

*melilot. Mss.*

*Summ. absinth. P. ij.*

*Mica paus simlag. q. f.*

*Myrrh.*

*Croc. opt. aa. ʒb.*

*ʒ Regin. Hungar.*

*Theorac. Andr.*

*El. diafcor. aa. ʒij.*

*M. pro Cataplasmate.*

Si Bubo simplex aliam præter ordinariam afficiat partem, ex gr. si sub mento appareat, & haud magnus est, dissolvendus est, in quem finem liquorem nostrum dissolvemus commendamus applicando vel fortiter illinendo.

*R. Spir. vin. alcaisat. ʒvj.*

*Cinamom. acutiss. ʒb. ʒij.*

*Caryophyll. ʒb.*

*Croc. opt. ʒib.*

*M. & digerantur diu; aliquando & destillantur.*

Vel sequens aut simile imponatur Empl.

*R. Gum. Ladani. ʒj.*

*Gaiban. ʒb.*

*Tinctur. ejusdem q. f.*

*Camphor. ʒj.*

*Myrrh.*

*Aloes aa. ʒb.*

*Pulv. sem. cumm.*

*anj.*

*Herb. salz. aa. ʒij.*

*Spir. matric. q. l. ad*

*consistentiam Cervati mollioris.*

Vel si hisce non cedat Bubo, sequens con-  
ducet.

*R. Aloes.*

*Myrrh. aa. ʒj.*

*Camphor. ʒij.*

*ʒ Hri ʒb.*

*ʒ Regin. Hungar. ʒij.*

*Spir. matric. ʒxx.*

*Elx. vit. Matib. ʒj.*

Cum spongia fricetur, & imponatur sacculus ex herbis discutientibus, & sale Gri, & xci. sem. cumini. repletus, omnia enim hæc attenuant & resolvunt, imprimis cum accedat calor actualis, quo vires Medicamenti promoventur, & fermentatio interna succorum augetur, vel illinatur ~ lambric. cum ~ ʒ xci succin. &c. Si vero Bubonem satis magnum ad maturatiouem vergere appareat, maturantibus & suppurantibus adjuvandus; ita quando ager dolorem lancinantem & pulsantem remittere, & quandam titillationem succedere sentit, & cedens mollities digitis aliaque apparent signa perfectæ suppurationis, & brevi futura apertione, nisi spontè erumpatur, abscessus à perito Chirurgo aperiendus est, & quidem magis lancetta; cauterium enim potentiale, propter longam elcharæ moram, si optio detur, minus locum habere videtur, idque in loco declivi, & quidem magis late, vel per transversum, præcipiè in inguinibus, quo materia ichorosa acerrimè faciliò pateat exitus. Factâ apertione mundantia dicta conveniunt, ad ulcus depurandum & apertum servandum, ne citius consolidetur, nisi succis pravis aliis magis idoneis concedi potest exitus: sunt qui canalibus plumbeis servant apertum ut depleatur pus, vel injiciendi sunt varii liquores, si ulcera hæc profundiora sint, vel quod melius, turunda vel pluniacollæ ex linteo carpto fiant, & imponantur cum ʒ calc. viv. ~ matric. ~ vin. Camph. vel digestiv. vel Basilic. bals. ʒ terebinth. cum Theriacâ vel diafcoridio, vel spir. vin. myrrhatius, qui instar omnium est, & cunctis ulceribus optimum remedium existit. Si ichorosa magis sit materia, addatur Balsamus de Capaiv. vel pulv. herb. scord. vel bals. nost. vulner. &c. Quando verò notantiora evanuerint Symptemata, ac reliqua ad statum pristinum magis accedunt, tunc sarcoticis & consolidantibus vulgo sic dictis locus erit: ex Emplastris hic conveniunt oppodeltoch, stipticum, Diapalm. item Terebinthinat. imprimis verò ex olibano. aloë, myrrhâ, mastiche, camphorâ, sacrocolla, succo hyperic. veronic. nummular. prunell. parata remedia.

Curatio Carbunculi seu Anthracis cum curâ *Cura Carb. Bubonis* sæpe convenit, nam Tyrones sciunt *bubonibus* velim, quod affectus hic curati debet ut *Anthracis* gangrena, & cum jam ad sphacelum tendat gangrena, omnis propediem opera adhibenda est, ut suppurationi sequatur, & per consequens separatio Elcharæ. Præcipiè ergo curatio totius car-  
do vertitur in partis lideat: à sanâ separatione, h. e. gubulis debito patentibus solitum simund convenienter transmittentibus, quæ sit à sanguine & humoribus continuo impingentibus in partem, æque ratione tubulorum erolorum ac fluidi contenti, putrescentem. quam dum penetrare nequeunt, tandem de se desolantur, idque facilius, si vel ab acido vel ol. gni circumlimiti intus contento toti jam abscessu fuerint tubuli, vel scarificationibus aperti tubuli sani vi propulsus cordis copiosum effundunt humorem, qui  
infau-

insinuans se inter partis demortuæ fragmenta, jam divisa ea lubricando efficit, ut frustulatum decidant, facilitatque hæc separatio, si applicentur sub formâ imprimis Cataplasmatis, talia, tum quæ agitationem, tum particularum acidarum &c. in parte demortua, quàm humorum in parte sanâ adaugent, tum quæ spirituosius salinis volatilibus balsamicis &c. particulis, ne acidum corrosivum ulterius in tubulos sanos sæviat, impediunt, humorumque è tubulis stillantium acrimoniam auferunt; quod ad mundificationem & consolidationem requiritur, sicque Carbunculus in exulcerationem transit, quæ hic terminatur extremitatibus vasculorum abruptorum, ex quibus, & per quæ humores (ut alibi fluunt, sic hic) exsillant, curanda ut omnis alia, habito saltem ad ipsam sanguinis constitutionem, ut & cæterorum fluidorum ab eo ut fonte derivandorum, respectu.

Ad separationem plures utuntur butyro Ænii, eoque circa Carbunculos saltem circum ducunt, inde statim pars corrupta secedit à sanâ, & dein ulcus facili negotio mundificant, & ad perfectam deducunt curationem, vel loco butyri Ænii Emplastro Magnetico A. Salæ uti possumus, quod propediem crustam excitat, quâ separatâ unguento maturante separanda est materia supposita.

Si malignitatem adesse constet, præter interna Diaphoretica, Bezoartica, Theriaca, viperina & absorbentia varia Camphorata, aliaque superius dicta, ad externa quoque confugiendum, & est sequens insignium virium, in Anthrace singulis bihoris, vel etiam pro re natâ citius repetendum, & calidè applicandum.

℞. *Herb. scordii.*

*Ruta*

*Cicut. aa. M℞.*

*Sem. Bardan. ʒi℞.*

*Alves.*

*Myrrh. aa. ʒ℞.*

*Oliban. ʒiij.*

*Tinct. Galban. ʒiij℞.*

*Croc. ʒ℞.*

*Terebinth. var.*

*Ungu. Basilic. aa. ʒiij.*

*Resin. pini ʒi.*

▽ *Resin. Hungar. ʒi℞.*

*Camphor. ʒi.*

*Farin. fabar. q. l.*

℞ *Theriac. Andr. ʒi.*

*M. f. l. a. Cataplasma calidè imponendum.*

℞ *Sacculus arenæ calidæ repletus super applicandus.*

Si quis à tali magno apparatu abhorreat, imponat vel Theriacam Andr. vel Dialcordium Frac. vel aliud Cataplasma magis simplex. Sunt qui prius scarificant Carbunculum, & dem imponunt seq.

℞. *Succ. Symphy.*

*Scabios.*

*Calend. aa. ʒi℞.*

*Theriac. vet. ʒiij.*

*Vitell. ov. N. 2.*

*M. & calidè applicetur.*

Sunt qui crudeliter agunt, & ferro aperiunt Anthracem, vel cauterium imponunt potentiale, facta apertione ulcus mundificant unguento de apio, &c. & tandem consolidant sequenti vel simili.

℞. *Succ. calend.*

*absynth.*

*scabios.*

*api.*

*Myrrh.*

*Irid. ʒi.*

*aloes aa. ʒi.*

*Sarcocoll. ʒi℞.*

*Mel. ros. ʒiij.*

*M.*

*Vel quod nobis magis arridet,*

℞. ▽ *calc. viv. ʒi.*

*Spir. vin. camph. ʒi.*

*Succ. hyperic. express.*

*nummular.*

*prunell. aa. ʒ℞.*

*Myrrh. ʒi℞.*

*M.*

## CA P U T IV.

### *De Phygelo, Phymate & Furunculo.*

#### §. I.

Quamvis hi affectus cum supradictis Plilegmone Bubonibus & Carbunculis, non quidem nomine, sed & ut plurimum re convenient, & tantum quoad figuram, situm, & dein secundum magis & minus differant, attamen Antecessorum nostrorum methodum semel receptam imitati, & eos in Tyronum gratiam perspicue tractare nobiscum constitui-mus. Hi enim affectus non minus ac Bëbones sunt glandularum passiones, solâ differentiâ in gradibus positi.

*Phygelon.* *Phygelon* describitur, quod sit tuberculum inflammatorium, vel potius Erysipelaceum glandularum subcutanearum absque suppuratione, cum dolore urente & mordicante, à lymphâ stagnante acriori obortum. Dicitur etiam *Pannus*, veteribus *Pannus*, item *Pannula* vel *Panicula*, Græcis verò *Phygelon*:

*Phyma* verò generaliter tuberculum denotat, *Phyma*, hic verò stricte sumimus, pro tuberculo glandularum inflammatorio mox erumpente, & ad suppurationem tendente. Aliis tantum est Bubo statim adactus, & ad suppurationem festinans, qui revera nil nisi modum Bubonis, & gradum certum exprimit, unde merito sub ejusdem genere, & notione à Practicis tractari deberent, cum non opus fuisset ob minimam circumstantiam tumoris novum non tantum excogitare nomen, sed & alia.

*Furunculus*, Græcis *Dothien*, describi potest, *Furunculus*, quod sit tumor in hac vel illâ corporis parte ex-lus, Do-guus in acutum tendens, ovum columbinum vix excedens, cum rubore, dolore, à stagnatione & acrimonia succorum obortus.

§. 2. Quod partem affectam tumorum horum *partes* affecti concernit, *Phygelon* & *Phyma* Adenium seu glandu-

glandulosa occupant loca, maximè verò emergunt in cervice, alis, & inguinibus ut plurimum post febres. Phygetlon in inguine produci dicitur Bubo. Furunculi verò omnes corporis partes possident, imprimis verò in carnolis plerumque partibus circa cutem cum inflammatione & distensione fibrillarum circumvicinarum hærent, aliquando sunt profundiores, & usque ad membranas penetrant, & modo plures simul afficiunt partes, sæpè verò in musculis hærent, & motum artus obstruendo ac distendendo fibrillas impediunt.

*Diagnosi.*

§. 3. Perspecta parte affecta nunc paucis *Diagnosi* horum tumorum perspicimus. Signa verò ex quibus cognoscitur Phygetlon, sunt tuberculum seu tumor instar eryipelatis vel inflammationis; adeit enim calor, durities, dolor ac distensio, febris, litis, vigilie: ac initio adeit pulsatio, gravitas, ardor, rubor, horrorque, rarissime hi tumores ad suppurationem perveniunt.

*Phyma* cognoscitur a tumore glandularum in sensus nostros incurante, qui facile ad suppurationem transit, minor est tumor quam Phygetlon, minoremque habet dolorem & ruborem.

Quod Furunculorum *Diagnosi* attinet, apparent illi ruberitiam cum ardore & duritie, erictionem horum cernitur solet horror, rigor & febris. Dolor adeit valde intensus, imprimis, si ad suppurationem tendunt, adeit enim pulsatio, calor cum maxima inflammatione totius artus. Diverse sunt magnitudinis, ut plurimum sunt instar ovi columbini, alii minores, alii majores; si unus abicit, alter revertitur, & hoc per menses aliquot sæpè durare solet, rarius sponte evanescit, sed ut plurimum per suppurationem, & quasi ulcera dein constituunt, materia, quæ prodit, valde tenax est & lutosa, coagulata & aliquando cum lymphæ mixta, sæpè foraminula in superficie cutis exhibent, per quæ humor stagnans subtilis emanat, & reliqua durities discurrunt, per frustula sæpè chylus coagulatus extrahi potest. Furunculi hi sunt aliquando Epidemici, prout hoc anno 1688. observavimus illos per totum Districum Castellani gralantes.

*Calculus.  
rum opinio  
de causa  
Phygetli.*

§. 4. *Ætiologiæ* tumorum imprimis *Phygetli* vel *Pani Galenicæ*, dicunt nihil aliud esse, quam glandulæ alicujus eryipelatis inflammatum, aut inflammationem eryipelatosam, vel phlegmone in adenum locis emergens, maximè verò in cervice, alis & inguinibus, ut plurimum post febres aut post alicujus partis dolorem, quæ fluxionem etiam adenis prouocant, eveniens. *Phygetlon* verò in inguinibus emergens veteribus dicitur Bubo. Causas tumoris hujus calide & celeriter orti dicunt, esse alias externas, alias internas; illæ ipsi sunt quæcumque fluxionem promouent, hæ verò ipsi sunt plethora, & partis recipientis, enunciorii scilicet mollioris receptioni apta, conjuncta vero causa Galenicæ est sanguis biliosus ejusmodi tumorem excitans.

*Phyma.*

*Phyma Galenicæ* dicunt tumorem glandularum, quem à sanguine pituitoso produci existimant, qui citò ad suppurationem pervenit, ob humiditatem à pituita proveniente putredinis materiam.

*Furunculi.*

*Furunculus* ipsi est humor abscessorius ex crassissimis humoribus in carnolis maximè locis constitis, mixtis quidem, quum in ipsa sola cute consistit: malignus autem, quum ex ampliore profunditate emerit.

§. 5. *Phygetli* seu *Pani* causam *Paracelsus* ex *Paracelsi* colore emortuo provenire ait, sic quoque juxta *opinio de causa Phygetli, Phymæ & Furunculi.* ipsum in Musculis affectis absconditur hoc tuberculum, quod ex sale Mercuriali oriri contendit. *Phymæ* verò causam ex nutrimentorum proprii membri liquoribus deducit: *Furunculorum* esse apostema per languinem ait, conflurgitque ex Mercurii mineralibus.

§. 6. *Helmontius* *Phygetlon*, *Phyma* & *Furunculos* à Laticis & cruoris affluxu produci existimat, & à solo spiritu vitali causaliter eorundem oriri arguit. *Phyma* verò è latice infecto salum dilolutorum oboriri laud dubitat.

§. 7. *Willisus* de causa *Phygetli* sequenti modo ratiocinatur. Immanis illa sanguinis effusio de causa venientis febrilis, & per se & ex agrotorum querelis satis superque conspicua ab admixtâ materiâ quadam heterogeneâ, vel ab exaltatis spiritibus sulphureis accenditur. Si enim extraneum quid massæ sanguinis confundatur, & ab illius particulis ita dissimile existat, ut cum iis nequaquam uniri, nec toti massæ assimilari possit, eam violenter perturbat, & motus maxime inordinatos in illa excitat, duratque intensior ista ebullitio, donec sevestris & aliena ista materia vel subacta, vel foris eliminata fuerit. Si verò spiritus aut sulphur dominio gaudeant, & ultra præscriptas limites evehantur, alia principia obruunt, nulloque freno coëctæ impetum faciunt, sanguinisque liquorem plus debito exagitant, nec malaciam illis prius concedunt, quam exardescentes illæ particule deslagraverint, factâ autem per humorum turgescientiam subtiliorum particularum evaporatione, sal spirituum confortio orbatus, nec ab iis exaltatus accendit, atque coagulatur; at glandulæ liquorum corpus perreptantium partibus excrementitiis heterogeneisque iis confusus excipiendo deslinat, & ob substantiæ laxitatem illas facile adnitescentes, easdem ob pororum angustiam in gremio suo retinere coguntur. Adenes verò ab aggesta hæc materiâ, à quâ ipsarum interstitia opplentur, distenduntur, & in tumorem durum ob exhaustas in exardescentiâ particulas aqueas, eleantur.

*Phymæ* causam quod attinet, Præternaturalis, ut ille loquitur, sanguinis fervor cum ab heterogeneâ materiâ ipsi confusa, tum ab ferocitibus ejus activis principiis exorta, remissior quandoque existit, modo ab illa pauciori copia minusque fermentescibilis in dolis cruoris massâ admixta, modo ab his minus effertis, tum temporis enim parciore contingit exortu, in illius humorem sanguineum subingressi secretæ, minorque partium liquorum coagulatio; tenuiorum quoque & æquarum particularum tanta nullatenus accidit deperditio, relidatque massæ fluiditatem conciliant de sufficientes super sunt; in adenes ergo delatæ extraneæ istæ, coagulatae succorum particule, tardiorique motu in illas compulse, tenuiora ipsarum vasa, ad quæ pervenerunt, obstruunt, depresso rem minusque durum in glandulis tumorem producant, ob tranquilliorum excitatam in sanguine turgescientiam, materięque fluiditatem, propter quam etiam tumor promit suppurationem.

Quod *Furunculorum* causam concernit, ex *Furunculo* Willisii principiis sequenti modo explicari possunt *Furunculi*. Alieni atomi sanguinis nequaquam congeneres, nec ipsi tñe miscibiles illum subeun-



subeuntes nullam interdum sensibilem promptamque perturbationem in eo inducunt; quandoque etiam liquoris sanguinei solutum quodammodo strictum vinculum nullatenus sublequitur subitanea vehemensque ejus effervescencia. Parum perturbatum intenditur sanguinis cursus, nulla apparente in corpore alteratione. quia materia heterogenea, tenuioresque ac paucæ particulæ in reliqua massa separatæ facili negotio omnes corporis glandulas pervadunt: sed quum ad miliares perventum fuerit, nec actiores quarundam ex iis poros permeare valent, in iis commorantur, eosque infarciunt, glandulasque extendunt, partemque, in qua ipsæ sunt confisæ, tumefaciunt: in illâ verò utut temperata sanguinis turgescencia, indefinenter avolant spiritus, laxiorque fit totius massæ compages: principia autem à se invicem secedunt, crassæque particulæ à tenuioribus seu fluidis separantur, quibuscum tamen universas corporis partes percurrunt, earumque ampliores poros penetrant, & pertransiunt, sed ad cutaneas glandulas attingentes, & in angustioribus earum poris inhaerentes, in illis sensu ac sine sensu ageruntur, & quum continuo fluxu illic advehantur, tenuioresque sunt indolis, partem validè distendunt, acuminatumque tumorem producunt, in sanguine verò vehementior ab iis excitatur ebullitio, quia quum ob abundantiores in parte agellæ fuerint, à cruore nullo modo subigi & secerni, & propter obstratos meatus foras amandari possunt.

*Sylvius*  
vicinum  
de causa  
Phygetis.

§. 8. *Sylvius* Phygeton, Phyma & Furunculus ad magnitudinem auctam refert. Tumores igitur alii sunt ex partium consistentium magnitudine atque substantia aucta, alii ex partium contentarum extra locum naturalem effusione in vel inter partium consistentium substantiam. Author etiam tumores hos non multum à Bubonibus & Carcinculis differre, ait, eandemque ipsis assignat causam, quamvis benigniorem, & acrimoniâ non adeo esse fortem ac in Bubonibus, sed viscidam admixtam esse pituitam, & sanguinem non valde acrem, hinc pro diversitate hujus miscelæ sanguinis vel *Phygeton* vel *Phyma* vel Furunculum produci arguit.

*Phyma*.

*Phygeton* ergo *Ipsi* est à sanguine magis bilioso, *Phyma* verò à sanguine magis pituitoso, qui statim ad suppurationem pervenit, hinc minor est tumor quàm *Phygeton*, minoremque habet dolorem ac ruborem, & citius ad maturationem transit.

*Furunculus*.

*Furunculus* verò *Ipsi* est tuberculum in acumen magis protuberans, cum inflammatione & dolore, ovum columbinum magnitudine adæquans. *Furunculum Sylvius* agnoscit alium benignum, alium malignum seu pestilentem. Furunculum benignum esse inquit ait, qui cutim ferè tantum occupat; malignum verò qui pesti est conjunctus, hinc & causam variare dicit. Causam ergò Furunculorum humores pituitosos atque impuros esse sanguinem contendit. Pestilentis verò causam humores esse vult aciores ac lividos nimis corrosiventes.

*Carlesi*  
norum ju-  
dictum de  
causa Phy-  
getis.

§. 9. *Carlesi* causam *Phygetis* attribuunt succo crasso chyloso multis particulis acutis rigidis referto, & ductus glandularum conglobatarum obstruenti, circa quam tubulorum obstructionem hærens, nec transiti inveniens, liquor glandularis fibras distendat & tuberculum nascitur.

*Phyma* causam ejusdem planè generis, ut *Phyma* prioris tuberculi, esse existimant, nisi quod particulæ chyli acutæ non sint adeò rigide & facilius flecti queant, unde & citius suppurationem admittat.

*Furunculus*, sive *Dorhien*, à succo orti decent chylo crassiore multis particulis tenacibus, viscidis, caseosis & lutulentis repleto, in quo retentæ partes acutæ minùs, quàm in prioribus, sunt subtiles, sed grossiores & graviores, quas æther subtilis majori violentia movere debeat, unde & coagulatio hæc difficilius queat dissolvi.

§. 11. Perspectis aliorum de causis tumorum *Nossa* sententiis, nunc & nostrum deponamus judicium. Causa *Phygetis* eadem est ac aliorum tumorum inflammatoriorum, vel Erysiopelatorum, nempe obstructio inflammatoria, quæ secundum magis & minùs, & pro materiâ, ejusque visciditate ac acredine, locoque, quem occupat, differt, & cum obstructione hanc inflammationem superius capite de Inflammatione latius deduxerimus, ea hic rursus repetere super sedemus. Causæ etiam hic possunt esse vel interne vel externe. Internæ sunt acidum sanguinem ac succos nostros, imprimis verò lympham in glandulis contentam coagulans, ductusque obstruens, ut allentibus succis nulla concedatur circulatio, hinc similis producit tumor. Externa quoque causa variæ symbolum suum afferre possunt, ceu in aliorum opinionibus sufficienter jam dictum.

*Phyma* itidem ab obstructione inflammatoria dependet, imprimis si plures tubuli in glandulis fuerint obstructi, & lymphæ motus aut perfluxus ordinarius haud concedatur, cum simul multum succi chylofi eò perveniat, & fermentatio propediem fiat. Facile tumor hic in suppurationem abit.

*Furunculus*.

Si ritè causa *Furunculi* pensetur, certissimum est, ipsum orti ex sanguine polyposo acido coagulato, admixto simul crasso chylo stagnantibus. In his enim tumoribus salia aëlia minùs subtilisata sunt, quoniam salium acidum mutaticum non ritè dispergitur, prout decet. Hinc sequitur, quod ex ejusmodi sanguine muratico tot salia volatilia, aut spiritus subtiles, vel particulæ oleosæ, gummosæ, produci nequeant, quot ad æconomiam animaleam necessaria sunt, hinc attenuatio particularum reliquarum sanguinis impeditur, sed stagnant potius in musculosis ac carnosis partibus, excitantque tumorem ovi columbini magnitudinem æquantem, & in acumen vergentem. Sanguis enim lutosus diu ita per totum corpus circulari potest absque productione *Furunculi*, nisi causæ aliæ interveniant, quæ mutationem aliam in Massâ sanguineâ producant: quam diu sc. particulæ chyli crassæ ac lulosæ cum acido in arteriis & venis circulantur, tam diu sanitas persistit, si verò mediante aëre fermentatione in sanguine obortitur, tunc improporionatæ particulæ à sanguineâ massa propelluntur in partes extremas, hinc sunt ab acido in sanguine latente particulares coagulationes in carne ac cute externâ. Obstructio inflammatoria ergo exillit modo in hac, modo in illo vasculo, & non duntaxat in uno ramo, sed nonnumquam in mille aliis minutissimis vasis. Hic ergo est stagnatio succorum maxima, à ruptione vasculorum oborta. Qui enim ab-

tuntur

# CAP. IV. DE PHYGETLO, PHYM. & FURUNCULO. 513

tantur acidis, salis, ac muriaticis, facile in affectum hunc incidunt, uti in pueris observamus tempore autumnali fructibus immaturis vel alimentis crassis, spirituosius & sale volatili carentibus, abtentibus.

*Phygetlo.* §. 12. Quod Prognosis concernit, *Phygetlo* est tumor non facilis curatu, quoniam glandulas occupat, omnes enim tumores glandulosi difficilius sunt sanationis, quam aliarum partium carnosarum.

In pueris, quibus *Phyma* est familiarius, citius curatur quam in juvenibus, quibus raro contingit, difficilius ad suppurationem vel maturatiorem propediem abibit hic tumor phymaticus.

Prognosis *Furunculorum* quod spectat, tardius isti ad suppurationem tendunt, rarius in Gangranam ac Sphacelum transeunt. Suppuratio enim nihil aliud est quam attenuatio & fermentatio succorum evaluatorum, & hæc operatio similis est chylificationi, quæ in stomacho contingere solet. Cum non sint periculosi Furunculi, attamen infantes facile ad atrophiam disponent, diu sæpe durant, ac facile recidivæ fiunt, si unâ in corporis parte aperiantur, & curentur, aliâ iterum repullulant, doloremque maximum ab initio cum horrore, febre, & externâ inflammatione, rubore, calore inferunt, infantibus sæpe dyspnoeam aliosque affectus accerunt, ceu læpissimè id evenisse animalis verissimi. Nonnunquam in ulcera transeunt diuturna. Difficillimi quoque curati sunt hi tumores, quando aperti foramen profundum ac rotundum excavant. Tumores hi tempore ad fermentationem excitandam apto, solent grassari epidemice. Furunculorum cura sæpius ad menses differtur, imprimis in scorbuticis & cachecticis subiectis, quo enim acridinis humorum gradus major, eo cura difficilius succedit. In adultis non tam facile, quam in pueris curantur hi tumores.

*Cura Dietæ.* §. 13. *Cura Dieteticam* quod concernit, his in tumoribus præcipuis, eo dirigatur *Dietæ*, ut obstructio facta tollatur, & succi liberentur ab acidis aliisque causis stagnationem succi inferentibus, ut ipsi statim liberius concedatur transitus per omnia vasa ac tubulos, imprimis per glandulosos; Aer ergo, qui ad *Dietam* pertinet, sit temperatus, purus & ab omnibus inquinamentis liber, vixetur frigidus copioso acido nitroso refertus, item nebulosus fuliginosus &c. Cibi sint optimi succi lacteiscentis copioso turgidi & volacili, fugiantur omnia acida, salia, muriatica, terrestria facile succos coagulantia, & ad stagnationem invitantia, potus sit ita comparatus, ut succi inde fluidiores reddantur, nec ullus ad hoc præstandum aptior exiter, quam potus calidus Theæ vel Coffæ, hinc siliam nostram à furunculis pluribus, aliis remediis nihil juvantibus, non ita pridem liberavimus; vel si placebit, talis calidus potus parari potest ex fumaris, epatic. nob. ex Enul. aliisque, vel Caffè. Vinum Gallicum vel Hispanicum modicè in prandio concedi potest, qui vero vino Rhenano assueti sunt, nec plane ab eo desuescendi; cum subita mutatio periculosa sit, sanguis enim ac succi nostri debent conservari iisdem particulis, quibus à prima nativitate nutriti sunt, hinc sanguis noster ac succi reliqui, amaris, salis, acidis, dulcibus volatilib. terrestribus, viscidis ac læxcentis aliis consistere debent, sed ne vel acidez vel salinez, vel aliæ in illis copiâ prævalcant.

Vigiliæ ac somnus, motus ac quies sint pro re nata legibus sanorum accommodata, neque excedant limites ordinarios.

Excreta & retenta quod attinet, ea semper more solito excreantur, vel retineantur, si obstructions vel alvi, vel mensium, vel lochiorum, vel hæmorrhoidum idones sollicitent remedia, hinc inde abundè, & ad nauseam revelatis.

Animi passionibus firmâ fiduciâ in Deum nostrum rationis freno regulentur, moror, terrore omnimodo exulent, ne ab his coagulentur succi corporis nostri, inaximi enim hi sunt coagulatores sanguinis ac succorum nostrorum, ceu experientia quotidie testatur.

§. 14. *Curationem* ita instituunt *Galenici*, in *Phygetlo*, attendentes, ad indicationes sequentes, cum cura ut sc. Magnitudo aucta tollatur, interperies corrigatur & pars corroboretur: his indicationibus satisfaciunt præcipue si ab externis causis oriatur malum: scilicet, si à peste, & febribus malignis: tunc enim periculosissimum dicunt affectum: quod si non obstat febris alienigena malignitas, à principio statim injecto enemate sanguinem detrahunt, & saburram corporis leniente pharmanam eadem cautione adimunt, & si abilit malignitas, Topica aliquantum repercutientia & refrigerantia applicant, oxycraurum linteolis calide apponunt, vel sanam succidam, oleo rosaceo, vel olivarum immaturarum omphacino dicto intinctam tumori obvolvunt. Si verò dictæ febris vel magna humorum copia, minime repercutiendum, sed potius discutendum esse præcipiunt: in quem finem sequens commendant.

℞. Fol. malv.  
parietar.  
alsines aa. Mj.  
Rad. alibee ʒj.  
Flor. mellil.  
hyperic.  
chamomill. aa. P. j.  
pulveriscentur vel minutissimè inciduntur, & cum li. q. aquæ in cataplasma coquantur, quod tepide applicetur.

Si adit durities, maturantia & emollientia laudant, & sequens præscribunt.

℞. Ferment.  
Caricar. aa. ʒij.  
Coq. c. s. q. hydromelisu, addendo  
adipis suilla ʒij.  
M. f. Cataplasma, cui add.  
Gumm. ammoniac. ʒj.  
Farin. bordei  
lini aa. ʒiij.  
Cum aq. in pulv. mixt. & calide applicetur.

Suppuratione facta tumorem aperiendum, dein mundificandum & carne implendum esse dicunt.

Quod si suppurantibus opus sit, apponunt fermentum cum caticis contusum & melle. Vel rad. cucum. asinini, lupin. & rad. cappar. excip. li. q. terebinth. &c. applicant in calid. ubi patientes aperturam pati renuunt.

Cura *Phymatis* in pterisque convenite ajunt *Phyma*, cum *Phygetli* im dicta: Topica debent hic esse talia, inquirunt, quæ naturæ motum sequuntur, quò enim natura vergit, eo per loca conferentia esse ducentia, ajunt, Mel, in quo dissolutum sit gummi ammoniacum, apponunt, ut emolliatur tumor, deinde suppurationi applicant.

T t t

Furunc.



*Furuncul.*

*Furunculi*, ad mentem *Galenicorum*, curantur 1. ordinatâ victûs ratione, 2. causæ antecedentis ablatione, & 3. conjunctâ materiæ correctione. Prima intentio, juxta ipsos, perficitur debita rerum sex non-naturalium administratione: Secundo satisfaciunt scopo, si fluxionem avertant venæsectione vel scarificatione, frictione, ligaturâ, motu &c. ultimæ verò intentioni satisfaciunt, si materiam non repercutiant, sed corrigant imposito fermento cum massiche, vel Empl. diachylum simplex.

Vel:

℞. *Mica panis* siliq. ʒiij.*Farin. sem. lini**senigrac.* aa. ʒij.*Caricar. pingv.**Fermenti* aa. ʒiv.

Coq. c. f. q. lact. caprini ad consistentiam Cataplasmatis: si dolor adsit, hinc addunt *rad. alibea lil. alb. & sol. malv.* quod si tumor apertus, mundificativo de apio abstergunt, item seq.

℞. *Succi apii* ʒiij.*Terebinth.* ʒij.*Vicell. ov.* N. ij.*Pulv. thuris* ʒiij.

Coq. ad aliqualem succi exhalationem, deinde add.

*Farin. hordei* ʒij.*Mell. rosat.* q. f.

M. F. liniment.

Dein ulcus implet &amp; cicatrizant.

*Paracelsi  
cura in  
hisc.*

§. 15. *Paracelsus* in curâ Phygeli Phymatis & Furunculorum Sonath commendat, cui virtus expulsiua inest, hujus enim virtute ac vi singula Apotemata pelli ait, quia hoc resolvit, mitigat, denique expellit Apotemata ex corde. Unâ etiam adesse, dicit, oportet Chirurgiæ Praxis, interuentibus Maturativis quibus in emunctorium redigantur tumores hi. Maturativa quoque cum attractivis ita conjungi vult, ut expulsiuum attractivum sequatur. Directo igitur Sonath in virtutem suam expulsiua sequitur Thyriaca, sub quâ delitescere contendit Arcanum in omni veneno propter virtutem ulcusurpandum.

*Helmontii  
cura.*

§. 16. *Helmontius* tumores hos non aliter curari ait quàm alios tumores, per intera a sc. sudorifica & Arcana sua, & diaphoret. &c. Inter externa magnificat axungiam leporis vetust. sanguinem hircinum, imprimis verò oleum strumarum.

*W. H. S.  
mouet en-  
randi Phyg-  
elion.*

§. 17. *W. H. S.* materiam in adenibus aggestam, & Phygelen in iis producentem ex partibus terrestribus crassioribus Sulphureis, & paucis aqueis illas diluentibus constitutam, ad supurationem redigendam incumbit, & internis sudoriferis & Martialibus, & quia materia valde compacta existit, fortioribus etiam maturantibus externis ad supurationem eam deducendam vult, in quem finem suadet ut foveatur statim Phygelon decocto sequenti:

℞. *Rad. alib.**lil. alb.**Fol. malv.**parietar.**violar.**branc. ursin.*

Coq. in 4. font. ad lbj. & decoct. tepid. bis in die foveatur tumor: post totum imponatur Cataplasmata sequens:

℞. *Resident. decoct. supra dict. in mortar. consus. & per cribrum stragel. q. f.**cap. sub cinerib. coct. N. ij.**Ol. lil. alb. q. f.*

M. F. Cataplasmata applicanda tumori bis in die.

Si hæc autem non suffecerint, imponatur tumori emplastr. de galbano, vel de gummi ammon. vel diachyl. magn. cum gummi. Abscessus deinceps aperiatur, & solito more tractetur ulcus.

*Phymatis* materiam temperationem fluidio-Phyma, remque facilius maturari ait Author, promptiusque suppurari. Sequens commendat Cataplasmata.

℞. *Mica panis**Uvar. pass. sine acin.* aa. ʒj.*butyr. recent.**axung. suill.* non salit. aa. ʒvj.*lact. vaccin.* ʒij.

M. F. Catapl. l. a. quod bis in die tumori imponatur. vel:

℞. *Farin. senigrac.**Sem. lini* aa. P. æq.*Decoq. in lact. vaccin. f. q.*

M. F. Catapl. f. ac fervetur ad ulum.

*Furunculum* verò maturari statim author suadet, imposito sc. emplastro citrino, vel aperiri ferro vel canterio. Evacuata autem materia absque Medicamentorum auxilio plerumque coalescere existimat, sed si sponte non consolidetur, imponi illi Emplastr. demeliloti, vel etiam tantillo balsam. Petuvian. illini jubet.

§. 10. *Sylvius* Phygelon cum Bubonem curat *Sylvius* discutientibus nimirum externis, item emplastris & unguentis emollientibus ac resolventibus, ut sunt diachyl. melilot. de gummi. Varia quoque Cataplasmata ex aromaticis, ac salibus volatilibus parata imponi jubet, si maturatus fuerit tumor, cum aperiendum esse præcipit maturantibus sc. ac rumpentibus, inter alia commendat fermentum cum caricis contusum, & melle mixtum sique impositum, vel in fortioribus aperiatur scalpello vel lancetâ in parte molli ac declivi. Apertum mundare jubet digestivo vel bals. ʒ anis. vel terebinth. Dein ad consolidandum Empl. diapompholyg. vel stictic. Crollii applicandû esse suadet.

Curam *Phymatis* quod attinet, *Sylvius* non ster eam cum curâ Phygeli in plerisque convenire ait, & Empl. diachyl. cum gummat. aliisque volatilibus concinnatum laudat, item mel in quo dissolutum sit gummi Ammoniacum, exinde equimillico emolliiri humorem hunc scribit, quem dein imposito bals. ʒ Terebinth. vel anis. mundificandum & iterum consolidandum esse Tyrones suos docet.

*Furunculus* etiam iisdem remediis curandus esse contendit, imprimis Empl. diachyl. f. commendat, vel seq.

℞. *Mica panis* siliq. ʒiij.*Farin. sem. lini**senigrac.* aa. ʒij.*Caricar. pingv.**Fermenti* aa. ʒiv.

Coq. c. f. q. lact. caprini ad consist. Catapl. si dolor adsit, hinc addi vult:

*rad. lil. alb.**alib.**Fol. malv.* aa. ʒß.

M.

Pro mundificatione sequens laudet.

℞. *Succ.*

℞. Succ. apri ʒij.

Terebinth. ʒij.

Vitell. ov. N. ij.

pulvis Thuris ʒiij.

Coq. ad alicuius succi exhalationem, dein add.

℞. resin. bord. ʒi.

Mell. ros. q. l.

M. F. linimentum.

Dein impleri iubet ulcus cicatrizandum.

**Cartesiani** talem nobis suppeditant *Phygetlon* vel *Phyma* curandirationem, quā impuritates ex intestinis eliminantur, ne succo chyloso & sanguini communicentur, hinc resinam Jappi, scammonium rotatum, & mercurium dulcem in usum ducunt, quibus si scorix crassiores ejectiones sunt, particulas acidiores & rigidiores obstructionem ductuum, glandulorum inducentes flectere, absorbere & per habitum corporis eliminare conantur remediis porosis, alcalici, fixis & nonnquam volatilibus, Ne nempe fumarizet, & cordii, bezoardico minerali, Sc. C. C. volatili, rob sambuci, Tincturā ʒi antimoniatā, vel infusis & decoctis ex lignis aliisque herbis sanguinem depurantibus, Ipsa verò hæc tubercula externis topicis attenuare, incidere, emollire & resolvere student, illito vel oleo amygd. dulcium cum oleo scorpionum, additisque guttulis quibusdam olei destillati anisi vel succini, misto, vel unguento dialtheæ & Basilico, vel inposito emplastro de mucilaginis, aut diachylon & de meliloto invicem mistis. Materia satis emollita tumorem aperiunt, & exempto pure ulcuscuius mundant unguento anreo, vel basilico & balsamo sulphuris, emplastroque dialtheæ, vel de gratia Dei ad optatum perducunt sanationem.

**Furunculorum.**

*Furunculi* curationem itidem emollientibus peragere tentant, qualia sunt Empl. de gummi Ammoniaco, sulphure, camphora, euphorbio & oleo petreæ, vel quod loquens exhibet formula.

℞. Pic. naval. ʒij.

Pyrethr.

Galban. aa. ʒb.

Terebinth.

Cera aa. ʒj.

M.

Materia suppuratam remediis corrosivibus separant, ulcus mundant, & sarcoticis explent. Recusante verò materia suppurationem, sectione cruciformi præmissa & cute sublata, materiam spatula separant, reliquias unguento Ægyptiaco, vel præcipitato, aut alumine usto abluunt, & ulcus emplastro oppodeltoch debite occludunt.

**Notissima** tertia de *Phygetli* cura Pharmacaceutica ac Chirurgicali.

§. 12. Quod *Nostram* curationem Pharmacaceuticam Chirurgicam tumorum horum attinet, *Phygetli* cura consistit in tumoris glandulosi deobstructione, quæ obtinenda est æque per remedia interna ac externa, interna egregia sunt incidentis, & dein diaphoretica sive absorbentia, inter incidentia hoc in tumore amara & tartarea meliora sunt, ex. gr. Essent. myrrh. cent. min. catd. bened. abissini, &c. inter Quæa liq. tetr. fol. ʒ R ʒ nostr. volat. ʒ. D-lat. Crem. ʒ. cum ocul. ʒs. hæc enim optime cum absorbentibus conjungi possunt, & sic una fideliter plures dealbamus parietes. Et cum sæpe aliquid maligni seu acrimoniae subest, hinc Diaphoretica non contemnenda sunt, imprimis Sc. C. C. volat. viperar. ex exuviis viperar. solum confectus, ~ viperar.

ex viventibus, viperis cum toto destillatus, salia volatilia oleosa, imprimis hic conducet internè ~ matricalis nostr. oleosus, egregium remedium in omnibus tumoribus. Externa etiam statim tumori apparenti applicanda sunt, hinc angue pejus repellentia ac alia refrigerantia fugienda, sed statim ad res solventia ac deobstructionem transiendum est: commendamus ergo statim ab initio seq. vel similem sortum, seu formā Cataplasmatinæ applicandum.

℞. Herb. salv. origan.

thym. cichitay.

malv. atripl.

alsines aa. Mß.

rad. alth. ʒj.

Flor. melior.

hyperic.

chamomill. aa. Piß.

bacc. junip. ʒj.

Coq. in vin. Gall. vel muls.

dein add.

~ matric. ʒib.

Fl. sambuc. ʒj.

Camphor. ʒiij.

℞. ʒi.

Vel spiritus matricalis cum linteis madefactis & quadruplicatis inponatur. Theriacum cum capsali cum effectu applicant. Imponantur varia emplastra, ut de Sc. C. diachyl. f. diaphoret. de melilot. de mucilag. omnibus verò præstat Empl. de Lablano cunctis tumoribus discutendis egregium Empl. Ut verò horum applicatione per aliquot dies continuatā, si tumorem facis magnus ad maturationem vergere appareat, quamvis hoc in tumoris genere rarissime fiat, maturantibus & suppurationem promoventibus succurratur; ita quando & ager dolorem lancinantem & pulsantem remittere, & quandam titillationem succedere sentit, & cedens mollities digitis, aliaque apparent signa perfecta maturationis & brevi futurae apertionis, nisi sponte rumpatur abscessus, à perito Chirurgo aperiendus est. & quidem lancetā, idque in loco declivi; factā dein apertione mundandum est ulcus & tantum exsiccandum, quod more solito cito curetur ~ calc. viv. ~ matric. vin. Camph. succ. hyperic. numeral. plantag. ~ Hni, aliisque balsamicis digestivis vel ungu. nostro balsamico, balf. de Peru, de Capivā, Tolutan. vel Chili, vel plumeola cum supradictis liquoribus & balsam. nostro divino imbuta applicentur tepide. Empl. divin. diachalcit. de plumbo stidic. oppodeltoch, vel polychrestum nostrum apponatur.

Cura *Phymatis* vix differt à cura prædicti *Phygetli*, gradu enim à se invicem differunt; internè ergo conveniunt incidentia, absorbentia ac diaphoretica, hinc inde aucteum dicta, imò vinum medicatum ex herbis & radicibus aliis quæ parata volatilibus & absorbentibus hic maxime convenit.

Cura externa eò dirigatur ut suppurationi promoveatur, quod obtineri potest, si externis impositis fermentatio succorum augeatur, in quem finem conducet ungu. basilic. externè inpositum, vel alia Cataplasmatina ex emollientibus parata, specificum in hoc tumoris genere habetur mel, in quo dissolutum fuerit gummi ammoniacum, si apponatur illic, à quo emolliuntur & apertuntur *Phymata*. Vulgus imponere solet mel cum farina subactum; apprimè convenit farina lini

T t c 2

melle

velle mixta. Dein aperti facillè entrantur impositis mundificantibus, & dein exsiccantibus jam superius dictis ex  $\Psi$ , & succis temperantibus paratis.

*Cura Furunculorum.*

In *Cura Furunculorum* èo respiciendum est, ut coagululum sanguinis ac succorum impediatur, & circulatio promoveatur, ne partes lutosæ alibi stagnare possint, quod obtinere possumus, si acidum in sanguine ac succis existens mortificetur vel absorbeatur, & dein sanguis crassius attenuetur, in quem finem absorbentia diaphoretica fixiora commendamus, imprimis verò sequentem pulverem ad  $\mathfrak{z}$ j. vel plus vel minus pro re nata exhibendum.

$\mathfrak{z}$ . *Ænis diaphores.*  $\mathfrak{z}$ ß.

*acul.*  $\mathfrak{ss}$  ppt.  $\mathfrak{z}$ j.

*alb. grac.*  $\mathfrak{z}$ j.

*Ebor. ppt.*  $\mathfrak{z}$ j.

*M. F. Pulv.*

Salia enim volatilia & alcalica hoc in pulvere contenta acidum apprimè temperant, prout hunc effectum in pluribus morbis, præsertim in Sodâ, vidimus. Hic verò effectus non tantum in primis viis percipitur, sed etiam in chylo ad cor tendente effectum hunc præstat. Profunt etiam hic omnia salia volatilia oleosa, huic Furunculis affectus semper exhibendæ sunt guttulæ aliquot salis volatilis oleosi, vel ~ catarrhalis oleosi, vel cephalici in vino malvatico, non Rhenano vel alio acido, quoniam cum hoc effervescens volatile oleosum figuram suam, & per consequens, vires suas amittit. Si hisce *Furunculis* non cedant, ad acidum magis temperandum, & sanguinem attenuandum ac incidendum sequens conducet decoctum ad  $\mathfrak{z}$ ij. ter de die exhibendum.

$\mathfrak{z}$ . *Rad. China*

*salsaparill.* aa.  $\mathfrak{z}$ j.

*bardan.*  $\mathfrak{z}$ ß.

*Lign. Guajac.*  $\mathfrak{z}$ iv.

*Bacc. lauri*

*Herb. verifmar.* aa.  $\mathfrak{z}$ ß.

*Fl. verbaf.*

*Citr. min.* aa.  $\mathfrak{M}$ ß.

*Herb. cochlear.*  $\mathfrak{z}$ j.

*Sem. anis.*  $\mathfrak{z}$ ß.

$\Theta$   $\mathfrak{z}$

*Æci* aa.  $\mathfrak{z}$ j.

*Æni crud.*  $\mathfrak{z}$ vi. in nodulo ligand. vini & servat. q. s. coq. & serventur colat.

Jucundius verò ægri curantur decoct. lignor. ac rad. chinæ cum Thée infus. & saccharo edulcorat. & more solito ex patellis absorpto. Hisce non juvantibus ad vinum chalybeatum accedendum est, & sequens commendamus.

$\mathfrak{z}$ . *Lima. Chalyb.*  $\mathfrak{z}$ j.

in vino optimo generoso vel Gallico vel Hispanico Mens. dimid. loco calido digeratur.

& patiens vitrum hauriat, & simul

Tincturam corallorum cum cerâ paratam nostram assumat, & interponantur salia volatilia ut C. C.  $\mathfrak{z}$ ci, de quibus de die  $\mathfrak{z}$ j. assumat. Hæc omnia sanguinem crassum attenuant, & acidum peccans temperant, quod semper in tumoribus hisce respiciendum est. Nec negligenda sunt Antimoniata Tinct.  $\mathfrak{z}$ ni  $\mathfrak{z}$ ß. aliaque alibi ad nauseam dicta.

Curatio *Furunculorum externa* itidem consistit in sanguinis lutosi ac ab acido coagulati ac

incrassati incisione & attenuatione, ut succi stagnantes ritè rursus circulari possint, & quoniam non multum fluidi in hoc tumoris genere reperitur, hinc particula Medicamentorû fores haud perturbare possunt, ex quo tarditas motus dependet. Ratio ergò æquè ac experientia Nos docet, quod ejusmodi tumores ope vehementiorum maturantium & fermentationem internam promoventium Medicamentorû curari ac auferri debent. Ut plurimum ergò in curatione *Furunculorum* animus dirigendus est ad ipsius massæ sanguineæ aliorumque succorum correctionem & emendationem, materia enim peccans, quæ adhuc cum aliis succis in sanguine commixta est, aniam dare potest novæ productioni tumoris, quod apprimè hic notandum est, si enim hoc non ritè observatur, per plures menses artus vexantur, prout experientia Nos docet abunde. Nec etiam ab initio ut in aliis tumoribus, discutientibus volatilibus discutere tentemus *Furunculos*, sed potius ad eos suppurandos nos accingamus, alias tantum detinemus materiam, quæ dein profundius excavat corroditque.

Ad maturationem ergò *Furunculorum* sequens Tyronibus communicamus remedium egregium.

$\mathfrak{z}$ . *Gumm. ladan.*

*Galban.*

*Ammoniac.* aa.  $\mathfrak{z}$ ß.

*Syrac. calam.*

*Pulv. rad. byron.*

*Herb. sal.*

*Sem. curmin.* aa.  $\mathfrak{z}$ ß.

*Resin. pini*  $\mathfrak{z}$ ij.

*Ol. Guajac.*  $\mathfrak{z}$ j.

*M. f. l. a. Ceratum mollius.*

Gummata enim, ex quibus constat hoc Ceratum, quia in se continent sal volatile acre, oleum & spiritus, maxime profunt, imprimis Ladaum, cuius oleum multum subtilius est quam galbani, prout ex suavi odore gummi hujus percipi potest, hinc sequitur ejusmodi gummi optimè particulas coagulatas & lutas discindere posse, quoniam materia subtilis aliter per commixtionem particularum gummi ladaui fluit, quam per gummi Galbani; reliqua quoque Medicamenta in Cerato hoc contenta in se continent Salia penetrantia & volatilia, item olea balsamica, sic & pulveres particulas suas salinas habent, quarum ope operatio Medicamenti hujus maxime promovetur, & inde necessàriò particula stagnantes ad motum intestinum seu fermentationem incitantur, hinc sequitur inflammatio, quam deini excipit suppuratio. Si dolor maxime urgeat Cerato præscripto croci  $\mathfrak{z}$ j. misceri possunt. Vel imponatur unguent. Basilicon. quod egregium est ad maturandos tumores, quoniam internum motum particularum ac fermentationem promovet. Si inflammatio sit vehemens. conveniunt Cataplasmata ex scord. menth. fl. chamomill. &c. parata, vel Theriaca vel Diafordinum formâ Cataplasmatibus imponantur tepide. Si jam maturatio & brevi futura apertio iuveniet, nisi sponte rumpatur abscessus, ferro aperiendus est, factâ dein apertione ulcus mundandum est à quacunque sorditie, imposito vel balsamo nostro digestivo ex myrrh. thure, aloë,  $\Psi$ . vitell. ov. Terebint. parat. pro re nata & ungu. Egyptiac. imponend. vel balsâm. de Peru, vel Chili, vel sequenti mixtura, quæ raro de effectu frustrabit

$\mathfrak{z}$ . *Aq.*

n. Ag. ʒj.

~matricul. ʒß.

Succ. hyperic.

nummular.

plantag. aa. ʒv.

Sal. hni ʒj.

M. quā mixturā plumaceola imbuta im-

ponantur ulceri, vel imponatur basilic. cum elix. &amp; diapl.

Empl. divin. vel sticticum vel calam. de tertia, vel aliud exsicicans imponatur. Pinguia in his aliisque angue pejus fugiantur, &amp; asterisco notandum Chirurgis in omnibus, ut omnia calide applicent.

## CAPUT V.

## De Ecchymomate &amp; Plaga.

## §. I.

**E**cchymosis cutis affectus dicitur, hinc varia sortitur nomina, *Ecchymoma* nempe, à Græco verbo *εχχυω*, vel *εχχυω* i. e. Effusio, Sugillatio, Suffusio, *naevus* i. e. Species Ecchymomatosis sunt Hypopyon & Hyposphagma, sanguinis sc. evalati concursus ad ungues ex plaga, de quo vitio de unguum affectibus in specie fusius dicemus. Huc referri possunt vibices, stigmata, peliomata, à fugigatione vel plaga (Germanis *Knippen* / *Pege* / dicitur) exorta. *Ecchymosis* ergo est affectio circa cutem & sub cute, qua sanguis à suis vasis per fissuras & rimas effunditur, nondum in grumos coactus, tandem tamen à stagnatione acidior redditus in grumulos abit, & partem livescere facit. Hinc jure meritoque vulgo dicunt Ecchymosin solutionem continuitatis cum contusione & ruptione vasorum sanguiferorum aliorumque conjunctam: alii Ecchymosin describunt, quod sit suffusio sanguinis in spatia vicina, unde pars affecta lividum sortitur colorem.

**Plaga.** Si verò hoc malum fit à contusione, fractura, lapsu vel alia causa violenta, *Plaga* dicitur, quæ verò sanguinis effusio à causa fit interna, nulla prægressa evidente causa violenta, *Ecchymosis* dicitur: quam verò veterum differentiam & distinctionem tanquam inutilem rejicimus, si enim vel ab interna vel ab externa causa producatur affectus, idem tandem affectus erit. Hinc iterum abunde patet. Veteres in nominibus excogitandis magis curiosos quam in aliis utilioribus explicandis fuisse. Sic quoque Molops, item vibex ipse nihil aliud est, quam cuius sugillata ex verberibus; idem significant stigmata ac peliomata.

**§. 2.** Pars affecta merito *Cutis* dici potest, quia in ea apparent stigmata illa; & cum Cutis rete mirabile variorum tubulorum & lymphaticorum, glandularum & arteriarum, venarum, nervorum &c. sit, nulli mirum videri debet, hanc eandem cutem & in ea vasa potissimum sanguifera pati debere. Quæ vasa sanguifera in cute vel sub cute latentia facili Marte eroduntur à causâ internâ, succis scilicet, acris, ac corrosivis scidentibus; vel aperiuntur à causâ violentâ, hinc non potest non fieri, quin evalatus ibidem jaceat stagnaque. & ob crassitiem minimos tubulos permeare, multo minus per cutis poros avolare nequit.

**Diagnosi.** §. 3. Affectus hic Sugillatio scilicet, nullis indiget signis, quibus dignoscatur, quam oculis, quibus se satis manifestat; sanguis enim ex contusis, erosis vel ruptis arteriis ac venis exsudans, ruborem, dolorem, inflammationem vel livorem excitat. Signa ergo Ecchymoseos sunt tumor molliis; lividus, quandoque cum, inter-

dam sine doloris sensu partes corporis nostri imprimis sub cute latentes occupans varias. A relatione ægri nosci potest, num à causâ violentâ, vel à causâ internâ producta fuerit Sugillatio. Livorem totius corporis periodicè recurrentem observavit Celeberr. *Carolus Raygerus*, testantibus *Ephemer. Germ. Nostr. Ann. 9. & 10. Observ. 3.*

§. 4. In eruendâ *Causa* Ecchymomatosis adscribunt eam *Galenici* sanguini evalato, cum caro ab aliquo pondere incidente contusa fuerit, venæque parvæ quæ per eam dispersæ sunt, ruptæ fuerint, sanguis profunditur, quali transeolans, isque sub cute collectus, juxta ipsos facit id, quod Ecchymoma vocatur, cute adhuc integrâ: rupta cum Ecchymosi h. e. sanguine, qui in loco contuso collectus sit, omnino fieri ajunt. Ecchymosis ipsis est ceu aliis effusio sanguinis subter cutem, quam ab omnibus causis fieri alterunt, quæ possunt exprimere sanguinem, à venis arteriisque extravalare, ruptis, erosis, apertis aut rarefactis eorum tunicis, & cutaneum aneurisma facere. Plagam dicunt eodem serè modo oboriri, quam tamen à causa violenta ut plurimum fieri ajunt, ut nempe ex acuto retulove telo, aliisque instrumentis.

§. 5. *Paracelsus* coagulationes sanguinis in cute vario modo fieri posse contendit, ut *transfusionibus, casibus, percussionibus*, vel in corpore vel in membris. Cùm aliquod membrum gravissimum percussione contusum fuerit, impossibile est, ut in eo fiat iterum naturalis unio læsi cum circumstantibus, quia, ut ille ait, mortem in se recipit à percussione vel trusione; at si percussionibus, trusionibus aut casu coagulationes intra corpus contigerint, sanguinem mox in putrefactionem transire ait, nam ibidem ac in membris extrinsecis tamdiu resistere non potest, ob internum calorem in corpore, sic in deterius pronum est, ut quicquid in eo læsum fuerit, mox in putrefactionem agi contendat.

§. 6. Secundum *Helmontium nostrum* Ecchymoma ac Plaga à causis variis produci potest, sæpissimè verò à plagis & percussionibus artuum & partium carnalium, hinc Ecchymomatosis causam in coagulatum & evalatum cruorem unicè rejicit, concretionem ac contusionem cruoris adeffe nullus dubitat, hinc ipsum cum aliis sub cute congelatum & nigricantem esse statuit.

§. 7. *Villisi* in Ecchymosis causa deducenda sequenti modo ratiocinatur: Sanguis in partium substantiam effunditur, & in eâ remanet, vel ob earundem partium contusionem, vel ob vasa aperta aut disrupta à cruoris acrimonia, vel ab eodem crassiore obstructa: grave siquidem corpus aliquod parti cuidam violenter

Ttt 3

applicatum fibras ejus vasaque sanguifera in eo dispersa comprimit, ipsaque sibi invicem propius adjungit, & coarctat, sanguis autem curriculum suum pergens, & per arterias ad locum contusum appellens, compressa vasa penetrare nequit, nullaque parente viâ, quâ ulterius progrediatur, in eâ parte ad quam pervenit moram facit, & in illâ stagnat, ac talis sanguinis effusio *Ipsi Plaga* dicitur. Disrupto verò apertove vase aliquo ab inscitâ sanguinis acrimoniâ, cruor in vicinas partes delabitur, ipsasque inundat; & quàm plus sanguinis ab arteriis deferatur, quàm à venis reportari possit, nec sanguis ab arteriis exiens, pari modo ac antea venarum oscula subeat, in parte, in quam decidit, aggeritur, & cessat. Si enim sanguinis quidam grumulus ad tenuiora partium vasa attingit, quæ ob eam, quæ pollet, molem permeare nequeat, in ipsorum limine hæret, illorumque officia obturat, eriorque indefinenter adventanti viam præcludit, ille verò in itinere suo impeditus in parte commoratur & retinetur, & hæc sanguinis extravasatio *Ecchymoma* denominatur, sanguine dictis de causis in parte quadam cespitante. Spiritus pernici motu agitati à reliquis principiis desciunt, & per poros volant: Sulphur verò spirituum consortio orbatum deprimitur, & crassescit, terreæque ac salinas particulas venis suis complectitur. Quum autem propriè dicta tunc existat principiorum residuorum confusio, nec ea sub exacto mixtionis vinculo à spiritibus contineantur, interstitia, quæ inter eorum particulas interstunt, irregularia existentia, plerosque lucis radios absorbent, coloremque subnigrum aut lividum exhibent.

*Sylvius.* §. 8. *Sylvius* Ecchymoseos & Plagæ causam, ut & omnis alius sanguinis effluxus dicit esse ejectionem valorum sanguiferorum qualemcumque, sive illa fiat à causa externa violenta, ut ictu, casu, contusione, vasa lacerante, aut ex nimia valorum à copioso, valde rarefacto aut retardato sanguine. Flatusque, distensione, sive ab humoris aut in vasis, aut extra ipsa subsistentis acrimonia rodente, sive à re dura & acuta vulnerante, obtusave contundente, aut plaga aut quovis alio idem contingat modo.

*Cartesius.* §. 9. *Cartesius* sanguinem è vasis suis intercutem & cuticulam effusum tanquam causam materialem proximam admittit in *Ecchymomate*, eamque effusionem, ob arteriolarum potissimum disruptionem contingere affirmant, vel ab interiori sanguinis impetu ex fortiori particularum angularium, cum porosus effervescencia orto, vel ab externa quadam violentia per contusionem, concussionem, suffigationem, unde *Plaga*, virgis factam cætionem, unde *Vibices* excitentur, inducta. Internam disruptionem plerumque arteriolarum & tubulorum quandam præcedere dicunt obstructionem, ob quam sanguis in transitu impeditus arteriolas nimium distendat, novus verò assiduò affluens, & priorum in angustiores ramum depellens, ostium aliquod nimis aperiat, ut portio quedam ejus cum succo chyloso nutritio in partem effundatur, ibidemque hærens suo volatili pedetentim destituitur, porosque obstruens globulorum æthereorum appulsum variè commutet, ut vel ad latera deflectantur, sicque livorem exhibeant, vel omnimodo suffocentur, & atrum quandam colorem præsentent.

§. 10. Cause ergo Sugillationis, me judice, *Noftrum* in duplici sunt ordine, duplicemque ejus constitutionem differentiam: causæ liquidem ejus sunt, ceu jam dictum est, *Externa* vel *Interna*. Prioris classis sunt contusio, fractura, lapsus, collisio, suffigatio, &c. & inde sanguinis effusio à causis istis producta veteribus *Plaga* denominari solet. Posterioris verò ordinis sunt tubulorum obstructionis & sanguinis stagnatio, hinc tandem facta disruptio vasorum, vel à corrosione humorum vel nimia horum distensione vasorum, illa sanguinis evasatio propriè *Ecchymosis* dicitur. Nos verò promiscuè affectus hos pertractamus. Partem cuidam infertur Sugillatio, cum grave quoddam instrumentum vehementius in illam impellitur, & ab illo canaliculi sanguinem deferentes validius premuntur, juxta se invicem propius adiguntur, & ab officiis suis sanguinem, quem continent, ejicere coguntur in partem, in qua terminantur. Sanguinis particularum ordo à fortiori ista pressione destruitur, ipsæ à se invicem dissepuntur, & illarum perit unio, materia ætherea partes omnes irrequite pervadens, ad sanguinem istum extravasatum appellens, & in particulis ejus alcalinas tenuiores, & ad motum aptiores æque ac in viscosas phlegmaticas impingens, ipsas ad exitum determinat, vel per reliquorum interstitia viam illis molitur; quum verò acida Sulphura, & crassiora alcalica motui sint minus idonea, in parte remorantur. Acida Sulphurum ramis intrancantur, eaque coagulant, quæ motu, quo à materia ætherea adveniente, & à spiritibus animalibus influentibus donantur, in tubulos angustiores, quàm ut liberum permittant illis transitum, compulsa in illis retinentur eosque obstruunt & impediunt, ne sanguis illos præterfluere valeat. At quum omnes partis tubuli vel canaliculi ab instrumento contundente non fuerint compressi, & strictiores tantummodo sint occlusi, aditque anastomosis inter vasa congenera, sanguis ab obturatis canaliculis in apertos deflectit, à quâ datâ porta ruit: quare ea non sit sanguinis stagnatio, quæ tumori elevando sufficit. Alcalia crassiora, quæ in parte stagnarunt, amplioribus gaudent poris, quàm ut acida, quæ illos subeunt, in iis coarctentur: quum ergo acida præ tenuitate sua latos alcalicorum poros facili negotio pervadant, nullumque adit materiz subtili adveniendi impedimentum, & ea libere per Sulphurum coagulatorum interstitia transire queat, rectâ tendit, neque vel minimam in sanguine turbam concitat. Quapropter contingere potest sanguinis extravasatio seu sugillatio sine subsequente inflammatione, attamen si contusio gravior fuerit, canaliculique ampliores & angustiores, ac profundius in parte jacentes, æque ac illi, qui in superficie sunt positi, supra modum compressi fuerint, & eorum parietibus atque poris validiore ista compressione propius ad se invicem admotis, sanguini non liceat per canales illorum iter facere, nec subtiliora alcalica in profundiori latencia evaporari queant, necessarii ut plurimum subsequitur inflammatio, quia alcalica tenuiora in parte retentâ delicatiorum acidorum spicula poris suis excipiunt, quæ cum ipsis remorantur, eosque angustiores facientes materiz æthereæ accedenti obicem ponunt, quæ in sanguinem reflexa, illum velociori agitatur motu. *Ecchymosis* propriè dicitur



dictæ causas internas asseruimus canaliculorum obstructionem, & sanguinis stagnationem accusamus, at quum sanguinis stagnatio ut plurimum à canaliculorum obstructione & ruptione producat, & canaliculorum obstructio à Sulphuribus viscidis coagulatis excutitur, unde eritatur Sulphurum coagulatio, timari operæ pretium est: eam autem emergere à sanguinea malsâ acidis à causis in Capite de Inflammatione allatis, satis jam perspectum dedimus: quæ acida, in Sulphurum ramis implicata illa coagulant, sed si delicatiora fuerint acida, subtiliora solum quædam sulphura cogent, quæ in minutiores grumulos à phlegmatis, quibus inartant conglobata, amphores canaliculos prætermeabunt, & in arctioribus tantummodo co-spiciantur, quare Ecchymosis, uti & Plaga, Inflammatione vacare potest, quod accidit pro obstructorum canaliculorum ratione, si nimirum fuerint latiores aut arctiores, in profundo aut in superficie collocati. Certum ergo ex his colligere est, sanguine liquore coagulato, ac hinc & inde à motu quiescente, Ecchymosin constitui. A coagulatis succis obstruuntur & ita comprimuntur, ut circulatio spirituum animalium, seu succi nervei impediatur, quemadmodum enim hypothesein de Circulari Sanguinis motu ab omnibus sanioris mentis Philoſophis ac Medicis receptam, & infinitis Experimentis atque Ratiociniis confirmatam novimus, sic quoque succum nervinum seu spiritus animales moveri à cerebro per nervosas partes, ab his per vasa lymphatica ad venas Subclaviam & Cor. hinc per arterias Carotides & plexum Choroidem ad glandulam Pinealem, & ad Ventriculos cerebri anteriores tres, per porositatem verò huius denud ad nervos. Alii supponunt, in plexibus choroidibus cerebri produci & in glandulâ depurari fluidum quoddam æreum simulque flammæum, quod ad nervos delatum nomine succi nervei aut spirituum animalium, sensum ac motuum eundorum in corpore nostro existat auctor, hoc verò fluidum si spiritus animales necessàrio circulari debere, i. e. ad principium suæ emanationis reverti, extra omnem dubitationis aleam ponimus.

*Prognosis.*

§. 11. Si levis sit Ecchymosis, nullum habent periculum, sed tantum deſecrationem Corpori inferunt. Sanguis sub pelle extravasatus vel insensibiliter discutitur, vel suppuratur, vel obstruendo nervosus tubulos Gangrænam aut Sphacelum inducit. Plaga à graviore contusione vel lapsu orta, ut & Ecchymosis in profundiore loco facta, subsequentein habent ut plurimum suppurationem, quam tamen Ecchymosin in manu dextra absque suppuratione vel ullo incommodo, & per 14. annos durantem vidi in generoso viro quodam hinc in oris commorante. Sic etiam partis affectu ratione sunt vel difficiliore vel faciliore; in pedibus & tibia difficillima curatu est si fuffuso imprimis in scorbuticis aut cachecticis, continuo enim madent partes, quam Ecchymosin in Nobili Aulico à lapsu graviore ortam per annum & ultra durasse observavimus; Ut plurimum remanent stigmata livida tanquam coagulati sanguinis testes.

*Dieta.*

§. 12. Nec Dieta in Sugillatione negligenda venit, aliis accedente succo nutritio acido acri ac terrestri affectus hic putius augebitur, quam diminuetur; eo enim collimandum est, ut suc-

ci omnes attenuentur & volatiliscentur, in quem finem Patiens acrem eligat calidum ac temperatum, frigidum ac pluviosum contra fugiat sollicitudinem. Conveniunt cibi evpepti, fluidi, aromatici ac Sale volatili turgidi, partim ut sanguis stagnans & evasatus attenuetur & resolvetur, humores incrassati obstructionem parientes incendantur ut melius fluant, & contra vitentur summo perè frigida, item salina, imutatica ac acida. Potus sit hic imprimis calidus Ther nempè vel Caffæ, vel alius herbe volatilis, cerevisia quoque variis herbis ac radicibus aromaticis maritata concedi potest, vel vinum Gallicum vel Rhenanum, modo fuerit oculis æ. maritatum, vel in quo bacce sambuci fuerint infusæ; vel cum sale volatili more solito in mensa assumi potest.

Somnus, vigilia, motus & quies, excreta ac retenta, animi passiones sunt pro re nata rationistrutina perpendenda.

§. 13. Cura Galenicorum in Ecchymomate & Plaga in eo consistit, ut concretus sanguis per halitum digeratur, idque celeriter, priusquam nigrescat, ab initio ergo si Ecchymosis magna est V. S. instituunt, & Syruptos, seu Julapia sanguinis coagulationem, seu concretionem, seu putredinem prohibentia propinant: uti sunt Syrupus de succo limonum, de succo acetosellæ, de acedine citri &c. Inter Topica commendant illi adstringentia, refrigerantia digerentibus admixta, ut calor partis umatur, & putredo prohibeatur, & venule sanguinem effundentes constriungantur, miscent itaque albumen ovi cum ol. rosato, & mediocri, adstringentetamen ligaturâ parti affectæ applicant, partem quoque in circuitu eodem inungunt oleo, & addunt pulverem rad. bryon. vel ros. rub. inspergatur, sunt etiam ex hoc grege, qui in principio Ecchymomata scarificant. Aliqui ex iis pellem arterinam recentem detractam, & adhuc calentem iisdem pulveribus & paucis sale pulverisato inspergunt, & contusis Ecchymosis atque laborantibus circumligant partibus. Alii ut tument ung. dialtheæ cum croco. myrrill. rad. bryonia vel ros. rub. pulv. partem sugillatam quoque foveri ajunt vino calido, in quo mel & sal sint dissoluta. Quod si Ecchymosis sit inveterata & radices egerit, raphanum contusum applicant, alii partem affectam lavant aceto calido vel decocto raphani cum vino facto, vel sequens Cataplasma:

℞. *Herb. malv.*  
chærsol.  
flor. chamomill.  
melilot. aa. ʒij.  
rad. symphit.  
altheæ aa. ʒij.  
succ. absinth. ʒiſs.  
vin. alb. q. l.  
M. f. l. a. Cataplasma.

Si malum ad maturationem tendat, hanc adjuvandam esse jubent, & dein ulcus detergendum & consolidandum.

Cæterum de numero Ecchymomatatum sunt quæ sugillata nominantur, & livores ex Plaga contracti; in quibus præter jam dicta conveniunt hydropiper unâ cum suo semine illitum, sugillata & humores qui obduerunt, discutit. Pellem autem pecudis recens detractam, eos qui flagris cæsi sunt, potius quam cætera omnia, uno die unaque nocte perlinare ajunt. Ranunculum quoque

quoque illitum, aut capparisi folia, aut cerussam cum aceto laudant. Oleum liliaceum continuè inunctum vibices concolores abigere non dubitant.

*Paracel.  
sum.*

§. 14. *Paracelsus* duas conditiones remediorum pro coagulationibus sanguinis esse arguit. Externarum hoc est percussionum vel contusionum remedium, ut locum oleo laterino perungas, postea liges cum aceto rosaceo. Non est, inquit, quod cæruleum colorem auferre cures, at resolvere, tum abeunt per se colores. Inter cætera quæ præstantissimum oleum ad omnia externa membra contusa fractaque, hypericonis depædicat. Itidem & olea vulneraria, balsama, & ex fodicationum emplastris tracta esse in usum, qui dictus est, utilia.

Ad coagulatum sanguinem intrinsecus multa recepta posse adferri scribit, & sic aliqua tamen corpora præstantissima, è quibus omnia constant remedia, inquit, quorum tradit sequentia selecta. ut sunt Rheubarbarum, sperma ceti, lacca, carbones tiliarium arborum, astrucium, vel branca ursina, aqua pæoniæ, endivie, bolus armenius, terra sigillata, hircundinaria, reupontica, lapatum majus, aqua valerianæ, Mumia, diagridium, agaricus, scolopendria, Ylópus, aqua cardui Maris, sal gemmæ. Omnes è iam purgationes aut laxationes coagulatum sanguinem pellere dicunt, cum aliud remedium haberi nequit. Locus etiam casus aut contusionis inungi debet prædictis medicamentis ad exteriora membra positus ad mitigandum. Clysteres quoque commendat juxta necessitatem. Mannam pariter esse excellentissimum hoc loco remedium ait. Animadvertendum vult, ne priusquam ad maturitatem pervenias, acerbis utaris medicamentis, at à micutione incipias.

*Helmont.  
ium.*

§. 15. *Helmontius* ad contusionem concretione nemque Cruoris absorbendam & dissolvendam commendat æque interna ac externa remedia, inter interna alius præfert lapides & ossifrag, in spiritu aceti resolutos & assimtos, item Diuretica ac Diaphoretica tanquam specifica remedia laudat, post volatilia ut ~ Q C. C. lignorum, Camphorata, &c. Sudorifera fixa extollit, ut & Mercurium Diaphoreticum, quo remedio plus quam centum hoc morbo affectos se felicitè curâsse gloriatur. Ejusque indolis Mercurialis habetur Rothmaleri particulare ex universali.

Inter externa Topica commendat rad. Bryon. alb. raf. & parti sugillatæ superimpositam, quæ Ecchymomati ac Plagæ, in qua cruor sub cute congelatus & nigricans est, cum paucis horis in aquam resolvit, eamque pariter per cutem exigit.

*Willisium.*

§. 16. *Willisius* sanguinis suffusionem quamcunque curat, ipsum congruatim blandè Diaphoreticis intro alutis dissolvendo, & spiritibus parti applicatis per poros discutendo; ultimi ordinis sunt spirit. Vini Camphoratus, ~ lavendul. flor. sambuc. Juniper. &c. qui juxta auctorem sanguinis stagnantis partes comminuendo, & in motum ciendo, porosque aperiendo, illum per insensilem transpirationem evaporare faciunt.

*Sylvium.*

§. 17. *Sylvius* sanguinem è vasis suis effusum, ac per vicinarum partium substantiam dispersum, li removeri queat, in totum aut ex parte quantumvis inde removendum putat. impediendo idcirco ipsius coagulationem, atque potenter dissolvendo partes ipsius crassiores sub cute latentes

& Ecchymosin efficientes, discutiendoque tenuiores, ac temperando insimul actiores, idque tam internis medicamentis, quam externis. Ad sanguinis ergo coagulationem quamcumvis impediendum Auctor commendat oculos & Ænium Diaphoreticum, Mumiam, sperma Ceti, Gum. Galban. Sagapenum, opium, cerevisiam Joppensem dictam, & sequentem præscribit formulam:

~ ∇ llyssopi.  
sanculi aa. ʒij.  
+ stillat.  
~ vini redif. vel cuspisvis  
Aromatici ʒij.  
ocul. & ʒj.  
sperm. ceti  
Mum. Alex. aa. ʒj.  
Land. opiat. gr. iv.  
Syr. s. rad. ʒij.

Hujus mixturæ propinat. Aëro cochleare upum & alterum, æquè in sanguinis effusi concretionem interna ac externa sub cute.

Parti affectæ inungit ungu. martiat. de Altheæ compositum, aliudve aromaticum quodvis, additis quandoque oleis itidem aromaticis, Laurino, Anethino, aliisve potentioribus aut stillatitiis Terræ, Terebinth. Succini, Laterino, &c. sed minori quantitate. Inter Emplastra aliis præfert Emplastrum de spermate Ceti dictum sequens:

~ Cera alb. ʒiv.  
sperm. ceti ʒij.  
Gum. galban. + dissolut. ʒj.  
M. f. Emplastrum,

per quod liquatum trahatur tela, fiatque vulgo dictum sparadrapum utrinque alternatim applicandum, quod egregium ad sanguinem in externis corporis partibus omnibus. Fotus quoque conducere posse ait ex plantis Aromaticis & potenter discutientibus, in aqua vinové coctis paratos, addendo subinde usus tempore aliquid spiritus vini. Ex. gr.

~ Rad. Bryon.  
Apis aa. ʒij.  
Filices,  
Fol. sambuc.  
Eupator.  
Cannab.  
Chamedr.  
Menth.  
Absynth. aa. Mj.  
Flor. melilot.  
Chamom. Rom. aa. Miß.  
Sem. cumini,  
Bacc. Lauri aa. ʒj.

M.

Crassè contusa omnia coquantur ex aqua pluviali, sed igne lento, atque vase clauso. Servetur ad usum, vel cum sacculus applicetur, vel potest pannus laneus vel sponsia mollis partem affectam tegere, apta Fotui calenti imponi, mox ex pressio liquore superfluo parti dolenti applicari, atque sicut modò dictum aliquoties renovari.

Ubi in talem, tamve profundum locum effusus est sanguis, ex quo citra suppurationem & Abscessum amoveri nequeat commode; promovendam fore ac accelerandam Paris confectionem ac generationem, in quem finem cum aliis Auctoribus Prædicis commendat medicame-

# CAP. V. DE ECCHYMO MATE ET PLAGA. 521

menta emollientia & maturantia vulgò dicta, radices & fol. Althex, Malvæ, lil. alb. branc. ursin. Atriplex, Mercurialis, &c. horumve farinas ut & hordei, caricas pingues, Axungiam humanam, suillam, pingued. Anseris, Gallinæ, vitulinam, &c. Ex his sequens parare solet Cataplasma:

℞. Farin. rad. alth.  
hordei aa. ʒij.  
fol. malv.  
branc. urfin. aa. Mijj.  
Sem. lini ʒij.  
Caricar. ping. No. X.

Cog. in igne lento ex aqua pura, cerevisia tenui, & tepidè applicetur.

*Cartesiana.*  
f. 18. *Cartesiani* ad auferendum *Ecchymoma* primariam curam eò locare solent, ut coagulatum resolvarur, attenuetur, & quantum possibile, in debitam redigatur fluiditatem, ut in venas resorberi queat, quod verò reliquis succis immisceri ineptum est, apertis poris ejiciatur, quapropter internè salibus volatilibus prædita exhibent sudorifera, subtilitate sua penetrantia, atque in membris hærentem sanguinem in crassatum non modò è quiete in motum provocantia, sed in motu comprehensum per patulos etiam meatus expellentia, quale sequens mixtura præbet remedium.

℞. Ag. Chærefol. ʒß.  
menth. ʒij.  
℥. lumbricor. essentificat. ʒj.  
℥. volatil. C. C. gr. iij.  
Syr. Hyperic. ʒiiij.

F. Mixtura duabus vicibus exhibenda.

Juxta sudorifera, & el post eadem usurpata, diuretica quoque prædita in usum ducunt, ad reliquas crassiores egerendas, quorum numero inferunt oculos ʒß. sanguinem hirci, ejusque sal volatile, sal succini, sperma ceti, rubiam tinctorum pulverisatam, vel decocti formi exhibitam, mummiam, camphoram, myrrham, spiritum florum sambuci, aliæque humores crassos resolventia. Externè ea quoque adhibent remedia topica, quæ poros aperiunt, sanguinemque concretum attenuant atque discutunt, ut succum raphani, mucilaginem radice sigilli Salomonis, & gummi tragacanthæ, aqua chærefolii vel liliorum extractam, aquam calceis vivæ, spiritum lumbricorum, &c, cataplasma ex farina fabarum, & aqua florum sambuci paratum, unguentum de cynoglossa. Abluunt etiam maculas lividas frequenius urina calida, vel loquenti mixtura.

℞. Ag. Sigill. Salomon. ʒijß.  
flor. fabar.  
geran. Roberts. aa. ʒj.  
℥. vin. ʒß.  
Myrrh. ʒi.  
Succ. ʒi ʒß.  
Camphor. ʒß.

M.

*Nostrum.*  
f. 19. Cura *Ecchymosæ* & *Plagæ* me Arbitro, eadem est, eaque vel interna est, vel externa. Interna medicamenta, quibus hic uti necessum est, sunt sudorifera ac attenuantia sanguinem congruatum resolventia, sicque fluidiorem reddentia, & sic conveniunt omnia ea, quæ in pleuritide & casu conducunt, ut sunt pulvis contra casum, sperma Ceti, lapis Irland. ʒn. Diaphoreticum, oculi ʒß. Sangu. hirci, cervi, terr.

Japon, mandibul. lucii, flor. papav. errat. & omnia absorbentia, Diaphoretica blandiora cum absorbentibus maritata optimè propiuntur. Volatilia quoque maxime profunt, quia sanguinem congruatum ritè dissolvunt, inter quæ ~ ℥. ʒci aromat. aliis præferimus, omnia enim alcalia sanguini stagnanti & quiescenti motum restitunt, ut sic melius fluidior nempe redditus à venulis resorberi queat. Imprimis hic conducet Mixtura Sylvii contra hæmorrhagiam sanguinis sæpe præscripta, sine tamen aceto parata cochleatum exhibenda. Vel sequens in juniorum tyronum gratiam præscribi potest formula:

℞. ∇ flor. sambuc.  
chærefol. aa. ʒj.  
menth. ʒß.  
~ ℥. ʒci anthosat. ʒß.  
matrical. ʒß.  
ocul. ʒß. pps. ʒj.  
Syr. papav. err. ʒvj.

M.

Vel in forma Pulveris:

℞. ʒn. Diaphor. ʒß.  
ocul. ʒß. pps. ʒj.  
Lapid. scissil. Irland. ʒij.  
℥. volatil. succin. gr. vj.  
M. f. pulvis. cuspidatum exhibendus.

Vel

℞. Fac. rad. bryon. ʒß.  
ocul. cancer. pps. ʒj.  
terr. Japon. ʒß.  
℥. volatil. C. C. gr. iv.

M. f. pulv.

Externè conveniunt ea omnia, quæ in Capite de Inflammatione retulimus, sanguini grumoso ac coagulato stagnanti dissolvendo eidemque discutiendo appropriata, ut sunt spir. vin. camph. crocat. cum ~ ℥. ʒci, cum calc. viva parat. mixt. & parti sugillatæ tepide cum lintheis duplicatis imposita. Huc pertinent varia Cataplasmata ex rad. Bryoniæ & herbis aromaticis concinnata, & calide imposita, nec negligantur suffumigia, quæ & sæpe graviores sugillationes citissime resolvunt. In contusione partium nervearum, & simul exorta Ecchymosi conducet Bals. Peruvian. in vicell. ovi & sp. vin. Camph. Matrical. dissolutus. Leviori in suffusione sufficit sæpe Emplastrum contra Livorem faciei

*Myrsichii*, vel sequens Parzi:

℞. Syrac. calam.  
Ladan.  
Benzoes aa. ʒvj.  
Majstich.  
rad. irid. flor.  
Bacc. lauri  
Cinamom.  
Caryophyll.  
Calam. arom. aa. ʒijß.  
Lign. aloes.  
Fl. Chamomill.  
Lavendul.  
N. M. aa. ʒß.  
Mosch. ʒj.  
Cera nova ʒvj.  
Resin. ʒij.  
Ol. rosar. q. f.

M. f. l. a. Emplastrum.

quod valde resolvit, ac fluidiora omnia reddit. Sic etiam quandoque sola bryoniana a parti affectæ seu sugillatæ imposita sufficit. Sequens

Uuu

vero

verò me raro fecellit, quoniam partes acidas congruatas maximè dissolvit attenuatque, acidumque temperat:

℞. *Myrrh. el.*  
aloes Epat. aa. ʒij.  
▽ *Regin. Hungar.*  
Elix. vita *Matth.* aa. ʒij.  
~ *Mattical.* ʒxx.  
Camphor. ʒijj.  
Θ *Hni* ʒß.

solve Myrrh. & aloen cum ~ *matticali*, & misce in vase clauso, & adde ultimùm Elixir vitæ & Camphoram, & cum spongia applicetur sæpius calidè, vel cum linteis quadruplicatis apponatur. Cùm autem hujus Spiritus *Matticalis* sæpius mentionem iniecerimus, ejus descriptionem hic dabimus.

℞. *Masticis*  
*Myrrha*  
*Oliban.*  
Succini aa. ʒijj.  
~ *vin. retif.* lbij.

F. Infusio.

dein destilletur, & dein cohobetur Spiritus, qui insigniendus nomine *Matticalis*, qui solus calidè applicatus Ecchymosin tollit.

In *Contusione* semen cumini cum Caryophyllis & rad. Sigill. Maris applicatum egregiè conducit, vel ablynthium in vino tostum & applicatum adhibent Nostrates. Alii solo ~ *tu vini* in quo Caryophyll. & N. M. fuerint infusa, ad illinendum vel applicandum utuntur. Omnia enim hic conferunt *Salia aromatica vegetabilia*, quoniam eorum spiritus, *salia volatilia* & *blea* operari, & externè apposita sanguinem resolvire debent, sequens ergo erit egregium.

℞. *Elix. vi. e* ʒij.  
~ Θ *~ caryophyll.* ʒß.  
*Mattical.* ʒß.  
▽ *flor. sambuc.* ʒij.  
Camphor. ʒijj.

M.

quod remedium omnibus contusionibus & sugillationibus applicari potest. Sequens nuper in oculi contusione & inde nata Ecchymosi oculi instillatum juvit.

℞. ~ *~ ci volat.* ʒß.  
matr cal. ʒiß.  
Θ *Hni* gr. iv.  
Camphor. ʒß.  
*Croc. opt.* gr. xv.

▽ *sanicli*  
*euphras.* aa. ʒj.

M.

In quacunque sugillatione sequens proderit Cataplasma.

℞. *Rad. sigill. M.*  
*uros fl.*  
*Sem. cumin.*  
*fenicul.*  
*herb. Salu.* aa. ʒß.  
*caryophyll.*  
*Macis* aa. ʒijj.

Coq. in Vin. Gall. & add. Panis biscot. q. l. ut fiat Cataplasma, quod calidè parti imponatur sugillatæ.

Si Sugillatio fuerit ex contusione fortiori, ex qua fit sanguinis valis suis effusio, debet discutiti & consumi per Sacculos discutientes ex ablynthio, malva, ruta, semperviv. fl. Chamom. sambuc. Θ *~ ci* & c. paratos.

In magnis sæpe contusionibus & plagis metuenda est gangrena, vel exulceratio, vel inflammation, vel abscessus, in quem finem ad hæc Symptomata impedienda nullum præstantius offendi remedium, quam sequens, nunquam me nec in desperatis ferè casibus defersens, quod junioribus Medicis communicare libet.

℞. *Summ. Absynth. Mj.*  
*Scordis.*  
*Marrub.*  
*abrotan.* aa. Mß.  
*fl. Chamom.*  
*melilot.*  
*sambuc.* aa. Pij.

*Concis. coq. ex decocto carum den herbaram,*  
*ut consistens. Cataplasma, acquirat, add.*  
*Farin. Hordei.*  
*lini q. l.*

Dein add.

Θ *~ ci depurat.* ʒß.  
▽ *Camphor.* ʒij.

Cataplasma hoc tepide applicetur, & effectus mirandos in Inflammationibus malignis, Punctura nervorum, Gangrenæ & Sugillatione percipies.

Sunt ægri, qui sæpe Emplastra exoptant, inter quæ aliis palmam præripiunt Empl. nostrum Cinnabarinum, de Labdano, de Cumino, de Spermate Ceti, de Bryonia, Diachyl. f. & pluræ alia alibi dicenda. Sæpe etiam sanguinem evasatum Scarificatione facili eximunt, & cutem defecratam illinunt oleo Talcii.

## CAPUT VI.

### De Erysipelate & Herpete.

#### §. 1.

Sanguinis aliorumque machinæ nostræ corporeæ succorum inotum, consistentiam & stagnationem, senè tubulis suis evasationem plurimum morborum esse causam, & exinde eam derivari & illustrari posse in confesso est. Causa enim morborum ut plurimum est motus sanguinis ac reliquorum succorum malè se habens, ut hic vel instar omnium sit, & facem in Pathologia præbeat radices lustrandi & symptomatum fontes. Nec minùs morbus excitat Motus Sanguinis ac Succorum Littoralis, quo alluitur ac litus Microcosmici, Cutem

neque, ex canaliculis plurimis & variis mixtæ contextam, ejusque glandulas minutissimas miliares dictas. Non raro huc fordes, quicquillas, & peregrina acida, acria, Sulphura & Phlegmata suis undis vecta expumat; frequenter æstum particularem huic illive affricat. Exemplo sit *Erysipelas* & *Herpes*, motui huic viciati debita, sive ab intrinsecò ardore & pustulis ad extimam vestem efflorescat instar rosæ, sive Solis calore incalescat pars, ut canaliculis ruptis humor insideat magis, & alci cum acido humori insitum effervescat.

Do

*Erysipelas.*  
*Herpes.*

De hisce dum agere impræsentiarum animus est, nihil dubitamus, quin hic affectus ferè in omnibus conveniant cum Inflammatione jam superius tractatâ, etenim gradu tantum differant, & non inconcinne Erysipelas, ut species Inflammationis minor consideratur, eadem enim observantur phænomena, & effectus à similibus præterpropter causas derivandi; Herpesque dici potest Inflammatio leviter exulcerata; quare tantum in eo differt, quòd humor seu succus magis acris, & non multo phlegmate refertus in minutissimis tubulis & canaliculis evasetur flammæque. At cum Auctores hanc jam triverint viam, eandem in juniorum Medicorum gratiam etiamnum sequi volumus.

Erysipel  
quid?

Erysipelas ergo dicitur & ignis facer, propter acriorem calorem, qualem ægri in ambustis sentiunt, hinc alius dicitur ignis Sylvæstris, quasi essetatus ob fervoris ferociam, Græcis affectus hic appellatur *φλγμεν*, ardor, Germanicè, *die Roste / das Rothlauff / das Heilige* oder Sancti Anthonii *Feuer* / nonnullis *die Schöne*. Latinis etiam dicitur ignis Persicus ferus: sed ad quem finem Veteres uni rei claræ tot imposuerint nomina, rationem non video. Erysipelas ergo est vocabulum Græcum, & originem suam debet nomini *ἔρυσ*, rubor, à quo *ἔρυσ*, rubet, & verbo *πλάσσω*, vel *πλαστός*, propinquo, ut ita denominationes hæc à Veteribus partim à colore, partim ab ardore deumpz videantur. Erysipelas est tumor seu rubor cutis aliarumque partium, à succis sale acris & pungentibus saturatis, in aliqua parte utplurimam subcutanea decumbentibus; cum maculâ rubrâ latâ dispersâ, & aliquando pustulis cum dolore exortis. Descripionem hanc quod attinet, licet non planè conformis sit præceptis Logicis, hoc nobis satis erit, Erysipelas ad Medicam clarè ac verè delineasse atem, hinc à nobis brevissimè describi solet, quod Erysipelas sit obstructio vasorum lymphaticorum capillarium in cute cum febre.

Herpes  
quid?

Herpes seu *Herpeton*, Latine quibusdam etiam Serpigo dicitur, itemculus serpinginosus, seu pustula serpinginosa. Duplex vulgo itatur, *Miliaris*, & *Ephemerus*, seu exedens. Herpes igitur describi potest, quòd sit Inflammatio exulcerata à sale acris & rodente, paucoque phlegmate soluto, in superficie partis alicujus sæpius cum pustulis & erosione cutis, producta. *Miliaris* ille dicitur, qui summam exasperat cutem, & sub epidermide consistit, exiguas illic pustulas producens, quæ minimùm exstant aut prominent, milio semini haud ab similes. Exedens seu ferus Herpes, ruptis pustulis veram exulcerat cutem & profundius hæret, serpitque in latum & altum sensum, multoque tempore emergit, pustulas monstrat aridas. Affectus diuturnus est, & febris utplurimùm expers. Siccis ille est, ubi nullum adest serum, humidus verò vulgo dicitur, qui sero irroratur multo. Sordidus verò Herpes dicitur, ex quo manat ferocitas quadam graveolens.

Parti affe-  
ctus.

§. 2. Subiectum principale affectuum horum sunt partes membranose & cutaneæ, & quoniam cutis ex innumeris canaliculis diversos vehentibus succos, componitur, facillè hisce affectibus obnoxia est, imprimis verò vacula lymphatica cutis superficiem perreptantia patiuntur, & læsæ perspicuantur, ex eo, quod Erysipelas

& Herpes in cutis superficie nascuntur; quod enim in Erysipellate vascula lymphatica capillaria obstruantur, & non sanguifera, ex eo patet, quòd in Erysipellate raro pus appareat. Lympha ergo quoad particulas suas rigidiores acresque peccat, quæ hic cumulatæ & sui juris factæ atque separatæ, affectum hunc producent. Si ex phlegmate acris interdum glandulæ minutissimæ, quibus cutis maximâ ex parte contextitur, obstruantur, & succus stagnans & evalatus mediante acido & alcali incalcescat, nonnihil elevantur glandulæ & tubercula minima seu pustulas cum rubore partis efficiant, quæ etiam ob modò dictam effervescentiam inter alcali & acidum multum prurunt, unde Herpes oritur.

Differe-  
ntias.

Paucis attingamus affectuum horum differentias. Differt Erysipelas ab Inflammatione, quoniam in hac calor adens est minor, quàm in Erysipellate; differunt à dolore, in Inflammatione siquidem dolor est comprimens & pulsans, in Erysipellate verò dolor est instar acicularum pungens. Sic etiam colore differunt, si premittit digito cutis Inflammatione obfusa, tunc permanet rubra, in Erysipellate verò albescit, & dein iterum rubescit. Tumor in phlegmone non ita à premendo cedit, quod tamen in Erysipellate observatur. Sic etiam tensio maior est Inflammatione, quàm in Erysipellate. Phlegmone in eodem quoque manet loco sine mutatione, sed Erysipelas facile serpit de loco in locum, & est instar ignis fatui modò in hac, modò in alia parte. Humor quoque Erysipelas producens tenuior est, quàm Inflammationis.

Diagnosi

§. 3. *Diagnosi* nunc affectuum nostrorum consideranda venit: incipit Erysipelas cum horripilatione, quæ nulla alia ratione produci potest, quàm ex nimia & continua agitatione particularum rigidarum, ex quibus acidum & alcali constituitur, hinc existimamus, rigidas particulas illabentes panniculo carnosio, cum titillare ac vibrare, unde horripilatio animadvertitur. Sic & sæpè adest capitis dolor ab eadem productus causa, nervosæ capitis fibras vibrante. Calor etiam intensior adest & volatilior, propter majorem istius succi obstructis tenuitatem, particulae enim alcalicæ & acidæ subtilis materiæ ope magis ad invicem colliduntur, hinc calor augetur. Adest quoque dolor instar acuum vel acicularum pungens, & quoniam particulae flexiles, ut oleæ & ramosæ ineptæ sunt ad dolorem hunc producendum, necessum est, ut particulae rigide continuo fibras nervosas vibrent, unde talis percipitur dolor, qui propter minorem tensionem tolerabiliorexistit.

Color rubicundior hoc in affectu apparet ex eo, quod sanguis præterfluens hic non tam diu stagnat, quàm in Inflammatione, sed cuticulæ magis appropinquat, hinc fibræ eodem liquore majori copia irrorantur, sed in Inflammatione profundius latet humor, adeò ut color nimis saturatus sit, quàm hic; & quoniam digitorum pressione succi isti stagnantes facillè ex fibris premuntur, & hæc exsuccæ redduntur, color ruber potest meliori jure adscribi texturæ tubulorum mutæ, unde radii luminæ aliter reflectuntur: color albus sub digitis apparet, sed remotis digitis, succis

Uuu 2 eundem



eundem locum petentibus, rubor denique apparere, ut ante; exinde etiam constat succos stagnantes minorem obtinere fluiditatem.

Tumor in Erysipellate non tam altè elevatur, idque ob minorem humorum coactionem & stagnationem, dein ob majorem fluiditatem facilius humor vasa perficit, huic tumor non adeo elevatur, nec tam rubicundus & calidus, uti in phlegmone apparet, hinc & ob humores istos magis & facilius transeuntes sanguinescentes minor est tensio, quam in inflammatione, in qua humor oblitans solidior ac crassior est, & sanguini minus cedit. Certum ergo est, quod in Erysipellate tumor non adeo est elatus, uti in inflammatione, sed calor intensior, dolor item acicularum instar pungens, & multum tolerabilior est. Color rubicundior est, & deservescens humore ad flavedinem magis vergit. Loos sepe mutatur & vaga est, nec tenuis adeo diffusus, cedit quoque prementibus digitis, & color rubescit in album mutatur, qui tamen, ceu jam diximus, illico rubescit. Febris quoque aliquando adeit, & comitatur Erysipelas, ob turbatam sanguinis mixturam & lesionem partem particularum.

Herpes ferè cum omnibus hisce explicatis symptomatis convenit, & in eo differt, quod Erysipelatis tumori accedant pustulae, & à rigidis particulis cutis glandulæ miliaris corrodantur, hincque parte ægra vesiculæ ac bullæ producuntur, ex quibus liquor salis & acris corrosivus parumque tenax emanat, quod Batavi belroos dicunt. In hoc affectu ergo adstant tumor latus & parte nexalperans, durities, dolor, sensus ultionis, progressus quasi in orbem, medio, dum extrema procedunt, lanefcente. Hinc affectus hic merito jure Erysipelas exulceratum vocari potest.

*Galienus  
tunc causam  
Erysipelatis.*

§. 4. *Ætiologiam* instituitur, præmittimus aliorum iudicia nostrum, & quidem agmen ducunt *Galienus*, quorum de causis Erysipelatis hæc est opinio, quod originem sumat ex sanguine fervente ac tenui, ex sanguine scilicet ac bile, quum enim sanguis superat, inflammationem Erysipelatiformem: quum flava bilis, Erysipelas inflammatum appellant. In communi verò, tumorem ex sanguine ac bile calidioribus factis productum Erysipelas nominant. Sunt qui causam bilem alimentariam dicunt non excrementitiam, (quæ tæterum absque febre generat,) à calidis visceribus, motu, tempore æstuoso, cibo, potu calido, &c. generatum.

*Herpetis.*

Herpetis causam dicunt flavam bilem citra alteribus humoris admixtionem secretam, in parte aliqua consistentem, & liquidam bilis crassior fuerit compage, magisque acris, totam cutem usque ad subiectam carnem exulcerat, & hinc ab ipsis vocatur Herpes adedens. Si verò tenuis & minus acris ac calida, bullas parvas in summa cute excitat milio similes, & miliaris Herpes ex similitudine dicitur; verum ex *Oribasii* sententia, putat eum cum flava bile mixto miliarum Herpetem facit. Causam Herpetis remotam & externam dicunt omnem, quæ bilem producere valet, ut aer calidus, cibis & potus calidus, &c. interna verò sunt dispositiones viscerum calide, conjuncta autem est bilis sincera & ardentissima, quæ ob tenuitatem partes carnosas transiit, & cuti tanquam subiecto densiori adheret, illamque corrodit. Quamvis tam Her-

pes, quam Erysipelas, à bile fiant, in hoc tamen differre ajunt, quod hoc fiat à bile alimentitia, ille verò à bile præternaturali, quæ dum magis fera & acris est, magis depalcitur, & vocatur Herpes exedens, & *causam* ulcera faciens: in hoc etiam differunt Herpes & Erysipelas, quod ille sensim, hoc verò derepente invadat: quod ille sit cum prurigine: hoc cum dolore.

§. 5. *Paracelsus* Erysipelas esse consumtum sal vitriolatum, hoc primum in rubedinem & corrosionem, postmodum in ulcerationem transiit; *opinio de causa Erysipelatis.* locum ejus esse ut plurimum inter genua & calces circumcirca cruris ibidem esse morbum Mercurialem dicit, & quamvis vitriolatum sal morbum efficiat, est tamen ipsa minera Mercurialis tantum, à qua proprium recessit balsamum, & liquor salis, ejusque species pro quantitate recessus demonstrantur.

Petiscum verò ignem esse sulphureum corpus, accensum, quod ex suo transformatum est illud cum omnibus speciebus sulphuris, & est calx viva sicca, & calx viva liquida, quæ suam accensionem à liquido sale recipit, postmodum urit, consumitque membrum penitus, uti calx cadaveri aliquid.

Herpetem verò Mordacem vel Esthiomenam, *Herpetis.* vulgo lupum oriri ex sale Mercuriali tantum contendit Author, ejusque centrum figi, ubi defectus major fuerit: & quamvis adscribitur hepatis, vel per ejus curam procedatur, morbus tamen eam per se reculare afit. Fixum quoque esse, & in circumferentia centrum suum coagulare intrinsecus ad os fodiens, urere, callososque nodos tandem procreare usque ad mortem, arguit. Vidi puellam 20. annorum Herpete exedente laborantem & quidem in mamma sinistra circa papillam tres digitos exedente, quæ crustacea dici potest, jam ultra triennium hoc malo fuit afflicta.

§. 6. Erysipelas Helmonticetiam vocatur *Helmontis opinio de causa Erysipelatis.* Aposlema igneum, unde Author hic de ipsius causa ratiocinans supponit fingitque. Archeum aliquod in parte ultimæ digestionis famulante conceptum doloris signa inique ferentem, ac velut furore percitum Erysipelas suscitare. Unde in Erysipelate venenum aliquod ideale ab Archeo natum esse contendit. Frigus quoque in solium modicum, non tamen rigorem in initio Erysipelatis obvenire ait, quia acor halituosus adhuc modicus est: qui dum ad corporis superficiem pertigerit, extra proprium sui diversorium ibidem accescit atque putrescit. Hinc saponariam & lixivialem medelam exstinguere Erysipelas arguit, eo quod in lixivialibus omne acidum commoritur. Febres enim continuas ab intus detenta aciditate similiter primum rigere, & in finem live consumptionem usque postmodum æstare comprobant. Aciditatem ergo vaporalem pervadentem in Erysipellate corporis penitissima acidum esse humorem nullus dubitat, imprimis hoc demonstrat exemplo, quod saponariis aliisque lixivialibus acidum domantibus miscetur remediis. Gustu etiam comprobant, liquorem illum ex Erysipelate emanantem non esse amarum seu bilem, uti Veteres existimant, sed acidofallum, hinc Erysipelas produci ait à spiritu vitali alcalificato. Causa Erysipelatis occasionalis est sal quoddam acidum, si hoc copiosius abundat, Archeum in tantum lacessere potest, ut is partem aliquandam gangranet, vel etiam fieri potest

# CAP. VI. DE ERYSIPELATE ET HERPETE. 525

potest salium corrosivorum incensio in particulari membro, ubi affluente latice & cruore pars intumescit, & Archeus partis rebellis existit.

*Herpetis.* In *Herpete* seu igne *Persico* sal causticum de sorte alcalium pro causa allegat *Helmontius*, relictique Galenicorum causam, quam de amaris & bile fingunt, quapropter effectus maximè ignei in corporibus existunt. Ridet frustaneum bilis commentum, cum præsertim, qui ignis indolem imitantur, minimè sint humoris bilioli clientes.

*Ursula re-*  
*incensio de*  
*causa Ery-*  
*sipelatis.* § 9. Juxta *VVillisium* exoritur *Erysipelas* à sulphure extratemperiem ordinariam evedto, cuius particulæ quædam cum aliis principiis congeneres non existentes, & cum ipsis fororiari non valentes, à mixtione solvuntur, effertæque evadunt, & sanguinem exagitant, ac conturbant. Dominium itaque obtinentibus sulphureis particulis, laxataque cruoris compage, spiritus volatæ, sugescitque liquoris sanguinei sctorum atque excalescencia, sulphure à spiritibus nullo modo amplius contemperato. Circulante itaque sanguine, funduntur illæ sulphureæ particulæ sibi invicem impingentes simul coeunt, & uniuntur, majoresque hac ratione vires acquirunt, & sanguinis incendium intendunt, sed quàm ad angustiores quosdam tubulos pervenerint, quos ob crassitatem percurrere non possunt, in eis commorantur & aggeruntur, adustionisque sensum excitant, & adaucta indefinenter earum aggerie, ad superficiem usque propellantur, cutemque diducunt, & in tumorem elevant. At quàm eodem impetu semper agitentur, nisi cito compellatur ipsarum conflagratio, repagula à quibus cohibentur, effrignant & disperdunt, partesque, in quibus continentur, excurrunt.

*Herpetis.* *Herpes* ex *VVillisii* sententia producit, quando scilicet sal in sanguine luxuriat, vel summo jure potitur; quomodo siquidem sal uberius ab alimentis massæ sanguineæ supeditatur; vel ob pravam digestionem rite non exaltatus, crudiorque remanet, aut dissipatis depressisque spiritibus ab aliis dissociatur, fluoremque assequitur. Salinæ itaque particulæ exterorum principiorum jugo solutæ unâ conflunt, & per totam massæ sanguineæ compagem sese explicant, atque ob eam, qua gaudent, similitudinem, unâ coeunt, & conjunguntur, cruorique acido-salsam diathesin communicant. Sanguis enim universas corporis partes pervagans, ad superficiem advectus, salinas illas, quibus infestatur, particulas humore lymphico dissolutas in glandulis cutaneis; in quibus omnia recrementa sua deponere assolet, relinquit; Pori verò minimarum istarum glandularum arctiores existentes, quamvis lymphæ huic à salibus copiosioribus viscidiori factæ exitum præbent, eam in sinu suo retinent, illaque plus nimio saturati obstruuntur. Salia autem ista ob varias, quas inter se fecerunt, concretientias, & plurimas terrestres particulas, quas secum abripierunt, majorem acquirunt molem, glandularumque substantiam, in quibus exsistunt, in tumorem extolunt. At salium spicula utut ab admixta terra obtusa, per poros cutis, cujus fibrillas vellicant & dilacerant, foras prominent, & pro intensiori remissiorive acedinis gradu dolorem aut pruritum excitant, & cutem exesam in squamulas discindunt.

§ 8. *Erysipelas Sylvium* cum *Galenicis* à bile putra deducti, ubi scilicet bilis sine sanguine in partem aliquam effunditur aut erumpit, illamque acrimonia sua vexat & male afficit, ac ex conflictu dolorem excitat in parte sensu prædita, ubi enim sensus major non est, ut in parte carnosa, juxta *Ipsam* corrumpitur & mortificatur ea nonnunquam sine ulla sensu. Ortum quoque *Ipsi* videtur *Erysipelas* ab humore biliolo & lymphatico vel pancreatico acerbis, & vitiose in corde simul effervescentibus, febrimque producentibus, arctiusque inter se, ideoque laxius sanguini jundis, atque cum ipso tamen quaquaversum propulsis, & facile in corporis superficie, ut & alibi foras harentibus, ibique tumorem levem, ardorem autem ac dolorem magnum *Erysipelatis* nonnum notum excitantibus. Si tumor hic amplius ibi corruptus, ab externo frigore imprudenter admisso repellatur ad interiora, & sanguini admisceatur, vel non satis medicamentorum externorum ope via ipsi sternatur ad exitum, nec interiorum opera propellatur idem foras, juxta *Ipsam* gravius producit febris cum delirio, & sæpe mors sequitur ipsa. Humorem enim hunc, & de bile maxime participantem, ad corporis superficiem propulsus, magis à temperie sua degenerantem & actiorem factum, non sine summa sanguinis noxa eidem admisceri, unde mox ardentem produci febrim, & effervescentiam nocentem in corde ante omnia cerebro, animalibusque functionibus advectam, quas mox ita turbat ac confundit, ut sensus externi vacillent, interni delirant, annuque motus turbentur atque ac motus corporis animalis. Bilem actiorem sanguini adulam delirium excitare in febre tam inter mittente, quàm continuâ, asserit *Auctor*. Hinc in *Erysipelate* retroactio post turbatam mentem mortem in se jam delatante, & medicamentis præpostere utente *Noster* se scribit observasse.

In *Herpete* verò bilem actiorem ad corporis *Herpetis*, superficiem, cutem & delatam accusat *Sylvius*, quæ ibidem existens bilis cuticulam corrodit, vesiculasque producit.

§ 9. *Catechani* à terrosiori succi chylosi liquore in cute molliori subsistente, & coagulato, tumorem illum superficiem produci referunt, quem *Erysipelas* vocant, partesque hujus liquoris acutiores subtiles, siue salinas à materia æthereâ celerimè agitas, fibras cutaneas & nervosilas tenuiores vellicando dolorem aliquantum utentem excitare & ruborem. Retineri verò particulas istas sub cute arguunt obpororum ejus occlusionem & tubulorum obstructionem à liquore incassato, quàm incapsulationem interdum ab externo frigore induci norunt, ob quod in ductibus lymphaticis liquor iste in motu siue fluore suo impediatur, sed quia ob subtilitatem à calore superveniente liquor hic facilius resolvitur, quàm chylius crassior, expropter etiam contingere asserunt, ut *Erysipelas* ad loca vicina migret, fluit enim aliquantum lymphæ ista à priori coagulatione resoluta ad tubulos proximos, sed cum volatilibus salibus sit destituta, in pristinam coagulationem facile relabatur, & in tubulis istis, ut in prioribus, dagnat. A vi acidioris potu largiori & ira affectum hunc suscitari norunt, quod lymphæ à priori non modo in copia augeatur, sed multis etiam particulis acutis, & cuspidatis repleatur, quarum mucroneas

*Incensio Sylvium causa Erysipelatis.*

*Catechani tumorem & incensio de causa Erysipelatis.*

in fibris cutaneis & nervosis facillè hæreant, & poros obstruendo insensibili transpirationem impediunt, unde lymphæ diutius hæreat, & quietem acquirat, quæ sola coagulatio ista producat. Ob excaulescentiam & iram succos omnes & maxime lympham turbati, particulas angulares à reliquis segregari, & majori copia ad partem aliquam unâ cum lymphâ transmitti dicunt, quandoquidem ob vindictam liquor nervosus impetuosiùs ad membra externa, seu executionis organa, influens, lympham in vicinis tubulis simul propellat. Arteriolæ à lymphâ hac in tubulis cutaneis stagnante compressæ sanguinem in exterioribus suis ramulis diutius detinere æstimantur, cujus rubor per cuticulam transpareat. Interdum una in parte tumorem hunc abire, & in alia etiam remotiori de novo exsurgere propter æstimant. quod lymphâ ista resoluta in massam sanguineam refluxerit, at nondum ab acutis istis particulis salis liberata, circuitu sanguineo in aliam partem effusa, eandem obstructionem & fibrillarum excitet agitationem. Pullum in tumore non abesse existimant, quod minores tantummodo arteriarum ramuli, non verò majores earum trunci comprimentur. Tubulos etiam quandoque ab acutioribus particulis nimium agitatæ serodi, aut à succis impetuosiùs irruentibus dirumpi credunt, unde pustulæ exsurgunt. Quando verò contingat, ut succi quidam lutosi viscosi ex chylo crassiore subsequantur, & tubulos quosdam sub cute obstruant, Erysipelati simul ædem quoddam adjungitur.

*Herpes.*

A succo quodam multis particulis angularibus imbuto, sive acido glandulas cutaneas obstruente, easdemque in tubercula quædam distendente *Herpetem* oriri volunt, quandoquidem lymphâ acidior & crassior in glandulis stagnans easdem in granula quædam duricula disponat, unde *Herpes miliaris* vocetur, sed à materiâ subtili interdum commota fibras vellicet, & pruritum provocet, ad quem sedandum si homines cutem scalpant, cuticulam abradi referunt, cannalesque ita apertos assiduò liquorem quandam oris instillat effundere, qui particulis acutis erodentibus prædictis vicinas fibrillas cutaneas exedat, sicque intra serpat, donec tubercula invicem proximè jungantur, & cutis valde destruitur, & in formam crustaceam mutetur, cum amissis particulis lubricis anguillarib; volatilibus liquor remansens perquam immassetur, & tandem ratione particularum erodentium partes subjacentes musculosas non minus destruat & exedat, ut profunda quandoque effodiantur foramina.

*Notæ sententia de causa Erysipelati.*

§. 10. Glandularum miliarium seu subcutaneorum pensum est tantum à sanguine separandi ac fecernendi acidis à tenuiorum alcalicorum cum subtilioribus acidi coaliu genita, & in phlegmatis dissoluta quibusdamque sulphureis allocata, quando verò in sanguine existunt abundantiora acida, eorumque spicula æquo sunt longiora & rigidiora, copiosiora iis imprægnantur alcalica, & salia quæ ex mutuo eorum connubio emergunt, propter longiores, quibus gaudent, aculeos ad motum sunt ineptiores, & obtusosdem turbato sanguinis mixtura, quod in quibusdam feminis instante menstruatione, (imprimis si salinarum vel acidarum particularum ad reliquos sanguinem & humores constituentes proportio non fuerit debita,) manifestissimum,

turant, ac sanguinem reliquosque succos in circulo suo retardant; salia jam dicta ad easdem glandulas pervenientia, & in earum tubulos se infinnantia ob spicularum, quibus horrent, longitudinem, illos præterfluere nequeunt, & in ipsis cespitate coguntur, sed quàm in continuo motu versentur, tum à materiâ æthereâ, tum à spiritibus animalibus, tum à subtilioribus sanguinis in viciniâ circulantibus partibus, aliorumque succorum communicato, & serie perpetua ab aliis à tergo subsequenibus compellantur, & altius adigantur, aculeos suos parietum tubulorum poris infigunt, fibrillas illorum dividunt & dissecunt, viamque sibi sternunt ad cuticulam usque, quæ cum densioris robustiorisq; sit texture, illorum acutiei resistit, ipsaque sub se reprimunt. At cum in desinens sit saltum istiusmodi à sanguine secreto, & in glandularum tubulos amandantur, per quos ad cuticulam accedant, priorum ibi commorantium copiam adaugent, cuticulam distendunt, eamque in vesiculas aliquando elevat, distentæ cuticulæ pori acutiores sunt, difficiliorque eo patet salinis particulis exitus, paucioresque hæc de causâ exhalantur. Sub cuticulâ ergo coërcitæ, & perpetuo motu agitatæ spiculis suis cutis ac cuticulæ fibrillas violentius impetunt, ac spasmodicos motus illis inferunt, unde dolor, qui in Erysipelate percipitur, & exulceratio, quæ sublata cuticulâ interdum apparet. Certum ergo est, quod vascula tenuia lymphatica cutis affecta seu rupta sint in Erysipelate, in quâ non adest tantus tumor, quæ lymphâ lætenuis est, hinc fluidior pars facilius per vala lateralialia delabitur, hinc non tanta congestio, neque pus generari potest, quia non plures chylosæ particulæ admixtæ sunt humori evalato; ratio est, quod humor iste in minimis istis tubulis pauciores tenaces particulas chyli in se continet, nec tubuli chyli ferè majores rupti sunt, sed tantum minutissimi. Atque hac ratione lymphâ hæc affecta facillè à causa quodam superveniente resolvitur potest, sicque petit hæc in parte Erysipelas, verum ubi hæc materia soluta pervenit ad sanguinem, febri, h. e. levem secessionem particularum sanguinis excitat. Et cum tubuli cutis non sint ejusdem magnitudinis, quippe in facie sunt minoris Diametri, si illic alluit, facile pedem figit, sicque reproducitur Erysipelas, sentitur pruritus, quia in hoc lymphæ inflammans quædam superest fluiditas, hinc partes salinæ à se invicem dissociatæ sunt, & quasi quælibet particula salina seorsim ab æthere agitur, sed collectis vitibus uno impetu non possunt ruere in fibrillas nervæ easque dilaniare.

In Erysipelate ergo, cui dictum est, afficiuntur exigua cutis vascula lymphatica, continentia lympham prægnantem non minus cujuscuque generis acutis particulis, sed non adeo ramolis viscosis chyli obvolutis, sicuti in majoribus cutis inferioris, carnis, &c. tubulis in inflammatione contingit, prout eorum tubulorum textura magis vel minus compacta dilatari nescit, & Diameter exigua est, facillique oboritur Erysipelas ab externa causâ, ut frigore, incarcerata lymphâ, vel ab interna aliquatenus tantummodo turbata sanguinis mixtura, quod in quibusdam feminis instante menstruatione, (imprimis si salinarum vel acidarum particularum ad reliquos sanguinem & humores constituentes proportio non fuerit debita,) manifestissimum,

*Intus.*

In tumescencia & resistentia in Erysipelate minores sunt, quàm in Inflammatione (ratione molis & inherentiæ utriusque habitæ,) cum ibidem & tubuli minores sint, & materia stagnans non adeo copiosè congeritur, & fluidior facilius per vasa lateralia delabitur, nec tantam (licet promptius) succipit fermentationem, hinc est, quod acutæ, acidæ, &c. ab æthere transfluente adactæ singulæ seorsum ob intermixtum fluidum impingant quidem in fibrillas tubulorum, non autem tanta vi dissecantur, atque ad rupturam usque distendant, ut in Inflammatione, hinc pruritus potius, quàm acutus doloris sensus percipitur, ardor autem major lenitur, tum quia morbosum cutis rete proximam est, tum quia ab ætheris celerrimo interfluxu materia hinc fluidior, promptius ejus agitationi obsecundans, nervulos magis afficit: adhæc color rubens, cum ejus causa non tam altè lateat, vividior apparet, dependens cum priori phænomeno ab eodem ætheris celeri transitu: abit autem faciliusque redit, eodem vel alio color vagabundus loco, in Inflammatione permanens quoniam obstructio à particulis aliquatenus adhuc fluidis & lubricis orta salis rigidæque à poris educentibus, accedente majori earum ab æthere agitatione, ignisque à corde impulsu vi facili solvitur, quod cum sit, materia ex obstructione in sanguine turbas excitando secessionem leviori causatur, qua particulæ extra debitam unionis spheram ejectæ, cum sanguine per universum corpus distributæ, eodem si illuc propellantur, vel alio in loco hærent, cum textura vasorum cutis & epidermidis ubique fere sit consimilis, ac proinde æque alibi, quàm ubi soluta est obstructio, reproducitur Erysipelas: exstillas autem, si erosi fuerint tubuli, (ut aliquando fit in Erysipelate faciei nomine bellæ rosæ insignito) non pus, ut alibi eruptis tubulis chylolam sanguinis portionem continentibus: sed lymphæ acerrima subiectas partes excoriat; quando verò innumere adfunt & exiguæ pustulæ, videntur glandulæ miliaræ cutis vel obstructæ, vel immodè erosæ, quæ si imprimis in infantibus à frigore (ut in aliquibus sudantibus ab impedita transpiratione mox pustulæ oriuntur,) obstruuntur & dem eroduntur tubuli, exstillas lymphæ vel ichor quidam tenuis iuxta roris, quæ species Germanis Thall-Murm vocatur. Ex hisce prolixius deductis abundè constat, causam Erysipellaris Inflammationem quandam esse obstructionem. Causæ remotæ Erysipelatis sunt vulnera, contusiones, exulcerationes, calor ignis, vel Solis, vel abusus frigidorum ciborum ac potulentorum, ex quibus faciliè causa interna oriri potest, nempe obstructio à lymphæ in tubulis minimis cutis intrallata & stagnante.

Causa  
Herpetis.

Quod à contingat, ut vascula cutanea erodantur, humor qui effluatque acrimoniæ suæ salinæ excedit partes circumjacentes, & si pustulæ inde excidentur, indicium est ipsas glandulas miliaræ simul esse affectas, & tunc hic affectus in infantibus ut plurimum vocatur Herpes; in adultis verò inde oriuntur ulcercula. Causa ergo immedia est secessio particularum serosarum & volatiliùm oleosarum sanguinis, qualis enim illa intemperies est in sanguine & lymphæ, talis etiam est in minutissimis his tubulis. Herpes miliaris oritur, si lymphæ debito viscosior absorptis & ingatus ab ære aquosis & tenacibus concrevit in

squamulas seu crustulas, dicitur Herpes sicca squammosa. Differunt autem à crustis squammæ, cum sint tenuiores & in superficie exteriori siccatæ à cute diffillant, quod in crustis non ita fieri solet. Sub crustis verò effusa lymphæ fermentescens punctione particularum acutarum in fibrillas nervorum pruritur, imò ardorem cum leviori Erysipelate, & sæpè dolorem excitat, & pro majore aut minore acrendie sanguinis, ac lymphæ, acrior vel secus alios vicinosque cutis tubulos erodens, (contribuente ætheris vicinos humores turbantis inordinato, ut in omni Inflammatione, transitu) ipsosque capillorum exedens, ut fit in lue Greæ, scabie, &c. dicitur merito Herpes exedens. A glandulis subcutaneis particulæ salinæ & sanguine secerit vidimus, illudque ab ipsis produci competimus, eò quod longioribus rigidioribusque spiculis sint donatæ, ideoque ad exitum ineptiores existant, sed quàm in phlegmate sint dissolutæ, vis illarum obvianditur, & cuticula ab earum actione præservatur, à congeneribus salibus oriri Herpetem existimamus, illaque spiculis duris, rigidis & acutis esse donata quis negabit? Equè ista, ac priora, cum hac tamen differentia, quòd posteriori um spicula priorum spiculis sint breviora. Acida siquidem, quæ hoc in ultio affectu alcalica faciunt, sunt delicatiora, & brevioribus pollent aculeis, quia de causa salia ex mixto eorum coailitu emergentia sunt minuciora, faciliusque glandulas subcutaneas pervadunt, & ad cuticulam usque deferruntur. Sulphura pauciora à subtilioribus tenuioribusque istis acidis coagulantur, rarioresque exsurgunt, & in minutissimis tantum tubulis obstructions, unde minor contingit sanguinis stagnatio, quàm liberillè sit aditus in ampliores tubulos, à quibus reorbetur. Phlegmata salia dissolvunt, & una cum ipsis à sanguine separantur, vel illi tenuescunt, & cum eo denudè circulantur, vel à continuo motu à materia subtili & spiritibus animalibus communicato attenuantur, comminuntur, ac per poros exhalantur. Salia itaque paucò sero dissoluta minus occupant spatium, levioresque cutis elevationem inferunt, sed cum etiam à phlegmatis vis eorum non infringatur, nec illorum acumina ab ipsis obtundantur, & in irrequieto motu persillant, cutis & cuticulæ circumpositarum fibras, in quas impingunt, durius graviusque pungunt ac lancinant, utitionisque sensum inducunt, quàm autem ab aliis perpetuò de novo advenientibus compellantur, & rectè in oppositam cuticulam protrudantur, poris suis spicula sua infigunt, à quibus fortis prominentibus sit partis asperitas, ac continuata & durante impulsionè cuticulæ fibrillæ aculeis, quos poris suis exceperunt, minutum secautur & in fissura abeunt.

§. 11. Sequitur *Prognosis*, & quidem ratione *Prognosis* salutaris & mortis; ubi asterisco notandum, quòd licet raro lethale sit Erysipelas, (quod tamen in perverso, & quidem repellentium ac refrigerantium remediòrum usu aliquoties lethale observavimus,) nihilominus eùm altiores in imis viscerum medullis, imò & cutis glandulis miliaribus radices egerit, satis rebelis est, & furcataeque licet expulsum, tamen usque recurrere aptum natum est. Breviter sæpè hic affectus terminatur, ipsam verò radicem extirpare, ut nullum medietur reditum, hoc opus, hic labor est. Principem enim Serenissimam novimus,

quæ plus ultra 12. annorum spatium Erysipelas à quacunque tempestate vel excessu in diætâ recidivans patitur, nullis remediis, quamvis optimis adhibitis, cedens. Facile ergo, seu dictum est, recidivat hoc malum, vel aliquando degenerat in ulcera. Curatio illius difficilior est, si osium denudationi aut fracturis supervenerit, si ab exterioribus ad interiora, ut vulgo dicitur, convertitur, si putrescit, aut suppuratur, quod verò rarissimè vel nunquam observatur. Malum est, si Erysipelas in facie ac capite oboritur, si in Hepate, utero aliisque partibus internis erumpit. Modum eventus ad salutem dicimus ut plurimum fieri per insensibilem transpirationem, ubi accedente pruritu cuticula quasi in squamas fastiscit, colorque in ordinarium & consuetum sensum mutabitur. Sin verò nullius curæ malum ægro fuerit, facili negotio, inconsideratè applicatis (seu superius diximus,) repellentibus & refrigerantibus non alcalinis, unâ cum aliis erroribus in cura commissis, in ulcera rebellia & ipsam sæpe gangrenam & mortem abit. Introrsum pullum Erysipelas ipsi vitæ stuit invidias, juxta 6. aphorism. 25. Hipp. Quod concernit Herpetis prognosin, terè eadem est cum Erysipelatis prædictione. Simplicis & humidî Herpetis curatio facilius obtinetur, quàm sicci & feri. Ferus si vel sponte, vel repellentium ac refrigerantium medicamentorum misulterio promptius suppuratur, graves sæpe habet morbos subsequentes, Apoplexiam nempe phthilin, febrem, &c. Herpes in subjectis scorbuticis, ubi succi sunt instar aquæ fortis acerrimi, obveniens, difficillimè curatur, & transit sæpe in ulcera diuturna.

Diætâ.

§. 12. Perspecta prognosi, pervenimus ordine nostro constituto ad *Curam Diæteticam*; cum verò Diætâ nostrorum affectuum nempe Erysipelatis & Herpetis ferè eadem est, ac Inflammationis superius jam latius deductæ, non operæ pretium diximus plura præter generalia hic addere. Ab acris ergo calore intensiore, succos nostros dulces ac volatiles per cutis poros avolare faciente, & à frigore eos coagulante & actiores stagnando redeunte sibi caveat æger Erysipelate vel Herpete infectus; facile enim inde recrudescet malum, & sæpe non absque ægri periculo. Hinc lymphâ inersatur & in tubulis minutissimis, seu glandulis cutis miliaribus facile stagnat, unde frigore vago, & postmodum febri admodum periculosa tentantur ægri, sanitati suæ non ritè studentes. Aër ergo sit temperatus ad calidum vergens, vitæ summo opere extremis utrisque. Calidior enim dilatando plus justo, & eliminando nimis, ad stagnationem disponere potest succos nostros, imprimis lympham corporis nostri. Quoad cibos, acidis non vescatur æger, nocent etiam omnia alimenta salsa, dulcia saccharata, pinguis, nimis calida & nimis aromatizata. Potus calidus Theæ vel Caffæ, vel lign. Guajaci vel Salsasfræ, farsaparill. &c. optimus est. Quies & somnus conducunt, quia succi machinæ nostræ hîc recreantur ac attenuantur, ut sic fluidiores cunctos tubulos etiamque minimos perfuere valeant.

Motus intempestivus exulet, quia facillè inde coagulatio succorum oritur, prout ex motu nimio palpitacionem cordis & arteriarum, à coa-

gulatione succorum ortum habentem fieri totè die observamus.

Venus non sit immodica, animi affectus coagulationum succorum auctores Græci rationis moderentur freno. Cane ergo & angue pejus vitetur ira vel exandefectencia quæcunque, obstrictians facillimè morbo.

Alvus, ut quotidie officium faciat, admoveatur. Hæc omnia & singula occasionalem causam & ahsam ut præbere queant affectui recursum, ita providè sunt observanda, adeoque si exesse hospitem hunc velit, commendatissimum sibi habere Diætæ studium necesse erit.

§. 13. Curacionem Erysipelatis aggredientes *Curâ* *Galenicâ* prius *Galenicorum* videamus. Statim isti ab *lenicorum* initio ubi comparuerit Erysipelas, venam in *Erysipelo-* cubito secant, maxime quidem humeralem: *ibi* sin minus, eam, quæ invenitur: si verò obali-quod impedimentum venam non secant, purgatione utendum esse ajunt, & bilem educens medicamentum & sequi vel simile præscribunt;

Rhei elect.

Cori. myrob. citrin. aa. ʒij.

sol. fenn. ʒij.

mann. elect. ʒj.

His superaffunde

ʒa cichor. bullientis ʒiv.

Stent per noctem: in colat. dissolv. Syr. de cichor. quadrupl.

Rhabarb. ʒß.

Crem. tartar. ʒj.

Elect. de Tamarind. ʒj.

M. f. potio: vel etiam elypteres fortiores applicent. Ipsam purgationem sæpius reiterant, ut verò sanguis deservescat & bilis corrigatur, Julapia refrigerantia ex aquâ endivivæ, nymphææ, lactucæ, portulacæ, cum Syr. de endivia, de nymphæâ exhibent.

Quod externâ Topica attinet, illinenda esse Erysipelati ea, quæ partim id quod influit repellant, per frigeſcentia, partim ut id quod jam coactum est, discutiant per moderate caleſcentia ac humectantia, priusquam livida ac nigra pars fiat, ita ut ea quæ illinuntur semper humida conserventur, per hoc ut frequentius alterentur: atque illud fieri possit contendunt, si per molles spongas prius illa abluantur. Multus enim partis fervor citò exhalare faciens hæc relinquit. Opus autem habere Erysipelata ab initio dicunt frigeſcentibus cum humiditate absque adſtrictione, velut est sempervivum & portulaca, & psyllum, lentacula palustris, feris, cucurbita, solanum, hyosciamus, lactuca, glaucium, insuperque apium & rhamni folia per se aut cum pane imposita, & cerata ex aqua valde frigida. Miscent & opii quid istis, & succi papaveris, & cicutæ, & mandragoræ, & efficiunt medicamenta composita. Parant quoque cum in finem ceratum ex cera alba, rosaceo quadruplo admixto, quod ex oleo crudo citra salem sit paratum, ita ut hæc in pila emolliantur, & aquæ frigidæ affundatur, quantum suscipere possunt. Aceti etiam tenuis ac pellucidi reliquis medicamentis parum admiscere solent, sed & polente cum aliqua ex relatis frigeſcentibus herbis, & palmulæ pingues ab ipsis applicantur. Illinunt etiam partem affectam cerussa aut cimolia, aut figulari terra cum solano, aut spuma argenti cum



# CAP. VI. DE ERTSIPELATE ET HERPETE. 529

eum rosaceo, aut chalcitide cum oleo & passo, aut cerussa cum aceto lycio, aut acacia cum aceto. Remittente autem fervore utuntur simplicibus quidem sulphure vivo & menta, cum aceto rosaceo, aut ruta cum absinthio & aceto ac oleo, aut spuma argenti cum portii & betæ succo. Compositis autem privatum quidem ad caput, hoc pastillo utuntur (spuma argenti, cerussa, croci, sulphuris vivi, opii cum passo: in communis vero ad omnes partes, minii, sinopici, chalcitidis, nisyos torrefacti, æruginis, atramenti sutorii, aluminis scissi singulorum æquales partes, utuntur ex aceto.

Vel:

- ℞. Sulphur. viv.
- Cerussa,
- opii,
- acacia aa. ʒß.
- aceti q. f.

M.

Vel:

- ℞. sol. recent. althea tener. lbj.
- in aceto coct. probè trit. & addito
- resucci triente,
- spuma argenti,
- Cerussa singulorum sextante & ʒß.
- rursus tercio cum Coriandri aut sem-
- pervivi aut solani succo, dein adjectis
- micis panis, ut Emplastri formam ac-
- cipiat, imponunt.

Sequenti quoque Emplastro utuntur:

- ℞. Olei cecini
- myrti aa. lbj.
- Cera ʒv.
- spum. argent. ʒijj.
- æruginis rnf. ʒvj.

Postquam verò cessavit inflammatio aut diuturna sit, antea quàm livida pars fiat, Cataplasma ex cruda hordeacea farina imponunt. Si verò iam livida facta fuerit, scarificat, & cataplasma diutius imponunt, & perfundunt aqua calida dulci, aliquando etiam marina aut muria, quandoque enim cataplasmati eadem admiscunt, postea verò relatis compositis utuntur cum animadversione, nam si diutius permaneant, in pus aut putredinem transmutationem contingere existimant.

Cura Herpetis ad mentem Veterum consistit primò in bene ordinata victus ratione; secundo in materiæ antecedentis aversione & inhibitione; tertio in evacuatione humoris partem affectam occupantis: quarto in ulceris sanatione. Dietam eandem, nempe frigidam ac humidam, quæ in Erysipellate describitur, commendant, circa universalia ipsi quoque idem consilium est, purgandum enim, venamque secandam esse contendunt, evacuant igitur totum corpus per medicamentum bilem educens. Dein transeunt ad Topica, affectis autem locis frigefaciencia ac siccantia adhibent medicamenta, ab initio quidem pampinos vitis & rubi ac plantaginis in cataplasmate apponentes, postea verò lentikulam, hisque aliquando etiam mel ac polestam miscunt, vel seq.

- ℞. Decoct. sol. rubi
- arnoglossæ aa. q. f.
- in quo dissolvæ
- farin. bordei,
- lupinor. aa. ʒiv.

pulv. rad. emula ʒvj.

M. f. Cataplasma, cui add.

Ol. Nymphaeæ,

rosacei aa. ʒvj.

M. & applicetur moderate calide, vel loco ejus ungu. de liquiritia, vel atramentum scriptorium saltem applicant, quod (ut illi ratiocinantur,) ratione vituli putredinem corrigit, ratione gallarum repercutit & refrigerat, vel sequens applicant unguentum:

- ℞. Lacca succida rnf. & pulverisata ʒij.
- Corticis pini rnf. & loti ʒiß.
- adipis caprilli ʒj.
- ol. myrtin. ʒijj.
- Cera q. f.

M. f. linimentum, quo partem affectam illinunt.

Vel:

- ℞. Aceti,
- Aq. plantaginis aa. P. æq.

M. & applica. Sunt qui terram cimoliam cum succo solani subactam & ad unguenti formam redactam apponunt. Quod si Herpes ulceratus adsit, medicamenta moderate exsiccantia & minime acia esse administranda arguunt, ulcus itaque sequenti decocto ablunt:

- ℞. Herb. plantag.
- solani,
- burse pastoris,
- Centinod. aa. Mj.
- endivie Mß.
- Calicum virid. gland.
- Nucum Cupressi aa. ʒijj.
- balauft.
- gallar. aa. ʒj.
- Thuris
- malicorii,
- Myrrha aa. ʒß.

M. f. decoct. in aqua fabrorum, quo ulcus ritè mundandum esse præcipiunt. Dein comburant lanam succidam in olla nova, combustam terunt in pulverem, & cum f. q. aq. rosar. redigunt in liquorem instar atramenti, quod plumbi illinunt, alii ipsam atramentum applicant. Nonnulli ulcerarum Herpetem illinunt pastillis passo solatis aut vino tenui & austero non veteri aut posca aquosa. Adhibent etiam glaucium & huic similia ex aqua, & hoc nihil efficiente, acetum admiscunt. Sed & plantaginis succum aut solani dilutum magnoperè laudant, aut lini semen tostum, ac vino oleoque coctum & tritum imponunt, aut cimoliam solani succo dilutam illinunt, & spuma argenti trientem succi portii cyathos septem, succi betæ tantundem, trita inungunt, ubi verò diuturna jam sunt talia ulcera, idoneum esse dicunt Musa pastillum & Andronii.

Vel:

- ℞. Lana mollis non lota, circum eadem ob-
- voluta ac rnf. ʒiß. ʒß.
- Cera ʒijj.
- recententis plumbi acetabuli dimi-
- dum, adipis caprin. curat. & lot. in
- aq. ʒiß.
- olei Myrti ʒv.

M.

Vel:

- ℞. Malicorii mali Pnnici dulcis ʒvj.
- spuma argenti ʒvj.

xxx

luna

quæ plus ultra 12. annorum spatium Erysipelas à quacunque tempestate vel excessu in diætâ recidivans patitur, nullis remediis, quamvis optimis adhibitis, cedens. Facile ergo, ceu dictum est, recidivat hoc malum, vel aliquando degenerat in ulcera. Curatio illius difficilior est, si osium denudationi aut fracturis supervenerit, si ab exterioribus ad interiora, ut vulgo dicitur, convertitur, si putrescit, aut suppuratur, quod verò rarissimè vel nunquam observatur. Malum est, si Erysipelas in facie ac capite oboritur, si in Hepate. utero alisque partibus internis erumpit. Modum eventus ad salutem dicimus ut plurimum fieri per insensibilem transpirationem, ubi accedente prurito cuticula quasi in squamas fastiscit, colorque in ordinarium & consuetum sensum mutabitur. Sin verò nullus curæ malum ægro fuerit, facili negotio, inconsideratè applicatis (ceui superius diximus,) repellentibus & refrigerantibus non alcalinis, unâ cum aliis erroribus in cura commissis, in ulcera rebellia & ipsam sæpe gangrenam & mortem abit. Introitus pulsum Erysipelas ipsi vitæ struit insidias, juxta 6. aphorism. 25. Hipp. Quod concernit Herpetis prognosin, ferè eadem est cum Erysipelatis prædictione. Simplicis & humidi Herpetis curatio facilius obtinetur, quàm siccis & feri. Ferus si vel sponte, vel repellentium ac refrigerantium medicamentorum ministerio promtus supprimatur, graves sæpe habet morbos subsequentes, Apoplexiam nempe phthilin, febrem, &c. Herpes in subjectis scorbuticis, ubi succi lani instat aquæ fortis accitimi, obveniens, difficillimè curatur, & transit sæpe in ulcera diuturna.

*Diætâ.*

§. 12. Perspecta prognosi, pervenimus ordinem nostrum constituto ad *Curam Diæticam*; cum verò Diætâ nostrorum affectuum nempe Erysipelatis & Herpetis ferè eadem est, ac Inflammationis superius jam latius deductæ, non operæ pretium duximus plura præter generalia hic adlere. Ab ætère ergo calore intensiore, succos nostros dulces ac volatiles per cutis poros avolare faciente, & à frigore eos coagulante & aciores stagnando reddente sibi caveat æger Erysipelate vel Herpete infectus; facile enim inde recrudescet malum, & sæpe non absque ægri periculo. Hinc lymphæ interallatæ & in tubulis minutissimis, seu glandulis cutis miliaribus facile stagnat, unde frigore vago, & postmodum febri admodum periculosa tentantur ægri, sanitati suæ non rite studentes. Aër ergo sit temperatus ad calidum vergens, vitæ summopere extenuis utrisque. Calidior enim dilatando plus justo, & eliminando nimis, ad stagnationem disponere potest succos nostros, imprimis lympham corporis nostri. Quoad cibos, acidis non vescatur æger, nocent etiam omnia alimenta salsa, dulcia saccharata, pingua, nimis calida & nimis aromatizata. Potus calidus Theæ vel Caffæ, vel lign. Guajaci vel Salsæfras, farsaparill. &c. optimus est. Quies & somnus conducunt, quia succi machinæ nostræ hîcæ recreantur ac attenuantur, ut sic fluidiores cunctos tubulos etianque minimos perficere valeant.

Motus intempestivus exulet, quia faciliè inde coagulatio succorum oritur, prout ex motu nimio palpitationem cordis & arteriarum, à co-

agulatione succorum ortum habentem fieri cotidie observamus.

Venus non sit immodica, animi affectus coagulationum succorum auctores sanæ rationis moderentur freno. Cane ergo & angue pejus vitetur ira vel exandescencia quæcunque, obstrictans facillimè morbo.

Alvus, ut quotidie officium faciat, admoveatur. Hæc omnia & singula occasionalem causam & ansam ut præbere queant affectui recursum, ita providè sunt observanda, adeoque si exesse hospitem hunc velit, commendatissimum sibi habere Diætâ studium necesse erit.

§. 13. Curationem Erysipelatis aggredientes *Cura Galienicorum* videamus. Statim isti ab *lenicorum* initio ubi comparuerit Erysipelas, venam in *Erysipela-* cubito secant, maximè quidem humeralem: sin nimis, eam, quæ invenitur: si verò ob ali- quod impedimentum venam non secant, purgatione utendum esse ajunt, & bilem educens medicamentum & sequi vel simile præscribunt;

*Rhei elect.*

*Cort. myrob. citrin. aa. 3ij.*

*fol. senn. 3ij.*

*mann. elect. 3j.*

*His superaffunde*

*74 cichor. bullientis 3iv.*

*Sunt per noctem: in colat. dissolv. Syr. de*

*cichor. quadrupl.*

*Rhabarb. 3ß.*

*Crem. tartar. 3j.*

*Elect. de Tam. arind. 3j.*

M. f. potio: in eam clysteres fortiores applicent. Ipsam purgationem sæpius reiterant, ut verò languis deservescat & bilis corrigitur, Julapia refrigerantia ex aqua endiviar, nymphæ, lactucæ, postulacæ, cum Syr. de endivia, de nymphæ exhibent.

Quod exteriora Topica attinet, illinenda esse Erysipelati ea, quæ partim id quod influit repellant, per frigiditatem, partim ut id quod jam coactum est, discutiant per moderate calefacientia ac humectantia, priusquam livida ac nigra pars fiat, ita ut ea quæ illinuntur semper humida conserventur, per hoc ut frequentius alterentur: atque illud fieri posse contendunt, si per molles spongas prius illata abluantur. Multus enim partis fervor citò exhalare faciens hæc resiccat. Opus autem habere Erysipelata ab initio dicunt frigiditatem cum humiditate absque adstrictione, velut est sempervivum & portulaca, & psyllum, lentacula palustris, feris, cucurbita, solanum, hyosciamus, lactuca, glaucium, insuperque apium & rhamni folia per se aut cum pane imposita, & cerata ex aqua valde frigida. Miscet & opii quid istis, & succi papaveris, & cicutæ, & mandragoræ, & efficiunt medicamenta composita. Parant quoque cum in finem ceratum ex cera alba, rosaceo quadruplo admixto, quod ex oleo crudo citra salem sit paratum, ita ut hæc in pila emolliantur, & aquæ frigida affundatur, quantum suscipere possunt. Aceti etiam tenuis ac pellucidi reliquis medicamentis parum admiscere solent, sed & potentia cum aliqua ex relatis frigiditatem herbis, & palmulæ pingues ab ipsis applicantur. Illinunt etiam partem affectam cerussa aut cimolia, aut singulari terra cum solano, aut spuma argenti cum

eum rosaceo, aut chalcitide cum oleo & passo, aut cerussa cum aceto lycio. aut acacia cum aceto. Remittente autem fervore utuntur simplicibus quidem sulphure vivo & menta, cum aceto rosaceo, aut ruta cum abinthio & aceto ac oleo, aut spuma argenti cum porri & betæ succo. Compositis autem privatum quidem ad caput, hoc pastillo utuntur (spuma argenti, cerussa, croci, sulphuris vivi, opii cum passo: in communi vero ad omnes partes, minii, sinopici, chalcitidis, mulsos torrefacti, æruginis, atramenti sutorii, aluminis scissi singulorum æquales partes, utuntur ex aceto.

Vel:

- ℞. Sulphur. viv.  
Cerulea,  
opii,  
acacia aa. ʒß.  
aceti q. s.

M.

Vel:

- ℞. fol. recent. althea tener. lbj.  
in aceto coct. probè trit. & addito  
resucci triente,  
spuma argenti,  
Cerulea singulorum sextante & ʒß.  
rursus tertio cum Coriandri aut sem-  
pervivi aut solani succo, dein adjectis  
micis panis, ut Emplastri formam ac-  
cipiat, imponunt.

Sequenti quoque Emplastro utuntur:

- ℞. Olei cecini  
myrti aa. lbj.  
Cera ʒv.  
spuma argenti. ʒijj.  
æruginis ras. ʒvj.

Postquam verò cessavit inflammatio aut diuturna sit, antea quàm livida pars fiat, Cataplasma ex cruda hordeacea farina imponunt. Si verò jam livida facta fuerit, scarificant, & cataplasma diutius imponunt, & perfundunt aqua calida dulci, aliquando etiam marina aut muria, quandoque enim cataplasmati eadem admiscunt, postea vero relatis compositis utuntur cum animadversione, nam si diutius permanent, in pus aut putredinem transmutationem contingere existimant.

*Herpetis.*

Cura Herpetis ad mentem Veterum consistit primò in bene ordinata victus ratione; secundò in materis antecedentis aversione & inhibitione; tertio in evacuatione humoris partem affectam occupantis: quartò in ulceris sanatione. Dietam eandem, nempe frigidam ac humidam, quæ in Erysipectate describitur, commendant, circa universalia ipsis quoque idem consilium est, purgandum enim, venamque secandam esse contendunt, evacuant igitur totum corpus per medicamentum bilem educens. Dein transeunt ad Topica, affectus autem locis frigefaciencia ac siccantia adhibent medicamenta, ab initio quidem pampinos vitis & rubi ac plantaginis in cataplasmate apponentes, postea verò lenticulam, hisque aliquando etiam mel ac polestem miscunt, vel seq.

- ℞. Decoct. fol. rubi  
arnoglossa aa. q. s.  
in quo dissolv  
sarin. bordei,  
lupinor. aa. ʒiv.

pulv. rad. emula ʒvj.

M. f. Cataplasma, cui add.

Ol. Nymphae,  
rosæ aa. ʒvj.

M. & applicetur moderatè calidè, vel loco ejus ungu. de liquiritia, vel atramentum scriptorium saltem applicent, quod (ut illi rariocinantur,) ratione vituloh putredinem corrigit, ratione gallarum repercutit & refrigerat, vel sequens applicant unguentum:

- ℞. Læca succide usque & pulverisatæ ʒij.  
Corticis pini usque & loti ʒiß.  
ad. pis caprilli ʒj.  
ol. myrtin. ʒijj.  
Cera q. s.

M. f. linimentum, quo partem affectam illinunt.

Vel:

- ℞. Aceti,  
Aq. plantaginis aa. p. xq.

M. & applica. Sunt qui terram cimoliam cum succo solani subactam & ad unguenti formam redactam apponunt. Quòd si Herpes ulceratus adsit, medicamenta moderatè exsiccantia & minime acria esse administranda arguunt, ulcus itaque sequenti decocto ablunt:

- ℞. Herb. plantag.  
solani,  
bursa pastoris,  
Centinod. aa. Mj.  
endivie Mß.  
Caticum virid. gland.  
Nucum Cupressi aa. ʒijj.  
balaust.  
gallar. aa. ʒj.  
Thuris  
malicoris,  
Myrrhe aa. ʒß.

M. f. decoct. in aqua fabrorum, quo ulcus ritè mundandum esse præcipiunt. Dein comburant lanam succidam in olla nova, combustam terunt in pulverem, & cum f. q. aq. rosar. redigunt in liquorem instar atramenti, quod plumbis illinunt, alii ipsum atramentum applicant. Nonnulli ulceratum Herpetem illinunt pastillis passo solatis aut vino tenui & austero non veteri aut posca aquosa. Adhibent etiam glaucium & huic similia ex aqua, & hoc nihil efficiente, acetum admiscunt. Sed & plantaginis succum aut solani dilutum magnopere laudant, aut lini semen tostum, ac vino oleoque coctum & tritum imponunt. aut cimoliani solani succo dilutam illinunt, & spuma argenti trientem succi porri cyathos septem, succi betæ tantundem, trita inungunt, ubi verò diuturna jam sunt talia ulcera, idoneum esse dicunt Musa pastillum & Andronis.

Vel:

- ℞. Lana mollis non lota, circum sedam ob-  
voluta ac usque, ʒiß. ʒß.  
Cera ʒijj.  
recrementi plumbi acetabuli dimi-  
dium, ad. pis caprin. curat. & lot. in  
aq. ʒiß.  
olei Myrti ʒv.

M.

Vel:

- ℞. Malicoris mali Punici dulcis ʒvj.  
spuma argenti ʒvj.

X x

lana

lana non lota circum sedam obvoluta

ac yssa 3ij.

Cera 3xii.

Cerussa 3j.

sturis,

alumin sciss. aa. 3j.

*Vin. & myrteo excipiantur.*

*Cura Erysipelatis ad mentem Paracelsi.*  
§. 14. Paracelsus curæ principium in Erysipelate esse ait, ut ligamenta stringantur cum aliohol, ne concurrant alia salia, postea sperniolo mortificandum, deinceps amotis doloribus per oppodeltoch consolidandum esse contendit. Descriptio aliohol est sequens:

℞. Salis anachron 3j.

Anodi 3b.

*reduc ad formam cum oleo de spica.*

Descriptio Spertioli:

℞. Spermatis Ceti,

Ranarum,

Cersoli,

Junperi aa. q. v.

*fiat destillatio in Sole.*

Vel:

℞. Glutinis aquatici 3ij.

*destillantur in aquam, cui sermus mineralium imponatur, & bulliant simul per horam, aut donec in formam glutinam reducantur, adde*

*Caphura 3j. fiat unguentum, quo cum ligetur crui terno quoquo die semel, per tres septimanas continuando. Postea sæpius ablundo mundetur aqua foliorum querci, vel aqua falsa. Curabitur optimè non aliàs, ac si medicamentum superpositum esset: nam ejus est indolis medicina prædicta, quod tribus hebdomatibus etiam operetur, post ejus omissionem, donec omnino curaverit. Anachron est genus salis, quod crescit in petris, veluti mæscus lapidibus supernatens, nitri similitudine: non est nitrum tamen, quod à vitrariis conficitur. Est sicut usnea quid, ac decoctum aqua sit, ut alumen, acidum. Postremo vitri formam accipit, spumamque producit, quam antiqui falso putarunt anachron. Ignis Petrici curam duplicem esse dicit Author, una priusquam natus sit morbus, altera cum jam est vigentesimus: ad priorem curam seq. proponit:*

℞. Spermatis ranarum lbß.

Caphura 3ij.

Astria,

Tenuis aa. 3j.

*Re:duc ad destillationem Solis, quod sic intelligas, ponatur in vitrum ad Solem, donec liqueant. In hunc liquorem pannos intinctos superponit loco dolenti, cum siccati fuerint, rursus intingit, superponitque tam diu, donec sedetur. Ad posteriorem curam adhibet seq. v. gr.*

℞. Terbinth. indurata lbj.

Oppoponaci lbß.

Colcoharis 3ij.

*Re:duc in Emplastrum.*

Bulliens etiam desponat mel, cui præcedentia cum imposuerit, inde efficit Emplastrum tenue, hoc pannis illitum imponit.

*Harpoia.*

*Herpetis cura in refrigerio consistere ait, demum remediis mucilaginosi, ad callos nodosque tollendos, postea curat per oppodeltoch. Mucilaginosum ipsius remedium est sequens: v. gr.*

℞. Liqueor. de Mumiâ,

de Massice,

de Caphurâ aa. 3b.

Mucilag. de sanngreco,

de psyllio,

de cyonidis aa. q. f.

*pro incorporatione, usum hujus esse sicuti*

*Emplastri oppodeltoch.*

Refrigerium vel infrigidatio fit sperniolo, anodyno per quinque aut sex dies, post quos mumiâ addes. Aliam curam proponit Author nempe sequentem:

℞. Realgaris crystallini 3j.

olei ardentis 3ij.

cerussa 3j.

*M. f. unguentum.*

Circumponatur hoc lupi circumferentia tantum ut in medio nihil sit. Renovetur singulis duodecim horis semel, usque ad sextum vel octavum diem: deponit postmodum & permittit. Circulus ille totus auferretur per se. quo facto, lavat mane vesperique hac aquâ, superponit etiam infra scriptum Emplastrum secundum artem Chirurgicam. Aqua, vel ejus lavamentum est sequens:

℞. Aqua glutinis,

rosarum aa. 3vj.

paribenionis 3v.

*M.*

℞. Olei lini lbß.

avis viridis,

Cera aa. quartam.

*F. Cerotum, cui*

*superadd. Bdelli colati 3j.*

*Liga secundum artem.*

§. 15. *Helmontius* Erysipelatis venenum ex ira *Helmontii*

Archei deducens, sanationem ejus ponit in lepo- *Cura Ery-*

re, cui timor, mansuetudo, fuga & vita innocua. *spelatui.*

Cruor itaque, in quo est productum seminale paventis mansuetudinis, & efficiens, mortificat vitus ex incandescencia venenosa natum. Etenim amores, odia, terrores, horumque seminalia producta, sigilla, ideas & characteres in rebus notavit, unde plutum occulorum causas proximas adinvenisse gloriatur. Erysipelas quoque Apostematum maxime ignem apposita aquâ vitæ sanari Nobiscum statuit. In genere ergo juxta ipsum sufficientia remedia sponaria & lixivialia, quæ illud extinguunt, quia acidum ejus causam mortificant, in specie verò magnetem sive stercus humanum calide applicari jubet, quod unâ nocte omne acidum extrahit & necat, ut vix amplius deinceps redeat.

Sic & supradictum cruorem leporis venati, & *Harpoia.*

in Martio capti linteo exceptum, & calidè applicatum æquè in Erysipelate ac Herpete conducere ait; quasi idea & phantasia leporis tanquam animalis mansueti & pavidissimi metu suo ideam ferentem Archei sedat ac cohibet. Helmontius ridet etiam hic Scholas, quod applicare jubeant refrigerantia quatenus fructui, & non arbori vitæ remedium applicant. Ad acorem hunc halituosum, & inde Archeum partis excandescentem placandum commendat remedia, cui insunt idæ timoris, hic etiam laudat carnem leporinam in furno exsiccatam. Usus adstringentium & refrigerantium contemnit, hujusmodi enim salibus acidis corrosivis volatilibus ad viscera interiora & massam sanguineam, quod faciliè mediantæ latice fieri contendit, retrocedentibus, tùm lethalis apoplexia, vel catalepsis, imò & mors oboriri potest.

§. 16. *V. V. u.*

# CAP. VI. DE ERTSIPELATE ET HERPETE. 531

*Cur. Ery.* §. 16. *Sylvius* sudoriferis materiei in Ery-  
sipelate stagnantis per poros sufflamine in  
promovet, quibus opium associat: & inter Dia-  
phoretica rob sambuci plurimum laudat. Parti  
applicat medicamenta, quæ transpirationem  
adjuvent, liquoremque extravasatum attenuent,  
ejusque ardorem compescant & mitigent. Prio-  
ris generis sunt spiritus vini crocat. & camphor.  
in quibus infundantur flores sambuci. Secundi  
vero sunt Saturnina, Minium. &c.

*Herpetis.* In cura *Herpetis* *Willisius* laudat viperina,  
acidulas, lac integrum & serum illius, quæ omnia  
mixta efficaciz hoc in affectu esse assertit Author.  
Sed quum hæc plerumque non sufficiant, nisi ad  
topica confugiamus, sequentia commendat.

℞. Ol. olivar. ʒij.  
Terbinth. opt.  
Cera flav. aa. ʒj.  
Sublin. corr. ʒiſſ.  
benzoïn.  
Syrac.  
pulv. iros flor. aa. ʒij.  
M. f. s. a. unguentum.

Vel:

℞. Ungu. pomad. ʒj.  
præcipit. alb. ʒij.

M. f. unguentum.

Vel:

℞. Alum. ust.  
Sacch. canth. aa. ʒj.  
Sperm. ceti,  
Cera flav. aa. ʒiſſ.  
ol. amygd. dulc. ʒiſſ.

M. F. unguentum.

*Sylvius Ery-*  
*sipelatis*  
*Cura.* §. 17. *Sylvius* in Erysipelate multis aliis reme-  
diis præfert sudorifera, blanda imprimis, quando  
aliqua febricula associata est, hinc laudat Anti-  
monium Diaphoreticum, bezoarticum minerale  
ole. Joviale, Saturninum. Tinct. ʒnii ʒfat.  
ocul. ʒ. Ebur phil. pp. crocum ʒ, &c. quibus  
admiscenda vult salia volatilia ac aromatica, in  
quem finem sequentem præscribere solet for-  
mulam:

℞. ∇ flor. sambuc. ʒj.  
sanicul.  
Card. bened. aa. ʒvj.  
ʒnii Diaphoret. ʒiſſ.  
ocul. ʒ. ppf. ʒj.  
Laudan. opiat. gr. ij.  
Syr. card. bened. ʒvj.

M. detur cochleatim atque per vices. Externè  
laudat cremorem cum creta mistum. & Erysipe-  
lati calidè inpositum, ut & aquam calcis vivæ  
cum aqua florum sambuci calidè applicanda.

*Herpetis.* Ad *Herpetem* *Sylvius* commendat sempervi-  
vum, portulac. saccharum Saturni, &c. opti-  
mum & egregium dicit esse linimentum ex pul-  
vere subtilissimo cretæ & cremor. lactis, quo se-  
pids *Herpes* illinatur, item si ʒ in aqua extin-  
guatur, istoque liquore locus affectus eluatur.

At si multum exedens sit *Herpes*, in usum  
vocat remedia Morbi Gallici, nempe poriones ex  
salaparilla, Guajaco, Sassafras, rad. Chinæ, san-  
tal. citrin. rad. enulæ, & simil. sudores præterea  
suadet. Externè vero convenire ait unguentum  
Saturninum, ex lithargyr. ʒri & ol. olivar. sine  
igne tum in mortario plumbeo diuturnis tritio-  
nibus mistum maxime laudat, Balsam. ʒ Com-  
plementum abolvit.

§. 18. *Carrisiarius* in curatione *Erysipelas*

commode instituenda eò studiosè respiciunt, ut  
lymphæ crassior stagnans resolvatur, & in debi-  
tum redigatur florem, quo obstructio tubulo-  
rum cutaneorum ab ea facta tollatur, eaque de  
causa ea interius sumenda exhibent remedia, quæ  
particularum angularium in lymphæ contenta-  
rum mucrones hebetent, abforbeant & frangant,  
ut fibrulis ulterius inhaerere nequeant, sed poris  
magis accommodatæ per sudorem faciliè expel-  
lantur, cui scopolequens inferire potest mixtura.

℞. Aq. fumar. ʒiſſ.  
flor. sambuc. ʒj.  
Elettuar. disford. Frac. ʒiſſ.  
ʒci gutt. vj.  
Syr. card. bened. ʒij.

M. Exhaustiantur una vice.

Vel:

℞. Aq. scord. ʒiſſ.  
Rob sambuc. ʒj.  
Tinctur. Croc. gutt. ʒiſſ.  
Syr. fumar. ʒiſſ.  
voiat. succin. gr. ij.  
Syr. scabios. ʒij.

M. Assumatur una vice.

Forma etiam pulveris convenieptia adhibent su-  
dorifera, ut particulæ cuspidatæ pungentes eò  
magis inter poros eorum frangantur, & irritetæ  
per poros eliminantur, cujusmodi remediis se-  
quens tyroni existat exemplar.

℞. Ocul. ʒ. gr. xij.  
bezoard. miner. ʒiſſ.  
Syr. succin. gr. ij.  
Ebur. Philos. pp. gr. vj.

M. F. Pulvis una vice in aqua florum sam-  
buci saccharo parum edulcoratæ exhibendus.  
Prospæctis ita poris & tubulis obstructis cuta-  
neis, ut referentur remediis internis, non cun-  
ctantur etiam topicis sive externis resolutionem  
istam lymphæ coagulatae, & salium pungentium  
mucronatarum hebetationem, & extra poros eja-  
culationem promovere, quod præstant volati-  
lioribus, porosis & blandis remediis, quorum  
numero inscribunt sacculos floribus hyperici,  
camomillæ, sambuci, chrysanthem. herbis scor-  
dii, phellandrii, menthæ, farina volatili, creta,  
C. C. usto præparato & pulveris ʒro repletis te-  
pidè inpositis, linteis crocato & spiritui vini  
camphorato humidato calidiusculè applicato,  
quam intinctionem optimè insitui putant, si  
crocus in aqua spermatis ranæcum solvatur, &  
tinctura hac linteum mundum saturatè imbua-  
tur, & lentè exsicceetur, exsiccatum de novo solu-  
tioni immergatur, & deniq; sicceetur, hæcque  
immersio & siccatio sexies repetatur, tumque  
lintheum istud tinctum ad usum servetur. Eodem  
modo etiam teiam sanguine leporis Martio capli  
imbutam, & usûs tempore aqua florum sambuci  
humidatam tepidè imponunt, eamque valdè de-  
prædicant. Sequenti mixtura tepidè adhibita sa-  
pius *Erysipelas* se abegisse gloriantur.

℞. Aq. sperm. ranar. ʒij.  
Spir. vin. camphorat. ʒiſſ.  
flor. sambuc. ʒj.  
Tinctur. croc. ʒiſſ.

M. & hac mixtura *Erysipelas* aliquoties illi-  
natur. Dissolvunt quoque, vel in pulveris for-  
mam redigunt olibanum, succinum, myrrham,  
crocum & camphoram, iisque spiritum vini af-  
fundunt, & in loco tepidè per diem & noctem  
servant in digestionem, tum liquore hoc eodem

xxx 2

modo,

*Carrisi-*  
*arius*



modo, ac priore misura utuntur. Fovent etiam partem Erysipelate infectam decocto corticum sambuci, decocto lithargyrii, myrrhae & lactis sulphuris, vel nistura sequenti:

℞. Spir. vin. ʒiij.  
aq. flor. sambuc. ʒij.  
Lactis vit. ʒss.  
trochisc. alb. Rhaf. ʒij.  
camphor. ʒj.

M.

Imminuto tumore & dolore tendente, cum æger liberius incedere occipiat, ad reliquias acidas auferendas non abhorrent levia quædam purgantia, quæ glandulas intestinales aliquantum stimulantia excretionem lymphæ per intestina promoveant, ne tanta in copia hæc acrior chylo admisceatur, & ad membra externa devehatur, cujus rei gratia sequentem potissimum approbant formulam:

Aq. flor. sambuc. ʒij.  
cinamom. ʒj.  
Tinctur. Jalap. ʒss.  
℞ci gutt. vj.  
Syr. de cicor. cum rhab. ʒiiss.

F. Mixtura laxativa una vice exhaurienda.

Quando pustule sunt excitatae, easdem aperiunt, ut lymphæ acrior effluat, & pustulas vel tinctura croci, vel linimento ex ceruilla & spiritu vini illinunt. Ulcera facta aqua calcis vivæ abstergunt & myndant, & unguento albo camphorato, vel ex vitellis ovorum induratis, myrrha, croco, camphora, oleo hyperici & spiritu vini parato ad sanitatem perducunt.

*Herpes.*

In *Herpe* lympham glandularem corruptam corrigunt, particulas angulares pungentes & rodentes abigendo internis itidem sudoriferis ex ammonio potissimum & lignis, aut radicibus chinæ & salsæparillæ paratis, quibus liquor iste simul attenuatur, & obsterectio glandularum cutanearum, sive miliarium solvitur, tum foris locum affectum ablunt decoctis lignorum, vel aqua Mercuriali, aut lixivio ex cineribus tabaci, & oleum tartari vel solum, vel cum oleo amygdalarum amararum mistum sæpius illiunt, vel alia quædam convenientia unguenta, qualia sequentes exhibent formula:

℞. Unguenti rosat. ʒj.  
Præcipitat. rub. ʒj.

M.

℞. Crem. alb. ʒss.  
Butyr. ver. ʒj.

M.

℞. Aq. tria. ʒiiss.  
Oxi.  
Sui ʒi ʒij  
Lapid. scissil. ʒij.  
Ol. rapar. veter. q. l.

M. F. Linimentum.

Vel:

℞. Unguent. rosat. ʒj.  
Lacc. rub.  
ʒij præcipit. alb. aa. ʒss.  
Sui ʒi ʒij.  
ʒij Diaphoret. ʒij.

M. F. Unguentum.

Vel:

℞. Sevi ovill. ʒij.  
fell. bovis ʒiij.  
Coq. ad consumtionem humiditatis. F. Un-  
guentum.

Imponunt etiam cataplasmata ex farina secalis, myrrha & apio, in lacte ebutytrato parata, vel linimenta illinunt ex fuligine camini, thure, lithargyrio, scoris ʒis, Δe baccis lauri, radice aristolochiæ, rutro, ʒlo, aut alumine, aliisque cum butyro & spiritu vini nistis composita. Quin sequens linimentum singularis existere dicunt alius.

℞. Tut. pp.  
Ceruss. aa. ʒss.  
Succi Limon. q. l.  
F. Linimentum.

§. 19. Curationem *Erysipelæ* si facile assequi mur obstructionem inflammatoriam tollendo, hinc acidum & coagulatum, a quo excitatur infringendo ac in tertium mutando, & sic fluxum liberiores per canaliculos promovendo, cui proposito satisfaciunt medicamenta tum interna tum externa, absque internis curatio nonnunquam frustra fascipitur, per interna enim lymphæ cum reliquis succis coagulata ac in tubulis stagnans ad fluiditatem facili Marte redigi potest. Ex internis conveniunt potissimum Diaphoretica & absorbentia quæcumque, quæ non tantum poros aperiunt, sed & succos acidos in alcalicos redigunt, & sic acidum pellunt, atque hujus generis sunt alcalia, tam fixa, quam volatilia & oleosa, conducunt ergo in Erysipellate, ~ C. Colat. ebors, ~ ℞ci oleos. sive aromaticus, ~ catarrhalis volat. ~ fl. sambuc. Mixt. f. R. bezord. sine acido parata, R ʒnii ʒlat. Essent. viperin. ʒn. Diaphoret. bezord. miner. martiale, imo omnia chalybeata hic conducunt, ocul. ʒs. C. C. f. Δ pp. unicorn. foss. ebors. f. Δ pp. mand. lucii, Sacch. seu ʒni: sed quis omnia recenserebit? in juniorum Medicorum gratiam unam vel alteram communem formulam:

℞. ∇ fl. sambuc.  
card. bened. aa. ʒj.  
roob. samb. ʒij.  
~ quidem ʒss.  
Ebor. f. ∇ pp. ʒj.

M. detur ad vitrum, vel detur cochlearium, vel una vice propinetur. Vel in forma pulveris præscribatur sequens vel similis:

℞. Bezord. ʒiial.  
ebors. f. Δ pp. aa. ʒj.  
mandib. lucii ʒss.  
cinab. ʒnii gr. ʒj.  
camphor. gr. iij.

M. detur cuspidatum hic pulvis cum ∇ flor. sambuc. vel fumar. vel cum potu Theræ. Cinabarina & Camphorata egregia sunt in Erysipellate remedia. Vel sequentis Essentiæ detur dosis ad guttas 30. 40. vel ʒo, in vehiculo convenienti.

℞. ~ fl. sambuc.  
cochlear. aa. ʒj.  
Q.  
Q-li ʒ ʒ ʒss.  
℞ci gutt. x.

M. vel detur R ʒnii ʒlat. ad guttas 20. bis in die. Prorusticis & pauperibus sufficit seq.

℞. Alb. græc. ʒj.  
Flor. sambuc. ʒj.  
Coq. ex lacte dulci aa. ʒvj.  
Colat. add.  
Croc. ʒj.

M. Quod

# CAP. VI. DE ERYSIPELATE ET HERPETE. 533

M. quod calidè & imprimis vesperti ab ipsi bibatur.

Purgationes, fortiores (nisi in primis vislatae sibiurta acida, in quo casu convenit infus. nostr. laxativ.) V. S. tanquam noxia in Erysipelate rejicimus, hanc tamen plures in Erysipelate instituendam volunt, non ad causam tollendam, sed ad sanguinis pressionem fortioiorem tollendam imprimis urgentibus maximis doloribus Erysipelati conjunctis. Diuretica verò profunt, quia & per hæc lymphæ coagulata resolvuntur ac stagnans per urinam exire potest, inter quæ aliis palmam præcipue & nostra Diuretica, arcum duplicatum, & omnia nitrolâ, inio & sâlia, item succinata, & en, gr.

℞. Ocul. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.

Θ absynth. ʒj.

arcum, dupli. ʒiʒ.

Θ velat. succin. gr. iv.

M. f. pulvis, dentr cuspidatim in ∇ fl. Chamomill. sambuc. charæsol. &c. In quem finem conducit serum tamarind. vel æstull. cum rad. acetos. Sarsaparill. & sero lactis, addito ~ u nitri c. ~ x dulcificat. Ut verò obstructio inflammatoria melius tollatur & auferatur, parti affectæ adhibenda sunt varia localia ac topica remedia, quæ sibi quisque habeat commendata, quæ sint resolutiva, vel acidum destruentia, & coagulatim stagnansque dissolvuntia, ut lymphæ coagulata & acri minimis in tubulis liberior concedatur transfluxus, hinc commendamus omnia alcalina, & absorbentia, camphorata, volatilia oleosa, aqueis tamen temperata, sola sæpè ∇ calida cum sapone Venetâ calidè applicata, vel tantum infusum Theæ cum linteis Erysipelati oppositum fufficit; item ~ vin. camph. vel crocat. vel in quo flores & baccæ sambuci infusi, seu cui eorum spiritus adjunctus fuerint, vel aliis præferimus lequens:

℞. ∇ Calcu viv. fl. sambuc.

~ matricul.

vin. Camph. aa. ʒiʒ.

M. applicetur calidè quadruplicatis linteis. Vel:

℞. Myrrh.

Oliban. aa. ʒv.

Cog. in ∇ & vin. Gall. f. q. dein add.

Camphor. ʒij.

croci ʒiʒ.

M.

Vel:

℞. ∇ fl. sambuc.

~ vini aa. ʒij.

Camphor. ʒij.

Θ hni ʒi.

qua mixtura linteum quadruplicatum imbutum sæpius parti affectæ calidè imponatur, quo non tantum acidum peccans & obstruens temperabis, sed & tubulos à lymphæ acri obstructos reserabis, quibus obtentis Erysipelatis symptomata certò certius cessabunt ac imprimis ardor indutus. Si hæc præter spem non juvant, ad validiora transeundum est.

℞. ∇ pluviantil.

~ flor. sambuc.

vin. crocat. aa. ʒij.

myrrhæ ʒiʒ.

Camphor. ʒiʒ.

~ Θ xci succ. ʒj.

Θ hni ʒi.

M. calefant parum, quo linteola madefacta parti affectæ imponantur, & quoties renovanda, quoties frigescerint aut exsiccati percipiuntur. Vel pro pauperibus:

℞. Flor. sambuc.

fol. levistric. aa. Mj.

Cog. ex lact. dulc. aa. ʒvj.

colat. add.

~ vini ʒij.

Θ ʒiʒ.

M.

vel ex herb. rutæ, scordij, absynth. nicotian. fiat decoct. cui add. ~ vin. camph. vel crocat. sic etiam conducunt linteæ saponis lixivio, vellaq. ~ vel urina madefacta Erysipelati imposita.

Nescio quo anili metu absterrenti hæcenus Medici ac Chirurgi, quod non audeant Erysipelati applicare remedia humida, sed tantummodo sicca: ast sciant hi scitoli, hæc humida volatilia magis per poros penetrare, facilius tubulos aperire, succos stagnantes ad liberioiorem transfluxum invitare, sicque obstructionem inflammatoriam tolli posse: ego verò omnibus junioribus Medicis Epithemata varia calidè applicanda commendo, & ex experientia videbunt, quantum Praxis Rationalis Neotericonum distet à Veterum obliuitorum irrationali. Siccà verò non rejicienda volo, sed & eam magno cum fructu sæpè applicari statuo, hisce autem nihil juvantibus, ad humida spirituosâ ac temperata confugiendum esse. Inter sicca topica eminent pulv. Erysipelatos des *Myrsinib.* item ex alcalinorum elasticè sunt Saturnina, creta contusa, farina lupinorum, tritici, lini, cortices interiores sambuci cum farina Erysipelati imposita, mulierculi: remedium est universale, melius verò conducet pulvis ex faccharo hni, cerulla, mimio, thure, croco, camphora paratus, & cum lino vel canabâ applicatus: Pulvis quoque liquiritiæ, fler. sambuc. melilot. chamomill. lac virg. &c. eodem modo impositi laudantur. Ex gr.

℞. Farin. bord. ʒj.

fabar. ʒiʒ.

pulv. liquirit. ʒv.

Crete,

myrrh. aa. ʒiʒ.

Ceruss. ʒij.

Camphor. gr. vj.

M. externè inpergatur hic pulvis: vel sequens magis simplex:

℞. Farin. c. ʒj.

myrrh.

ceruss. aa. ʒiʒ.

camph. gr. v.

M. f. pulvis tenuissimus.

Crete enim & farina sæpè sola sufficiunt, quoniam ex alcali constant, quorum particula minime cutis poros intrant, & acidum quantum possunt absorbent, pari modo sicuti colchotar & li aëri expositum denuò acidis saturatur particulis. Huic scopo ob alcali copiosum convenit sperma ranarum, & linteæ spermate hoc probe imprægnata, ut & panis lineis crocatus *Myrs.* conferunt, vel Myrrh. Camphor. croco affund. ~ vin. vel sambuci, in quo liquore imbuantur linteæ, quæ postmodum iterum exsiccentur, & dein ita exsiccatæ applicentur Erysipelati, quæ tuto & cum summo emolumento apponi possunt.

X x x 3

Alii

Alii laudant fel carporum calidè illitum, alii commendant folia raphani rutilicani, quæ in forma sicca imponenda (suaudent Empl.

Hic etiam cataplasmata non negligenda, quæ sæpè totam implent paginam, ex herb. rut. scord. absynth. abrocan. decoct. cui add.  $\Theta$  \*ci depurat  $\Theta$   $\zeta$ . spir. vin. camph. & tepide applicetur. Vel Theriaca Androm. vel Dialcordium tepidè applicetur per vices, & hinc plus commodi, quàm ex aliis percipies: mutanda enim sunt sæpiùs medicamenta, quia sæpè unico effectum non præstante aliud præstabit. Pars etiam Erythelate affecta quinque vel sexies de die matriche & thure suffumigetur, suffimenta enim ex sabina, radice levisnici, fl. storach. & aliis, quæ jam in vulgus abierunt, & optima sunt. Uti enim pulveres temperant & moderantur ardorem, ita suffumigia particulis suis alcalinis volatilibus dissipant, & in motum eunt stagnantes & subsistentes particulas, ut vel in ordinem redeant vel exhalent.

Curatio Herpetis seu Erythelatis exulcerati ex jam dictis constat, non multum differt à curâ Erythelatis, sed Herpetem producentis acrius esse, quàm in Erythelate, pauciorique sero esse dilutum, quare ut illius quoque curam absolvamus, necessarium habemus ea adhibere remedia, quæ salium acrimoniam obtundunt, poros glandularum miliarium obturatos referant, cuticulæ angustiores poros ampliant, lymphæque penû adaugent. Herpetis curatio variat, prout ipsè affectus, si addit interperies sanguinis salsa mutatica vel acida, ea (quantum possibile,) aufertenda exhibendo infanti vel nutrici appropriata alimenta & medicamenta acridinem involventia, ut decoctum radicis chinæ & leviorum Diaphoreticorum usus sit continuus, conducunt enim omnia Diaphoretica & Diuretica superius recensita, & externè ferè nihil lentandum, nisi in antecessum interni causis sit prospectum, quo peracto spontè sæpè curatur, quo neglecto multa sæpè graviora symptomata subsequuntur. Diversa autem in usum vocari possunt tum lavimenta ex mundificantibus variis absynth. aloë, myrrh. camph.  $\Theta$ . hui, ~  $\Theta$  \*ci,  $\nabla$  calc. viv. & similibus conflata linimenta ex unguento rosac. c.  $\Theta$  le hui, vel  $\zeta$   $\pi$   $\alpha$  alb. sejunctim vel simul vel cum aliis camphor. therebinth. ocul.  $\zeta$ . flor.  $\Delta$ .  $\Theta$  \*ci commixt. prout res exigit;

tum pulveres aspergendi ex cerussa, lap. calaminar. tut. ocul. cancr.  $\Theta$  hui, cret. &c. Omnia quoque medicamenta, quæ in scabie præscribuntur, & hic profunt, ut ol.  $\zeta$ . V enulat. Saturnina. Cinabarina, & sequens conducit pulvis Herpeti inspergendus:

$\mathcal{R}$ . Ocul.  $\zeta$ .  $\zeta$ ij.  
cinabar. nat.  $\zeta$ ij.  
 $\Theta$  hui  $\zeta$ ij.  
sperm. ceti  $\zeta$ ij.  
camphora  $\zeta$ ij.  
M. f. pulvis.

Vel illinatur balsamus Peruvianus, vel cum linimentis carptis imponatur. Quandoque etiam ad fortiora accedendum est, ex gr. sequens in Herpete sæpè optimum præstitit effectum, cautè tamè applicandum.

$\mathcal{R}$ . Sublimat. opt. gr. xij.  
 $\nabla$  pluvial.  $\zeta$ vj.

Cog. super cineres calidè in phialâ vitreâ ad dimidiat.

Vel in forma linimenti: Vel

$\mathcal{R}$ .  $\zeta$  sublim.  $\zeta$ ij. ad  $\zeta$ ij.  
immittatur vasi stanneo, ac effund.  
 $\nabla$  fl. fabar. sigill. sal. ad  $\zeta$ vj.

stent ita per noctem, mane siltretur aqua, ut clarescat. Vel

virial. Ungar.  $\zeta$ ij.  
 $\nabla$  Plantag.  $\zeta$ ij.

applicetur quadruplicis linteis.

$\mathcal{R}$ . Ungu. rubr.  $\zeta$ ij.  
camphor.  $\zeta$ ij.  
 $\zeta$  prapit.  $\zeta$ ij.  
ol. rosar.  $\zeta$ ij.

M. fiat l. a linimentum.

quo Herpes calidè inungendus est, vel theriaca vel dialcordium, vel spir. matricar. cum aq.  $\zeta$  vel Elix. vit. imponantur: ex salib. volatilibus impositis sæpè optimum obervavi effectum imprimis si cum aquis fuerint temperata, sic & convenit  $\Theta$  volatile oleosum illitum. Suffumigia nec hic continentenda sunt. Celeberrimus D.  $\Delta$  Guldenkle: Herpetem miliarium feliciter curavit præmissis cholagogis & fervorem particularum emendantibus remediis solis paucis topicis, cetero sc. Hieronymi Fabricii ex succo tabaci, &c. & postmodum arcano Valesii de Tarantâ applicato funditis hisce delevit.

## CAPUT VII.

### De Oedemate & Scirrho.

$\S$ . I.

Inter Tumorum genera Medici & Chirurgi reſerunt *Oedema* sive *Oedus*, quod derivatur à verbo Græco *oedma* & *oedus*, quod significat tumorem frigidum laxum, mollem, albicantem, doloris expectem, non renitentem, per quem materia subtilis seu cælestis liberè sine remora perfluere potest; describi potest *Oedema*, quod sit tumor mollis, laxus, digito prementi cedens, indolens & albicans in cruribus præcipuè apparens, à succis, imprimis lymphæ effusa & viscida ac stagnante, vel planè à tubulis suis evasata, à defectu athenisortum habens, morbisque chronicis plerumque succedens.

*Oedema quid*

*Scirrhus* derivatur etiam à Græco verbo *scirrhos* ex  $\sigma\sigma\pi\sigma$ , quod propriè tumorem durum, renitentem, ac indolentem denotat. Sunt, qui distinguunt inter Scirrhum legitimum, sive exquistum, & non exquistum, quem vocant *gynor exquistus*. Nos verò hanc distinctionem rejicimus, pro causæ enim & loci, seu partis affectû ratione saltem differunt. Distinctio ergò in Scirrhum phlegmonodem, erythelatomem, oedematodem tanquam inutilem foro Chirurgico exulare jubemus, cum doctrina hæc de quatuor humoribus Galenicis sit relinquenda. Scirrhus *Ejus D.* ergò describi potest, quod sit tumor durus reni-

scriptio.

denis

tens & indolens absque inflammatione sensum in partibus mollioribus genitus, partes internas atque ac externas invadens, à succis spiritibus volatilibus fraudatus, fixioribus ac crassioribus in tubulis stagnantibus & vix fermente scibilibus & sic partem extendentibus obortus. Scirrhus vulgò, seu dictum, dividitur in exquisitum, & nothum dolentem.

Parti affe-  
cta.

§. 2. Omnes corporis nostri partes internæ, ac externæ, quatenus constant ex tubulis ex uno magno tubo prodeuntibus, pro parte affecta Oedematis haberi possunt, cum collectio humoris viscosi ac aquei in hac vel illa parte facile fieri possit, præsertim verò in extremitatibus, & quidem pedum, hic tumor observari solet, & hoc facile fieri potest ob loci declivitatem. Oedematis ergò sedes sunt *vasa lymphatica*, effectam lympham vehentia cum intemperie sanguinis viscida & paucò sale referta, hinc cum vala sanguifera comprimentur, lymphatica autem distendantur, oritur pallor. Scirrhii verò pars affecta sunt glandulæ omnes & tubuli quicunque, vel partem internam, vel externam constituentem.

Diagnosi.

§. 3. Dignoscitur Oedema, seu tumor oedematofus, ex iis, quæ jam superius in eius descriptione relata fuerunt, tum ex eo, quòd vestigia digiti impressi diutius supersint, & successivè iterum eleventur, tum etiam ex pallore tumoris, & ex doloris, Inflammationis & caloris absentia, humor quippe obstruens dolorem ac inflammationem non efficit, ex eo apparet, quod succus iste minimè fermentativus est, unde patet, fibras haud tanta vi expandi, & per consequens minorem dolorem & calorem causari. Nullus enim in hac obstructione oedematosa adest particularum minimarum motus intestinus. Hinc etiam Oedema raro suppuratur, materia enim obstruens est humor viscidus ac crassus, qui non facile, ut chylus, coagulatur, idemque rarissime, vel nunquam in pus mutatur, nisi efficiatur, ut alcali & acidum in eodem tumore invicem digladiantur ac fermententur, non aliter, ac fieri videmus in oleo. Si per deliquium oleo Oli affuso, sal enim Oxi & quodvis sal alcali acuta habet spicula, interim pluribus poris amplioribus est donatum, & per consequens multum ætheris secum vehit, oleum autem Oli constat ex particulis acidis scindentibus, non tam porose substantiæ, porisque non tam amplis, hinc etiam tantam ætheris quantitatem non fert. Itaque si confusio duorum horum liquorum fit, magnæ oriuntur turbæ, acidæ enim scindentes particule se amplius salis Oxi poris insinuant, illisque obstructis, ætheri, quem copiosum secum vehit, viam præcludit, qui concitatiore motu in illos ruens manifesta nobis sui transitus exhibet signa, imò cum tanto impetu partes distendit, ut si incautiùs confusio fiat, vitrum in partes dissiliat. Ab hoc itaque concitato ætheris motu calor, strepitus & murmura deduci solent. Fumina autem oriuntur, quia per celerem illum ætheris motum particule attenuantur, inciduntur, & resolvuntur, quæ resolute nobis tumores exhibent. In hoc verò Oedemate cessat hæc effervescencia, quia æther per continuatum motum novos sibi formavit poros, quos liberè ac sine ullo impedimento transit, quamdiu enim liberè transire nequit, & vi quadam ruere debet, tamdiu effervescencia liquorum & succorum corpo-

ris nostri durat, novis verò poris factis illa cessat.

Scirrhii signa Diagnostica sunt tumor durus & renitens, ab initio minimus apparens, de die verò in diem crescens, modò lividus, modò pallidus, juxta varietatem humorum stagnantium, & exinde enatam texturam partium, absque verò Inflammatione, calore & dolore apparet hic tumor scirrhosus, ex quo iterum patet, succos hos non esse fermentescibiles, sed potius in ipsis cessare motum intestinum particularum minimarum, hinc est, quod nullus calor, nullusque dolor percipitur, de quibus jam abundè egimus.

§. 4. Quemadmodum Galenicus ex biliosa fluxione Erylipelas, sic ex pituitosa deducunt Oedema, quod ipsis tumor laxus est citra dolorem. Norunt autem etiam tumores laxos fieri circa pedes in affectionibus aquæ inter cutem, & tabe, ac malo corporis habitu. Ob pituitosi ergò humoris influxum, laxum tumorem in parte aliqua oboriri statuunt. Cause primitivæ ipsis sunt omnia ista, quæ intemperiem frigidam & humidam producere, pituitæque proventum generare possunt, ut est aer frigidus & humidus, victus inordinatus, crapula, &c. Causa antecedens ipsis est temperies humida ventriculi, cerebri, Hepatis, & pituitæ in corpore proventus, quæ est causa Oedematis conjuncta, quatenus est, ut illi loqui amant, naturalis, & quarta sanguinis pars insipida & alba.

Scirrhium autem exquisitum à viscoso, ac Scirrhii, crasso humore, partibus Scirrho affectis adeò impacto, ut ægrè avelli possit, fieri contendunt. Alii ex ipsis Scirrhii caulam ab humore melancholico naturali, nonnulli à pituita crassa deducunt. Ab hepate & liene malè affectis facile humorem vitiosum mitti posse non dubitant. Plerumque tamen à Medicis Scirrhium fieri ajunt, qui inflammationes & ignes sacros perfrigerant ac adstringunt.

§. 5. Oedematum tumorem Paracelsus deducit à liquore in parte quadam resoluto, producto ab externis causis & accidentibus, cum quicumque læsus fuerit, vel ex abundantia liquoris, sal autem quodvis resolutum in suoloco remanere statuit solum, nisi per poros transeat, quod in Oedemate fieri nequeat.

Scirrhium verò in omnibus corporis partibus scirrhii, vel à sale nitroso in eas dejecto, & ibidem alienam indolem induente tumoresque hosce producente, vel à vitriolo in duritiem abeunte excitari existimat, quorum posteriores tumores ob vitrioli corrosivitate aliquando in ulcera transfeant.

§. 6. Helmontius in cruore extravenato, depresso & condensato esse fermentum excitativum existimat, hinc latex quamdiu cum cruore in venis existit, vel ad glandulas fertur, communi vita potitur, nec regulis hydraulicis patet. Sursum verò atque deorsum necit, quia non habet. Ast extra vitæ consortio semel reiectus, jam excrementi naturam subit, deorsumque sæpè prope rat, proprio gravatus pondere. Vilis itaque pretii latex in Oedemate evalutus ab ipso habetur, ideoque quoties unumquodque viscus malè afficitur, statim latere negligit, eumque à cruoris sui consortio excludit, fatisque sibi negotii in sui tutelam reperit domi. Ergo latex semel alibi repudiatus, vitæque sodalicio spoliatus, & in partibus quibusvis corporis delatus,

Galenicus  
rum opinio  
de causa  
Oedematis.

Paracelsus  
placita de  
causa Oedematis.

Helmontii  
ratione  
nupta de  
causa Oedematis.

excre-

excrementi statim indolem luscipit, quin suam sibi que nativam. Hæc ipsi *Helmonio* est *causa Oedematum*, & non tam causa, quam productum, laticem in Oedemate minus vitæ consuetudine privum, quàm in Afcite, etiam rursus in venas forberi, & ad renes labi, ut ultimam lotii determinationem subeat, contendit Author. Latex enim, secundum *Ipsum*, in cruoris massa sinuosis vagatur, ad loca opportuna deferuntur, distributivæ facultati promptè auscultans. Pariter licet in morbis obsequiosis abundet, & oedematosa crura inflet, id fortè contingere ait. Natura enim, ut loquitur, generali nitu odiosum sibi hospitium parit, illudque excrementis facinrat, quæ abigere optat. Oedemata fieri statuit, si attractrix laborat resagantque latex in hepate. Eapropter *Galenicorum* opinionem, quam habent de pituita in Oedemate seu tumore laxo collecta, ridet, & pluribus comprobatur rationibus & experimentis, eam falsam esse, sed potius laticem acidum & resagantem accusat.

*Scurbi.*

Pro *Scurbi*, indole & causa ritè expiscanda *Helmontius* statuit, quod totus cruor, ut in Gas aheat, duabus aliis ad volandum opus habeat, aëre & fermento, quare quoties aliquid cruoris in externo corporis ineptum sit, aut non sensui disponatur, gradusque subeat, ut totum per totum fiat volatile & transvolabile, eo momento jam *Scurbis* & *Nodis* esse conceptos arguit. *Duros* etiam *Scurbis* ex Tartaro peregrino sæpè coalescere non dubitat, Tartarumque hunc inesse materialiter in edulis & potibus, itemque permanere per digestionem officinas, atque proinde tandem coagulari in miferiis tradit Author. Coagulata in nobis fieri per exsiccationem (excepta creta podagrica, neque per tartarum inexistente) clam, multo minùs ex Microscopi conditione saxosa aut calcinatoria. Alioqui sicut initio, prout & *Scurbis* quolibet, itemque bolus, lutum, mucago, arena & duelech seminalibus intus juxta *Ipsum* coagulantur ac resoluntur, atque longè aliter solvuntur ac coagulantur, quam si pertinax & immutabilis rerum quantumlibet tartarus sua sponte in nobis peregrinum coagulum dedisset. Mucilaginem quoque in partem aliquam per Crisum delatam luscitare sæpiùs *Scurbis* pluribus Author comprobatur rationibus.

*Willisii observationis de causa Oedematis.*

§. 7. *Willisius* statuit, sanguificationem perfici tum fermentatione, tum accensione, cruorisque crasin integram permanere, dum eorum utraque ritè exercetur; si vero spiritibus & sulphureis dissipatis aut depressis, & sale à copiosiori aqua diluto, latex serosus præpolleat, infirmatur pervertiturque hæmatosis. Chylus itaque in sanguinis massam confluens, eumque cadaverosum quasi reperiens, ab illo nequaquam fermentatur, nec dissolvitur, comminuiturque: chylus ergo nullam vel saltem levissimam passus alterationem, in aequum vitiosumque commutatur liquorem, qui indies angelicens sanguinem obruit, ejusque calorem imminuit. Cruor autem curriculum suum per universam corporis peripheriam tardiori tamen gressu pergeus, serum istud exuberans ex arteriolarum oculis in laxiori quadam parte deponit, illud vero spiritibus destitutum & torpidum existens, venarum orificia, à quibus refertur, subingredi non valet, & majori sua diuturniorque ægeffione, impletis omnibus

poris partis, in qua residet, eam in tumorem elevat. Morbus iste contingit etiam ex sanguinis accensionis defectu, quando scilicet inspirato crassiori aëre paucioribusque nitrosis particulis dilato, sanguis in præcordiis ritè non accenditur, & tenuiore in illo excitata efflagratione rectè nullo modo perficitur; hocque pacto depravatur cruoris latex, ac visus fermentativa penè exortus, chylis dissolvendo atque assimilando impar reperitur, illumque in serosum humorem permutari finit. Quum tamen sanguinis fermentatio ejusque accensio semper adeo non invertantur, ut nulla ipsi amplius superlit chylum fermentandi assimilandive virtus, sed eorum utrique aliqualem contingat immutatio, liquoris aquosi proveniens semper copiosior non accidit, parèque solummodo copia aggeritur, & in peculiari quadam parte laxioris texture aggeritur, quam in tumorem *Oedema* appellatum elevat.

*Willisius noster de Scurbi causâ ratiocinans Scurbi.*

asserit, adeo copiosas inter dum adesse in sanguine terrestres particulas, ut activorum ejus principiorum volatilissio ab illis inhibeatur, & ipsius aque ac succi nutritivi consistentia ipsissior reddatur. Latex ergo sanguineus testudineo gradu corporis partes peruenis, terreis que particulis scatis, quum ad angustos glandularum ductus per arterias delatus fuerit, eos permeare, venarumque oscula subintrare nequit. In glandulis itaque remorari cogitur, & in illis stagnare necesse habet; sed quum serolis particulæ præea, qua pollent tenuitate, venarum orificia subire possint, à terrestribus deiciuntur, easque relinquunt in glandularum valculis, quas continua sibi ægeffione adimplent atque insarcunt. Liquor vero nervosus malo fermento præditus, pravum istum succum in glandulis effusum ipsi assimilare nequaquam valet, & cum in illarum substantiam convertere, sed durum tumorem *Scurbi* nomine venientem ex eo compingit & efformat.

*Sylvis opinio, quo modo generetur Oedema.*

§. 8. *Sylvis* in quibusvis corporis partibus tumores *Oedematosos* contingere posse asserit, eorumque causam existimat serum & pituitam nimiam, non tantum massâ sanguineam admixtam, sed & intra partes corporis externas effusam, quod subsistens serum aut pituita in parte aliqua, ibidem juxta *Ipsum* producit *Oedematosos* serososque tumores in partibus particulares, cruribus præsertim & pedibus, tum in singulis corporis partibus. Tumores hos sæpè ortum suum habuisse existimat à nimio potu, cui indulgent non pauci ob situm ferè inextinguibilem, qua fuerit affecti in quibusdam febribus & continuis & intermittentibus, imprimis durante frigore, existente tunc potu pernicioso.

*Scurbi* vero tumores juxta *Sylvis* fundamēta originem sumunt ex diuturniore partium obstructione, ob sanguinis ac humorum nimiam viscositatem, coagulationem, inspilationem; aut pituitosi humoris intermixti nimiam quantitatem. Coagulationem hanc humorum in duci ait ab acido nimis austro, unde sanguis ac pituita firmiorem & magis retinentem acquirunt duritiem.

§. 9. *Carstani* à succo quadam crasso, sive lymphâ lutulenta, viscida & coagulata tubulos partium obstruente tumorem *Oedematosum* generari docent, cujus succi visciditatem originem accu-

*Carstani opinio, tumorem fundamēta de causa Oedematis.*



accusant chylum crudiores ex ingurgitatione cibi & potus ventriculū obruente pronatum, praefertim verò vinum acidius majori in copia potum tumori huic anſam præbere norunt, quandoquidem ſucci acidiores alias particulas poroſas & volatilioreſ in motu ſuo impediunt & in quietem cogant, ſicque ſuccos inſpiſſant. Frigus etiam externum vehementius vel inſpiratione eſſiunt, vel poris corporis adhærens, ſuccorum motui in corpore obſiſtere, & in viſcidatē eodem cogere ſolentur, quapropter piſcatores, alioſque homines ſapius aqua calidæ inſiſtentes pedum Oedemate tandem onerari norunt, uti & illos, qui tempore pluviæ & hyemali ſive gelidatē aliquod longinquius conſiſtunt, quod aſthmaticis & difficultate ſpirandi affectis eo citius contingat, cū ſanguis cum reliquis ſuccis in machina eorum debiſe ventilari nequeat, & per inſpirationem frequentiore aërem frigidum aperto ore in pulmones admittere opus habeant, qui maſſæ ſanguineæ communicatus ejusdem circulationem tardiore reddat, & multis particulis acidis angularibus ad motum inteſtinum nimis promtis eandem inſiciat, unde lymphæ tam clara & reliquis ejus ſuccis ſequetrari nequeat, ſed turbida & lutuleſcit per glandulas tranſire inepta, extremis corporis partibus potiſſimum, & nonnunquam etiam ipſi trunco communice-  
tur.

Ab ipſo verò chylo ab iſdem particulis angularibus, ſive acidis coagulato *Scirrhum* in parte aliquâ glandulari pronari credunt, particulis enim volatilioribus & ramoſioribus à craſſioribus caſeoſis ſegregatis, poſteriores firmius compinguntur, & interdum adeo in-  
craſſantur, ut in topheam & calculoſam abeat durtiem. Nonnunquam in ipſis inflammationibus contingere dicunt, ut perversâ topicorum mēdis convenientium applicatione volatilioreſ iſtæ chyli obſtruentis particule per poros nimium dilatatos abeant in autam, quibus abſumptis reſiduum in fluorem redigi nequeat, ſed ob terreſtreitatem ſuam in tubulis quieſcat & eodem obſtruat, circaque obſtructionem iſtam novi ſucci, & præſertim chyloſi, tamdiu hæreant, donec per diuturnioreſ motum inteſtinum volatilioreſ eorum ſales denuò aſurgant, & terreſtres partes prioribus in tubulis jam morantibus aggregentur, & tumor ita durus augeatur. Ut verò ejusmodi terreſtreitatem in ſuccis corporis humani colligantur, multum attribui cenſent victum, craſſum, frequentioreſ & diuturnioreſ elum caſei antiquioris, carnis inſumæ, piſcium marinorum inſumatorum, vel muria diutius conditorum, potum cereviſæ craſſioris ex aquis lutulentis, fabuloſis aut calcariis paratæ, nec non vini non ſatis depurati, & particulis terreſtreſ abundantis, aërem craſſioreſ, ſulphureum, & nebuloſum aut frigidum copioſius & diutius inſpiratum, qui chylum in ſanguine contentum pariter inſpiſſat. Ex diuturniore mæſtitia multos ſuccos acidos, & auſteros in corpore colligi putant, coagulationi chyli aliorumque liquorum, quàm maximè accom-  
modatos, unde externa quoque remedia ac-  
ciora inflammationi vel eryſipelati ſimilitè ad-  
hibita humores ibidem loci detentos coagu-

lare, & tumori huic ſiſſo anſam præbere ſolentur.

§. 10. Ut & noſtram de cauſa Oedematis addamus ſententiam, dicimus & hunc tumorem eſſe à ſtagnatione humorum in partibus tubuloſis, nullus enim tumor eſſe poteſt, quando corporis noſtri canaliculi aperti & integri ſunt, ſucci liberè perfluere ac circulare poſſunt, in Oedemate verò ſucci ſunt magis lutoli & eſſeti, quàm in aliis tumoribus, humor enim in Oedemate eſt inſtar gelatinæ ſeu juſculi carnis frigefacti: in principio ex dilaceratis valis lymphæ & ſuccus nerveus exſiſtant, & in partes vicinas eſſiunt, quæ dein opæ acidæ accimonia: in maſſam lutuloſam commutatur, non aliter ac ſi decocto cornu cervi aſſuſis acidum, quod dein mutatur in gelatinam, vel ſi juſculum carnis exponas aeri acido: à quo craſſius redditur. Cauſa ergo immediata Oedematis eſt lymphæ in parte quadam ſtagnatio, à vaſe lymphatico obſtructo & diſtento, vel ab eſſuſione ejusdem in partem, in qua colligitur, à rupto vaſe, cauſa verò mediata eſt lymphæ viſciditas, craſſitas, & aquoſitas; experientia enim conſtat, lympham ex alcalibus ſulphureis ſive volatilibus, & ex ſulphureis ſiſis ac phlegmatis conſtitutam eſſe; dum enim principia iſta ordinem ſuum ſervant, juſta ſunt magnitudinis, & figuræ, ac motu æquali aguntur, nulla ſit lymphæ in corpore remota, at quæ ex plurimis cauſis notabilis immutatio iſis omnibus accidere poſſit, nec mirum quoque, ſi lympham aliquando in partibus ſtagnare videamus. Succus enim Oedematosus ſeu lymphæ ob craſſitatem & aquoſitatem ſuam non facile ab *abere* agitari poteſt, non mirum proinde eſt, quod in tali tumore non graves ſubveniunt inflammationes aliæque ſymptomata. Subſequitur quidem Oedema morbum chronicum, & acutum nulla cauſa evidente prægreſſa, niſi quod in morbis chronicis & acutis maxima ſit ſpiritus animalium deperditio, tenuis contingit illorum reparatio, volatilioreſ ſanguinis particule diſſipantur, & ſale volatili oleoſo ſanguinis deſiciente neceſſario lymphæ craſſa ac eſſeta remanet, imo partium fermentationes ſeu motus particularum minimam inteſtinum ceſſat. Saliva autem phlegmatis (quæ in morbis acutis aut chronicis diſſipata fuerit,) æquæ ac par eſt non abundans, alimentis ſufficientem non conciliat fluiditatem, acidæque illius, ut & ſalia craſſioreſ adeptæ molem alimentorum tenuioreſ particulas ſubire nequeunt, easque intemeratas ſerè dimittunt. Alimenta in ventriculū delapſa, & leviorē tantum in ore paſſa præparationem, æquæ ac par eſſet à fermento ſtomachi non dividuntur & comminuantur, quum per morbi decuſum vel ejusdem violentiam notabile contingeret alcalicorum phlegmatumque detritum, & fermentum ventriculi nihil aliud ſit, quàm liquor ex alcalibus acidis & phlegmatis compoſitus, ſi liquor iſte, qui à ſanguine ſecernitur, alcalicis & phlegmatis fuerit depauperatus, alimentorum ſalia apte non diſſuet, nec eorum ſulphura, uti necellum foret, diſſolvit, unde accidit, ut chylus, qui ex hac maſſa ita fermentatâ oritur, craſſus fiat ac viſcidus, talis autem chylus ad duo-

Y y denum

denum appellens, & intestinorum tubulum excurrentes, à succis in illorum cavitatem defluentibus non corrigitur. Bilis liquidem, quæ ex multo alcalico fixo, paucis volatili, paucis præ, paucissima terra & copioso phlegmate constat, satis abundantibus alcalicis phlegmatisque ditata, chyli acida, ut conduceret, non absorbet, nec convenientem fluiditatem illi impertitur, succi cum ex Pancreate, tunc ex glandulis intestinorum tunicis insertis emanantes, & ex alcalicis volatilibus sulphuribus, phlegmatisque constituti, alcalica satis copiosa non possidentes, nec phlegmatis ea, quæ requireretur, abundantia prædita, residua chyli acida, ea quæ per esset ratione, non absorbet, sulphura sufficiens non dissolvunt, chyli particulas reliquas, ut conferret, non diluunt, nec justam mixturam illis conferunt. Is itaque chylus sanguini permixtus, ab isto corrigi nequit, omnesque succi ab hoc separati, ejus indolem participare debent.

Quum ergo sanguis lymphæ fons existat, hæc illius indolem redolere debet. Si autem potius particularum volatilium sanguinis portio avolarit, crassiores tantum, inter quas primas obtinent acida, ad motum ineptiora, & sulphura crassa remanent. Lympha ergo, quæ ex sanguine glandulis separatur, particulis suis volatilibus fraudatur, & ex crassioribus tantum sulphuribus, quibusdam acidis & phlegmatis constat, sed paucis resistentibus alcalicis in lymphæ, quæ sulphura ejus dissoluta detineant, acidis in illorum ramis sese implicantibus, & phlegmatis illa circumducentibus resistere nequeant, quare coagulantur & conglobantur, & in vasorum lymphaticorum angustiora orificia delata, in illis cespitant, eaque obstruunt, novæ lymphæ adveniendi obicem ponunt, quæ quum ulterius progredi nequeat, hoc in loco remoratur, perpetuoque affluxu vasis tunicas distendit, partesque adjacentes in tumorem elevat oedematofum; at vero tanta fit interdum lymphæ in vase collectio, ut fibræ tunicarum illius amplius sese extendere non liceat, cessanteque elatere, & continua facta lymphæ in tunicas impulsione, fibræ tandem disrumpantur, vasque contentum liquorem effundant, vel quoque temporis tractu delicatiora acida lymphæ à sanguine communicata, remanentium alcalicorum poros subeant, salique producant, quæ vasorum tunicas impetentia fibras illorum distendunt & dilacerant, vasque aperituram inducunt. Quando ergo adest intemperies viscida, terrestris sanguis & succus in remotissimis minutissimisque tubulis facilè sistitur, unde obstructio totalis sine dolore acuto, quia partes terrestris & viscidæ prædominiam obtinent, hinc partes salinæ acutè incarcerantur, & quasi sicuti ensis in vaginâ reconditæ sunt. Quando verò Oedema oritur, nulla prægressa causa evidente, sex quoque res non-naturales vulgò dictas merito accusare debemus, omnia enim ea contribuunt, quæ vel volatiliora alcalica dissipant, aut abundantiora acida sanguini ac succis inferunt, quæ jam in capite de Inflammatione satis fuisse explanata sunt; & quum lymphæ à sanguine tanquam fomite, ut supra vidimus, originem ducat, illius constitutionem æmulari debet, paucisque in illo existentibus alcalicis copiosisque acidis compositionem ejus ingredientibus, ad visciditatem

coagulationemque prona sit, vel acrimoniam assequitur. Cum, proinde debita inter sanguinis particulas non est proportio, ac proin intestina ejus agitatio rite non procedit, prævalentes (cum nec chylosorum seu viscidarum fiat attenuatio,) particulae crassæ viscosæ, terrestris sibi mutuo facilè adherent, sibi quæ ea de causa in angustissimis, licet laxis, à corde remotissimis tubulis, h. e. in extremitatibus, manibus pedibusque sistuntur, quos tum totaliter obstruant, vixque ulla inter ipsas fit fermentatio, paucis acutis omnino involutis, nullum nisi gravativum cum sensu frigoris excitant dolorem, cumque sensum & sensum coagmententur, pedetentim intumescit pars Oedematosa tum dicta, pallida ob compressionem vasorum sanguineorum, tubulis ultra tonum expansis à materia viscosiore, quam in universali Oedemate seu Leucophlegmatia, ubi visciditati major conjuncta est & his copia, illic autem major visciditas cum acido adesse videtur, manente aliquamdiu fovea digito impressa, viscidis particulis tardè tandem locum, quo expulsi erunt, repetentibus.

Materia obstruens si magis, quam prior, fuerit crassa, viscosa, resinosa, prout artius vel copiosius poris tubulisque infarsita, vel plures simul circumvicinarum partium, præcipuis glandulosarum, tubulos intortos oblescent, recedent, aut à longo tempore, fugatis interim lubricis aquosis aliisque subtilibus, cum magis vel minus notabili quantitate particularum Salarum, terrestrium vel acidarum conjuncta, majores diutiores (interdum topheæcos & calculosos,) producit Scirrhus exquisitus vel nothos dolentes: Porro Scirrhi non raro oriri solent in partibus Inflammatis post intemperium refrigerantium ac repellentium usum, non dispari ratione, ac gangræna post applicationem albuminis ovi cum bolo, immo multo tumores à nimium calidis resolventibus, fluidas potius expellentibus, quam crassas dividitibus, seu attenuantibus, Scirrhioli sunt magis vel minus pro materia & partis varietate.

Causa ergo Scirrhi est succorum coagulatio, eorumque in parte aliqua, præsertim glandulosa, stagnatio & induratio, acidum enim coagulando materiam in duritiem adigit. Jam superius demonstravimus, Inflammationem fieri à tubulorum obstructione à sulphuribus, à medicamentis acidis coagulatis, & ab alcalicis idem saturatis orta. Si enim pro remediis, quæ acida absorbeant, motum succis stagnantibus communicent, poros strictiores dilatent; ea adhibeantur medicamenta, quæ acidorum penam adaugeant, succorum cespitantium motum inhibeant, porosque obturent ac stringant, qualia sunt repellentia, materia compactior redditur, obstructioque validior fit. Proturpens autem materia subtilis, accedentes spiritus animales, subtilioresque sanguinis in vas circumjacentibus contenti particulae impingentes, in succos illos stagnantes, tenuiores tantum in motum agunt eorum partes, easque ad exitum determinant; ac quum alcalia volatilia, sulphura volatilia, phlegmataque, ex sint particulae, quæ ad motum magis sunt pronæ, motu donatæ ab aliis desciscunt, & per poros effugiunt. Crassiora verò salia ab alcalicorum cum acidis connubio genita, crassa sulphura & terrestritas in parte

in parte remanent, quum autem continetur materia æthereæ, spirituum animalium, & volatiliorum sanguinis vicini particularum in succum stagnantem appulsus, nec crassiores illius particule ab iis attenuari nec comminui possint, acida in alcalicorum poros alius ab ipsis adiguntur, & sulphurum ramis fortius involvuntur, salique in partis fibras compulsi, illas mutuò inter se arctius adiungunt, earumque interstitia angustiora faciunt. Sed quum sulphura salium aculeis superextendantur, & terrestritas massæ isti permixta eorundem salium spicula obtegat, partium fibrillæ à salium insuleibus vindicantur, nullusque vel levis excitatur dolor, Durities ex eo prodit, quod evaporatis volatilibus alcalicis, reliquæ particule juxta se invicem quiescere remanent, sulphura ab alcalibus, ut antea, nequaquam dissoluta, coalescunt, motuque desistantur, dissipatisque phlegmatibus, aliæ particule à se invicem semotæ non detineantur & undique pressæ propius ad se invicem accedant, ac rara parvæque relinquant interstitia. Sic quoque validiora discutientia medicamenta parti alicui inflammatae incautè & sæpe applicata, & per poros ad succum in illâ parte stagnantem delata, tenuiores eius particulas in motum concitant, irritatis partis fibrillis, frequentiusque iteratis illorum vibrationibus, magis volatilitatem succus stagnans, eliminanturque per poros subtiliores ejus particule, crassioresque in parte relicte arctius inter se ununtur, fortioresque faciunt obstructions, quæ durum produciunt tumorem indolentemque, salium illas facientium aculeis sulphuribus absque terrestritate obtestis.

Remotæ causæ sunt res non naturales malè à Medicorum vulgo ita dictæ, quæ & sium symbolum ad excitandum hunc affectum afferunt; ær enim calidus & exestivus concitatore in motum succis concilians, illaque vehementius rarefaciens, tubulorumque fibrillas fortius pungens, ex illorum vasis eruptionem infert; ær autem iste fervidior succum extravasatum volatilitatem, partisque poros ampliando, succi subtiliores partes abripit, ejusque crassamentum ex salibus sulphuribusque crassis & terrâ compositionem in parte relinquit, consuntis ergo tenuioribus particulis, à quibus reliquæ in motu conservabantur, & exhaustis phlegmatibus, à quibus dissolutæ detinebantur, hæc undique à materia subtili pressæ, & à continua fibrarum partium ambientium vibratione compulsi, arctius invicem connectuntur, crassioresque constituunt moleculas, quæ pertnaciores in tubulis efficiunt obstructions, à quibus tumor excitatur durus & indolens *Scirrbi* nomine veniens.

Ær frigidus particulis duris, rigidis & acutis donatus, fibrillarum poros subiens illos occludit, earumque interstitia angustiora reddit. Salia volatilia per insensilem transpirationem exire solita, obturatis poris, angustatisque fibrarum interstitiis avolare nequeunt, sanguinique, chylis vel lymphæ remixta, rapidiorem motum illis communicant, validiusque ea exagitant, & tenuiores subtilioresque ipsorum particulas evaporare faciunt, subtilioribus ipsis exhalatis, acida alcalicorum crassiorum poros subeunt, sulphuribusque ramis intrinquantur, eaque coagulant. Salia ergo ab aci-

dorum cum alcalicis unione orta, & sulphura ab acidis coagulata ad confictos tubulos delata in iis remorantur, eosque obstruunt. Materia subtilis, spiritus animales & volatiles vicini sanguinis particule tenuiores, si quæ adhuc superfluis, partes exagitant, & à reliqua massa separant, ac per poros amandant; crassiores ergo tantum particule remanent, quæ arctius inter se conjunctæ durum efficiunt tumorem, qui nullum adjunctum habet dolorem, salium aculeis nudis non existentibus.

Cibi acidi & acerbi copiosiora sanguini impertientes acida, salium in coabundantiam promoveant, sulphurumque maiorem adducunt coagulationem. Salia ergo illa, sulphuraque ista coagulata, ad angustiores vel minus robustis fibris polleutes tubulos deducta, in illis obstructions faciunt, nullo ipsis concessio ob molem exitu. Stagnante igitur in parte humore, tenuiores eius particule perpetuo, quo dominantur, motu evaporantur, crassioraque salia & sulphura coagulata cum terrestritate in parte subsistunt.

Cibi nimia terrestritate, aut visciditate, sive crassioribus sulphuribus iisque copiosioribus præditi Scirrhum procreare valent; si enim terra in ea adsit abundantia, ut à phlegmatis distolvi nequeat, repletisque aliorum elementorum sanguinis, vel succorum ab illo segregatorum, interstitiis, copiosa adhuc superfluit, ad aciores tubulos delata, scabraque superficie donata illorum poris affigitur, ipsisque adhæret: angustioribus ita factis tubulis, succus ad illos per veniens in cursu suo impeditur, subtiliores ejus particule exhalantur, crassiores stagnant, aculea ab acidis saturantur, sulphura ab iisdem coagulantur, terrestrisque particule in consimiles accipientes, iis adnascuntur, tubulorumque obstructionem, ac partis tumorem adaugent. Potius eadem habenda est ratio, quæ cibi.

In vehementiori motu, frequentioribus iisque validioribus fibrarum partium in sanguinem vibrationibus, hic rapidiori agitur motu, nimisque attenuatur ac rarefit; eodem de causa copiosiori tenuiorique sanguine ad cerebrum appulso, abundantiores in eo progignuntur spiritus, & ad partes majores determinantur, à quibus adaugentur sanguinis motus & rarefactio: quod chylis & lymphæ etiam evenit, durante rapidiori tali motu, minores sanguinis, chylis, lymphæque particule majore parte exhalantur, reliqua verò massa tenuioribus hinc orbata particulis, à quibus in motu conservabatur, & crassiores solummodo possident, quæ torpidiusque sunt acida: crassiorum alcaliorum poros subeunt, iisque inhaerent, sulphura ab alcalicis amplius, ut antea non dissoluta, ab acidis coagulantur, & ad angustiores tubulos devenientia in illis retineantur, illosque obturant. Continua per motum humorum obstruenti communicata distipatione, subtiliorum particularum, terra tantum cum salibus & sulphuribus coagulatis remoratur. In quiete debiliores sunt fibrarum partium in sanguinem vibrationes, ideoque particule ejus, ut par esset, non comminuntur ac attentur, nec à se invicem æquæ ac extre foret, separantur ad ipsam succis fluiditatem conciliandam; paucus sanguis iisque crassior ad cerebrum apportatur, pau-

Yyy 2 cioresque

cioresque hæc de re in cerebro producuntur spiritus, & minori, quam requireretur, copia ad partes conflunt, coctiones ob spirituum penuriam deterius peraguntur, nec particulae, ut deceret, à se invicem extricantur. Morus ergo sanguinis, sufficiens non affluentibus spiritibus animalibus nullo modo intenditur, neque partes ejus volatilantur aut rarefiunt; acida ex alcalicorum poris nequaquam deurbantur, nec à sulphurum amplexibus abripiuntur, sed potius altius in illa adiguntur, à pressione, quam undiquaque patiuntur. Salia ergo & sulphura coagulata ad angustiores tubulos appellentia, in illis retinentur, eosque obstruunt, penitusque exhaustis tenuioribus particulis exurgit tumor durus.

Somnus nimius & laboriosus dictus multum conferre potest ad producendum hunc affectum, in somno enim levis fit partium corporis motus, tubuli cerebri viscidiores lymphæ oclusi paucos admittunt spiritus, quo fit, ut sanguinis circulatio aliorumque succorum lentius progrediat: loquor enim hic de laborioso & morbo somno, in naturali enim somno omnes succi celerius circulantur.

Vigilia quoque symbolum suum afferunt, ad producendum scirrhum: in vigiliis enim spiritus animales absumuntur, & fit læpe in partes uberior spirituum animalium influxus, majusque eorum contingit detrimentum; corporis partes frequentiori eoque validiori agitantur motu, fibrillæque magis iteratis in sanguine vibrationibus suis illum tenuiorem rapidioremque efficiunt; particulae sanguinis attenuatae ad exitum sunt procliviores, & à reliqua massa copiosiores defileunt: acida verò dominum obtinentia etasiorum alcalicorum renascentium poros imprægnant, sulphuraque ab acidis non dissoluta coagulantur, atque ab iis obstruuntur arctiores tubuli. Exhaustis itaque per continuum motum phlegmatis, residuisque particulis subtilioribus, crassa tantum superfiunt salia, sulphura coagulata & terrestræ, à quibus Scirrhus pronascitur.

Si succi corporis ab aliquo viscere secerni soliti, vel ob majorem crassitatem, vel ob nimiam visciditatem in eo stabulentur, id est, si abundantioribus salibus crassis, aut copiosiore terrestræitate, vel uberioribus crassis sulphuribus ab acidis coagulatis præditi in eos perveniant tubulos, qui angustiores fuerint, quam ut transiitum illis permittant, retinebuntur in illis vel salia ista crassiora, vel sulphura coagulata, vel terrestræitas, in iisque obstructions efformabunt, quæ à nova & consimili adveniente materia accrescens, perdurante verò particularum obstruentium in parte temora, quod subtilius in iis superest, ab illis separatur, & exhalatur, parumque magnæ relinquit, à quo nascitur Scirrhus.

Sic & animi pathemata causa procatartica existunt Scirchi, profundior enim durabiliorque moror graviorque tristitia Scirchorum plerumque causa sunt. Anima enim tunc temporis unitotantum eique tristi objecto attentæ, paucos autem in corporis partes spiritus, sanguis illis non ditatus testudineo fertur gressu, pauciorque ad cerebrum devehitur, quod fit, ut parciore in eo procreentur spiritus, tubulorum fibrillæ spiritibus non distentæ concidunt, illosque angustiores efficiunt, ac sanguinem difficiliter ad-

mittunt; nec illius circulationi properanda, ejusque attenuationi promovenda vibrationibus suis opitulantur: sanguine ergo requisitâ spirituum abundantia carente, particulisque illius sufficienter non volatilatis, succi fermentitii ab illo secreti volatioribus particulis, à quibus ad munia sua peragenda maxime adjuvatur, satis abunde nequaquam ditati, alimentorum digestionem imperfectè operantur, crassiores alimentorum partes apertè non penetrant, nec dividunt, phlegmatisque salia terræque soluturiam, ut par esset, non aperiunt. Cum sufficientia non adsint alcalia volatilia, alimentorum acida, uti conveniret, non absorbeant, eaque compedibus soluta in alimentis relinquant. Sulphura coagulata ab acidis non liberantur alcalicorum, quorum adest penuria, ministerio: chylus ergo ex talia massa elicitus, & venas lacteas subingressus, nullo negotio in illos angustioribus nioram trahit, vel quædam ex illius crassioribus sulphuribus ad arctiores glandularum tubulos devenientia, in ipsis remoratur, quàm ob inolem eos præterfluere non valeant. Hic verò chylus sanguini commixtus, & universas corporis partes cum eo pervagans, ad angustiores earum tubulos appellens, in iis crassiora sua salia, aut coagulata sulphura deponit, illosque obstruit: nec lymphæ à sanguine separatae felicitior contingit fors; à sanguine crassiora salia, & sulphura ab acidis coagulata mutuatur, à quibus quædam illius vasa obstruuntur, humoribus itaque istis in partibus obstructis remanentibus particulæ illorum tenuiores, & ad motum aptiores evaporiunt, solumque superest crassamentum, à quo progignitur Scirrhus.

§. II. Oedematis prognosis dubia est, quod per se prodians mali est ominis, morbi enim chronici subsequens indicia præbet; si verò tumor pedum Oedematosus phlebotomi vel hæmorrhagiam, vel hypercatharin, ceu dum hæc scribo, exemplum novi, succedit, pessimum est signum, & mortis sepe adventum denotat; ubi lymphæ vel sanguis omni suo sale volatili fuerit fraudatus, & subsequitur tumor oedematosus, urplurimum lethale existit signum. Ubi verò homines temperamentum roboris habent, in iis raro lethale est oedematosus hic tumor, diu tamen durat. Sic etiam particulares tumores oedematosi haud sunt periculosi. Raro suppurantur hi tumores aquosi, propter visciditatem succorum stagnantium & defectum particularum volatiliæ & alcalicarum. Aliquando tamen ob nimiam compressionem vasorum nervorum, & oleis volatilis defectum in succis Oedemata transiunt in gangrenam & sphacelum, prout tale quid simile videmus contingere in Hydrocypis.

Scirchi quoque curatio difficilis est, ob materiam crassitatem, siccitatem, & particularum ejus intimiorem unionem & obstructionem pertinacem, & nulla sepe est expectanda, imprimis si sensu penitus careat; sed aliqua adhuc salutis superest spes, si sensu aliquando donetur, ex hoc enim apparet, quod obstructio non sit totalis, sed quædam fibrae & tubuli adhuc suum succum nervum & quidem volatilem oleosum recipiunt; hinc si Scirchi sint in debilibus & emaciatis corporibus, res periculi plena est. Scirchi cum notabilem in se contineant salis vel acidæ vel corrosivi

*Prognosis  
Oedematis*

rosivi copiam, finili existente sanguinis ac succorum constitutione, cum aliqua omnium functionum depravatione in subiectis ætate vel alia de causa debilibus, facile at pede pressio in caneros degenerant, superveniente dicti salis vel acidi vehementiore motu: (vel si tandem fermentationem suscipiant, vel quando in tubulis circumvicinis, &c. oriatur Inflammatio seu Erysipelas, vel quando intempestive emollientia & discutiencia fuerint applicata, &c.) quo tempore ardor ob speciem Inflammationis introductam sentitur, hinc particula acutæ scindentes commoveat, hic illic nervorum propagines dilacerant, unde dolor acutus, pungens, scindens, partisque fibrillas dissecant, omnis humoris adventus præcluditur, ipsaque gangræna, si non Sphacelus, (indicante id colore atro vel livido partis & venarum vicinarum partim, vel totaliter comprellarum,) inducitur, sensum vel festinanter partes circumscissas inficiens, pro majore copia, acutæ & motu corrosivorum, ipsaque subiecti dispositione, donec tandem magis proserpens mors subsequatur. Scirrh si ad suppurationem perveniant, facile transeunt in Cancrum vel Fistulam pravam & sæpe incurabilem.

*Diata.* §. 12. *Diata* æquæ in Oedematoso tumore ac in Scirrholo observanda est, aliis sæpè frustra medicamentis ages, cum ingurgitando cibos incongruos & aquam frigidam hauriendo affectus hos tantum augeas. Eo enim his in tumoribus pertinacibus curatio dirigenda est, ut succi spissiores ac aquosi incidantur ac sensim dissipentur, in quem finem Aer eligatur temperatus, contra fugiatur nimis calidus ac frigidus, imprimis hyemalis, hyems enim oedematosis maxime noxia est.

Cibi sint copioso sale volatili repleti, & conducent aromaticæ ac dulces gelatinæ aliaque, quæ succum nutritium augent. eumque sale volatili replent. Potus sit Thez vel Caffè, in aqua tepida, in qua prius rad. chin. & lign. Sallasfras fuerint cocta, vel vinum generosum, vel Gallicum, vel Hispanicum, modicè tamen haustum.

Vigilæ & somnus non excedant mediocritatis limites. In motu seu exercitio semper sit æger, equitando, modò curru vehendo, modò ambulando se exerceat, sed ne quid nimis, per vehementiores enim motus corporis volatiliores avolant particulae, remanentibus viscidioribus noxiis. Excreta & retenta sint in statu suo ordinario, exulent verò purgantia. Animi passionem omnes hic nocent, imprimis terror ac metor.

*Galenicorum curatio Oedematis.* §. 13. *Diata* pertractata, nunc videamus curam Oedematis pharmaceuticam, & quidem primum Galenicorum, qui Oedema curati asserunt, vel per resolutionem, vel per suppurationem, vel per indurationem: Primò requisitam ordiant *Diatam*: Secundò humorem pituitosum præparant & evacuant: Tercio topica applicant, accidentia & symptomata corrigunt. Secundæ intentioni satisfaciunt, decocti hyssopi in Hydromelite facti §iv. cum oxymelle scyllitico singulis diebus cubitum emuti propinando, dein sequens vel simile phlegmagogum exhibent.

℞. Fol. fenn. f. §. 3b.  
meboracum. alb. §ij.  
zib. §j.

agaric. in petiâ ligat. §ij.

myrob. chebul. aa. §j.

Infund. omnia per noctem in

▽ hyssop. §iv.

Manè facta levi ebullitione in colat, dissolv.

Mann. el. §j.

el. Diaphænic. §ij.

M. F. potio.

In hoc affectu tam frigido non convenire ajunt venæsectionem, nisi hæc à mensibus retentis, in quibus aliquando eam permittunt. Topica Ipsis sunt primò aqua & acetum, unde ad Oedema curandum spongiam poscā imbutam cum ligamento leniter stringente imponunt. Initium verò deligandi ab inferioribus partibus ducunt, & ad superiores partes progrediendo desinunt, spongiam verò novam esse oportet, si talis non sit ad manus, eam, quam habent, nitro extergunt & melids etiam lixivio, quod stillatitium vocant. Si horum uti tumor non subsidat, paululum aluminis miscant. Valere ad idem ajunt molliissimum ex lucerna linamentum hoc eodem humore imbutum & impositum. glancium quoque utile esse narrat. Si verò inveteravi Oedema, particulam oleo prius inungunt, deinde spongiam ex lixivio imponunt, acutiusque constringunt atque ita tumori laxo medentur. *Isatim* etiam *sarvum* tumores hosce mirabiliter digerere & comprimere scribunt. Idem præstare terram omnem pinguem & magis etiam Egyptianam volunt. In Galenicorum gratiam unam & alteram adjiciemus formulam:

℞. Lixiviu. acerrimi lbj.

acet. lbß.

ol. §ijj.

M. Intingunt calide linteola & Oedemati applicant. Quod si tumor ad declinationem venerit, sequenti vel simili utitur cataplasmate:

℞. Sulphuris,

Farina fabar. aa. §ibß.

stercoris columbini §ibß.

mellis communis §j.

dec. El. rad. asphodeli q. f.

Coq. ad consistent. cataplasmatum. quod bis de die renovant. Alii tantum sulphur cum axungia suilla miscant & inungunt. Alii Diachylon cum gummi commendant.

Quando Oedema ad maturationem devenit, illudaperiunt in loco inferiori, servata fibrarum rectitudine, vel ferro, vel corrosivo, vel medicamento tumpente, dein ulcus apertum mundificant, & digerunt tercinthina vitello ovi mixta cum pauca quantitate gummi ammoniaci in aceto soluti. Facta digestionem ulcus carne implet cum ungu. basilico minore linteolis inuncto & applicato, tandemque cicatrizant. Dolori occurrunt per unguenta relaxantia: ut ungu. de alihæa, cum oleo anethino, chamomelino, lil. alb. Quod si tumor in duritiem abierit, emollientia imponunt.

Scirrhum curant Galenici primò *Diata* calef. *Scirrh*, ciente & humectante, secundo causæ antecedentis præparatione & evacuatione, in quem finem sequens, vel simile ordiant Meianagogum:

℞. Herb. adianth. nigr.

epithym.

lingv. cerv.

cuscut.

capill. §. aa. Mß.

Yyy 3

Myrob.



Myrob. Indor.

agaric. rec. troch. 22. 3ij.

fol. fen. f. fl. 36.

His in omnibus superaffundunt

q. sum. ar. bull. 3v.

Stent per noctem, manè facta unica ebullitione, in expressione Colat. dissolvunt

Manna el. 3ij.

Confect. Hamech. 3ij.

M. f. potio.

Deinde, si malum oriatur ob hemorrhoides obstructas, illas aperiant, & si ob menstrua retenta, provocant illa: si sanguis in toto redundet, aperiant basilicam sinistri lateris, foramine lat amplo, ut sanguini facilius deus exitus: si obstructions in hypochondriis adint, eas reserant adhibitis primò præparantibus, deinde evacuantibus, quæ sæpius repetenda esse volunt.

Ad Topica accedentes medicamenta, digestentia adhibent unâ cum emollientibus juncta. Inter digerentia recentent fornamgræcum, sinum capillum cum posca. Inter mollientia autem magni æstuant hoc in casu adipem & medullam cervinam, item adipem taurinum, hircinum & urinum, item ammoniacum & bdelliumque & styracem. Horum usu duriciem dissolvunt additis digerentibus.

De vulneribus commendant adipem aserinum & gallinaceum ac phasianum. Verùm in tendinibus ac ligamentis, lapidem igne candefactum acerrimo aceto extinguunt, in quem finem æstimant lapidem pyreum vel molarem. In hoc affectum partem commoveri volunt, quo exhalantem vaporem suscipiat, & postea rursus mollioribus imponunt medicamentum. Oleo tamen tenui ab initio, non aqua, partem perfundunt perpetuò singulis diebus, aliquando etiam althæa, aut cucumeris silvestris radicem in oleo incoquant & applicant. A balneo verò in totum ipsis ægris abstinendum esse suadent, aut saltem à frequenti. Ubi verò Scirrhus moderatè fuerit emollitus, ammoniacum pinguiissimum acerrimo aceto dilutum parti illinunt ad multos dies: post quos rursus mollioribus utuntur, quod galbanum & opoponacea pinguiissima recipiunt. Inter talia autem maximi faciunt id, quod ex perna fit & Amythaoni imicribitur; aliaque in struins commendata.

Paracelsus  
tunc in  
Oedemate.

§. 14. Paracelsus Tumorem Oedematofum nullo modo vult aperiri, sed defluxiones intrinsecus per Mercurium laxativum averti, post hæc externa sequenti modo applicari suadet.

R. Caricar. lbj.

ol. granor. Junip. 3iv.

Farin. fabar. 3vj.

M. F. cataplasma super ignem, quod Tumori aquoso superponatur, quando calidiùs pati valeat æger. Commendat etiam sequens vel simile Emplastrum.

R. Farin. fabar. lbj.

sem. psyll.

cyonior. 22. 3j.

consol. d. maj. 3iv.

Vini &amp; aceti q. l.

F. Empl.

In Scirrhis quocunque sanando Paracelsus exterebinthina & lithargyrio parata maxime æstimat, adhibito simul studio, ne in Cancrum abeat.

Helman-  
tiana cura

§. 15. Helmontius Laticis ignorantiam multam medendo, somnia in oedematibus suscitasse

scribit; turgidis nimirum sero crucibus, fossulam prementis digiti resistentibus & manè evanescentibus pituita à Galenicis ridiculè putata, nocturna digestionem in cinere verba. Et cum Author noster laticem acidum & resagranter accuser, Oedemata sanare lapillum Butleri tendit. Externe verò radicem bryoniæ coit & instat cataplasmatis applicatam admodum credit utilem, sicuti in aliis tumoribus a sæpè salutare præfuit auxilium.

In Scirrhis curandis gunnata applicat vult Author, quæ maxime resolvunt, in quem finem laudat etiam sequens unguen.

R. Ol. laurini 3vuj.

Olibani,

Masticis,

Gummi. Arabic.

resin. abigine 22. 3ij.

Destillentur, dein repetatur destillatio, & quidem cineribus clavellatis, & habebris balsamum egregium.

Ubi affectus internus externum petit subsidi- in Scirrhis. dium, ut Scirrhus unguita. de foris lapide calefacto vel arena calida foveri jubet, idque se didicisse ait contuendo paleam, in alieno aquæ tepentis, fursum ac deorsum velut à calore subter accensio commotam deambulantem; ideoque potenti calore appolita unguenta animari, & spiritum suum cruori nostroungere suspicabatur primum, deinde comperit, sic malum foras elici liti que impulsionem lymphomaticas. Et quæcunque Balnea agunt in toto, hoc idem calefacta fotaque unguita absolvent in parte sine totius jactura. Later enim fovens, juxta Authorem, pellit odorem emplastri intro, attrahitque foras, quæ alias pigriora hærent, iterumque cum cruore spiritus impetus faciens attrahitur, dispergitur à calore aliusque succedit suo loco, vim medicaminis haurit & velut ebulliens intro, revolvitur.

§. 16. Quum Willisius prædictum affectum, Oedema nempe ex vitia chylosi, ut & hæmatolii provenire dicat, hinc ad affectum hunc curandum æquè interna ac externa commendat. Inter interna, stomachica aromatica, item Elixir proprietatis, & Diaphoretica aliis præfert; sed quum serum non solum per poros sudoriferorum beneficio expelli debeat, ac eorum secretio per urinas etiam sit promovenda, prædictis remediis diuretica adjungit. Tumori autem externè applicat cataplasma ex absynthi, rosmarin. origan. calaminth. chamom. &c. in lixiv. comm. vel vino decocta, quo decocto Tumorem Oedematofum sovet. Cui usui inservit etiam aqua calcis vivæ, uti & lixivium ex cineribus sarmentorum.

Scirrhis verò Author statim imponit resolutentia fortiora discutientibus moderatis permitta, ut sunt Gummi Ammoniac. Galban. &c. Ammoniac. ad hunc affectum tollendum plurimis extollit laudibus, siue solum in usum revocetur, siue cum empl. diachylo vel aliis commistum. Si hæc debiliora fuerint, ad Empl. Vigon. dupl. cum Mercurio recurrendum esse jubet.

§. 17. Sylvius curam Oedematis consistere ait in seri aut pituitæ nimis evacuatione, hinc præter purgantia phlegmagoga Author commendat varia diuretica, quæ simul impediunt novam pituitæ productionem, ac corrigunt simul ædum noxium, emendantque cætera inde orta vitia in sanguine

in Oedemate.

Willisii methodus curandi Oedema.

Scirrhus.

Sylvius methodus curandi Oedemate.

languine pituitosiore ac ferosiore, ipsum incidendo & attenuando, in quem finem aliis medicamentis præfert omnia salia volatilia & aromatica, quippe quæ & acidum temperant & pituitum seu serum incassatum incidunt, hæcque imprimis ratione juxta *Ipsum* urinas movent. Post hæc sudorifera commendat, quæ tum serui, tum pituitam foras propellunt, & sanguinem crassum incidunt, inter quæ cuncta volatili sale turgentia vegetabilia laudat, ut sunt radices apii, bardan. pimpinell. zedoar. chin. imperator. salaparill. fol. capill. ven. scord. summa. cent. mini. melholl. fl. chamomill. sambuc. lign. Guajac. Sassafras, quercus, Juniperi. buxi, bacc. Juniperi. sambuci, ebulli, Diacord. &c. Atque ex his varia forma parat medicamenta interna sudores moventia. Præter hæc commendat etiam Antimonium Diaphoreticum, Bezoarticum minerale ex eodem Gnio. sed cum  $\zeta$ o sublimato in butyrum prius destillato, hinc cum Nitri ~tu fixato confectum. Laudat quoque Bezoardicum Lunare, Ore. Salia etiam volatilia atque olea stillatitia ex partibus animalium parata summo-perè æstimat. Præter hæc interna & forinsecus quædam applicanda suadet Author, imprimis hic commendat balnea tum aquæ dulcis, tum variorum decoctorum, tum ~tus vini & laconica dicta. Sic quoque totus ex aromaticis & sale volatili constantibus vegetabilibus parare & calidè applicare jubet, vel suffumigia varia ex iisdem & gummosis instituit, emplastra ac linimenta ex resolventibus parata magnipendet, ut sunt Carmin. Diachyl. de bacc. Lauri, de Gummi. Ammon. ung. dialth. C. Ol. Philosoph. macis, &c. aliaque resolventia sæpe recensita.

*Scirrhus.* *Sylviu* prælaudatus in affectibus *Scirrhostis* ad viscositatem humorum corrigendam, incidendam & attenuandam, & sic obstructionem ab iisdem productam fortiores resolvendam salia præscribit volatilia frequentius in vino vel liquoribus aliis convenientibus assumenda, siue sint ex animalibus deprompta, siue in vegetabilibus detineantur. Ad magis verò attenuandos & leviter etiam evacuandos humores illos viscidos & tenaces pilulas suas laudat magistralis ex gummi galbano cum resinis, castoreo, croco, aloë rosatâ & trochiscis alhandali compositas, alteris diebus deglutendas.

Externè olea & unguenta inungit emollientia & dissolventia ex oleo laurino, Philosophorum, vel cataplasmata ex plantis aromaticis parata, nec non Emplastrum Carminans resolvendis humoribus inspersit perquam aptum. Sic quoque omnia gummosa & volatilia externè tumoribus *Scirrhostis* impolita magni æstimat.

*Cartesiani* maximum locant studium in *Oedemate*, ut humor siue lymphâ illa lutulenta & coagulata quantocyus resolvatur, atque fluidiore factâ potiore ejus parte, recrementa crassiora & reliquorum succorum miscelâ incongrua tum per urinam, tum per sudorem eliminentur. Hoc verò eorum propositum, quo citius obtineatur, attenuationi lymphæ crassioris sedulo incumbunt remediis internis, in materiam lutulentam particulis suis volatilibus, mediantes æthere subtilissimo easdem excitante, faciliè agentibus, quoscunque tubulos perreptantibus, & calore ob suppressum motum inductum in fœccis resuscitantibus, quem scopum sequenti ferre tentant vino medicato.

\*. *Rad. Imperator.* 3ij.

*Valerian.*

*enul.* aa. 3ij.

*onyx.*

*aristol.* aa. 3ib.

*Salaparill.*

*contragerv.*

*fraxinell.* aa. 3j.

*Herb. salu.*

*chamedr.*

*scabios.*

*verben.*

*menth.*

*fol. rorismar.* aa. Mß.

*summit. thym.*

*centaur. min.* aa. Pj.

*flor. sambuc.*

*flor. chamomib.* aa. Pß.

*sem. danci* 3ij.

*lini fraxin.* 3ib.

*Saff. fr.* 3ib.

$\Theta$ is  $\zeta$ i 3j.

*adhyb.*

\*ci aa. 3ß.

*costi am. r.* 3ij.

*cinamom.* 3j.

F. *Species* pro Nodulo uni & dimidiæ mensuræ vini impendendo. Locum, in quo æger decubabat, calidum esse volunt, ut calor externus cum remediis intro assumtis simul cooperetur, & tum quovis manè de prædicto vino 3ij. ægro oedematoso propinant. Ablumto eo, & urinæ fluxu satis promotio, ad sudorem elicendum procediunt, exhibentque ægroto de sequenti mixturâ quotidie duo cochlearia:

\*. *Aj. Angelic.* 3ib.

*rorismarin.*

*chamedr.* aa. 3ib.

~ *jump.* 3ij.

*flor. sambuc.* 3ib.

$\zeta$ i 3j.

\*ci cinamomifol. 3ß.

*Syrup. Scord.* 3j.

M.

Internis hisce simul jungunt externa, frequentesque instituere jubent frictiones panno lineo calefacto, & succino, mastiche & gummi sandarachæ probè infumato; fomentationes etiam suadent ex herbis salvis, origani, foliis rorismarini, baccis lauri, juniperi, floribus sambuci, camomillæ, semine cumini, Rercore columbarum, sulphure &  $\mathcal{A}$ e  $\mathcal{A}$ co, quibus perosis spirituosâ penetrantia & fortiter resoleventia illiunt. ut coagulatio lymphæ dissolvatur, humerque fluidior redditur vel ad ductus urinarum devehatur, vel per poros partis affectæ exsillet, ubi tamen sedulo advertere præcipiunt, ne humor salior fibras cutis erodat, & inflammationem vel gangrænam in eadem suscitet, laudantque sequenti imprimis mixturâ spirituosam.

\*. *Spir. Junip.* 3ij.

*flor. sambuc.* 3ib.

*Essent. Valerian.* 3ib.

*salv.* 3ij.

~ *Camphor.* 3j.

*Ol. s. cinnam.* 3j.

M.

Cata-

*Nyroh. Indor.**agaric. res. troch. 22 3ij.**sol. sem. f. st. 3b.*

His in omnibus superaffundunt

*alq. fumar. bull. 3v.*

Stent per noctem, mane facta unica ebullitione, inexpressione Colat. dissolvunt

*Manne cl. 3ib.**Confect. Hamech. 3ij.**M. f. potio.*

Deinde, si malum aperiatur ob hæmorrhoides obstructas, illas aperiunt, & si ob menstrua retenta, provocant illa: si sanguis in toto redundet, aperiunt basilicam sinistri lateris, foramine lat amplo, ut sanguini facilius deire exitus: si obstructions in hypochondriis adsint, eas referant adhibitis primò præparantibus, deinde evacuantibus, quæ sæpius repetenda esse volunt.

Ad Topica accedentes medicamenta, digerentia adhibent unà cum emollientibus junctia. Inter digerentia recensent sanumgræcu, finum caprillum cum posca. Inter mollientia autem magni æstuant hoc in casu adipem & medullam cervinam, item adipem tauroinum, hircinum & utinum, item ammoniacum, bdelliumque & styracem. Horum usu duritiem dissolvunt additis digerentibus.

De volucribus commendant adipem anserinum & gallinaceum ac phasianum. Verùm in tendinibus ac ligamentis, lapidem igne candefactum acerrimo aceto extingunt, in quem finem æstimant lapidem pyritem vel molarem. In hac affectam partem commoveri volunt, quo exhalat vaporem suscipiunt, & postea rursus mollitorum imponunt medicamentum. Oleo tamen tenui ab initio, non aqua, partem perfundunt perpetuo singulis diebus, aliquando etiam altheæ, aut cucumeris silvestris radicem in oleo incoquant & applicant. A balneo verò in totum ipsis ægris abstinendum esse suadet, aut saltem à frequenti. Ubi verò Scirrhus moderate fuerit emollitus, ammoniacum pinguißimum acerrimo aceto dilutum parti illinunt ad multos dies: post quos rursus mollitorio utuntur, quod galbanum & opopauia pinguißima recipiunt. Inter talia autem maximi faciunt id, quod ex perna fit & Amythaoni inscribitur; aliaque in istis commendata.

*Paracelsi*  
*tura in*  
*Oedemate.*  
§. 14. *Paracelsus* Tumorem *Oedematofum* nullo modo vult aperiri, sed defluxiones intrinsecus per Mercurium laxativum averti, post hæc externa sequenti modo applicari suadet.

*R. Caricar. lbj.**al. granor. 3anip. 3iv.**Farin. fabar. 3vj.*

*M. F. cataplasma super ignem*, quod Tumori aquoso superponatur, quando calidius pati valeat æger. Commendat etiam sequens vel simile Emplastrum,

*R. Farin. fabar. lbj.**sem. psyll.**cyonior. 22 3j.**conful. d. maj. 3iv.**Vini & aceti q. s.**F. Empl.*

In Scirrhis quocunque sanando *Paracelsus* exterebinthina & lithargyrio parata maxime æstimat, adhibito simul studio, ne in Cancrum abeat.

*Helmontius*  
*LIANA CURA*  
§. 15. *Helmontius* Laticis ignorantiam multam medendo, somnia in oedematibus suscitasse

scribit; turgidis nimium sero crucibus, fossis in Oedemate lam preuentis digiti retinentibus & manè evanescentibus pituita à *Galieno* ridiculè putata, nocturna digestionem in cruorem versa. Et cum Author noster laticem acidum & stagnantem accuset, Oedemata sanare lapillum *Buleri* contendit. Externe verò radicem bryoniæ contulim & instat cataplasmatibus applicatam admodum esse credit utilem, sicuti in aliis tumoribus aquosis sæpe salutare præstitit auxilium.

In Scirrhis curandis gummiata applicanda vult Author, quæ maxime resolvunt, in quæ finem laudat etiam sequens unguen.

*R. Ol. laurini 3vij.**Olibani,**Masticis,**Gummi. Arabic.**resin. abiegna aa. 3ij.*

Destillantur, dein repetatur destillatio, & quidem cuernibus clavellatis, & habebis balsimum egregium.

Ubi affectus internus externum petit sublidium, ut *Scirrhus* unguita. de foris lapide calefacto vel arena calida foveri jubet, idque se didicisse ait contuendo paleam, in atheno aquæ tepentis, lustrum ac deorsum velut à calore subter accenso commotam deambulantem; ideoque potenti calore apposita unguenta animari, & spiritum suum cruori nostro jungere suspicabatur primum, deinde comperit, sic malum forsè selici sitique impulsiones symptomaticas. Et quocunque Balnea agunt in toto, hoc idem calefacta fotaque unguita absolvent in parte sine totius pæctura. Later enim forens, juxta Authorem, pellit odorem emplastri intro, attrahitque foras, quæ alias pigriora hærent, iterumque cum cruore spiritus impetus faciens attrahitur, dispergitur à calore aliusque succedit suo loco, vim medicaminis haurit & velut ebulliens intro, revolvitur.

§. 16. Quum *VVillsius* prædictum affectum, Oedema nempe ex vitia ehylosi, ut hæmatoli provenire dicat, hinc ad affectum hunc curandum aquæ interna ac externa commendat. Inter interna, stomachica aromatica, item Elixir proprietatis, & Diaphoretica alia præfert; sed quum serum non solum per poros sudoriferorum beneficio expelli debeat, ac eorum secretio per urinas etiam sit promovenda, prædictis remediis diuretica adjungit. Tumori autem externè applicat cataplasma ex absynthio, roremarin, origan, calaminth, chamom. &c. in lixiv. comm. vel vino decoctis, quo decocto Tumorem Oedematofum fovet, Cui usui inservit etiam aqua calcis vivæ, uti & lixivium ex cineribus samentorum.

*Scirrhus* verò Author statim imponit resolutentia fortiora discutientibus moderatis permixta, ut sunt Gummi Ammoniac, Galban. &c. Ammoniac. ad hunc affectum tollendum plurimis extollit laudibus, siue solum in usum revocetur, siue cum empl. diachylo vel aliis commistum. Si hæc debiliora fuerint, ad Empl. Vigon. duplici Mercurio recurrendum esse jubet.

§. 17. *Sylvius* curam Oedematis consistere ait in seri aut pituitæ nimia evacuatione, hinc præter purgantia phlegmagoga Author commendat varia diuretica, quæ simul impediunt novam pituitæ productionem, ac corrigunt simul acidum noxium, emendantque cætera inde orta vitia in sanguine

languine pituitosiore ac serosiore, ipsum incidendo & attenuando, in quem suum aliis medicamentis præfert omnia salia volatilia & aromatica, quippe quæ & acidum temperant & pituitum seu serum incassatum incidunt, hacque imprimis ratione juxta ipsum urinas movent. Post hæc sudorifera commendat, quæ tum serum, tum pituitum foras propellunt, & sanguinem crassum incidunt, inter quæ cuncta volatili sale turgentia vegetabilia laudat, ut sunt radices apii, bardan. pimpinell. zedoar. chin. imperator. salisparill. fol. capill. ven. scord. sum. cent. mini. melilot. fl. chamomill. sambuc. lign. Guajac. Sassafras, quercus, Juniperi, buxi, bacc. Juniper. sambuci, ebuli, Diascord. &c. Atque ex his varia forma parat medicamenta interna sudores moventia. Præter hæc commendat etiam Antimonium Diaphoreticum, Bezoarticum minerale ex eodem Juio. sed cum Q̄o sublimatum in butyrum prius destillato, hinc cum Niri ~tu fixato confectum. Laudat quoque Bezoardicum Lunare, Ore. Salia etiam volatilia atque olea stillantia ex partibus animalium parata summopere æstimat. Præter hæc interna & forinsecunda quædam applicanda suadet Author, imprimis hic commendat balneatum aquæ dulcis, tum variorum decoctionum, tum ~tus vini & laconica dicta. Sic quoque fons ex aromaticis & sale volatili constantibus vegetabilibus parare & calide applicare jubet, vel suffumigia varia ex iisdem & gummosis instituit, emplastra ac linimenta ex resolventibus parata magnipendet, ut sunt Carmin. Diachyl. de bacc. Lauri, de Gummi. Ammon. ung. dialth. C. Ol. Philosoph. unacis, &c. aliaque resolventia sæpe recensita.

*Scirrhi.* *Sylvis* prælaudatus in affectibus *Scirrhosis* ad viscositatem humorum corrigendam, incidendam & attenuandam, & sic obstructionem ab iisdem productam fortiores resolvendam salia præscribit volatilia frequentius in vino vel liquoribus aliis convenientibus assumenda, siue sint ex animalibus deprompta. siue in vegetabilibus detineantur. Ad magis verò attenuandos & leviter etiam evacuandos humores illos viscidos & tenaces pilulas suas laudat magistrales ex gummi galbano cum resinis, caloreo, croco, aloë rosatâ & trochiscis alaudali compositas, alterius diebus deglutendas.

Externæ olea & unguenta inungit emollientia & dissolventia ex oleo laurino, Philosophorum, vel cataplasmata ex plantis aromaticis parata, nec non Emplastrum Carminans resolvendis humoribus inspissatis perquam aptum. Sic quoque omnia gummosa & volatilia externè tumoribus Scirrhosis imposita magni æstimat.

*Carosorum curatio.* §. 18. *Carosiani* maximum locant studium in Oedemate, ut humor siue lymphæ illa lutulenta & coagulata quantocyus resolvatur, atque fluidiore factâ potiore ejus parte, recrementa crassiora & reliquorum succorum miscelæ incongrua tum per urinam, tum per sudorem eliminentur. Hoc verò eorum propositum, quo citius obtineatur, attenuationi lymphæ crassioris sedulo incumbunt remediis internis, in materiam lutulentam particulis suis volatilibus, mediante æthere subtilissimo easdem excitante, facili agentibus, quoscunque tubulos petreptantibus, & calorem ob suppressum motum indudum in succis resuscitantibus, quem scopum sequenti ferire nituntur vino medicato.

\*. Rad. Imperator. 3ij.

Valerian.

enul. aa. 3ij.

eryng.

arist. aa. 3lb.

Salisparill.

contrayerv.

fraxinell. aa. 3j.

Herb. salv.

chamedr.

scabios.

verben.

menth.

fol. rosmarin. aa. Mß.

summit. thym.

centaur. min. aa. Pj.

flor. sambuc.

flor. sibeananth. aa. Pß.

sem. dauci 3ij.

lini fraxin. 3ijß.

Sass. fr. 3ijß.

Q̄i 3j.

adlymb.

xi aa. 3ß.

casti amar. 3ij.

cinamom. 3j.

F. Species pro Nodulo uni & dimidio mensuræ vini suspendendo. Locum, in quo æger decumbat, calidum esse volunt, ut calor externus cum remediis intrò assumtis simul cooperetur, & tum quovis manè de prædicto vino 3ij. ægro oedematoso propinant. Absumpto eo, & urina fluxu satis promotio, ad sudorem eliciendum progrediuntur, exhibentque ægroto de sequenti mixturâ quotidie duo cochlearia:

\*. Aq. Angelic. 3ijß.

rosmarin.

chimedr. aa. 3ijß.

~ Junip. 3ij.

flor. sambuc. 3ijß.

Q̄i 3j.

xi cinamomiflat. 3ß.

Syrup. Scord. 3j.

M.

Internis hisce simul jungunt externa, frequentesque instituit juben frictiones panno lineo calefacto, & succino, mastiche & gummi sandarachæ probè infumato; fomentationes etiam suadent ex herbis salvia, origani, foliis rosmarini, baccis lauri, juniperi, floribus sambuci, camomilla, semine cumini, Rercore columbarum, sulphure & Q̄o xco, quibus peractis spirituosa penetrantia & fortiter resolventia elidunt. ut coagulatio lymphæ dissolvatur, humoresque fluidior redditur vel ad ductus urinarios devehatur, vel per poros partis affectæ exilit, ubi tamen sedulo advertere præcipiunt, ne humor salior fibras entis erodat, & inflammationem vel gangrænam in eadem suscitet, laudantque sequentem imprimis mixturam spirituosam.

\*. Spir. Junip. 3ij.

flor. sambuc. 3ijß.

Essent. Valerian. 3ijß.

salv. 3ij.

~ Camphor. 3j.

Ol. d. cumini 3j.

M.

Cata-



Cataplasmata etiam imponunt ex herbis scor-  
dii, ruta, foliis rosmarini, floribus camomil-  
lae, sambuci, baccis lauri, stercore gallinarum,  
særina lupinorum, fabarum, semine cumini, sale  
Armoniaci & croco cum lixivio & spiritu vini  
parata, vel emplastrum de baccis lauri sequenti  
modo præscriptum:

℞. Emplast. de bacc. lauri ℥ij.  
ol. s. cumini ℥ij.  
camomill. q. f. pro malaxat.

D. in usum.

Mutato Oedemate particulari in leucophlegma-  
tiam universalem, sive anasarcam, cum magno  
scroto tumore malum hoc æ plurimum experti  
sunt incurabile, quod nullis remediis, etiam aliis  
penetrantissimis & maxime resolventibus potuit  
emendari.

In Scirrhis. Scirrhus tumori fortiora adhuc adhibent  
emollientia, particulis volatilibus spirituosis  
prædita, internaque commendant aperientia ex  
martialibus, aliisque tophaceam materiam de-  
struentibus, ea de causâ sequentibus speciebus  
medicatum vinum extollunt:

℞. Aq. petroselin. ℥ij.  
apii ℥iij.  
bardana ℥ij.  
pencedani.  
Ircos aa. ℥j.  
Herb. Calamench.  
rut.  
scord.  
Agrimon.  
parietar. aa. Mā.  
flor. anthos Pj.  
cori. fraxin. ℥ij.  
oli ovis ℥j.  
ocul. s. ℥iij.  
sem. levistic. ℥j.

D. ad Chartam pro nodulo uni mensuræ vini  
impedendo. Hoc absorto sequentem mixtu-  
ram quovis die bis, mane & vespere, ad cochlea-  
re unum exhibitam pro majori dissolutione ma-  
teriae incrassatæ maxime judicant idoneam.

℞. Aq. genisse ℥j.  
puleg. ℥vj.  
rosmarin. ℥ij.  
Essent. scorphular. ℥iij.  
croci ovi ℥j.  
℞ci carvi. ℥b.  
Syrup. scabios.  
fumar. aa. ℥b.

M.

Pulveres etiam laudant ex oculis cancrorum,  
crystallistactari, croco ovis, & succini, & ejus-  
modi aliis paratos. Inter topica deprecandam pri-  
mo spirituosâ ex essentia scorphulariæ, spiritu  
gummi Ammoniaci, & cum calce vivâ parato,  
spiritu camphoræ, matricali, cataplasma ex sæ-  
binæ vini cum sulphure & semine carvi, ex sæ-  
rinâ fabarum cum semine sipari, deinde oleosa,  
ut oleum petræ album, succini, silicium, Philo-  
sophorum, & tandem unguentum de arthanitâ,  
emplastrumque de gummi Ammoniaci, quod  
cum pauca quantitate butyri ℥ij mistum etiam  
tumores solvit quàm durissimos.

§. 19. Peripsectis aliorum sententiis de Cura  
Tumorum Oedematosorum ac Scirrhorum, nunc  
& nostram deponamus etiam. Curatio ergo Oe-  
dematis principalis est interna, & in sanguinis  
ac succorum intemperiei correctione, ob-

structionumque refectione versatur, intro-  
ducendo in sanguinem & succos tales determinatas  
particulas, quæ impedimenta sufficientis motus  
sanguinis tollunt, adminiculaque ejusdem resis-  
tendi suppeditant, & obstructions resecando  
occasionem debite per partes circulationis san-  
guinis exhibent. Tumores ergo hi aggregendi  
sunt remediis incidentibus & simul attenuantibus,  
succorum crassitiem & stagnationem resol-  
ventibus, ut fluorem pristinum recipiant, & tu-  
buli ab obstructione liberentur, quod præstari  
potest fixis Diaphoreticis, & salibus simul vola-  
tilibus incidentibus armoniacalibus, quodais  
angulare dominantibus, & factam inde coagula-  
tionem destruentibus, adeoque tali vel simili  
mixturâ curatio inchoanda est:

℞. ∇ absynth.  
aperitiv. aa. ℥j.  
menth. ℥b.  
Essent. agrimon. ℥ij.  
camaur. min. ℥j.  
℞ci aromati. ℥b.  
Syr. scord. ℥vj.  
M. detur cochleatim.  
Vel:

℞. Turb. Bezzart. sine acid. parat. ℥ij.  
℞ juniper. ℥b.

M. detur ad 30. guttas in vino vel ∇ fl.  
sambuc. chamæpyth. quæ Essentiâ nuper curavi  
virum 50. annorum Oedemate laborantem, ad-  
hibito externo Emplastro de cumino cum ol. Q.  
& succin. malaxato: incidentia ex variis radic.  
herbis aromaticis, baccis & seminibus oleosis  
egregiam afferunt opem; sic etiam pulvères inci-  
dentes non contemnendi sunt.

℞. Ocul. es. pp. ℥ij.  
spermat. ceti ℥b.  
rad. ari. ℥j.  
∇ absynth.  
℞ci depurat. aa. gr. xij.  
saccul. bryon. ℥b.  
C. C. volat. gr. vi.

M. f. pulvis cuspidatim exhibendus.

Decoctum radice bryoniz sæpe solum sufficit  
internè exhibitum ad Oedematosos curandos af-  
fectus. Hic etiam omnia ea convenienti medica-  
menta, quæ in Hydrope proficua sunt, cum ve-  
rò hæc alibi ad nauseam dixerimus, ea repetere  
non libet, tantum addamus pauca de Mercuriali-  
bus, quæ graviore in casu, circumspicere tamen,  
usurpata efficacissima sunt, incidunt enim &  
educunt viscositatem sale vel potius acido so-  
cetam, per glandularum salivarium tubulos (cum  
viscosis transmittendis fortan nullæ in corpore  
æque sint aptæ viæ seu partēs) dilatatos à præ-  
grandiuculis ℥ij particulis magis vel minus,  
prout majori vel minori copia spicula acida acu-  
tiora, vel secus, vel magis vel minus extra ordi-  
nariam earum superficiem eminent. Hæc vola-  
tilia diu usurpata omnem sæpe in Oedematosos  
Tumores implent paginam, oleosis & incidenti-  
bus juncta.

Externè etiam Topicis applicatis viscosa, sta-  
gnansque materia etiam ea attenuanda, fluidi-  
orque reddenda, tum æquali calore, cum patrici-  
orque activis simul cum diluentibus adhibitis,  
ita ex gr. fomento vel balneo ex Cæc. Do.  
cineribus clavellatis, sale armoniaci, absynth.  
ruth. cicut. malv. fl. chamomill. sambuc. &  
similibus vino vel urinz incoctis pars affecta  
calidis.

Nostra ra-  
tio curandi  
Oedema.



calidissime foveatur, vel immergatur, fasciis longioribus debito strictius deliganda. quo vasorum amplitudo debito major auferatur h. e. quo debita vasorum Diametri proportio respectu floris continendi relictuatur. Fotum sequentem extollit Dn. à Guldenklec.

℞. Herb. potentill.

arthemis.

pilosell.

betonic.

salv.

rorism.

origan.

absynth. aa. Mj.

fl. chamomill. Mib.

cent. min.

sum. aneth. aa. Mj.

bacc. lauri ʒi.

junip. ʒiv.

salv. marin. lbj.

Cog. in ♀ pro Fotu.

Si autem adhuc fortiori desiderentur auxilia, applicetur cataplasma magis vel minus resolvens ex his vel similibus, ruta, ablynth. scord. cicuta. aneth. cucut. rad. bryon. cort. sambuc. ebul. bacc. lauri, fl. sambuc. chamom. sem. anis. fœnicul. cumini. ʒ. ʒ. fab. tost. gum. Animoniac. Labdan. Ex quibus omnibus vel Epithemata, vel Essentiz, vel Extracta, vel Cataplasmata, vel Fomenta, vel Emplastra parari possunt, quo præstantius nullum est sequenti de Labdano.

℞. Ol. olivar. lbib.

Lithargyr. aur. lbj. ʒiv.

Cog. s. a. ad consistent.

add.

Cera cirin. ʒxj.

Colophon.

resin. pini aa. ʒij.

Gum. Galban.

Ammoniac. aa. ʒiib.

Elemi ʒi.

Labdan. ʒiij.

Ol. Lauri ʒiv.

Axung. porcini ʒij.

Cervi ʒi.

Storac. calam. ʒb.

rad. irid. flor.

bryon. aa. ʒij.

Sem. cumini ʒi.

Bacc. lauri ʒvj.

Flor. chamomill.

melilot. aa. ʒij.

Herb. sabina,

Tym. aa. ʒb.

M. f. l. a. Emplastrum.

quod egregias possidet vires in tumoribus quibuscunque discutendis: imprimis in œdematosi sequens Ceratum de Cammino nobis in usu esse solet.

℞. Cera cirin.

Empl. Diapalm. aa. ʒviiij.

ol. lil. alb. ʒvj.

bacc. lauri ʒij.

ungu. martial. ʒiv.

sem. cumini. subtiliss. pulv. ʒvj.

℞ ʒci depurat. ʒb.

M. f. l. a. Empl.

Conducet etiam Emplastrum Diaphoreticum

Mysiclii. Hic quoque proderunt suffumigia ex

resinosi ac gummosi volatilibusque instituta, & à tumoribus excipiendi, vel sacculi imponantur ex prædictis speciebus parati, additis sale ʒ & ʒco. Alii commendant raphanum, alii fermentum panis, alii rutam pedibus Oedematosis imponenda. Liquores quoque spirituosos externe illinendi sæpe sufficiunt, ut sunt ~ vin. Camph. lumbicor. flor. sambuc. ʒ volat. oleol. & similia.

Scirrhi vix nisi initio sui curationem suscipiunt, hinc eò incumbendum est, ut succi indurati emolliantur, coagula spissius resolvatur, & quicquid magis stagnat, quàm decet, ad motum excitetur, ita enim non modò omnia reddi fluidiora speramus, sed & poros simul fore apertos, & evaporationem debitam recrementorum iri promotum, eaque propter digerentia propinamus & tubulos obturatos referantia, in quem finem interna & externa exhibenda sunt remedia. Inter interna conveniunt, quæ vim volatilisandi habent, ut sal. volat. viperar. Essent. viperin. ʒv. elf. Tinctur. ʒii ʒss. ~ ʒc. arom. chalybeata seu Martialia quoque conveniunt, ut ʒ. ʒ. Tinctura ʒis aperit. Tinct. ʒi, liq. terr. fol. ʒi. Vina medicata paranda sunt ex incidentibus & aromaticis, ex gr.

℞. Rad. aron.

pimpinell.

enni. aa. ʒb.

Herb. abrotan.

calaminth.

majoran.

salv. aa. Mib.

fl. stachad. Arab. Pij.

bacc. junip. ʒiij.

limat. ʒ ʒb.

cass. lign.

cinamom. aa. ʒij.

ʒ ʒiij.

ʒci ʒij.

M. f. species pro nodulo uni mensuræ vini imponendo: vel ex cristall. ʒi, croco ʒis aperit. & ʒ fulminante fiat pulvis, cujus dosis est quantitas in mucrone cultri contenta, in sequenti vel simili vehiculo propinanda.

℞. ♀ aperit. ʒij.

Cinamom. bingloss. M. ʒi.

Tinctur. juniper. ʒiij.

~ lumbic. ʒi.

ʒli ʒ ʒb.

Syr. scord. ʒi.

M. deur ad vitrum.

Vel:

℞. Occl. ʒb. pp. ʒi.

croco. ʒ aperit. ʒij.

arcen. ʒpl. ʒi.

Camphor. gr. iij.

ʒ cent. min. ʒb.

M. f. pulvis, qui per vices exhiberi potest. Tinctur. ʒli ʒ in uteri Scirrho communicata etiam hic conducet. Quod externam curam Scirrhi attinet, iidem difficilis est, quo enim magis emollitio tentatur, eò lapsissime malum latius extenditur, discutientibus fortioribus etiam ita indurantur hi tumores, ut tandem degenerent in matrem quandam calculosam, Prout autem partem internam vel externam, vel secus latentem oblesserint, recentes, vel inveterati cum plurius ad junctis variis generis acutis, vel discutio, (is, quæ simul resolvendi & emolliendi vim habent,) vel fortè fortuna suppuratio, tentanda; sic post

ZZz

debitam fomentationem aliquando non frustra cataplasma ex rutha, abſynth. malv. fl. ſambuc. eluſ. rad. hryon. bacc. lauri, ſem. cumin. ſœnicul. ʒi. ʒi. ʒi. fabis, &c. vel malagma ex gummi Ammon. bdellio, galbano cum terebinthinâ ſæpè & ʒo., vel Empl. de Ran. c. Merc. quadrupl. vel Empl. de cicut. cum gummi. Ammoniac. vel unguent. arthanit. cum Theriac. & ſucco Bryonix, pluraque ſimilia applicanda eſſe monemus, fortiora enim hiſc affectus requirit remedia, quàm tumor Oedematofus, Empl. Divinum, de Labdano, de Cumino, cum aliis junctâ ſæpè magnū edunt effectum, modo tumor exiſtat curabilis. Emplaſtrum noſtrum de herba Thee paratum in diſſolvendis tumoribus rebellibus egregium eſt, quod eſt ſequens:

℞. *Gumm. Galban.* ʒij.  
*Sagapen.*  
*Ammoniac.* aa. ʒij.  
*ſolu. in ol. terebinth.*  
*add.*  
*Gumm. Elem.* ʒiſ.  
*ol. C. C.* ʒvj.  
*Tucamahac.* ʒij.  
*ʒ ſard.* ʒi.  
*Campbor.* ʒiſ.  
*Myrrh.* ʒij.  
*Pulv. herb. Tere* ʒiv.

*Sperm. ceti* ʒij.  
*Pici* ʒij.  
*terebinth.* ʒv.  
*oleophen.* ʒij.  
*Θ volat.* ꝑcc. ʒj.  
*Q. ʒb.*  
*Cera q. l.*

*M. ſ. l. a. Emplaſtrum*, quod reſolvit & diſcutit pertinaces ac ſcirrhofos tumores, conſert & plurimis aliis affectibus externis;

Vel:

℞. *formicar.* ʒij.  
*campbor* ʒiij.  
*Θ perſic.* ʒi.

*M.*

quo remedio illinantur Tumores Scirrhofi. Qui Scirrhus in perfectum tranſit cancerum, nullis externis remediis (niſi forſan valde exiguis in parte quâdam externâ,) curatur, cum ſit perfectus Sphacelus, qui tantum iis (ut aſunt) exacerbatur, h. e. introductâ majori agitatione, facillimè ulcèrius proſerpit, verùm ſi laterit tali in parte, quæ exſiſſionem admittit, nullis circumſtantis impediētibz, totus quantus radicaliter exſtirpandus eſt; ſi autem nec externis remediis debite tolli poſſit, nec ferro locus ſit, vix quid tentandum, imò nec internis quidem, cum à minima agitatione virus ejus circumvicinas inſiciat partes.

## C A P U T VIII.

### *De Cancro ſeu Carcinomate.*

§. 1.

**A**RTIS noſtræ Apollineæ Proceres de nominibus magis, quàm de rerum momentis ſolliciti, huic affectui, ſumpta à Cancro in aquis degente ſimilitudine *Cancer* nomen indidere; vel ob capacitatem, quæ rei ſemel prehenſæ hamuloſas chelas pedesque ita inſigit, ut difficilis ſit extricatio, graveque effugium: vel ob venarum ſubnigrarum, tanquam radicū viroſo fermento gravidarum diſperſionem, quæ pedes Canceri marini divaricatos exprimit; quam verò ſignificandi diverſitatem, ut & alia Philologis & Lexicographis potiùs relinquamus. Dicitur & Carcinus, item tumor cancroſus, Carcinoma non exulceratum phagædæna, item lupus (*ſic* *Meſſ*) ulcerato magis tribuitur. Noli metangere dicitur, quia malum hoc tangendo ſæpiùs exaſperatur, & exulceratum lignificat cancerum. Miſa ergo Etymi indagine, qua plurimi auctores in morbis enucleandis prolixiores ſunt. & quidem ad nullum uſum inde reſultantem, ad utiliora abſque anihagibus nos conferamus. Cancer vulgo deſcribitur, quod ſit tumor lividus, durus, ab initio parvus, reitens, dolorificus, in partibus glanduloſis obveniens, ab acidis & ſalis alcalino ſubtili junctis particulis, & iplas glandulas devorantibus productus.

*Cancer quid.*

Nos verò cum breviter deſcribimus, quòd ſit gangræna glandularum à ſucco ſenſim ac ſenſim acidiorè & actiore factò partes adjacentes corrodeute, cum dolore partis affectæ moleſto oborta.

Differentiæ quoque Canceri multiplices ſunt, alius occultus eſt, ſeu non exulceratus, alius maniſeſtus, ſive exulceratus, alius quidamtenus indolens, alius doloris pleniffimus, alius lentus,

alius citò prodiens, alius ſuperficiarius, alius profundus, alius concentratus, alius diſperſus; alius totum oblidet corpus, cujus elephanſis exemplum eſſe poteſt ex mente Arabum, alius duntaxat partem aliquam glanduloſam occupat; v. g. mamma, labia, naſum, pudendū, &c. Alius ex occasione externâ prodiit, ut compreſſione, contuſione, &c. alius ab internâ oriſtur cauſa.

§. 2. *Locus affectus* ſeu ſedes nativa vel Sub-Parte affe.

jectum quod vocat, Canceri ſunt *partes* omnes corporis noſtri glanduloſæ, quæ maxime domino huic ſubſequent, quæ glandulæ ex vaſculis aut exiguis veſiculis, hiquore à ſanguine diverſo repletæ ſunt coagmentatæ, ſed quia hæcenus nullum eſt vas, quod aliquid ad glandulam afferat, præter arterias, quæ ad illam ſanguinem advehunt, igitur credimus, liquorem iſtum quandam eſſe portionem ſanguinis arterioſi, quæ ab eo ſeparata fuit vel à vaſculis, vel à veſiculis, & quæ in ipſorum cavitatem cumulata eſt, unde accidit, ut liquor ille ſemper à glandulâ effluat per canaliculum, qui ab ea proficiſcitur; & quem canalem excretorium nominamus. Differentia, quæ intercedit inter liquorem iſtum & ſanguinem, ab illa ſententia nos detertere non debet. Quoniam enim ſanguis ex principiis heterogeneis conſiſt, certa quædam portio unius vel plurium ex hiſce principiis, à ſanguine ſegregari poteſt, & excipi cavitatem vaſculorum aut veſicularum glandularum. Et quia ſanguinis principia in hoc liquore ſine debito numero, ſive ea, quæ par eſt, portione, ut ſanguinem conſiciant, non adſunt, liquor, qui ex hac coagmentatione exſurgit, debet eſſe liquor à ſanguine differentis. Omnes ergo glanduloſæ partes ſi reſectæ ſunt liquore

liquore corrosivo, facile corrodī possunt, ex quibus mammarum composita sunt, quae reliquis sunt capaciore, ita ut juxta *Paracelsum* ad solas mammas femininarum, & scapulas virorum sedes Canceri restringatur, ut alias etiam affectuum injurias somitis instar in se suscipiunt mammarum: cancer etiam neclabii, genis, oculis, axillis, inguinibus partibusque genitalibus in lasciviae penam patitur, nec ossa penitus labii hujus immunia existimamus, licet alia forsitan facie & nomine, *Caries* scilicet, veniat.

*Diagnosis.*

§. 3. Ut *Cancri Diagnosis* paucis attingamus, notum est, quod Cancer occultus ab initio vix nisi per specialiora irritationis indicationes, punctiones, &c. oculatissimo etiam Medico suspicionem movere potest; sunt, qui praesentiam Canceri occultū ab initio colligere satagunt, si nempe leniens & emolliens Medicamentum tumori imponatur, & post duas vel tres horas tumor non cedat, sed in spongiosum abeat substantiam, crescentē dein malō; sed nec hujus fidentum est, nam haud malum faciem dum est, ut inde eveniat bonum. Cancer vero nobis manifestus apparet, non tantum ex tumoris inspectione, sed quoque si dolor nunquam desit, & nocte expectari solet. Exesa autem cute si prorumpit, sic ulcus horrendum, cavernosum, & hinc dicitur *Cancer exulceratus*, estque inaequalis cum tuberculis & carunculis; dein dolor ferē est intolerabilis, & æger non aliter dolorem percipit, ac si mille aciculis pungatur. In tactu est durus & obstinatus, aliquando etiam mollis, maxime enim fortis Cancer exulceratus, ex quo effluit materia fetida ac ichorosa, interdum flava, labia ulcers sunt crassa, prætumida, foris inversa, venarum & arteriarum extremitates à glanduloso ac corrosivo liquore exeduntur ac corrodiuntur, hinc larga saepe sanguinis profusio sequitur, carnes vicinæ depascuntur, saepe ita, ut abundantius muscularis partibus in ipsam thoracis cavitatem inspicere possimus, imprimis in Cancro mammarum, febris adeo lenta ob recessione partem particularum ac turbant sanguinis mixturam, cibi quandoque est fastidium, saepe & animi deliquium, in pluribus tandem subsequitur hydrops, quam excipit ipsa mors. Quae omnia phenomena tristia observavimus in virgine honesta Hep dicta placide & pie demortua. Alium puerum in vicino pago *Wolffsanger* dicto vidi, cuius natus, labia, oculi & tota facies ad collum usque, horrendo ac abominabili sanē spectaculo erant depasta, qui & sic miserē vitam suam finivit. Plures alios quoque contemplati sumus, inter quos plures reperimus, in quibus vermiculi vini ac mortui prodierunt. Confer etiam *Ephem. Germ. nostr. Ann. 2. observ. 143.*

*Ætiologia  
Cancer  
feminarum  
Galienus.*

§. 4. Circa hujus affectus gravissimi Canceri causam magno occurrunt difficultates & diffidia apud Auctores, imò adeo ipsi occulta fuit ejus causa, ut *Platerum* mulierci ignorantiam suam hic fateri, quam credulae assentiunt Antiquitati.

Tota enim *Antiquitas Galenicæ* Cancrum ab atra deducit bile, hinc accusant fœcā calidam & siccam, lienisque intemperiem calidam & siccam, quæ juxta per congeniem profert sanguinem, ablegatque ad partes exteriores, ibique Cancros phagedenicæ ulcera producit. In omni corporis parte Cancrum nasci posse dicunt, verum in maximis mulierum maxime ab-

undare, eo quod laxa sint & materiam quam crassissimam prout suscipiant. Ex atra enim bile effervescente Cancros produci statuit *Peterius*, & si bilis acrior fuerit cum exulceratione, quapropter colore etiam nigrescentes sunt inflammationibus citra tantam caliditatem. Venas verò repleri, & circumcirca tendi ad similitudinem pedum Canceri animantes scribunt, unde etiam hanc appellationem morbus habet. Canceri ergo causa remotæ, ad mentem *Peterii*, sunt omnes ex, quæ sanguinem adustum generant & melancholicum, ut sunt carnes infumate, allium, porrum, cypar, legumina, vigilia, &c. Internæ verò sunt obstructions, v. gr. hæmorrhoidum, menstruorum, calida jecoris intemperies & lienis imbecillitas: causa conjuncta est sanguis adustus melancholicus, seu melancholicus præternaturalis, qui ubi acrior est redditus, acutus in venis impactus, & putrescit, Cancrum facit exulceratum, ubi vero mitior est, non exulceratum producit.

§. 5. *Paracelsus* strenuus ille Reformator ponit causam Canceri in Colicohare vel Realgare *Paracelsi* Microcosmico, prout enim Colicoharis conditio est, circum se rodere ac abedere, quum ab eo separatū fuerit, à quo temperatur, ac tum pro siqu suo corporis aliqua parte suam tyrannidem exercere non secus Colicoharum sal acutum est materia producens Cancrum, sub hac videlicet differentia, quod viris ex hæmorrhoidalibus fluxionibus, tuminis autem ex menstrualibus obveniat. Ex his colligit, Canceri situs & loca non alibi fore posse, quam ubi fluxus ejusmodi sibi centrum faciunt. Nec alio se loco ponere possunt, quam ex hæmorrhoidibus inter scapulas, & ex menstrualibus ad pectus. Notat etiam, fluxus menstruales acrisima saliva continere. Quare si corrosivi salis in matrice feret hujusmodi separatio, ut à menstruo se jungeretur, Cancrum, ut supra dictum, & pravam lentitinem ibidem oriri posse non dubitat. Esse etiam in hujusmodi sale realgare quendam cancrum scribit, qui quidem in sale Calebino minime fit. Cancer ergo *Paracelsi* est Apostema, quod ex hæmorrhoidalibus effluxionibus provenit in viris, atque mulieribus ex menstruum corrosivo sale meatum in locustis manifestato, cujus salis duplex est, plumosus videlicet ac arsenicalis differentia. Idem Auctor in Cancro sal causticum virulentum, & necrosin partis affectæ producens accusat, innuitque his verbis Germanicis: *Dann so das Salz sich erhöhet / und besonders sich / was wir es als ein freßend Ding / wo seine Hoffart liget / da naget sie und frisset / aus diesem freßend und nagen da entspringen die Uicerationen, Cancer, Cancrena.*

§. 6. *Helmontius* in pluribus *Paracelsi* fidelis affecta, Cancrum à sale alcalico corrosivo deducit, lumen enim ait, formale virulentum substantiam in virā nostrā, si ipsam vivens, adeoque prout *Archeus* tabidus fermentaliter contagium externum suscipit, ita & in *Cancro* aberrans, se transplantat in furors, quibus carnem topicē infestat. Nam ubi ille loquitur, vive deferantur intro, per accidens externum, sive verò intus suscitentur, adeoque hactenus aliquantulū differant, quoad initium principiativum. Quædam subito se propagant intotum, & necem mox inferunt, alia verò topicum venenum exercent, eo quod

Zzz 1

ed quod horum proprietas est penetrare ex natura veneni, se dilatat tantum iuxta præscriptum sui veneni. Cancrum quoque à contusione factum in muliere notavit Aul. hor. Verum tamen Cancrum ad mentem Paracelsi in ubere & utero mulierum duntaxat esse statuit. Cancrum etiam in carne acutissimi sensus, & continuæ exsionis esse scribit, hinc à sale caustico ejus causam deducit proximatam.

*Villism.* §. 7. Sanguis ex Villi sui opinione materiam nutritioni necessariam suppeditat, succus verò nervosus formam ipsi confert, illamque partibus assimilatur, ac in earum substantiam convertit: atque hoc pacto refectur detrimentum, quod passus fuerunt partes, ipsarumque accretioni suspenditur opera; dum liquidum nervosus humoris crasis inculcata subsistit, nulloque vitio inficitur, sanguinis particule nutritioni accretionique dicata debita congenerique donantur forma, & proportionata partibus exhibetur alimonia. Alio verò & heterogeneo quodam fermento laici nervoli commixtus humor, ab acteris pro alimento suffusus, degenerem induit formam. Si enim ob exhaustos depressoque spiritus, copiosioresque aquosiorum particulam ab intensiori sulphuris efflagratione dissipationem, sal nimis evahatur, fluoremque patiatur, sanguis atrabilariam diathesin consequitur ab exaltatis salibus fixis, crassioribus sulphureis in malsa residuis conjunctis. Eror verò ad glandulas perveniens, crassiores atque coagulatas, quas sibi admittas habet particulas, per articos ipsarum canales abripere non valens, eas in ipsis deponit. Liquor autem nervosus eiden, qui sanguis, labet introitus, per fibras nerveas ad partes, in quibus relicta sunt atrabilaria ista materia, & nutriendis partibus improporcionata, appellens, timorem ex ea cudit, qui ob similitudinem ipsi Cancer denominatur. Villisim. ergo à liquore acetoso instat liquorum à buxo & aceto extillatorum Cancrum produci statuit.

*Sylvestr.* §. 8. Sylvestri Cancrum produci existimat in glandulis: partibusque glandulosis ab acido acri. Docuit enim *Syl.* abunde, in glandulis succum subacidum à sanguine secerni, eundemque succum acidum in ipsis contemperari à spiritibus animalibus per nervos ad easdem delatis, & si acidum reddatur in corpore acrius atque in glandulis secerni solitum, quoties redundat, facilius partes has ladat, quam alias. Ab acri enim acido Cancrum generari comprobatur, quia eum comitari solent dolores lancinantes acidi acris proditores, item quoniam acidum concentrantibus ac contemperantibus eundem leniri contendit.

*Cartesius.* §. 9. Cartesiani glandularum obstructionem ad Cancrum producendum, quam maxime existimant accommodatam, quamvis ferre volunt liquorem viscidum à sanguine per arteriolarum meatus in ductus glandularum delatum, abs quo cum segregatio & transitus lymphæ per easdem impediatur, tumores primo in glandulis suscitari dicunt tenaces absque ulla corrosione, sed quum lymphæ non valens transire diutius circa obstructiones istas detineatur, subtiliores particulas ab arthere sæpius commotas tandem à reliquis secedere & exhalare, quibus absumentis particulas acutas & mucronatas, ante à blandioribus ramosioribus & porosis iisdem intermixtis sub jugo servatas, dominium adipisci, & angulis

luis non modo succis & fibris firmis inhaerere, sed eorum etiam extrinsecus acutis fibras destruere & erodere, quæ ramenta angulis quibusdam intermixta, sanguini ex destructis arteriis effuso communicentur, & miscelam ex diversis istis succis constituant, quæ per venas debite nequeat transfluere, nisi ubi venæ istæ magis dilatantur, & propterea sanguinem istum corruptum, & plurimis particulis angularibus acutis, sive acidis, repletum, & in venulis circa tuiorem istum sive glandulas obstruatas constitutis hærentem, pedes illos cancrinos subartus intuentium oculis exhibere, cum radii lucis in poros venularum istarum disensarum quidem, sed simul etiam obstruatarum incidentes aliquomodo suffocentur. Ex vellicatione quoque fibrularum membranarum, & nervosarum à particulis istis angularibus dolorem induci, & si portio quædam succi chylosi reliquis acidis immisceatur, suppurationem partis cancerosæ cum salutari quodam eventu & cancri extirpatione, dum omnino circumcirca cancrum istum contingat, subsequi docent. Lapsim læpe aut percussione affectui isti ansam præbere affirmant, quatenus violenta ista concessione textura unius vel alterius glandulæ destruitur, & lymphæ petcolatio inhibeatur, liquor verò hic cypsa tubulos destructos diutius hærens corruptatur, & acidum istam acquirat dispositionem, quod itidem contingat, si tuberculum aliquod glandulosum diutius & fortius unguibus scalpatur, ut hoc etiam modo tubuli quidam destruantur, & succorum diversorum debita impediatur segregatio, & per distinctos suos ductus ad varias corporis partes distributio, volatiliores enim partes facile secedunt, & apertiores angulares artibus copulantur.

§. 11. Nos in Cancro explicando, epusque *laxtan* causam perspectam reddendo supponimus, per *franc. sen* glandulas fieri secretionem liquoris, quem *sen* glandulæ à sanguine sequestrant, cumque semper eundem esse. Attamen ideo imaginari nullo modo debemus, omnes glandulas consimiles separare liquorem. Experiencia demonstrat nobis maximas differentias inter liquores, qui à variis glandulis excernantur, quod satis restat, diversas glandulas varia ut plurimum separare principia à malsa sanguinea. Sed cum hæc menti non planè satisfaciunt, nullatenus fortasse inconsultum erit, modum per vestigare, quo glandulæ à sanguine segregant liquores, qui ab ipsis emanant. Ut propositum in hac conquisitione successum obtineamus, animadvertimus, arterias in glandulæ corpus sanguinem advehere, huncque compositum quoddam esse ex plurimis particulis heterogeneis, quasdam ex particulis istis heterogeneis ab arteriarum cavitate egredi, & in cavitate vasculorum aut vesicularum, quæ glandulam constitunt, colligi. Unde concludimus, ad esse meatus, à cavitate arteriarum ad vasculorum vesicularumve cavitates pertingentes, eosque meatus ita esse dispositos, ut nullum aliud sanguinis principium illos pervadere queat præter ea, quæ sunt absolute necessaria ad eum componendum liquorem, qui ex singulis glandulis sigillatim emanat. Tales meatus, sive calia foramina *Pari* dicuntur ac nominantur. Sed quia liquor, qui è glandulæ effluit, ex particulis heterogeneis constat, necessum est, ut omnes parti singularum partium non sint consimiles. Quæ de causâ prout liquor



liquor glandulæ ejusdem composuit fuerit ex sulphuribus, alcalicis, phlegmaticis, aderunt quoque habita proportione, in arteriis hujusce glandulæ poti apti ad liberum dandum exitum alcalicis, sulphuribus, vel phlegmaticis; si verò acres acidæ vitriolicæ, Sale alcalino subtili junctæ particulæ glandulas perficiant, necessario eas corrodingo ac stagnando tuiorem Cancrosum producere aptæ natæ sunt, quia hæ particulæ non sunt oleosæ & spirituosæ, sed potiùs terrestres acres corrosivæ, tubulos corrodingos quovis, ex quarum particularum vitiosarum miscella Cancræ materia produciunt, absque dubio hæ particulæ crassæ ac tardiores tubulis cuspidibus suis nimis se infigentes tardiores ad motum sunt, & nunquam per tam angustos meatus & tubulos perficere possunt, sed potiùs in glandulis stagnant, & sic obstructionem Cancrosum pariunt. Causa ergo Cancræ potissimum est succus glandularum corrosivus aquæ fortis similis, qui tubulos cum carne & membranis corrodit absumitque. Accretio particularum harum corrosivarum est lenta, quia in magno ramo, ex quo glandulæ oriuntur, non facile stagnant, sed pededentim minimis in glandulis cumulantur hærentque, reliquæ verò particulæ cum reliqua rursus circulantur malsæ. Causæ ergo omnes Cancrum producentes sunt obstructionem hanc Cancrosum efficientes, & sunt vel Externæ, vel Internæ. Externæ sunt vel à fortiori glandularum contusione, vel pressione, inde tubuli glandularum obstruuntur, lymphaticus liquor sale corrosivo fixo refertus coacervatur stagnatque, & sic facile Cancrum producere potest: Dein datâ poti succi hi corrosivi magis corrodingunt, & sepe sibi apertam faciem viam, sicque Cancrum exulceratum constituunt. Cancros etiam sæpe oriri videmus ex pertinacibus obstructionibus, quales produci solent per repellentia Medicamenta partibus glandulosis imposita, quale quid in feminâ, dum hæc scribimus, observavimus, quæ ex tumore glandularum mammarum, per abulum repellentium Medicamentorum incidit in Cancrum, quia succi sale acido abundantes glandularum tubulis magis impingunt, & quasi implantantur.

Causæ Internæ sunt dispositio nativæ & obstructio in glandulis ipsis, quæ oritur à sanguine viscido terrestri sale fixo & acido referto, à quo haud melior lymphæ à glandulis separari potest, in quibus stagnant succi, & de die in diem acres redduntur, & continuo disciendendo ac corrodingo planè aliam texturam in glandulis inmedicabilem efficiunt. Hisce deductis jam paucis quoque phenomenon Cancrum comitantium rationem reddamus, ut accuratius Tyrones indolem Cancræ percipiant.

Si autem tantus corrosivus non adierit gradus, majorque fluiditas in humoribus contentis in parte affectâ non ita profunda, sed cuti propiore, nec nimis fixæ, sed laxioris texturæ, non ipse sphacelus seu Cancer, sed potiùs exulceratio exoritur cancrofa (à malignitate sic dicta, ) fistulosa proserpens cum variis Symptomatibus, prout ipsa materia corrosiva variat, cum continuâ vellecatione & exesione, hinc succorum copioso affluxu cum pure tenui, acri, valdè fetente, flavo, livido, pro diversis vasculis exesivis diversis, & sæpe à sanguiferis vasis exesivis effluente, superveniente sæpe febris, animi deli-

quii, &c. à materiæ illius attenuatis, & intra sanguinem receptis particulis variè eum turbantibus. Differt hæ exulceratio non nisi gradu ab illis, quæ scorbuticis sæpe eveniunt, variantes inter se secundum diversos dissolutionis & corrosivis gradus, per quos etiam à gangræna differunt, quæ sæpe erosionibus gingivarum scorbuticis supervenit, (hic loci nomine Cancræ aquosi ob sinus salivales, insignita:) nec à maculæ lividæ in scorbuticis, non sunt nisi gangræna species leviores.

Delor est in Cancro exquisitissimus, imprimis in exulcerato, quoniam particulæ inter se fermentantes fibrillas nervosas concutunt tumuntque, nihil enim magis dolorem excitare potest, quàm particulæ acidæ ac salæ hic abundantes, pungentes, icindentesque figuras collidentes, prout videre est in fermentatione & commotione acidorum cum alcalicis. In glandulis istis obstructis idem est apparatus, hinc succi acres ac corrosivi redduntur, quibus acutis particulis instar cultellorum tubuli & fibrillæ inciduntur ac discinduntur, unde necessariò continuus dolor oboriri debet.

Materia etiam in Cancro detenta sæpe ita foetet, ut non tantum àstantibus, sed & ipsi ægro nauseam pariat, ex qua apparet abundè, quod hic affectus paucis tantum differentis à Gangræna differat, quia in hac idem factor observari solet. Fætor ergo hic non aliunde oritur, quàm à secessione oleosarum & volatilium Sulphurearum particularum.

Per plures quoque annos sæpe delitescit Cancer, quia ipse oritur à viscoso humore & sale acido & corrosivo, atque hoc corrosivum interdum per plures, quàm 20. annos ita obvolutum jacere potest, ceu constat præter experientiam nostram ex Tulpiana observatione aliorumque; certum ergo, Cancrum sub formâ exigui tuberculi per longum temporis spaciū delitescere, & tandem inopinatè protrudere posse, prout plura novimus (cei dictum est) exempla, eam verò ob causam hoc accidit, cum scilicet illud acidum corrosivum à vinctulis viscosi humoris, quibus antea obtegebatur & alligabatur, liberetur, & aculeis suis cuspidibusque incipiat pun gere, scindere ac corrodere.

Materia diversâ, quæ effluit ex Cancro exulcerato, consistit in dissectione diversorum vasorum seu tubulorum, quia in nonnullis tenuior & albidior, in quibusdam crassior conservatur succus, imò dissecis vasis sanguiferis, ipse sanguis in formâ sanguinis rubicundi emanat, imò arteriolis ruptis sanguis cum impetu, & indistinctus effluit, ceu id sæpius in ægris vidimus. Cancer exulceratus est indolens ob pressos nervos & quod acidum quiescat, hinc

Febris lenta in Cancro ortum suum habet ab iisdem particulis corrosivis acido resolis, in massam sanguineam derivatis, ibidem ejus mixturam turbantibus.

Deliquium animi facile hoc in casu accidere potest, quoniam per fermentationem succorum stagnantium plures acidæ particulæ ad massam sanguineam mittuntur, quæ eò delatæ ipsum coagulant iuctassantque, sicque sanguinis circulationem ad tempus impediunt, & sic deliquium animi atque Synopen inducunt.

Part Cancrofa apparet livida, & nonnullamquam cineritiam, qui color oritur à nonnullis



acidis subtilibus particulis per tubulos minutissimorum Capillarium valorum sanguiferorum penetrantibus, sanguinem in suo cursu, in parte affecta impediuntibus, & texturam cutis variantibus, quo incidentes radii colorem istum lividum exprimentes.

*Callositas laborum ac durities Canceri eodem modo se habet, ac superiori Capite abundè diximus de Scirrho.*

Nonnunquam & Vermiculi tum vivi, tum mortui, in Cancero observati fuerant, quod phenomenon nonnullos Medicos aliosque ad hanc opinionem traxit, ut existimarent, causam Canceri exulcerati imprimis esse sarraginem, seu copiam parvulorum venenatorum vermiculorum catenæ devorantium, & simul ipsi corruptionem conciliantium, hinc dicunt esse causam, quod tam cito per ambitum devorent catenam, & hujus rei hanc esse causam addunt, quod unicus vermiculus in charta exceptus, intra unius horæ spatium 50. similes producat: in hunc finem nuper frustulum carnis cortosæ cancröse excindi curavi, & microscopio armatus vermiculos nullos observare potui, sed eorum loco, potius viscidum humorem gelatinæ similem perspexi.

*Prognosis.*

§. 11. Nunc itaque detecto damno hospite, in ejus *Signa Prognostica* paucis inquiramus, ex quibus non magnum habebunt solamen ægrotautes, ludit enim medicantes ac ipsos deludit *Cancer*, hunc Chirurgorum dicitur opprobrium, qui quo intimius afflictiis partibus implicatur, eo & pertinaciùs hæret & mordaciùs torquet. Per annos sæpe latet plures hoc malum, quod corpori magnam inurit noxam, ratio hæc est, quod acidum & alcali per allisionem vel pressio- nem aliarum viscidarum ac tenacium particularum in suo motu impediunt, quo minus fibras partium continentium, ita cito discindere vel secare queant. Nullus verò est morbus, qui ægris majorem incutit metum, quàm *Cancer exulceratus*, nullusque est qui Chirurgum magis fatigat, quàm hoc malum. Hinc verò omnes practici malum hoc incurabile dicunt, imò ipse *Paracelsus*, qui alias sat benignus in prædicando est, & ubique jactat se omnes morbos curaturum esse, in *Libro verò de Apostemæ c. 3.* inquit: *Cancer* successu temporis cordit foditque re- ctà cor vertius, mortemque repentinam in sua molitur periodo; illum circumfusum hoc & al- bis fama jugalibus, illeque multo pretiosus au- ro foret, qui dicum potentum imprimis carnis- cem tollere possit carcinoma, dum veluti vul- tures apud inferos Titii discerpant jecur. Exem- plo suo etiam comprobavit veritatem maximus Græcorum Doctor *Hippocrates*, dicens *S. 6. aph. 30.* Quibus occulti Canceri adsunt, non curare melius est. Curati enim citius intereunt, non curati verò longiore tempore vivunt: hinc an curabilis *Cancer* sit, an secus, maxime con- trovertitur, possibilitatem verò docent Aucto- rum quamplurimorum exempla, præsertim *Helmontii libr. 30. de idæis morbis. §. 38.* numve- rò hæc fides sit adhibenda, judicent nobiscum Practici. Distinguendum autem esse existima- mus inter partem affectam, sic v. gr. in utero, intestinis, oculis, palato, &c. curationem vix admittit *Cancer*. *Helmont. l. alleg. n. 37.* inquit: Interim nil actum, nisi furor ille Archei ideas germinans siluerit, natumque inde perstans vi-

rus suffocetur. Neque enim occiditur per cor- rosiva, imò ne quidem in ulceribus, nisi & cor- rosivis vis necandi insit, ætate quæ furorem alius magis accendunt, quam placant aut inter- munt. Ex quibus Canceri curationis difficultas satis liquet. Unde etiam illud *Nasonianum*:

*Curando fieri quadam pejora videmus*

*Ulcera, quæ melius non tangit sua.*

Hinc quoque enatum illud Proverbiū: *Cancer remedia mitiora contemnit, fortioribus exasperatur.* Sic quoque *Platerus* inquit: Si *Cancer* ptimum inceperit, & adhuc exiguus sit, nec negligatur, (uti scè sit, cum nonnulli à peritis Medicis tunc cognoscatur:) ipsius incre- mentum difficulter impediri, si adactus sit, ægeriunt, & si ad summum pervenerit, nun- quam curari posse, & si exulceratus sit, nisi possit funditus & integer extirpari, & si longo tempore sæpe perdurare possit, lethalem esse. Mitiorē certò nostro judicio *Cancer* meretur prognosin, nempe exteriores corporis partes obdians, faciliè cultro extirpari potest, vel aliis remediis acere corrolivum corrigentibus, inter- jectis, ut impediatur, ne alibi pedesigat. De quibus in paragrapho de curâ agente dicta sumus. Rarissimè enim hic affectus curatur im- primis exulceratus, præsertim in loco inconve- niente & operationi influendæ inodineo exis- tens.

§. 12. Expeditis iis, quæ Theoriam concer- tibus, ordinis ratione ad ipsam curationem, & quidem primò *Dieteticam* accedamus, sine enim ordinata vivendi ratione reliqua præsidia frustra adinoveri, quis non toto observat die? *Dietæ* verò nobis, cœu centies dictum, sub remissæ non-naturalium vulgò ita dictarum titulo offer- tur, quorum singulas paucis perstringamus.

Atq. sit temperatus ac ab omni impuritate li- ber, copiosa materia subtili repletus, à quo fue- ci nostri corporis inprimis lymphæ aliique æro- niantur ac fluidiores redduntur. Omnia ali- menta ac potulenta sint superfluo alcali, & sale volatili oleoso repleta, vitentur æque pejus vi- scida ac acida, terrestria ac sale fixo corrolivo prædita, quia hæc sanguinem & succos nostros, imprimis in glandulis incrassant ac coagulant, ineptosque ad circulationem reddunt, unde fa- cile succi in glandulis stagnare ac Cancrum pro- ducere possunt. Sanguis enim noster constat quidem ex sexcentis particulis, ut plurimum ve- rò ex sale alcali volatilibus, si accedat acidum sal- tum incrassatur sanguis, simili modo, prout apparet, si oleum *Qi* per deliquium inspissatur per affusionem *tus Qi* acidi, spicula enim Acidi in canaliculis alcali hærent, dein particule acide in corpore nostro possident acres figuras in omnibus lateribus secantes, quæ oleosas par- ticulas discindunt & incidunt. Si enim sangui- ni evalato affundas acidum quandam liquorem, ipse apparebit statim niger & spissus, imò si affuderis acidum in venam alieque animalis, morietur in momento, cœu nuper in cane hoc insti- tutum experimentum. Contrarium observatur in sanguine, si aquam ex sale *Xco* vel nitro compositum ipsi affuderis, hinc sanguis apparet rubicundus & fluidior redditur. Sed ad rem, hoc in affectu nocent admodum falsa, quorum particule sunt instar longarum durarum, circa quas aqueæ angustiores luccos nostros circum- volvunt, qui tot salinis particulis aggraviati succi sanguis.

sanguinem in motu suo tardant, hinc plures scorbatici morbi, præprimis verò Cancer ortum suum habere possunt, vitentur ergo carnes muria conditæ, fumo induratae, halesces, brassica sale condita, &c. Omnia verò alimenta & potulentia, quæ nec nimis calida, nec nimis frigida sunt, h. e. quæ ex subtili alcali cum subtili oleo circumseptæ, sunt optima, quæ sanguinem vix mutant & relinquunt in mediocri fluore. Nimis calida sanguinem nimis activum & fermentantem reddunt, quod plures particule subtilissimæ avolent. Nimis pinguis nocent, ut sunt farcimina, petasones, lardum, caro suilla, anguilla, anseres, legumina, cæles vultus, &c. item omnia saccharata, quia viscidum acidum in se continent, hinc ad obstructions cancerosas producendas disponunt succos nostros. Cibi ergo sint boni succi & sale volatili oleo curgidi. Potus sit Insulum Theræ vel Coffæ, vina acida & cerevisiæ vetustæ angue pejus vitentur. Conceduntur vina Gallica ac Hispanica, aliaque sale acido fixo haud prædita.

Somnus hic ad reparandos spiritus animales maxime proficius erit, qui omni ope procurandus. In Cancro mammarum non super dorsum decumbendum est, ne pressione hæc spiritus animales circulates impediatur.

Motus magis conducit, quam quies, hinc exercitiis ad diti raro Cancro afficiuntur; sanguis enim cum succis nostris redditur motu fluidior, quiete verò fit crassior, & ad motum ineptior. Post pastum motus ne sit nimius, aliis cibi in ventriculo non sufficienter digesti vi ejiciuntur.

Alvus serveatur lubrica, sique aliàs solennis & consueta evacuatio fuerit suppressa, omni operâ promoveatur. Veneris usus rarus sit. Excernenda ad consuetudinis leges mensuranda.

Ita, mæstitia, terror, aliaque animi pathemata maxime cerere, nocent, & in praxi quotidie effectum tristem observare licet, sanguinem enim & succos nostros facile coagulant, & ad motum tardiores reddunt. Qui ergo sanitatem amant, ii semper hilaritati, quantum possibile, studeant, omni operâ & in Deum O. M. fiduciam suam ponant, certi quod Dei voluntas bona sit, suosque nunquam deserat, & quod tandem cum carne sua resurrecturi sint, & visuri Filium Dei, in summâ gloriâ in judicio apparentem, & fruturi æternâ vitâ. In lætitiâ enim & gaudio talique fiducia longè liberius, & feliciter procedit sanguinis fermentatio à copiosiori spirituum animalium influxu aduta, unde succorum ac spirituum copiosior distributio per totum corpus, quam quidem in mæstia ac tristitiâ, ubi propter minorem spirituum animalium in fibras fermentatio sanguinis, illorumque distributio per totam corpus valde imminuitur; impiiis Succus pancreaticus primis in visis redditur austerus & bilis iners, plurima certe symptomata afferit.

§. 13. Cura Galenica ipsius Canceri in eo consistit, ut incipientes Cancri augeri prohibeantur, in quem finem causam peccantem, nempe atabiliarium humorem evacuant, priusquam in parte affectâ confirmetur. Evacuant autem primum, si nihil prohibeat, per venæsectionem: deinde per purgationem, ab initio ex simplicioribus, quale est epithimum, quod quatuor drachmarum & dimidiæ pondere, ex sero lactis aut aquâ nulla dant: postea verò ex hierâ, quæ ni-

nigrum veratrum recipit. Vel præscribunt prius Apozema præparans seq. vel simile.

℞. Scelopendr.

Ad. anth. nigr.

Capill. Veneris

Fumar. aa. Mj.

F. Decoct. in bibij. ag. fumar.

vel lactis caprin. In colat.

dissolv.

Syr. de Scelopendr.

de pomis Regis Sapor. aa. ʒj.

Byzant. ʒvj.

M. F. Julapium.

De quo singulis mane ʒiv. exhibent: & postea sequenti melanagogo præparatum evacuant humorem adustum.

℞. Decoct. præcedent. ʒivb.

in quo infund. per noctem

sol. sens. f. ʒj. ʒij.

Myrob. Indar ʒij.

Rad. bellchor. nigr. ppt. ʒj.

stent per noctem, mane, facta una aut alterâ ebullitione, in colat. dissolv.

Syr. de pomis c. sol. sens. ʒb.

Conj. cit. Hamech. ʒib.

M.

Ad locum affectum etiam varia applicare jubent, vitando exasperantia aut mordentia; sequens vero commendant:

℞. Ol. rosarum

Onphacim.

Succ. solani, aa. ʒij.

Quod tandem in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo agitant, donec concreseat & plumbeum acquirat colorem: dein add.

Lythargyr.

Cernisse aa. lb̄b.

M. cum oleo & f. l. a. linimentum.

Vel urticam contundunt, & cum succo solani mixtam superponunt, sola etiam cutâ solâ cum passulis à nucleis liberis contusa applicant.

Ad locum vero ulceratum absque offensione adhibent solani succum linteo molli duplicato in ipso tincto ac imposito. Forinsecus autem supra illud laneam teneram circumdant, quæ ipsâ succo sit imbuta, & diligenter provident, ne illa resiccet, ita ut frequentius succum affundant. In ulceratis Cancris diuturnius uti solent Medicamento ex pompholyge. Semen quoque Raphani domestici contulim, & cum aceto mixtum applicant. Hiscenon putantibus, si patientes sint fortes & juvenes, ad ferrum accedunt.

§. 14. Juxta Paracelsum in curâ Canceri hæc Paracel-  
morrhagiales menstrualesque fluxiones amoven-  
dæ sunt per Physicum; demum per Chirur-  
gum anodyno mortificandum erit ter. vel quater. ut in Noli me tangere fieri dicit: postremo descriptio-  
ne consolidativâ eodem loco posita curan-  
dum. Gluten aquaticum in aquam, ubi reduxe-  
ris, accipit semper ad unam libram Colchotar-  
is ejus ʒib. florum aris: proportionem hanc à quan-  
titate Colchotar- is observando, mixta simul ul-  
cerique vel Cancro superposita maneant, donec  
purelanc: quod plerumque juxta ipsum fieri  
soler in quatuor diebus. Deinde amovendo  
superponit mundificatum sequens:

℞. Picis nivalis,

Visci pini,

abietis

Cura Can-  
cri secun-  
dum Ga-  
lenicos.

*abietis* aa. lbj.  
*ex locustis de laticellib.*  
*Lavigne* quar. j.

Mixta liquefiant cum cere & olei partibus æqualibus, ut ambo sufficiant ad emplastri compositionem: quod isto, non alio quovis, extrahi poterit. Deim superponit pulverem hunc:

℞. *Pulv. ex succo chelidonis*  
*Parthenionis*  
*Centauræ* aa. ʒß.

*Mumia* ʒi.

Mane vesperique ligat.

Anodyni ipsius descriptio est seq.

℞. *Spermoli*,  
*Succi solatriæ* aa. ʒj.  
*Liquoris de frinus vel vernici* ʒß.  
 Reducatur in formam Unguenti.

*Helmontium.*

§. 15. *Helmontius* exilitimat, solum attactum lapilli Butleri, tanquam remedij potentis sat esse ad extinguendum *Canceri* virus ab indigno Archeo ortum, quia externa remediij obliuio, quadam consecutione contiguitatis, totum domat Archeum, non secus ac dens rabidi, etiam si optinè invento, deterfustamen rabiem quandoque adfert. Commendat etiam gluten Aquatico Paracelsi i. e. Ranam integram vel Bufonem, per Blas lunare ipsius plenilunii, & frigus hybernium aucocillium in albam & crystallinam conversam, supra baculum in campo aperto locatam, per unicum noctem, manè liquatum tragacanthum referentem, cum formâ seu figurâ pristina. Laudat quoque Author in Cancro Colchotar vitrioli prius aliquamdiu in cella ad mollescendum repositum, dein cum farinâ avenæ, & lacte in Cataplasma subactum, quod juxta ipsum Cancrum tollit necatque.

*Willisium.*

§. 16. *Willisius* ad crassiores ac coagulatos humores educendos commendat pilulas Tartar. Querc. vel de succino Crat. cum ammoniac. vel sequens Apozema.

℞. *Rad. polypod.* q. ʒiij.  
*Herb. ceterach.* ʒij.  
*Fol. sem. s.* ʒß.  
*Santal. citrin.* ʒij.  
*Cog. in* ♡ *fontan.* ʒxv. ad ʒx.  
 addend.

*Agaric.* ʒij.  
*Rhabarb.* ʒiijß.  
*Colat. clarificata* add.  
*Syr. de pomis purgant.* ʒij.

Hujus Apozematis ʒiv accipiat æger, repetendo intra 3. vel 4. dies semel.

Varia quoque hoc in morbo commendat absorbentia, ut sunt oculi ʒ. Corall. margarit. Ebur. pur. Item interalterantia & refert prælaudatus Noster Chalybeata, imprimis acidulas feratas seu martiales, quia maximo melancholicis hæ aquæ esse solent solatio, copiose enim epotæ sanguinis tincturam salino-sulphuream eluunt, ejusque mala fermenta destruant, & viscerum sordes abtergunt. Inunctionesque referant, & per consequens sanguinem purificent.

Inter Externa, Saturnina omnibus reliquis præferet.

*Sylvium.*

§. 17. Cura *Canceri* ad *Sylvii* mentem in eo consistit, ut acidum concentretur ac contemperetur. Concentrant autem juxta *Ipsum* potentior Acidum acre areta, sanguis draconis, coral-

lia, oculi Cancrorum, mandib. lucij piscis, item opium, item quodvis sulphur metallicum aut minerale fixum. Ex quibus aliisque varias concinnat formulas.

§. 18. *Cartesius* talem instituit in *Cancro*. *Cartesius* mate curationem, qua particule illæ angulares acutæ, & succi acidi hebetentur, mitigentur & obstructions glandularum, quantum possibile est, referentur. Hæc de causa sudorifera commendant, & remedia porosa & volatilia, ut anguli partium acui, quibus humores peccantes resecti sunt, intra poros remediiorum frangantur, & succi in convenientem redigantur fluorem, ut ita simul glandulæ obstruere referantur, & ubi pauca liquoribus reddatur via. Maxime vero in Cancro nondum exulcerato proficua judicant vina medicata, vel decocta herbarum multo sale volatili refertarum, cum tota inde purificetur massa sanguinea, crassi & ad motum torpidiores succi in debitum suscitentur fluorem, & proinde tubuli quicumque facile aperiantur & permeabiles reddantur. Hujusmodi verò vino sequentes imponunt species:

℞. *Rad. Scrophular.* ʒß.  
*Contrajerv.* ʒij.  
*Scabios.* ʒiij.  
*Salsaparill.* ʒiijß.  
*Bardana* ʒiijß.  
*Herb. geran. Rupert.*  
*sumar.*  
*chelidon. min.*  
*agrimon.*  
*centaur. min.*  
*card. bened.*  
*scord.* aa. Mß.  
*Flor. sambuc.* P. lß.  
*Perficor.* P. i.  
*Rasar. lign. Colubrin.* ʒß.  
*Sem. Pheclandr.*  
*levistic.* aa. ʒij.  
 ① *is fulig.* ʒj.  
 ʒovis ʒß.

D. ad chartam pro speciebus uni mensuræ vini impendendis. Succis ita ad sudorem satiat aptatis, & crassioribus eorundem impuritatibus per urinam rejectis, pulveres exhibent diaphoresin largiorem promoventes, qualem sequens proponit formula.

℞. ʒnii diaphoret. gr. xvj.  
*Chelar.* ʒß.  
*Qu. Oru* gr. iiij.  
*Camphor.* gr. j.

F. *Pulvis* in sequenti vehiculo unâ vice exhibendus.

℞. *Ag. sumar.* ʒß.  
*Essent. enul.* ʒ.  
*Flor. sambuc.* ʒß.  
*Syr. scord.* ʒiijß.  
 M.

Præmissis hisce subjungunt externa quædam penetrantia, & glandulas obstruere aperientia, quæ per poros ingredientia succos viscidos incidunt, attenuent, & fundant, uti sunt emplastrum despermate ceti, de ranis cum *Oio Vigonis*, balsamus sulphuris, oleum myrrhæ, spiritus tabaci, unguentum nobile *Mynsichti*, vel sequens, imprimis si incrementum assumere concipiatur.

℞. *Rad.*

℞. Rad. aristol.

virid. er. aa. ℥iij.

Minii ℥℥.

Arsenic. cryſtall.

Auripigment. aa. ℥℥.

Opii

Camphor. aa. ℥ij.

Axung. porcin. ℥ij.

F. Unguentum.

Sectionem tamen accommodari ſolentum exiſtere dicunt remedium Canceri adhuc incipientis, quo funditus exſtrepitur, ne unquam aliquod capiat incrementum; at in majori, ubi multæ jam à ſanguine impuro repletæ ſunt venæ, & copioſæ tumori huic ſubſequenti arteriæ, operationem hanc periculo haud vacare quàm liberrimè proſequentur. Deſtructis etiam plurimis glandularum fibris, & arteriolarum extremitatibus chyli advehentibus, ut tumor jam convertatur in ulcus, nec hoc ipſum incrementum acquirat, & partes deſaſcatur vicinas, nullum intermittere volunt ſtudium, ſed frequentiores inſtituere jubent fomentationes ex ſpiritu mattricali, vel decocto Thez, ſcorpulariæ, contrajervæ, ſcordii, nicotianæ, ulcusque abſtergere mandant liquore mellis ab ſcio abſtracto Aug. Sale, vel liquore mercurii præcipitati attingunt, pulveresque inſpergunt, quorum poros ſucci acidi ulcere contenti copioſe ingrediuntur, ex ſale Jovis, vel Saturnini, cretæ, ceruſæ, pompholygis, lithargyrio, thure, & ut partes fibroſæ jam corruptæ à ſanis ſeparentur, illa adiungunt, quæ motu celerissimo à æthere agitata eadem abraſant, diſſecent & ſejuvant, quorum adſcribunt numero amalgama ℥iij, auripigmentum arſenicum, ſublinatum, calcem vivam, & butyrum ℥iij, quintam eſſentiam arſenici, oleum ℥iij ſaccharinum, calcem ℥iij dulce, & huiusmodi alia, quæ ſequentes in ſe comprehendunt formulæ.

℞. Plumbi ſſ. ℥iij.

Ceruſ. ℥iij.

℥iij crud. ℥ij.

Pomphol.

Camphor.

℞iij. aa. ℥j.

Ol. nicotian. ℥j.

Succi ejusdem q. l.

F. ſ. a. Linimentum in mortario plumbeo, quo ulcus Cancroſum ſtudioſè illinatur.

Vel:

℞. Lithargy. ℥ij.

Auripigment. ℥ij.

℞iij. alb. ℥iij.

Mell. diſſolut. ℥vj.

F. Unguentum.

Maſſam etiam Lithargyri ſtudioſè illitum egregiam navare operam aſſerunt, nec ſecus improbant humanum, cum ſucci corroſentes optime hoc domentur. Ad ſanationem, vel ſi hæc penitus pro voto obtineri nequeat, ad præcautionem, ne incrementum ſumant, nec vitæ inſidia ponat ulcus hoc alijs ſatis deſtructive, ſequens approbant unguentum.

℞. Litharg. aur. ℥ij.

Minii ℥ij.

Mum. ℥vj.

℞iij. ℥ij.

Camphor. ℥ij.

Ol. roſ. q. l.

F. Unguentum.

Hiſce ſubjungunt emplaſtrum diapompholygis, vel diaphulphuris, ulceri huic maxime convenientia.

§. 19. Præmiſſis aliorum curationibus, & No-  
ſtram Pharmaceuticam ac Chirurgicam aggredi-  
libet. Huic itaque pernicioſo & glandulis ut  
plurimum incarcerationi ſanitati hoſti eruen-  
ac deſtruendo acuenda ſunt ingenii organa, illique  
referenda deliſcentis Adverſarii ſores. Attem-  
perantibus & imprimis corroſivam acidi miſtam  
acrimoniam in luccis demulcentibus Medica-  
mentis hoſtis iſte aggrediendus eſt, inter quæ  
palmam alijs præcipiunt omnia alcalia vel vola-  
tilia vel fixa, item temperantia & oleoſa, dia-  
phoretica, quæ omnia acidum acre corrigunt,  
& ex corpore eliminant: cinnabarina, cancrina,  
Creæ, ſaturnina ac camphorata, item niſtroſa,  
chalybeata, teſtacea ac leſcentia alia commen-  
dantur hoc in aſſectu atroci. In juniorum Me-  
dicorum gratiam, & Nos unam & alteram com-  
municemus formulam, & quidem in forma de-  
cocti, imprimis ubi dolores urgent.

℞. Rad. chin.

ſarſaparill.

liquirit. aa. ℥vj.

Raſur. lign. Guayac. ℥iij.

Fol. alib.

Flor. papav. err. aa. Mj.

Capit. papav. alb. & ſeminib. N. 3.

paſſul. ex acinat. ℥iij.

Cog. ſecundum artem ex ſ. q.

▽ ſimpl. poſſquam per noctem

in ſula fuerint, Colat. ℞. ℥ XL. Det. S. Apozoma, de quo calidè bibatur aliquando vitæ plenum.

Vel:

℞. Rad. chin. ℥iij.

gentian.

convalſerv.

emul. aa. ℥℥.

angelic. ℥ij.

Herb. ſcordii

card. bened. aa. M℥.

Sem. ejusdem ℥℥.

Inſund. & coqui ſ. q. Aq. commun. & vin. in vaſe bene clauſo ad Colat. Div. Edulcoratur ſyrupo ſcordii.

Interponatur ſequens vel ſimile ſudoriferum, imprimis ſi dolores maxime urgeant.

℞. ▽ Hord.

card. bened. aa. ℥iij.

cinam. ℥℥.

Ocul. eb. ppt.

℞iij diaphoret. aa. ℥℥.

Opicorrell. gr. ij.

Syr. ſcordii ℥℥.

M. pro unâ vice hauriendus potus.

Vel:

℞. Roſb. Juniperi ℥℥.

℞ C. C. volat. gr. xij.

R. bezarr. ℥℥.

Aq. ſcordii q. l.

M. F. diaphoreticum unâ vice aſſimentum. Omnia enim remedia, quæ in Peſte & Gangræna ſolent præſcribi, & hic proderunt; eo enim ſemper reſpiciendum eſt, ut obſtructio illa cancroſa tollatur, & lymphæ à ſale acido corroſivo fixo liberetur, in quem finem ſequentia ſanguineam maſſam depurantia commenda-  
mus.

AAAA

ELIN.



*℞. Elix. vitæ ʒij.*  
*℞. Cephal. volat. n. d. ʒj.*  
*Trit. corallor. ʒij.*

*M.*

Vel sal. volat. oleos. quodvis conducet : vel in formâ pulveris sequens conferet.

*℞. Cinabar. nat. gr. iv.*  
*Ocul. ʒs. ppt. ʒß.*  
*Sacch. Fm. gr. ij.*  
*Camphor. gr. j.*

*M. F. Pulvis lingulis vespertinis horis assu-*  
*menendus.*

Vel :

*℞. Antisept. Poteri ʒß.*  
*Arcan. dupl. gr. v.*  
*Laudan. opiat. gr. j.*  
*M. F. Pulvis.*

Vel :

*℞. Sem. melon. ʒij.*  
*▽ beder. terr. bellid. aa. ʒij.*  
*F. emuls. add.*  
*Ocul. 69. crud. ʒj.*  
*Crysal. ʒ.*  
*Sacch. Fm.*

*M. f. l. a. Emulsio cochleatim & per vices exhibenda.*

Varia martialia edulcorantia interponenda sunt, aliaque acidum acre in succis existens corrigentia, & per diuresin eliminantia, quale sequens egregie iteritulus.

*℞. Rad. scabios. enul. aa. ʒß.*  
*polypod. ʒv.*  
*sac. saporill. china aa. ʒij.*  
*Herb. fumar. scv. dii.*  
*Herb. Veronica. scolopend. fenecion. aa. Mß.*  
*Flor. sambuc. Pij.*  
*hyperic. Pj.*  
*Rasur. fental. cur. ʒvj.*  
*saffes. ar. ʒß.*  
*Guajac. ʒij.*  
*Cort. ejusdem ʒß.*  
*℞. li. ʒ ʒij.*  
*℞. ʒ ʒij.*  
*Sem. danci ʒß.*

*M. dentur ad 6. id vini generosi.*

*℞. Gm. Glat. viperin. Zvelferi ʒli ʒi, aliaque plura interponenda sunt. Acidula quoque martialia & nitrola non negligenda sunt, cum consilio Medici potæ. Si in primis viis lateat amurca viscida, eas eluendas volumus sequenti lenitivo.*

*℞. Pulv. prunor. ʒj.*  
*resin. Jalapp. gr. iij.*  
*Edulc. gr. xv.*  
*M. F. bolus.*

Mercurialia enim sæpe optimum præstant effectum, prout in omnibus tumoribus, sic præprimis in Cancrosis. Alias nocent purgantia, quia malum lateat ut plurimum in partibus solidis, & si cæries purgabis, Cancrum non curabis. Eodem modo V. S. nocebit, quia enim nil aliud efficies, quam ut agro aliquid de ipsi vitæ demas.

Si febris urgeat, interponi potest sequens vel limilis mixtura cochleatim assumenda.

*℞. ▽ menth. ʒv.*  
*Diascord. Sylv. ʒj.*  
*Gm. diaphoret.*  
*Ocul. 69. aa. ʒj.*  
*Elix. vitæ ʒvj.*  
*Laudan. opiat. gr. j.*  
*F. Mixtura.*

Si dolores intensi sint, opii dosi augeri, ut & Camphora addi potest, quæ sæpe plus præstat, quam opium. Detur sæpius crysalli mont. ppt. ad ʒß. cum laud. opiat. gr. ij. n. j. Curatio ergo Cancri, si quæ ob loci congruitatem fieri potest, ut plurimum duobus remediis perfici potest, unum est culter, qui tutissimus & compendiosissimus, & ægri male sanitati suæ consulunt, qui remedium hoc metuunt protrahuntque, donec res non amplius integra est. Alterum remedium sunt Medicamenta caustica, quibus malum cruentis absumitur, Ulcus Cancrosum, quod Cancrum apertum (quo jure non quæro) vocitant, cum vix curationem, si omnia jam depasta fuerint, admittat, præstat sæpe palliari, quam curari, atque illud remediis lenioribus externis, (non possibilibus internis sanguinis ac succorum correctione jam superius dicta,) ut unguento Hmno cum Camphora superimpofitis stupis, theiicali Camphorato, vel similibus madefactis, non tamen nimium efficacibus. Qualia partim discutiendo quasdam sanguini redderent particulas eas mixturam valde turbantes, partim viscidis à longo tempore involutas in vicinis adhuc tubulis quiescentes corrosivas in motum suscitando efficerent, ut citius omnia (ne quidem nervis vel tendinibus, unde immanes dolores, vel sanguiferis majotibus exceptis,) erodendo prosperaret ulcus, (si tamen de verâ curatione rationari licuerit) abblandientibus favorabilibus quibusdam circumstantiis, in iis, qui nimium diu non tardati sunt, corporeque sano & vegeto, si vet temperamento roboris sunt præditi, si commoditas loci permittat per ferrum, ut commodiores & breviores viani, malum integrum simul cum portione partis sanæ auferatur, quod si non admittitur, per iterata caustica quasi per multos cultellos, illud, quod una, vel alterâ sit incisione illic efficiendum, ut malum corticatum eradicetur, caustica verò sine periculo applicantur carni & glandulis, non autem tendinibus, nervis, valibus sanguiferis majoribus, à quibus proin cavendum. Præterea inter vel præter caustica (Experientia teste,) valde ad excitandum efficaces compertæ sunt rigidissimæ, acutissimæque acidorum corrosivorum particulae, poris vel amplexibus particularum Gm. vel Gmii firmiter inhaerentes, quarum molem cum augent, circumquaque eminentes se indunt, pungunt, & ob figuram irregularem corporum interstitiis sat diu & firmiter inhaerentes, ab aquosis elui ferè renuunt, quæ cum non augeant agitationem particularum acutarum in ipsa parte, sed potius ob dissoluta stamina, ob effectionem introductam, &c. sistant, optimo aliquando cum successu ad malum funditus eradicandum applicantur. hoc respectu in usum vocari possunt ▽ divina, Tr. vel lavamentum ex ▽ ʒ ʒo ʒo, theiicali. Camph. extra & oolocynth ablynth. Ol. Guajac. cum balsam. Peruv. &c. Possunt etiam pulveres ex aristoloch. ocul. ʒs. sal. Fm. & pluribus aliis appropriatis aspergi, donec ulcus malignum reditum & benignum, eodem ut simplex modo, curetur.

Hic



Hic verò omnia unguenta, cataplasmata farinacea & spissa vel unctuosiora nocent, quamvis salibus volatilibus fuerint mixta. Sequentia & similia lavamenta calide ter vel quater de die linteis quadruplicatis applicari possunt.

℞. *Aq. Regin. Hungar.* ℥ij.

*Calc. viv.*

*Decolt. Guajac.* aa. ℥v.

*Elix. vita* ℥ij.

☉ *volat. oleos.* ℥ib.

*Camphor.* ℥ij.

*Bals. Peruv.* ℥ib.

*Ol. sassafras* ℥ij.

℥ii-*tri* ℥b.

M.

Sequens quoque Balsamus externus, à pluri-  
bus magni æstimatur Cancro illitus.

℞. *Balsam. aurei*

*Acum. ~ tereb. par.* aa. ℥ij.

*Pulv. opis crud.* ℥ij.

M. & f. bals. quo illine Cancrum non  
exulceratum & exulceratum. Balsamus Aureus  
sequenti modo paratur.

℞. *Δ viv.*

☉ *hnia* aa. ℥b.

*Camphor.*

*Borrac.* aa. ℥ij.

*Ol. amygd. amar.* ℥ij.

*ada.*

*Ol. Talcis* ℥ij.

M.

Omnia enim remedia externa acidum acre  
temperantia, obstructions Cancrosius re-  
ferantia, & Cancrum induratum resoluten-  
tia egregia sunt. Superfedeamus Practicorum  
Catalogum Medicamentorum digerentium. ca-  
tharteticorum, diaphoreticorum, uno verbo  
universalium in medium proferre, utpote phar-  
macorum pro impetrandi fine minus idoneo-  
rum, inefficacium ac ineptorum. Sunt quo-  
que, qui statuunt veram ac geminam Cancri cu-  
rationem consistere in Quo, non quidem vulgari  
crudo & indigesto, sed singulari quidam enchei-  
resi parato; ex ejusmodi prolapsia dicunt esse  
pulverem istum indolentem à viro quodam Ju-  
liacensi unumquemlibet Cancrum sanante adhi-  
bitum, & ab Helmontio l. de *Idci morbof.* nota-  
tum: sed si verum, de quo valde dubito, dolen-  
dum est, præparationem ejus cum Artifice fuisse  
sepultam. Salivationem ope ℥ii peractam sapidius  
profuisse testantur monumenta Medicorum. In  
quem finem alii sequentem commendant Essen-  
tiam quotidie ad guttas 20. & plures usurpandam.

℞. *Essent. vulnear.*

*hyperic.* aa. ℥ij.

*Solut. myrrh.*

*alvis* aa. ℥j.

*in ~ vini solut.* ℥ij.

℥j. *precipitat.* ℥b.

M. f. l. a. *Essentia.*

℥ias enim est acidorum domitor strenuus. Sa-  
tarnum quoque in laminas redactum, & Can-  
cro nondum exulcerato impositum palliativè fe-  
lici cum successu adhibitum fuisse testatur Ob-  
serv. 161. *Ephemeridum German. Ann.* iv. & v.  
ubi notatu dignum quid occurrit, quod sc. lami-  
na ejusmodi plumbea intra duos menses erosa, &  
in medio in albicantem pulverem reducta fuerit.  
Alii optimo cum successu laminam plumbeam  
piovivo illinunt, sicque Cancro non exule-  
ra-

to, ut & exulcerato imponunt. Quod de Ar-  
senico, ℥nio, aliisque mercurialibus scribunt,  
ex eodem fuit fonte, quia non nisi ratione par-  
ticularum ℥ium vires exercent suas, hunc se-  
quens balsamus egregius est.

℞. *Cinnabar.* ℥iii ℥j.

*Ocul.* 69.

☉ *hni* aa. ℥j.

*Sperm. ceti* ℥ij.

*Camphor.* gr. v.

*cum balsam. Peruv.* q. 6

M.

Vel:

℞. *Plumb. ust.*

*Terr. & li dulc.*

*sigillas.*

*Ceruss.* lot. aa. ℥j.

☉ *hni*

*dulc.* aa. ℥j.

*Thur.*

*Myrrh.*

*Extr. arist. loch.*

*Consol. maj.* aa. gr. v.

*Ol. vitell.* ov.

*Balsam. Peruv.* q. 6

*F. balsam.*

Celeberrimus Poterius præscribit Balsamum  
suum ℥lem indies Cancro illinendum.

Sunt, qui in Cancro curando Cancros flu-  
viatiles, item ranas ac bufones magni æstimant,  
de quibus videantur Paracelsi. *Helmontius*, *Aqua*  
*pendens*, *Fabr.* *Hidannus*, qui in eum finem un-  
guentum ex ranis viridibus. quod ab his laucia-  
tur, ab illis culpatur, composuit. Alii sunt, qui  
extollunt sterus felis Cancris fluvialibus antea  
nutritis. Decoctum ☿. ☉ & capite mortuo su-  
liginis ab Authoribus commendantur. & ve-  
getabilibus Geranium, Polytrichon, Charteo-  
lium, Solanum, Cicutam, Plantag. pomaque  
putrida laudibus evehunt.

Celeberrimus Mayi in ulcere Cancroso ora  
an alias corporis partes occupante proficuum di-  
cit pulverem ex ranis aquatilibus, gammaris &  
C. C. isto compositum.

Sulphura mineralium anodyna fixa & opatia  
pro mitigando dolore, & pro curâ palliativâ  
præ aliis profunt; sed quis quæso omnia recen-  
sebit remedia, sunt enim innumera, & ferè totum  
replent librum, quæ ab Authoribus commen-  
dantur. Nullum verò mihi tutius & melius re-  
medium videtur, quàm culter & caustica, ad  
quæ semper ægri, ab initio præsertim, à Medi-  
cis incitandi sunt, quæ caustica cum cautelâ ap-  
plicari possunt, inter quæ facile palmam aliis  
præcipit Oleum meum ℥nii Oratum externè  
Cancri labiis appositum, vel arsenicum corre-  
ctum alii applicant, omnia autem caustica cum  
cautione apponenda sunt, & si Inflammatio  
suboriat, statim Medicamentis idoneis recur-  
rendum & non timendum est, quod malum ali-  
quando revertatur, cui observavit Celeberr. *VVe-*  
*delius* l. 1. f. 2. c. 7. *Amant.* Med. domito sic ap-  
parenter Cancro, partibus vi corrosivorum de-  
structis, & fontibus lymphæ velut exsiccatis, ma-  
lum tamen non æquè cessasse. Sic etiam sectio ipsa  
male instituta sæpe in Cancro incurabili recidivam  
minuat, cum non ita pridem in cive hujus Civi-  
tatis tumore oculi Cancroso laborante observa-  
vi, cum is ab Empirico non ritè excinderetur,  
prope-

propediem repullulabat, & quidem cum majore tumore: ast hic Cancer non rite exsectus fuit, plures enim mammas Cancrofas abscindi vidi, absque ullâ recidivâ. Sic quoque *Fabric. Hildanus* totam mentulam Cancro exulcerato laborantem feliciter se sectione sustulisse scribit; ego Cancrum labii inferioris feliciter Limburgi ad Lahnam excindi curavi, forcipe sc. tollendo Cancrum cum bonâ labii parte simul, ac uniendo labia vulneris, ut in labio leporino, quod & conspexit Cl. D. Muys celebris ille Chirurgo-Medicus, qui etiam in Cancro crystallum montanum tam internè, quàm externè usurpatum efficax remedium dicit, quia acidum egregiè temperat. Unguentum verò Egyptiacum jure meritoque in Cancro curâ rejicit. Si à sectione vel caustico applicato remedio sanguis nimium stillet, applicari potest illico liquor stipticus vel noster, vel *Drelincorrii* sequens.

*℞. Alum.  
nitri.  
℞iia. ʒij.*

*M. c. album. ovor. n. ij.  
ut omnia inter se fluant.*

Vel inspergatur sequens Pulvis stipticus.

*℞. Bol. commun. ʒij.  
Gallar. immatur. ʒj.*

*℞i de Cypro*

*Camphor. aa. ʒj.*

*M. F. Pulv.*

Vel seq. Aq. stiptica

*℞. Limas. ʒj.*

*Ol. ℞iia. lb̄ss.*

*M. & effervescent; postea add.*

*Alum. ʒij.*

*℞. ℞iia. ʒij.*

*eris usq. ʒij.*

*Iterum effervescent; postea add.*

*Aq. commun. lb̄ij.*

*M. & percolentur.*

Aq. stiptica, quæ aquæ guttatim internè, quàm externè usurpanda est.

## CAPUT IX.

De Scabie, Lepra, Græcorum & Arabum, Impetigine, Al-  
pho & Leuce.

## §. I.

**N**Æ! diversæ oriuntur in corporis nostri diversis partibus obstructions, ut & ex his dependentes diversi affectus cutanei, tam pro diversitate particularum obstruentium, quàm ipsarum partium, in quibus obstructio est suborta. Si enim à sale quodam obstruantur tubuli cutanei, & vascula excretoria in glandulis cutis miliaribus, oriuntur *Scabies*, *Lepra*, *Impetigo*, *Alphus* & *Leuce*, qui affectus valde deturpant extimam nostram vestem, simulque clam vitæ insidias struunt. Nec in proprio deservunt corpore, sed & in alia impetunt, propagare gestientes virosum ichorem & disseminare amplius, adeoque & invisi sunt hi affectus. Noctu graviores sunt, interdiu sædiore, semper ingrata sunt symptomata. De quorum affectuum ac symptomatum ratione ordine tractaturi sumus, ut tyrones eos clarè ac verè perspiciant intelligantque. Pauca ergo prius de Nominè, antequam ad realia accedamus, in usum Tyronum addere libet, de Etymologia non solliciti, de Synonymia tantum dicemus, quod Scabies dicatur aliis *psora*, & quidem à Græcis, Germanis, *der Brind*, die *Gräbe*. Scabies alia dicitur humida, seu serosa; alia sicca seu pruriginosa. Omnis verò scabies est maligna & contagiosa.

*Scabies* describi potest, quod sit obstructio tubulorum cutaneorum, imprimis excretoriorum, in glandulis cutis miliaribus, cum capillarum vasorum lymphaticorum obstructione, vel etiam disrptione à sale quodam fixo acido oborta.

*Lepra*. *Lepra* valde congenet & affinis affectus est cum Scabie, ita ut hæc nill aliud sit, quàm mitior Lepra; gradu enim tantum differunt. Est enim Scabies ad Lepram Græcorum quasi via, ut Lepra Græcorum ad Lepram Arabum (seu Elephantiasin, si nempe sal acrius & abundantius, pluresque & profundiores afficiat glandulas, sicque morbus diutius protrahatur. Sic etiam squa-

mulæ in Leprâ generantur, quæ in Scabie non conspiciuntur, ex quâ fursuracea tantum decidunt recrementa. Dicitur & Lepra ab his squamulis quasi *ἀλεπ*, i. e. squamola.

*Lepra* Græcorum describi potest, quod sit obstructio scabiola vel totius corporis, vel certæ alicujus partis, sicca, fursuracea, squamola, quid vehementissime pruriginosa, à salinis & vis coagulativis, in sanguine & succis præexistentibus & ad glandulas cutaneas delatis, ibidem obstructionem pertinacem producentibus, oborta.

*Elephantiasis* seu *Lepra Arabum* non nill ex-  
du differt, & una aliâ malignior est & vehementior; alia mitior & benignior est, pro salis acrimoniæ gradu, à cujus cum humoribus miscela, & inde exorta textura cutis colorum istorum diversitas petenda est, & non à quatuor illis famosis humoribus, prout Veteres explicarunt, & juxta humorum varietatem more solito novam diderunt nomina; quæ à sanguine fuerit producta, Alopeciam, quæ à pituita, Tyrcam, quæ à bile, Leoninam, & quæ à melancholia reliquis majorem Elephantiasin nominarunt. Juxta Recentiorum magis intelligibilem Principia describi potest Elephantiasis, quod sit obstructio scabiola pertinax ac maligna, cum defæcatione totius corporis, crustis & tuberculis duris, maculis lividis & ulceribus, à sale quodam fixo ac corrosivo humori viscido ac terreftri implicato, & in cutis tubulis glandularum profundioribus hærente eosque dilacerante, ortum trahens.

*Impetigo*, aliis *Lichen volaticum*, mentagra, *impetig.* aliis *Herpes squamosus* dicitur, pro quarum squamarum diversis, colore, crassitie, consistentia, &c. & ulceris, cujus sunt recrementa, profundioris, vel superficialis varietate varè denominatus est *Impetigo*, vel vitiligo, cujus species esse videntur *Alphus* & *Leuce*. Hæc gravior cum altius descendat, & (vel copiosiores albidioresque producat squamulas,) vel tantum eam obstructionibus vexando (hærente in tubulis materia

materia in squamas concretura) maculas producit albidas, ipsas pilorum radices aggrediens; illic levior, gradu tantum minore differens. Dicitur autem adesse Impetigo, quando ex una vel pluribus erosis producta pustula succuserodens circumquaque exulcerat vel minus, (prout majorem minoremque invenit resistantiam, & hic vel illic pervix adfint obstructions vel secus, circumvicinis aggreditur glandulas, & latius usque serpens profert acervos orbiculares, vel varii-formes, ulcusculorum fundentium materiam, mox in squamas nonnihil albidas concrefcentem. Describi ergo potest Impetigo, quod sit obstructio scabiosa cum tuberculis planioribus pustulosis ferè magis proferpentibus, à sale fixo acido ac acri glandularum cutanearum tubulos obstruente, oborta. Cum *Alpho & Leuce* gradus tantum differunt, facile eorum descriptio dari potest. Duplex Impetiginis genus à Cello constituitur, unum mitius, alterum ferum. Impetigo mitior minimas cutis pustulas exasperat, & non tam citò serpit, cum fera Impetigo celeriter ad vicina serpat, & pruritus vehementiorem habeat comitem.

Part affe-  
cta.

§. 2. Affectus hi cutanei idem agnoscunt *Sub-jectum*, & cum duplex Scholæ constituant *Sub-jectum*, primum sc. & secundarium, *Sub-jectum* ergo primum seu adæquatam dici potest totum corpus, & potissimum sanguis cum suis succis, qui sanguis cum perenni suo fluxu & refluxu minima corporis alluat, & pervadat loca & pressione adjuvet, non potest non labem suam ipsis affricare, & particulis suas foculentas in ipsis deponere glandulis cutaneis ac miliaribus dictis, & eorum vasculis excretoriis, non aliter ac in tubulis ac canalibus artificialibus, liquoris, quem velunt, recrementa quædam lateribus adherent, at jam prout pars quævis corporis vasis pluribus & angustioribus, aut aliis majorialiqua, ad impunitates has sanguinis remorandas pororum dispositione prædita est, ita & iisdem suscipiendis & hospitandis aptior existit. Potissimum ergo sedem affectus hi fiunt in cute ejusque membranis, præcipue verò in glandulis miliaribus, earum tubulis, & vasculis excretoriis cum capillaribus vasis lymphaticis. Quod verò *Scabies* in membranosis locis magis hospitari solet, ratio hæc est, quod scilicet membranz poros habeant constantiores, quibus se accommodare difficilior possunt particulæ rigidæ, unde facilius in ipsis hærent quæque debent. Quare etiam *Helmintius* rectè Subjectum Scabiei totam pellem constituit, exclusis omnibus visceribus & Hepate. Cum enim Scabiem contraxisset ex Chirothecâ Scabie infectâ, & per reiteratas putrefactiones adeo macilentus, raucus & lassus evasisset, ut vix stare poterit, & nihilominus Scabies permansisset, scabiem non ex vitiosis, biliosis & auctis humoribus, aut ex Ingenierie Hepatis, sed solo contactu Chirothecæ sibi molestam fuisse optimè judicavit. Reliqui affectus etiam cutem pro subjecto agnoscunt, in istis verò glandulis profundiores obstruuntur ac afficiuntur; cutis enim nihil aliud est, quàm contextus quidam retiformis, qui constituitur ex innumeris filamentis valorum sanguiferorum, nervorum tendinumque mirâ arte invicem implicatis, per quorum spatia vacua ordine parallelo emergunt ductus quidam excretorii à *Stenone* primùm observati, à glandulis subjacentibus orti, & papillæ

quædam pyramidales à nervis prodeuntes, quæ à molli lymphâ ex ductibus illis exsudante perpetim rigantur, & in cuticulam tutelæ ergo superjacentem per tennes fibras protenduntur. Has cum Celeberrimo *Malpighio*, illarum Inventore, pro immediato tactus organo agnosceamus. Animadvertendum adhuc, quod præter jam recensita in Cute, mirabili rete, ope microscopii detegantur pori duplicis generis, *maiores* aliis, qui plerique pilos sibi insertos sustinent, & *minores*, quæ spatia ab aliis relicta occupant.

§. 3. Incipientis Scabiei signa sunt, si percipi-  
*Diagnosi*  
tur pruritus vehemens, qui quasi prodromus *Scabiei*, item delectatio in scalpendo, dolor verò post confricationem, cutis & cuticulæ cor-  
*Scabiei*  
rugatio. Præsentis jam signa visui sese offerunt, & cognoscuntur ex miserissimo ægri statu, & molestissimis cruciatibus, præsertim noctu, dum ægri in lecto incalescunt & fermentatio major excitatur. Cutis asperatur, interdum prurit, roditurque. Pustulæ aliquando majores, aliquando minores, modò sicciore, modò humidiores sunt, aliæ quasi confluentes. Pustulis ruptis & apertis fiunt ulcuscula, quæ sanie & ichore evacuatis obdurescunt in crustulas, quibus tegitur, squamosas, & scabendo furfuracea secedunt; deturpatio verò cutis minor est, ac in Lepræ speciebus, cum in his crustæ squamæque longè sint majores, & exulceratio longè profundior, & malignior: ut plurimum infantes ac pueri Scabie inficiuntur, nec adulti atque senes ab ipsa tuti sunt.

Lepra Græcorum pruritus habet insepara-  
*Diagnosi*  
bilem, & tantus hic est, ut etiam ægri vehem-  
*Lepra*  
mentissimè scalpendo nullo modo juventur, sed potius omnis generis ulcera & phlegmonas accersat, quod cutem exasperet & Subjectam ei carnem multò quàm in Scabie profundius depa-  
*Scabiei*  
scatur, quia profundiores afficiuntur glandulæ, & materia est hic acrior, quàm in Scabie, unde & squamulas producit, quales in Scabie haud generantur; dicitur & Lepra ab his squamulis, quia cutis in cortices quasi squamasque resolvatur.

Nunc ad veræ Elephantiasis seu Lepræ Arabum Diagnosin pergamus, in qua accuratius versari non decet, quo magis interest, accuratum judicium ferri de suspectis in hominum confortio aut tolerantis, aut inde excludendis.

Incipientis hujus affectus signa ut plurimum sunt ab initio obicura & aliis morbis communia, cum veluti anguis sub herbâ lateat, nihilominus tamen aliquatenus illam produunt lassitudo, & segnitie spontanea totius corporis, mentis ignavia, stupiditas cum summâ in somnum proclivitate, ejusque tamen frequente interruptione. Infomnia metus & tristitiæ plena, & sæpè incubo vexantur ægri, aliisque affectibus soporosis: sic quoque leprosum somnambulicem novimus; in venerem alii proclives sunt, ut ipsis aliquando priapismus ac satyriasis accidat, respiratio est difficilis ac tarda, expiratio gravis ac sætida, pulsus parvus, tardus & sæpè inæqualis, sius intentia, appetitus debito minor. Alvo supra modum stricta laborant infecti, urinæ aliquando jumentorum lotis similes, cutis crassior, durior ac alprior redditur, color faciei & totius corporis lividus apparet. Flatuum ac ructuum copia, à vitiosa nempe digestionem

alimenta in substantiam viscidam ac tenacem mutante, quæ sæpe ope fermenti resoluta, dum amplius spatium requirunt, nec per poros obstructos exitum habent, datâ portâ per superiorem & inferiorem gutturem erumpunt ruuntque.

Inrescentis hujus affectus atrocissimi, & quasi è larebris suis prodeuntis signa diagnostica multo jam manifestiora sunt, & quasi partæ victoriæ vexilla in facie primum, seu cute tenuissimâ donatâ, & aëri frigido poros quosvis stringenti, & fuliginem aliorumque recrementorum exclusionem impediendi maxime expositâ, apparent. Quantum intranspiratio per poros cutis impedita sanitati noceat, testantur abunde monumenta Medicorum, nisi enim à sanguine exirent varia corpuscula, quæ aërem comprimendo materiam subtilem eò determinarent, ut locum ab ipsis derelictum occuparet, foret, ut sanguis sufficiens nullatenus donaretur agitatione, ut aëris gravitatis resisteret. Insuper ergo transpirationem in singulis corporis nostri partibus perfici quis negabit? Imò si ea quæ exhalantur & evaporant, oculis percipi possent, foret, ut corpora nostra nibe sæpè circumdata apparerent: cum Celeberrimo ergo *Sanctorio*, Medicinæ Staticæ Auctore confirmamus, copiosior materiam à corpore nostro excerni per insensilem transpirationem, quàm per urinas & secessus, & ex octo alimentorum libris, quas quotidie quis usurpabit, quinque per poros avolaturas. Oritur autem secundum nonnullos in Elephantiasi, in partibus inferioribus molibus & spongiosis narium primò lenticula, quæ crescendo in tumorem insignem ac deformem nares attollentem exsurgit, unde pinnae narium dilatæ, patulæ, fixæ & salebrosæ redduntur, parte verò superiori ab his ipsis tumoribus coarctatus nalis respiratio obest, & dispneam causatur; similia deinde tubercula ex rubro sublivida, indolentia, & quæ loco moveri possunt, in facie etiam, fronte præsertim, & genis exsurgunt, partesque omnes faciei sædè intumescunt, cum maculis crebris vivo-ide nigricantibus interpersis, quæ à sanguine ob tubercum illorum præsentiam in motu suo impedito & stagnante oriuntur. Frons crasseleat & corrugatur, supercilia præ tuberositate deorsum pendunt, palpebræ tumidæ & inversæ conspiciuntur, malæ crasseleant ac intumescunt, labia prætumida prominent, mentum crasseleat, aurium pinnae in ambitu rotundiores & contrahiores apparent, auricula verò tumidior & parotides circumjacentes in insignem tumorem elatæ conspiciuntur. Aspectus torvus est, oculi ex flavo rubent, pellicula sive unguis adnascitur oculis, & sæpe visum tollit, oculi sæpe in orbem agi videntur, capilli & pili deplount. Tubercula quoque granulosa flavescentia, vel sublivida in lingua deprella, & in palato ac faucibus spectantur, quales grandiores non raro in porcis cernuntur, deglutitio impedita est, voxque rauca, venæ raninæ item temporum & aliarum corporis partium, præptimis inferiorum ob acclivem & difficiliorem sanguinis crassi ac acidi per illas motum tumentes, nigricantes & varicantes sanguine illo propriâ visciditate ac aciditate admixta stagnante, apparent. Tubercula per totam capitis pilosam partem, per collum, artus & totum corpus reliquam disperguntur, & in brachiis cubitum:

manuumque summitatem, in pedibus verò femora & genua potissimum occupant, idque prope articulos, qui copiosis glandulis gaudent, Adest insuper scæda cutis, in artubus imprimis extremis & capite piloso, Scabrities & inæqualitas cutis quibusdam & squamis albis quandoque sublividis, inde aliquando deploentibus, & cutis aliquando dehiscit in plantis & digitis pedum, succedit tandem partium corporis consumptio, unde ossa, scapulae præsertim alarum instar prominent. In vigore morbi constitui ægri exuberant tubercula jam dicta, & totam cutem nigrescentem. Tumores tandem excavantur in scæda ulcera, quæ cutem profundè penetrant, lata sunt ac serpentina, labrisque callosis & prætumidis prædita, & sanguinem, si contrectentur, facile profundentia; nullum tamen sensum, quod mirandum illa occupantis, aut fibrarum nervearum partis materia viscida adeo infarctarum, & ab acido succo ita arrosarum. In spiritibus animalibus sensus primarii Auctoribus nullum amplius cum partibus liberum commercium, quod in tota cute quandoque obtinet. In dictis ulcusculis & vermiculi observati fuerint, non secus, ac in gangrænâ, quia instar lupi rapacis omnia membra dilacerat, ac devorant, hinc bestia illa sævit in ipsa ossa, & decidunt sæpe manuum & pedum digitum, imò nasus & genitalia, radices quoque unguum digitorum arroduntur, funduntur ac dilacerantur, odoremque tetrum ac cadaverosum spirant: Febris quoque adest lectica.

Perpectis his, testat ut ex illis eruamus certa & pathognomonica signa, quibus nixus firmum aliquid Medicus judex insectorum pronuntiare possit: sed si tem accutatè perpendo, ex ingenti hoc numero vix aliqua pauca sunt, quibus omnino fidendum sit, nisi plurima alia signa concurrant, & sequentia esse possunt.

1. Nodosæ, granulosa, tuberosa & sublivida protuberantia in facie, lingua, artubus, & quandoque reliquis in partibus molles & indolentes.

2. Ulcera profunda, callosa ac scæda, acum sine perceptione doloris admittentia.

3. Horrenda & terribilis ista faciei deformitas superius descripta.

4. Quando omnia, & quidem generosa Medicamenta frustra adhibentur.

Alii addunt, elephantiacos noctu toto corporis habitu splendere, quod tamen falsissimum esse hæcenus observavimus.

In *Impetigine* mitiora observantur signa, summa tantum conspicitur cutis asperitas cum multâ prurigne, squamis & furfuribus, & si albæ simul appareant maculae, simulque squamulae albæ decidunt, & si quoque altrius descendat & profundiores afficiat glandulas. Dicitur & *Leucæ*, quæ simul pilorum radices aggreditur. Alphus verò cognominatur, quando cutis est aspera, & albo colore in superficie tingitur. Affectus enim hi, ceu jam superius diximus, gradu tantum differunt.

§. 4. *Galenici causam* Scabiei explicantes, dicunt *Galenicæ* vidunt ipsam in humidioribus & siccioribus. Humidiores enim generati volunt à sanguine cum admix-

*Diagnos. Impetiginis*  
rum opinio de causâ Scabiei.

admixtione phlegmatis falsi. Sicciorem verò fieri à sanguine bili flavæ commixto. Ut plurimum Scabiei excitari per contagium statunt, nec non à cibis calidis, nimis calidis & aromatibus acutis & amaris. Tenuiora enim ajunt quidem excrementa in sudores absorbta, ita cutem egrediuntur: verum crassiora, atque idcirco difficilem exitum invenientia, dicunt ibi in cute subsistere, & ita paulatim discuti; & hinc pturiginis & scabiosis deducunt affectus.

*Elephantiasis, Leontiasis, Satyriasis, seu Lepra.*

*Elephantiasis, Leontiasis, Satyriasis* seu *Lepra* *Causam* veteres deducunt à crasso, viscoso, ac atra bile redundante sanguine, & pituita multa falsa ac acida. Causæ enim externæ ipsi sunt omnia illa, quæ sanguinem atrabilem & Melancholicum gignunt, & inde vitiosam nutritionem causare possunt: ut caro porcina, communicatio saniei & spiritus elephantiaci. Apprehendi autem hac affectione viros magis, quam feminas dicunt, atque inter illos magis, qui crallum & viscosum ac atra bile repletum sanguinem habent, & qui abundant pituita falsa ac acida, item qui victu crasso & ægrè concoctili utuntur, & qui in otio degunt; non minus verò iis, & qui multis exercitiis inordinatè utuntur, & per hoc sanguinem inspissant: itemque iis, qui cibos assidue in ventre corrumpunt: quod verò regionem attinet, hujus mali inductricem, esse ajunt illam regionem quæ valde calida tum quæ vehementer frigida est: & altera quidem ob id, quod sanguinem adalescit: altera, quod frigore suo eundem congelat & perspirationes prohibeat, ac insitum calorem suffocet.

*Lepra Graecorum.*

*Lepram Graecorum* item *Galenici* ex melancholico succo, & reliqua Cacoehymia, enasci contendunt, ubi verò serosi, tenues & acres humores aliis crassis succis admixti, ad cutem tanquam ad commune emunctorium à partibus internis rejiciuntur, *Λευκός*, i. e. *Impetigines*, generari dicunt, quæque brevi in Scabiem ac *Lepram* transire statunt. Remotè omnia conferre dicunt, quæ humores possunt reddere aciores, quibus accedit cutis conspitiatio à frigore.

*Alph.*

*Alphum* Veteres deducunt à pituita albâ, quia color cutis in hac specie albus est, serè subasper & non continuus, ut quædam quasi guttæ dispersæ esse videantur, interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit, *Melan* colore ab hoc differre dicunt, quia niger est & umbræ similis. *Leucen* verò *Alpho* habere aliquid simile dicunt, sed magis albida est, & altius descendit, in eaque pili albi & lanugini similes sunt.

*Leuca.*

*Leucen* sive *Vitiliginem albam* à pituita lentâ ac glutinosa in summa cute impacta *Galenici* obori sibi persuadent, quia iis, quæ pituitam evelunt, curari solet. Hinc *Leucen* dicunt transmutationem cutis ad colorem albidiorē, à viscosa ac glutinosa orientem pituita. *Vitiliginum* generationem ejusdem cum *Leuce* speciei esse scribunt, verum illas ad profundum usque corpus mutare, ut etiam pili similes enascantur. *Vitiliginis* verò in cutis superficie consistere ajunt, præterquam, quod etiam ipsæ moram trahentes, ad profundum usque procedunt, ut etiam pilos albos producant propter subjectum humorem. Nam ex pituitoso humore albas, nigras verò vitiliginis ab atrabile fieri hand dubitant.

*Paracelsi opinio de*

§. 5. *Paracelsus* Scabiem procedere ait ex sale liquoris, quod in spumam transmutatur, aut in

locustis exsiccat, & super cutem non aliter, *causa* *Scab.* quam sal super urticam extrinsecus adhæret. Non secus illud, Scabiei nempe, vel pruritiū, in extremitatibus erumpit ex liquore variis in culpidis, prout in urtica videtur. Altera via, inquit Author, progreditur ex sanguine sal & rodit cutem, carnem ac ossa prorsum unâ cum venis, ligamentis, nervis, juncturis, &c. Scabiei plures species juxta salis diversitates describit. Scabiei originem etiam provenire ex emoribus resolutis haud dubitat, quibus accessisse ait alumen minerale scissum, à quo etiam pruritiū, Sapharum & fures deducit.

*Lepram Graecorum* à sale arsenici simili, vel à *Lepra* *sale vitrioli plumosi* deducit.

*Elephantiasin* ex hæmorrhoidalium liquoris *Elephan-* *tiasis* bus menstrui produci ait, vel nutrimenti descenditibus ad locustas membrorum. Quamlibet *Elephantiasin* serpere ait in modum Naphthæ, solum verò eò differre ab hac illam, quod ejus substantia liquorque simul nascantur. Si ex menstruis, vel hæmorrhoidalibus morbus iste procellerit, flavam aquam; si ex liquoribus, rubicundam profluere perhibet. Omnis enim *Lepra* juxta ipsum frigidior existit naturâ atque præpinguior, neque fieri potest, ut unquam cum Medicaminibus concilietur. Plures quoque *Lepræ* species Author constituit, Leoniam videlicet, Elephantiam, Alopeciam, Thyram, Morpham & Undimiam, quas omnes ad eandem medendi rationem redigit.

*Impetiginem, Alpham & Leucen* *Paracelsus* *Impetig-* *exori* *contendit* ex cruoribus resolutis, quibus *Alph.* *accessit* *alumen minerale scissum, & pro varietate* *Leuca.* *salis peccantis vel Impetiginem, vel Alphum, vel Leucen* produci existimat.

§. 6. Juxta *Helmontium* Scabie pellis inficitur, ut cutis nequeat alimentum depuratum in propriam veterem alimoniam, sed in alium ichorem traducat, qui est pruritus & urticæ salis, hinc *Helmontius* existimat, quod omnis Scabies non intrinseca petat remedia, sed solum topica, quæ sunt enecando pruritui salî, adferunt in se ipso experientiam, cum enim Scabiem contraxisset ex Chirothecæ Scabie infecta, & per reiteratas purgationes adeo macilentus, tæucus & lassus evasisset, ut vix stare poruisset, nihilominus Scabies permansit, hinc concludit, contra *Galenicorum* sententiam, non ex vitiosis biliosis & adustis humoribus. neque ex intemperie Hepatitidis, sed ex solo Chirothecæ contactu Scabiem productam fuisse. Impossibile enim ipsi videtur, quomodo Scabies ex contactu contracta, quadrantis horæ spatium ante intemperiem Hepatitidis induci posse & ab intemperie, ut sic effectus esset ante causam; potius ergo ab acido latice tanquam fermento, & semine in pelle existente causam Scabiei proximam deducit. Et ut breviori circino comprehendam omnia, causa Scabiei ad mentem *Helmontii* est vitium & contagium pellis virulentum proprium, non verò Jecoris, P. incipio scilicet interno spontaneo, sive externo, tomite contagioso aliunde hautum & transplantatum in contactu sc. corporis, hintei vel suppellectilis infectæ, in pelle tangentis concepto.

*Lepra Causam* quod attinet, *Helmontius* *Lepra* *Lepræ* inenitibilitatem subjectivè esse in habitu carnis, effectivè in quodam veneno, quod est cruentum anodynum glaciale prope modum mortificans & Archeum inficiens, & foetida



contagio in regione sudorifera communicabile; hoc venenum, juxta Ipsum, incipit ab extra, ubi sentiunt internos dolores, & externum frigus & calorem, hinc venenum hoc foris sedem habere contendit, quoniam spiritui sensitivo confermentarum ab innato calore foris protruditur, atque aliqua ex parte frigori respondet, licet non in qualitate prima elementalī; alio titulo est glaciāle & mortificat per modum gangræne, verum duntaxat partem, quam ulcere signat. Imò nec etiam inde se procul dilatat congestim, quia est ex veneno glaciāli constringente insensibilitatis Auctore. Lepra ergo juxta Ipsum, venenum habet anodynū, non quidem soporativum, sed glaciāle propemodum, mortificans cum infectione spiritus sensitivi, ideoque potenter contagiosum, præcipuè in regione fervida ac sudorifera.

*Impetiginis*  
In *Impetigine* pruritivum fermentum in Pelle latere statuit, hinc *Impetigines Lichenes* pellis vitia esse ait à pruritivo jam dicto fermento oborta, quæ si partem aliquam obfederint, pertinaciter eam ulceroso pruritu deficiant.

*Albi & Leucii.*  
Cum juxta *Helmontium* latex pluribus usibus destinetur & officis, sequitur eundem etiam exorbitantem totidem & plurimum adhuc morborum causam fieri occasionaliter, saluginem nempe, acridinem ac putridi commistiones ab internarum partium fordidis infectis suscipit, multasque ideo pellis excoitationes, *Albium* sc. & *Leucum* excitant, prout & in pelle suas atque varias pruriginis produciunt. Errare itaque Scholasticis latius credit, quæ hos defectus in Jecore insens referunt ejusque intemperiem incusant; nec advertunt, quod unica ovis totum gregem Scabie infestet, absque Jecoris labe ulla, quodque abstergisse manum luteo, quo Scabiosis est usus, Scabiem propagat citra Jecoris contagium aut defectum ullum.

*Villisus*  
*opinio de causa Scabiei.*  
§. 7. *Scabiem* oriri contendit *Villisus* ex humore lymphico acido salino factio in glandulis cutaneis constantem residente. Sanguis verò, è quo lymphā depromitur, talem acido-salivam diathesin consequitur, vel ex alimentis uberiore sale refertis, & in ventriculo non rite volatilificatis, vel à spiritibus debita copia cruore non irradiantibus, nec saltem amplius coëscens. Quum enim novus iste serosus latex è sanguine elicitus salibus turgescent ab glandulis cutaneis, per quas foras erumpere debet, pervenerit, cum liquore in illis jam contento fermentat, quia cum ipso facile nequaquam uniri potest, illi congener non existens, & post fermentationem in alienam concreverunt materiam, quæ ob crassitatem poros cutis, quos pervadere nequit, opplet atque obdurat, & cutem in acuminatos tumores elevat, qui tum mole tum numero augescunt à sero perpetim adventante, & à sanguine in vas suis à tumoribus istis compressis retento, & in cursu suo impedito. Fibre autem nervæ in glandulis miliaribus dispersæ à salinis particulis, quibus pori omnes sunt infarcti, vellicatæ, inordinatum spiritibus animalibus motum conciliant, molestique pruritus sensum excitant.

*Causa Lepra.*  
Ventriculi fermentum nonnunquam tantopere depravatur, ut alimenta ingesta protèrve concoquantur, & male digerantur, ipsorumque principia inter se confusa rite non expendantur, neque explicentur. Crassior ergo rudisque ex malsa ista conficitur chylus, qui in sanguinem delatus, ab ipso nequaquam subigi assimilarique

potest; sed suffocatis quasi spiritibus ipsis, ab illius adventu, tardior in motu suo redditur. Particulæ salinæ, quæ abundantes & pleræque fixæ aut minùs volatiles omnibus alimentis insunt, crudæ minimeque exaltatæ sanguini commixtæ, spissiores enim circulatione minùs habilem, & ad obstructions in universis partibus, quas perlustrat, producendis aptiores efficiunt. Depressis autem spiritibus, sulphureque in semetipso implicato, sal nullo amplius freno cohibitus sese in libertatem vindicat, & cæterorum principiorum jugo excusso, eorumque consortio privatus ad floris statum pervenit, fixusque penitus evadit, atque coagulatur. Sanguis itaque spissior factus hixisque salinis refertus, passim in tenuioribus partium tubulis celsipat, crassasque ac coagulatas salium particulas relinquit; quarum aggerie à novis perpetim advenientibus augescunt, partium cutisque pori ab illis opplentur ac distenduntur, & in tumorem elewantur. Quum enim salium istorum superficies spiculis horrida existat, partium, in quibus continentur, texturam destruiunt, earumque fibras dissilcant, atque cutem in squamulas dissolunt. Succis nervosis quum à vitio isto immunis non persistat, fibrarum nervearum canales, per quos circulator, in finibus obstruit, spirituumque influxum in partes exteriores impedit, earumque sensum obscuriorem reddit.

*Villisus* negat *Impetiginem* produci ab huiusmodi causa. Immore merè cutaneo, vel contagio, vel à quavis alia causa depravato. Asserit verò in cruoris malsa nonnunquam ob salis fixi fluorem passim abundantiam quasdam fieri concretiones acido-salinas, quæ quum nec edomari, nec comminui aut atteri possint, sanguinique innatas cum ipso circulantur, ad cutem compulsa ejus poris inhaerent, quos opplent, & in tumorem elewant, atque in superficie pustulas produciunt. Sanguinis enim crassi penitus viciata existente, & sale in ipso imperium obtinente, novæ sunt indefinenter salinæ concretiones, quæ priorum vestigia prementes ad corporis habitum perveniunt, ubi ipsis aduniantur, & pustularum in superficie prominentium aggeriem adaugent. Spiritibus à sale hoc pacto in cruoris malsa præpollente prius depressis, sulphurisque inflammatione & exaltatione præpeditis, illius coagulationes indies augescunt, & materia tartarea in sanguine uberius progignitur, quæ perpetuâ circulationis lege per arterias versus cutem delata, primarum pustularum molem adauget, novasque in superficie producit. Sed si sanguineus latex totus quasi tartareus evadat, in omnibus sanguiferis vasibus in corporis habitu dispersis tartareas istas concretiones relinquet, ex quorum stipenda illa coacervatione in immensum exurgit pustularum aggeries, universaque superficies squamosa seu leprosa incrustatione obducitur; & tum humor cutaneus viciatus istius liquoris contagio corruptus, cum ipso affociabitur, morboque vehementiori atque pertinaciori efficiendo auxiliari manus conferet.

Dum cutis & cuticulæ pori liberi & aperti persistunt, humores excrementitii ad glandulas miliares, per quas foras prorumpant, appellentes, debita fluiditate gaudent, cutis levis ac polita, & concolor permanet. Quum verò mitis ille humor in glandulis cutaneis hospitant, interdum nimis exhaustiatur, aut viciolus fiat, vel

vel cutis cuticulæ texture densior evadat, earumque pori tunc à prava victus ratione, tum à duriori labore, aut vehementiori frigore constringatur: humor serolosus, qui per cutis foramina, continuè evaporatione foras eliminari debet, præpedita via in cutis poris retinetur, & coarctatur, ejusque aggestio à novo indefinenter adveniente accrescit. Quum enim in poris cutis non aditë sufficiens iis omnibus serolis particulis continendis spatium, nec pateat ipsis exitus ob densiorem cuticulam, è poris cutis erumpentes sub cuticulâ expanduntur, & cuti suppositæ applicantur, illiusque colorem immutant: nigro liquidum eam tingunt colore, si Sulphura quædam crassiora & adusta admixta habeant, albo verò si liquor lymphicus putris & putris fuerit, humor autem serolosus per poros exhalari solitus sale, sed volatiliori naturaliter turget; sed si vitietur, fixior fit, & acorem quandam contrahit, salisque ejus spicula paulò crassiora atque duriora evadunt, qui cutis cuticulæque porostum sibi angustiores repentiens, in illis hæret, & remoratur; sed quum illius aculei, illis infixi remaneant, forisq; prominent, cutis asperitas contingit. Si verò cuticulâ densior fuerit, particule serolæ sale utunt volatili imprægnatæ, eam pervadere nequeunt, & sub illa remorari coguntur, sed quum ad evaporationem continuò tendant, spicula sua cuticulæ poris inferius paulò apertioribus insigunt, quæ ad exteriorem superficiem pervenientia, eam asperam & inæqualem reddunt.

**Causa Leucæ.** Liquor serolosus in sanguine per glandulas cutaneas secretus, & per cutis poros foras emanans, sale volatili turget, & in oleo sua mitis est & oleosus: cutis itaque benigno illo humore irrorata æquabiliter sique permanet, & quamdiu per poros suos liberum exitum ei præbet, cuticulæque pori satis patuli illius evaporationem non impediunt, nullum contingit cuti ab ipso detrimentum. Sed quum corrupti possit liquor ipse, pororumque cutis ac cuticulæ, uti & earum texture dispositio immutari possit, variis de causationibus, in primis *Leucæ*, pluribusque aliis affectibus obnoxia fit cutis; abundantiores autem in humore seroso existentes salinæ particule spissiores eam faciunt, & ad evaporationem ineptiores, ille verò crassioribus pollens particulis in cutis poris remanere cogitur, & in eis stagnare, sed quum perenni fluxu novæ prioribus adiciantur, hæc ab illis è poris, quos occupabant, extruduntur, & versus cuticulam propelluntur, quam tuum ob propriam molem, tum ob eam densiorem permeare non valentes, in subiectam cutem decidunt, & super externâ ejus superficie expanduntur, cuius innatum colorem pervertunt. Salia enim in sero diluta aculeos suos in majoribus cutis poris, per quos exeunt pili, insigunt, earumque radices erodiunt & destrunt, ac illorum delapsum inferunt, sicque *Leucæ* constituunt.

**Juxta Syllabiæ causam Scabiæ, Lepræ, Impetiginis, Albiæ & Leucæ.** §. 8. *Sylvius Scabiem feram, Lepram, Impetiginem, Album & Leucæ* gradu tantum inter se differre ait, hinc & non multum juxta ipsum horum affectionum causæ differunt. Causam enim Scabiæ, Lepræ aliorumque; cutaneorum affectionum esse humorem acrem dicit, simulque glutinosum, & potissimum acrimoniam acidam esse causam reputat, humores etiam istos acres acidisque in corporis superficie hætere vult aliquando propter pituitam glutinosam ipsis admistam, aliquando propter aliquod in Dicitur vitium patra-

tum. Cutis enim rubedinem & apertionem Ipse ab acrimonia, & ad falsedinem nutritiam tendente humore deducit: qui sumul tenax existit, & hinc facile concrevit & accrescit vestimentis, induratis, aliisque linteis parti affectæ proximus.

Existimat igitur Author, in Leprâ acrimonia maxime viscidum glutinosumque in corpore præexistens ad corporis superficiem cum circulante sanguine propulsum ibidem sisti. Et cum duo sint acrimonia ab Authore primò inventa, salsum sc. lixivium, & acidum, hinc pro diversitate hujus acris & reliqui glutini modò *Lepram*, modò *Impetiginem*, modò *Album*, modò *Leucæ* obori contendit. Ceterum hæret edicit illos humores acres acidosque in corporis superficie aliquando propter pituitam glutinosam ipsis admistam. Notat quoque idem Author humorem acrem ex lesa cute partes vicinas, quibus glutinositæ suæ adhæret facillè inficere, ac similiter afficere, quo nomine seipere solent hi affectus; quin ratione eadem vitium hoc contagiosum reddi comprobatur, dum ite humor alios attingit, ac præcipue infantes & pueri, quorum humores pituitiores, quam in adultis, facilius, juxta ipsum, simili afficiuntur corruptione, illamque servant, hinc Scabiem, Lepram, Impetiginem aliaque ut plurimum contagiosa pronuntiat, quia alios contactu suo inficiunt, adhærente sc. humoris acris & plus vel minus glutinosi parte alterius cuti, quam penetrat, & allabantis sanguinis sani partem corrumpit, atque in cute permansens, diuturnum sæpe malum parere posse contendit.

§. 9. *Cartesius* etiam hic in pristina sua persistit opinione, statuuntque *Scabiem* ab obstructione orni tubulorum cutis, quod iisdem succi inhæreant ipsi & viscidum à particulis quibusdam cuspidatis & taliter figuratis, ut certis quibusdam tubulis pedum, manuum, aliorumve corporis artuum inhæreant, quorum cavitati superficiem eorum corresponsent, in motu impediti. Ex enim particule cum pro diversitate figurarum & tenuitatis vel crassitudinis diversos constituent acidorum gradus, vario quoque modo alios succos, quibus immiscuntur, in motu impediunt, & fibras tubulorum, per quos fluere solent, afficiunt. Quippe cum plures ejusmodi particule viscido humori inhæreant, quæ cuspidatæ & acuatæ non tantum utrinque, sed etiam tenuiores sunt, celerius quidem, sed non ita vehementer ab æthere petraescente commoventur, quam si pluribus gaudeant micronibus, ac majorem etiam habeant molem; etenim priores ita agitate & visciditate non adeo difficulter se jungunt, & plures perforant fibras, verum tubuliores tam magna non efformant foramina, unde parva solummodò in cuticulâ excitantur pustulæ, quæ facillè aperiuntur, & paucum effundunt pus: crassiores autem ex multis constantes aciebus ab æthere, cuius motui aliquantum resistunt, vehementius agitate, fibras plures in uno quodam districtu fortius dirumpunt, ut chylus etiam ex cavitatibus suis effundatur, qui cunctis foramen illud obtegente distendat, & pustulas majores cum abegente quadam inflammatione efformet. Dilaceratis etiam & destructis ab acidis illis succis glandulis, cum ductibus suis lymphæ effluit, & partes humectat, quæ Scabiæ species vulgo humida dicitur. Apertis verò pustulis, si acuta illa particule, sive succi acidi, chylum inficientes vicinas semper fibras non

Bbbb

modò

modo cutaneus, sed subiacentes etiam musculares erodant, & devastent, scabies redditur ulcerosa. Exesum verò fructuum horariorum in corpore ejusmodi succos coactuari norunt, cum qui in corpore existunt ab iis facile increscant. Propagari frequentius morbum hunc per contagium aliis etiam concedunt, quandoquidem spicula cum succis corruptis effluentes per attactum, sudorem, aut linteaminum usum aliis facile communicentur; quæ poris cutis inherentes tubulorum obstructionem, & succorum cutaneorum corruptionem spe citius introducant.

*Lepre.*

Majori succorum viscidiorum copia, & particularum angularium & rigidarum, sive acidofalsarum iisdem inhaerentium adscribunt *Lepre* causam, quatenus ad unum penè omnes totius corporis tubuli & glandule ab iis obstruuntur, & sales acidi glandulis cutaneis firmius inhaerent, atque aculeis suis fibras cutaneas pungendo pruritum excitant, ad quem sedandum quando cutis scalpitur, ea jam arrosa facile dissolvitur, succique corrupti ex denudatis suis ductibus lentum effluentes superficiei adherent, & intantum augentur & indurescunt, ut levi ab attactu squamatum instat decidant, siquidem lymphæ, utpote causa eorum materialis, adeo crassa existat, & lubricis suis particulis cum spirituosius orbatæ, ut neque ad fluxum prompta existat, neque superficiei corporis firmius agglutinetur, sed particulis rigidioribus plena facile diffiliat. Antequam verò adeo indurascatur lymphæ, sed viscidior saltem in glandulis cutaneis & in specie ipsius faciei, brachiorum & coxæ hæreat, tubercula efformari in dolentia & mobilia referunt, quibus morbus hic primò se prodat, quibus cum cutis exterior satis est repleta, faucium & radices linguz tubulos viscido ejusmodi succo repleti, uti & aliarum tandem partium, atque ab acutioribus particulis fibras cutaneas erodi, ulceraque plana & lata tum in naribus, tum in aliis membris excitari, donec tota massa sanguinea corrupta sit, & succus chylosus vitiatissimus tubulos perveniat, & nullum partibus conveniens distribuatur alimentum, unde & destructis glandulis pili decidant, & è locis punctis nullus sanguis effluat, cum arteriole succo quodam viscido repletæ sint, nervi relaxentur, ut nullus sentiantur dolor, & color viduus, ob sanguinis & succi chylosi purioris defectum, deperdatur, donec arteriæ tandem & venæ coarctentur, ulcera verò nasum depascantur, & asperam arteriam occupent, vitæque finiant. Ungues etiam ob nutrimenti corruptelam istam findi, intorqueri, & ungularum brutorum in modum excrecere dicunt. Colligi verò prava illos succos in corpore profertur ex malâ victus ratione, cibis non satis coctis sed crudis, multum infumatis, salicis, alisque sædis, aëre impuro, & id genus aliis diætae aberrationibus suo loco brevi latius enumerandis.

*Impetig.*

Tenuiore verò existente lymphâ, sed ab acido in motu impeditâ, & in glandulis primò paucioribus, deinde pluribus hærente, & easdem in cute obstruente, fibrasque vellicantes *Impetiginem* suscitari referunt, cujus particula cum ab æthere materia celerius moveantur, tubera ista in superficie calida & rubicunda reddi dicunt, & cum successively lymphæ ista obstruens augeatur, tubera illa augeri, uno post aliud succrescente, & posterioribus priora in altum prementibus, ut botrum referant, donec lymphæ exsiccata, & particulas

falsis rigidioribus existentibus, cuticula dehiscat, & succi indurati squamatum decidant.

*Alphum* sive *Vitiliginem* ortum habere consent ex corrupto chylo & sanguine, qui si partim adhuc bonus existat, & in cute ejusque glandulis earumve interstitiis tum partes corruptæ spissiores, tum bonæ fluidiores & butyrosæ dispergantur, partes spissiores & ad motum pigriores cuti adherentes, sed eidem assimilari non valentes, guttas repræsentare albas, Alphi nomine notas, quæ nec asperæ sint, nec squamosæ, nec ulceratæ, nec dolentes nec fricatæ rubeant; si verò succus quidam accedat acidus, fibras & glandulas cutaneas destruens, ut radii luminare suffocentur in iisdem, coloremque fulcum præsentent, *Melas* produci inuunt, vel *Morphæam* nigram: uti si omnimodò destructis hinc inde glandulis pili decidant, & lymphæ ex diruptis suis canalibus effluens albidior coaguletur, & radii lucis incidentes immutati remittantur, *Lentem*, sive *Morphæam* albam pronalci, in qua fundiores adhuc paucæ remanentes particule pilorum progeniei insufficientes, & ad cutis superficiem delatæ ab ambiente aëre comprimantur, & prout in motu fuerunt coagulentur, sicque superficiei inhaerentes lanuginem ejusmodi, qualis mala cydonia, vel folia populi albi invellat, exhibeant.

§. 11. Eadem ferè *Scabiei* causa, me judice, est ac Erysiplatis & Herpetis suprà jam recensitæ; glandulæ enim hic æquæ ac tubuli lymphatici subcutanei obstruuntur & eroduntur, sed tamen profundiores, quàm Erysiplatis; variæ enim & hic oriuntur pustulæ, & ulcuscula, quæ prout diversæ est sanguinis humorumque inremperies, ipsius cutis diversæ textura laxior vel constriCTOR, etiam pro eorum minimis diversitatibus ratione siccitatis, humiditatis, acridinitque majoris vel minoris, figuræ, magnitudinis, vel pertinaciæ, vel quatenus cum aliis morbis conjunguntur, vel eos subsequuntur, varia sunt variisque insignita nominibus, ita ex. gr. ab usumio fructuum (licet ordinariè per contagium disseminetur,) æstivum præprimis acidulculorum, austerorum, ut uvarum, &c. obortæ in cutis tubulis intortis, angustis vel constantioribus membranosis, ut circa manus regionē, obstructions & dein erosiones pro acridinit gradu & copia conjuncta majori vel minori visciditate, vocantur *Scabies* seu *Pfora*, magis vel minus *humida* cum materia purulenta, ichorosa & sæpè ab erosis vasculiferis eruenta: vel *sicca* cum squamis vel crustis majoribus vel minoribus, pro multitudine diversorum vasculorum exesorum, materiæque visciditate, cum pruritu vel dolore ac ardore, decidentibus pustulis novæ succedunt: vel quia materia ex iis sanguini communicata aliqualem secessionem, atque hinc ob tubulorum angustiam novam obstructionem causatur: vel quatenus materia sub crustis novos erodit tubulos: cumque hæc materia aliquatenus sit tenuis, & volatilis per sudorem alterius corpori, & hinc sanguini communicata, vel lymphæ in cutis extremis existenti, talem in sanguine producit mutationem, ut sal vel acidum præcipitetur, hoc est, ut hæreat angustis in cutis tubulis, ob aëris injurias foras avolare nequeat, mox exulcerationibus se proditum; vel cum ob conjunctas viscidas particulas manibus, &c. alterius hominis facillimè adhæreat, & quasdam epidermidis vel cutis fibrillas

*Impetig. sentia de causa Scab. hinc*



fibrillas abscindendo ab iis in cincinnos resiliens retinetur citius vel tardius, pro sui tenuitate, acutis, &c. atque subjecti dispositione; vel accidentis ætæ mutatione instat fermenti succum lymphaticum in mixturâ, (qui dein sanguinem) turbando, tubulosque ejusdem erodendo, labe scabiosa est infectura. Hinc liquet, cur visciditati involuta & stagnans in cutis tubulis aliquando certum tempus requirit, antequam in æstum deducatur; adhæc cur Scabies delisse viâ vel curata ob consolidatas exulcerationes, certo revertatur tempore. Salergo acidum coagulans & obstruens est in Scabie subtilius, quam illud, ex quo & per quod furunculi generantur, & magis in superficie hæret, affectus enim hi tantum gradibus differunt, quia eadem ferè conspiciuntur phenomena, pustulæ enim scabiosæ circa furunculos æquæ apparent, ac in Scabie. Salacidum subtilius in Scabie adesse constat ex eo, quod hic affectus aliis facile per sudorem communicari possit, uti quotidiana notum est experientia, hinc facile explicari potest, quomodo Scabies aliis communicetur, non verò furunculi; supponi ergo debet, quod sudor Scabiosi manibus vel aliis corporis nostri partibus communicetur per tubulos, cujus sudoris particule fermentibiles cum lymphâ ibidem contenta ad cor mediante sanguine revelantur, ibidem appellens sanguis particulis peregrinis resectus instat fermenti exotici, necessum est ut ejusmodi viscosa sanguinis ac succorum mixtura in peculiaris genere valorum discernatur ac comprehendatur, & cum nullæ ad hanc materiam viscosam recipiendam aptiores sint, quam ipsæ glandulæ cutaneæ, qua cum his valculis in motu, ordine, & figurâ magis conveniunt, quam cum aliis. Et ut accuratius Tyrones rem hanc intelligant, supponant, 45. libras succorum cum sanguine in toto nostro corpore subsistere, & plures quam millia diversorum canaliculorum, in quibus succi vehuntur, reperi, ac quodlibet vas repleti, sique aliorum circuletur succus, propediem alio adventante succo repleti, ita ut quodlibet vas juxta suam capacitatem & magnitudinem ex communi alveo adimpleatur. Ex quibus facile ratio peti potest, cur Scabies potius in tubulis cutaneis, quam in aliis corporis partibus producat. Certum est in Scabie non semper totam massam sanguineam esse viciatam, uti vulgo à Medicis creditur, qui propterea statim confugiunt ad purgantia, cum tamen nil quicquam istis efficiant. Sunt enim plures homines Scabie infecti, quoad cætera sanissimi, potest ergo esse, quod aliquod fermentum lateat in poris cutis, quod saltem fixum in sanguine à particulis reliquis præcipitur; adeoque cura tantum est instituenda ad hunc salem per poros cutis evacuantum.

Opinio hæc nostra de causâ Scabiei non Novitatis argui debet, nuper enim incidi in Librum Jacobi Sadoletii Episcopi & Cardinalis de Laudibus Philosophiæ intus latum, & Anno Christi 1541. impressum, in quo de Scabie sequenti modo disserit: Scabies est morbus vulgaris, & omnibus notus, quem Psoam Græci vocant, nos verissime Scabiem, cum sanguis accensens parum à cute conatur erumpere, & quacumque funditur, propter acumen stimulis pungit infectis, corpus, & inficiendo pruritus acres cit, qui sunt quasi fermenta quadam, & nondum

appropinquantis doloris. Ex hisce patet, veteres Philosophos prægustum veritatis jam habuisse. Nunc pergamus ad explanandam Scabie obvenientia phenomena, & quidem pancia. Ex pruritu satis superque constat, materiam, ex qua Scabies producitur, non esse adeo crassam ac tenacem compactamque, sed quod particule volatiles facile per allisionem aliarum particularum alluentium appellantur, sed quoniam appulsio totius massæ sanguineæ nimis debilis est, hinc tantum cum miti & blando poppylinatæ allidit, à quo fibræ tantum leniter tanguntur ac pulsantur, exinde nullum oritur. Pruritus nocturni causa est calor, dum enim cooperti sumus, corpus nostrum continuò transpirat, hinc fermentatio in fucis stagnantibus oritur, & sic particule in glandulis affectis commoventur, & ejusmodi producent pruritum molestem.

Si pustulæ decidunt, aliæ regenerantur, ratio hæc est, quia ab attenuatâ pustulâ nonnullæ particule peregrinæ sanguini iterum commiscuntur, qui rursus huc delatæ eundem edunt effectum, & producent affectum. Reliqua phenomena facile explicari possunt.

Ad causas Scabiei mediatas remotiores nunc festinandum est, inter quas eminet Aer: hic nocet aer nimis nitrosus, frigidus, qui ad coagulationem succorum producendam aptus est: imprimis verò morbis æstus Autumnus, qui corporis nostri succos ad plurimos disponit morbos, præsertim ob alios fructus horarios tum temporis abundantes, nihil enim magis hoc in affectu nocet, quam abusus ejusmodi alimentorum acidorum & salinorum, de quibus & alii paragrapho de Diarâ inferius latius & fusius acturi sumus.

Si totum corpus Scabie fuerit infectum, & Causa sanguis ita inquinatus, ut per universam cutem obstructions, & hinc fetidæ continuæ exulcerationes fuerint exortæ, vel tantæ fuerint tenuitatis & acedinis, ut continuò circumvicinos aggrediendo tubulos tum erodendo, tum speciem Erysipelatis ac gangrænæ levioris introducendo, tandem per totum corpus fuerint diffusæ, ubique continua fetida crustacea & squamosa ulcera dicitur adesse Lepra, atque à similitudine, (cum adeo sæpè fuerit crustosa cutis, ut Elephantis cutem representet:) Elephantiasis, qui affectus optimo jure Cancer totius corporis, seu Gangræna omnium glandularum dici mereatur, cujus causa proxima sunt particule terrestris & viscidæ. Quæ sive sale quodam fixo & acri de indole acidorum prægnantes. Viscidæ enim ac terrestris particule peccare, præter testimonium oculorum & manuum quod easdem in sanguine demonstrat, etiam evincit pertinacitas morbi, tuberculorum & tumorum durities & tenacitas, eorumque, ut & ulcerum & quandoque totius cutis insensibilitas. Sic etiam acres & ansteræ particule, quando à crassis succis præcipitantur, nec propter rigiditatem, quæ gaudet, mandari, sive tubulis partium solidarum accommodari debite possunt, sed illis constanter infixæ hærent necessario aculeis suis, prout sc. illa magis vel minus fuerint rigida & acuta, continuum pruritum & etiam dolorem, fibrillas nimis discindendo, in mente excitare possunt. Sal etiam acidum in Leprà adesse probatur à corrosione partium carnosarum & ipsorum ossium, item à colore obscuriore & nigri-

nigricante totius corporis leproforum, & præcipue illorum sanguinis, qui similis est ei, quem spiritus acidi minerales in venas carnis vivi vel alius animalis per siphonem injecti producunt, spissum sc. & atrum, contrarium verò edunt effectum salia alcalia volatilia & fixa injecta, ut sunt ~  $\Theta$  xi, C. C. ol. Tri per deliquium, quæ sanguini infusa colorem exaltant, quod quilibet in vino experiri potest, sal enim volatile C. C. vino infusum illud intense rubescere facit. Sic quoque notabilis exstat observatio apud *Marcellum Donatum*, si ipsi fides adhibenda sit, quod sanguis ex vena sectâ Elephantias laborantis emissis ipsam congelaverit aquam.

Lepra quoque aliquam habet affinitatem cum Scorbuto, Cancro & Lue Græâ, qui affectus omnes icidem oriuntur ab acido coagulativo, quare sæpe morbi in hunc vel illum commutari solent, sed in Leprâ acidum hoc vitiosum ab humore terrestri ac viscido implicatur ac infringitur, unde nonnisi lente rodit & mediante illâ visciditate corporibus aliis tenaciùs adhæret; & volatili suo acido per contagium se propagat.

Certum enim est, cum humor iste tenax ac terrestris tum sal acidum in malsâ sanguinâ abundant, & proportionem excedant, illius mixturem non tantum pervertunt, sed & motum ejus turbant. In Leprosorum ergo sanguine ac succis particulæ sunt ad motum ineptiores, quadrate, vel ramoïse & rigide viscido inherentes, imò aliquando instar palorum inter reliquas ad motum promptiores ubique infixæ, illarum motum impediunt; imò particulæ salinæ acide cum reliquis concrecendo illas præcipitant, & instar lactis coagulant, hoc autem haud impedit, quo minus motu sanguinis ac succorum ordinario ita turbato & impedito, extraordinaria ejusdem fermentatio adesse possit, cui etiam tribuendum est, quod humor malignus, qui in profundioribus & magis abditis lateat glandulis, velut in domo Plutonis delitescat, jam interiorum victor, superficiem corporis invadat, ibique trophæa sua erigat, variis ac crudelissimis Symptomatibus conspicua. Contingit quoque simili modo, quo Pus & feculentia in musto fermentante ad latera dolii, crementa ista crassa & salia coagulata ad latera vasorum lymphaticorum ductuum glandularum excretoriorum, & Periphereiam corporis pellantur, ubi serositate adhuc excepta & diluta, minutissima etiam vala capillaria subire possunt, quâ ratione cutem & glandulas lympham filtrantes ac segregantes replent, ibi à lymphâ per poros, vel aliorum evadente, derelicta, nec ob crassitatem per poros externi nec minuta venarum oscilla cum sanguine reliquo subiugredi possunt, hærent itaque in angustis illis, & ab aliis pari modo subsequeutibus pressa, & invicem aggesta, partem in fæces atollunt tumores, ibique magis magisque exsiccata majorem acquirunt malignitatem & acrimoniam, atque erosionem ulcera excitant infamabilia, insensibiliaque.

Causæ remotiores & ansam huic affectui præbent, ut Aër, qui calidior & siccior remotè suum symbolum conferre potest, hinc Ægypto, teste etiam *Galeno*, endemius est, & in Asia, Africa & Hispaniâ frequentior est Lepra, quam nostrâ in Europâ, crebriùs tamen

occurrit in Galliâ Narbonensi & Aquitaniâ, Germaniâ item superiori, Noctet quoque Aër frigidior, qui succos incrassat viscidumque auget, vel acrior, qui particulis salinis ex terra imprægnatus, vel puris ac foetidus. Lepra & tempore Veteris Testamenti maxime communis erat, num verò fuerit à certâ acris constitutione, vel Dei punitione, id Theologis discutendum relinquamus.

Mala victus ratio ipsum morbum producere valet, vel tantum ad eum recipiendum corpus disponere potest; sub hac classe referuntur cibi pessimi, salini ac acidi, vel singularibus particulis præditi, & omnia ea, quæ chylum viscidum acidum salum & terrestrem suppeditant, ut sunt carnes ac pisces fumo indurati aut murti conditi, pisces butyro fixi, fungi, bulbi, caseus vetustior, panis fursureus aut nimis acidus, legumina nonnulla, carnes non coctæ, quibus Tartari vesici solent, hinc & Lepræ obnoxii sunt; nocent etiam cerevisiæ crassæ ac vina tartaro crasso fecunda, ulus spiritus vini & aliorum ~ tum *Ætiorum*. Somnus quoque & vigiliæ nimis, ut & quies solum afferunt Symbolum, quod etiam referri possunt Excreta & Retenta extraordinarie se habentia. Denique animi pathemata vehementiora ansam Lepræ dare possunt, quæ ceu fulmina sanguinem & succos percutiunt, & inter ea imprimis, quæ spiritus figunt, debitant eorum ex cerebro in partes subjectas emanationem, sanguisque in corde expansionem & rarefactionem impediunt, & per consequens succis crassis ac acidis plus justo augendis occasionem dant, cujusmodi sunt tristicia ac moror curæ immodicæ, &c. Contagium quoque facillimè producit hunc morbum, quod vel ab ortu, vel post nativitatem communicatur, unde Elephantias vel hæreditaria vel æstiva dicitur. Primò igitur hæreditate ad invitos etiam transeunte hoc malum possidet, alterutro Parentum vel utroque etiam semina morbosa suppeditant. Patris enim semen cum nihil aliud sit quàm chylus spiritibus alcalibus volatilifatus, illorum diatheses morbosas facillè recipere & conservare potest, nec impedit, si cum Harvæo Anglo spiritum tantum genitalem ad ovum immediate (non verò prius per totam sanguinis massam & dein ad ova delatum, prout quidam opinantur) pertingere, illudque fuscundare credamus, cum haud difficulter percipi possit, spiritum illum in universali hac totius corporis corruptione à Principiorum suorum, sanguinis, succorum ac spirituum labe plantè immunes esse non posse, sed miasmatis, seu particulis nonnullis exoticis, characterem affectus continentibus necessariò confurcatum existere, debere, quæ cum istar fermenti venenati se habeant, teneras ovuli partes facillè in indolem suam deflectere possunt, & tubulos succosque ita disponere, ut eidem labe infans afficiatur. Mater quoque, quæ in opere hoc generationis haud omnino se passivè habet, ut Veteres somniant, suum addit symbolum, dum præter ovum, ceu primam sortis materiam, nutrimentum etiam illi in utero suppeditat, succum nempe chylosum, nequitiam autem sanguinem menstruatim aliàs excreti solitum, prout Arabes fabulantur.

Sic



Sic & post natiuitatem contagium hujus morbi suscipitur, non duntaxat per leprosum, aut rerum, quibus uti sunt, contactum, sed & per halitus tum ex toto eorum corpore & glandularum poris, tum imprimis ex ipsis ulceribus sordidis in aërem sparios, & cum eo per tubulos corporis subeuntes, & sanguineæ massæ communicatos, eandemque prodncentes mixturam sanguinis ac succorum. Lepra etiam per coitum communicatur, item per oscula, lintea, vestes, pocula, &c. per hæc enim subtilior veneni hujus pars per fermentationem abstrahitur, & leni alicui viscositati involuta, poris cutis se insinuat, & secundum ductum vasculorum illius excretoriorum in glandulas, & hinc mediantelymphâ in sanguinem defertur, quem paulatim vi fermentativa in indolem suam convertit & degenerare facit.

Causa im-  
petiginis,  
Alphi &  
Leuce.

Ulcuscula verò in *Impetigine* nec ut in Lepra contagiosa sunt, nec ab externâ causâ contagiosa oriuntur, sed à sanguinis & succorum certâ dyscrasiâ seu iustemperie introductâ, vel ab erroribus in Diætâ, vel à morborum quorundam non ritè curatorum reliquiis, ut scorbuti, luis Græcæ, &c. vel à parentibus traductâ, eûm qualis parentum sit sanguinis & humorum mixtura, talis per semen propagetur, & per alimentum factui communicetur: porro nec ita ut in Lepra, (saltem non ordinario, si gravissimam speciem exceperis,) per universam cutem diffusa sunt, sed tantum hanc vel illam, vel aliquas corporis partes obidet *Impetigo*, cujus materia ichorosa ex officio vasorum expulsa tenuibus vel aquosis particulis, ab aëre vel corporis calore, vel ætheris celeriori (ob præsens Erysipelas) transfluxu, &c. fugatis, diversimodè citius vel tardius concrevit varias in squamulas, prout unus vel plures tubuli glandulæ unius miliaris erosi transmittunt copiosius vel parcius chyli portionem resinosam, viscidam magis vel minus acutioribus salis, vel acidis, vel humidis permixtam, si autem capillaria sanguinem ad vel à singulis glandulis vehentia, pluresque glandularum plurius vasorumque tubuli fuerint erosi, simul copiosiorum fundunt materiam in varias transformandam crustas.

Sic quoque sal istud in tubulis cutaneis hærens, cum humoribus serosis ibidem existentibus aliam efficiunt texturam, ita ut pustulæ nigro tingantur colore, quia particula hæc salinæ ob densiorem cuticulam stagnantes, è poris cutis erumpentes sub cuticula expanduntur, & cuti suppositæ applicantur, illiusque colorem immutant, & sic oritur *Alphus*.

Quod si simul sal istud acre contingat ad glandulas minutissimas pilosas, easque acutioria sua erodat, ne pilæ exeant & decidant, oritur *Afectus Leuce* dictus. Affectus enim hi parùm inter se ratione causæ differunt.

Prognosis.

§. II. Sequuntur ordine horum affectuum *Signa Prognostica*, & primò *Scabiei*. Scabies non tam periculosa, quàm molesta est, nec per se lethalis existit, nisi in curatione error committatur, retropulla enim pelora sæpe producit symptomata, imò in infantibus & pueris nonnunquam ipsam mortem, sic observavi palpitationem cordis, anxietates, Epilepsiam, tullim convulsivam, convulsiones, diarrhæas, Apoplexiam, aliaque mala exinde producta: sic quoque in filia decem annorum à Scabie retropulla

saltem sancti Viti, seu saltationem convulsivam vidi. Aliquando pectoris dolores, & catarrhi suffocativi ex Scabie retropulla in praxi nostra quotidie animadvertimus. Bona aliquando est Scabies, ut *signum*, quatenus sanguis liberatur ab impuritatibus, & segregatur in glandulis: mala verò est ut *causa*, quatenus abundante ejusmodi salinas fixas particulas in M. S. ac reliquis succis denotat, quæ cutim diversimodè deicunt: pessima quoque Scabies est, si caput obideat. Quò plures occupat partes, (universalis quali,) eò pejor, quò sordius exasperat, eò deterior. Scabies ergò quo asperior est & magis prurit, eo partes afficit, eò difficilius tollitur. Scabies quæ in ulcera imprimis pedum transit, curata difficillima est. Scabies *sicca* difficilius quam *humida* curatur. Neglectum hoc malum facili morte in *Impetiginem*, *Lepram* & *Elephantiasin* nonnunquam incurabilem transit.

Omnis verò Scabies est maligna & contagiosa, hinc & sæpius multum in cura facessit negotii, quia quamvis cætera salva sint in corpore, superficialium tamen tubulorum & vasculorum cutaneorum tanta est obstructio, ut sæpius quò magis sadent Scabiosi, eò magis in cutem deiscuntur.

*Elephantiasin* incipientem tanquam monstrum in incurabilis haud difficile curari, sed ubi jam altas egerit radices, vestigiis violentius cuti impressis, rem multo jam difficiliorem & periculosiorem esse notum est, quamvis ipse omnem curationis necdum abicere debeat, sed quando ad summum malignitatis acumen adscenderit, insanabilem plane esse, prout etiam quæ hæreditaria est, quæ nunquam in totum extirpari potest, cum ejus principia primus partus flammis combinata, ac tunc nimis partibus adhaereant: unde hos & confirmatos *Elephantiacos* & *Leprosos* spem curationis abicere jubemus, eosque quemadmodum olim Veteres mortuos suos Deus subterraneis consecrandos judicant. Huic & in nostrâ Germania ejusmodi leprosi propriis ædibus in viâ Regiæ extra civitatem extructis inhabitare solent, ut melius extra confortiorum aliorum hominum vivere, & Eleemosynam à transeuntibus petere queant. Morbus enim est valde contagiosus.

*Prognosis Impetiginis, Alphi, & Leuce* magis vel minus est periculosa & curata difficilior, prout ipsa causa, videlicet acredo vel crassities, fuerit major vel minor, vel prout combinati fuerint cum aliis morbis; si introsum vergunt, periculum indicant maximum, aliàs quantum indicant materiam peccantem propter fermentationes sufficientes posse ad circumferentiam corporis expelli, bonum exhibent signum. Omnes verò hi dicti morbi contagiosi sunt & attractu halitque in alios transferri possunt:

§. 12. Multum sanè ponderis ad felicem affectuum horum atroxissimorum curationem situm est in congruâ ac legitimâ Diætâ, quæ id quandoque præstat, quod Medicamenta nequeunt, imò pluribus uerbis fomes quati præcindi potest. Aër ergò sit ante omnia purus, saluber & lucidus, Euro persilabilis, multo æthere refertus, vitetur omnis aër fœtidus, crassius, turbidus ac nimis frigidus, ut & pravis nebulis atomisque conspurcatus. Alimenta sint boni succi, & facili digestionis, carnes animalium juniorum, avicularum, vel vervecinæ, vitulinæ, jussculisque incoquantur herbæ aromaticæ, su-

Bbbb 3 giantur

Siantur nimis salæ, acres, fumo induratz, & carnes crudæ, &c.

Potus sit hic imprimis calidus Theriæ vel Coffeæ cum decocto lignorum paratus, quo solo potu plures vidimus curatos. Cerevita tenuis probe defæcata & aromaticis condita, ut sunt radices Enulæ, herba scolopendr. fumar. cort. Guaiac. citri, &c. vina acida Rhenana, Franco-nica, Neccarina, Mosellana, Baeccharacensia, quæ omnia in se continent acidum sal fixum, maximè noxia existunt. Concedi verò potest Gallicum, Hispanicum, Scag. dictum.

Morus sit modicus & deambulationes præsertim post pastum institutz. Quicquid stilia & vita sedentaria sæpe nocet, hinc interdicienda est, quia inde tenax ac viscidus producit sanguis. Alvus respondeat spontè, vel artis beneficio ad officium redigatur.

Venus nullo modo concedenda, chylus enim optimus cum spiritibus planè his absuitur, tunc in tubulis remanet duntaxat sal fixum ac acre viscido inhaerens obstructusque. Sunt, qui statim post coitum in deliquium animi incidunt, ceu nos quædam novimus exempla. Excerenda omnia iusto tempore reddantur, ne obstructu sanguini ac succis nostris coagulationem afferant.

Animi passionibus vitentur, ira & indignatio ad sanæ rationis continenti mensuranda sunt, Medicus animam acri merori & tristitiæ deditum certâ curationis spe solet ac demulceat.

*Galenicorum cura in Scabie.*

§. 13. *Galenicus* quoad *Scabiæ* curam, à purgatione tempus initium ducunt, & sunt ex iis qui purgantibus præmittunt præparantia humores, ex herbis fumar. endiv. cicchor. borrag. lupul. Epithymalisque parata, & in sero lactis caprini ad tertiam partem conflantur decocta & dein edulcorata. Pro purgatione commendant omnia melanagoga phlegmagogis mixta, ut sunt massa pilular. de summo terre, extir. agac. coeliar. pulv. Syrius. Prius etiam sanguinem educunt, postea exuberantem humorem, ubi antea cum extenuarunt & concoxerunt, exhibitus potionibus inectus obstructione liberantibus, Medicamentis purgantibus expellunt, ac demum ad prædida, quæ loco affecto accommodata accedunt.

Inunctionibus exsiccantibus & discutientibus summae entis inhaerentes humores digerunt ac evacuant. Balnea prodesse dicunt, ea maximè, quæ sua sponte prorumpunt & nitrum ac sulphur, & eiusmodi aliam qualitatem recipiunt, quæ abundè exsiccare & dissipare credunt, post quæ convenientia innumeraque unguenta, linimenta præscribunt, ex. gr.

℞. Salina.

℥ i. 4. Aethiop. lachryma aa. 3℔.

Cori. rad. capparis,

Gummia aa. 3viil.

benè trita coq. cum aceto & oleo q. s. confectumque inung. crebrò in Sole.

℞. Succis rad. asphodeli 3viil.

Sulphuris ignem non experti,

Alumina aa. 3v.

Nitri 3℔.

M. Trita madefaciunt cum aceto acerrimo, ut in succum solvantur, & crebrò illinunt.

℞. Colophon. arid.

Pingued. bovii & gallin.

Ol. laurin.

Sulph. ignem non experti.

Cera pura

Resin. Terebinth. aa. 3℔.

Subacta fervefaciunt cum oleo rosaceo, & illinunt in Sole. Sequentem illinitionem admodum mirabilem in Scabie dicunt.

℞. Lauri amara folior. tenerum 3ij.

Benè trita coq. cum oleo communi ad tertias, dein colant, & species abijiciunt oleo, atque admiscunt

Cera alba 3ij.

& elixant, quoad dissolvantur, postea insperg.

Sulphuris ignem non experti, triti 3j.

benè confectum illinunt in Sole,

Vel:

℞. Succis squille 3ij.

Cera pura 3ij.

Oleis rosaceis 3iv.

lithargyr.

Cerniss. aa. 3ij.

picis liquidi 1℔℔.

heliosmatis, seu scorie argenti Syriaci aa. 3ij.

Trita irrigant cum aceto, & cocta ad consistentiam illinunt in Sole frequenter.

Sequentem quoque illinitionem Scabiei admodum esse probatam scribunt.

℞. Farinae ervina

lupinorum.

sanguis aa. 3ij.

cicer. nigr. 3j.

Trita excip. cum melle, & confecta illinunt in Balneo.

Ova decem in aceto acerrimo macerant, quoad omnis ipsorum tella marcescat & mollescat. Dein coquant cum rosaceo, & aceto levigatis adjiciunt lithargyr. 3℔.

Sed quis quælo hæc omnia describat?

In sicca verò Scabie commendant seq.

℞. Cerniss.

amylis

rad. anchuse aa. Mj.

Cera

olei aa. 3ij.

M.

Si verò Scabies est humida, sequens laudant.

℞. Ol. rosac.

laurin. aa. 3j.

Pulv. Nitri

sulphuris aa. 3j.

Syrac. 3℔.

M. F. linimentum.

Lepram seu Elephantiasin confirmatam, & in Leprosas altas agentem radices, & quidem exulceratam, tantquam Cancrum totius corporis incurabilem phantasma esse contendunt, ubi verò in principio est affectio, ut neque aliqua partium decidat, neque ulcerata sit cutis superficialis, neque etiam tumidae eminentiæ plurimum insurgant, verum turpis solum sit facies, ita tamen, ut non valde indecorum aspectum præferat, curaretur tantum. Non pauci per solam capitis unctionem, plerosque qui ita inceperunt, prohibere conantur, ne ab affectione superarentur. Statim igitur incipientem morbo venæ sectione ununtur, cum repetita sanguinis detractione, atque hoc magis in vere, quam do maxime & gignitur affectio & exacerbatur. Paucis autem interpositis diebus, novem aut decem, purgant ipsos pulve ex colocynthide, non una vice, sed sæpe, juxta rationem Medicamen-

ti dosim adaugent. Purgationem quoque ex hiera iis commodam esse dicunt.

Rursus autem diebus circiter 10. interiectis, serum lactis scilicet ipsi sument. Sequentibus vero diebus lactem non scilicet, aut recens multo aegros alunt, purgationem ex veratro albo bis vere, autumno vero semel instituunt. Materiam peccantem ad ventrem ac intestina deducunt, & ex alto evacuantibus ac transferentibus humores utuntur, siccant ac adstringunt cutem. Leves igitur cucurbitas ad os ventriculi, & ad præcordia affigunt, & iisdem quoque partibus dropaces adhibent. Pauce autem tempore interposito rursus reflectendum esse ajunt, initio à purgatione per hieram sumpto, omnia venæsectione, ex quâ majus detrimentum, quàm utilitatem ullam futuram esse perhibent. Dein ad specifica transiunt & potiones sequentes plures laudant.

℞. Aceti cyath. N. j.

cedria

succ. brassic. crud. cyath. aa. N. ij.

Mixta hæc dant manè & vesperti.

Vel exhibent pulv. folior. Sideritidis herbæ ad 3j. in vini cyatho uno: aut C. C. 3j. & aceti scilicet cyathi mensuram bibendam præbent quotidie post matutinam deambulationem, aut sequens Electuarium.

℞. Scilla affusa 3v.

Mell. q. s.

M. ad formam eclegmatis.

Aut exhibent succi eyrenacici ervi magnitudinem melle & butyro dilutam, aut ramenti eboris drachmæ dimidium cum vini cyathis duobus, aut cumini Æthiopici drachmas tres cum melle velut eclegma. Præ omnibus autem hoc in morbo efficacem esse dicunt Theriacam ex viperis, & potam, & forinsecus illitam. Si verò habere possint ipsa animalcula, nihil adeo efficax esse, velut viperarum carnes coctas comestas ex albo jure, factâ cocturâ per aquam copiosorem, & sale, & porrum, & anethum usque ad spinarum separationem, abscessis prius capitibus ac caudis ipsarum, ad digitorum quatuor mensuram, exemptis etiam intraneis ipsarum, pelleque detractâ. Quo remedio ut plurimum in Galliâ & Italia Medici moderni uti solent in morbis ferè omnibus desperatis, & in iusculis viperas vivas etiam decoquant aegrisque propinant manè & vesperti. Quin & Theriaci sales idem præstare ipsi censentur, cum obsoniis sumti: si enim ipsi utantur, squamas veluti corticem quandam de cute ipsorum discedere promittunt. Ceterum post curationem intrinsecam Smegmatis in balneo utuntur ex decocto betæ aut sennigræci cum aphronitro, aut sapone, aut myrobalano, & quandoque etiam psilochris. Detergere etiam dicunt portulacani cum aceto tritam, & stenus sempervivum, & rumicis radices aceto coctas, & alumen cum sale & sandarachâ, æquis portionibus in vino & oleo lentisco: & id quod ex aleyonio, nitro, sulphure, & myrti foliis paratur, cum aceto tritum & illitum, & quod ex sepiæ testâ ustâ, & pumice, nitro, cimoliâ tostâ, gummi & gallâ omphacinâ, paribus partibus parant, siccum inspersum aut cum aceto affricum. Sed etiam sequens mirificè juvare credunt.

℞. Radic. Rumicis Mj.

Nitri 3Lx.

Thuris 3xxx.

Sulphur. 3xxij.

Cum aceto Ægyptio illinunt.

Efficax esse etiam sequens perhibent.

℞. Auripigmenti 3x.

Sulphuris viv. 3viii.

Costi 3xij.

Calcei viv. 3iv.

Cera 3v.

baccar. Lauri aridar. 3xij.

Hæc omnia populi foliorum succo aut crasso decocto subigunt, & mellis spissitudinem habentia illinunt.

Cataplasma enim imponunt, si tumida eminentiæ aut inflammata, aut exulcerata fuerint, quod parant ex alicâ cum succo polygoni aut plantaginis, aut helxinæ tritâ; sed & milisæ herbæ viridis folia cum axungia usâ ad imposita mirificè opitulati perhibent. Exulceratis autem partibus imponunt Emplastrâ varia, id quod ex diaphryge paratur, & Melinum ex vino, & coriacium, & quod sit ex aceto mulso. Pastillus etiam Andronius & pompholyx & cadmia illis prædicantur. Ceterum ad spirandi difficultatem in elephantiacis assellos sub vasâ aquariis quinque aut sex ex aquæ mulis cyathis tribus bibendos præbent. Aquarum verò naturalium usum velut maximè necessarium eligunt, aluminolarum præsertim & ferrolarum, & si fieri potest, frigidarum. Conferre etiam ipsis eandem in potu annuunt, eandemque vim habere etiam arenæ marinæ usum, & omnia exudatoria ac sudorifica. Habitationes ipsorum Elephantiacorum quàm longissimè removendas esse ab urbibus, & in mediterraneis ac frigidis locis statuendas esse asserunt.

Lepra Medicinam facientes Galenicis venæsectionem primùm instituunt, si corpus humorum copia redundare vident, sin minus omnino tamen purgationem per ea, quæ atram bilem evacuant, præscribunt. Forinsecus autem utuntur in communi quidem veratro utroque, & calce locâ in usum sicca seposita, usu verò expeperente aquam diluentem strigenti spissitudine illinunt.

℞. Salvia

Olea Æthiopica lachr. aa. 3viii.

Cort. rad. capparis

Gummi aa. 3xiiij.

F. Linimentum, quod illinunt cum aceto in sole.

Leptas autem privatim removere ajunt anemonas appostas, radicem vitis albæ, compostam verò hanc farinæ loliaceæ chenocem, cardamomi albi drachm. 4. spumæ nitri drachm. j. atramenti sutorii drachm. 8. asphodeli radices medix drachm. 4. terunt in aceto & cerati crassitudine illinunt, loco ex nitro preparato.

℞. Radic. asphodel. 3vj.

Sulphur. vivis

Manna aa. 3x.

Nitri 3viii.

aceto diluta illinunt.

Præteritis cum aceto vitellis & sulphuri cera tum adjuvant. Quin & argenti spuma cum aceto & rosaceo trita, ut emplastri formam accipiat, Lepram depurgant. Sed & ex lapatho smegmata, & pleraque ad Elephantiacos descripta, in communi etiam ad lepras & Scabiem contumaciorum facere ajunt.

Alph

Siantur nimis salsæ, acres, fumo induratz, & carnes crudz, &c.

Potus sit hic imprimis calidus Theræ vel Cofæ cum decocto lignorum paratus, quo solo potu plures vidimus curatos. Cerevilia tenuis probè deficcata & aromaticis condita, ut sunt radices Enulæ, herbæ scolopendr. fumar. cort. Guajac. citri, &c. vina acida Rhenana, Franco-nica, Neccarina, Mosellana, Baceharacensia, quæ omnia in se continent acidum sal fixum, maxime noxia existunt. Concedi verò potest Gallicum, Hispanicum, Seq. dictum.

Morus sit modicus & deambulationes præfer-tim post pastum institutz. Quies in aia & vi-ta sedentaria sæpe nocet, hinc interdicienda est, quia inde tenax ac viscidus producit sanguis. Alvus respondeat spontè, vel artis beneficio ad officium redigatur.

Venus nullo modo concedenda, chylus enim optimus cum spiritibus plantis his absumitur, tunc in tubulis remanet dumtaxat sal fixum ac acre viscido in hærens obstruensque. Sunt, qui statim post coitum in deliquium animi incidunt, ceu nos quædam novimus exempla. Excer-enda omnia iusto tempore reddantur, ne ob-struendo sanguini ac succis nostris coagulationem afferant.

Animi passiones vitentur, ira & indignatio ad sanæ rationis crutnam mensuranda sunt, Medi-cus animum ægri merori & tristitiæ deditum certâ curationis spe soletur ac demulceat.

*Galenicum cura in Scabie.*

§. 13. *Galenicus* quoad Scabie curam, à purga-tione semper initium ducunt, & sunt ex iis qui purgantibus præmittunt preparantia humores, ex hietbis fumar. endiv. cicior. borrag. lupul. Epithymalisque parata, & in sero lactis capri-ni ad tertie partis continuationem decocta & dein edulcorata. Pro purgatione commendant omnia melanagoga phlegmagogis mixta, ut sunt massa pilular. de luno terre, exit. agar. cochiar. pulv. Syrius. Prius etiam sanguinem educunt, postea exuberantem humorem, ubi antea eum exte-nuarent & concoxerunt, exhibitis potionibus in eatu obstruktionem liberantibus, Medicamen-tis purgantibus expellunt, ac demum ad præsi-dia, quæ loco affecto accommodata accedunt.

Intunctionibus exsiccantibus & discutientibus summe cuti in hærentes humores digerunt ac evaquant. Balnea prodesse dicunt, ea maxime, quæ sua sponte prorumpunt & nitrum ac sul-phur, & eiusmodi aliam qualitatem recipiunt, quæ abundè exsiccare & dissipare credunt, post quæ convenientia innumeraque unguenta, lini-menta que præstebunt, ex. gr.

℞. *Silvia.*  
Oli. *Aethiop. lachryma* aa. ʒʒ.  
Cort. rad. *capparis*,  
Gummi aa. ʒviib.

benè trita coq. cum aceto & oleo q. s. conse-ctumque inung. crebro in Sole.

℞. *Succi* rad. *asphodeli* ʒivb.  
Sulphuris ignem non experti,  
Manna aa. ʒv.  
Nitri ʒb.

M. Trita madefaciunt cum aceto acerrimo, ut in succum solvantur, & crebro illinunt.

℞. *Colophon. arid.*  
Pingued. *ovis & gallin.*  
O. *laurin.*  
Sulph. ignem non experti.

*Cera pura*  
Resin. *Terebinth.* aa. ʒb.

Subacta fervefaciunt cum oleo rosaceo, & illi-nunt in Sole. Sequentem illinationem admo-dum mirabilem in Scabie dicunt.

℞. *Lauri amara folior. tenerum* ʒij.  
Benè trita coq. cum oleo communi ad ter-tias, dein colant, & species abijciunt oleo, atque admiscunt

*Cera alba* ʒij.  
& elixant, quoad dissolvantur, postea insperg.

Sulphuris ignem non experti, triti ʒj.  
bene confectum illinunt in Sole,

Vel:  
℞. *Succi squilla* ʒij.  
*Cera pura* ʒij.  
Olei rosacei ʒiv.  
lithargyr.  
ceruss. aa. ʒij.  
picis liquid. lbʒ.  
heliosmatis, seu scoriz argenti Syriaci aa. ʒij.

Trita irrigant cum aceto, & cocta ad con-sistentiam illinunt in Sole frequenter.

Sequentem quoque illinationem Scabiei admo-dum esse probatam scribunt.

℞. *Farina eervina*  
lupinorum.  
sævigrae aa. ʒij.  
cicer, nigr. ʒj.

Trita excip. cum melle, & confecta illi-nunt in Balneo.

Ova decem in aceto acerrimo macerant, quoad omnis ipsorum testa marcescat & mollescat. Dein coquant cum rosaceo, & aceto levigatis adijciunt lithargyr. ʒb.

Sed quisquæ hæc omnia describat?

In sicca verò Scabie commendant seq.

℞. *Cerniss.*  
amyli  
rad. *anchuse* aa. Mj.  
*Cera*  
elcti aa. ʒij.  
M.

Si verò Scabies est humida, sequens laudant,

℞. *Ol. rosac.*  
laurin. aa. ʒj.  
Pulv. *Nitri*  
sulphuris aa. ʒj.  
Syrac. ʒb.  
M. F. linimentum.

*Lepra seu Elephantiasis* confirmatam, & in *Lepra*, altas agentem radices, & quidem exulceratam seu ul-tanquam Cancrum totius corporis incurabilem phantia, esse contendunt, ubi verò in principio est affec-tio, ut neque aliqua partium decidat, neque ulcerata sit cutis superficies, neque etiam tumi-dæ eminentiæ plurimum insurgant, verum tunc-pis solum sit facies, ita tamen, ut non valde inde-corum aspectum præferat, curare tentant. Non pauci per solam capitis unctionem, plerosque qui ita incepterunt, prohibere conantur, ne ab affec-tione superarentur. Statim igitur incipientia morbo venesectione utuntur, cum repetita san-guinis detractione, atque hoc magis in vere, quan-do maxime & gignitur affectio & exacerbatur. Paucis autem interpositis diebus, novem aut de-cem, purgant ipsos pulve ex colocynthide, non una vice, sed sæpe, juxta rationem Medicamen-ti do-

ti dosin adaugent. Purgationem quoque ex hiera iis commodam esse dicunt.

Rursus autem diebus circiter 10. interjectis, serum lactis scilicet ipsi dant. Sequentibus vero diebus lacte non scillo, aut recens multo aegros alunt, purgationem ex veratro albo bis vere, autumno vero semel instituunt. Materiam peccantem ad ventrem ac intestina deducunt, & ex alto evacuantiis ac transferentibus humores utuntur, siccant ac adstringunt cutem. Leves igitur cucurbitas ad os ventriculi, & ad præcordia affigunt, & iisdem quoque partibus dropaces adhibent. Paucos autem tempore interposito cursus reflectendum esse ajunt, initio à purgatione per hieram simplo, omnia venesectione, ex qua majus detrimentum, quàm utilitatem illam futuram esse perhibent. Dein ad specifica transiunt & potiones sequentes plures laudant.

℞. Aceti cyath. N. j.

castra

succ. brassicæ. erud. cyath. aa. N. ij.

Mixta hæc dant manè & vespere.

Vel exhibent pulv. folior. Sideritidis herbæ ad 3j. in vini cyatho uno: aut C. C. 3j. & aceti scillit. cyathi mensuram bibendam præbent quotidie post matutinam deambulationem, aut sequens Electuarium.

℞. Scillæ assuæ 3v.

Mell. q. s.

M. ad formam eclegmatis.

Aut exhibent succi eyreici ervi magnitudinem melle & butyro dilutam, aut ramenti eboris drachmæ dimidiam cum vini cyathis duobus, aut cumini Æthiopici drachmas tres cum melle velut eclegma. Præ omnibus autem hoc in morbo efficacem esse dicunt Theriacam ex viperis, & potam, & forinsecus illitam. Si vero habere possunt ipsa animalcula, nihil adeo efficax esse, velut viperarum carnes coctas comestas ex albo jure, factâ cocturâ per aquam copiosiore, & salem, & porrum, & anethum usque ad spinarum separationem, abscissis prius capitibus ac caudis ipsarum, ad digitorum quatuor mensuram, exemptis etiam intraneis ipsarum, pelleque detractâ. Quo remedio ut plurimum in Galliâ & Italia Medici moderni uti solent in morbis ferè omnibus desperatis, & in iusculis viperas vivas etiam decoquunt ægrisque propinant manè & vespere. Quin & Theriaci sales idem præstare ipsis censentur, cum obsoniis sunt: si enim ipsi utantur, squamas veluti corticem quandam de cute ipsorum discedere promittunt. Cæterum post curationem intrinsecam Smegmatis in balneo utuntur ex decocto betæ aut sænigræci cum aphronitro, aut sapone, aut myrobalano, & quandoque etiam phloethris. Detergere etiam dicunt portulacum cum aceto tritam, & stenus sempervivum, & rumicis radices aceto coctas, & alumen cum sale & sandarachâ, æquis portionibus in vino & oleo lentiscino: & id quod ex alcyonio, nitro, sulphure, & myrti foliis paratur, cum aceto tritum & illitum, & quod ex sepiæ testâ usâ, & pumice, nitro, citrullâ tostâ, gummi & galli omphacinâ, paribus partibus parant, siccum inspersum aut cum aceto affricum. Sed etiam sequens mirificè juvare credunt.

℞. Radic. Rumicis Mj.

Nitri 3Lx.

Thuris 3xxv.

Sulphur. 3xxij.

Cum aceto Ægyptio illinunt.

Efficax esse etiam sequens perhibent.

℞. Auripigmenti 3x.

Sulphuris viv. 3viij.

Costi 3xij.

Calci viv. 3iv.

Cera 3v.

baccar. lauri aridar. 3xij.

Hæc omnia populi foliorum succo aut crasso decocto subigunt, & mellis spissitudinem habentis illinunt.

Cataplasma enim imponunt, si tumidæ eminentiæ aut inflammatæ, aut exulceratæ fuerint, quod parant ex alicâ cum succo polygoni aut plantaginis, aut helixinæ tritâ; sed & milisæ herbæ viridis folia cum axungia tusa ac imposita mirificè opitulati perhibent. Exulceratis autem partibus imponunt Emplastrâ varia, id quod ex diaphryge paratur, & Melinum ex vino, & coriacium, & quod fit ex aceto mulso. Pastillus etiam Andronius & pompholyx & cadmia illis prædicantur. Cæterum ad spirandi difficultatem in elephantiacis asellos sub vasis aquarii quinque aut sex ex aquæ mulis cyathis tribus bibendos præbent. Aquarum verò naturalium usum velut maxime necessarium eligunt, aluminolarum præsertim & ferrosarum, & si fieri potest, frigidarum. Conferre etiam ipsis easdem in potu annuunt, eandemque vim habere etiam arenæ marinæ usum, & omnia exudatoria ac sudorifica. Habitationes ipsorum Elephantiacorum quàm longissimè removendas esse ab urbibus, & in mediterraneis ac frigidis locis statuendas esse asserunt.

Lepra Medicinam facientes Galenici venesectionem primùm instituunt, si corpus humorum copia redundare vident, sin minus omnino tamen purgationem per ea, quæ atram bilem evacuant, præscribunt. Forinsecus autem utuntur in communi quidem veratro utroque, & calce lotâ in ulum sicca seposita, usum verò expetente aquam diluentem strigenti spissitudinem illinunt.

℞. Salvia

Olea Æthiopicæ lactis. aa. 3viij.

Cori. rad. capparis

Gummi aa. 3xij.

F. Linimentum, quod illinunt cum aceto in sole.

Lepras autem privatim removere ajunt anemonas appostas, radicem vitis albæ, compostam verò hanc farinæ loliacæ chemicæ, cardamomi albi drachm. 4. spumæ nitri drachm. j. atramenti futorii drachm. 8. alphodeli radices mediz drachm. 4. terunt in aceto & cerati crassitudine illinunt, loco ex nitro preparato.

℞. Radic. alphodel. 3vj.

Sulphur. viv.

Manna aa. 3x.

Nitri 3viij.

aceto diluto illinunt.

Præteritis cum aceto vitellis & sulphuri ceratum adjiciunt. Quin & argenti spuma cum aceto & rosaceo trita, ut emplastri formam accipiat, Lepram depurgant. Sed & ex lapatho smegmata, & pleraque ad Elephantiacos descripta, in communi etiam ad lepras & Scabiem contumaciorum facere ajunt.

Alph



*In Alphe.* Alphi eurationem sequenti medicamine peragi pronuntiant Veteres.

℞. *Aluminis scissilis* ʒij.

*Nitri* ʒiv.

*Myrrine aride contriv.* ʒvj.

*M.* dein in balneo super Alphum inspergunt farinam ex faba.

Incidunt etiam cutem nonnunquam, & materiam intus contentam eximere tentant.

Illos vero *Alphos*, quos *Melanas* vocant, sanant, quum simul contrita sunt alcyonium, thus, ordeum, & fabana sine oleo, in balneo ante sudorem inspergunt, tum genus id vitiliginis desfricant.

*In Impetigib.* In *Impetiginibus* Medicamenta vehementer siccantia commendant, proinde post totius corporis evacuationem simplicia ipsis competere ajunt, ut sunt ciccr, veratrum, erinaceus in petris degens, pix cerato ac resinae admixta, crocodili terrestris sterces & sturnorum, ubi solam otyzam ederunt. Multi vero hoc solo *Impetigines* in mento aut etiam alibi curare satagunt: Triticum multum incindi ferventi imponunt, & defluentem ex ipso liquorem adhuc calidum *Impetigini* illinunt, ac puerorum *Impetigines* saliva hominis affidine confricant; ad has etiam facere dicunt pruni gummi illitum. Inveterata vero *Impetigini* Vitis folia trita cum aceto imponunt, aut eodem modocapparis folia. Composita vero hæc, ut sulphur cum thure aut cum ammoniaco aceto dilutum illinunt, sicuti etiam Pastillos plures in eum finem componunt, ut sunt sequentes.

℞. *Sulph. viv.*

*Summe nitri* aa. ʒß.

*canchryos* ʒj.

*Terrum cum aceto, & partem affectam illinunt.*

Vel:

℞. *Veratri alb.* ʒj.

*farin. lupinorum,*

*buccinorum usorum,*

*nitri* aa. ʒij.

*M.* illinunt & affricant.

Ad fortiora sæpe confugiunt levioribus nihil juvantibus.

℞. *picis*  
*rad. helleb. alb. tris.*

*ol. rosar.* aa. p. æq.

*M. f. l. a. unguentum molle.*

Ad Excoriantia quandoque deveniunt, ut est applicatio folii picis & violenta ejus detractio.

Vel:

℞. *Avis uss.*

*sol. viticis,*

*liharogr.*

*nitri* aa. ʒj.

*sulphuris viv.*

*rad. Veratri alb.* aa. ʒß.

*arginis* ʒij.

Terantur omnia leparatim, c. f. q. olei rosacei & ceræ citrin. f. linimentum, quo remoto mundificant unguento viridi vel Apostolorum, deinde ad cicatrizandum imponunt ungu. de tutia, vel de minio, vel Empl. de lapide calaminari.

*In Leuce.*

*Leuces* Carationem Veterum quod attinet, hi non omnem Leucem dicunt curabilem, sed dignationes ipsius tales habent. Leucem in superficie non ultra cutem perungunt, &c, si quidem sanguis fluxerit, curam recipere ajunt:

si vero humor lacteus effluat, incurabilem esse pronunciant. Quidam igitur unctionem perfectum in Leuce probant, & alia, quæ per ad unctionis modum solum adhibent: alii vero & ex unctione dolorem, & ex hæc cicatricem veriti, quæ non minus quam ipsa *Leuce* decorem vitæ ret, crustam inducentibus Medicamentis utuntur, qualia etiam concolorem cicatricem efficere tradunt: alii etiam horum difficultatem reprobantes, Tincturas adhibent, & sequentibus compositionibus uti solent:

℞. *Adarces,*

*Canchryos,*

*Sulphuris vivi* aa. p. æq.

Singula tula ac cribrata forsum, dein cum aceto simul ad multos dies lavigata in Sole illinunt. Progreßu vero temporis adjuiciunt parum quid de veratro & de galla.

Fici nigrae virgulta aceto macerata, & lavigatis aphonitrici, sulphuris vivi, myricæ fructus, singulorum æquales portiones admiscunt, & nitro prædictis illinunt, ac insolant, cavendo ne exulcerentur. Alii calce vivâ sufficiens ad fici folia admixta utuntur & ubi desfricaveris, inquirunt, Leucas veratro albo, donec exsudarint, reliquo corpori concolores fient, quæ de causa etiam sinopide aut meliade terræ easdem illinunt, aut acubus simul innitentibus perpunctione factâ, donec erorem fundant, sinopide cum aceto illinunt, aut prædictas fici succo recentis illinunt, & folia ipsius aliquantum confricant.

§. 14. *Paracelsus* in Scabie abstinendum esse *Paracelsi* ait à potionibus, digestionibus, purgationibus, *Scabie* à diaphoreticis, ab exiccatis & morbillorum unguentis, sequentia vero in Scabie curâ commendant.

℞. *Aluminis rupei* lbj.

*aluminis Armenis* lbß.

*F. Mixtura pro Scabie.*

℞. *Aluminis plumosi*

*Entalis* aa. lbj.

*F. Mixtura pro pruritu.*

℞. *Alcali de aluminibus,*

*Solis fusiss.* q. v.

*F. Mixtura pro furfuribus.*

℞. *Vitrioli*

*aluminis scississ.* aa. lbß.

*Fiat Mixtura in Sapharis.*

Hæc etiam ipsa prædesse ait in Lepri Græcorum.

*Elephantiam* vero terminari in ulcus cavernosum afficit, quo membri consumtio transit ad *phantiam* principale membrum, & inde sequi mortem hand dubitat. Juxta Ipsum ergo triplex est Elephantia cura: quarum una est hæmorrhoidarum; secunda menstruorum provocatio: tertia liquorum exsiccatio.

Leprosos laxativis ullis non purgari vult Author. Quod enim est oleum ad aquam, hoc idem est, ad mentem Authoris, Medicina ad Leprosos quare plenam atque perfectam aggredditur curam, præparationem nempe regenerationis, & ipsam juxta præscriptum Spagyricæ Tincturæ in hunc modum: Principio mundanda esse ait metalla leproforum interveniente Tincturâ, in quâ duplex Tinctura & duplex Lepra delitescit, rubra sc. & alba, hanc Lunarem, illam Solarem appellant Spagyrici. Priorem ex Tincturâ Solis, posteriorem verò ex Tincturâ Lunæ accipit. Hic non existimat operæ pretium esse observari ea, quæ

quæ Veteres de origine Lepre scripserunt, cum eadem Praxis adferat. Porro inquit, qui velit Spagyricè consilire Lepre, videat, necum his, qui Mercurium Solis, quem plerique Spagyricorum primam materiam appellant, (autum possibile falso crediderunt,) aherret. Ille asserit, Lepream rubeam à Mercurio Solis, albam à Mercurio Lunæ sanari. Hoc opus, hic labor est, ut Mercurium exactè conficias. Postreus pergit, et si Mercurius ad tingenda metalla non prorsus sufficeret, valeret tamen in corpore, ut illud sanitati restitueret. Sunt præterea alia quædam arcana, quorum de vitâ longa fecerat mentionem, quæ Lepream æquo tollunt.

*In Alpha.* *Impetiginæ ac Leuce.* *Alphum, Impetiginem ac Leucem* Author curari asserit per sua arcana, mortificativa & mundificativa, imprimis seq.

℞. *Vitrioli*  
aluminis scissi aa. lbss.  
F. *Mixtura.*

Vel:

℞. *Alcali de aluminis*  
*Salis fusæ.*  
F. *Mixtura.*

*Helmontii* §. 15. *Helmontius* ad Scabiem curandam præ aliis interna commendat salia urticaia acidaque enecantia & eliminantia, magni enim estimat sua sudorifera, imprimis Mercurium diaphoreticum, aliæque Ipsi solemina. Omnia enim, quæ deterfunt facultatem ex copioso nitro habent, etiam laudat, unde cruorem deterfivum illius salis pruritivi rediunt. Remedium unicuique exte: num hic extollit, unguentum nimis præcipuo è Sulfure paratum, quod contagio inimicum tollit omnem propemodum pellem Scabiem, cui addit radices Ellebori albi, & bæccas lauri, quo unguento partes Scabie infestæ sapidis illini iubet.

*Lepram.* *Lepram* Author dicit esse malum difficilis sanationis, propter contagium glaciale ac ferè mortificans, spiritusque sensitivi oppressivum, hinc testatur, quod Lepream nemo mortalium curaverit unquam, qui non potius sit liquore Alcahest, qui sit tædiolosissime præparationis, nemoque, etiam artis gnarus fuerit, ad ejus consecutionem pervenire unquam, quem Akissimus speciali dono non eò duxerit, particulari enim privilegio sit oportet electus ac dotatus, si potius illo medio debeat: per quod sc. juxta Ipsum, tam sensitiva, quam insensitiva sub lunari æqualiter penetrantur, usque in radicem feminalem atque intrinsecam primi Entis. Idcirco etiam cuncta sub se domat, & commutat absque reactione patientis, agentisque depauperatione. Lepra ergo ad mentem Ipsius difficulter sanatur, eò quod venenum glaciale confermentetur, ceu dictum, spiritui sensitivo, unde remedium debet habere accessum ad prima nostri constitutiva, ubi venenum est superando, & glaciem huius hienis novo Vere suffundendo, id quod præstant Ipsius arcana, ut sunt Arcanum Corallinum, Tinctura Lili, &c. de quibus jam alibi dictum est.

*Impetiginem.* Ad *Impetiginis* pruritivum fermentum extirpandum ac enecandum commendat *Helmontianum* liquorem sequentem Mercurialem saccharatum.

℞. *Plantag.* 3vj.  
rosar. 3ij.  
℞ *sublimat.*  
jaschar. alb.

℞ *viniaa.* 3ß.

M. add.

℞ *fortis* 5j.

M.

Cum penicillo liquore intincto tingendum volunt locum affectum, & quidem sæpius de die, Internè etiam aquè hoc in casu, ac in *Alpho* *Alphum* & *Leuce* ad Laticem exorbitantem reducendum, & falsedinem seu acridinem in pelle peccantem enecandam deprædicat *Helmontius* Mercurium suum diaphoreticum, & parare solet ex Elleb. alb. & bæcc. lauri varia linimenta.

§. 16. *Villsius* tum internis, tum externis remediis Scabiem curare promittit. Mox abintus venam secat, & deinde purgans Medicamentum exhibet. Pro potu ordinario sequenti infuso uti jubet.

℞. *Summis. Tamarisc.*

famar. sic. aa. Mij.

rad. lapath. acut. sic 3vj.

Cort. solan. lignos 3ij.

Incis. & contus. misc. & in doliolum quatuor congiorum cerevisia tenui plenum inficiantur. Sed quum interna auxilia sine externis nihil aut parum proficiant, sequens unguentum præscribit.

℞. *Ungt. emulat. sine Mercur.* 3iv.

Pulv. Sulfur. 3ß.

O. Tartar. per del. q. f.

M. f. Unguentum.

Si verò pertinacior fuerit Scabies, ad unguenta Mercurialia recurrit.

Etiam *Villsius* Lepream ut plurimum incurabilem esse denunciat, Viperinorum usum longum tamen suadet. Acidulas etiam, uti & ferum lactis juxta Ipsum profunt. Chalybeata quoque optimi esse usus promittit; Hic etiam decocta lignorum cum Antimonio crudo in nodulo concluso, laudat, & tandem curationem eius per salivationem Mercurialem tentandam esse ait.

*Villsius* ad horrendæ Lepre profligationem convenire dicit post universalia, sc. phlebotomiam, & catharsin, serum lactis, acidulas chalybeatas, herbarum expressiones succulentas, imò & salivationem; & omnibus aliis ex Viperis parata Medicamenta anteponit, aliorumque serpentum carnes elixas, & loco cibi ordinarii comellas mirum asserere auxilium asserit.

Si *Alphus* ex pororum constrictione ortum ducat, *Villsius* tunc diaphoretica juvare promittit, quibus poros contractos aperit. Si verò ab humore lymphico vitioso affectus hic producat, illi corrigendo & alterando operam navat. Sed quum Medicamenta externa talibus defæcationibus delendis sint apprinè necessaria, sequenti utitur ad cutem detergendam.

℞. *Lixivii è sale Tartari minus saturati* 3iv.

Olei amygd. amar. per express. sult. q. f.

Oleum lixivio in tali proportionem miscetur, ut totus liquor lactescat, ac ita perlistat. Mixtura hæc illinantur partes Alpho affectæ mane ac vespere.

Particulis salinis in *Leuce* coti inhaerentibus demulcendis, usque foras eliminandis & poris cutis aperiendis Author operam navat, in quem finem sudorifera, diuretica aliæque commendat. Deinde hoc Medicamento partem inungit:

Cccc

℞. *Cum-*

*℞. Camphor. incif. ʒij.*

Teratur in mortario vitreo, fenfum affund. *fucc. Limon. unius*, deinde adde *vin. alb. lbj.*

*M. f. colatura; & Camphora Residua putriligata*, in vitro suspendantur. & lectur ad usum.

*Sylvius pro-*  
*cessus in*  
*curatione*  
*Scabiei,*  
*Lepra, Im-*  
*petiginis,*  
*Alphi &*  
*Leuces.*

§. 17. *Sylvius* in curatione *Scabiei* eo reflectit, ut acrimonia acida & pituitosum glutinosum corrigatur, in quem finem extollit salia lixiva & imprimis blandiora vel fixa, quale in calce vivâ reperitur, vel volatilia ex omnibus animalium partibus parabilia, utroque enim remedii genere usus est feliciter & plures facile curavit Author. *Scabiei* curationem plerumque solis externis absolvi vult, & quidem absque internis Medicamentis ullis, nisi observentur præterea alia in humoribus vitia, imprimis si *Scabies* producta fuerit à sudore quovis modo impedito, in quem calum sudoriferis blandis ac sæpius exhibitis denuo viam parat humoribus in superficie hærentibus, ibidemque ita corruptis, ut *Scabiem* feram producant. Ubi vero criticos modo ad cutim propulsus fuerit humor acer, idemque ob admistam pituitam tenacem ibi hærens *Scabiem* produxerit, cæteris functionibus ritè se habentibus curationi ejus non ita incumbit, cum temporis accessu ipse evanescat. In curatione æquè *Scabiei* ac reliquorum affectuum, nempe *Lepræ*, *Impetiginis*, *Alphi* ac *Leuces* inhiuenda omnia ea laudat Medicamenta, quæ cutis poros servant apertos, quin eos eodem aperiant, quæque humorem acidum temperant, glutinosumque incidunt & abstergunt, sicque partem affectam restituant, & consolidationem promovent. Maximè verò cavendum est, ut ne adhuc Medicamenta ullo modo cutis poros occludant, humoremque peccantem ad interiora repellant, unde sæpè in *Scabie*, aliisque cutis affectibus plurima gravia mala, febres nempe, æsthatina & *Epilepsiam*, & post eam sæpe mortem produciunt. Aliis ergo Medicamentis Author præter sola salia volatilia, sed blandiora, quorum ope plures curavit hæc morbis cutaneis obsessos & quidem feliciter, satque citò & facile. Dandam quoque esse operam monet, ne crustæ facile à partibus subiectis, imprimis in *Scabie*, separentur, cum sub ipsis feliciter contingat cura tota. Eadem de *Scabie* ferâ, item de *Leprâ*, *Impetigine*, *Alphi* & *Leuce* dicta vult, cum iisdem salibus volatilibus affectus hi sensim decedant.

*Cartesius*  
*normi: po-*  
*tio curat*  
*di Scabi-*  
*em.*

§. 18. *Cartesius* in curatione *Scabiei* ad succos viscidos & acidos maximè advertunt animum, ut iisdem attenuentur, & eliminentur, tum per sudorifera, tum levia quædam cathartica, præsertim si glandulæ intestinales ejusmodi visciditate & particulis angularibus acutis replete sint, ita enim easdem cum viscido humore simul evacuari, & sanguinem cum chylo ab iisdem præservari promittunt. Diaphoreticis tamen potentiorē adscribunt potentiam in subvertendis istis particulis mucronatis cuti in hærentibus, & glandulas ejusdem destruentibus, & hæc de causa non diu cunctantur, sed protinus ad eorum accedunt usum, propinando vel decocta ex lignis Guajaci, salastri, fraxini, radicibus chinæ, scabiozæ, Lapathi acuti, enulzæ, herbis fumariz, cardui benedicti, persicariæ, centaurei minoris, floribus, sambuci, aquilægiæ; vel pulveres ex ʒio diaphoretico, cerussâ

ʒiali, & fumariz, scabiozæ, ʒi, sulphure, vel alias quasdam mixturas, ex quibus diversas componunt formulas, quarum sequentia quædam existant exempla.

*℞. ʒii diaphoret. gr. xij.*

*ʒis fumar. ʒß.*

*volat. C. G. gr. ij.*

*M. F. Pulvis.*

*℞. Aq. Persicæ.*

*senecion. aa. ʒij.*

*Essent. Enul. ʒij.*

*~ flor. sambuc. ʒß.*

*R ʒi ʒij.*

*Syr. fumar. ʒiijß.*

*M.*

Præmissis internis hisce, quibus glandulæ earumque ductus obstruæ optimè referantur, & succi viscosi non modò attenuantur, sed cum particulis mucronatis iisdem in hærentibus foras ejiciuntur, etiam ab extrâ remedia adhibent succos illos sævientis domantia, & devaluationes cutaneas ab iis jam factas restaurantia, quorum de numero primum locum penes ipsos merentur balnea vel abluiones ex decocto rad. bryoniæ, lapathi acuti, aristolochiæ, scrophular. ari, herbarum persicariæ, saponariæ, agrimoniz, parietariæ, nicotianæ, foliorum betulæ, farinæ lupinorum, sem. staph. diagr. ʒiis, &c. in cerevisiâ tenui, vel ex aquâ calcis vivæ, in quâ aliquid mercurii dulcis fuit dissolutum, vel alio quodam decocto ʒiali, quæ omnia calidiusculè, vel saltem tepidè sunt adhibenda, & post eorum usum cutis leviter tantummodò linteolo quodam detergenda. Fortiori si desiderantur, ad unguenta procedunt, qualia sunt enulatum cum ʒio, Sale Ang. Sale Gile cum ʒio ejusdem, Medicamentolum *Myrsibii*, de lithargyrio, de tutiâ cum lacte ʒiis & ʒe ʒi, vel quæ sequentes exhibent formula.

*℞. Flor. ʒiij.*

*buir, non salit. ʒiij.*

*zinzib. ʒj.*

*ʒis præcipitat. ʒß.*

*M.*

*℞. Ol. Nuc. jugland. rancid.*

*ʒss aa. ʒi.*

*Succ. apii q. l.*

*F. f. a. Unguentum.*

*℞. Unguent. alb. camphorat. ʒij.*

*ʒis iris. ʒij.*

*Sapon. Venet. ʒiijß.*

*Lithargyr. ʒij.*

*Ovi ʒj.*

*ʒii dule. ʒij.*

*ʒss ʒiij.*

*M. F. Unguentum.*

Vel sequens D. D. *Vogel* sangui elegans, quo *Scabiem* manuum sæpius pro voto ægrorum abegit.

*℞. Ol. balanarin. recens express. ʒiijß.*

*ʒis ʒi ʒß.*

*Lactis ʒi ʒß.*

*Ol. d. Ligni Rhod. gr. viij.*

Spatulâ aliquoties agitando redigantur omnia in Limentum subalbidum, quo locus affectus bis de die inungatur.

Pustulas aperiant, & chylum corruptum in iis latentem linteolo leviter expriment,

# CAP. IX. DE SCAB. LEPR. IMPET. ALPH. & LEUCE. 571

munt, hinc aqua mercuriali vel calcis viva abluunt, & unguento Medicamentoso inungunt. Ulcera non minus aqua calcis vivæ, vel spiritu camphorato emundant, & pulverem ex radice fumariz bulbosæ, albo græco, olibano, myrrha, & cineribus ossium inspergunt, tum emplastro diasulphuris imposto debite consolidant. Indulsum quoque sulphuratum nullatenus continentunt.

**Elephantiasis & Lepram.** Fortiora quædam in usum ducunt in Elephantiasis tum Arabum, tum Græcorum, sive Lepræ, quales ægros à sanorum consortio separatos volunt, & ludoriferis tractari diutius continuatis, si forsitan in principio ulceris succorum coagulatione & omnimoda accelescentia prohiberi queat, consummatos enim inanem sæpius de perfecta curatione concipere spem nullatenus ignorant. Sunt verò remedia, quæ leprosis & elephantiasis convenire existimant, decocta ligni Guajaci, thermæ sulphureæ, nitrosæ & martiales, entimonium crudum, & senecida serpentum cerevisiæ imposita, pulveres ex nitro & floribus æci, unicornu Oare, flores Zii argentei, Theriaca tum Andromachi, tum Saxonica *Mysficibus*, Tinctura ex floribus reguli Zii. Externe admodum convenire existunt balneum illud abstergens, purgans, rarefaciens & digerens *Rondelarii*, quod componitur ex bryoniæ, cucumeris almini, serpentariæ, enulæ aa. lbss. cum radicibus, lapathi acuti, acetosæ, borraginis, buglossæ, saponariæ aa. Mij. cum radicibus, fumariz, lupulorum, endiviæ, cichorii, plantaginis, aa. Mij. lupinorum, corticum fabarum, hordei integri aa. P. ij. rosar. rubr. flor. nenuphar. trium flor. cordial. tamaricis, aa. Mij. flor. chamomill. melilot. aa. Mij. in aqua fontana & pluviali decoctis, post quod op. busonum inungunt.

**Impetigine.** Eadem quoque procedunt ratione in Impetigine, æci etiam sublimatum præcipitatum conterre credunt, vel sal Zii. & foris unguenta adhibent post balnea, quæ picem liquidam in se continent, præsertim illud, quod paratur ex carne vervecina radice lapathi trajectory, & pice liquida perfusa, in veru assata, liquor defluens servatur ad usum. Unguentum sequens valde approbant.

℞. Ol. Junip. nuc.  
Oiper deliq. aa. Zij.  
Oli Roman.  
Oli commun.  
Austrit. aa. Zij.  
Litharg. aur. Ziiij.  
Cera q. l.  
M. F. Unguentum.

Mercurialia subsistunt, si priora parum efficiant, adhibentque ad singulas drachmas præcipitati albi unguenti rosacei unciam, & invicem probemiscant.

**Alphum & Leucem.** Pariter & in Alpho ejusque speciebus, adeoque in ipsa etiam Leuce sudorifera fortiora approbant, qualia sunt præter superius recentia bezoardicum Oare *Mysficibus*, Tinctura ex Pio Zii cum Oo, Tinctura ex floribus Zii. Externè locum affectum oleo busonum illinunt, vel balsamo lithargyrii terebinthinato, aut liquore Zii vivi, nec unguentum de nicotiana hoc in casu adeo improbat, quamvis inveteratus affectus fortissima etiam rejiciat remedia.

5. 19. Si respicias ea, quæ Nos de causa Scab. Nostra diximus, facili matre Tibi etiam nosse apparebit cura, quæ nostro judicio consistit in temperando acido, & diluendo sale fixo acido, in cutis glandulis miliaribus ejusque ductibus excretoris hærente, simulque resolvendo succo ab iisdem coagulato, quæ omnia obtinere possumus per Incidentia, cathartica leniora, Diluentia aquea, Diaphoretica miora, & Diuretica blandiora, quò enim materia tendat, eò ducendam esse hætenus omnes judicant Medici. Ex classe Incidentium. Nos præ aliis commendamus Treac. & calia & amara. In juniorum gratiam sequentem vel similem apponamus formulam.

℞. Crystall. ℥ 38.  
Pulv. ari. censl. aa. gr. v.  
℞ æci depurat. gr. ij.  
M. f. pulv. detur in triplo.

Essentia trifol. fibrin. & Elix. nostr. polychrestum, cum ~ matricul. paratum egregia sunt.

Inter Cathartica leniora & blandiora commendamus, quæ sc. non ad sanguineam perveniunt massam, fortiora enimpurgantia proscribimus, hinc novimus exemplum, quod viro 40. annorum scabioso pulvis Jalappæ ʒi. cum crem. ℥ 38. fuerit exhibitus, absque hypercatharsi eodem manè quò assumierat, mors sublecuta est. Aliis scabiosis centies vidimus purgatis, remanente in exterioribus cutis glandulis Scabie. Concedi tamen possunt miora, ut sunt Infusum passulatum cum foliis senn. Eiect. nostr. laxans cum ʒi dulci, decoct. sol. senn. cum Rhabar. quod & per se vel cum aliis potui ordinario imponi potest. Quod attinet Diluentia aquea, ea sæpe omnem implent paginam, si sint simul temperantia, sal enim illud acidum in glandulis subcutaneis existens maxime diluunt temperantique, ex quibus potus Theæ tantum omnia superat, quantum lenta solent inter viburna Cupressi; salia enim acria diluit, ac acidum viscidum temperat, circulationem sanguinis ac siccorum promovet; potest etiam hic potus parari cum decocto Guajaci, salassas, rad. chinæ, enulæ, &c. & sic præstantior erit, potus quoque Caphæz egregius est. In hunc finem & varia destillata ex herbis & succis antiscorbuticis parari possunt, vel ad præscriptum Dn. Guidenkleæ dentur singulis matutinis & vespertinis horis Mixturæ temperantis ac diluentis sequentis ʒijj.

℞. ∇ sumar. ʒiv.  
cichor.  
endiv. aa. ʒijj.  
Succ. recent. ex cochlear. nasturt.  
sumar.  
cichor. aa. ʒijj.  
Sacchar. q. l.  
Digerantur & filtrentur.

Vel dentur varia cum sero lactis infusa à Medicis Practicis ad nauseam hinc inde descripta, & inter Antiscorbutica relata.

Salibus hisce dilutis & temperatis audaciùs ad Diaphoretica blandiora accedere possumus, cum sic diluta & quasi subtiliora facta salia faciliùs per poros cutis, mediantibus sudoriferis, eliminari queant, in quæ finem conducunt omnia salia volatilia, ex gr. ∅ volat. C. C. eboris, viperæ, quæ viperina aliis palmam præcipiunt, item  
Cccc 2 ∅ volat.

¶ volat. urinae & ci, item salia alcalina fixa, ut sunt & gnum diaphoret. bezoart. miner. Martiale, Joviale & animale C. C. Philos. calc. Eū enim in curatione Scabiei incumbendum est, ut superficialium tantum tubulorum & vasculorum cutaneorum obstructio tollatur, quod obtinetur aliquando per Tincturam gni Olar. à guttis x. ad xx cum decocto ligni Guajaci exhibitam. Cerrulla gñialis sequens in Scabie curanda egregii usus est.

¶ Reg. 8<sup>a</sup> part. j.

¶ 8<sup>a</sup> part. iij.

M. f. pulv. qui detonetur, edulcoretur, & efficeetur, Dosis à ʒb. ad ʒj. quovis manē. Inò ipsum gnum erudum exhiberi vel potui indipotest. Viperina semper interponenda sunt, & ipsæ viperæ iusculis carniū incoqui & sic assumi possunt. Axungia viperinata internē tum externē maximē confert, quæ cum conservæ fumar. vel rosar. aliquoties exhibitæ Scabiem quamcumque certò curabit, modò non sit adulterata, prout in Galliâ hoc remedio plures vidit curatos Frater meus Jacobus V. V. Wilhelmus Dolans.

Si Scabies retropulsa est, & particulæ hæ vitiosæ & exoticæ vel massæ sanguineæ mixturam turbant, vel iuccos reliquos, imprimis nervum coagulant. ac acrimoniâ suâ salinâ in istis succis varia & vehementiora producant Symptomata, eò annitendum, ut per diaphoretica iterum ad sedem priorem, cutis sc glandulas expellantur, in quem finem sequens vel similis præscribi potest Mixtura.

¶ ʒ fumar.

fl. sambuc. aa. ʒib.

R ʒi ʒj.

Essent. myrrh. ʒj.

lignor. ʒib.

¶ volat. viperar. gr. iv.

¶ camphora ʒj.

Syr. de fumar. ʒvi.

M. & detur cochleatum, & quidem per vices repetendo.

Vel sequens Domini à Guldenslee.

¶ ʒ fumar.

fl. sambuc. aa. ʒib.

¶ aurat. gr. xj.

¶ ebuls ʒj.

Theriacal. ʒb.

M. pro una dosi.

Vel sequens Juniperinum:

¶ R. Rob. Juniperi ʒb.

¶ Juniperi gr. xij.

Syr. ejusd. ʒj.

¶ ʒ Junip. vel fl. sambuc.

F. porinnēcula una vice assumenda.

Pauperculæ liffæ in locis ad Scabiem expellendam uti solent & revivo ad ʒj. aliquoties assumto. Scabies sicca & maligna non aliter curatur, quàm Lues & ea per decocta lignorum, rad. sal-taparril. ¶ Guaiac. spir. matricar. extracta aliæque specificæ capite de Lue venerea petenda.

Quandoque mediante tero per Diuretica blandiora educuntur particulæ istæ salinæ & acidæ Scabiem producentes, hinc Tinctura ʒri cum essentia lignorum, item serum lactis cum herba fumar. pro pauperibus sæpè sufficit, & cum potus Theæ tanquam optimum diureticum inclauereit, capropter hoc nomine con-

ducet. Inter reliqua blandiora Diuretica referimus sequentia.

¶ ʒ bellid.

Fragar. aa. ʒib.

¶ nitri ʒb.

R ʒri ʒj.

Syr. de rb. rad. ʒb.

M. detur cochleatum.

Vel detur liquor noster diureticus est ¶ & nitro paratus ad ʒo. guttas, vel Tinct. ʒri in Ag. card. bened. succus quoque Betulæ tempore veris exstillans conducet, qui salinas particulas in humoribus existentes circumvolvunt & cum urina educunt, quod etiam præstat decoctum contra Scabiem Myrsi, vel ejus loco decoctum sum-pini, vel dentur spiritus seq. Balsamici gut-tæ ʒo.

¶ ʒ Spir. C. C. ʒvij.

gumm. pini clarissimi ʒiv.

M. & destilla juxta modum chymicum.

Vel:

¶ ʒ Terebint. in ʒssj. ʒj.

gumm. Ammoniac. ʒb.

ʒssj. ppi. gr. xv.

ocul. ʒ ppi. ʒb.

Balsam. Peruvian. gr. v.

M. f. pilule pisi minoris magnitudinē cum pulver. rad. liquirit. inpergenda, & ʒo. pro unica dosi assumenda.

Ad Classē Diureticorum etiam pertinent Acidulæ & Theriæ ad leges Medicas assumæ, quæ & hic opem spondent. Peractis hæc omnibus & instituta pro causæ varietate electione dictorum remediū Internorum, ad Topica seu Localia Externa accedendum est, quibus sæpè solis Scabies, & absque Internis à plebe-jis curati solet, hinc tantum ex ¶ vivo cum axungia porcina unguentum parare nōcunt, quod sæpè cum fructu, nonnunquam verò cum tristi effectu illinunt. Sulphur verò sanat Scabiem non ob adjunctum spiritum acidum, nam ille solus nequicquam hic proficit, sed ob reliquam ¶ ris substantiam, quæ saturata non est tanta acidi quantitate, quin ei faciliè possit longè plus adherere humoris acidi in Scabie peccantis. Sic etiam Mercurius, magnus iste acidi domitor seu magnes, sine acido Scabiem semper tollit, plura enim commendantur linimenta contra Scabiem, quæ pro basi agnoscunt Mercurium vel ejus præcipitata, album, viride, rubrum, &c. prout malum fuerit pertinacius. Em-plastrum etiam Ole, & sæpè zonæ inclusum, nam circa corpus gestatum Hydragryrum tollit omnes cutis defectiones scabiosas, quæ si refractariæ, & nullis ordinariis auctulent remediis, in usum vocentur simul remedia Lui Veneræ ac Scorburo dicata interna. Tartaræ & myrrhatæ externæ sæpè omnem implent paginam & sunt tutissima, ut & Camphorata, Sequens nobis solenne est.

¶ ʒ Ungu. Enular.

sap. Venet. aa. ʒj.

¶ ʒris viv. ʒib.

¶ ʒci depurat. ʒj.

camphor. ʒb.

ʒdulc. ʒj.

ol. Terebint. q. s. f. linimentum.

Vel in forma liquida sequens, vel similis applicari potest.

¶ ʒ Calc.



℞. ∇ calc. viv. ʒv.  
 ʒiv. vin. Camph.  
 matricul. aa. ʒj.  
 R myrrb. ʒij.  
 ol. Q per deliq. ʒss.

M.

Vel:  
 ℞. ∇ solan. rosar. ʒij.  
 ʒ. ∇ ʒss.  
 aluminis ʒj.  
 ⊖ H<sup>ni</sup>  
 Q aa. ʒss.

Coq. in vase terreo.

Vel:

℞. ⊖ li ungu. ʒss.  
 ∇ plantag. ʒiv.

M.

*Hartmanni* linimenta varia ex ∆re, pulvere pyrio, Camphora, pice liquida, resinā pini, Terreb. &c. parata summopere commendat. Ab aliis laudatur sequens.

℞. Sapon. Ven. ʒ. v.

⊖ \*c. ʒss.  
 ʒi. cerid. N. j.

M. c. aq. rosar. f. linimentum.

℞. ʒ viv. ʒss.  
 solut in ∇ ut lapis infern.  
 ex quo ʒ. ʒj.

Ung. diapomph. q. v. ʒj.

ʒ viv.

⊖ nitri aa. ʒj.

⊖ \*ci

⊖ volat. C. C. aa. ʒj.

Elix. vit. q. l.

f. Unguentum.

Mercurialia enim omnibus in pustulis aliis palmam præripiunt; credas experto Roberto. Vel applicetur sequens magis approbat.

℞. Crem. lall. ʒiv.

Rad. lapath. rec.

ex quibus f. decoctum instar p. d. p. ʒijss.

ʒior. ∆ citrin. ʒss.

Caryophyll. ʒj.

M. f. l. a. Unguentum.

Hæc nil juvantibus nonnulli ad fortiora transeundum esse judicant, seq. vel simile præscribentes.

℞. Mercur. sublimat. ʒj.

Ungu. nuri. l. c. ʒiv.

M. exacte.

Linimentum Cosimi Slotani à *Guilhelmo Fabricio* descriptum à pluribus magni penditur.

Optimo verò cum successu & Balnea tum naturalia, tum artificialia institui solent, ut quasi eluantur salia ista acida coagulativa fixiora. Inter naturalia laudantur ea, quæ multo ∆re & bitumine, vel nitro sunt imprægnata, & hinc Embsenses, Aquisgranenses, Carolinæ, & in vicinâ Wisbadenenses ac Geismarienses, aliæque ubivis terrarum scaturientes Thermae. Sed cum non cuivis contingat adire Corinthum, & ut plurimum pauperes magis, quibus curæ est suppellex, quam divites Scabies afficiat, ea propter istis balnea commendamus artificialia, qualia ex Malvâ, Scabiosâ, Saponariâ, Nepetha, Fumariâ, Betonica, rad. oxylapathi, Farinâ Lupinorum, Furfuribus in Aq. decoctis parari solent, quibus addi potest ∇, ∆ & ⊖. Ex gr.

℞. Rad. Helen. ʒij.

oxylapath. ʒij.

Herb. fumar.

saponar.

seabios.

nepeib.

Fol. belen. aa. Mij.

Tabaci Mj.

∆ crud. lbj.

Bacc. lauri ʒj.

⊖ lbss.

M. pro Balneo.

Sic etiam infestus ex iisdem speciebus componi possunt, inter quos sequens laudatur:

℞. Herb. scabios.

fumar.

agrimon.

malv.

cent. min. aa. Mj.

Fl. chamomill. Miv.

rad. lapath.

cort. rad. frang.

∆ viv. aa. lbss.

Sal. comm. lbj.

f. decoct. ex aq. fluviatil. pro infessu septimanatim bis repetendo.

Lavamenta quoque & lixivio Reguli Gni ejusque scoriarum, vel ipsius Gni, vel aq. divin. vel virid. *Hartmanni*, Tinct. Tabaci, aq. ferrariorum &c. sapissimè solâ illinitione Aquæ Reg. Hungariæ, vel spiritus vin. Camphor. vel spiritus matricalis Scabien curatam observavimus. In quem finem quoque pro delicatis Aulicis & virginibus varia inegmata & saponis odorati parari queunt, quibus reliquæ residuæ abluantur ac abstergantur. Ex gr.

℞. Sapon. Venet. ʒj.

Syrac. calam.

Lap. medicamentos. aa. ʒij.

rad. ieros flor. ʒj.

N. M.

cinam. aa. ʒss.

puly. Santal. alb. ʒj.

asa dulcis ʒij.

caryophyll. ʒj.

Mosch. gr. iv.

ol. Q. q. l.

Lepra Græcorum, quæ est intensior scabiei *Cura in gradus*, hinc in *Cura* planè hi affectus non disse. *Lepra Græcorum* eadem ergo in Leprâ hæc Græcorum conducent, quæ superiùs fufius descripsimus, modo sudorifera aliaque Incidentia medicamenta sint paulò fortiora. Hic ergo præ aliis conveniunt viperina, ac Gniata cum ʒlibus fixioribus, cinnabarinis, aliisque ad nauseam jam dictis, & externis Topicis recensitis. In Scabie æquæ ac in Leprâ Græcorum Venæsectionem proscrubimus, quia causam morbi lege circulationis tollere nequit, sed sanguis, spirituosiore ejus parte emissa, reliquis crassior evadit. Non minus inethicæ sunt cucurbitulæ siccæ ac scarificatæ, fonticuli, hirudines, &c. quæ omnia tanquam inutilia & in torturam ægrorum tantum excogitata protinus rejicimus.

Ad hostem *Elephantiasis* in latebris suis limos in p<sup>re</sup>sis latentem eruendum, vix arma ulla restant, & in hoc obtinendo oleum & opera perditur: est tentare licet eum aggredi remediis potenter incidentibus, attenuantibus, visciditatem sacorum resolutentibus, & sic particulas in remotissimas

Cccc 3

tissimis

tissimis tubulis impactas, & quasi incuneatas è sede sua dimovendis, quibus indicationibus omnibus satisfaciunt potus Thea, & possum asseverare, quod nemo hoc potus genere utens unquam Lepra affici possit. potus quoque Capheæ egregius est, item decoctum lignorum calidè assumptum, & cum  $\sim$   $\Theta$   $\times$ ci & camphoræ permixtum. Incidentia optima sunt  $\times$ calia &  $\Delta$ rea cum aromaticis quibuscumque permixta.

*Diuretica* nec hic negligenda, sed paulò fortiora, quàm in Scabie sunt, optima sunt, quæ constant ex alcalibus volatilibus & fixis, quæ acidum peregrinum, quod sanguini iusto crassiorem consistentiam conciliat, ac feri & excrementorum per Renes secessum impedit, absorbendo, tum rigiditate particularum suarum tubulos renales obstruendo, effectum suum præstant, quibus addi possunt, quæ lubricitate partium suarum vias aperiant, & aliis formulis præsertim millepedes ad junguntur. Si hæc medicamentis in recenti malo, crassior succi peccantis pars subducta videbitur, tum feliciore siedere ad *Sudorifera* accedere poteris, quæ reliquas particulas salinas fixas, poros & glandulas cutis obstruentes convellunt, cum lenitate, quam eò confutare faciunt, ex corpore eliminant. Cavendum autem, ne hæc in usum vocentur, antequam sanguis ac succi à nimia asperitate diluta sint, ne sanguis nimis inflammetur & morbus exacerbetur. Dentur ergo hic in principio morbi mitiora ac humidiora, quæ humiditate sua salia diluant, & in sinu recondita educant, quæ parari possunt ex herbis & radicibus copioso sale volatili præditis, quod cum acido sanguinis vitioso fermentet, & illius cum partibus terrestribus concretionis dissolvat, addendo in progressu  $\Theta$  volat. C. C. eboris, succin. fuligin. viperar. eboris, serpentum nostrat.  $\sim$  theriacal. quæ tandem aritari possunt remediis majore rigiditate præditis, & acidum potentius domantibus, ut  $\Sigma$ n. Diaphor. Merc. Diaphoret. Bezoart. Min. Joviale,  $\Delta$ reæ, pulvis Poterii cum Nitro,  $\Sigma$ nio & Jove confectus, quem sic commisceas cum resina Guajaci præstantissimum habebis sudoriferum, Antimonium Ole. cerussa  $\Sigma$ ni, Tinctur.  $\Sigma$ ni, & pulvis meus  $\Sigma$ io Antimonialis, quo nullum in Lepra datur præstantius remedium, & dum Hanoviz Praxi operam dedissem, mihi & Chitargo *Wedding* puella 10. annorum de pago *Steinheim* dicto, prope Hanoviam sita, oblata fuit, cujus totum corpus crustosis squamis obductum erat, quæ puella solo hoc pulvere sudorifero  $\Sigma$ io  $\Sigma$ ni ali ad grana x. & ultra de die in diem propinato curabatur, & singulis matutinis hortis, & quidem post sudorem, manipulus & plus squamarum in lecto reperiebatur, quæ tam diu deciderunt, donec ab omnibus liberata fuit, & nunc optime vivit. Tinctura  $\Sigma$ ni etiam egregia est, & detur sequendi modo cochlearim:

$\Delta$ . Tinct.  $\Sigma$ ni 3ij.  
 $\nabla$  fl. sambuc. 3ij.

M.

Auxungia viperina cum conserva fumariz facpius exhibita etiam egregii in Elephantiasi erit usus, multo enim sale volatili gaudet, cujus ratione crassitiem ac tenacitatem succorum incidendo ac resolvendo, acidum obtundendo & ex corpore educendo, & hinc sanguini ac succis justam consistentiam mixtionemque restituendo effectum suum forgitur: haud dissimilem præ-

stant opem serpentes nostrates in jure decocti & assumpti, item millepedes aliæque animalcula, sale volatiliurgentia, ut bisones eorumque sal volatile. Inter panaceas referunt Balfam.  $\Delta$   $\Sigma$ nia-tum sine Marte, ol.  $\Sigma$ ni Diaphoret. præcipitat. rubr. calcinat. magn.  $\Delta$ le Paracelsi. Inter Lopez arcana etiam relectur *Tinctura*  $\Sigma$ x, seu potius  $\Sigma$ ris Helvetii, quæ dicunt ipsum formam Elephantiasi laborantem, & ab omnibus Medicis derelectam, feliciter curasse: paratur verò Tinctura hæc ex  $\Theta$   $\times$ ci &  $\Delta$ lo, quæ detonentur in craticulo, & dein extrahi  $\sim$  vini, hinc sic viridis, & si ei affuderis aliquot guttas ol.  $\Delta$  per deliq. tunc apparebit cerulea inhar Tinctura Lunæ, & hæc dicitur ista decantata Tinctura. Alii jactant præcipitatum pulverem  $\Theta$ ren Rappii. Alii extollunt liquorem Alcahest, nonnulli panaceam albam. Num fidem mereantur, judicent ii, qui tot egregia possident arcana. Nos enim his destituimur.

In Elephantiasi V. S. Cucurbitulas, Hirudines, Vescicatoria, Setacea, Cauteria, castrationem & similia dolorosa necune, ta potius, quàm medicamenta rejicimus. Cucurbitula enim & Hirudines sanguinis partem tenuiorem saltem eliciunt, Vescicatoria verò & Cauteria foci Fonticuli sanguinis ac chyli partem tenuiorem & fluidiorem absumunt, & reliquos humores magis incrassant, & sic malum potius augent, quàm imminuunt.

Hæc in Elephantiasi etiam *Externa Topica* in usum trahenda sunt. Primo igitur duritiem & siccitatem cutis emollire ac corrigere, sal istud fixum viscidum quæ glan huius cutaneis, quantum possibile, dissolvere, illisque exitum procurare conemur, quem scopum obtinebimus per balnea aquæ dulcis tepidæ, quæ optimum salium menstruum esse potest, imprimis si & ipsa aqua sale quodam adjecto auctior & præstantior reddita fuerit. Laudamus etiam hic Thomas bituminosas &  $\Delta$ reas. Defectu autem Theriacum Balnea artificialia parari possunt ex  $\Sigma$ cotii  $\Sigma$ ni cum  $\Delta$  &  $\Delta$ o, vel seq.

$\Delta$ . Ciner. Bufon. q. s. ad Balneum.

$\Delta$  commun. 3ij.

M. & coq. in  $\nabla$  communi, add.

Solut. Myrrina 3j.

angu.  $\Sigma$ ni 3ij.

M. pro Balneo.

*Egyptii* Reges in hoc morbo ex sanguine humano balneum parantur; alii balneo primogeniti (audacissimi confisio), aut alio, in quo cadever putrefactum sit, ut solent. Alii locum Lepri infectum secundariæ sententiæ fortiter fricant. Fatus verò, seu cunctia & cataplasmata ad emolliendos partium externarum tumores commendantur; à balneo linteolis deterfus æger sequenti vel simili utatur linimento.

$\Delta$ . Axung. viperar. 3ij.

urfi 3ß.

d. Laurin. 3ij.

succ. fumar.

veronis.

nummular.

scabios. aa. 3j.

pulv. rad. aristoloch.  $\Delta$  3ß.

$\Delta$  3j.

liburgyr.  $\Delta$  3ß.

Cui add. potest.

$\Delta$  præcipitat. rubr.

fuligi-

# CAP. IX. DE SCAB. LEPR. IMPEI. ALPH. & LEUCE. 575

*fuliginis,*  
*gru.*

*M.*

Si his omnibus haud obtineri potest, ut tumores leprosi evanescant, ferrum arripiendum est, vel causticis utendum, qualia sunt lapis infernal. & sublimat. ol. Antim. ritè destillatum & rectificatum.

Ulcera verò  $\nabla$  Gali *Rulandi* lavari, aut decocto Guajaci, aut succis plantag. nummular. &c. mundificari possunt, cicatricem inducas stiptico Paracelsi. Ubi autem gangraena jam partes corripit, abstinendum est ab omnibus unguentis & emplastris, & si sphacelus accedat, cultro vel ferra menbra sunt abscindenda, ut pars sincera trahatur.

Sunt Leprosi qui Priapismo & Salacitate laborant, & in Veneream maximè proni sunt, ad hoc symptoma curandum varia specifica praescribi solent, ut sunt  $\nabla$  Nymphæ:  $\Theta$  Hni, aq. castitatis, Myns. Succus Lactucæ, emulsiō canabina, pulv. crystall. &c. imprimis verò Nitrum in aq. Nymphææ solutum à D. Guldenkleee laudatum singulis matutinis ac vespertinis exhibendum est.

*Cura in Impetigine.*

Impetiginis gradus intensior *feru* dictus viv illam admittit inediam, etsi ulli salivationi à Mercur. excitata cedit, quæ Mercurialia validissimè omnem ferè succorum acredinem, æquè acidam ac saliam visciditatem conjunctam per ductus salivales evacuat, inò præterquam quòd multum acidi intra suos poros vel amplexus suscipiunt, ipsos glandularum cutis oculos tubulos ampliando, & aliquorum filamentorum decussationem eos necitentium extremitates solvendo efficiunt, ut facilius major humidi copia eos transiens acutas acres eluat, viscidasque diluat particulas, quo consolidationi sufficiens sternitur via. Ad humorem ferolum acrem inordacem cum crassioribus & terrestribus particulis maritatum eliminandum conducunt serum diluentia ex cicorio, endivia, fumaris, borragine, poly-podio, in sero lactis caprino decocta, ut & interpositis catharticis blandioribus Mercurio dulci junctis. Elixir Antihypochondre. nostr. maximè hoc in casu confert, ex iisdem enim paratur herbis & radicibus.

In *Impetigine Leviori* seu Lichene (*Flechten*/ qui est levissimus Herpetis & Serpiginis gradus,) omnia ea conveniunt, quæ commendavimus in Scabie, imprimis illa, quæ depromuntur ex fumaris, & Nitro, imprimis hic noduli purificantes conveniunt.

Inter Topica excellunt in quacunque *Impetigine*  $\nabla$  sperm. ranar. florum omnium, lac  $\Delta$ etis,

ol. ovorum, decoctum  $\Psi$ , liquor  $\&$  saccharat. *Mynschi*, unguentum Medicamentosum No-bile ejusdem, ungu. ex Hno, ex ol.  $\nabla$  camphor. & ceruss. & empl. cinnabarin.  $\Theta$  Hni, camp. & bals.  $\Delta$ , decoctum & infusum *Poterii* omnia Mercur. hic profunt. Partibus impetiginosis applicari potest sequens.

*Succus semperviv.  $\&$ ij.*  
*creta pulv. q. l.*

$\Theta$  Hni  $\&$ ij.

*M. f. linimentum.*

Quod si pruritus molestus fuerit conjunctus, imponatur *Prævis* unguentum, quod describit in *Medicina Pauperum*, valentetur Experimentum *foeli* excremento ferri. Spirituosa etiam hic eximii erunt ulus,  $\nabla$  nempe  $\Psi$  cum  $\sim$  matricali & camphora, vel cataplasmata calidè imponenda.

In Curatione *Alphi & Leuces* eodem modo, *Cura in* ac in Scabie dictum est, incedas, affectus enim hi cutanei tantum secundum magis & minus differunt: hinc omnia quæ superius in Scabie commendavimus, & hic prodesse inculcamus, imprimis incidentia, diluentia, diuretica ac diaphoretica, imprimis etiam hic potum *Theæ* cum decocto lignorum laudamus, una cum viperinis. Externè verò imprimis ad maculas albas valet unguentum rosaceum cum  $\&$ io præcipitato, camphora cinnabar ac balsamo Peruviano. Hic etiam profunt ol.  $\nabla$  per deliq.  $\sim$  matricali. cum ol. amygd. dulc. item lac Virginis, absque aceto parat, ungu. ex  $\Psi$   $\Delta$  viv. item aq. sperm. ranar. item  $\nabla$  Regim. Hungar. Ballam. divini.

*Vel:*

*Ungu. Pem. ut.  $\&$ vj.*  
 *$\&$  viv.  $\&$ ij.*  
 *$\nabla$  feru  $\&$ ij.*

*M.*

*Vel:*

*Ungu. Pem. ut.  $\&$ ij.*  
 *$\Theta$  volat. C. C.  $\&$ ij.*  
*Flux. vitæ  $\&$ ij.*  
 *$\Delta$  viv.*  
 *$\Delta$  Nitri aa.  $\&$ ij.*  
 *$\sim$   $\Theta$   $\&$ ci  $\&$ ij.*

*M. f. linimentum egyptium.*

In *Leuce* conveniunt præter jam dicta in Scabie, interna acrimoniam absorbentia, ut Ebur.  $\&$   $\Delta$  parat. Epatic. rubr. spec. diarrhoi. Abb. Diatrioni. Santal. & sexcenta alia. Balnea fiant ex rad. lapath.  $\Delta$  &  $\nabla$ . Curatur enim eodem modo ac Scabies & Inipetigo, quæ remedia omnia si hic repeteremus, nauseam tantum pareremus

Lectori, quare cramben biscoctam apponere non libuit.

## CAPUT X.

*De Phlyctenis, Sudaminibus, Epinyctidibus, Termintho, Essere, Psydrazio, Ficu & Talpâ Topinaria.*

$\S.$  I.

**T**umorum, Tuberculorum ac Pustularum Cutem nostram defœciandam adeo multa & varia sunt genera, ut numerus eorum inducentis viginti sex, recensente *Joanne Philippo Ingrassia de Tumoribus, Tract. 1. cap. 1. com. 2. excrecat*. Unde dubium quandoque videtur, quo

nomine hic vel ille tumor aut pustula sit indigenda, eum & in ipsis nominibus interpretandis non parva occurrat difficultas. In juniorum Medicorum verò gratiam sequentes explicaturi sumus pustulas, distinctionem vix admutantes.

*Phlyæna* dicuntur & *Phlyctides*, Germanis *Phlyßena*, *Stipp*, *Phlyctides*,

*Sikroeten* / *hisiq* *Blattern* / aliis *dos wilde* *Seier* / *Nachtbrandt* : sunt pustulae in summa corporis plantae & superficiei nascentes, à tenui sane in cute stagnante, eamque sua acrimonia salina erodente, pungente, & urente, unde aliis dicitur *lenis silvestris* : sunt enim vesiculae quaedam cito erumpentes, nec adeo dolentes, humore flavo vel subalbido repletae, pustulas ab unctione aquae ferventis inductas referentes.

*Sudamina*, Graecis *Hydrae*, aliis *Papularubra*, mordicantes, sudorales, aut sudorosa, cum ex sudore proveniant. Germanis dicuntur *Grübel-sucht* / *Schwellen* : describi possunt, quod sint pustulae post sudorem obortae, à fibrillis & duobus propter acredinem diffusis & in circinnos resiliens, indeque in cavitatem evalato succo nutritio vel lymphae productae.

*Epinthides*, *Pustula nocturna*, à nocte ita dictae, cum noctu oboriri soleant, doloremque saepe producant insignem. Germanis dicuntur *die Nachtblattern*. *Plinio* dicitur pustula livens & noctu inquietans. Sunt ex pustularum genere, colore sublivide & nigricantes, quandoque subalbide cum vehementia inflammatione & dolore, vix fabam magnitudine excedentes, & pro specie carbunculi habentur hae pustulae : describi possunt, quod sint pustulae, quales ab  $\nabla$  fervente excitantur, sua sponte nocte praesertim in cute erumpentes, ab acerbis salinis humoribus tubulos cutaneos peremptibus obortae.

*Terminthi* cutis etiam dicuntur eminentiae plerumque in tibiis & cruribus productae, colore ex nigro & viridi rotundae, interdum non absimiles sunt herpeti exulcerato. Germani istas vocant eminentias, *die braune Blattern* ; describuntur, quod sint tubercula parva à salinis ac corrosivis succis cutis glandulas ac tubulos corrodentibus, & cavitatem parantibus oborta. Scorbui ac Luis Venerae comites esse solent hae tubercula.

*Efferæ*, (quod vocabulum Arabicum est, & apud Abinlinam & Serapionem legitur,) dicuntur etiam ab aliis *Saïre*, *Pemphix*, *Bulle*, *Am-pulle*, *Eckanifmata*, Germ. *die Nesselsucht* & sunt pustulae parvae Scabiei bullarum instar vel squamarum eminentes, ac si ab apum icetu fuerint excitatae. *Paracelsus* vocat has pustulas *squamulis pediculares*, easque ex vaporibus Talcis vel Cachionae deducit, hinc morbum familiarissimum esse metalli fossilioribus scribit *Tr. de Ulc. & Apst. cap. 47*.

*Hydracia*, *Hydracia* indignantur papulae vel vesiculae ut plurimum in capite à tenui minusve acri lymphae tubulos cutaneos ibidem corrosoriente obortae, unde à *Phlyctenis* in hoc tantum differre docent Auctores.

*Ficus* vel *Ficosa*, vel *Ficatio*, item *Tumor Ficosa*, aut eminentia *Ficosa*, aliis *Marisca*, qui tumor nasci solet in oculo ejusque palpebris, vel in mento, vel in ano, (à *Thymo* sola magnitudine differens,) vel in digitorum extremis protuberans, item in utero proveniens; nonnullis dicuntur *Conchyliomata*. Describi potest, quod sit tumor cum excrecentia quadam carne à succis viscidis, imprimis nutritio, stagnantibus, obortus.

*Talpa to-pinaria*, *Talpa* dicitur etiam *Topinaria*, est tumor scabiosus cutis capitis ac faciei proprius, saepe pus seichylum album coagulatum in se continens, & ob acrimoniam serpendo cuniculos instar

*Talpa* sub cute efficiens, sed etiam tumorem rotundum exhibens, quales *Talpa* terram subivendo efficiunt. Vocatur etiam *Tesludo*, confer *Bonetti Med. Sept. L. 1. S. 1. c. 9. p. 13*. Quam *Tesludinem* verò alii ob figuram differunt à *Talpâ* differre scribunt. *Paracelsus* *Tesludinem* & *Celsam* dicit, hocipsum esse id, quod huc atque illuc discurret. Quibus omnibus tantum ingenia Tyronum fatigantur, & Tubercula hae optimo iure sub uno nomine, me iudice, comprehendipotuerunt : sed nunc Veterum vestigia semel calcata incedere cogimur.

§. 2. *Pars afflicta* harum pustularum sunt ut plurimum cutis, cuticula seu epidermidis rubribus ac glandulae miliares, eo enim delati succi salini acres scindentes ac corrodentes, facile ejusmodi pustulas producere apti nati sunt. In pluribus quoque jam dictis affectibus cutaneis exigua cutis vascula lymphae continentia afficiuntur, quae saepe accensum lympham facile in his vasculis excretoriis stagnare, & diversis generis tubercula excitare valent.

§. 3. Quod *Diagnosin* horum Affectuum cutaneorum attinet, eos accurate describere, hoc opus, hic labor est, melius enim depingi, quam describi possunt, & si mihi vacaret, Tyronibus Chirurgiae in pictura quoscumque tumores & varii generis pustulas hoc in Opere delinquant, imò & ulcerum diversitates clare ante oculos representassent, ut ex figura cum suis coloribus differentias animadverterent. Negotia verò antica & practica non permiserunt hac vice haec omnia ad vivum ita proponere : hinc *Diagnosin* more solito clare ac perspicue, quantum possibile, nunc tradamus.

*Phlyctena* ergo cognoscuntur ex suis vesiculis in cute extrema cito erumpentibus, nec adeo dolentibus, in quibus succus flavus & subalbus chylosus continetur, & ferè similes sunt pustulis illis ab unctione aquae ferventis productis.

*Sudamina* sunt pustulae, quae in sensus incurantur nostros, sunt enim rubrae, mordicantes & ut plurimum post sudorem & tempore aestivo, quo homines facile sudoribus infestantur, item saepe in his animadvertuntur, qui statim post sudorem se aëri frigido exponunt, vel qui sudore Anglico vel sudore colligativo laborant.

*Epinthides* sunt pustulae, quales ab aqua fervente excitantur, sua sponte nocte praesertim in cute erumpentes. Interdum sunt sublividae & nigricantes, nonnumquam rubrae & albae cum inflammatione vehementiori acque dolore, vix fabae magnitudinem excedentes.

*Terminthi* cognoscuntur ex eminentiis seu tuberculis colore ex nigro & viridi rotundae plerumque in tibiis & cruribus oboriantur, & ferè hae tubercula herpeti exulcerato sunt similia.

*Efferæ* cognoscuntur ex pustulis parvulis in cute erumpentibus cum squamis bullarum instar, cum insigni pruritu, & instar ignis sacri, modò hanc modò illam occupat partem, febris instar tertianae comitari solet; confer. *Encyclopaed. Med.*

*Phydracia* facile patent ex vesiculis seu papulis *Phlyctenis* ferè similibus, à quibus vix differunt, hae pustulae in se continent lympham tenuem acremque, quam facile dein effundunt.

*Ficatio*

Ficus.

*Ficatio* seu *Marisica* cognoscitur ex excreſcentia aliqua carnea ſabre majoris, ſeu ficus magnitudinem non multum excedente, quæ oritur non tantum in ano, ſed etiam mento, utero, digito minore, vel oculo, imò etiam in aliis corporis noſtri partibus.

Talpa.

*Talpa* verò cognoscitur ex tuberculo ſeu tumore rotundo inſtar Talpæ acervi, ſub quo etiam cutis eſſoſa eſt, exiſtentibus ſcilicet ſuccis corroſivis tubulos corrodentibus, & cavitatem ſeu foſſulam ſibi comparantibus.

*Mriologia ſecundum Galenicum in Phlycten.*

§. 4. *Cauſas* horum morborum quod concernit, veteres *Galenici* primò *Phlyctenas*, (quæ ipſis ſunt veſiculæ quædam citò erumpentes, humore flavo reſerta, buſſurum inſtar livida; puſtulas ab uſione aque ferventis inductas reſerentes,) à copia humoris, cui conjuncta eſt bilis ſervida ſub cuticula collecta & illam diſtendens, produci ajunt. Sanguinem quoque menſtrum, cum diutius retinetur, & poſtquam biliſus evadit, ſimiles ſæpè tumores excitare docent. Alii ex Veteribus cauſam continentem ponunt in ſanguine nimis ſeroſum ac biliſum, qui à natura ad corporis ſuperficiem detrudatur; procatarricæ verò juxta *Galenum* ſunt omnis generis cibi multum bilis ac ſeri præbentes.

Sudamina.

*Galenici Sudamina* cauſam à nimio ſeroſo ſanguine ad cutem delato & ibidem coctico deducunt, ſerum per ſudorem evanari impeditur, & hoc uſtulum in æſtate contingere aſſerunt.

Epinyctidum.

Cauſa *Epinyctidum* juxta Veteres à cauſa *Phlyctenarum* non multum diſſert, & tantum in eo conſiſtit, quòd hæ exulcerationes cutaneæ nocte magis, quàm die ſiant & infeſtent. Sunt & alii, juxta quos *Epinyctis* à ſanguine aduſto & hepate calidiorè oritur.

Terminithi.

*Galenus* & ejus ſequaces *Terminithorum* cauſam reſciunt in humore atrabilarium à natura in partes inferiores ceu ignobiliores tibias vel crura expulſum.

Eſſera.

*Eſſera* cauſa juxta Veteres duplex eſt, in quibusdam ſanguis nimis cholericus, in aliis pituita falſa atque niſroſa, in aliis ſerum ſaliſum exiſtit, tale enim acre juxta ipſos mordax & immobile eſt, ideoque facile ejusmodi tubercula producit, citoque diſſipatur & evaneſcit. *Forſſius* in ſuis *Obſervat.* hunc affectum ad *Epinyctidas* retulit.

Pydraciorum.

*Pydraciorum* cauſa ad mentem *Galen*i diſſert à cauſa *Phlyctenarum* in hoc, quòd harum puſtularum ſeu *Phlyctenarum* cauſa ſic acrior ac tenuior, illarum ſc. *Pydraciorum* ſic magis craſſum ac minus acre, hinc etiam puſtula ſummam cutem exedentes ſubalbidæ, duræ, acutæ ac ſæpè indolentes, & ſæpè in capite oborti.

Ficus.

*Ficus*, quatenus denotat excreſcentiam aliquam carneam, & quidem vel in oculo ejusque palpebris, cauſa juxta *Galenicos* conſiſtit in pituita craſſa dulci ac inſipida, quatenus verò ſumit pro excreſcentia tumorofa in ano, & idem cum *Thymo* ſignificat, originem trahit ex ſanguine foeculento craſſo atque melancholico, item iſti *ficus*, qui ſunt eruptiones ulcerofæ rotundæ, ſubduræ, rubicundæ, dolorofæ eos ab eadem deducunt cauſa.

Talpa.

*Talpa* metaphoricè ſignificat Tumorem pituitoſum in capite, & quidem juxta *Neotericos* aliquot. *Galenus* dum de *Atheromate*, *Steatomate* & *Meliceride* agit, meminit quidem, quòd

adhuc tumorum ſpecies, in quibus res aliæ contineantur, quæ non humorum modò, ſed & ſolidorum quorundam corporum proprietates præſentent, verùm inquit, quòd rariùs occurrant, ideoque illos nominibus nec vocabulis propriis non donavit, ideoque diverſa nomina, inter alia etiam *Talpa* ſeu *Teſtudo* ab aliis excoſitata ſunt, cujus cauſam ponunt in pituitam viſcoſam ac inſipidam. *Guido* *Talpani* magis reſert ad *Atheroma*, quàm *Meliceridem*, athrinatque, quòd *Talpa* ſit ipſe Tumor, qui vocaretur *Teſtudo*, & cum alia materia reperiatur, hoc in Tumore pituitam viſcidam atque pro cauſa agnoſcit.

§. 5. *Paracellſus* cauſam *Phlyctenarum*, *Sudaminum*, *Epinyctidum*, *Terminithi* ac *Pydraciorum* de mineralem eſſe inquit, & quidem corroſivam, quæ enim corroſivæ ſunt, illæ juxta *Authorem* in depalcentes novæque formas abeunt, puſtulas nempe, *Phlyctenas*, *Eicharam*, *Sudamina*, *Epinyctides* ac *Terminithos* ulceraque his ſimilia efficiences. Puſtulae enim, juxta ipſum, per ſe ſuaque natura nil niſi cruſta, ſeu *Eichara* ſunt: ex una enim eademque materia iſtas fieri contendit, quæ obrem cum *Coffi*, *Saphaci*, &c. ſimiliter ſeſe habeant, ipſorum naturam quandoque puſtulae hæ imitantur, nam ex natura ſalis, ex qua omnes cruſtae ſunt, ſingula iſta generantur. Differencias verò ac proprietates, quibus ſingula inſigniantur, ex *Spermatis* ac *Mineralium* variis corruptionibus ortum habere *Author* contendit. Itaq; cum chaos ad conſtitutionem *Microcoſmi* concurret, pro diverſitate ejus puſtulas variare haud dubitat; nam perinde ut manna jam hæc, jam illa qualitas præcellit, ſic puſtularum ſymptomata diverſa evadunt, quædam cum laxatione, quædam cum vi *Diaphoretica*, quædam cum anodynâ virtute, multis cum in colore, tum primis qualitatibus differentis concitatae ingruentes, uti maniſeſtiùs explicat ipſe *Author*.

*Eſſera* *Paracellſus* provenire ait ex vaporibus mineralium extrinſecorum, ubi calx inciderit aut cachimia, hinc *Eſſera* juxta illum ſervire ſolent in eos, qui ſalia montana, vitriolum aut cuproſam excoquunt; vel cuprum eſſodunt, liquefaciuntque. *Fodinarum* artiſices morbo ſimilium pulmonis cordisque paſſionibus doloribusque torquentur. Cum igitur in ſpiritibus mineralium hæreat hic morbus, nullum per ſe terminum facit, imò potiùs in uno ſtatu permanet. Si enim nodus quipiam tumorque vermiculos pediculorum inſtar ederet, qui poſtmodum in latum extendereutur, cruſtaequerubeas, ut ſunt ſquamæ piſcium producerent, *Eſſeras* fore judicat.

*Ficus* *Paracellſus* ex hæmorrhoidali ſanguine ut plurimum oriri contendit, cum nutritius humor ſeparatus eſt à ſubſtantia ſanguinis, & per porum ſuum emunctorialem penetrat extra materiam propriam, tranſit in excreſcentiam, quæ *Ficus* denominatur.

*Talpam*, ſeu *Teſtudinem*, ſeu *Cellam*, (hoc eſt, id, quod huc atque illuc diſcurrat,) ex ſaliſibus accidentalibus coagulata eſſe dicit, notat etiam, cum *Cella* ex corpore ſuo tranſit in coagulationem, vagationem ſuam retinet & ſecundum coagulationem.

§. 6. *Helmontius* *Phlyctenarum*, *Sudaminum*, *Helmontii*, *Epinyctidum*, *Terminithi*, *Eicharam*, *Pydracii*, opinio de alia.



*causa ha-*  
*vum p: p: m*  
*hacum.*

aliarumque pustularum *Causam* adscribit Latici fermento quodam salino acri infecto, à quo in pelle coagulatur latex, & inde facile excitari has pustulas contendit.

*W: illi*  
*opinio de*  
*causa*  
*Phlyctena-*  
*vum.*

§. 7. *Phlyctenarum* progeniem tribuit *W: illis* particulis salinis fixioribus in sanguine majori copia aggestis, quæ per glandulas miliaræ à cruoris malsa secretæ, ad poros cutis, ut per eos foras evaporentur, tendunt; sed quum ea, quæ donantur, crassities earum exitui obstat, sub cuticula hærent, cutisque poros adimplent atque in eâ coæservantur, augescenque illarum aggestione cutem & cuticulam in tumorem elevant. Fluorem verò assecutæ dominiumque obtinentes cutis fibras acredine sua vehementissimè vellunt ipsasque erodunt.

*Sudami-*  
*nium.*

*Sudamina* ex *W: illis* oriuntur ab humoris lymphici per cutis foramina exeuntis ac sudorem producentis, particulis crassioribus sub cute remanentibus; illæ enim à novis perpetim advenientibus velut superficiem compulsiæ nullumque sibi liberum exitum adinvenientes, sub cute cessitant, illam extollunt, & pustulas in ea procreant. Crassiora verò illa lymphæ salia nerveas cutis fibrillas, in quas impingunt, lancinant & convellunt, doloremque pariunt.

*Epinylli-*  
*dum.*

*W: illis* opinatur, insensilem transpirationem æque non exerceri noctu atque interdum, nec tanta copia & pari libertate humores excrementitios per cutem exhalari. Quando enim sanguis abundantioribus,isque minus volatilibus turget salibus, serosus ille humor, qui ex ipso à glandulis cutaneis separatur, viscidior contingit, & ad exitum ineptior. Quum enim noctu pori superficiei minus patuli existant, spissiorilla lymphæ per ipsos viam sibi parare nequit, & sub cute remorari cogitur: & in ipsa aggesta eam in tumorem elevat. Sanguinis verò vas ab humore isto excrementicio in cutis substantia stagnante compressis, cruor in suo motu retardatur, qui ideo moram faciens mox corrumpitur & excaulescit, inflammationemque parit, cui adiungitur dolor à salibus nerveas cutis fibras pungentibus inductus.

*Termin-*  
*ibi.*

*W: illis* *Terminithum* progigni contendit ex sanguine corrupto & coagulato in minores grumos concrecentes; tales enim grumuli cum reliqua cruoris massa per universum corpus delati, & ad superficiem per arteriarum oscula protrusi, in partibus à corde longè distitis, ubi sanguis minori motu agitur, in cute desiguntur, atque remorantur, ejusque interstitia opplentes eam in tumorem extollunt: Liquor verò nervosus adveniens talem depravatam sanguinem in partium substantiam convertere non valens, tubercula ex eo efformat. Sal autem, quod tales in sanguine concretiones produxit, à calore partis actuatam fibras circumpositas aculeis suis impetit, easque erodit & exedit, ac foveam sibi excavat.

*Esferum.*

*Esferum* oboriri vult *W: illis* ex humore lymphico in acido-salâ indolem commutato, sub cute, quam in tumorem elevat, aggesto, & è sanguine ex vas à tali acriore humore erosum erumpente, atque cum ipso commixto, & à sicco nervoso in extuberantem carnem cum pustulis à seroso liquore exortis convertit.

*Phydras-*  
*tum.*

*Phydracia* provenire ait *W: illis* ex seroso humore per cutis foramina exhalari solito, paulò quam par est viscidioris & acrioris. Liquor autem

iste, quum cutis poros ob spissitudinem subire nequeat, sub ea retinetur atque colligitur, illamque in tumorem elevat, acredineque, qua prædicta est, fibrillas ejus dissecat ac dissindit.

*Ficis* originem adscribit Author noster succo *Ficis*, nutritio spissiori, ob visciditatem suam in parte quadam residenti. Liquor enim nervosus adlocum illum accedens humoremque nutritium mollioribus particulis refectum ibi aggestum reperiens carnem superfluum staccidamque ex illo producit.

*Talpam* *Topinariam* fieri asserit *W: illis* à sero *Talpam* copioliori in sanguine aggesto, abundantique sale, eoque fluore adepto, refecto, quum enim sanguis recrementa sua in variis emundatoriis deponat, & in glandulis cutaneis portionem feri, quo gravatur, relinquat, poros cutis, per quos foras eliminari debet, infarcit & obstruit, si salibus crassioribus fixioribusque scatet. Cutis ergo spiracula pervadere non valens & sub ipsa remorari necesse habens, in illius interstitiis coæservatur & congeritur, eamque distendit, atque extollit. Salia autem mole gaudentia & acutis cuspidibus donata, sibi oppositas fibras erodunt & dissindunt, cuniculosque continuatâ actione sua in partibus agunt.

§. 8. Quamvis *Sylvium* non ex professo de hisce *Sylvi* diversis egerit pustularum speciebus, attamen ex ipsius principis facile causæ earum deduci possunt, solemus enim hoc in opere omnia Authorem complere, quæ omiserunt. *Phlyctenas* itaque, *Epinyctides*, *Terminthos*, *Esferas*, *Phydracias*, aliasque pustulas produci credit à partibus succi pancreatici acrioris tum humoris formæ ad cutem delatis. Pustulas dicit alias squamosas & scabras, alias acrem liquorem sive serum simul effundentes, alias nullum, sed siccas esse, aliquando pruritus molestem habere conjunctum, aliquando nullum aut levem duntaxat. Non deducendas proinde vult pustulas venereas à sale lixivio vel fixo vel volatili, sed ab acido plus minusve fracto ac temperato. Prout namque illud plus aut minus infringitur, gravius idem aut levius sæviet in cutim, atque pruritus graviorem aut leviorém producet. Ubi autem acidum illud acre magis est concentratum, pustulas juxta Ipsum producet magis aridas: ubi contra idem est magis solum minusve concentratum, pustulas producet madidiores ac serum aliquod stillantes, imò celerius serpentes. Ab acido ergo acrimonia plures deducit pustulas.

§. 9. *Cartesii* ortum pustularum præsentium *Cartesia-* adscribunt succis cutaneis, chyloso nempe nutritio, & lymphæ vitiosæ se habentibus, adeoque tum in motu impeditis, & uno vel altero loco circa glandulas inter cuticulam & cutem firmius hærentibus, tum particulis acutis angularibus refectis. Ità *Phlyctenas* suscitari autumant, dum chylus nutritius lymphæ acidiori dilutus ab externa quadam causâ, frigore nempe, igne, vel medicamentis ad superficiem corporis allicitur, & cutim perforando cuticulam distendit atque in tuberculum propellit. Cum verò particule illæ acutæ subtiliores sint, & non tam copulatæ, quam hæc illuc dispersæ, pustulas etiâ non adeo magnas, sed minores & plures emergere pronunciant, nisi temporis tractu cuspides istæ acutæ ab æthere frequentius agitatæ plures disfringant & erodant tubulos cutaneos, & hinc pustulas augeri, & in sul-

in sulcis liquores corruptos colligi, qui diversis particularum in se contentarum figuris modò radios luminare dispersant, modò suffocent, modò varie reflectere cogant, & propterea diversos etiam pustularum harum conspectui dari colores. Quasquumque etiam corporis partes huic morbi generi obnoxias esse asserunt, ad quas lymphæ pertingere solet, adeò ut nec oculorum tunice ab eo degant immunes.

*Sudaminum.* *Sudaminum* originem impuunt lymphæ resolutione, & cum sudore quidem extra poros cutaneos eiecitæ, sed ob causam quandam externam, præsertim diuturniorem obfectionem circa cutem collectam, cuius particulæ acutæ sive acres cutem erodant; vel fieri docent, dum inter sudandum corpus detegatur, & frigus externum ambiens poros cutaneos subito ocludat, ut lymphæ & liquores eliminatioi destinati inter cutem & cuticulam restare cogantur, & coagulati pustulas & maculas producant. Quòd verò, juxta *Hippocratis* effatum, plerumque genitalium partium summam cutem occupent, hoc ideo fieri censent, quoniam partes hæ ob partes adjacentes, femora præsertim, continuo foveantur calore, & ad glandulas inguinales major lymphæ deferatur copia, unde perpetuo quodam madeant sudore.

*Epiphytides.* *Epiphytides* suscitari credunt à lymphæ glutinose tubulos cutaneos obstruente, cui adhaereant multæ particulæ lanceolatæ acutissimæ fibras cutaneas dilacerantes, & propterea magnum dolorem & tandem etiam ulcusculum producentes, in quibus lymphæ illa glutinosior tantquam in sulcis colligitur. Noctu verò tum oriri, tum maxime excruciare volunt, quòd tum temporis liquor ille crassius ob caloris defectum tardius commoveatur, & globuli secundi elementi fibras cutaneas versus lanceolas illas fortius premant, unde & major obstructio, & fortior dolor exoritur, radii etiam luminare suffocantur, & ater in illis color vel lividus conspicietur.

*Terebinthi.* *Terebinthum* ex succo chyloso crassiore & spissiore in tubulo quodam stagnante & fibras cutaneas valde distendente produci docent, unde non modò tuberculum exurgat, sed cum ex lymphæ variz quædam ei afflorentur particulæ diversarum figurarum, cuspidatæ & porosæ, pro earundem motu & situ diverso interdum fibrulas quasdam cutaneas distingi & pustulas excitari, tum radios lucis quosdam suffocari, quosdam verò leviter refrangi, & colorem inde emergere atroviridem, quo tubercula ista superbiunt, & figura sua terebinthi fructum repræsentant.

*Efferas.* *Efferas*, *Pemphigæ*, sive *Ampullæ* excitari volunt à lymphæ multis particulis angularibus mucronatis resecta, in plurimis glandulis cutaneis hærente, & tubulos obstruente, cui admisceatur de chylo crassiori portio quædam, quæ poros angustando soli materiz æthereæ subtilissimæ transitum permittat, hæcque celerius commota fibrulas variz verberando inflammationes producat. Cum verò lymphæ nondum depauperata sit salibus suis volatilibus benignis & partibus spirituosius, idè succum chylosum crassiorē brevi attenuari & resolvi, angulosque acutos mitigari dicunt, & tubercula etiam brevi recedant, sed quoniam ista resolutio & mitigatio non sufficiat ad fluiditatem plenè restituendam, propterea eadem citò satis redire asserunt, & se-

pe levi quadam de causa externa subito refrigerante, aut terrorem incutiente, unde fibræ cutaneæ constringantur & pori angustentur, in locum de novo produci.

*Psidracia.* *Psidracia* ortum trahere putant à simili quadam tubulorum obstructione à lymphæ crassiori, sed particulis mucronatis non adeò resecta, inducitur, & præsertim in glandulis cuticularibus capitis sedem figente, quapropter tubercula hæc duriuscula quidem, sed minus dolorosa esse fatentur, quòd fibræ cutis membranis non adeò perungantur.

Quocumque in corporis loco excrescat *Ficula*, *Ficula* eundem à succo nutritio sive chyloso crassiore promissi statuunt, dum aliquo in loco nimium augetur & stagnat, ut fibræ propterea valde extendantur, & nonnunquam nervosæ quædam dirumpantur, hinc liquor nervosus copiosius effluens chylosum fortius ad exteriorē corporis superficiem propellat, cui cum novus assiduus succedat, extuberantiam hanc ulterius ajunt capere augmentum, & succum intus contentum adeò interdum inspissari, ut ob siccitatem in grakula ficuum semini non abimilia secedat.

*Talpa.* *Talpa* oriri existimant à chyli sive succi lactei particulis crassioribus & coagulatis inter cutem & cranium potissimum collectis, eo quòd ductus chylosi sive lactei à particulis acutis lymphæ corruptæ prius intercoctæ, & liquor exiissem effluens acidior chylosum coagulet, qui stagnans cutem in tumorem distendat, lymphæ verò acrior relictiis particulis illis ad effervescentiam & motum ulterius ineptis, ad vicinas partes serpens mediante materia ætherea cum succis earum de novo confictum ineat, fibras dirumpat, destruat, & effusum chylum, ut priorem denuò coagulet, sicque novam producat protuberantiam, instar talpæ terram perfodientis, & tumulis in eadem projiectis.

§. 10. Pervenimus denique ad hoc unum affectum cutaneorum causam nostrò judicio deducendam, & in genere dicimus, ubi congeritur, quòd vel propter abundantiam particularum crassarum, *Quinarum* vel acidarum magis vel minus corrosivarum in toto sanguine & humoribus, vel propter actionem fortuitam ab igne aliore externo vel interno, hic illic in poris tubulisque cutis (quæ longius à corde distat, in injuriisque externis magis est obnoxia,) fiat obstructio, illico diversi generis oriuntur maculæ vel albicantes, vel nigricantes, lividæ, cæruleæ, rubescèntes, vel etiam si major gradus corrosionis adfuerit, oriuntur pustulæ & ulcuscula, quatenus videlicet fibrillæ propter acridinem abscissæ in cincinnos resiliunt, lymphæque nutritioni aliàs dicata in cavitatem deponitur, quæ igni exposita vel aëri facile exsiccat, utpote viscosa & gummosa. Pro diversitate nrsus harum pustularum & ulcusculorum ratione majoris vel minoris humiditatis aut acridinis, hos vel illos lacerant corroduntque tubulos.

Porro pro minimis harum pustularum diversitate, ratione figure, magnitudinis, vel pertinaciz, vel quatenus cum aliis morbis conjunguntur, varia iis imposita sunt nomina, & causæ aliqua diversitas occurrit, hinc paucis & quidem nostrò judicio ita sunt deducenda.

§. 11. *Phyctena* possunt dici species inflammationis minimæ, cum tuberculos afficiuntur enim hic vascula lymphatica continentia lympham

prægnantem diversis particulis salinis acutis, & viscosis chyli obvoluit, quæ ed delatæ tales pustulas cutem elevando excitant, prout eorum tubulorum textura magis vel minus compacta dilatare possit, cum fiant pustulæ vel majores, vel minores. Sic ab externis causis vel frigore coagulante iucralanteque lympham, vel etiam ab internis succis salinis ac terrestribus particulis scatenibus, in fermentationem facile transeuntibus itidem excitantur.

**Causa Sudaminum.** Cum per cutem porosam necessario continua peragitur transpiratio, hinc facile fieri potest, ut cum lymphaliis succis, salinæ acidæ terrestresque particule simul eliminentur, quæ verò nimis crassæ exitum haud invinentes in glandulis cutaneis stagnare coguntur, hinc obstruuntur tubuli, qui & dein eroduntur, uti & sæpius in aliquibus sudantibus ab impedita transpiratione ejusmodi pustulæ *Sudaminem* nominis insigne oboriuntur, cum enim tubuli eroduntur, exstillat lymphæ vel ichor tenuis, vel chylus remanente viscidior in cuticula textura ista mirabili & sudamina representant, frigore quoque externo accedente, imprimis si corpus nostrum prius sudore maduerit, facile succi in tubulis glandulosi cutaneis existentes coagulantur, & sic huius generis pustulæ produciuntur.

**Causa Epinyctidum.** Causa *Epinyctidum* est itidem particularis inflammationis, & cum ut plurimum hic affectus nocturno tempore excitetur, & dolorem intensum comitem habeat, necessario sequitur, ipsum oriri ex obstructione tubulorum angustiorum varietateque intortorum, in glandulis cutaneis à secedentibus ex cæterum contubernio particulis imprimis acutis irregularis texture, & quidem pungentibus, sicque dolorem inferentibus fibrillis se inde irritatis, & in cincinnos adactis, à fortiori etiam acido succo figente Livor inferitur.

**Terminibus causis.** *Terminibus* oboriri solet, lymphæ si sit debito acrior, absumtis & fugatis aëre aquosis & volatilibus particulis, effusa enim lymphæ acris fermentescens, punctione particularum acutarum in fibrillas nervorum pruritum & sæpe dolorem excitant, & pro majore vel minore acredine sanguinis ac leucorum, acrior vel secus aliis vicinisque tubulos erodens, imò si conjuncta est lues *Grea* ipsosque capillorum radices exedens, vel *Scorbutum* comitans, eadem enim ferè est causa *Læis Venereæ*, ac *Scorbuti*, sal enim acre ac corrosivum in sanguine ac luccis existens, & ad cutem delatum ejus tubulos cutaneos erodentibus, imprimis verò in tibiis & cruribus existentibus.

**Essera causa.** Cum *Essera* aliquando squamulas conjunctas habeat, ex hoc phænomeno pro certo concludi potest, quod lymphæ in *Esseris* sit debito viscosior, absumtis particulis aqueis & tenuibus, concrevit in squamulas seu crustulas, imprimis si adfuerit sanguis & lymphæ salinis particulis rigidis ferata, quandoque non constans est, hinc lymphæ.

**Psudracii causa.** *Psudracia* haud multum in causa differunt à *Phlyctenis*, cum obstructio sit in hoc casu in subcilioribus & superficialibus cutis glandulis, & lymphæ est etiam tenuior & acrior, epidermidem facile elevans & inter eandem & cutem se effundens, sicque papulam vel vesiculam produciens.

**Causa Fici.** Causa *Fici* latet sæpe in sanguine & succis, cum debita inter sanguinis particulas non est

proportio, ac proin intestinis motus (seu intestina agitatio,) non rite procedit, prævalentes enim (cum nec chylorum seu vicidarum fiat attenuatio,) particule crassæ viscosæ, terrestres & salinæ vel acidæ sibi mutuo adherentes facile, levique de causa in angustissimis à corde remotissimis tubulis, h. e. in extremitatibus digitorum, vel alibi in cutaneis tubulis sistantur, & sic in inducunt, hic eniur major visciditas cum acido adesse videtur.

**In Talpa topinaria lymphæ acrior aliquando visciditatem conjunctam habet,** hinc acredine suæ quidem tubulos corrodit & evasatur, sed ob visciditatem lentè gradum simul facit, & sic sub cure ceu Talpa sub terra fodiendo hunc affectum producit.

**§. 11. Phlyctene** quamvis ex se periculo vacent, sæpè tamen si non rite tractantur, in herpetem degenerant.

**Sudamina** nullum periculum inferunt, sed cum deformitatem inferant, à sexu sequiore sepe curatio exoptatur.

**Epinyctides** quoque periculose sunt, sed maximam descædationem cuti inferunt, & facile exulcerantur, quæ exulceratio haud difficile curatur.

Si *Terminibus* lues *Grea* non comitem habeat, nil periculi adest, sed facile in herpetem exulceratum transit, & difficile illi sepe sanatur, imprimis si scabiem vel prædictam luem conjunctam habet.

**Essera & Psudracia** carent omni periculo, facileque curantur, at facile etiam redeunt. Præcaveant tertianamali quandoque sunt ut tertiana.

**Fici** est affectus diuturnior & difficilior curatu, quia humores viscosi actenaces non facile sunt dissipabiles.

**Talpa** est etiam curatu difficilis & facile in ulcus, seu fistulam transire potest.

**§. 12. Prognosis** perspicua nunc ad *Cutem Diabeticam* nos conferamus: Cum verò omnes hi affectus vel ab obstructione, vel ab erosione producantur, necessario *Diabetica cutis* dirigenda est, ut obstructio & erosio impediatur, hinc aer sit temperatus; cibi sint boni succi & optime nutriendi, fluidi ac calidi, exulent frigida alimenta, exlucca, viscida ac terrena, salina, acida, inuratica, quæ simul obstructionem & erosionem inferre possunt. Potus esto calidus, imprimis Theæ vel Caffæ, vel alius Decocti, santalini, vel lignor. vel si placet cerevisia ac vinum, variis aromaticis ac resinosis maritentur, vel in vino assumatur aliquid salis volat. C.C. vel oleos. Sylv. vel nostr. fiantur autem potulenta frigida glaciæ refrigerata, cerevisiæ crassæ ac acidæ, item vinæ austera ac acida. Somnus, vigilie, motus & quies sint ad justum modum instituta, excreta, & retenta sint more solito & consueto seu ordinario sanorum similia. Animi pathemata fortiora & exagitantia angue pejus fugiantur, ut Ira, metor, invidia, &c. cum his vel exagitantur succi bene antea mixti, vel magis coalescantur.

**§. 13. Nunc Curam** horum affectuum ad *Galenicorum* examinemus, & quidem curam *Phlyctenarum* prius exponentes, quam instituunt observando *Diætam* refrigerantem, humectantem & diureticam, dein ad *Hepar* respiciunt. Curationem ergo præmissis universalibus (si opus) decocto lentum, & Epichemate ex lixivio forticum cineribus fagi parato, deinde oleo lini ac nucum aa. p. æq. mixto perfici.

# CAP. X. DE PHLYCT. SUDAM. EPIN. TERM. ESS. &c. 581

perficiunt. Quamprimum pruritus, dolor & rubor apparent, sequens statim applicant:

*R. Bol. Armen.*

*Coriandri pulv. aa. ʒß.*

*C. l. q. aq. rosar. F.*

*f. a. Linimentum.*

Quod fulceretur accipiunt adipem suillam, liquefaciunt & cum l. q. spumæ argenti minutiss. pulv. efficiunt linimentum pustulis his applicandum, cui & sulphuris pulv. parum addunt, & sic efficacius reddunt.

*In sudamini-  
bus.*

Cum *Sudamina*, juxta Veteres, ex nimio sero in sanguine contento oriuntur, quod in cute coërcetur, densatur, ac per sudorem evacuari prohibetur, hinc curationem Veteres institunt primò hydragogis seu serum evacuantibus medicamentis: secundò topicis, & quidem Epiphemate ex aq. folliculorum quercus, cum aliquot granis camphoræ mixtis.

*Epiphy-  
ditus.*

Cura *Epiphyditum* ad nentem Veterum consistit primò in ordinato victu, ut nempe omnia acia acida & falsa vitentur: secundò in materie antecedentis per venæ sectionem & purgationem ablatione: tertio in applicatione Topicorum. Veteres ergò hisce pustulis seu exulcerationibus medentur brassicæ, cicutæ, vel solani, vel hyoscyami, vel thami, aut plantaginis foliis cum melle impositis. Egregie etiam ab ipsis laudatur calx cum oleo ad mellis consistentiam subacta imposita, itidem Laser cum aquâ omnium florum mixta. *Oribasius* verò oleosâ non admittit vult, & loco olei aceto cum vino utitur, admonetque, ne acia, acida aut falsa medicamenta adhibeantur. Vitari etiam jubet iomenta, balnea & Solem.

*Termin-  
abo.*

Juxta Veteres *Terminaborum* curam similem esse dicunt medelæ pustularum nocturnarum, seu *Epiphyditum* jam modo relatæ.

*Effertur.*

Curationem *Effertarum* Veteres tribus remedium generibus peragunt, sudore, balneo aquæ dulcis, & farina secalinâ; sudore enim juxta illos causa evacuat, quâ proligrat affectus etiam desinit: Balneo aquæ dulcis humor salis inordax, nitrosus & cholericus mitigatur, porisque apertis sensibilibus & insensibilibus eliminatur. Si vero opus sit universalibus uti, tunc illa exhibenda esse, nec diuretica negligenda, monent.

*Psydrasa.*

Curatio *Psydraciorum* juxta *Galenum* ejusque sequaces, (præmissis universalibus præsertim cephalicis aut caput purgantibus:) sic applicatione discutientium ac refrigerantium, æquali portione mixtorum, imprimis sequens commendant:

*R. Argenti spuma,*

*cerussa aa. ʒiv.*

*aluminis,*

*rutæ folior. virid. aa. ʒij.*

*ex aceto myrteosq. oleo*

inungunt. Magis autem proficere ajunt ea, quæ humiditate scatent. Ad *Psydracia* calidissima & fera commendat farinæ fabarum ʒij. cum vino exceptas, & ad cerati formam redactas & illitas.

*Vim.*

*Ficus* curationem quod attinet, quatenus excrecentiam aliquam carneam denotat, præprimis Veteres intendunt supputationem prohibere, ideoque per pilulas cochias causam, seu materiam peccantem evacuari volunt, deinde discutientibus; hisce verò non juvenibus, emollientibus ad supputationem promoventibus

utuntur. Exulceratis verò sicibus ceratum citrinum vel pulsam ficis melli mixtam imponunt. Quatenus similitur pro excrecentia tumoreis applicant sequens.

*R. Squam. aris,*

*Sandarac. aa. ʒij.*

*Alum. sciss. ʒij.*

*M.*

Per se singula terere jubent, ac cum rosaceo miscere ac imponere imperant.

Ad *Ficosus* in capite ac mento pustulas medicamentum sequens applicant:

*R. Myrtos ʒiß,*

*chalcidius ʒiß,*

*squama aris ʒi.*

*aluminis sciss. ʒß.*

*M. h. c.* sic cum toto largè imponunt. Laudant enim his in pustulis alumen scissile, flores aris, & gluten taurinum, tum squamam aris, quæ dupla sit, teruntque ex aceto & illinunt. Probatum etiam ab ipsis capita menularum combusta biscocta, & cineres unâ cum aceto commixti.

Curationem *Talpe Topinariæ* Veteres juxta *Am-  
Talp.* nus & magis à Steatomarum curatione differre statuunt.

§. 14. *Paracelsus* in curatione *Phlyctenarum*, *paracelsi  
Sudaminum*, *Epiphyditum* ac *Terminabi*, alia cura in  
rumque pustularum sequenti modo incedit. *Hye-  
pustula*  
malibus instantibus pustulis per Solem. i. e. per *hies*.  
Medicinas reiolventes curationem aggreditur,  
è convectoria àstiva ingruente influenza per hyme-  
malia, i. e. coagulativa remedia malum attentat.  
Sin alia forsitan intempestiva ingruant impres-  
siones, ut sunt grandines, ros, pruina, &c. nil  
admodum juxta ipsum laborare oportet, cum ult-  
trò successu temporis aboleantur. Quod si verò  
astali elemento generaretur quodpiam Crystatillo  
ac Berillo simile, tum ipsum, quod generatur,  
serè fixum est, nec tam facile loco movetur, nisi  
illa coagulatio in tantum infringatur, ut nun-  
quam deinceps ad coagulationem pervenire  
queat, namque ejusmodi Elementi ignis pro-  
prietates est, talemque naturam quandoque pustula  
referre cernitur: corpus enim penetrant, ut  
sine negotio nunquam deinceps evellantur, sed  
omni ex parte Berillo eorum naturam referant. Si-  
mili planè ratione nimirum ventorum instar, do-  
lores punctiones, veltigationes, &c. contingunt,  
itaque in curandis illis observat. ne quid-  
quam agerent nisi prius exitu quærere possit  
prepararo. Curationem ergò per suffocationem  
pustularum maxime improbat author, quas  
pustulas catharticoorum usu non curari asscrit, sed  
potius commendat sua Diaphoretica arcana. Ex-  
ternè laudat Alumen rupeum, pluniosum, sal fu-  
sum, Entali, Vitriol. alum. sciss. vel sequens:

*R. Succ. agrimon. ʒi.*

*deporris ʒß.*

*olei anethi. ad pondas omnium.*

*F.* mixtura, cui pannum intinges, hanc superponit non aspergendo.

*Vel:*

*R. Aq. glutinis,*

*rosarum aa. ʒvj.*

*parthenomus ʒv.*

*M.*

*Vel:*

*R. Olei lini ʒß.*

*aris viridis ʒß.*

*M.* quo illinantur pustulæ.

*Dddd 3*

*Effertur*

*Efferas Paracelsus curare facit sequentibus:*

℞. O. li ex *Juniperis* lbj.

*amgd.* dulce. lbj.

*de coſte* ʒviij.

*M.* Fiat mixtura: poſtremum ſit ſicuti oleum de Guaiaco, aut buxo. Oleum de Juniperis non ſeri vult per delenſum, ſed oleum de coſte, h. e. ex ſagino ligno. Vel:

℞. Olei de Spica ʒb.

*quercini* lbij.

*Axungia cati* lbj.

Commisceantur: ungantur, & his oleis præſervabuntur à ſpiritibus, qui morbum hunc generant, quia unctioſitas illa non ſinit hujusmodi ſpiritum ſubintrare. Natura quidem, juxta Ipſum, aluminis eſt officiūque, ſindere. Cum tamen his cutis perſeueret ſinerit axungijs, tales ſpiritus nullos recipit, qui ſibi detrimentum inferre valeant.

*Ficuum curam* Paracelsus duplicem eſſe ait, unam abſolvi ſtercoralibus medicamentis, alteram verò ſeri dulcibus corroſivis, Authoris verò corroſivum dulce ſequens eſt.

℞. Olei laterini ʒi.

*de juniperi* ʒb.

*ex myrrha* ʒij.

*M.*

Corroſivum dulce dictum cum aceto ſequens eſt:

℞. Olei laterini ʒj.

*Aqua aluminose* ʒb.

*Viriditatis ſalis ad pondus omnium.*

Cura de ſtercoribus ſequenti modo peragitur. ℞. Patientis dejectum ſtercus, *M.* cum oleo de vitellis ovorum. Premat patiens (ſi exiſtant in ano,) ut exeant, quibus tunc medicina ſuperponatur.

In cura Talpæ ſeu Teſtudinis, ipſi *Paracelsus* & *Celſus* dicunt, cavendum eſſe ait Author ab unguentis, unctioſionibus & corroſivis. Cura ergo Ipſius talis eſt, ut regio circumdetur ejus alumine plumoſo, & poſtquam elſchara decidit, ſuperponit opodeltoch: hac via Teſtudinem putrefieri ait in ejectionem, & communibus emplaſtris curam concludit.

*Helmontius* ʒ. 15. *Helmontius* in curationibus harum puſtularum pauca admodum revelat remedia, omnemque operam latice corrigendo impendendam eſſe ſibi aliisque perſuadet, qua virtute in *Phyltensis*, *Sudaminibus*, *Epinidibus*, *Terminis*, *Effers*, *Pſydracio*, *Ficui* & *Talpa* *Topinaria* præ aliis ſalem nitri viribus perquam pollere exiſtimat.

*Willigiviro* ʒ. 16. *Willigiviro* *Phyltensis* curat humorem glanduloſum jam corrigendo ſemento alterationem illius producente penitus extincto, & poros cutis referando, venâ ergo ſecta, corpus hoc medicamine expurgat:

℞. Sulphur. ʒiiij gr. viij.

*Scammom.* ſulph. gr. viij.

*Crem.* Tri ʒb.

*M. f. pulvis.*

Deinceps ſequenti cereviſia medicata uti jubet.

℞. Rad. polyod. qu.

*lapath.* acut. aa. ʒiiij.

*ſenn.* op. ʒiv.

*Epithym.*

*Turbitib.*

*mechoacann.* aa. ʒij.

*ſantal.* circ. ʒj.

*ſem.* coriandr. ʒvj.

f. a. præparentur, fiat ſacculus pro iij. congiis cereviſiæ, poſt ʒ. vel 6, dies hauriatur, & ſumatur ad ʒij. plus minus omnimane per viij. vel x. dies. Diuretica etiam exhibet ad ſaliſus iſtus ſerum per urinas evacuandum: *Diaphoretica* verò imperat ad poros aperiendoſ, materiamque excrementitiam foras per eos eliminandam, ſed quum, ut jam alibi dictum, tales affectus vix abſque topicorum auxilio evaneſcant, partem illam ex unguento facto ex radicibus oxylapathi in butyro cum vino albo coctis ad vini conſumptionem, & oleo Tartari per deliquium f. q. admixto.

*Sudaminum* curam inſtituit poros cutis referando & relaxando, crāſſioresque ſaliſas particulas attenuando, & per ductus communes ejiendo. Præmiſſis enim univerſalibus, ſi conſultum fuerit, *Diaphoreticorum* ope poros aperit, & deinceps balneis aque tepide cutem relaxat. Si verò his non cedat affectus, Diuretica in uſum advocat; & tandem decocto ex ſulphure & vegetabilibus parato partes tepide fovet.

*Epinidibus* tollit anguſtiores poros aperiendo, *Epinidibus* & crāſſiorem lympham attenuando, ac foras deducendo, ad quem finem lignorum decoctum commendat, aliorumque ſudoriferorum, uti & Diureticorum uſum laudat.

*Terminibus* ſanat, præmiſſo medicamento quodam *Diaphoretico*, carnoſis iſtus excreſcentiis inſpergendo pulverem compoſitum ex offibus ſepiæ, pomphol. ceruſſi, & pauco alum. uſt. aut æt. uſt. & ſi hiſce non pareant, ungu. *Egyptiaco* illas illinit.

*Efferas* delet humorum recrementitiorum excretionem per cutis foramina promovendo, unguentoque ex unguento pomato, conchil. uſt. pauc. ciner. tabac. & parva quantitate ſabina pulveriflat, carnem ſuperfluam auferendo.

*Pſydracia* fugat lymphaticum humorem attenuando & demulcendo, ac per vias ipſi deſtintas expellendo; à purgatione verò auguratur, ipſique ſudorifera ſubjungit, quæ propoſitum ſinein non aſſecuta fuerint, ea ſubſequentur Diuretica, ut ſunt ſerum lactis, & acidiule martiales.

*Ficuum* diſſipat ſuccum nutritium decocto quodam ſudorifero ſubtiliſando, ipſique trochiſcum ſequenter applicando:

℞. Mercur. ſubl. corroſ. ʒj.

*opii* pulv. ʒj.

*mucag.* gum. tragacanth. q. ſ.

ſiant Troch. l. a. magnitud. piſ. ſerv. ad uſum.

Deinde ulcus digeſtivo communi ſanat, illudque ad conſolidationem perducit.

Ultimò *Talpam* *Topinariam* *Willigiviro* proſligat Diureticis copioſiore ſerolum liquorem excrendo, ſalſamque ejus Diatheſin ſequenti vel ſimili electuario corrigendo.

℞. Conſerv. rad. lapath. acut. ʒvj.

*ocul.* ʒ. pp.

*corall.* pp. aa. ʒj.

*Ebor.* ʒj.

*lign.* aloes.

*ſantal.* circ. aa. ʒib.

*ſal.* prunell. ʒij.

*Q. li* ʒ ʒib.

*ſyr.* è ſucc. injud. l. q.

*F. Elect.* doſ. ʒij. cui ſuperbib. aqua ſequens:

℞. Fol.



℞. Fol. tamaric. q. pl. in massam contusa ponantur in olla fictili vitreata cum operculo, quæ clibano post panes extractos indita, stet per horas sex aut octo. Dein massa in columella fusula, liquor clarus effluat, cujus dosis ℥iv. aut ℥vj. eaque usurpari potest extra Electuarium.

Sylviis de  
curandis  
hæc in-  
herculis  
ententia.

§. 17. Sylviis in pustulis quibuscumque Phlyctenis, Sudaminibus, Epimphidibus, Terminibus, Esseris, Psidraciis, & Tulpis curandis interna commendat sudorifera, imprimis laudat decocta lignorum, & salia volatilia. Externè etiam etiam magnificat decoctum lignorum, quo soveri vult pustulas, quæ si non sufficiunt, accedit ad sal suum volatile cupri Tinctura imbutum, quo pustulas scdæ & plane malignas feliciter curat. Dein quandoque ubi sc. suspensio est de lue Venerea, ad fortiora transit, & pustulis applicat Mercurium præcipitatum alicui unguento immixtum.

Carthesi-  
anorum  
modum en-  
curandi  
Phlycti-  
nas.

§. 18. Carthesiani talem subministrant Phlyctenas curandi rationem, qua acutè particula porosis medicamentis absorbeantur, & extra corporis meatus eliminentur, tum tubercula aut pustule emolliantur, aperiantur, & materia intus collecta eximatur, post hæc ulcuscula mundentur, abstergantur & consolidentur. Lympham proinde asperioribus refectam salibus ab iisdem liberant sudoriferis ex fumaris, scabiosis, & io diaphoretico, bezoardico minerali, sale cardui benedicti, spiritu florum sambuci, tinctura tartari, vel etiam decocto lignorum & ejusmodi alius sudorem elicientibus, particulas asperiores mitigantibus & cum sudore ejicientibus. Pustulas postmodum ipsas attingunt spiritu florum sambuci, terebinthinæ, camphoræ, aqua calcis vivæ, decocto ficuum, vel linimento ex farina fabarum, seminis fœnigræci. oleo nucum & succo oxylapathi illinunt. Hæc si pustula non abigantur, easdem aperiunt, liquorem intus contentum acriorem linteo tenero leviter expriment, ulcuscula abstergunt aqua florum sambuci, hyperici & plantaginis, in quibus flores sulphuris & sal si fuerint dissoluta, & unguento de tutia vel diaphompholygos omnimodo tentant sanare.

Sudamina

Sudamina abigere tentant similibus sudoriferis, ut poricuteanei aperti incongruunt emittant, & reliquæ incrassatæ resolutæ & fluidiores redditæ convenientes repetant ductus, quapropter C. C. Philosophicè præparatum cum cinabari antimonii satis conveniens hic existere dicunt remedium, ad proliciendum sudorem intus assumptum. Sudore probè promotò autem studiose abstergunt, & ipsas efflorescentias spiritu florum sambuci & succo hyroniæ cum camphora mixtis calidiusculè abluunt, & pulverem ex farina lupinorum, myrrha, olibano & lithargyrio iisdem aspergunt, abs quibus particula acres facillimè absorbeatur & cutis apprimè mundatur.

Epimphidibus

In Epimphidibus sudorifera laudent subtilia, poros cutaneos citò aperientia, lympham crassiorem resolventia & attenuantia, nec non particulas angulares acutas, sive sales acidos acres mitigantia, quorum ordini includunt spiritum theriacalem camphoratum, electuarium diascordii, rob sambuci, cinabari ℥iij, & volatile C. C. Pustulas etiam aperiant, & aqua theriacali abluunt, tum unguento aureo, vel linimento ex oleo hyperici, calce viva, & camphora sanant.

Sudorifera etiam in Terminibus ducunt necesse. Terminaria ad lymphæ coagulatæ cum succo nutriente ibidem.

resolventem, post quæ forinsecus emollientia adhibent, uti sunt essentia radices terophulariæ, cum spiritu gummi ammoniaci calidè adhibita, emplastrum diachylum simplex, vel cum gummis, vel de ammoniaco Foresti. Si discutiente, sed ad supurationem vergat, eam promoveant, post hæc apertionem instituunt, & expressa materia purulenta spiritu matricali ulcusculum aliquoties abluunt, & imposito emplastro diapalmæ vel de gratia Deinde occludunt.

Ad Esseras abigendas, & reditum earum præcavendum, sudorem admodum etiam sudant proficuum, quem sequenti potissimum prolixiunt potiuncula.

℞. Aq. rorismarin. ℥b.

flor. sambuc. ℥ij.

℥ Diaphoret. ℥j.

℥ scabios. ℥b.

ol. d. corr. citr. gutt. iij.

Syr. fumar. ℥iij.

M. d. exhibetur una vice.

Post sudorem balneum instituunt ex herbis agri-moniæ, scabiosæ, silviæ, beronicæ, alchimillæ, furturibus, argillæ & aliis. Mixture etiam fortis adhibent ex aquis hyperici, florum fabarum, sambuci & lacte sulphuris cum camphora. Aquam calcis vivæ cum io hoc etiam in morbo non credunt ineptam esse existuram.

Psidracia abigere student blandioribus sudoriferis, præsertim puerorum capita instantia, quapropter sequentem mixturam apprimè convenire promittunt.

℞. Aq. scabios. ℥b.

Essent. rorismar. ℥j.

fumar. ℥b.

liq. C. succinar. ℥b.

Syr. card. bened. ℥ij.

M. d. cochleatum.

Ipsas hæc pustulas illinunt oleo Qi, cum olæ amygdalar. amarar. & guttulis aliquotolei spiciæ misto, vel creta in spiritu vini camphorato dissoluta, aut unguento aureo.

Ficini convenire dicunt emollientia, attenuantia & succum chylisum incrassatum fluidum reddentia, unde nec hic interna continentium sudorifera ex salibus præsertim volatilibus parata, tum externa quoque adhibent emollientia, uti em-

Ficini.

plastrum de Amniaco cum sulphure & camphora, de galbano, aliaque supurationem promoventia, qua obteuta tuberculum aperiant, materiam intus contentam expriment, & aqua Mercurialis ulcusculum aliquoties attingunt, donec unguento diaphompholygos consolidentur.

Talpa sopinaria emollientia non minus imponunt, & materiam aliquantulum emollicant facta incisione eximunt, tum aqua sublimata ulcus emundant, & emplastro de gratia Deid convenientem deducunt consolidationem.

Talpa;

§. 19. Phlyctenarum curatio nostro judicio varietat pro caulæ varietate. Si enim addit intemperies sanguinis salia mutatica, vel acida, ea quantum possibile, auferatur, exhibendo appropriata medicamenta acridinem involventia, qualia sunt decocta chinæ, aliorumque lignorum cum Thea, & simul fixiorum diaphoreticorum usus interponendus est, ex quibus laudantur gum diaphoreticum, ebur Philosophi, pp. C. C. eodem modo elaboratum, antisepticum Poterii, oculi

oculi ☿, Martialia quæcumque, ut & viperina &c. quorum medicamentorum usus sit per spatium aliquod temporis continuus.

Externè verò nihil tentandum, nisi prius internis causis bene fuerit prospectum, quo peracto, spontè sepe abeunt, sed sepe etiam externa postulant remedia. hinc spiritus matricalis sepe sufficit Phlyctenis illitus, vel epithematis iustar impositus, vel ☿ ☿ cum ~ ☿ ☿ ☿, vel unguentum rosarum cum ☿ ☿ ☿, creta & similibus absorbentibus, vel cum camphora, terebinth turia, oculis ☿, floribus ☿ ☿, ☿ ☿ ☿ aliisque commixtum. Lixivium è cineribus pini tanquam specificum laudatur: omnia verò lixiviosa id præstant. Si adest simul inflammatio, tunc unguentum diapompholygos cum camphora sufficit, ut & omnia escicantia, imprimis emplastrum de lapide calaminari cum camphora & oleo mastiches malaxatum. Hic nec purgantibus, nec venæsectione, nec cucurbitulis, nec scarificationibus, ne churidinis aliquid utilitatis præstabis. In pustulis hifce Galli solent imponere emplastrum divinum à Barbette descriptum.

Cura Sudaminum

In Sudaminum curatione eò annitendum est, ut prius massa sanguinea ac reliqui succi à suis viscidioribus salinis ac terrestribus liberentur particulis, in quem finem varia absorbentia, Diaphoretica leviora, imprimis verò Diuretica interna conducunt, ut sunt ☿n. Diaph. bezoart. Jovial. ☿le cum ocul. ☿. ebor. & unicornu fossil. &c. quæ omnia sanguinis mixturam debilitant restitunt, acidumque temperant: interponantur varia Diuretica, Tinctur. bellid. fumar. Tinctur. ☿, liq. terr. fol. ☿, crem. Sicum ocul. ☿. decoctum lignor. cum herb. heder. terr. fumar. & rad. aperientib. dist. eryng. enul. &c. pil. ex terebinth. cum milleped. & salibus fixis paratum. His enim remediis falsæ ac terrestris acidis conjunctæ particula per urinam eliminantur, quæ per poros cutis excerni nequeunt.

Externa cura consistit in Sudaminum ablatione, hinc conducunt varia lavamenta ex mundificationibus parata, nempe abluith. ruta, myrrha; sit ergò sequens formula:

☿. ☿ fl. sambuc. 3ij.

~ matric. 3i.

ol. ☿ per deliq. 3ij.

M. & abluantur hæc pustulæ, & quidem tepide, hac mixtura. Vel in forma linimenti,

☿. Ol. sambuc. 3ij.

cret. 3ij.

☿. Hui 3b.

fl. ☿. 3j.

M. f. linimentum.

vel ungu. de lithargyr. cum camphora mixtum, quo illinantur hæc pustulæ. Vel ☿ calc. viv. cum ~ vin. camph. & fl. sambuci sufficit. Vel:

☿. ☿ l. il.

Sperm. ran. aa. 3ij.

~ theriacal. camph. 3j.

Troch. alb. Res. 3b.

M. pro fotu & illiutione.

Ex. gr.

☿ ☿ flor. sambuc.

calc. viv. aa. 3ij.

~ matric.

fl. sambuc. aa. 3b.

☿ Hui 3ij.

camphora 3b.

M. d. ad usum.

applicetur hoc epithema quadruplicatis lineis, & quidem tepide. Convenit etiam unguentum Hui. ex lithargyr. ☿. & ol. olivar. siml. ☿, tum in mortario plumbeo diuturnis tritionibus mixtum, maxime conducit. Bals. ☿ complementum absolvi.

Curatio Epiphytidum iudem consistit in depuratione M. S. à salinis ac terrestribus acidis maritatis particulis, quem effectum præstant Diaphoretica temperata. V. S. & purgatio contra veterum omnium Auct. opinionem plus nocet, quàm juvat, hinc commendamus essent. fumar. bellid. cum ~ ☿ li ☿, quæ simul particulas ipsas vitiosas per urinas eliminant educuntque, ut decoct. lign. salistr. ac santal. item varia antiscorbutica remedia, & præsertim temperata egestia hic erunt remedia. Denique ad Topica deveniendum est, inter quæ excellent Grea, ol. ☿ cum olei cochlearis guttula una vel altera maritatum & illitum. Sunt, qui oleum Juniperi commendant, tanquam specificum, alii brassicam vel cicutam parum confusam pustulis his impositam, ~ matric. spir. vin. camph. fl. sambuc. ☿ calc. viv. colinet. item varia decocta mundificantia hinc inde dicta hic conducunt.

Cura Epiphytidum.

In Terminibus ante omnia ad mixturam sanguinis reflectendum est, num ista sit vel acida vel salia muriatica, quæ prius corrigenda decoctis appropriatis chin. vel lign. santal. vel ☿ lib. volat. oleof. elix. vit. ol. cochlear. vel Guajac. omnia enim medicamenta, quæ acedinem involvunt, appropriata hic sunt, leviora ergò ac temperata Diaphoretica interponenda sunt ex antihæst. ☿nio Diaphoret. aliisque absorbentibus, imprimis detur pulv. absorbens noster. Nec hoc in casu diuretica blandiora negligenda veniunt, ut varia Essentia ex herbis & rad. diureticis parata, vel Grea quævis.

Cura Terminibus.

Externè exulceratis hifce pustulis inspergantur varii pulveres ex mandibulis lucii, cerussa, lap. calaminar. tut. ocul. ☿. cerul. fl. ☿, ☿. aloë, myrrh. camph. parati: vel fiant fotus & imponantur varia Epithemata.

☿. Aq. fl. sambuc. 3ij.

~ matric. 3j.

☿ ☿ ci cum acet. viv. parat. 3ib.

M. f. Epithema calide applicandum.

Possumt & applicari varia linimenta, vel empl. imprimis nostrum de laddano.

In Effersis sive pustulis illis parvis eadem remedia conveniunt, tam interna, quàm externa, quæ in scabie commendavimus. Massa enim sanguinea multis salinis scater particulis, quæ vel per sudorem, vel per urinam eliminandæ sunt. Hunc scopum attingemus si exhibeamus varia Diaphoretica fortiora & volatiliora iis, quæ in præcedentibus commendavimus: conducet ergò ☿ vel spiritus volatilis viperarum, vel C. C. vel Tinct. ☿nii ☿. vel nostra ☿ris. Ex. gr.

Cura Effersis.

☿. ☿ enul.

card. bened. aa. 3ib.

Tinct. ☿nii ☿. 3j.

myrrh. 3b.

Syr. defumar. 3b.

M. d. cochleatim per vices.

sed cura non tam facilis est in Scorbuticis ac puerperis sed sæpe Medicos fatigat, imprimis cum accedat

accendat febris tertiana, in quem finem omnia conducunt antifebrilia temperata, ex gr.

*℞. ocul. 55. ppt.*

*arcand. dnp. 22. 3℔.*

*deturante paroxif. cum ∇ card. bened. febrifug. 5.*

*anodyn. Mixt. f.*

*M. Camphora appendatur collo & Empl. febrifug. Schobell. imponatur pulsibus, & primæ viæ expurgentur laxantibus.*

Topica hic haud negligenda sunt, sed fiant lavamenta ex herb. malv. saponar. fumar. oxylap. scabios. cum farin. lupinor. *Δ & ∇.* Vel illinantur Elleræ lixivio reguli 3nii, vel decocto tabaci, vel ∇ plantag. sacch. 3ni, *℥* dulc. spir. matric. spir. calc. viv. adject. vel ol. *℥* cum ol. amygd. dulc. Reliqua vide *Capite de Scabie.*

*Cura Pfig. draci.*

In *Pyloraciis* apprimē conveniunt sudorifera, ut obstructio tollatur, & lymphæ corrigatur. Detur ergo sæpius pulvis noster absorbens cum 3nio Diaphoret. vel *∅ C. C.* volat. vel viperar. vel Tinct. 3nii *℥* Essent. fumar. lignor. radic. enul. lapath. acur. spir. matric. & plura alia sæpius commendata. Inter topica sæpe sufficit ∇ calc. vivæ cum sacch. 3ni & camphora sæpius applicata. Linimenta quoque ex ol. sambuci, cum *∅* 3ni & camphora parari, sicque applicari possunt. Ol. *℥* per deliquium egregium erit remedium, imprimis si oleo amygdal. dulc. maritetur, spir. matricis sæpe quoque omnibus aliis palmam præcipit, ut & aq. Regin. Hungariæ tepide applicata. In eorum defectu imponatur spir. anthos vel flor. sambuci, vel spir. vin. camphorat, in hunc finem tyronibus sequentem aut similem commendamus formulam:

*℞. ∇ fl. sambuc.*

*plantag. aa. 3℔.*

*spir. matric. 3℔.*

*℞. 3i.*

*camphora 3℔.*

*Balsam. divin. n. d. 3iij.*

*M. D.*

Cum in *Ficof* tumore sanguis nimis crassus sit, *Cura Pfig. cur.*

ille prius incidendus ac volatilifandus est, in quem finem conducent varia acidum temperantia, ac dein volatilifantia remedia, ut sunt *∅* volat. oleos. Elix. vit. liq. *∅ C. C.* succin. bals. nervin. decoct. lignor. Præmissis hic tumor hic dissolvendus est, in quem finem varii foci, suffumigia ac Epithemata parari queunt ex herb. rutæ, cicutar. Nicotiau. salv. flor. chamom. verbasc. mehlot. sem. lini fœnigræc. bacc. lauri Juniper. *∅ 3i.* *∅* xco, ex quibus variæ concinnari possunt formulæ & tepide applicari. Vel spir. matric. cum spir. *∅* xci cum calc. viva parato imponatur, vel spir. calc. viv. fl. sambuc. &c. His nihil juvantibus, ad fortiora accedendum est, quam nimirum quandam corrosivam, quam *Opisthassæ* vocant, adjici enim potest momentum 3ni sublimat. vel præcipitat. item *℥* dulc. quæ aqua plures curavit *Sorbaui, c. 8. ac Excrefcentius miris.*

*Talpa* cura pro causæ varietate variat, & hio *Curatio Talpa.* conveniunt omnia ex interna superius dicta Diaphoretica ac absorbentia, item externarum resolventia ac diacentia, volatilibus oleis ac resinosis mixta. Uplurimum tamen Talpa sine manus operatione vix curari potest, quæ operatio fit vel applicato corrosivo, cui incisio per totam elcharam sat profunda subiungitur, quo tamen corrosivo non semper opus est, sed statim fiat incisio, dein reliqua cutis ab ipso tumore digicis paulatim separatur. & ad tuncum seu radicem deveniatur, quo facto eximatur tota massa inspissata, hinc mundificativa cum plumaculis imponantur, donec vulnus sarcoticis consolidetur.

## CAPUT XI.

### De Tumoribus Cysticis, Ganglio, Atheromate, Meliceride, Steatomate & Emphysemate.

#### §. I.

**T**umoreshi, de quibus modò tractaturi sumus, nomen suum à diversitate materię intus contentæ sortiti sunt; hinc dicuntur Tumores Cystici, quia propriè includuntur Cystidi, seu tunica, seu folliculo.

*Ganglion.*

*Ganglion* describitur, quod sit tumor durus indolensque cum cute sanæ, à tubulorum tendinorum contusione & induratione, post laborem ut plurimum in manibus pedibusque obveniens. *Germanis* à duritie dicitur *Überbein*. Ganglia nihil aliud sunt, quam nodi in nervis ac tendinibus. Nodi verò isti callosi, qui *Glisten* Germanis vocantur, differunt ab his duritie, & quod non in nervis aut tendinibus existant, sed illis tantum adiaceant. Ganglia cognominantur à figurâ externâ corpora *ovaria*.

*Atheroma.*

*Atheroma* est species tumoris seu abscessus cum folliculo, in quo aliquid *pulsi* simile continetur peculiari tunica inclusum. Situmortalis, quod frequentius accidit, in capite excre-

scat, ob firmam capitis cutem firmiter cranio circumtentam, non tam extoritur prominere potest, sed potius tumor talis latius sub cute capitis sæpè expanditur, unde tunc *Tfudo*, item *Talpa nigra* appellari solet. Hoc in tumore materia proprio folliculo contenta & diutius retenta, subinde acrior redditur, & aliquando ipsum os cariosum reddere potest. Tales tumores si sunt immediatè suprà saturas, relinquendi sunt intacti.

*Meliceris* describitur, quod sit species tumoris vel abscessus cum folliculo, humorem melli similem in propriâ tunica continens. Meliceridem pilorum fasciculum intus simul contentem vidit *Cl. Hoffmannus* test. Eph. G. Dec. 2. A. c. Obf. 210.

Si verò materia in tunica propria contenta sevo vel adipi similis est, tunc vocatur Medicis vel Chirurgis *Steatoma*.

Sunt & alii ejusmodi tumores cystici, qui continent vel pilos, vel carbones, vel vitra, vel

Eccē

chartas

*Meliceris.*

*Steatoma.*

oculi ☿, Martialia quæcumque, ut & viperina &c. quorum medicamentorum usus sit per spatium aliquod temporis continuus.

Externè verò nihil tentandum, nisi prius internis causis bene fuerit prospectum, quo pacto, spontè sepe abeunt, sed sepe etiam externa postulant remedia. hinc spiritus matricialis sepe sufficit Phlyctenis illius, vel epithematis instar impositus, vel  $\nabla \Psi$  cum  $\sim$  ☿is  $\times$ ci, vel unguentum rosarum cum ☿e  $\Phi$ i, ereta & similibus absorbentibus, vel cum camphora, terebinth. tutia, oculis ☿, floribus ☿is, ☿e  $\Phi$ i aliisque commixtum. Lixivium & cineribus pini tanquam specificum laudatur: omnia verò lixiviosa id præstant. Stadeß simul inflammatio, tunc unguentum diapompholygos cum camphora sufficit, ut & omnia exsiccantia, imprimis emplastrum de lapide calaminari cum camphora & oleo mastiches malaxatum. Hic nec purgantibus, nec venesectione, nec cucurbitulis, nec scarificationibus, nec hirudinibus aliquid utilitatis præstabis. In pustulis hisce Galli solent imponere emplastrum divinum à Barbette descriptum.

*Cura Sudaminum*

In *Sudaminum* curatione eò annitendum est, ut prius massa sanguinea ac reliqui succi à suis viscidioribus salinis ac terrestribus liberentur particulis, in quem finem varia absorbentia, Diaphoretica leviora, imprimis verò Diuretica interna conducent, ut sunt ☿n. Diaph. bezoart. Jovial. ☿le cum ocul. ☿. ebore & unicornu fossil. &c. quæ omnia sanguinis mixturam debilitatam restitunt, acidumque temperant: interponantur varia Diuretica, Tinctur. bellid. fumar. Tinctur. ☿i, liq. terr. fol. ☿, crem. ☿icum ocul. ☿. decoctum lignor. cum herb. heder. terr. fumar. & rad. aperientib. dict. eryng. enul. &c. pil. ex terebinth. cum milleped. & salibus fixis paratum. His enim remediis falsæ ac terrestres acides conjunctæ particule per urinam eliminantur, quæ per poros cutis excerni nequeunt.

Externa cura consistit in Sudaminum ablatione, hinc conducunt varia lavamenta ex mundificantibus parata, nempe abstin. ruta, myrrha; sit ergo sequens formula:

$\times$ .  $\nabla$  fl. sambuc.  $\Phi$ i.

$\sim$  matricial.  $\Phi$ i.

ol. ☿i per deliq.  $\Phi$ i.

M. & abluantur hæ pustulæ, & quidem tepide, hac mixtura. Vel in forma linimenti.

$\times$ . Ol. sambucini.  $\Phi$ i.

cret.  $\Phi$ i.

☿l.  $\Phi$ ni  $\Phi$ B.

fl.  $\Phi$ .  $\Phi$ i.

M. f. linimentum.

vel ungu. de lithargy. cum camphora mixtum, quo illinantur hæ pustulæ. Vel  $\nabla$  calc. viv. cum  $\sim$  vin. camph. & fl. sambuci sufficit. Vel:

$\times$ .  $\nabla$  l. sil.

Sperm. ran. aa.  $\Phi$ i.

$\sim$  theriacal. camph.  $\Phi$ i.

Troch. alb. Ros.  $\Phi$ B.

M. pro fotu & illinitione.

Ex. gr.

$\times$ .  $\nabla$  flor. sambuc.

calc. viv. aa.  $\Phi$ i.

$\sim$  matricial.

fl. sambuc. aa.  $\Phi$ B.

☿ni  $\Phi$ i.

camphora  $\Phi$ B.

M. d. ad vitrum.

applicetur hoc epithema quadruplicatis linteis, & quidem tepide. Convenit etiam unguentum ☿uin. ex lithargy. ☿r. & ol. olivar. finct.  $\Delta$ , tum in mortario plumbeo diuturnis tritionibus mixtum, maxime conducit. Bals.  $\Delta$  complementum absolvit.

Curatio *Epinthidum* itidem consistit in deputatione M. S. à salinis ac terrestribus acidis maritatis particulis, quem effectum præstant Diaphoretica temperatiora. V. S. & purgatio contra veterum omnium Auct. opinionem plus nocet, quam juvat, hinc commendamus essent. fumar. bellid. cum  $\sim$  ☿li  $\Phi$ , quæ similis particulas ipsas vitiosas per urinas eliminant educuntque, ut decoct. lign. lassifr. ac santal. item varia antiscorbutica remedia, & præsertim temperata egegia hic erunt remedia. Denique ad Topica deveniendum est, inter quæ excellunt Grea, ol. ☿i cum olei cochlearis guttula una vel altera maritatum & illicitum. Sunt, qui oleum Juniperi commendant, tanquam specificum, alii brassicam vel cicutam parum confusam pustulis his impositam,  $\sim$  matricial. spir. vin. camph. fl. sambuc.  $\nabla$  calc. viv. colinet. item varia decocta mundificantia hinc inde dicta hic conducent.

*Cura Epithidum*

In *Terminibus* ante omnia ad mixturam sanguinis reflectendum est, num ista sit vel acida vel falsa muratica, quæ prius corrigenda decoctis appropriatis chin. vel lign. santal. vel ☿lib. volat. ☿ volat. oleos. elix. vit. ol. cochlear. vel Guaiac. omnia enim medicamenta, quæ acridinem involvunt, appropriata hic sunt, leviora ergo ac temperata Diaphoretica interponenda sunt ex antihect. ☿nio Diaphoret. aliisque absorbentibus, imprimis detur pulv. absorbens noster. Nec hoc in casu diuretica blandiora negligenda veniunt, ut varia Essentia ex herbis & rad. diureticis parata, vel Grea quævis.

*Cura Terminibus*

Externè exulceratis hisce pustulis inspergantur varii pulveres ex mandibulis lucii, cerussa, lap. calaminar. tut. ocul. ☿. corul. fl.  $\Phi$ , ☿  $\Phi$ , aloë, myrrh. camph. parati: vel fiant fotus & imponantur varia Epithemata.

$\times$ . Aq. fl. sambuc.  $\Phi$ i.

$\sim$  matricial.  $\Phi$ i.

$\sim$  ☿ci cum calce viv. parat.  $\Phi$ B.

M. f. Epithema calide applicandum.

Possunt & applicari varia linimenta, vel empl. inspermis nostrum de labdano.

In *Essentiis* sive pustulis illis parvis eadem remedia conveniunt, tam interna, quam externa, quæ in scabie commendavimus. Massa enim sanguinea multis salinis scatet particulis, quæ vel per sudorem, vel per urinam eliminandæ sunt. Hunc scopum attingemus si exhibeamus varia Diaphoretica fortiora & volatiliora iis, quæ in præcedentibus commendavimus: conducet ergo ☿ vel spiritus volatilis viperarum, vel C. C. vel Tinct. ☿ui ☿. vel nostra ☿ris. Ex. gr.

*Cura Essentiis*

$\times$ .  $\nabla$  enul.

card. bened. aa.  $\Phi$ B.

Tinct. ☿ui ☿.  $\Phi$ i.

myrrh.  $\Phi$ B.

Syr. defumar.  $\Phi$ B.

M. d. cochleatim per vices.

sed cura non tam facilis est in Scorbuticis ac puerperis sed sepe Medicos fatigat, imprimis cum accedat



accelelat febris tertiana, in quem finem omnia conducunt antifebrilia temperata, ex gr.

℞. ocul. ʒss. ppt.

arcan. dupl. aa. ʒss.

decurante paroxif. cum ∇ card. bened.

febrifug. ʒ.

anodyn. Mixt. f.

M. Camphora appendatur collo & Empl. febrifug. Schöbelb. imponatur pulsibus, & primæ viæ expurgentur laxantibus.

Topica hic haud negligenda sunt, sed fiant lavamenta ex herb. malv. saponar. fumar. oxylap. scabios. cum sat. lupinor. ʒ. & ʒ. Vel illinantur Elleræ lixivio reguli ʒnii, vel decocto tabaci, vel ∇ plantag. sacch. ʒni, ʒ. dulc. spir. matric. spir. calc. viv. adject. vel ol. ʒi cum ol. amygd. dulc. Reliqua vide *Capite de Scabie*.

Cura Pfydracii.

In Pfydracii apprimē conveniunt sudorifera, ut obstructio tollatur, & lymphæ corrigatur. Detur ergo sæpius pulvis noster absorbens cum ʒnio Diaphoret. vel ʒ C. C. volat. vel viperar. vel Tinct. ʒnii ʒss. Eilent. fumar. lignor. radic. enul. lopath. acut. spir. matric. & plura alia sæpius commendata. Inter topica sæpe sufficit ∇ calc. viva cum sacch. ʒni & camphora sæpius applicata. Linimenta quoque ex ol. sambuci, cum ʒ ʒni & camphora parari, sicque applicari possunt. Ol. ʒ. per deliquium egregium erit remedium, imprimis si oleo amygdal. dulc. maritetur, spir. matricis sæpe quoque omnibus aliis palmam præcipit, ut & aq. Regin. Hungariæ tepide applicata. In eorum defectu imponatur spir. anthos vel flor. sambuci, vel spir. vin. camphorat, in hunc finem tyronibus liquentem aut stulem commendamus formulam:

℞. ∇ fl. sambuc.

plantag. aa. ʒiʒ.

spir. matric. ʒss.

ʒ ʒni ʒi.

camphora ʒiʒ.

Balsam. divin. n. d. ʒiʒ.

M. D.

Cum in Ficofo tumore sanguis nimis crassus sit, Cura ʒni ille prius incidendus ac volatilifandus est, in quem finem conducunt varia acidum temperantia, ac dein volatilifantia remedia, ut sunt ʒ

volat. oleof. Elix. vit. liq. C. C. succin. balf. nervin. decoct. lignor. Præmissis his tumor hic dissolvendus est, in quem finem varii foci, suffumigia ac Epithemata parari queunt ex herb. rutæ, cicutar. Nicotian. saliv. flor. chamom. verbasc. melilot. sem. lini fenigræc. bacc. lauri Juniper. ʒ ʒi, ʒ ʒco, ex quibus variæ concinnari possunt formulæ & tepide applicari. Vel spir. matric. cum spir. ʒ ʒci cum calc. viva parato imponatur, vel spir. calc. viv. fl. sambuc. &c. His nihil juvantibus, ad fortiora accedendum est, aquam nimirum quandam corrosivam, quam *Opssivasser* vocant, adjici enim potest momentum ʒii sublimat. vel præcipitat. item ʒ. dulc. quæ aqua plures curavit *Sorbaist. c. 8. ac Excrecentius miris*.

Talpa cura pro causæ varietate variat, & hic Curatio conveniunt omnia ea interna superius dicta Diaphoretica ac absorbentia, item externæ recensita resolventia ac discutientia, volatilibus oleis ac resinosis mixta. Uplurimum tamen Talpa sine manus operatione vix curari potest, quæ operatio sit vel applicato corrosivo, cui incisio per totam elcharam fiat profunda subjungitur, quo tamen corrosivo non semper opus est, sed statim fiat incisio, dein reliqua cutis ab ipso tumore digitis paulatim separatur, & ad fundum seu radicem deveniatur, quo facto eximatur tota massa inspissata, hunc mundificativa cum plumaceolis imponantur, donec vulnus sarcoticis consolidetur.

## CAPUT XI.

### De Tumoribus Cysticis, Ganglio, Atheromate, Meliceride, Steatomate & Emphysemate.

#### §. I.

Tumores hi, de quibus modò tractaturi sumus, nomen suum à diversitate materiæ intus contentæ sortiti sunt; hinc dicuntur Tumores Cystici, quia propriæ includuntur Cystidi, seu tunica, seu folliculo.

Ganglion.

Ganglion describitur, quod sit tumor durus indolensque cum cute sanâ, à tubulorum tendinorum contorsione & induratione, post laborem ut plurimum in manibus pedibusque obveniens. Germanis à duritie dicitur *Ueberbein*. Ganglia nihil aliud sunt, quam nodi in nervis ac tendinibus. Nodi verò isti callosi, qui *Gstedes* sive *Ganglione* Germanis vocantur, differunt ab his duritie, & quod non in nervis aut tendinibus existant, sed illis tantum adjacent. Ganglia cognominantur à figurâ externâ corpora olivaria.

Atheroma.

Atheroma est species tumotis seu abscessus cum folliculo, in quo aliquid puli simile continetur peculiari tunica inclusum. Si tumor talis, quod frequentius accidit, in capite extre-

seat, ob firmam capitis cutem firmiter cranio circumtentam, non tam extorsum prominere potest, sed potius tumor talis latius sub cute capitis sæpè expanditur, unde tunc *Tifludo*, item *Talpa nigra* appellari solet. Hoc in tumore materia proprio folliculo contenta & diutius retenta, subinde acrior redditur, & aliquando ipsum os cariosum reddere potest. Tales tumores si sunt immediatè suprâ saturas, relinquendi sunt intacti.

Meliceris describitur, quod sit species tumoris vel abscessus cum folliculo, humorem melli similem in propriâ tunica continens. Meliceridem pilorum fasciculum intus simul continentem vidit Cl. Hoffmannus test. Eph. G. Dec. 2. A. c. Obs 210.

Si verò materia in tunica propria contenta sevo vel adipi similis est, tunc vocatur Medicis vel Chirurgis *Steatoma*.

Steatoma.

Sunt & alii ejusmodi tumores cystici, qui continent vel pilos, vel carbones, vel vitra, vel

Ecces chartas



chartas, vel lintamina, vel vermes, aliamque materiam peregrinam, hinc nomina ista superiorum dicta essentiam horum tumorum non satis explicabunt.

*Empysema* est tumor statulentus, sub quo ventus vel flatus in tubulis, vel meatibus, vel peculiaribus tunicis continetur, tum enim flatus isti locum ampliorem quaerunt, tubulos distendunt, sicque tumorem statuosum *Empysema* dictum excitant.

Certum est, quod omnes istæ prædictæ materiæ contineantur in peculiari tunica, & in hoc omnes ferè consentiunt, quamvis in aliis differant. De Gangliis multum disceptatur inter Auctores, sed potius controversia est de nomine quàm re.

*Pars affecta.* §. 2. *Pars affecta* horum tumorum tunicatorum sunt partes membranosaæ & fibrosaæ, quæ sæpè ita extenduntur, ut proprium sibi efforment folliculum, ad succos istos diversos continendos; cum enim membranae violentius aut ab externa, aut ab internâ quâdam causâ distendantur, facili tunc dilatantur & lacerantur inter Auctores, sed potius controversia est de nomine quàm re.

*Ganglii* verò pars affecta sunt nervi ac fibræ tendinosæ, & occurrunt Ganglia utplurimum in articulis, manuum sc. & pedum, præcipuè verò circa juncturas apparent. Nervi plurimi in variis corporis partibus in cincinnos abeunt, & adeo inter se invicem intricantur, ut Anatomici tales coagmentationes *Plexum* dixerint, dein à plexibus proficiuntur, & circumcirca disperguntur. Quando plures nervi in unum coeunt, observandum est, vasa, ex quibus constituuntur, nullam inter se habere anastomosen, & eam solummodo in ipsorum involucre reperi, & cum nervus in plures ramos distribuatur, vasa ipsius privatim in plura non dispescuntur, sed divisio in ipsorum involucre occurrit, & vasa, quæ unico comprehensa fuerant fasciculò, plurimos constituunt ramos; quæ omnia nobis magnum affundunt lumen ad explicandum Ganglion inferius de causâ petendum.

*Diagnos.* §. 3. Parte affecta explicata ordine semel nobis proposito ad Diagnosin horum affectionum Tunicatorum accedamus. Ganglion ergo cognoscitur ex tumore duro, renitente inæquali, indolenteque, qui vel in manibus, vel pedibus mole sua utplurimum nucem avellanam adæquat, estque ejusdem cum cute sana coloris. Post laborem majorem homines in hunc incidunt tumorem. Tumor hic tantum ad latera movetur, non verò prorsum aut retrorsum, & per hoc differt à Meliceride & Atheromate, item ratione duritiæ, quæ in Ganglio observatur, differt à reliquis tumoribus Tunicatis.

*Atheroma* verò cognoscitur ex tuberculo utplurimum in capite, sæpè etiam in aliis corporis partibus membranosis existente, in Tunica propria materiam pulvi similem continente. Quod Atheroma in humero sinistro in spinam vergens ovi columbini magnitudine observavit *Curiosus Germani Ephem. Ann. 2. Obs. 93.* Me præsentem aperuit atheroma in pectore supra scrobiculum cordis Dn. Costnitz Chirurgus Cassellanus in 13. annorum ætate quæ atheromate quatuor uncia materię pulvi, similis effluxere.

*Meliceris* cognoscitur ex materiâ melli simili & proprio inclusu folliculo; prout *Sciatoma* observatur, si materia folliculo proprio contenta

sit sevo similis. Observatur etiam, quod tumores hi tunicati Lunæ phasés imitentur, & utplurimum circa partes nervas radiceantur, & proinde frequentius circa caput, collum, nucham & similia loca nervosa inveniuntur, in carnis verò partibus *Sarcomata* oboriuntur. Facili quidem patet, an sint proprio inclusu folliculo, quam verò contineant materiam, vix antequam aperiantur, dignosci potest. Ejusmodi tumores generantur intra corpus nostrum, prout id observavimus in Abdomine D. D. Dextbachii.

*Empysema* facili cognoscitur, facili enim digito cedit, & non tam durus est, quàm œdematosus tumor.

§. 4. *Ganglion* ad mentem Veterum, manuum juncturas ac talos frequentius, cubitum & caput autem rarius occupat; juxta illos quoque ex plaga vel labore originem sumit, quatenus ex bisce, sc. plaga, percussione, nimio labore, nervosa & tendinosa partes in nodum quasi, ac consequenter in tumorem coaguntur. Tumorem hunc à lentâ ac crassâ pituita oriri contendunt. Hinc Ganglium dicunt nervi contorsionem ex plagâ aut lassitudine proveniente; in pluribus quidem corporis partibus, max. mè verò in iis, quæ moventur, velut est summa manus & pes, obveniunt.

Juxta Veteres *Atheromatis* seu Nodi causa est *Atheromatis*. Spiritus vaporosus; sæpè & oritur juxta Ipsos ab humidâ, ac mucilaginosâ, præsertim autem pituitosâ materia, aut utraque mixta; quocunque enim modo hæc causa sub cute latitat, ac per tempus ibidem manet, natura Destra illorum adjuvante, varias formas induit & repræsentat, ut modò pulti, modò luto, anuræ faci similis evadat ac propria investitur Tunica.

Causam *Meliceridis* ac *Sciatomatis* eandem esse *Meliceridis* ac *Sciatomatis*. dicunt, nempe pituitosum ac mucilaginosum humorum insipidum & in proprio folliculo latentem, hinc tantum ab Abscessu differre ajunt.

*Empysema*, h. e. inflatio juxta Galenicis ex frigido crassiorique spiritu constat, hinc inflationes, quod spiritus cutem intendat. Renitentur tangendo, ajunt, & hinc differre ab œdemate contendunt. Imò ipse Hippocr. statuit, quod *Empysema* sit copia spiritus statuosus in cavitatibus, præsertim verò articulis.

§. 5. *Paracelsus* Tumores hos Cysticos, ut *Ganglion*, *Atheroma*, *Meliceridem* ac *Sciatoma*, apprimè describit sub nomine Scieroses, dicit enim, *Scierosis* est Apostema, vel nodus, qui nascitur per excrecentiam novæ generationis, quando scil. natura superfluitatem ex centro generationis producit, accumulato postmodum in excrecentiam juxta membrum, in quo fuerit, generatur. Regeneratio juxta Ipsum major est, quàm ubi corpus nascitur; possibile est, ut hæc secunda regeneratio, & est pura superfluitas regenerationis. Tumores hi juxta Ipsum aliquoties in fronte nascuntur, ut nodus, in service & in manibus. Quando sub costis aut sub ventre nascitur, tunc ejus Duritiem non bene percipi posse ait. Ex mellis suis mineralibus hocce tumores, imprimis *Meliceridem*, produci posse nullus dubitat.

*Empysema* esse à flatibus cum reliquis Auctores consentit, & sæpè ex accidentalibus provenire asserit, esseque sæpè arsenicalem inflationem præter salis resolutionem, siquidem omnis inflatio sicca producatur ex arsenico puro.

§. 6. *Gel-*

*Helmontii  
de causis  
horum tu-  
morum  
opinio.*

§. 6. *Helmontius* Ganglion & tumores hos Tunicatos seu Cysticos induci vult à mucilagine ex la ice relicta, & sub propria tunica latente, eandemque in tantam magnitudinem distendentem, & materiam diversam exhibente.

*Emphysema* verò seu Inflationem deducit ex flatu à fermento vitioso spermatico producto, partes varias membranosas variè tendente.

*Willisii  
et Boerhaavi  
de causis  
Ganglii.*

§. 7. *Willisius* innuit, *Ganglion* oriri ex fibris à duro quodam instrumento aut inasuetu, aut diutius tractato, vel à gravi aliquo corpore premente, à proprio situ deturbatis, ubique invicem propius & arctius admotis. Fibrarum ergo partis atque interstitii strictionibus hoc pacto redditis, fuligines per ea evaporari solitæ retinentur, ac in illis coacervantur, ipsaque opplentes fibrarum duntaxat ac tensionem adaugent, aquosioribus subtilioribusque earum particulis exhalatis, crassioribus verò remanentibus.

*Tumorum  
Cystico-  
rum.*

Tumores Cystici ex *Willisii* mente progignuntur ex succo nutritivo à sale acido in illo præpollente, viscidior factus atque coagulato, & in cujusdam arteriolæ, per quam devehitur, sine remorante. Liqueor autem ille crassior ac lentescens in vasis termino exspitans, perpetuæ aggregatione accrescens, arteriæ parietes dilatat, fibræ ejus ab invicem semovet, ac in longius protendit, amplioreque illius cavitatem efficit. Fibrarum autem arteriæ fines à partibus ambientibus coerciti in sese mutuo incurvantur atque concurrunt, & aduniantur, vasisque osculum obturantes folliculum ex eo efformant. Quum verò sal istud coagulans in humore nutritivo dominium obtinens variæ sit indolis, minorisque vel majoris aciditatis, & sulphur in eo coagulatum crassius vel tenuius existat: Liqueor concretescens folliculis indolis reperitur, diversæque advertitur consistentiæ colorisque differentis, & varia ideo sortitur nomina tumor ex tali humore coagulato exortus. Si enim materia in folliculo conclusa pulcem referat, *Atheroma* dicitur, si verò melli similis fuerit, *Meliceris* denominatur, at si sevo aut adipi par existat, *Steatoma* indigitatur.

*Emphyse-  
matis.*

*Willisius* autumat *Emphysema* ortum habere à flatibus in vase quodam contentis. illudque distendentibus ac dilatantibus, negat vero flatum primariam esse huius affectus causam, statuitque propriam illius originem debere spiritibus animalibus in motu suo ab incongruo quodam perturbatis, qui inordinatè & turmatim per fibras nervas in alicuius vasis tunicas irruentes, mirè illas inflant, atque distendant, & quaquaversus extumescere faciunt. Liqueore verò in vase dilatato contento à vehementiore isto spirituum impetu validius agitato, portio ejus in vapores rarefit, & in flatum amplius illud spatium implentes cedit.

*Sylvii opi-  
nio de cau-  
sâ horum  
morborum.*

§. 8. *Sylvius* Gangliæ & tumorem Tunicatum seu Cysticum causam deducit à pituita viscida ac glutinosa, proprium sibi folliculum efformante, & in parte quadam corporis coacervata.

*Emphysema* ex flatibus in vasis aliisque cutis partibus collectis, partemque externam distendentibus oriri censet.

*Cervicis  
tumorum ju-  
dictum de  
causâ  
Ganglii.*

§. 9. *Cervicis* existimant, Ganglion produci à nimia nervorum & tendinum extensione, unde ramuli contorqueantur, ad latus exerescant, & simul liqueor nervosus ex fibrula quadam

dirupta effluat, atque circa nervum coaguletur, tandem continuo quodam effluxu cum mulatus tumorem excitans. Hanc verò nervorum diruptionem ab externa quadam sulcitari dicunt violentia, confusione scilicet, lapsu, distortionem, luxationem, quibus sæpius tumor hic in acceptis ferendis sit.

*Atheromatis*, *Meliceridis*, & *Steatomatis* originem adscribunt chylo in propriis suis vasis ab acido quodam liqore coagulato, cujus partes crassiores caseosæ inspissatæ, & continuo aliarum affluxu adauctæ tunicam vasis illius extendant, quæ ita extensa folliculum constituat materiæ intus contentæ. Prout verò materia hæc caseosa vel mollior sit & aquosior, vel spissior, pinguior aut aridior, & ratione vulvularum, quibus vas illud chylosum constat, à se invicem dispersa, ita eandem modò pulsus, ut in *Atheromate*, modò levi, ut in *Steatomate*, modò mellis, ut in *Meliceride*, interdum etiam phosphorum, carbonum, & quando plures quædam venule obstruunt, tandem succorum transfluxum admittere non valentes concrescent, & invicem convolutæ fuerunt, pilorum, aliarumque rerum speciem præ se ferre affirmant.

*Emphysema* ortum habere dicunt à succorum quorundam tenuiorum invicem mixtorum effluente, veluti si lymphæ acidiuscula & liqueor nequeus particulis porolosis constans, in parte quadam confundantur, & mediante æthere diversæ hæc particule adveniant, tum spirituosæ à reliquis se junctæ tubulos musculorum distendant, & tumorem ejusmodi flatulentum excitant. Dum verò particule porolæ succi nervei superant particulas acutangulas lymphæ, hasque destruunt, nullam etiam inflammationem produci statuunt, quoniam materia æthereæ facilem reperit transitum. Nonnunquam tumorem hunc excitari credunt, quod reverà in parte ista ær distendens contineatur.

§. 11. Tumor, qui Ganglii nomine à plerisque nuncupatur, oboritur, *Mejndice*, si tubuli nervei vel fibræ tendinosæ ab infuso labore ita distorquentur, ut succi circulantes multas obstructions pro ostaculo offendentes stagnent in tubulis tendinosi, tandemque ab humoribus à tergo insequentibus propellantur usque ad membranam illam, quæ tendinem circumvestit, ubi efformata fovea colliguntur & concretescunt, abeuntque in duritiem eximiam particulæ viscosæ ac terrestres, tenuioribus interim exhalantibus. Certum enim est, tumores nervis adnati, nam corpora ista oleacea ab implicatione tantum vasculorum nervorum efformantur, ea prorsus arte, qua filum, ex quo funda contexta fuit, amplius spatium terere videtur in medio fundæ corpore, ubi lapis collocatur, quam in funiculis, qui ex utraque ejus parte exoriuntur. Sic & Ganglion læpè eodem modo generatur ac tumores tunicati, cum quis manum intorquet, facile fieri potest, quòd vas aliquod nervosum comprimatur, hinc facili mater ejusmodi tumor produciatur. Sunt etiam, qui credunt, Ganglion oriri ex succo nutritivo abundante, & in tumorem viscosum coacervato.

Tumores tunicati omnes oriuntur, me judice, à vase chylosifero à quacunque causa ampliato. Tunica enim illa, quæ circa hunc tumorem reperitur, nihil aliud est, quàm dilatatum vasculum chyloferum, vel vas, in quo succus, quo

*Athero-  
matis, Me-  
liceridis  
& Steato-  
matis.*

*Emphyse-  
matis.*

*Nostri  
sententia  
de causâ  
Ganglii.*

nutrimur, continetur, & uti *Aneurisma* fit ex arteria dilatata, & varix à vena dilatata, càm arteria, ubi aneurisma est, maximam habet dilatationem, quod & de vena in varice intelligas, sic hic dilatatur vas chyli ferum, & chylus ibidem stagnans coagulat, & in materiam vel pultem vel mellis vel sevo similem aquæ, prout enim chylus variat, & evaluatio dia durat. Cause verò hanc dilatationem & extensionem producentes, plures esse possunt, primò glandula obstruitur, à qua obstruktionem magis illa intumescit, hinc vas adiacens compressum dilatationem & extensionem producere valet. A causa quoque violenta vas aliquod chyli ferum vel lymphaticum majusculum, vix enim hæc vasa inter se differunt, ad medium aut discindi, aut rumpi potest, & tunc necessario chylus affluens nullamque resistentiam inveniens vas suum dilatat. Sæpiè enim à contusione, ictu vel lapsu affectus hi tunici orti observantur. Huc etiam refertur ipse succus ineptus, & per has angustias circulari non valens, qui reliquas partes membranosas dilatat. & ejusmodi tumorem pro humoris varietate, vel *Atheromatis* vel *Meliceridis* vel *Sceatomatis* nomine insigniendum, producit: & cum extensio sit dilatatio in superficialibus valis lymphaticis, fit, ut in his lymphæ reperiatur, tunc Medici nomen indidere *Hydatidæ*.

*Tumores  
Chyliferi  
Fistulæ.*

Nunc etiam paucis ad affectum Tunicarum phænomena explicanda animum dirigamus; ex omnibus verò apparet, quod succi in tali corpore sunt crassiores, imprimis chylus, qui tardius circulator, & sic stagnare cogitur. Dilatatio valis fit sentum aquæ sentum, quoniam affluxus & appulsus succorum non sufficiens est; si vero materia circa tunicas semel sibi aliquam efformavit cavitatem & dilatationem, necessario semper plures insequuntur particule ejusdem indolis, quæ ibidem colliguntur, & cum tempore talem constituunt Tumorem Tunicatum.

Diversitas materię, quæ in Tunicis his colligitur, deduci potest primò à conformatione valis, in quo dilatatio fit, vasa enim cuncta ob angustiam & flexuram non quolibet admittunt succum. Juxta hanc succorum, imprimis chyli, diversitatem, diversa reperiuntur vasa chyli feræ ad hanc vel illam nutriendam partem. Sic etiam à mixturâ sanguinis diversitas materię dependet, cum in quibusdam subjectis succi sunt tenuiores, quam in aliis, ubi reperiuntur crassiores, in quibusdam succis vel est acidum, vel salsum, vel oleum, vel spiritus abundantiores; si addas & hanc causam, mutationem nempe valis in longum & latum, quam figuram nactum est vas, dum dilatabatur, si enim dilatatur vasculum vel tunica, fibrillæ coarctantur, & hinc fit expansio maior, & ob majorem vel minorem extensionis gradum etiam cavitates major vel minor efficitur; in senectute ob fibrarum coarctationem vas latius distendi nequeunt, in juvenibus verò fibræ melius extendi possunt: ex quibus omnibus sequitur, peculiarem in his valis separari succum.

Si materia stagnans vel acidior, vel oleosior, vel spirituosior, vel salior existat, juxta horum varietatem succorum materia hæc in tumoribus Tunicatis, vel tenuior, vel spissior, vel pinguior, vel durior apparebit.

Sic etiam diuturna stagnatio hujus evaluati succi hanc vel illam faciem induere facit; si enim particule continuo in motu suo conferuntur, & inter se ratione figuræ mutantur, facilius fieri potest, ut oleosa particule à spirituosius deferantur, & mixtura turbetur. Pressio quoque externa ansum dat, ut materia in his tumoribus contenta compactior reddatur, quia particule invicem hamis & uncis combinatæ sunt, prout in oleis destillatis videre est, quæ amissis spiritibus incrassescere solent.

Si ergo ipsius materię stagnantis cuspidæ ab acido præfenti per mensum aliquot spatium planè disturpuntur vel franguntur, materia commutatur in materiam *duriorè* pinguedinem bovinæ non dissimilem, & sic producit *Sceatoma*, quia acidum particulas figit volatiles.

Si verò in tumoribus hi tunici plus salis fixi quam acidi colligatur: materia pulcritudine similis, quia particule fixæ talem mutationem, quam volatiles non efficiunt in succis, hinc oritur *Atheroma*.

Quilibet ergo ex his faciliè mente assequi potest, quod materia per tot menses latens stagnansque in parte aliqua plures mutationes circa figuram subeat, ex quarum particularum figuris, mixtura, combinatione, motu, hoc vel illud corpus generari posse neminem latebit, qui saniorè Philosophiam modò summis degustaverit labiis, quæ materia toties mutari potest, quotiesdiverſe ibidem colligantur particule.

Non necessum est, si hæc vel illa extranea in ejusmodi tumoribus tunicatis reperiatur, statim ad Diabolicas confluere artes, quando se vel mulcæ, vel vermes, vel pili, aliaque inveniantur peregrina, cum & hæc oculis aliisque miscelæ succorum aboriri queant. Non verò omnem incantationem abesse volumus, & consistunt illa in quadam fascinatione, & Diabolus sæpè fucum facit suis prastigiis, & sæpius inter puris ac materię effluxum quadam immisceat & supponit, quibus se mancipiis suis potentem, aliis formidabilem reddere vult: & cum sæpè hæc non fideliter referantur à circumstantibus & nimis credulis ac gatulis, plura hæc vice addere non libet.

Quod verò proprii folliculi generationem seu productionem attinet, ipsum sequenti modo generari videtur. Fibræ crassæ aut laceratæ, & sic à se invicem separatæ: ut in naturale unionem haud amplius redigi queant, à nutrimento distenduntur in largius ac protenduntur, hinc emittunt fibras, quæ mutuo concurrentes, talem constituunt membranam, quæ membrana nutritia & dilatata cum tumore incrementum caput, quoniam succus transfundans non ordinario situ transponitur, sed coagulatus coarctatur simpliciter, materia aut sero, aut pultis aut meli similis efformatur. Juxta Lunæ phasem tumores Tunicati augeri vel minui observantur.

Causa *Emphysematis* seu *Tumoris Flantantis* *Emphysematis* est obstrukcio pororum à quacumque causa oborta, cum sæpè crassiores & copiosiores vapores per poros obstruktos transire impediti, flatum constituunt. Flatus enim nihil aliud est, quàm vapor crassius in cavitatem musculorum, vel aliarum partium conclusus, compressusque, qui distendens expandensque partem membranosam, in eam veluti ventus impellitur, sicque *Emphysema* constituit.

6. 12. Quod

Prognosis.

§. 12. Quod *Prognosis* dictorum affectionum concernit, magis vel minus curatu difficilis est, prout ipsa causa, videlicet crassities fuerit maior vel minor. Cum Ganglion non vitæ exitum minetur, attamen est affectus curatu difficillimus, qui nec emollientibus, nec discutientibus aliisque specificis volatilibus obedit, hinc affectus hic ægros sæpe ad vitæ finem comitari solet, quia indolens est, non magni æstimatur, nec Chirurgi opera imploratur.

Sicetiam Tumores Tunicati absque periculo per plures gestantur annos, & lento progrediuntur gradu, medicamentis etiam rarissime cedunt. Sponte tamen nonnunquam suppurantur, & modo in ulcera fordida & fistulosa abeunt, modo accuratior cura inferius explicanda radicitus tolluntur. Atheroma interdum in putrefactionem abis, & quemadmodum ulcus ad basin se extendit, quo venæ sæpe eroduntur & periculosa hæmorrhagie causæ existunt, in odiosissimum is libras effusus esse ex Atheromate aperto legitur in *Ephem. German. Ann. 2. obs. 93.*

Omnes hi Tumores Cyfici sunt totè sine periculo, attamen, quia sæpe enormem excrescentiam, nonnunquam deformitatem inferunt, exrاندi sunt.

*Empysemata* pro loci varietate variat, facile aliàs curatur; non verò apiciendus est tumor statulentus.

Dietæ.

§. 13. Si æger tibi curari vult, oportet, ut & exacta utatur Dieta, si enim sanguis & succi imprægnati sunt multis viscidis, tenacibus ac terrestribus particulis obstructionem parientibus, fixoque sale poros valorum obtinentibus, ac sensum nimis dilatantibus, viamque particulis viscidis præbentibus. Victus ergo ratio optima instituitur, quæ ferociam illius mollitiæ inartum partium demulcere valent. Atter hinc in affectibus sit temperatus, ad calidum vergens & sale volatili multo refectus, vitetur acè nullis particulis terrestribus ac crassis aut nimis nitrosis acidis repletus, ut est æter neque frigidus ac marinus, qui succos ac ipsum chylum in vasis circumstantem, coagulando vel inspissando adeò crassum reddunt, ut postmodum morbi prælati inde oboriantur. Indulgeant ægri cibis facillioris digestionis, quique exhibent nutrimentum subtilius, quod facile in formam chyli ad sanguinem delatum leges circulationis sequi potest. Exulent omnia acida & viscida salia, &c. Potus sit cerevisia optima, cui interponatur. Potus Theæ vel Caffæ ad sanguinem & succos attenuandos, sicque ad circulationem faciliorem incitandos, exulent omnia vina atque potulenta acida. Exercitia, somnus ac vigiliæ, imò & alvus sint pro consuetudine. Excretiones quoque solite suppressæ aut nimis auctæ, quatenus multum ad affectuum horum productionem faciant, ad ordinatum incitentur cursum.

Quantum animi pathemata æconomiam nostram turbare queant, vel ex eo patet, quòd ex nimio timore, gaudio ac merore nonnulli vitam cum morte commutaverint, hunc & multum ad affectus nostros producentes contriungere possunt: cum enim anima corpori tam amico forede juncta sit, ut nihil ipsi eveniat, quin pro illius constitutione aut simul gaudio afficiatur aut tristetur, aut id, quod corpori molestum est amore conetur, si forte corpori inopinatè gratum aut perniciosum quid obveniat, illi statim

in auxilium adesse omniratione conabitur, quando spiritus magna copia ad omnes corporis partes determinabit, qui tanta celeritate, fulminis instar, ad singula corporis puncta penetrabunt, ut inde sanguis & reliqui succi non duntaxat in certoparticularum suarum ordine conturbentur, quo postmodum paucos spiritus promere queant, sed magno isto impetu sæpius ex latibulo quodam expellitur fermentum peregrinum, quod humoribus admixtum æconomiam animale turbat.

§. 14. *Galenicus* in Ganglio calcem vivam cum *Galenicæ* adipe aëterno & testiculinum prodesse dicunt, tum tura medicamentum ex Achate lapide parant & imponunt, vel sequens:

℞. *Cerussa*,  
*resina pini*,  
*olei veteris*,  
*ammoniaci*, *Thymiamatis*,  
*galban.* aa. ʒj,  
*Cera trientem*.

M.

Laminam plumbeam crassiorē, veluti sunt vermicula, Ganglio majori imponunt ac deligant. Gravitate enim dissolvi ajunt per longum tempus.

Commendant etiam oxerum & masticherum Emplastum. Sunt qui bene frangat Ganglion cum sale & sol. sambuci, sinul mixtis, dem applicent emplastrum de cicuta. Veteres in curatione Ganglii à Chirurgia abstinēt, ac solis medicamentis utuntur, præteritum vò Gummi ammoniacum super ignem emollitum & ad Emplastri formam redactum cum lamina plumbea superponunt, ne vero hinc & inde moveri possit, arctis vinculis coniungunt; si transactis aliquot diebus Ganglion emollitum fuerit, nulla rei mentione ad ægrium facta, statim (dum adhuc caler locus,) vincula tollere, pollicem dextere manūs Ganglio immittere, ac reliquos quatuor digitos parti affectæ injectos comprimere jubent, inde Ganglium citò dissolvi & evanescere sperant.

In *Atheromate*, *Meliceride* & *Steatomate* Chirurgiam, uti in strumis, adhibent, quæ confirmata, consistit in Sectione, excoriatione & suturis, reliquæ curatione: eam verò operationem ita instituant, ne & pelliculam faciant, eo quòd contentus humor effusus impediatur Chirurgiam, & ne partem ipsius relinquant, quæ regenerationis plerumque causa fit, circa manuum iuncturas, & malleolos, & partes, quæ secundum articulum moventur; quemadmodum etiam struma, si aut tota aut pars ipsius relinquantur. Quod si tale quid relictum fuerit, melius esse dicunt non fuere, sed erodentibus medicamentis relicta consumere.

In *Empysemate* curationis scopum esse ajunt, corporum rarefactionem & crassi spiritus attenuationem per calida ac tenuium partium medicamenta perficere. Præmissa evacuatione per hydragoga, quæ pituitum seu serum cum materiam (ex qua illatus generatur,) evacuant, progrediuntur ad iacculos ex carminativis, discutientibus ac calefacientibus, eosque calide parti affectæ imponunt. Si vero misticuli ob consuetudinem inflati fuerint, partes valde calida & acris ægrè ferre dicunt, quare ab initio mitigantibus perseverare oportet, declinatione verò contingente in discutientibus. Utiuntur itaque sapa

Eccc 3 cuna

cum modico oleo, lanis succidis excepto, aut etiam cerato ex clypeo admixto, & curam adhibent, quo caliditas permaneat, nam frigiditatem non conducere ajuat. Postquam verò mitigatio facta est, acetum admiscit & nitrum aut aphronitridum, & postea etiam lixivium: postremum autem emplastra discussoria adhibent usque ad perfectam mali discussionem, strigmenta servata prius, ut pura fiant, excolant ac rursus in ollam injiciunt, & tritam calcem vivam instar farinæ inspersam inferciunt, donec luti spissitudo fiat, quod tumuntur.

*Paracelsi cura in Ganglio, Atheromate, Meliceride, Steatomate.* §. 15. *Paracelsus* in Tumoribus Cysticis, Ganglio nempe, Atheromate, Meliceride, Steatomate curandis eodem modo incedit ac in Tophis & Scleroti, commendat ergo in eum finem sequeus unguentum,

℞. Ol. myrrisor. ʒij.  
N. Moscata ʒb.  
Acung. pimentorum ʒij.  
petrolei. ad pondus omnium.  
M. f. Mixtura.

*In Emphy-* In *Emphysemate* curatione ritè instituenda *Paracelsus* ab apertura & rebus siccis cavere præcipit, & resolutioni materię potissimum studere, varia ergo ex sicbus, oleo, ex bac. Juniper. farin. fabarum parare jubet cataplasmata. Ad ventum in Tumoribus abigendum sequens vel simile laudat cataplasma:

℞. Ol. ex bac. Juniper.  
amygd. disc. aa. ʒj.  
farin. fabar. ʒb.  
sim. columb. ʒij.  
caprar. aa. ʒij.  
Aceti q. l.  
M. f. l. a. cataplasma, quod superponatur mane, submeridie & vespere. Vel seq. Empl.

℞. Terebint. lbʒ.  
Cumin. ʒiv.  
sem. lactus. ʒvj.  
cera q. f.  
M. f. Empl.

§. 16. *Helmontius* in affectibus Cysticis, ut Ganglio, Atheromate, Meliceride & Steatomate omnia ea, quæ in aliis Tumoribus reperta habet & hic prodesset ait. Interne propinat oculos ʒss, aliæque Diaphoretica, quæ insigni cum utilitate intus exhiberi posse sperat. Topice verò emollientia adhibet, potissimum in tumore duro oleum illud commendat, quod in strumis depellendis sæpius probatum reperit, & oleum strumarum ab ipso vocatur.

*Helmontius* *Emphysemata* seu Tumorem flatulentum per semina flatus discutientia aufert, posse contendit, anisi, dauci, carvi, anethi, cymini, imprimis cum propter contusionis injuriam pars quædam lacerata in furorem concitetur, qui per remedia ista insigniter mitigetur.

*Wilsion* *curatio Ganglii.* §. 17. *VVillsius* Ganglion curare studet, illud insensibiliter resolvendo lamina plumbeæ ope, quam parti firmiter applicat, vel solam, vel Mercurio vivo illitam, vel oleo Juniperi destillato insinctam. Folia sempervi majoris tidentem adhibet, inferiorem eorum cuticulam prius detrahendo, novaque mane & vespere imponendo. Cumi Ammoniacum in emplastri formâ parti etiam applicat. Sed si Ganglia hîcce omnibus resistant, ad emplastrum de Ranis Vigonis cum Mercurio confugit, vel etiam parti successeve imponit plumbi laminam spiritui vini &

acero destillato infusam, cui euphorbium inspergit.

*Atheroma, Meliceridem, & Steatoma* simili *Atheromate, Meliceride & Steatoma* tractat methodo. Statim enim sollicitè materiam aggestam tum internis tum externis medicamentis insensibiliter dissolvit. Sed quum illud infrequentius contingat, imò & in recentioribus tantum tumoribus cysticis hoc expectare liceat; materia parumper maturata tumorem aperit, humorem evacuat, & loquum penitus excidit, ulcusque deinde curat balsamo vel sulphuris vel Peruviano; nulla autem superest resolutionis spes, si tumor aliquamdiu duraverit, & ad Chirurgi manum, tanquam ad sacram anchoram tunc recurrere necesse est. Cystis enim, ut jam dictum, radicibus tollenda venit, nec minus quidem ex fibrillis illam constitutibus est relinquenda, ne novus deinceps Tumor exurgat, qui deinceps in diuturnum scelerumque ulcus, aut fistulam abit. Ad hunc autem finem adsequendum utitur vel instrumento Chirurgico, vel unguentis exedentibus. A principio enim hos Tumores maturat emplastrum ex guanni ammon. pyrethri. & ol. luccin. destill. parato. Post apertionem autem unguentum Ægyptiacum in sinum immittit vel purum, vel cum terrâ vitricoli, & paucio viridi æris auctum.

In *Emphysemate* curatione abstinet à phlebotomia, uti & à cathartica atque Diaphoretica, matu. & Diuretica, qualia sunt sequentia, solummodo commendat:

℞. Milleped. vivor. mund. ʒib.  
Nuc. Mosch. incis. No. j.  
Simul contusus affund. a. u. diuretica infra scripta lbj.  
f. express. dosi ʒij. ad ʒiv. bis in die.  
℞. Baccar. Juniper. virid.  
sambuc. aa. lbij.  
Conor. abiet. lbij.  
Jugland. virid. lbj.  
Cort. VVinter. ʒij.  
citr. ʒij.  
Aurant. ʒij.  
Limon.  
sem. ammos,  
ernice,  
nasturt. aa. ʒvj.  
aneth. ʒj.

affund. ser. lact. ē vin. alb. parat. lbiv. destill. organ. commun. totus liquor misceatur.

Tumori autem sequentia topica applicat:

℞. Fior. sal. armen. ʒj.  
crystall. min. ʒij.  
vin. tenuioris multo phlegmate imbui. lbij.

Misc. & dissolve in vitro, huic liquori pannum lineum bis in die intingit, & tumori fluctu lento applicat.

Vel:

℞. Empl. Diasapon. b. e. de minio cum sapone Venetico f. q.

extendatur tenuiter super altum tenuem, quod parti impositum in illâ per aliquot dies linit, ipsumque tum renovat.

§. 18. *Sylvius* in Ganglio reliquisque Tumores Cysticis curandis ad glutinosam pituitam peccantem corrigendam, incidendam & attenuandam, sique tumores resolvendos, salia commendat volatilia frequentius in vino vel liquoribus



bus aliis indita sumenda, siue sint ex animalibus deprompta, siue in vegetabilibus contineantur. Externè olea & unguenta illinit emollientia & dissolventia ex oleo laurino, Philosphorum, unguento martiato, vel cataplasinata ex plantis aromaticis parata, imprimis verò Emplastrum suum carminans commendat. Ad evacuandos humores viscidos pilulas suas laudat magistrales.

*In Emphysemate.* In *Emphysemate* ad pituitam viscidam resolvendam & bilis actionem iuvandam carminativa laudat, ut spiritum nitri dulcificatum, & potissimum spiritum suum carminativum, aliaque flatuum discutientia ac sudorifera volatilia & fixiora quæcunque.

Inter externa magnificat *Sylvius* cataplasmata ex floribus chamomillæ, bacis lauri, semine cumini, olea rutæ, nardinum, anethi, vel unguentum martiatum & similia partibus statibus discutientis adhibita.

*Cartesiani* talem subministrant *Ganglion* curandi rationem, quâ tumor ille spissus ex liquore nerveo coagulato productus resolvatur, dissipetur, & à nervorum ramis & tendinibus amoveatur, ut rami illi & tendinum extremitates à distortionem & convulsionem liberari, & in situm convenientem reponi queant, quæ de causâ emollientia & interdum suppurationem promoventia tumori imponunt, qualia sunt emplastrum ex galbano, vel Gummi Ammoniacæ in vino dissolutum, diachylon cum gummis, de ranis cum *Œio*, vel tumorem illinum balsamo nervino, spiritu gummi Ammoniaci & *Œis* & c. invicem mixtis. Adhibetur etiam ad coagulati illius succi dissolutionem impetrandam laminam plumbeam *Œio* illitam, vel auream, quam super Ganglion firmiter alligant, vel digitis comprimunt, aut duobus prioribus digitis manus sinistrae illud prehendant, & dextra percutiunt, ut ita dissipetur, quo facto emplastrum defensivum *Vigoni* superimponunt. Sectione quoque secundum longitudinem institutâ illud nonnunquam student auferre.

*Atheroma, Meliceridum & Steatomas.* *Atheromatibus, Meliceridibus & Steatomatibus* curationem peragunt emollientibus, ut sectione postmodum facilius materia intus contenta unâ cum folliculo suo siue cystide eximatur. Sequens itaque emplastrum singulariter celebrant.

*Œ. Gummi Ammoniac. ʒij.*

*Œii ʒß.*

*Camphor. ʒij.*

*Euphorb. ʒj.*

*Ol. petr. q. l.*

*M. f. Emplastrum.*

Sectionem crucis formâ super tumore ingittunt, ad ipsam usque materiam, tum cutem elewant, & materiam spatulâ à reliquis partibus separant, hinc unâ cum tunica illa eximunt, & suscitatum fortè hæmorrhagiam ob disruptas venulas aut arteriolas convenientibus remediis sistunt, cavitationem unguento *Egyptiaco*, vel melle chelidonii mundant, reliquias aquâ sublimata, *Œio* & c. vel alumine penitus absumunt, & curam uti in aliis ulceribus debite absolvent.

*Emphysem.* *Emphysematis* conferte credunt interna remedia effervescentiam sedantia & discutientia, quæ parantur ex crystallis *Œi*, eboze Philosph. pp. floribus *Œi*, oculis *Œs*, nec non aliis sudoriferis & diureticis lympham resolutam extra corpus

eliminantibus. Inter externa tumori adhibenda sequens approbant linimentum.

*Œ. Unguent. martiat. ʒiijß.*

*Agripp. ʒiijß.*

*Sperm. cet. ʒß.*

*ol. Œ. aneth. gutt. vj.*

*cumin. gutt. iijj.*

*Petr. alb. ʒj.*

*F. Linimentum.*

Fotus etiam & cataplasmata deprædicant ex herbis betonica, mentha, chamædrios, salvia, phellandrio, foliis torismarini, floribus sambuci, chamomillæ, fatina fabarum, *Œo* & sale Ammoniacæ parata, uti & emplastrum de bacis lauri, oleo Philosphorum malaxatum & calidè impostum.

*Œ. 20.* In cura *Ganglii nostro* iudicio eò instructum est, ut obstructions tollantur, ac theodas succi viscosi ante omnia attenuentur, hinc præter interna volatilia & incidentia solis externis peragitur remediis, ut sunt ~ lumbrieor. matricalis, vini camph. item fotus & cataplasmata ex blandè resolyentibus parata. Hisce verò nil jvantibus, eò deveniendum est, ut exspiratio hujus instituat manu Chirurgi exercitati, quæ per Sectionem fit. hinc Ganglion circa articulos vel alibi emergens tollitur vel concussionem aut digiti compressionem firmiore, seu manu fricetur vel valide comprimitur, usque dum incalescat, mollescat, & evanescat, & sic vi compressionis succi tumorem constituentes iterum quaquaversum protrudantur & quidem per tubulos, & ne recidivam pariantur ægri, ad succos porro attenuandos obstructionsque reliquias tollendas, ipsi tumori superimponatur lamina plumbea aut alia simplex *Œo* incrustata, & super hanc Emplastrum tenaciter hærens (vulgò *Stiff-Plaster*) cum spleniâ compactiore & deligatione arctiore, eousque quo cystis rupta & materia intus contenta discussa fuerit, quod sæpè intrinsem & citius contingit: vel locolaminæ imponatur Emplastrum de ranis cum duplo *Œii* cum stricta ligatura, quæ impedit ne succi viscosi inconsuetâ cavitate iterum ut antè cumulentur. In quem finem & Emplastrum nostrum de Thea egregium erit, item de Labdano, Divinium *Barbettei*, Diaphoret. *Myns*. Alii aliquid de emplastris his dictis, aut gummi saltem *Œc.* dissolutum sub forma Emplastri laminæ plumbeæ supponunt, & factâ decente deligatione eundem expectant effectum. Sequens linimentum Gangliis illitum à pluribus magni æstimatur.

*Œ. Ol. Limac.*

*lumbrie. terr. aa. ʒij.*

*lil. alb.*

*chamomill. aa. ʒiijß.*

*verbasc.*

*Tabac.*

*sambuc. aa. ʒj.*

*castor. ʒß.*

Quo linimento manè & vesperti artus Gangliis infecti & deturpati calidè illinantur, vel loco hujus fotus instituat ex herbis *Ab-synth*, *Arthemisi*, *Origan*, *Salv. gran*, *Juniper*. in lixivio decoct. Item suffumigis utendum est ex gummosis aliisque discutientibus volatilibus. Sed breviori manu negotium hoc succedere videtur, si nempe pugni ictu duplici fortiore, membro super tabulam commodè situatam rumpatur capsula, quod vugus imitari solet, tumorem versus tabulæ apicem

apicem aliudve corpus solidius premendo, sicque pariter cystam ejus lacerando. Sed ubi Tumor altas jam egerit radices, & per annos duraverit aliquot, tunc ad præscriptum Celeberrimi Domini *Mys* ferula lignea haud differens ab illa, qua Præceptores in castigandis pueris utuntur, nisi quod plumbi portio in illius medio infusa jaceat, juvat, & talis ferula uno ictu, ægroti facie à manu affectâ in dorsum averfa, tumor rumpi solet. Quo remedii genere prælaudatus vir Ganglium per quadriennium patientem vexans evanescere vidit, cujus medela brevi per Emplastrum & strictam ligaturam absoluta fuit. Qui à duro hoc cuneo abhorrent, ii uti possunt sequenti vel simili linimento.

℞. *Ol. de Laterib.* ʒi.

*terebinth.* ʒiij.

*cera* ʒi.

*camphor.* gutt. v.

*vitell. ov.* No. j.

*M. f. linimentum.*

Quidam ex Chirurgis sunt, qui aperiunt Ganglia, eaque per suppurationem sanare tentant. Alii Emplastrum Arsenicale extollunt, ac dein ictum pugni. Rarum est, quod Cl. *Mys* refert in *Pedavio* suo ex *Blankardo*, materiam Ganglii ex cadavere exeuntam instar crystalli pellucidam apparuisse & satis duram, canique literas subiectas exhibuisse, multo majores, quam erant revera, sic ut illud Ganglion tum temporis pro microscopio interviret, quod tamen phenomenon non tam ejus pelluciditati, quam figuræ attribuendum existimo, quod facile experiri est, dum pupilla ex vitulo alioque animali exenta imponatur chartæ, literas videbis multo majores, quam erant revera.

In *Ganglio* ETTMULLERUS folia sempervivi majoris, cui detracta sit inferior cuticula commendat, quæ imponatur quotidie, manè & vesperti removendo, meliore jure applicatur lamina huius ~ vini camph. irrorata & adpersa euphorbio, quod Ganglia successively dissipare ajunt, ut penitus tandem evanescent.

Quod Therapejam affectuum reliquorum Tunicatorum *Atheromatus*, *Meliceridis* & *Steatomatus* atque, cura ferè eadem est, eorum enim sublatio fit per interna volatilia & fluiditatem succorum conciliantia remedia, ut sunt potius Theæ vel Caffæ more jam recepto calidè absorbendus, aliæque incidentia & Diaphoretica sæpius recensita. Cura verò insensibiliter peragitur per attenuantia & resolventia fortiora medicamenta, imprimis si tumores hi adhuc materiam fluidam contineant. Sensibiliter verò magis cura perficitur per Maturantia, Septica atque Sectionem.

Inter Resolventia medicamenta primas tenent calx viv. ejusque decoctum, ~ vin. camph. ~ matricul. cum aliis oleis aromaticis & gummosis mixta vel in Emplastrâ redacta, quæ sæpè post pigni ictum imponi possunt ad materiam melius resolvendam. Ex. gr.

℞. *Gum. Galban.*

℞ci.

*Syrac. calam.* aa ʒiij.

*Resin. pini* ʒi.

*Ol. Guajac.* ʒi.

*cera* ʒi.

*Philosoph.* ʒi.

*pulv. rad. bryon.* ʒi.

*M. f. l. a. Empl.*

Emplastrum nostrum de Thea, item de Labdano, de cicuta, de Tabaco, item Divinum de Rannis cum ʒ de Galbano *Mys*, & Magneticum, imprimis si quid Camphoræ addatur, egregia sunt in resolvendis quibuscumque Tumoribus, præsertim in his Tunicatis. Vel in forma linimenti sequens vel simile præscribatur:

℞. *Ungu. Dialth.*

*Martiat.*

*ol. Laurin.* aa ʒi.

*Philos.* ʒi.

*cera* ʒi.

*Tinct. Galbani* ʒi.

~ ʒci volat. ʒiij.

*Camphora* ʒiij.

*M. & illinatur, dein superius præscriptum applicetur Emplastrum.*

Balsamus Peruv. item vapor à pyrite ignita exceptus, & oleum rubetarum à *Barbette* laudantur.

Quoad maturantia medicamenta alteris notandum est, quod hisce cautè incedendum sit, ne, quemadmodum à potentioribus exsiccantibus durities redditur scirrhusa, maturantium fortioribus malignitatem cancerolam inducamus. Melius ergo mitioribus resolutentibus ut Empl. ex. gum. ℞. ol. succini & pulv. rad. pyrethri mixto tumores hi discutiantur; mediante enim hoc remedio Tumorem tunicatum in maxilla ruptum fuisse testatur *Sennertus*.

Cautica verò seu corrosiva medicamenta externa Tumores hos Tunicatos erodunt aliquid quando in usum vocantur, quæ cutem cum folliculo eorum abrodunt, sicque Tumores excavant, eapropter ea in Meliceride, Atheromate & Steatomate maxime conveniunt. Ex quorum erodentium seu causticorum classe cuti erodendæ applicandorum sunt lapis infernalis sive causticus officinarum, oleum vel butyrum ʒnii, item Gum. ʒi, vel quæ Escharæ, quam illa induxerunt, remota, ipsum folliculum penitus erodunt, inter quæ sunt viride æris, colchotar dulciss. Alum. ult. ʒi, & ʒi, ungu. fuscum *Wurzii*, quibus tamen medicamentis eo allaborandum est, ut cum materia contenta omnis folliculi substantia auferatur & ossa quoque, si his adhærescant tales humores, studiosè abradantur, aliis Tumores hi in ulcera abeunt fistulosâ, facileque repullulant.

Chirurgica ac manualis curatio horum Tumorum Tunicatorum consistit in pugna ictu, prout superius in curatione Ganglii diximus, postea curari potest ut aliud ulcus. Caustico prius adoriendi, & cultro reliquæ excindi possunt. Operatio ergo sequenti modo peragenda est: Incidatur cutis superposita ad formam crucis, & manu labris à Tumore separatis cystis eximii debet cum tota intus contenta materia. quæ interdum pinguedinis, mellis, pultis, interdum lapidis, vel calcis, vel etiam cere, vel glandulæ coctæ similitudinem habet, & si aliquid membranz remanserit, ad istam destruendam penicillum ~ Commun. inibui, & sic applicari potest;

Vel:

℞. *Empl. dialth.* ʒiij.

*ol. succini,*

ʒ aa ʒi.

M. &

*Atheroma, Meliceridum, Steatom.*

M. & applica Tumoribus Tunicatis, Lupiz, aliisque.

Materia sublata, curatur ut aliud vulnus.

Dum hæc scribo, in mentem venit sequens casus: Condiscipulus meus *Selen* dictus, Francothalensis, sub mento maximum sensum ac sensum nactus est Tumulorem Cysticum, quem tandem curandum suscepit Empiricus quidam Gallus nomine *Maavan* notissimus, qui materiam in Cystide contentam Sectione instituta me præsenso exemit promptissime, quæ materia erat glandulæ coctæ similis, sed post aliquot dies obveniebant Symptomata graviora, ut diei Sectione octavo inter parentum lachrymas optimæ hic spel juvenem animam afflaverit. Dum hæc scribo, puero Cystia aperiebatur tum difficile separatur folliculus evacuata jam materiâ, folliculi interna facies exempta materiâ est, quasi ex plicis composita.

Curatio *Emphysematis* consistit potissimum in renovandis tubulorum obstructionibus, per interna Diaphore ica volatilia ac carminativa specifica, ut sunt ~ nitri dulc. Essent. carminat. camomill. Root. cort. aurant. menth. Zedoar. arcan. dupl. sem. carminativa quæcunque, & ex his parata ~tus & olea. Omnia enim aromatica hic egregia sunt, ut Tinctura cinnamomi, macis & lexcenta alia cum ~ fœnicul. carmin. aliisque propinanda. In Juniorum gratiam esto sequens formula:

℞. ~ fœnicul. ʒij.  
carminat. ʒj.  
f. chamom. ʒiij.  
Essent. cort. aurant. ʒiij.  
~ nitri dulc. ʒß.

Syr. fl. chamom. ʒvj.

M. d. coelestium.

Vel detur per vices arcanum duplicatum à ʒß. ad ʒj. excellens in flatibus remedium, interponantur ~ anis. angel. matric. catarrhal. Elix. vit. Essent. bacc. lauri, Juniper. ~ \*ci anisat. Ut & omnia reliqua falsa volatilia oleosa conducunt. Solis enim sudoriferis internis curatur *Emphysema*.

Externè in *Emphysemate* conducunt sacculi ex fl. chamomill. sambuc. sem. anis. &c. in vino cocti & tepide parti flatulentæ impositi, vel parentur ex herb. ruthæ; sord. Malv. fl. chamomill. sem. cumin. carvi, bacc. lauri, Juniper. ~ \*ci, ʒi, &c. Ex quibus pro re nata parentur fortus vel Epithemata vino Gallico vel lixivio incoquenda, & calide applicanda. Vel sequens:

℞. ~ fl. sambuc.  
~ aa. ʒij.  
de vin. Camph.  
matricali,  
Angel. aa. ʒj.

M. cum quadruplicatis linteis applicandum Epithema.

Ceratum de *Cumino*. Empl. de bacc. lauri, de Theâ, de Labdano, carminat. Sylv. &c. optimo sæpe cum successu applicantur.

Tumores hi flatuosi haud incidi, aut ferro aperti debent; Gangræna enim ac Sphacelus facile subsequi solent. sed potius medicamentis idoneis cataplasmatibus, aliisque oleis chamomill. Philosophor. succia. carvi, cumini, anis. &c. resolvendi ac dissolventi sunt. Conducunt etiam suffumigia ex carminativis ac gummosis resinosisque parata.

## CAPUT XII.

### De Aneurismate & Varice.

#### §. I.

Affectus quivis & eorum causæ internæ non alibi querendæ sunt, aut reperiri possunt, quàm in succis & canalibus, ex quibus partes solidæ & universum corpus constatum est; nam quia sanitas, vires & vigor actionum à partium solidarum motu pendent, hæc verò à succorum agitatione, adeoque necessè est, ut succi per canales fluant resiliantque quæ deest viat, & modo ordineque, ut sanitas in propatulo sit; unde elucescit, actiones nunquam lædi posse, nisi læsis succis vel canalibus, aut ambobus. Itaque explicatis, quæ hic occurrere possunt vitii, referatæ erunt fores, ut clare læsarum actionum, adeoque morborum phenomenon causas clarissime perspicendo ob oculos ponamus. Nunc verò occurrunt & canalium sanguiferorum vitia, inter quæ imprimis perspicua sunt *Aneurisma* & *Varix*.

*Aneurisma* dicitur etiam Latinis *Arteria dilatatio*, & describitur vulgo, quod sit tumor extraordinarius continuò pulsans, digitis facile cedens, ac propediem iterum sese extendens, ab arteriarum interioris tunice rupta, & exterioris dilatatione. Brevissime describi potest, quod sit ruptura interioris Tunice arteriæ à causa quæcunque violentia producta.

*Varix*, Græcis *υπερ*, vocatur, Germanicè *varia*, generaliter dicuntur Varices die Krampff-Hödem/ specialius verò die Rinds-Blattern/ quoniam gravidis plerumque accidunt. Varices ergò nihil aliud sunt, quàm venarum nodosa, livida & molles intumescitæ, tractum atque colorem illarum obsestantes, quæ compressæ quidem digito imposito cedunt, mox tamen recurrunt, à sanguine crasso & ad stagnationem apto circa valvulas alicujus venæ, cujus membranz à majori sanguinis copia ibidem cumula ita distenduntur, ut sacculos quasi sanguine repletos efforment. Varix vulgò describitur, quod sit venæ dilatatio extraordinaria vel cum vel sine ulcere existens, contingensque modo in temporibus, modo circa umbilicum, frequentissime verò in cruribus, ut plurimum à nimia dilatatione venarum oborta. Me judice describi potest, quod sit venarum extensio nimia, à causa violenta cum interna tum externa oborta.

§. 2. Aneurismatis Pars afflicta sunt Arteriæ, & ari afflicta vasa ex fibrillis albis constata, sanguinem ex du globulis ovalibus constantem vehementer, quas arterias vasa esse continuata sanguinera solide probat D. Antonius van Leeuwenhoek, & in Collegis Anglicanis, in *Ysaïam Belgicæ*, Den

FFFF

VVAARTIG



*vanragtigen Omloop des Bloeds.* Cor quidem contrahitione sua sanguinem ex ventriculis suis in articularum immittit, sed quoniam arterie sensim decreverunt, sanguis in eas injici nequit magno eum impetu, quin eas tunc faciat. Cum arteria hoc modo tument, ad pristinum redeunt statum. fibrarum suarum elatere, & ea ratione partem sanguinis, quem acceperunt, cordis venis impendunt. Et cum cor iteratis vicibus sanguinem in arterias protrudat, ita etiam illa extolli debent & subsidere, iteratis vicibus. Mortuus iste Arteriarum Pulsus vocatur, circa quem annotandum est, arteriarum dilationem cordis contractionem concomitari, & arteriarum contractionem ejus dilationi adjunctam esse. Illi, quibus satisfaciit perspicuus rerum conceptus, cordi tantummodo tribuent munus sanguinem in arterias compellendi, ipsi quoque precipuum circulationis instrumentum existimabunt. Illi, qui autem cor esse sanguificationis organum, permittendum est, in certiori inniti conjectura. In omnibus vero corporis partibus, ubi existunt Arteriz, Aneurisma contingere potest. Sic in Nallo Virgo post variolas Aneurisma passa est, prout testantur *Bartholinus Alia Haffnensis*, & quidem *Obs. Si. vol. 1.* quod Aneurisma nullis remediis cedens febris superveniens curabat. In brachio, pedibus, collo aliisque locis observavimus Aneurismata, quae etiam internè nobis non observantibus contingere possunt.

*Varicum* pars affecta dicuntur *venae* cum suis valvulis, itidem vasa sanguifera, & quidem vulgo revehentia dicta, sanguis enim copiosus, crassius ac acidus à venis majoribus ad minores fluens ob crassitatem & suam viscositatem ad valvulas valorum subsistens & incrementum capiens, *venae* tunicam facilius mare distendere, & talem faciculum varicosum producere ac efformare potest. imò & internè *venae* à tali affectu non immunes sunt, uti *Varices* in venis pulmonum annotavit *Hippocrates*. Utplurimum vero *Varices* in gravidarum cruribus ac Abdomine observantur, qui tamen in omnibus corporis nostri partibus contingere possunt.

Diagnosi  
Aneuris-  
matum.

§. 3. Nunc ad Diagnosticon horum vasorum sanguiferorum affectuum nos accingamus. Aneurismata externis in partibus in sensus nostros facile incurunt; Tumor enim est arteriarum mollis & latus, ut digitorum compressioni aliquo modo cedat, mox tamen redeat; quamvis cum tempore & in Aneurismate inveterato tumor satis durus ac magnus evadat, prout Aneurisma pugni magnitudinem excedens & §. circiter unciam pondere vidit *Celeberrimus Dn. Schrakerus*. In Aneurismate pulsus deprehenditur pulsui Arteriarum respondens. Circa Aneurisma siugillatio vel livor utplurimum observatur, cuius deest densitas, sanguis enim extra illius cavitatem erumpens in loca vicina fertur, & apertio ejusmodi laesorum vasorum arteriosorum causa est, quam infelix Venesectio saepe suppeditat.

Prognosi  
Varicum.

Varices quoque externi in conspectum veniunt & facile cognoscuntur ex ipsorum livore & tumore molli, in cruribus enim & prope malleolos aliquoties hi Tumores varicosi, lividi & subcutanei observantur ad mori vel uva magnitudinem, quales nodos in virgine rustica *Celeberrimus* observavit *Georgius Francus in Deurr. Ephem. Ann. 3. Obs. 12.* qui varices etiam sponte

quinque rumpebantur, & inde effluebat ultra libram sanguinis, quos sponte apertos vidit *Cl. Fidelem A. G. Deurr. 2. Obs. 15. F. p. G.* In gravibus utplurimum observantur imprimis circa femur, abdomen & crura. Interni Varices vix à Medico oculatissimo cognosci possunt. *D. Johannes Murillet, Chirurgus noster Audicum nuper* vidit Aneurisma in Brachio circa cubitum Viri Juvenis alicujus, ovi struthionis magnitudinem excedens, quod per annorum aliquot spatium absque ullo incommodo gestabat, sed strepitum continuum produxit tumor, non aliter ac ventus sibilare solet, sanguis enim sic cum impetu irruibat. *Paracelsus* ait, si crurum venae timeant, qualescunque sint, nodosaeque hiant globulorum instar, cum nativi coloris in cereuleum, nigrum aut subviridem transmutatione, velut inflata entis praefer carnis detrimentum, Varices fore judicabis.

§. 4. *Galenicus Aneurisma* dicitur dilatio arteriz, seu tumor arteriz, qui est ad tactum mollis & digitis cedens, quem ex sanguine & spiritu generari dicunt. Fieri & Aneurisma aput arteria lauciatà, ubi quidem incumbens ipsi entis ad cicatricem devenit, manserit autem vulnus arterie neque conglutinata, neque cicatrice obducta, neque carne obturata. Cognoscitur affectum hunc ex pulsu arteriarum, imò ubi comprimuntur arteriz, tumor omnis disparet. Quae ex oculi arteriz aperture sunt, oblongiores apparent, & in profundo consistunt, & ad digitorum impressionem, velut strepitus quidam auditur, quum in affectionibus ex ruptione nullus sonus percipiatur, & sint quoque haec magni rotundae, & in lunum occurrant.

*Varix* *Galenicus* dicitur *vena dilatata*, quae *Varicula*, occurrit aliquando in temporibus, quandoque juxta uni ventris partem sub umbilico, maxime vero circa crura. Generationem hujus affectus juxta ipsos ex materia atrabiliosiore ortum habere contendunt.

§. 5. *Paracelsus Aneurisma* ex sanguinis arteria sale caustico oboriri contendit, & *Varices* juxta ipsum oriuntur ex sale plumoso, quod cum substantia resolutum est: illis venire ait, qui cavernosum milcus expectant: ac mulieribus gravidis: ideo quod ulcus hoc in matrice debeant expectare per generationem in eadem venas expulsam. Notat enim asterisco, cum sal ali-quod ex operatione propria se ipsum aperit, ejus est sanitas: ubi non, transiit ad radices hujusmodi venarum, & ulcus cavernosum intrinsecum generat.

*Hilmonius Aneurismata* ac *Varices* ab Arteriarum ac Venarum partium à sanguine multo cruore repleto distentione originem sumere, & natales suos habere sibi imaginatur, ac de eo non amplius dubitat.

§. 7. *Aneurisma* secundum *Willisii* opinionem oritur à causa vel externa vel interna; causa externa est arteriz sectio vel punctio, ab aliquo instrumento talem effectum producere valente inducit. interna vero est sanguis salibus acerbis & erodentibus luxurians; quorum particulae quaedam Tunicarum arteriarum poros subingressae, fibras Tunicae interioris discedunt ac dissecant, illamque ab exteriori robustiore existente separant. Sanguis vero eodem semper impetu circulum suum agens, hiatum illum in cursu suo obvium subingreditur, & spatium istud inter

exter-

exteriorem & interiorem arteriæ tunicam subsistens subiens, ipsas à se invicem latius sejungit, & aggestione sua validius illas distendens atque extollens, Tumorem Aneurisma dictum generat.

Varicæ.

Varix, sentiente Authore nostro, inducitur à sanguine crassiore & fœculentio in venis remanente, illarumque Tunicas dilatante. Crûor enim ex arteriarum osculis elapsus, & venas subingressus, tardiori multò quàm antea motu agitur, tum ob spiritus parviori copia illum tunc inhabitantes, tum ob tunicarum venarum tenuitatem, eamque laxitatem: quo fit, ut sanguis, qui arterias torrentis instar percurrit, testudineo quasi gressu in venis circuletur. Si verò cruoris massa spiritibus sit jam depauperata, aut liber ipsi non suppetat commeatu per venam aliquam vel compressam vel obstructam, in vasis alveo detentus sanguis tunica fibras & poudere suo & aggestione à se invicem dimovebit, illasque extendet ac elongabit, & venæ parietes dilatans, illius cavitatem ampliat, donec in tumore elevabit.

Sylvi opinio de causa Aneurismatis & Varicæ.

§. 8. Sylvi de causa Aneurismatis ac Varicis disticens statuit Arteria Tunica læsa Aneurisma, Venæ autem tunica intima læsa & laxata Varicem excitari, quia juxta ipsum aquè in Arteriis ac Venis requiritur conveniens hœritas & soliditas, quo sanguis per ipsas debet moveri & propelli queat.

Cassius opinio de causa Aneurismatis & Varicæ.

§. 9. Cassius adscribit originem Aneurismatis nimix exterioris arteriæ tunicæ extensioni, quæ à sanguine per interioris tunicæ fibras resolutas, suppuratas aut contusas, ad exterioris fibras fortius allabente, & motu suo pulsorio in eas agente frequentius dependeat, abs quo etiam pulsus & continuo sanguinis allapsus ipsa ista tunica exterior nonnunquam dirumpatur, & sanguis effusus circa eandem stagnando coaguletur. Externa quædam infortunia, qualia sunt lapsus, contusiones, alique offensiones, malo hinc interdum aniam præbere aſſerunt, dum arteria sanguine turgida vehementius percutitur aut contingatur, qua violentia fibræ internæ valde laxantur, & nonnunquam penitus diffingantur.

Varicæ.

Haud absummi ratione etiam Varices progenerari credunt, dum scilicet à vi quadam compressæ venæ sanguini ab arteriis fortius pulsio transitum permittere nequeunt, qui circa valvulas subsistens, & copia auctus ibidem loci venam distendit & tumorem producit, inter dum ob segregatas partes chylolosas aſcendentes in suppurationem prodeuntem. Compressionem verò istam venarum sæpius contingere dicunt, dum homines grave aliquod onus in altum elevant, aut etiam humeris vel capite gestant, ita enim muscoli ad laborem istum exandandum liquore nervo admodum reſerti & intumescentes, vicinas premunt venas, & easdem coarctant, ut sanguis libere satis per eas transfluere nequeat. Factum quoque in gravidis eandem compressionem aliquando insituisse, cum aliis fatetur.

Notra sententia de causa Aneurismatis.

§. 10. In quo autem Aneurismatis indoles consistat, nôstram nunc inter tot Authorum discrepantias deponamus sententiam: rupturam enim interioris arteriæ tunicæ ex triplici substantia glandulosa, musculari & membranosa ad mentem Willisii, constantis, exterioris autem nervæ extensionem, cui pluribus visum est, admittere vix posse alii aſſerunt. Nonnulli sagaciores

addunt vix possibile esse internam & crassam satis tunicam rumpi posse externa tenuissima salva manente, nisi fortè internam durissimam à sanguinis stagnantis acrimonia sensim atque sensim erodit, externa interdum crassiore reddita, & sanguini irruenti extensione sua, utpote molliori, amplius spatium concedente, imò utramque tunicam imbibendo ferossi humoris plures, quàm ordinariò aliàs solent, particulas extendi, sicque Aneurisma quasi aliquod produci posse plures aſſerunt. Sanguis in Aneurismate remoram ducens vel stagnans in arteria summam sæpe acquirit acrimoniam, quæ erodit internam arteriarum tunicam, & hinc excitat tumorem cum pulsu forti, quod in arteriis carotidibus in collo ut plurimum accidere solet, & nonnunquam quoque in alijs minoribus, raro vel nunquam in majoribus. In his enim ratio ejusmodi distensionem vix ac ne vix admittit, cum tunicarum illarum fortis resistentia istam impedit, nec valvula adit, motus quoque celerior sanguinis, quàm in venis existet, quæ omnia impediunt, ne tam citò exciteur Aneurisma. Frequentissima Aneurismatis causa est sæpe pertusio arteriæ loco venæ. In vasis corporis arteriis Aneurisma excitari posse testantur Monumenta Medicorum; Aneurisma in Aortâ obſervavimus, VValæus ex disruptâ arteria Aneurismata obſervavit, quod quartam Thoracis occupaverat partem.

Varices, me judice, ut plurimum à massa sanguineæ particulis multis, acidis, terrefcentibus & viscidis stagnantibus, ac vasa venosa ipsorumque valvulas nimis distendentibus oriuntur, ab acidi enim & viscosi nimia quantitate atlumpra, sanguis crassus ac ad stagnandum aptus redditur, quare & portio illius ad venam deferri, & moram præsertim circa valvulas alienius venæ necdere potest, inde membranz venarum vel valvularum à majori sanguinis copiâ ibidem cumulatâ ita distenduntur, ut succi ex arteriis inter membranas illius venæ dispersis egressi, & per membranarum tubulos fluentes libere transire nequeant, sed stagnare cogantur, sese inter interstitia fibrillarum figant & quidem tanta copia, ut hæc non tantum dilatentur & amplientur, sed ut præterea etiam aditus spiritibus animalibus intercludatur, ex nervulis in tubulos illos prolabantibus, ac venam aliquatenus constringentibus, inque illo motum quandam peristalticum producentibus, ad sanguinis circulationem in venâ promovendam, atque sanguis in venâ illa stagnans, membranas illius admodum distendens, Varicæ causa esse potest.

Cur Varices frequentissimè in cruribus accendant, ratio est, quia valvule in ramo crurali fortissimæ, imò duplices existunt, quæ sanguini affluenti valde resistunt. Quòd verò Varices potius in Tibiâ & inferioribus corporis partibus prodeant, causa & ratio est, quòd sanguis venosus ibidem adſcendere debet per viam horizonti perpendicularem, & aliquando hæc via aliquatenus occluditur à ligaculis illis, quibus crura constringere solemus ad retinendos caligas. Sanguis ergo majori, quàm par est, copia cumulat in venis, quasdam ipsarum venarum membranas distendit magis, quàm alias crassiores, & sic recessus, seu sinus, seu sacculos sibi formant, ac præsertim circa valvulas, in quibus sanguis indole sua jam acidiusculus, majorem adhuc acorem contrahit,



hit, quia ibi diutius absque circuitu commoratur.

Dolor si quis oboritur, ratio est, quod sanguinis particulae plures acidiores in carnem vicinam transeant per sinus, & sic fibrillis ibi irritatis & postea plane discissis, dolor in mente oboritur, & si plures fibrillae discinduntur à particulis istis acidioribus, aliquando ulcera dolorifica & profunda excitantur, hinc etiam sordida redduntur, & quidem ab acridio humore ac tenui, cui admixtae sunt particulae quaedam viscosiores ac magis ramolae, quae ramulis suis sibi mutuò implexae ac haerentes in superficie ulcerum illa sordida reddunt. Reliqua phaenomena ex his principis facile deduci & explicari possunt.

*Prognosis  
Aneurismatum.*

§. 12. *Aneurismata* minora, inque minoribus arteriis & his non adeò profunde delitescentibus contingantia, imprimis si à dilatactione tantum arteriarum, facilius curantur, quam quae in maioribus arteriis, & à rupturà orta fuerint, quae maximo cum periculo conjuncta sunt, ita ut hoc respectu *Bartholinus Cent. 3. Epist. Med. 54.* merito scripserit: *Deum solto precari, ut huiusmodi casus vel avertat, vel mea cura subtrahat.* Si aperiantur Aneurismata, sanguinis fluxus difficulter sistitur, & partes adiacentes facile in Gangraenam abeunt: sic & *Celsus* *Bartholinus* lethale vidit Aneurisma in Juvene Nobili ex laeso femore, quia arteria magna cruralis rupta fuit, hinc sectio non tuta erat aut possibilis, propter materiae copiam, & inter muculos delitescens ingentem rupturam, ne ligatura sufficiens erat, quale quid Hannoverae in fabro lignario sibi arteriam cruralem ludente observavi, cui quaecunque generalia remedia adhibebantur, aut sinistrae affectu, mente enim uno vel altero post istam magna effusa sanguinis copia, Hydrope defunctus est. Ex his omnibus apparet, quod Aneurismata majora sicut difficilius curationis sunt, ita minora interdum adhuc curam àimitant. Antiqua verò, ac quae ab arteria profundius latente exoritur, nec non quae ex nimis adstringentibus callosa facta sunt, vix sanantur, & membri exstirpationem saepe expostulant. Externa verò Aneurismata aliquando sunt absque periculo, & aegri diu perficere esse possunt, quoniam tamen periculum est, ut sanguis tandem corruptionem vel gangraenam concipiat, subinde necessum est, ut curentur.

Si Tumor Aneurismatis non adeò magnus, nihil periculi fovet, sed cum eodem vita satis diu protrahi potest, refertque *Sennerius L. 5. p. 186.* Mulierem quandam Aneurisma nuci juglandis magnitudine in cubiti flexura ultra triginta annos gestasse.

Si incautè Aneurisma aperiatur, non nisi mors expectanda est; unde si Tumor minor exstiterit, melius est incommodum levius tolerare, quam periculosa curationi se submittere, nihilominus si major, materiae latens putrescat, gangraena & mors expectanda, quae pariter metuenda, si sponte sua rumpantur Aneurismata. *Conf. Epist. G. Decur. 1. A. 7. Obs. 207. 208.*

In Cive A. W. Limburgensi rupturam Aneurismatis post febrem salutarem reperimus, sed hoc inter rara numerandum est contingentia.

*Prognosis  
Varicum.*

Utut Varices generati in cruribus femoribusque nihil periculi inferant, metuendum tamen, ne rumpantur, cum ex earum spontanea apertione plura pejora symptomata, imò mortis periculum oboriri queant, quale subit illa gravis, cui sinistri pedis varix rumpebatur, quae confusim exstillante sanguine, maritum vocat, fluxum ut inliberet, quod cum non posset, subito exstincta est, ceu testatur *Observatio 204. Decur. 1. Ann. 3. Eph. German.* quod etiam facili morte contigisset illi, cuius *Observ. 54. ejusdem anni* mentionem injicere, ni manus Chirurgi auxilium attulisset. In gravidis Varices quandoque turgescunt à foetu excluso iterum sponte subsident & disparent ceu in conjugē nostrā Charissimā Susanna, nata Svert, aliquoties observavimus. Varices etiam in ulcera diuturna transeunt, imò & dolore & inflammatione oebile possunt.

Melancholicis, quibus sanguis est crassus ac acidus, sunt Varices familiares, quibus etiam salutare esse & ab infania eos liberare ait *Hippocrates S. 6. aph. 21.* In scroto varix existens hernia varicosa dicitur, ejus prognosim proprio capite. Gravidis in femore & cruribus Varices valde molesti sunt, & quidem ultimis mensibus, post partum vero rite fluentibus lechius sponte obliterantur. In non gravidis & sanguineis Varices cum euphoria saepe rumpuntur. In ulcus vero, ceu dictum, saepius transeunt diuturnum.

Sectio periculosa est, quin & ruptio quandoque lethalis, quod illa femina 7. menses gravis experta est, cujus in *Ephem. Germ. Ann. 3. p. 380.* mentio fit. Haemorrhagiam enim lethalem causantur Varices apertae, quam laepe excipit ipsa Mors, linea ultima rerum: *Paracelsus* enim inquit, cutis in turpissimum forentissimumque foramen aperitur, quod si cum laterum punctationibus accidat, morti judicatur morborum obnoxium esse.

§. 12. In Affectibus canaliculorum sanguiferorum *Dietam* etiam *Dietam* accurata observanda est, & eò dirigenda, ut massa sanguinea ab acidis ac viscidis particulis, quae causae antecedentes nomine gaudent, liberetur. In aere ergo Aegri versentur moderate calido. Cibus sit tenuis, mollis, facilis, vitentur ungue pejus alimenta ingrassantia acidaque, quae multum contribunt ad hos affectus canaliculorum inducendos. Potus sit eodem modo comparatus, conducit prae omnibus calidus, potus Theae vel Caffee, vel cerevisia tenuis, in aliis vinum generosum vel Gallicum cum C.C.C. volatili more solito in mensa assumtum, quo acidum vini corrigi potest. Exercitia mediocria, non verò nimia, conducunt, à quibus abstinendum. Somnus ac Vigilae pro consuetudine instituantur. Hilaritati dent patientes operam; Alvus & imprimis menses in sexu fequiores respondeant ordinario cursui. Animi pathemata, ut meror, ira, terror, aliaque vehementiora vitentur summo perè, ne sanguinis coagulationi ac stagnationi in vasis sanguiferis animam demus.

§. 13. *Periustratio* fonte *Dietetico* nunc ad Pharmacuticum ac Chirurgicum. Nos confertanous, & primò *Galenicorum* de hisce intimis perspiciamus opinionem, qui in curando Aneurismate tutò incedunt, quae enim Aneurismata in aliis & inguinibus ac collo vint, itemque in aliis locis, si magnitudine excedunt, ea Chirurgia non tentant, ob magnitudinem vasorum; quae vero in extremis partibus & artubus, aut in capite consistunt, ea sic aggrediuntur: Si ex apertione arteriae tumor

*Galenicorum  
tam mo-  
do curan-  
ti Aneuris-  
ma.*

tumor factus est, sectionem rectam in longitudinem cuti insigunt, deinde disparatis per hamulos labiis, velut in vasorum excisione solent, excoriantes & per apta ad hoc instrumenta à membranis repurgantes, arteriam nudant, & acus sub eâ transmissione, & per duo fila deligatione usi, ubi prius intermediam arteriam partem scapello pungunt, & quod continetur in eâ evacuant, superante curatione utuntur, donec deligata filorum vincula excidant. Si verò ex arteriæ ruptione dilatatio facta est, totum ipsum quantum ejus fieri potest, unâ cum cute digitis prehendunt, deinde acum infra apprehensam trahunt, quæ duplex filum trahat: & post trahitionem, ipsam duplicis filam illam dissecant, & sic per duo fila tumorem hac illac deligant; quòd si tumor seu metus sit, ne fila delabantur, etiam aliam acum transmittunt, quæ priorem per totum premat, similiterque duplex filum trahat, & anis dissecta, sic per quatuor fila tumorem deligant. Aut apertò juxta medium tumore, post excretionem ejus, quod in ipsâ continetur, cutem amputant, eo quod deligatum est relicto, & splenio vino ac oleo imbuto imposito, curationem per lineamenta perficiunt.

*Varices.* Galenici *Varices* curant adipe gallinaceo cum capâ triti imposito vel per ducto assidue. Ad *Varices* fugandos commendant Hederæ radicem quum fuerit Luna in Aquario, alii hederæ baccastres, quæ per parietem repit, pedi in quo sunt *Varices*, alligant vel radicem ejus circumdant. Ad *Varices* qui suffunduntur & claudi non possunt, lanuginem de papyro apponunt, & sic eos claudi dicunt.

*Varices* ne nascantur lacertæ sanguine crura ægri junxi illinunt: ad *Varices* succandos sequuntur:

*℞. Servi hircini 3j.*

*Saponis 3vj.*

*M. & lineto oleo illitum medicamen apponunt.*

Quibus *Varicibus* etiam mederi balnea aluminosa haud dubitant. His vero aliisque frustra tentatis ad Sectionem *Varicum* accedunt, quam operationem sequenti modo describunt: Lotum enim hominem, vinculo in superna femoris parti circumdato, ambulare jubent, repletam autem venam attramento scriptorio aut collyrio, secundum situm ipsius, ad trium aut paulo amplius digitorum longitudinem notant, & reclinato extensis cruribus homine, alterum vinculum supra genu circumdant, & elevata in fastigium Venâ, scapello in loco, quem notant, secant, non altius quam per cutem, ut ne venam dividant: & labiis sectionis per hamulos distentis & membranâ per incurva scapella ad harniam aquosam paratâ excoriatâ, nudatâque venâ, & undiquaque expallâ, femoris vincula solvunt, & elevato per cæcum hamulum vase, acum duplex filum trahentem subjiciunt, quumque fili dissecant, & divisa in medio venâ per venæ sectionem scapellum, sanguinis quantum opus est evacuant, deinde ano filo superiori valis partem constringunt, & crure in directum extento, manu expressione sanguinem, qui in crure est, evacuant: & postea rursus inferne vas constringunt, aut partem venæ inter vincula interpolant, præsectam auferunt, aut etiam manere permittunt, donec sua sponte unâ cum vinculis

excidat: & linamentis sicis inditis, & si lenio vino ac oleo imbuto imposito deligant, ac ductu suppuratorio medicamentorum, quæ linamentis excipiuntur, curant. Plures inter Veteres vinculis non usi sunt, sed statim nudatum vas excindunt, quidam ex profundo extentum ipsum cum violentis extrahunt ac abrumpunt.

*§. 14. Paracelsus* in curandis *Aneurismatibus* & *Varicibus* à corticosis aquis, balneis, purgantibus cavendum esse præcipit, item ab omnibus unctionibus morbillorum, à Merc. & Sulphure.

Ad *Varices* tollendos & *Paracelsus* ad sectionem sequenti modo confugit: Aperiantur venæ cum tempore digesto, postmodum liquoribus gingivarum leporum ungendum erit per tres aut quatuor septimanas: unam tantum esse aperiendam venam per vicem monet, & postmodum alteram, non verò ambas simul. Digestum tempus esse ait, cum per annum abfuerint, ac postea redeunt. In Anno semel si venerint, & venæ semel aperiantur, si bis, & bis juxta ipsum aperiendæ sunt ordine, deinde leporum gingivas, aut pinguedinem humanum superponit.

*§. 15. Helmontius* in curatione *Aneurismati* ac *Varicum* cum *Paracello* ut in pluribus aliis convenit, eandemque approbat.

*§. 16. Willisius* arteria puncta aut secta fuerit, statim partem læsam stridè ligat, vel pumbi laminam illi imponit. Si hoc non suffecerit, valida applicat parti adstringentia, qualia sunt terra sigillata, terra vitrioli dulcis, bol. Armen. sperniol. Croll. &c. cum laudano opiato mixta, itisque Emplastris superimponit laminam plumbeam, & tandem si istis medicamentis cura uni non fuerit Aneurismata, cum aliis Auctoribus arteriam aperit, illique vitriolacea blande corrodentia applicat, & deinceps foras in consolidat.

*Varicibus Willisius* medetur purgura acis *Varices*, sanguinem crassiores evacuando, si tumor grandior fuerit, & postea laminam plumbeam illis applicat. Laudat etiam unguentum *Harmanni* ex Butyri Majalis part. j. & succi ex fluviali, part. ij. simul coctis paratum, quod insinuat interius laminæ *Varicibus* applicandæ. Sequens quoque à *Fernelio* propositum commendat.

*℞. Alumin. roch. q. v.*

Coq. cum aceto acerrimo, & spongia eo imbuta parti applicetur mane ac vespere, illique stridè alligetur, quod per mensis curiculum continetur.

*§. 17. Sylvius* in curandis *Aneurismatibus* ac *Varicibus* varia constringentia approbat medicamenta unâ cum venæ sectione insinuatâ, nec non vincula ac ligamenta varia tum Aneurismatibus tum *Varicibus* circumponenda æstimat.

*§. 18. Carcassani* ad curationem *Aneurismatibus* rite perficiendam, opus esse censent, ut sanguis arteriæ tunicam dilatans & in distentionis loco firmiter hærens inde ad aliam arteriæ depellatur regionem, ut fibræ postmodum tunicæ exterioris distentæ quantum par est in situm pristinum reducantur, & sanguis ubique liberum per arteriam reperiri transiunt. Hunc ut attingant scopum, tumorem digitis comprimunt, & emplastrium imponunt exsiccans & constringens, cui laminam superdant plumbeam ad fortorem impetrandam compulsionem. Convenire vero ex emplastri hoc in casu dicunt Diapomphos.

*Paracelsi  
cursatio  
Aneuris-  
matibus  
Varicum,*

*Helmontii  
de Aneuris-  
matibus  
Varicum  
cura  
sententia,  
Willisiana  
ratio cu-  
randi  
Aneuris-  
ma,*

*Sylvii opi-  
nio de cu-  
randis  
Aneuris-  
matibus  
Varicibus,  
Carcassani  
methodus  
curandi  
Aneuris-  
ma,*

pholygos, deficcativum rubrum, ad rupturas, vel quod sequenti modo componitur.

℞. Scor. ferri 3v.

mum.

tragacanth.

Gumm. Arab. aa. ʒiij.

thur.

acac. aa. ʒi.

Glutin. vulg. ʒiij.

gypsi ʒij.

Resin. ibid.

Cum succ. consolid. maj. & vera miniat. q. s.

F. Ceratum.

Diutius autem hæc emplastra continuanda esse monent, ut optatum præstent effectum, qui si obtineri non possit tandem perspicitur, sectionem seu deligationem arteriæ instituendam concedunt, modo à perito Chirurgo, & cautè peragatur. Denudari enim ipsam volunt arteriam, ut Aneurisma integrè veniat in conspectum, tum arteriam supra & infra tumorem filo quadruplicato sericeo cerâ abundè obducto arcè vinciunt, & Aneurisma in medio ligaturarum excindunt, quo factio vultus balisamo implent Capayvæ, & donec carne impletur fortiter deligant. Vulnerè ita sanato, vinculum super illo per anni spatium continuò gestari volunt, & post tempus hoc sensum relaxari, donec penitus auferatur.

Varices leviores & recentiores blandius tractant, adhibendo scilicet externa linimenta emollientia & resolventia, ex sevo hircino, butyro majali, verbaschino, oleo hyperici, unguento martiato, & similibus, nec non fotus & balnea convenientia ex radicibus altheæ, scrophulariæ, bryoniæ, herbis agrimonix, malvæ, foliis & floribus sambuci & similibus parata, quibus sanguis spissior ad fluorem restituitur. In gravidis enim fortiora non admittunt, cum patu felicitè peracto, & onere hoc comprimente remoto sanguis liberiorè faciliè requirat per venas transitum, in aliis verò nec remedia interna sanguinis motum circularem promoventia, nec externa comprimentia, & ligaturas contemnunt, ut ita sanguis è loco pellatur, & dilatata vena tunica consistatur, quapropter sequens etiam, vel simile quoddam emplastrum haud ineptum fore confidunt.

℞. Thur. ʒʒ.

aloes ʒij.

alium, ovi q. s.

M. F. Emplastrum.

Quando verò sanguis induratus & in thrombos coagulatus nec dispergi, nec in fluorem ulterius redigi potest, atque in cruribus existens magnum in ipso ingressu excitat dolorem ipsam etiam aliquando tentant varicum apertionem, ut sanguis ille crassior compressione sursum deorsumque factè evacuetur. Sectionis verò huius modum longo jam usu receptum non improbant, peragiturque, dum ægro resupino & cruribus modicè inflexis in scanno collocato crus ad venæ intumescientiam supra & infra tumorem fascia ligatur, venaque in conspectu sic posita atramento notatur, & cito elevata succumque digitis obducta, sicque juxta lineam annotatam in longum dissecta, denudatur, & à corporibus circumjacentibus explicatur, hinc acus obtusa, ne partes violet, & duplex filum trahens, ipsi subjicitur, ac supra transmittitur, quo tanquam

habenâ elevetur. Solutis posthæc cruris ligaturis, vena partè supernâ arcibus ligatur, ac infra ligaturam non aliter, ac si phlebotomia sit celebranda, per medium scalpello dividitur, ut sanguinis parte inferna quantitas sufficiens detrahatur, & tum eadem vena partè etiam inferna ligatur & vinculo constingitur. Intermedia verò portio inter ligaturas abscinditur, extremitatibus utrimque in carnem se subducentibus, vena ligaturæ ad spontaneam usque decidentiam permittuntur, & post triduum vulnus consolidantibus & sarcoticis, pro more in aliis vulneribus consueo, ex arte tractatur.

§. 19. Aneurismatis curatio, meo iudicio, in eo vertitur, ut fibræ ruptæ vel dilatate arteriæ cuiusdam lasæ iterum uniantur; si ergò Aneurisma est à pertusione arteriæ loco venæ, mox forti ligatura pars lasæ ligetur, vel lamina plumbea vel placentula On. Mmij imponatur, & fortiter ligata pars lasæ firmetur. Sunt etiam quidam, qui in opposito latere ad sanguinem imminuendum V. S. instituunt. Sola verò admodione spleniorum & fasciarum in cura recentium Aneurismatum felix fuit Morellus testante Zodiaco Med. Gall. Ann. 3. Obs. 1. Sed, aie iudice, cautè ligaturis hisce mercandum est, ne necrosis partis subsequatur, cùm strictionibus ligaturis commensus sanguinis ac succorum interceptiatur. Adstringentibus tamen & arcè ligatura malo huic obviam eundem esse omnes ferè afferunt cum Medici, tum Chirurgi. Hinc parti affectæ applicare solemus variæ ex farina volatili, gypso, bolo Armeno, sanguine Draconis, Thure, aloë, succo plantaginis, bursa pastor. hypocistid. acac. spermiol. Croll. parata remedia, modo in forma pulveris, modo cataplasmatum imponenda: Emplastrum Diachalcit. contra rupturam, de arietin. pell. applicata cum summo deligatione, modo membri talis sit constitutio, cui ligaturam commodam applicare licet, v. gr. in Collo, ubi digito vel manu saltem comprimendus tumor, quo ipsius augmentum inhibeat, imò aliquando planè evanescat: aliàs deligationi subijci potest lamina metallica firmiter reprimens, imò si loci conditio fasciarum applicationem haud ferat, v. gr. prope arteriam asperam, plurimæ ejusmodi laminæ sibi invicem superimpositæ, plumaceolis instructæ, & vinculis firmatæ sufficere debent. Si verò Aneurisma à causâ externâ, ex gr. à punctura oriatur, & hæmorrhagia sequatur, sanguinis effluxus antè omnia impediendus est, & punctura loco applicetur lineæolum duplicatum cum liquore diptictico nostro imbutum, vel Tincturâ Aris. Oli. vel imponatur Colophonium pulverisatum per se vel cum albumine ovi permixtum, egregium sanè diptictum. Manus adstantis locus fortiter comprimendus est, & in opposito latere pro re nata V. S. instituunt, sed ne quid nimis, interium pulveres adstringentes ac Emplastrâ applicantur, superior verò membri pars linteis aqua spermatis ranarum mediis involvatur, ac fasciâ duorum capitum munitur sepius circa partem affectam circumvolvenda, atque sic membrum lasum per spatium aliquod dierum relinquatur in situ congruo.

Nec interna cura utroque incalu negligenda est; si enim Aneurisma ab actimonia interna canaliculos sanguiferos corrodente ortum habeat, præscribenda sunt omnia absorbentia, ut sunt oculi ʒi. corall. ʒbur, C. C. f. Δ pp. tetr. sigill. crystall.

Notæ ap-  
paratur  
ad curan-  
dum A-  
neurisma.



## CAP. XII. DE ANEURISMATE ET VARICE. 599

crystall. mont. & sexcenta alia, nec negligenda sunt spirituosia oleof. ut ~ matricaria oleof. ~ volat. oleof. &c. Si vero jam hæmorrhagia præsens sit, conveniunt Tinctura Aris. & alia liquor spiriticus, Dialcord. Tinctura Hamatit. terræ catechu, trautalia, aliaque plura capite de Hæmorrhagia petenda.

Alii volunt ut arteria super Aneurisma digito aut conveniente ligatura comprimatur, & Lan- ceola aperiat, atque sanguis coelectus educa- tur: Vulneri verò & rupturæ arteriæ admovea- tur globulus seu frustulum ~ Cyperi gillypio tenui involutum, & huic superinspergatur pul- vis colophonii, vel saci coccolia, ac deinceps appli- centur splenia albumine ovi imbuta, vel appo- nantur linteam duplicatum liquore spiritico im- butum, hoc modo constringitur simulque cau- terizatur arteria læsa, ita ut sanguinis appulsus eam minime resolvere valeat, adaptata simul li- gatura coe veniente. Alii suadent cauterium actuale. Verum enim verò nostro iudicio cau- te incedendum est cum Sectione Arteriæ, in pri- mis majoris, nuper enituit in Nobili quodam triste vidi exemplum, cui in Aneurismate à punctura gladii in carpo manus productio nulla remedia, nec etiam generosa à Chirurgis nostris applicata: nec Sectio juvenem attulerunt, san- guis enim continuo effluebat, inlabatque Gan- græna, quare Chirurghi manus amputationem suaserunt, sed carnifex curationem absque am- putatione manus, morte iusto promittebat ni- mis audacter: sed, lodes, quæ audacia est, au- dere viribus impari? autin gicere illulitit: ter- tio enim die non tantum manus, sed & totius brachii lideratio accessit, quam excepit ipsa mors truculenta. Ego iuliu Serenissimi ac Po- tentissimi Principis, Domini mei Cæsarissimi, cadaver innà cum manu ac brachio liderato ape- rui, quod verò nihil præter corruptionem, to- talem brachii oblistructionem putrefactionem- que exhibebat, internis præter sanguinem sanis apparentibus.

Hinc sectionem nisi cum maxima cautela in- stituendam esse auctor sum: Locus quoque aptus esse debet, ut ritè pars ligari ac comprimi possit.

Arcta ligatura miraculi instar subinde paten- tem hiantemque constringit arteriam, sed ope- ratio eventum in minoribus tantum præstat, non verò in maioribus. quia tunica crassa nec facile rumpuntur, nisi à vehementi causa. nec ruptæ propter perpetuum spirituosum sanguinis affluxum facile sanantur, & huic quotidie crescit Aneurisma, facilius quoque in arteriæ tunica dilatata, quam in rupta prius sperata consolidati- o succedat.

Curationis Varicum nostro modo institutæ cardo in eo vertitur, ut acidum in sanguine de- litescens temperetur, & coagulatio sanguinis impediatur, dein vena dilatata, vel rupta tuni- ca constringatur consolideturque. Ad acidum ergò corrigendum temperandumque quotidie æget per vices alimur pulveris sequentis vel similis dosi:

R. Oculi. ss. pp.

coralli. alv. pp.

crystall. mont. aa 36.

Terr. catechu gr. v.

M. f. pulv. deniq. 9 doses.

qui pulveris in ~ chertcol. vel alia traumatica ex- libeatur. Dein accendendum est ad sudoriferæ temperata, ut Antimon. Diaph. C. C. unicor- nu, Bezoar, terr. catechu, unicornu fossil. &c. Potus quoque calidus Theæ vel Caffæ exumissus exibat per longum tempus continuatus, quo solo pota plures vidimus à varicibus liberatos.

Quod externa Topica attinet in Varie (ut hic præ aliis condecant Empl. ex gumm. Ammon. & Galbani. divin. de Thea. de Labdan. &c. Harimannus in praxi sua unguentum è butyro m. ali vel oleo rosaceo cum succo cancorum maxime laudat quod profuit cuidam matrone à septimo mense cum ejusmodi malo confictan- ti; Unguentum Dialch. mariat. &c. item pla- centula à Cl. D. M. y celebrata egyptum sæpe præstant effectum. Alii laudibus extollunt ad- stringentia, quæ tamen sint moderata. Balnea ac thermæ hic optime conducunt.

Quod Sectionem Varicum concernit, hanc itidem esse cum cautione instituendam volu- mus imprimis in gravidis & minoribus varici- bus, in quibus post partum spontè abeunt, in quæ finem ergo dubia instituatur cura, in ma- joribus verò sectio institui potest. Cl. D. M. y Varicem cum ulcere conjunctum singulis annis semel & feliciter aperuit, ex eoque libram unam sanguinis eduxit, atque sic effecit, ut ulcera concomitantia postea nunquam iterum disrupta sint.

Inter Chirurgica præsidia, etiam Deligationes veniunt, quæ ulteriorem venarum distensionem ac dilatationem inhibent: commodum huic scopo erit medicamen ab Aquapendente de Va- ricum excisione commendatum, & ad candelæ figuram formatum, quod tractui varicis impo- nitur, & super hoc arundinis cortex, qui sua cavitate medicamenti convexitati respondeat, hocque comprimat fascia idonea firmandum. Quò si verò Varices majores sint, præter Sectionem aut ulsionem nihil auxilii restare videtur.

## CAPUT XIII.

### De Verrucis, Cornibus & Fungis.

§. I.

Cùm succi in Machinâ nostra hydraulica continuo moveantur, agitenturque, & sic ad destinatos impellantur fines per pec- cularia & tenuitati & crassitie succorum re- spondentia vasa etiam minutissima, & sæpe vi- sum fugientia, quorum succi accrescunt vasa, & per foramina profluentes varias excitant pro- minentias & hyperærotes, quæ excrecentiæ carnosæ Medicis ac Chirurgis dicuntur Verrucæ,

quarum species vulgò quatuor sunt pro ratione radices, vel sunt nunc plana seu sessiles nunc pedicellæ, vel ex angulo co lo capite amplore prominentes. Pedicellæ vocantur Myrmecia, po- steriores verò Acrochoroantes. Sic quoque & alia species dicitur Verrus, quæ exterius quas- dam radicales habet instar porcorum, alia voca- tur Thymsus, colorem floris Thymi reterens, in Thymsus summo est latior, quam Acrochoroantes, ad magni-

Verruca.





# CAP. XIII. DE VERRUCIS, CORNIBUS ET FUNGIS. 601

enasci : utut sit , Verrucarum ratione id accidere contendit.

Fungus enim Ipsi dicitur, quàm post vulæris sanationem enascuntur Verrucæ quædam, & ex eis deinceps tumor in quantitatem diarium, trium aut quatuor librarum excrefcens, ac adhærens, non secus ac arbori Fungus : scætet ac foraminibus scætet.

Helmontii  
opinio de  
causa Ver-  
rucarum  
& Fungo-  
rum.

§. 6. Helmontius Verrucas suæ carnis Fungos esse asserit, & sæpe ex culto de prodigo nutrimentum partis alicujus variè dispergente obo-ritaslerit.

Fungorum verò originem accenset nutrimenti partium abundantia & copia, ex quâ Fungi partium superfcunt, dum caro à latice uberiùs affluente nimium humectatur, & in fundum quandam ejusmodi excrefcentiis proferendis apprimè habilem disponitur.

W' illi  
sententia  
de causa  
Verruca-  
rum.

§. 7. Verrucarum progeniem tribuit Villifus copiosiori succo nutritio, quandam sanguinis portionem admixtam habenti, & in laxiori aliquâ parte remoranti. Ille siquidem partis istius fibras subingrellus, easque aggregatione suâ extollens & dilatans, à liquore netveo adveniente in fibrarum substantiam convertitur. Verrucæ verò carnis colorem sanguinisque sublidum mutantur à vasis sanguiferis, quibus fibræ illas constituentes supatæ erant.

Cornuum.

§. 8. Cornua, opinante Villifio, excrefcunt ex humore alibili glutinosiore, qui ad papillas cutaneas devehctus illis adhærescit, atque in ipsi remoratur, easque continuâ suâ aggregatione elevat ac producit : plures verò contrigæ papillæ cutaneæ à liquore nutritio oppletæ sibi invicem adiununtur, & unâ coeunt, succique in iis cæspitantes tenuioribus atque aquosioribus particulis avolantibus, crassiores in papillis subsistentes ampliùs nec dilutæ, nec in motum actæ, in materiam compactam faciscunt, & iis infarsctæ papilla in corneam substantiam faciscunt.

Sylvii de  
causa Ver-  
rucarum  
& Fungo-  
rum.

§. 7. Sylvius Verrucas à lymphâ glandulosa acido spiritu abundante produci existimat, ut & Fungos ac Cornua, ab acido enim spiritu humorem glandulosum spissiore reddi posse, ut in poros cutaneos deductus eosdem opplens, ab alio succo affluente propellatur, sicque Verrucas, Fungos & Cornua producat.

Cartesii  
notum  
sententia  
de causa  
Verruca-  
rum.

§. 9. Cartesius ex ramulorum nerveorum læsione, vel obstructione Verrucarum deducunt originem, existimantes, ramulo quodam nerveo in cute vel ab externa violentia, scalptione, erosione, punctura, & similibus, vel internis quibusdam particulis acutis in lymphâ evasata contentis, uti in Scabie, dilacerato, succum ejus inter cutem & cuticulam effundi, ibidem inspissari & in excrefcentiam talem converti, quæ à subsequente liquore continuo capiat nutrimentum, instat (sirculi ex arbore efflorescentis. Pro majori verò nervi læsi concavitate, & pluribus inde fibrillis dispersis, etiam formam & magnitudinem Verrucarum differre dicunt, ut quo plures fibræ expandantur & dispergantur, quæ instar radicularum nutrantur, eo etiam excrefcencias illas copiosiorib' constare videantur in superficie quasi foliis, ramulis, aut squamulis : si verò fibræ arctius conglutinentur, radicem & petiolum longiorem & crassorem conspectui dari. Huic læ-

sioni ramulorum nerveorum aniam quæque præbere opinantur attachum utricæ urentis, vel lanuginosæ non minùs quàm spinosæ illius materiæ, qua cavitas fructuum cynosbati unâ cum arillis referta conspicietur, cujus cuti adhærentes spinulæ ab externo calore agitatæ fortius insigantur cuticulæ, ut ad extremitates nervulorum cutem perreptantes pertingant, easdem vellicent & pruritum excitent, cui cum succedat scalptio, nervulos istos jam distentos faciliè dirumpi, & succum eorum profundius referunt, obstructionem ramulorum istorum nerveorum à succo crasso Verrucarum productioni ideò credunt esse idoneam, quod liquor continuo effluens & debitum non reperiens transitum, priorem illum crassum ad extremitates magis propellat, fibras cutaneas altius diducat, & novo assiduoque affluxu obstructionem augens tuberculum producat, & sustentet, Verrucam exhibens magis rotundam, lævem & interdum non adeò pendulam, sed sessilem, instar monticuli cujusdam in microcolmi superfcie erecti.

Cornuum villorum vilubulum & tangibilium, Cornuum, utrumque sexum interdum invadentium & decorantium, non modò in digitis manuum & pedum unâ cum ungulibus, sed aliis etiam in membris, & quandoque ipsa in fronte procrefcunt, ortum sumere docent à papillarum cutanearum sub cute & contextu reticulari easdem obvelante longiore diductione, à succo crassiore & salso eas expandente inducta & interdum ab externa fortiori & frequentiori compressione excitata. Fieri enim sæpe videntur, ut lymphæ, & succus nutritus in scabie à liquore acido coagulentur, qui inspissati à novis succis versis papillas illas propellantur. hæc verò fortiter erectæ & invicem copulatæ contextum etiam reticularem elevent, & ad novum suscipiendum succum expansæ prominant, qui cum assiduò subsequatur, qui in papillis angularibus inter papillas commorantibus in motu impediatur, & ad subitanam redigatur quietem, magna cum tempore ibidem colligi eum asserunt copia, & duram proferre eminentiam. Externa offensione, compressione, vel alia quadam cutis agitatione oppositas istas papillas ad expansionem premi asserunt, ut succus nutritus versis easdem propellatur, unde in calce alisque plantæ pedum vel volæ manuum regionibus ex continuo incessu, vel laboribus durioribus, offensione in fronte cornua excrefcant, quò ductus non modò quidam dirumpantur succos suos postmodum effundentes, sed papillæ quædam fortius premantur, & ad succum recipiendum evasatum apè fatis disponantur. Ungues etiam non abscessi in corneam abire prominentiam dicunt, quoniam papillæ cutaneæ versis eorum principia ita sunt disposita, ut succum ungues nutriendum majori excipiant abundantia.

Liquorem tendinolum & nervosum succo Fungis unctuo articulos lubricanti majori, quam par est, copia commistum, & cutem distendentem, excrefcentiam spongiosam, live Fungum producere docent, qui succi propterea commisceantur, quò ab externa violentia canaliculi eorum dirumpantur, & succi ipsi effundantur, uti sæpe in genibus contingit, quando vel percutiuntur lapsu, calcitrant equi, aut similibus rebus violentis, vel frequentiori & diutius

Gggg

diuturniori in genua procubitu fibræ fortius compressæ vel distendantur, vel dirumpantur.

*Nostrium  
iudicium  
de causa  
Verrucæ  
rariæ.*

§. 10. Difficilem esse *causarum* doctrinam, & intricatam illarum investigationem nemofortean negabit, si consideret. Nos ex tot Authorum Principiis non tantum eas eruere conari, sed earum etiam supplere defectum, quas ipsi Authores ob gravitatem affectuum explicare vix ausi sunt. Existimamus autem *Verrucas* ideò propullulare extubereque, quòd à particulis nonnullis acutis acris incidentibus ac corrodentibus membranæ erodantur, & à succo per tubulos & poros profuente, emananteque succo nutritio fibræ relaxatæ magis distendantur, & aliquando proflus rumpantur, ut extra circumjacentem membranam promineant: circa quas protuberantias assiduò emanans succus nutritius colligitur, & hyperæcrosin quandam producit. Vasa enim capillaria vel à quacunque causa magis dilatata, vel attrita corrosoque succum nutritium chylosum emittunt, data enim porta quadam liquor iste nutritius partium liberius profluit, qui accedente tunc acido vel interno, vel externo coagulante in excrescentias ejusmodi abit carnosas. Eodem modo videmus in arboribus junioribus læsis succum quandam exsillare, qui ab accedente acido aeris coagulatus similes excrescentias *Verrucolas* exhibeat.

Causas remotas ansam *Verrucis* generandis dare posse, extra omnem dubitationis aleam ponimus, ad quas res non-naturales vulgò ita dictas referunt. Inter quas primas tenet Aër, qui frigidiior admixtus succo nostris iusto nimis incrassat, & insensibilem excrementorum transpirationem impedit, sic novi rusticus mille *Verrucis* per totum corpus dispersis infectum, qui à sola aquæ frigidiiori immersione has se acquiritisse mihi fassus est. Fœcundæ dein segetis instar est mala victus ratio, omnia enim, quæ chylum crassum acidum ac viscidum, mox tale in sanguinem ac succum nutritium suppeditant, *Verrucas* producere apta nata sunt, imprimis si accedant acria salita ac muria condita, quæ omnia faciliè tubulos erodere valent. De quibus & reliquis omnibus in *Diatæ* acturi sumus.

*Cornuum.*

*Cornua* verò, me iudice, à succo nutritio evasato oriuntur, cujus fluidis particulis sensim exhalantibus, reliquæ ceu & ossis seu cornu duritiem & formam assument. A quiete hunc succum ita indurari posse quis negabit? Rarum est, quod scribit *Alex. Bentd. L. 1. Histor. part. Corp. hum. c. 14.* vidimus, ait, in Geta vulnerato genu sagittâ cornu nigrum rupicapre capitis simillimum (è vulnere) produsse, materiamque, quæ in ossis substantiam converti debuisset, in carnem indelem aeris afflatu conversam, rami modo indurescentem.

Fungi ut plurimum circa articulos oborti ex violenta distensione, dilatatione & laceratione violentâ fibrarum tendinosarum producentur, hineque effluit succus nutritius & quidem in maximâ copîâ, ex quo caro mollis, rara & luxurians squamosa generatur, quæ dicitur fungus, qui ut plurimum post vulnera membranarum emergere solent, quod si accedat accescencia & corrosio, fungi exoriuntur Cancrosi. Qui plura desiderat de Fungis his microcosmi-

cis confectat *Ephemer. German. Ann. 9. & 10. obs. 63.*

§. 11. *Prognosis* horum affectuum quod con-  
cernit, *Verrucæ* pueris solennes sunt, nihilque  
niali portentunt. Inadultioribus nonnunquam  
suspicionem injiciunt Luis Veneræ, imprimis  
circa partes genitales occurrentes. *Verrucæ* vul-  
gares sanitati non obstant, sed cuti defecationem  
& molestiam inferunt. Sæpius inopinatò protu-  
berant, & inanimadvertenter rursus evanes-  
cunt, præsertim Acrochordones & Thymi.  
Myrmecia verò quatenus profundius hærent &  
fibris sæpè nerveis implicantur, tendinosisque  
fibrillis profundius insident, difficilior curantur,  
quia periculum est, ne tendinibus læsis inflam-  
matio vel Gangrena inferatur. Acrochordo-  
nes verò excisæ non faciliè relinquunt radicales,  
ideoque rarissimè repullulant. Thymo autem  
exciso in carne radica remanet, ex qua renasci-  
tur sæpè *Verruca*. *Verrucæ* quæ conjunctam  
habent Luem Venericam aliunde morbum  
Chronicum, difficiliores sunt curati, quàm  
quæ sunt simplices. Sic etiam istæ, quæ appa-  
rent in cutimâ cutis superficie, facilius sanan-  
tur, quàm quæ in internis hærent corporis  
partibus.

*Cornua* seu excrescentiæ ossæ omnes diffi-  
cillimè sunt curati, imprimis durissimæ, quæ  
nullum præter sectionem admittunt remedium,  
quæ sectio itidem pluribus involvitur difficul-  
tatibus; molliores excrescentiæ si ad maturi-  
tatem pervenerunt, decidunt quidem, sed post  
mensem iterum repullulant, eeu observavimus  
in cornibus digitorum.

Fungi sæpè etiam per plures annos afficiunt  
homines, sed præter incommodum & dolorem,  
nisi si contingant in articulis, motum ac sensum  
premiendo nervos aliquomodo tollunt. Ob  
stagnationem verò diuturnam succus acrior red-  
ditur, qui faciliè tumorem Cancrosi produce-  
re potest. Corpus quoque ad Tabem dispo-  
nunt omni succo nutritio in fungo deperdito.  
Aliquando malum hoc lethale est.

§. 12. Quod *Diatæ* refert, ista eò dirigenda;  
ut succi rite constituti absque ruptione tubulo-  
rum circulentur, in quem finem aer eligatur ca-  
lidus ac temperatus. Frigidus verò admodum  
nocet, quoniam incrassat succos nostros, trans-  
pirationemque impedit. Alimenta sint facili-  
digestionis, exulent acida, acria, salina, muria-  
tica, corrosiva, exinde enim succus nutritius  
pessimus partibus affertur, & sic ruptio tubulo-  
rum & evasatio succi nutritii faciliè produci po-  
test. Potus sit calidus, imprimis potus Theæ,  
vel Caffæ, vel Succolad. vel vin. Gallic. Hispan.  
aliudque non acidum, vinum enim Rhenanum,  
Franconicum, imò ipsum sæpè Mosellanum,  
quatenus acido & Tartaro abundat, coagu-  
lando succos maximè noceat; eligatur potus  
cerevisia tenuis rite defæcata & herbis volati-  
libus ac aromaticis maritata. Vel juscula non  
salita cum herbis sanguinem purificantibus.

Vigiliæ & somnus, item motus & quies sint  
moderata, & modum solennem haud excedant,  
motus enim nimius si mox à pasta sit, chylum  
crudum & cum impuritatibus per alvum ex-  
pellendis, permittit in sanguinem pellit.  
quies verò immodica, ut scilicet vita sedentaria, quam  
experiri-

# CAP. XIII. DE VERRUCIS, CORNIBUS ET FUNGIS. 603

experiuntur Sartores, nocet, quibus propter eas Scabies & Verrucæ, fungosque tumores familiares sunt. Animus sit hilaris, nullis passionibus obnoxius. Animi enim passionēs vehementiores ad affectus hos excitandos anīam dare possunt, quæ fulminum instar sanguinem percutiunt, & inter ea potissimum quæ spiritus hūiunt, debitam eorum ex cerebro in partes subjectas emanationem sanguinis ac succorum circulationem impediunt, & per consequens succis crassissimis ac acidis imprimis nutritio plus iusto corrigendis anīam præbent, eujusmodi sunt tristitia, mœror, curæ immodicæ, odium, terror, &c.

§. 14. Jam ad *Curam Pharmaceuticam* ac *Chirurgicam* horum affectuum accedamus, & primo Galenicorum perspiciamus, qui *Verrucas* quascunque tollunt per elaterium cum sale impositum. Imò ad has extuberantias delendas plura excogitavit vetustas remedia, qualia sunt Thūs cum aceto, grossi fici cum aceto, farina, ac nitro, hec liquor illius, itemque Tithymali, Smaridis caput salum ustum, ærugo cum sulphure vivo usta, oculi tollia cum atramento lutorio: item id, quod destillat à Sarcientis vitis vidibus, adhuc dum uruntur, ovillum stercus cum aceto, hirci fel illitum, heliotropii magni semen cum vino impositum, ruta cum nitro & pipere, nitrum cum urina pueri impubis, stercus bovis gregatū cum aceto. Galenus, ejus & sequaces, Verrucam fornicariam dux penus fistulæ, quales sunt veterum gallorum & anserum ac aquilarum, circumscificandam esse censent, ita, ut obtorqueatur per vim profundum & ex fundo Verruca fornicaria tollatur: alii verò ex ipis tinea aut ferrea fistulâ idem præstant. Aliis placuit eam circumscificare, & vossellâ prehenfam, scalpello velut clavos extendere. Quod Aëthorionem basin angustam habentem & pendere vitam attinet, extentam hanc eminentiam excidunt, sin minus filo satem aut pilo ipsam deligant, omnes quoque has eminentias plerasque frigido caute consumi continentur.

*Cornua* & *Fungus*. *Cornua* verò ac *Tumores Fungosi* Galenici per resiccantia Medicamenta tollere satagunt, & commendant diphryges inspersum, & aris squamam & testacea omnia usta, & eriuaceos ustos cum toto corpore. Hisce non iuvantibus ad fortiora transeunt, ut sūt Petræ Asiæ flos, sori, & chrysocolia, & chalcitis, & misy: (usta verò minus mordere dicunt,) aris illos, ærugo. Sal vitus fungosus flavidasque carnes juxta ipsos consumit, & linamenta evulsa ex linteo facta muria acriori macerata ac resiccata, indita & applicata duos ac fungosos tumores consumi jubent. Erug non autem cum spumâ aris ex his vehementer operari dicunt. Inter composita laudant Rhodium siccum, & Platanū & flavum appellatum, altissimæ ab ipsis pastilli Fastiati tritici ac inspersi, & siccum Sole ustum dictum, quod verò recipit calcis vivæ, squamæ aris, manæ æquales portiones, & ad excesscentias facit, & fungis limilia repurgat cum melle, & replet cum aceto.

§. 14. *Paracelsus* in Verrucis deiendis & abigendis remedio singulari uti solet, nempe ipsi Pol. gonaton dicto. Ad hæc Tubercula, Verrucas seq. maxime extollit; accipit enim *aleum ardens*, quo locum a lectum singulis diebus quater mungit, hoc autem dicit omnia, quæque

similia nascuntur in vulneribus. Author in *Portis* & *Cornibus* sequentia magnipendit:

*Ag. ol. ex bac. Juniper. Resonaz.*

*Agarici* aa. ʒi.

*seil. bovis q. s. prouneu.*

inunge dies noctesque, dein appone Oppodeltochi quod seq. modo paratur.

*ʒ. Celaph. lbj.*

*pulv. Chelidon.*

*arant. aa. ʒiv.*

*vijci de Cre.*

Ad *Fungum* absumendum accipit filum arsenicale, quo fungum excrecentem ex vulnere abscondit, postmodum sinit sanguinem, & oleo ardente perungit. Consumuntur, ait, hoc oleo Verrucæ, fungique omnes ac rami vel radices, & quibus ita cunctur. Et post consumptionem curat sanaturque poros emplastro de Mumia. Verum ubi sanguis nimium abundè profluere, laxat venam retrò fungum & refrigerat. Duros tumores, ut sunt Cornua, eodem serè modo curat.

§. 15. *Helmontius* inter arcana refert pomum transillum, cuius pulpa interna sita fricta *Verrucis*, donec intepuerit, & religatis medietatibus per filum. donec pomum putuerit: tunc enim vidit Verrucas attactas disparuisse. Simul atque enim vita poni ultima perit, cui Verrucarum impressio fuit conglutinata, perit Verrucarum vita ultima, retrocedendo per mediam.

§. 16. *V. Villisus Verrucarum* cucam exorditur decocti cuiusdam sudoriferi usū, inque deinceps inspergendo pulverem extutia, lapid. medicament. & lauco ære uto. Commendat eia in ligaturam.

*Cornua* tollere satagit internis Medicamentis sanguini fluiditatem conciliando, saliaque acida succum nutritium coagulantia corrigendo, eaque soras eliminando; quibus conferre ait Macchia, Corallia præparata, oculos Cancrorum, rasuram eboris, aliaque humide farina. Diaphoretica etiam atque Diuretica summæ esse efficaciac hoc in calu alierit: ad uvandam siquidem diaphoreticam hoc exhibet Medicamentum.

*ʒ. Antimon. diaphoret. ʒij.*

*eboris us. ʒiij.*

*ʒ. volat. C. C. ʒij.*

*M. f. Pulv. dos. ʒb. ter aut sæpius in die.*

Diuresin verò excitat sequentibus Medicamentibus.

*ʒ. Tin. ur. Sal. ʒi ʒj. ad ʒiss.*

*Ag. raphan. compos. ʒib.*

*M. detur in hanstu lipuoris possetic cum rad. & sem. bardan. incoctis.*

*Vel:*

*ʒ. M. laped. præp. ʒij.*

*Flor. ʒ. ʒi.*

*Nuc. Mosch. pulv. aa. ʒb.*

*Terebinth. Venet. q. l.*

*F. Pilul. sumat æet bis in die iv.*

Quod ad externa Medicamenta in *Cornibus* & *Fungis* tollendis attinet, emollientibus illa fovet, & sequens, vel simile adhibet:

*ʒ. Rad. alth. ʒj.*

*Fol. malv.*

*parietar.*

*branc. us.*

*violar. aa. Mʒ.*

*G. ʒ. ʒ. 2*

*Flor.*

*Galenicorum modum citando Verrucas.*

*Cornua & Fungus.*

*Paracelsi emulatio Verrucarum.*

*Flor. chamomel.*

*melilot. aa. ℞.*

*Sem. fenigrec. ʒij.*

*F. decoct.* in aq. communi, quo foveatur pars affecta.

Vel herbas has in formā Cataplasmatiss applicat. Si istis non satis relaxentur papillae cutaneae oppletae, nec materia indurata illas obstruens non emolliatur, Medicamentis cathartecis, jam superius de Verrucis explanatis radices Cornuum ac *Fungus* erodit, illaque hoc pacto destruit.

*Sylviana  
cura in  
verruca,  
Cornuum  
& Fungus.*

§. 17. *Sylvius* in curandis Verrucis, Cornubus ac *Fungis* ad acidum, tanquam omnis mali huius in affectibus causam praesertim respicit, ut illud dometur, & excrecentiae hae superfusae consumantur, quod cauteriis tum actualibus, tum potentialibus ex lixiviosis concinnatisque Medicamentis Mercurialibus optimè obuiari posse haud dubitat. Verrucas ac reliquas excrecentias exsiccare vult, quo omni succo privati flaccescant ac decidant, imprimis verò constrictione sili & attractu linteoli ~ ~ ~ ~ ~ is vel alius acidumneati.

*Curtis  
notum cu-  
ram l'op-  
tione.*

§. 18. *Curtisiani* destructioni Verrucarum omni opera incumbunt, adhibendo tuberculis huius ea remedia, quae radices eorum erodant, vel poros occludant, ne per eosdem capiant incrementum, sed omni succo destituta flavescant & decidant. Approbant itaque succum chelidonii majoris, quo Verrucae frequenter attingendae sunt, nec non aquam calcis vivae, vel aquam fortem, praesertim sequentia remedia à D. D. *Vogelsargio* utilissimè adhibita, quibus varii generis Verrucae abactae fuerunt.

℞. *Decoct. pisor. ʒij.*

*Dissolv. in eo*

℞. *i ʒij.*

*add.*

*Pulv. santal. rubr. ʒj.*

M. & probe agitentur, abluanturque Verrucae aliquoties in die tepide. Postablutionem hanc

℞. *∇ commun. ʒj.*

℞. *i ʒij.*

Stent per horam unam vel alteram in vitro in digestionem arenae calidae, donec intimè uniantur. Hoc liquore imbuatur stylus ligneus, quo postmodum Verrucae prius fricatae vel digitis compressae tangantur. Spiritum quoque nieri, vitrioli, sulphuris inter dum adhibent, vel sequens linimentum.

℞. *farin. lupinor. ʒj.*

*stercor. caprin.*

*ciner. fraxin. aa. ʒb.*

+ *for. q. l. inf.*

Linimentum Verrucis imponendum, locis vicinis emplastro defensivo prius munitis, per cuius foramen quaeque Verruca promineat. Interdum emplastrum aliquod imponunt Verrucis emolliens & discutiens, ut nutrimento ita diffusè absumantur qualia sunt de Ammoniac & galbano, imprimis si quidpiam salis Armoniaci isdem sit immixtum. Acrochordones & Thy-mos, sive Verrucas pensiles filo constringunt, ut sic constructis poris succo nutritio transitus denegetur, & Verrucae alimento suo priyate excrescant & decidant. Myrmecias sive Verrucas sessiles subtilioribus quibusdam illinunt

spiritibus facile penetrantibus, poros aperientibus & succum spissorem attenuantibus & resolventibus, quale sequens existit.

℞. *Essent. Verrucar. ʒiib.*

*Sabin. ʒj.*

℞. *i ʒiib.*

M. & Verrucae calidiusculè illinantur.

Post illinicionem, & quando essentia hae debet intra poros Verrucae penetrare, emplastrum superimponunt emolliens, praesertim verò de Ammoniac, aut diachylon cum gummiis. Nihil verò recensitis haec remediis iuvantibus, ad butyrum accedunt ʒij, eoque, partibus vicinis prius imposito defensivo, Verrucas attingunt, quas funditus tum extirpatum fieri promittunt. Corpore quoque variis in locis excrecentiis huius resecto, interna simul remedia in subsidium vocant, praesertim ea, quae succos incrassatos resolvere, poros aperire, & per eosdem eliminare possint, quod alias Verrucis cedere solet in nutrimentum, quo praedicato & reliquis florere censent sudorifera, live in decoctis, live in aliis hae exhibentur formā, in pulveris tamen formā aliis hic praestare credunt bezoardicum Sale, flores ʒij, & similia in aqua scabiosae exhibita.

Cornua olim habita habentia, qualia in capite & fronte quandoque emergunt, difficulter admodum & vix absque periculo vitæ, nedum sine doloribus, asseri posse censent, cum serrae sint detracendae, & remedia alia, sive interna, sive externa, in his nihil possint praestare iuvantibus, duriora enim nocunt, quam ut emolliant aut resolvant, & huiusmodi implacata, quam ut absque partis, cui inhaerent, laesione & maiori damno evellantur, proinde huiusmodi nodo nullum aptare solent cuneum, ne operam & oleum perdant. Minoribus autem & cutaneis Medicam interdum adhibent manum, detrahendo isdem alimentum, nempe succos crassiores, quibus nutritus referitur est. remediis purgantibus hoc in casu convenientibus existimatis, & in formā infusi ad tempus aliquod exhibitis, qualis parantur ex foliis tennae, cutupho, polypodio, agarico, addeitis aliis quibusdam simplicibus sanguinis purificationi alijs destinatis. His subiungunt sudorifera aliquoties repetenda, ut in papillis cutaneis haerens succus in alimoniam Cornuum cellulus attenuetur, ac resolutus per apertos poros evaporetur, & cornua nutrimento suo privata post rarefactas radices decidant, quo nomine decocta lignorum Guajaci, sassafras, colubrini, Juniperini, straxini, radicem sassaeparillae, chinae, contrayervae, peucedani, herbarum ceterach, chazaridios, scabiosae, foliorum torisamarini, sambuci, melisse, nec non flores mercurii argenteos, bezoardicum Oare, & Tincturam ex floribus reguli ʒij valde depradicant. Externè themas commendant sulphureas & aluminosas, quibus non modo duriores eminentiae circa radices emolliuntur, sed pori etiam cum papillis cutaneis constringuntur & succi superflui absumuntur, ut excrecentiae hae alimonia defraudata decidant. Ablatis verò Cornubus si papillae istae prolongatae & tumentes medullae instar extra cutem, praespicant, iis pulverem inspergunt ex alumine usto, testis ostracum vel concharum calcinatis, calce vivā cum saccharo mista, corticibus granatorum,



# CAP. XIII. DE VERRUCIS, CORNIBUS & FUNGIS. 605

natorum, aristolochia, vel unguentum Aegyptiacum super igne inspissatum imponunt, & circumligato vinculo per tempus aliquod relinquunt, donec pori ita sint transmutati, ut liquorem tantum non admittant copiam. Molliora proximè radices filo duplicato forti & cerâ obductâ firmiter constringunt, usque dum ob denegatum alimentum similiter exsiccata & arida delabantur. Minoribus & non ita prominentibus butyrum illuminat, quo erosâ non minus ut Verrucæ peire aut decidere possint.

*In Fungis.* Fungosus tumor circa articulos, & imprimis genui existenti, atque ex lapsu aut contusione originem ducenti fortis convenire judicant discutientes ex salviâ, betonica, agrimonîâ, corenariio, floribus hyetici, chamomillâ, bacis lauri, lemnis cumini, nec non epithemata calida ex aquâ calcis vivæ, spiritui juniperi, lumbricorum, essentia rotisamarini, spiritu salis armoniaci, & similibus, quibus præmissis emplastrum imponunt de ranis cum Sio, nervinum, vel de gummi ammoniaco. Interna sudorifica non contemnendam hic opem asserere posse existimant, præprimis ex salibus constantia volatilibus. Aliis autem fungosis excrecentiis in vulneribus nonnunquam conspiciendis inspergit pulveres exsiccantes & absorbentes ex radice ireos Florent. aristol. rotund. corticibus granatorum, alumine ustis, colchotare vitrioli, Sio præcipitato, vel aqua ablucunt mercuriali. In fungis hujusmodi capitis & cerebri vulneribus supervenientibus cautos esse volunt Chirurgos, ne fortioribus corrosivis majora mala, aut ipsam mortem accersant.

§. 19. Nostra Verrucarum curatio in eo consistit, ut succi nutritivi effluxus ac subsequens coagulatio impediatur, quod verò obtineri potest, si particulæ acres ac corrosivæ in succo nutritivo hospites obcendantur ac eliminentur, in quem finem omnia conducunt sanguinem purificantia dicta Medicamenta, præprimis sequens vinum medicatum commendamus:

Rad. enul. 3ij.  
aryopiyllat. 3ij.  
pentaphyll.  
petasit. aa. 3iib.  
Herb. fumar.  
Herb. scabios.  
capill. q.  
agrimon.  
heder. terr.  
salv. aa. Mß.  
Raf. lign. juniper. 3iib.  
colubrîn. 3ij.  
fl. sambuc. P. j.  
anthos. Pß.  
Sem. anis. 3ij.  
Q. 3iib.

F. Species promensura vini.

Varia etiam absorbentia acidum infringentia & sudorifica partes has per tubulos eliminantia interponi possunt, qualia sunt Antimon, diaphoret. Bezoart. minerale o'le, Joviale; item cinnabar. nativ. 3iij. Decoct. lignor. potus Theæ vel Caffæ, Essent. fumar. Tinct. Antimonii Qlat. quæ hic egregia est, Essent. Viperarum & sextentia alia, quorum mentio capite de Scabie facta est. Hic etiam Mercurialia maximè sæpè necessaria sunt, & institui debet cura Silis live salivatoria, prout in Luc Venerea. Cum verò

cura Verrucarum folis externis peragi soleat, ea propter internis recensendis diutius inhzere non placet, sed ad Externa transeamus, totius enim curæ cardo in eo vertitur, ut Verrucæ demto succo nutritio exsiccantur & exstirpentur, seu absumantur, quod obtinemus per acidum absorbentia & spirituosâ, ut spir. vin. Camp. ~  $\Theta$  ~ cum  $\Psi$  paratus,  $\nabla$   $\Psi$ , vel ipsa  $\Psi$  Verrucis applicetur, & superimponatur fomes accensus, vel solvatur  $\Theta$  ~ in  $\nabla$  pluviali. qua mixtura imbuantur lineæ duplicata & sic apponatur Verrucis. Alcalia omnia & Thea conducunt, hinc  $\Theta$  ~ per deliquium paratum non inconvenientis erit remedium externè illitum, item seq.

Ung. alb. Camphor. 3j.  
ol. Cri 3iij.  
calc. viv. 3j.  
Q. dulc. 3ß.

M.

Spiritus lumbricor. Matricar. ~ olihani, Elixir vitæ non contemnendi usus sunt in exstirpandis Verrucis. Nec negligenda sunt specificâ, ut sunt succus chelidon. maj. succus Liliæ, Limaces rubri, quibus fricentur Verrucæ, & hoc remedium in vulgus abiit, nostra verò experientia sæpè fallit. Inter specificâ etiam referunt sanguinem columbinum externè applicatum, item dissipare dicuntur Verrucæ, si laventur liquore illo salso, qui in doliolis butyri saliti reperitur. Alii Verrucas cum strassulo lardi fricant, nonnulli cum Pisis. plures cum pond. Borsdorffiano in medium discito, ad mentem Helmontii, quidam cum floribus Calendulæ, Celsæribus & F. delius eas manu mortua tangi vult.

Emplastra etiam sæpè his in monticulis satisfaciunt, ut sunt de galban. Myrs. oppodeltoch. de Thea, vel Empl. ex cera cum tantillo Sui vel Vigonis cum quadruplo Sui. Sequens magnificat D. à Guldensklæ.

Gumm. Galban. 3j.  
 $\Theta$  ~ 3j.  
picis naval. 3ß.  
Empl. diachyl. magn. 3iij.

M. f. Empl.

Alii emplastrum ex resina, cera, de Tacamahac. auripigment. paratum commendat. Ungu. Sui Camphor. maximè confert. Sæpè etiam excrecentiæ istæ Verrucosæ abiguntur instinuta fortiori frictione cum stramine mad. So. Sic etiam radice Chelidonii fricentur hæc tubercula, usque sanguis stillat, hinc aliquando arescunt deciduntque. Sed sæpè his non satisficientibus ad fortiora accedendum est remedia, cui intentioni satisfaciunt ruptoria ex alcalibus parata, in quem finem imponendi sunt cineres clavellati, imprimis straxini, item omnia ex saponè concinnata ruptoria laudant plures. Imò necessitate efflagitante ad corrosiva transeundum est, ut sunt ærugo, alumen, præcipitatum tuburini. Antimonium crudum, ~  $\Theta$  li.  $\Phi$ .  $\Theta$  li.  $\Phi$ . Ad ipsam  $\nabla$  nonnulli audaciter nimis accedunt, item oleo Antimonii vel Butyro Antimonii prominentias has tangunt, & sic eas profligant, cautè tamen hinc incedendum esse suadeo, ne fibrillis nerveis ac tendinosis applicentur, alias præter dolorem inhumanem inflammationem & gangrænam parti affectæ accelerare possunt, magis mihi aridet linimentum Times à Guldensklæ sequens.

Gggg 3

N. Mith.



℞. Mell. ros. ʒi.

℞. Oli ʒiʒ.

M.

Vel:

℞. Ol. Nuc. ʒij.

bals. Peruv. ʒʒ.

Sacch. subtiliff. pp. ʒij.

M.

Vel sequens, quid fortius est.

℞. ʒ. sublimat.

arsen. alb. aa. ʒʒ.

aq. fort. q. l.

F. Massa tenuis, cum ligno tangantur verruæ, donec nigrescunt, dein illinantur butyro non salito.

Vel:

℞. Rad. Dracunc.

ars.

cyclam.

irid. aa. ʒij.

Fol. sabín. ʒʒ.

sem. heliotrop. ʒij.

⊖ ʒci ʒi.

oxymel. squill. q. f.

M. f. Unguentum, quo illinantur tumores hi Verrucosi, ol. Juniperi, de laterib. Sabinae, spic. illinantur sæpius, dein abluantur ∇ sme-gmatis. Sunt, qui protuberantiis his ausu nimis temerario infigunt aciculam, dein caput aciculæ ad flammam sandelæ admovent, ut subcandeat, quo modo Verrucas incunt, quæ dein decidunt, remanente solum parva excoriatione. Sunt etiam, qui crudeliter ferrum arripiunt, easque excindunt.

Nostro iudicio Verruæ citò, tutò ac jucundè curantur per Anabrochismum, dum filo seticeo vel pilo equino sensim ac sensim constringuntur, ut aestant ac decidunt, locus verò atrocineto vel alio Vitriolico inungatur aliquoties, quo modo omnes fere tollimus Verrucas. Tutò etiam tangi possunt verruæ Lapide nostro infernali, madido factò, quò remedio plures sustuli, vel butyro ʒnii. Sunt alii, qui acicula eas perfodiunt, dein ad candelam caput aciculæ tirunt, tunc decidunt, sed reliquant inflammationem dolorosam.

Alii curam nescio quam Sympatheticam jactant, & solo contactu istas excrecentias obigi scribunt. Ex. gr. prout testatur *Timæus à Guldenklee*, ) si internodia straminis secalini vel al-  
terius frumenti singulis Verrucis fortiter im-  
primantur, postmodum defodiantur in terram  
sub tecli alicujus stillicidio, putrescentibus in-  
ternodiis, sensim contabescunt Verruæ, quæ  
tandem emoriuntur ac disparent. Imò quot Au-  
thores, tot remedia Empirica, quæ vetò vix fa-  
stidiaciunt: in Juniorum salutem gratiam unum &  
alterum apponamus.

*Papavolus* Myrmecias tangi vult sudore illo, qui emanat ex lignis quibuslibet, dum uruntur, semel vel bis de ita tangendo.

*Franciscus Petecium* serpentis exuvium tri-  
tum cum carne caricarum, reiectis granis, in  
formam Emplastri redactum vult, quod Verrucis  
imponatur.

*Severus* commendat pedes gallinæ, si sub pru-  
nis ponantur, donec exorientur, corio ab ossi-  
bus separato fricentur calide ter aut quater de  
die Verruæ.

*Sennertius* inquit, tolluntur Verruæ, si cum  
nigellâ & urinâ fricentur sæpius, item si laven-

tur cum liquore ex floribus Verbasci colle-  
cto, & cum floribus Verrucis apposito. Item  
decoctum ex Sinapi, Ace & So paratum  
commendat: Item si folia sabinae in vino ma-  
cerata imponantur Verrucis eminentius. Lau-  
dat etiam ∇ ex sarmentis vitium, dum uruntur,  
exudantem. Alii scyllam viridem, vel suc-  
cum scyllæ impositum laudibus efferunt. Alii  
sanguinem leporis, item succum portulacæ  
commendant, sed quis omnia sæpe anilia re-  
censabit?

Quòd *Curam Cornium* attinet, hæc et di-  
cenda est, ut materia ista condensata, & in du-  
ritiem adacta tophacea vel emolliatur, vel inci-  
datur, vel plantæ auferatur, quem finem aquæ  
per interna, quam per externa obsequere debe-  
mus, varia ergo incidentia & sanguinis purifi-  
cantia, & decocta sudorifera conducunt, alia-  
que diaphoretica, quandoque etiam diuretica,  
cornua enim debent curari, ut Lues Venereæ, quæ  
sunt in dactylophorum Venereorum, hinc corni-  
bus everruncandis commoda ailerimus Galia  
aliaque, quæ primas eluunt vias. In ejusmodi  
tuberculis cornuæ manuum & digitorum se-  
quens præscribit *Celsus* *Terentius D. Schelicer-  
cher*, *Archimedes Darmstadtinus*.

℞. Rad. enul.

cicbor.

corr. amariff. aa. ʒʒ.

herb. beton.

ceterach.

fenar.

veronic. aa. P. j.

fol. fenn. el. & mund. ʒij.

rhabarb. opt. ʒi.

agarc. alb. ʒi.

sem. cartham. ʒij.

cinamon.

z. zib. aa. gr. xv.

Incis. D. pro massa vel vino.

℞. Tinct. ʒnii ʒfat. ʒij.

℞. C. C. ʒnii ʒij.

M. S. Mixtur.

℞. Conserv. borrag.

rad. enul. aa. ʒʒ.

pulv. viperar. ʒʒ.

Corallor. rubr. ppr.

Matris perl. pp. aa. ʒʒ.

Syr. condit. corr. cur. q. l.

M. f. Elect.

℞. Empl. de cicus. ʒi.

Gumm. sapagen. ʒij.

ʒ. dulc. ʒʒ.

ol. ruta q. l.

M. F. Empl.

℞. Ol. ruta coll. ʒʒ.

pro inungendis cornibus. Certum est, purgan-  
tibus & sudoriferis Antimoniatâ egregiam sæ-  
pe præstare operam. Sequens proderit.

℞. Conf. B. Hamech. ʒij.

ʒ. dulc. gr. xv.

M. pro una vice.

Dein exhibeantur sudorifera & simul specifi-  
ca, ut sunt Essent. lignor. spir. matricar. cum  
gumm. Guajac. Tinct. ʒnii. Tinct. viperar. pulv.  
viperar. &c. Sunto formulæ:

℞. ∇ succar.

lignor. aa. ʒʒ.

R. ʒm. ʒ. ʒi.

essent.

# CAP. XIII. DE VERRUCIS, CORNIBUS & FUNGIS. 607

essent. viper. ʒʒ.

spir. matric. ʒj.

ʒ Guajac. ʒʒ.

Syr. scord. f. ʒʒ.

M. detur bis vel ter in septimanā.

Vel:

ʒ Pulv. Anglic nostr. ʒj.

D.

Vel:

ʒ Pulv. viperar. ʒij.

ʒ dulc. ʒj.

ocul. ʒʒ ppr. ʒj.

ʒ Sassafras ʒʒ.

c. roob. sambuc. q. l.

F. Condit.

Diuretica etiam hic maximi usus sunt, ut succi acres scindentes & tubulos effringentes per urinam eliminantur, in quem finem commendamus præ aliis Tincturam nostram Diureticam, aliaque libi ad nauseam dicta.

Quibus internis simul jungenda sunt Topica Medicamenta, ut Cornua hæc emolliantur, & dein post emollientem poros mutantia & paululum constringentia applicanda sunt remedia, ut succus nutritius extillare amplius nequeat. Inter emollientia commendamus varia Cataplasmata, Epithemata, Emplastra, balnea & id genus alia ex chamomill. melilot. herb. & rad. emoll. sem. scnigræc. lini, cumini, &c. parata. Empl. de Labdano, de Theâ, &c. aliaque ex Gummi parata conducunt. Emollienda sunt cornua & curanda instar Clavorum. Dein poros immutantia & incidentia fortiterque resolventia applicanda sunt, inter quæ laudamus Empl. Vigon, cum quadruplo ʒii, vel sequens:

ʒ Gum. Galban. c. ~ vin. in solut. & iterum inspissat. ʒj.

ʒ Gemma ʒj.

gumm. ʒci ʒʒ.

cera

resin. aa. q. l.

M. F. Emplastrum.

Emplastrum nostrum Mercuriale, quod paratur cum Sale Mercurii, egregium est per temporis spatium impositum. Tanquam specificum in Cornubus commendamus succum ex hederæ arboreæ trunco rescisco extillantem, & tuberculis cornutis illitum. Sunt, qui cineres ramorum vitis laudant applicatos, alii ex stercore ovino vel caprillo, cum lacte & caricis parant Cataplasma tepidè Cornubus imponendum. Alii aciculis pungunt Cornua, & sic ea disparere putant. Sequens proficuum erit sæpius applicatum.

ʒ Mercur. dulc. ʒij.

virid. aris ʒʒ.

mel. rosar. ʒʒ.

M. f. linimentum, quo ter vel quater calidè Cornua illinantur, dein abluantur sequenti vel simili spiritu.

ʒ Spir. vin. Camph. ʒj.

ʒ ʒci c. ʒ. parat. ʒj.

M.

Cum spir. matricali, Elixire vitæ, spir. lumbricor. balsamo Nervino sæpissimè fricanda sunt Cornua. Sunt qui sectionem suadent, sed cum ut plurimum hæc Cornua ossibus insideant,

& per consequens periosio aliisque membranis ac tendinibus adhaereant, maximā cautione utendum est, & perito Operatori committatur hæc operatio. Nonnulli fortissimis corrosivis Cornua aggrediuntur, eaque tangunt oleo ʒnii, & læpè usque ad os perveniunt, dein iterum more consueto vulnus sanant, sed etiam hæc periculum involvunt, ne fibrillis omnibus corrosis, vel sensus, vel motus membri pereat, vel gangræna sequatur partis. Quamvis ad radicem ferè usque ejusmodi cornua per corrosiva v. gr. ol. ʒnii, vi erosâ, attamen præter omnem spem repullulant, nisi applicueris, ~ Matric. &c.

Fungi curatio difficilis est, eo enim strenue incumbendum est, ut obstructions referentur, & evaluatio succi nutritii ante omnia impediatur, quod obtinere possumus, si particulæ acres scindentes ac corrodescentes è succo nutritio eliminantur, in quem finem conducunt interna sudorifera, & pro re natâ interna laxantia Mercurialia, aliaque, quæ supra in Cornubus recensuimus, chylus enim purificetur sequenti vel simili nodulo:

ʒ Raa. scabios.

emul. aa. ʒʒ.

sarsaparill. ʒij.

Herb. scordii.

sumar.

nummular.

veronic.

scelopendr.

ceterach. aa. Mʒ.

Flor. sambuc. P. ij.

hyperic. P. j.

Raf. santal. citr. ʒvj.

sassafras. ʒʒ.

guajac. ʒij.

cort. ejusd. ʒij.

ʒli c. ʒij.

ʒ Qi ʒʒ.

sem. dauci ʒʒ.

M. pro mensura 1½ vini.

Dein exhibeantur Tinct. ʒnii ʒʒ. essent. viperar. essent. lignor. aliaque superius jam dicta. Chalybeata hic egregia sunt nodulo includenda, & potui ordinario indenda.

Cura Fungorum præsertim externis Topicis peragitur. Therma hic præ aliis conducunt, in quem finem facillè Therma artificiales parati possunt. Sæpè etiam ad Ferrum accedendum, & excindendus est Fungus in casu, ubi inclinatur ad Cancrum, & cum hoc sit periculosum, pro partis affectû ratione pulveribus acidum temperantibus incrementum ejus, quantum possibile, impediendum, in quem scopum conducunt omnes pulveres ex Sale ʒni, Camphora, Calce viva, Tutia, Lapide Calaminari, Myrrha, succino, Thure, C. C. ust. parati: spongiosis his tumoribus item inspergi possunt ʒlum, ʒ ustum, vel pulv. ex aristoloch. rot. calam. arom. caryoph. concinnatus; imprimis conducit Elix. vitæ Mich. Applicentur etiam spiritus Matricalis, olibani, cum calce viva, imò instituantur varia suffumigia ex succino, herb. sabin. oliban. mastiche, &c. vel ex herbis ʒle volatili gaudentibus parentur fotus, Cataplasmata & calidè fungolis imponantur tumoribus. Nec negligenda sunt Empla-

Emplastra optimè resolutentia, ut sunt Empl. de Theâ, divin. de Labdano, de ran. cum ꝑ & Olo alb. parat. vel Cataplasma egregium ex cucumere asinino, Limac. rubr. coct. in vin. Gall. add. pulv. rad. Jalapp. & Bryon. l. q. Empl. de cicuta & de Cumino itidem conducunt. Frequenter tumores hic non deligandi, nec quod Chirurgis

notandum, aperiendi sunt, hinc etiam à canceris abstinendum est, quare ab ejusmodi tumore improvidè aperto mors secuta est, uti patet ex Obs. 63. Eph. Germ. Ann. 9. & 10. in quibus etiam legere est, quod sæpe excoriati cutis vel digito, vel ungue auferantur hi tumores & fungi Micrococcici.

## CAPUT XIV.

## De Cutis Nigredine, Furfuribus, Lentiginibus, Ephelidibus, Panno, Navis maternæ, Maculis Infantum Volaticis, &amp;

Maculis Hepaticis.

## §. I.

**P**ulchritudinis amans homo est, imprimis sexus sequior, qui potius mori amat, quam deformis vivere. Et si enim elogio *Isidori Pelusiotæ*, quod flos nunc splendidus, cras in nihilum redigetur, & quod hodie ignis est, cras in cinerem commutabitur, attamen natus decor, qui partium proportionem, & colore homini præ reliquis obligat, sui conservatione gaudet, quis enim non se ipsum abhorreat, non dicam scabiosus, leprosus, Elephantiacus, sed vel minima deformitatis macula deturpatus? Quis Navis defæctam faciem publico exponere sine pudore sustinet, ubi *Ætius* faciei *Ætius* in nigrum plumbeum colorem mutatum, vel pluribus maculis interspersis contaminatum est. Tegere licet partes alias, speculum verò corporis, faciem existimo, apertum esse debet. Nec sæpe tegere licet manus, brachium, collum, &c. quæ sæpe morborum & succorum in corpore peccantium indices & vitia, ut Cutis Nigredo, Furfuratio, Lentiginis, Ephelides, Navis Maternæ & Macula variæ tum Volaticæ tum Hepaticæ dicuntur, quæ omnia Cutis politum ebundatur, temporum gravitate deiciunt, & factum, qui pulchritudo hinc parti inest, exiunt. Cutem ergo maculatam in pristinum nitorem præsentibus his paginis restituam libido est.

**Nigredo.** Nigredo cutis est affectus, quo Cutis alba & florida, in subnigrum seu fuscum commutatur colorem, ex Cute hispida omnimodaque asperitate donata, obortus.

**Furfures.** Furfures, seu Furfuratio, vel Porrigo, est Scabie sicca seu Furfuracea Cutis, ejus imprimis, quæ capitis est, pueris familiaris, à salinis & asperis succis producta. Nomen habent à Furfuribus tritici, *Ætius*.

**Lentigo.** Lentigo, Græcis *ῥαῖς*, aliis *Lenticula*, est affectus cutaneus, imprimis faciei; vel sunt Cutis maculae modò ex flavo rubescentes, modò coloris fusci Lentibus colore & magnitudine similes, quibus in utroque sexu, in sequiore verò magis conspicuis facies, manus, brachia & pedes, seu aëri & Solis radiis expositæ partes conspersuntur, sine dolore & molestia productæ à particulis acido-suliginosis in tubulis subtilissimis cutaneis ob coagulationem subsistentibus. Hinc à Solis radiis maculas has cognominant solares, Germanis *Sonnenflecken*.

**Ephelis.** Cum affectu prædicto ferè ad mentem quorundam coincidit *Ephelis*, quas maculas *Blankardus* nominat *Sommerflecken*. Sed Ephelis derivatur à Græco verbo *ἔφηλις*, h. e. aspredo & nigrities in facie. Hinc alii gravidis familiares esse has maculas existimant, quæ majores sunt, &

post partum spontè evanescent, quæ etiam sæpe virgines infestant circa os & labia, sed cessante mensium fluxu iterum evanescent. Sunt etiam maculae à Sole provocatae, quos Græci *ἑλιδες* vocant ex *Crisione*.

**Pannus** notans maculam vel navem in Cute sive ex lue Gallicâ, sive ex alio morbo maligno dependentem, est macula grandior palmæ interdum magnitudinis, coloris subflavi, vel rubicundi, vel fusci, vel subnigri in facie sæpius proveniens, & sexum sequiorem deformans. Germanis dicuntur *die Hontigflecken* *Sommerbrand*.

Affines sunt his maculis etiam Navis maternæ connotati, aliis Maculae originales, vel Notæ infantum à Matre gravidâ tempore gestationis per imaginationem vel terrorem fortiori imprellæ & communicatae. Germanicè dicuntur *die Muttermähler*. Maculae hæc infantibus duplices observantur, sunt enim vel præuberantes, vel planæ, figurâ variâ & colore diverso pro causa varietate.

**Macula infantum Volaticæ** Germanis dicuntur *der Flug*. Maculae hæc sunt efflorescentiæ cutaneæ, seu exanthemata infantibus familiaria ex fermentatione succorum, & dein coagulatione in cutis tubulis oborta. Affectus hic tum in causâ, tum in curâ cum Erysipelate planè convenit, vocatur etiam aliis *Zona*, Græcis *ροσγί*.

**Macula Hepaticæ**, Germanis *die Leberflecken*, sunt efflorescentiæ cutaneæ, quandoque largæ, quæ sanguinis ac succorum acrimoniâ, & inde evacuationem cum aliquâ coagulatione in tubulis cutis præsupponunt.

§. 2. **Pars affecta** horum affectuum est Cutis, præsertim illud sanctè mirabile, tot plurimis filamentis vasorum sanguiferorum, nervorum, fibrarumque varietate inter se complicata contexta, quibus glandulae numerozæ & lymphæ ductus densissimè interponuntur. Tota enim Cutis cum rugis suis instar agri ab aratro sulcati, & dein cum ordinibus vertis, seu potius obliquis occati; appareret enim ita ut plano suæ areæ supra sulcos utriusque generis eminentes figuræ utriusque Rhomboidis existant, & juxta quod sulci isti cum rugis, sive areis, breviores ac minores, aut etiam profundiores ac majores fuerint, textura cutis delicata, sive tenuis vel crassa, sive levis vel vitata. Hujus constitutio licet plurimum natiuitati ac primogeniæ fluminum ac humorum concrectioni ac coagulationi debeatur, ea tamen ob diversimodam vitæ insequentis accidentia multifariam alterari solet, quod pertinet videtur crassior, labores duri, ac Boëtianus, vide de his *Blankardi Anat. Reformat.* Et cum Cutis variorum tubulorum & lymphaticorum, glandularum,

acc-

# CAP. XIV. DE CUT. NIGRED. FURFUR. & NAVIS. 609

arteriarum, venarum, nervorum textura sit, nulli mirum videri debet, hanc etiam variis maculis conspurcari posse.

*Diagnosi.*

§. 3. Quod signa spectat *Diagnostica* Maculas has in apicem lentissimas, ipsis non diutius inhæreamus, quia in oculos nostros incurrunt.

Cutis *Nigredo* ipsis patet oculis, nec signis aliis opus est, si enim cutis florida, & alba abeat in fulcam, statim deturpatur Cutis.

*Furfures* quoque ex furfuribus seu squamis ut plurimum in capite infantum productis cognoscuntur, cum & decedentes in oculos incurrant.

*Lentiginis* sunt maculæ lentes colore ac magnitudine referentes, ex flavo rubecentes & fuscæ emergunt ut plurimum in facie, manibus atque nonnunquam in pectore, partes enim, quæ Solis radiis exponuntur facilius maculis his infestantur; colore enim Solis quasi coagulantur, & per totum sæpe perennant æstivum tempus, & magis tum temporis in conspectum veniunt, tempore verò hyberno aliquantum dispacent, facili tamen repullulant, suntque his familiares, quibus rufi sunt pili, quibus etiam est cutis politior.

*Ephelides* verò majores sunt & prægnantibus, & quibus menses obstructi sunt facili obveniunt, & post partum, & post mentium fluxum evanescent, circa os & labia aliasque corporis partes apparent.

*Maculae originales* live *Nevi Materni* facili cognoscuntur, cum à nativitate nostris apparent oculis, qui navi pro imaginationis, vel cupidinis, vel terroris matris varietate variant; referunt enim modo ceratulum rubrum, modo moram, modo murem pilosum, vel testudinem, vel sexcenta alia, quæ hic recensere nimium foret. Navi vel plani conspiciuntur, nonnunquam verò elevati. Color etiam Navorum maxime variat, modo ceruleus, modo flavus, modo niger, modo rutilus exiit. Virgo hæc degit, cujus faciem fere totam rutilus occupat color, à matre gravida incendium subito adveniente, atque ex terrore faciem suam contredante ei impressus.

*Macula Volatica* Infantibus familiaris sunt, quæ modo apparent, modo dispacent, sunt parva stigmata in Cute nostrâ, quæ fere cum Erysipelate conveniunt, discrimen in eotantum consistere videtur, quod Erysipelas in uno loco plerumque persistit; in volatica autem rubor priorem locum deserit, ulterius tamen progreditur locaque vicina invadit.

*Macula Hepatica* sunt majores in ambitu, & hinc inde per totum corpus in brachio, in pectore, in collo, &c. dispersæ apparent, & aliquando pruritus excitant, cutem asperam reddentes, ubi vis enim vagantur.

§. 4. Nunc causas, & primò ex veterum Galenicorum mente, harum macularum videamus, qui *Nigredinem* Cutis ab humore atrabilario summam cutem inficiente oboriri censent.

*Furfures* ex crassis lentisque corruptis humoribus gigni, aut in toto corpore, aut in solo capite, pro exuberantiam humorum loco, contendunt. Alii à pituita falsâ, aut humore bilioso, aut atrabilario sanguine *Furfures* fieri autuntant.

*Lentiginis* ac *Ephelides* à Sole provocari ajunt, à cuius colore humores in Cute subsistentes quasi educuntur.

*Pannum* seu *Maculam* fuscâ Veteres ad Navum referunt matrem, eosque deditur ad imaginationem matris, licet veram ejus ortus rationem sufficienter nequeant explicare.

*Macularum Infantum Volaticarum* ac *Hepaticarum* causam frequentiore statuunt anguinem biliosum adultum Cuticulam occupantem, & ibidem in humorem melancholicum degenerantem; *Hepaticas* verò ab Hepate productas ajunt, sanguinem reddente calidiorem.

§. 5. *Paracelsus* Cutis *Nigredinem* à sale, & *Furfures* ex cruoribus resolutis, quibus accessit alumen minerale scissum, provenire ait.

*Lentiginis* ex cholera vel ex caliditate nasci negat Author, verum liquoris Mercurii esse dicit, ubi liquor Mercurii fuerit, qui vergat in sui regenerationem, cum enim oritur *Lentiginis* contendit.

*Navos* verò ab imaginatione matris provenire ait, à quâ alia interiora citissime commoveantur, ut scitui hæc vel illa macula imprimatur, pro varietate rei externæ obvenientes, & imaginationem turbantis: per matris imaginationem, conceptum, vel ad aliquam rem appetitum habentis, aut præ timore vel incultu metu, quæ *Macularum* ejusmodi causa sunt.

*Pannum* *Paracelsus* ex colore emortuo produci statuit; quicquid enim ex coloribus moritur, in corpore juxta ipsum fixum manet. Cum enim infans ex utero matris suæ maculam aliquam luteam, caruleam aut nigram attulerit *Pannum* esse judicat.

*Macula Infantum Volatica* & *Hepatica* à fluore menstrui oboriri contendit.

§. 6. *Hilmonius* secundum Principia causa Cutis *Nigredinis*, *Furfurum*, *Lentiginum*, *Ephelides*, *Navorum*, *Maternorum*, *Macularum Infantum Volaticarum*, atque *Macularum Hepaticarum* ab impuritatibus sextæ digestionis relictis, & transvolatatione in pectus de duci potest. sæpe etiam ab imaginatione matris perturbata alimentum factus, ei ut ramulus arbori inferti, inficiente.

§. 7. *Nigredinis* Cutis causam esse opinatur *Villifus* bilem atram & adultam in sanguine luxuriantem, vel ob impediam ejus in Hepate secretionem, vel ob abundantiorē ejus ac velociorem in cruoris massâ generationem; quæ per arteriolas ad superficiem advecta sub cute ob visciditatem suam retinetur. Bilis enim nigrum istum consequitur colorem, quando scilicet aquosioribus ejus particulis tenuioribusque sulphureis à magnâ ebullitione dispersis, salinæ summæ rerum possunt, crassioraque sulphurea residua coagulant. Quam autem sulphurei illi grumuli nullum inter se ordinem servent, & ita sint dispositi, ut ampla adit inter ipsos intersticia, radii incidentes ab illis cavernulis demerguntur, nec denuò reflectuntur.

*Furfures* excitari putat à seroso humore à glandulis cutaneis è sanguine secreto, & per poros evaporari solito; talibus paulò acrioribus crassioribusque imprægnato, liquor enim iste serosus ad cuticulæ poros perveniens, eosque angustiores, quàm ut particulis ipsius scabris majoraque molem obtinentibus exitum præbeant, reperiens, salinarum particularum, quas possidet, speculis Cutem ac Cuticulam discindit, & in lamellas *Furfurum* instar discelat.

*Ephelides* deducit à tenuiori humoris biliosi portione, vi Solis illam attenuantis, quæ dum

Hhh

evapo-

*Galenicorum opinio de causa Nigredinis.*

*Furfurum.*

*Lentiginum & Ephelides.*

*Panni & Navus materni.*

*Macularum Infantum Volaticarum & Hepaticarum.*

*Paracelsi judicium de causa Cutis Nigredinis ac Furfurum.*

*Navorum.*

*Pannus.*

*Macularum Infantum.*

*Hilmonii de causa Navorum & Maternorum.*

*Villifus de causa Nigredinis.*

evaporari incipiens in Cutis superficie aut Cuticulæ, quam pertransire nequit, concavo defigitur.

*Lentiginum.*

Quum etiam *Lentiginæ* secundum Authorem nostrum parum aut nihil ab *Ephelidibus* differant, illas ab eadem causa produci statuit.

*Nervorum Maternorum.*

*Nervi Maternos* in fœtibus imprimi dicit, quando scilicet gravis mulier objectum quoddam fortuito percipit, ipsiusque possidendi vehementissimo derepente ardet desiderio: tum temporis autem hoc objecto in retinæ fundo depicto, illius imago statim ad sensorium commune per spiritus animales nervos opticos incoherentes convehitur: ab istis verò comoti spiritus in corporibus striatis hospitantibus ad appendicem nervosum conflunt, & per eam in partes deferuntur, ac per fibras nerveas vasis sanguiferis implantatas cruoris massam subeunt, & cum ipsâ ad uterum pergunt; ipsi itaque cum materno sanguine commixti, & per vasa umbilicalia ad fœtum usque penetrantes, atque ad illius cerebrum tandem pervenientes, spiritibus in eo fabrefactis characterem in cerebro materno susceptum communicant. Hi autem majore motu percipi sanguinem satus vehementius exagitant ac rarefaciunt, & in laxiorem quoddam eum copiosius, quàm par est, propellunt. Liquor verò nervosus objecti à matre percepti, à spiritibus animalibus imaginem mutuatus, sanguinem majori abundantia, quàm ad partem nutriendam requiritur, offendens, illum commutat in substantiam ejusdem penè figuræ, cujus erat objectum matris cerebro repræsentatum.

*Maculæ cum Infantis Visceribus.*

*Willisius* censet *Maculas Infantum Vlaticas* propigni à quibusdam sanguinis grumulis à sale acido coagulatis, & in arteriis Vascularum orificiis hærentibus. Infantum enim Ventriculi fermentum quandoque vel à phlegmatis in ejus cavitate residui obvolutum, aut satis robustum non existens, lacti vel puli ritè concoquendis non sufficit. Salinæ ergo illorum particule rectè non explicatæ, & nullatenus volatilisatæ, ac cum chylis in sanguinem massam delatæ coagulationes in ipsa efficiunt; quæ cum ejus massa per totum corpus circulant, & ad superficiem pervenientes, in tenuioribus ejus vasculis, quæ ob molem transcurrere nequeunt, cæspitant, eaque obstruant, & rubras aut purpureas *Maculas* excitant, pristinum suum colorem servantes.

*Maculæ cum Hepaticarum.*

*Maculæ Hepaticæ* provenire arbitratur à quibusdam biliosis particulis in hepate à sanguine non separatis: quæ cruoris massa iterum admixtæ ad glandulas initiales per arteriolas deportantur, à quibus cum sero à sanguine segregantur. Quum verò evaporationi penitus inhábiles sint tales fœculentiæ, serò fors per cutis foramina prorumpente, illæ sub cuticulâ remanent, cutemque, cui insperguntur, defecant & conspiciunt.

*Spilii optio de eorum auctore.*

§. 8. *Sylvius* Cutis *Nigredinis* causam dicit esse, quando scilicet humores quidam crassi sanguini admixti, & ad corporis superficiem propulsi, ut excernantur, sub cuticulâ hærent, ipsamque colore subnigro inficiunt.

*Erfures* verò, *Lentiginæ*, & *Ephelidæ* obori-

*Nervi* verò *Maternos* fœtibus imprimi ait ab imaginatione matris, quia mater & fœtus sibi arde sint uniti, & fortis à matre faciliè aliquid patitur, sicque nota rei imaginationem graviter occupantis imprimatur.

*Macularum Infantum volaticarum* ac *Hepaticarum* causam corruptionis humorum attribuit, qui corrupti è massa sanguineâ ad Cutem depulsi varias producant *Maculas*.

§. 9. *Carterfianus* pororum Cutis certæ dispositioni *Nigredinis* adscribit causam, videlicet eorundem dilatationi & fibrarum cutanearum relaxationi, unde fiat, ut radii luminæ in talem incidentes Cutem non reflectantur aut refrangantur, sed profundius recepti suffocentur, & motus eorum intercepti ac hæantur, prout pila, quamvis fortissimè è manu projiciatur, in parietem tamen molliorem, uti est ille, qui linteo, reti, vel panno obducitur, incidit, nullatenus resili solet, sed omni suâ vi privata à motu cesset, corpori illi molli eo omni communicato. Hanc verò pororum dilatationem Cuti obtingere volunt ab æstu externo Solis succos cutaneos ad externam superficiem allicientis, qui dum frequentius evaporantur, & particule quædam asperiores iisdem sunt immixtæ, pori, per quos frequentior ille contingit transitus, distenduntur, ampliuntur, & fibræ nonnullæ eroduntur, quarum extremitates in superficie variè reflexæ, extensæ, distortæ, connexæ, vel dilatatæ majorem is conciliant profunditatem, & numerum eorum augment. Sordidities etiam Cui diutius adhærentes particulis suis asperioribus acutis fibræ cutaneas erodere & distringere posse ajunt, ut hâc ratione poris magis ampliuntur, ut iis obveniat, qui fortioribus & ejusmodi laboribus assiduè occupentur, inter quos magnus excitetur pulvis, qui Cutem externam ambiens, & cum sudore se miscens, cutem modo jam dicto afficiat, vel qui ex incuriâ rarioribus se lavare consueverint. In Africa cum Solis calor homines nudos continuo afflaret, & liquores ex ductibus suis ad superficiem externam prolittere, homines ibi etiam existere nôrunt nigerrimos *Æthiopum* nomine cognitos.

*Erfures* cutis excitari putant à particulis quibusdam acido-salis è lymphâ ad Cutem rejectis, eandemque erodentibus, ut succi extillant, qui incrassati aut coagulati in squamulas condensantur, post scalpationem faciliè à Cute decedentes. In capite *Erfures* istos copiosiores quandoque colligi credunt, quoniam ob impedimentum aliquam transpirationem attenuati succi circa pilorum radices subsistere coacti inspissentur, & per coagulationem incrassati floccorum instar distolui depluant.

*Lentiginæ* à succis oriri censent per tubulos cutaneos extillantibus, & sub cuticulâ coagulatis, quam distendentes in altum elevent, & diuturniore sua stagnatione, & quam ductibus inferunt, obstructione moleculam coloratam referant, tam citò non dissipabilem, quod similibus particulis à tergo sequentibus assiduè sustentetur. Fuscum illum, quo præditæ sunt, colorem à majori etiam deducunt pororum cutaneorum prolongatione, ob quam radii luminæ aequalem patiantur suffocationem, & quum spissiores sint succi hi, quàm ut tam citò resolvii possint, propterea obstructionem hanc non referant, sed maculas hæc diu conspicuas manere asserunt.

*Ephelidæ*



# CAP. XIV. DE CUT. NIGRED. FURFUR. & NÆVIS. 611

*Ephed.*  
*dum.*

*Ephedides* autem à succis quidem istiusmodi à Solis vel ætheris subtilioris fortiori in fibras cutaneas agitatione ad superficiem proleſtis. & ibidem coagulatis produci exiſtimant, ſed quòd ſucci iſti non adeò ſint inſcrallati & ſpiſſi, hinc ſi ceſſet externa illa Solis vel ætheris actio, eosdem facile reſolvi & per ductus convenientes in lympham & maſſam liquorum omnium communem refluere docent, quapropter & tempore autumnali, aut dum homines diutius ſub umbra degunt, maculæ hæ diſpareant, Cute priſtinum ſuum recuperante colore.

*Panni & Nævorum Maternorum.*

*Panni*, aliorumque *Nævorum maternorum* cauſam imaginationi adſcribunt fortiori gravidæ, obſecto cuiusdam deſiderato cogitatione ſua diutius, & per exſtaſin quandam inhærentis, vel ex terrore quodam vehementius commotæ, quare ſpiritus ejusdem validius excitati impetu quodam totam non modò propriam percurrant machinam, ſed ad ipſum etiam ei implantatum pertinent foræ, & in ejusdem ſimili membro, quod in proprio corpore attingit mater, fibras ita ducat, ut tubuli dilatati ſanguinem aliosque ſuccos majori admittant in copiâ, qui per coagulationem ibidem ſtagnantes pro diverſa configuratione, quam ſpiritus ſecundum corpoream illam ideam, quam natus ex conſpectu externo obſecto concepit, determinârunt, varias exhibeant maculas & picturas, quin etiam promittentias & imagines certas quasdam animalium aut fructuum ſpecies diſtinctè ſatis referentes.

*Macularum Volaticarum.*

Ex particulis quibuſdam angularibus acidis lymphæ, in extremis tubulis hærentibus, & obſtructionem quandam inflammatoriam inducentibus, *Maculas* dicunt infantum oriri *Volaticas*, quæ particulæ cum non adeò exiſtant rigide, ſed à novis alluentibus ſuccis ſuperari, ſolvi & moveri poſſint, aut per dilatatos poros cutaneos eas diſſipari & exhalari credunt, aut cum lymphâ refluente per conſuetos poros aliò deſerri, unde in prioribus partibus diſpareant, & quando ſimiles particulæ in aliam corporis regionem cum lymphâ ferantur, in iisdem maculæ tales denuò conſpiciantur.

*Macularum Hepaticarum.*

Fieri etiam interdum dicunt, ut plures tubuli & glandulæ in Cute à ſucco glandularum obſtruantur, & lymphæ multis particulis acutangulis, ſive acidis reſerta magna copia inter Cutem & cuticulam effundatur, quæ per poros tranſitum non reperiens, ſed ibidem ſtagnans *Maculas præbeat Hepaticas* dictas, quòd Veteres ab hepate humores biliſoſos in partes tranſfundi crediderint, unde maculæ iſtæ oboriantur: quam tamen opinionem veritati nullatenus congruere aſſerunt, ſed liquori acido in lymphâ exiſtenti potiùs earundem originem adſcribendam eſſe, easque poſt febres itæpe conſpici, quòd abſumtis particulis ſubtilioribus, craſſiores & acidiores lymphæ remaneant, quæ ceſſante motu ſanguinis vehementiore magis, quàm antè, coagulantur.

*Nævorum judicium de cauſa Nigredinis.*

§. 10. *Nigredinis* Cutis cauſam Nos in Cute ſerè biſpida omnimodique aſperitate donata, ponimus, pro diverſitate enim partium commixturam, poros Cutis vel ſuperficiem aſperiorum reddentium & diſtorquentium, & radios ſuſſocantium, Aſſenſum præbere jubet pannus ſericus niger, (*Gannet*) cujus exigua filamenta ſericea, è quibus conſtat, ſerè biſpida ſunt, ideoque inter omnia maxime niger appa-

ret. Corpora enim cuncta nigerrima ſunt, quæ exſtinguunt luminis motum, ejusque radios ſuſſocant. Ut album nigro opponitur, ita oppoſita albedinis & nigredinis eſt ratio, etenim majorem poroſitatem in corporibus nigredo requirit, ut ita microſcopia indefinitos in uigris corporibus poros detegunt, quorum in una ſerie carbonis digiti miſſenarium interdum excedit. Quæ etiam ratio videtur eſſe, cur nigra cæteris partibus læviora albis ſunt. Nigra ergò non refleſcunt foràs, ſed ſuſſocant potiùs radios, hinc certum eſt, corpora alba vitum laſſare, nigra autem laſſitudinem ſolvere. Nunquam enim album in oculis incurrit, quin ſimul admittatur impreſſio multorum radiorum, à quibus viſus fatigatur, cum nigrum videatur, ubi nulli recipiuntur radii, quod fatigationem tollit. Quoad ergò poros majores, in quibus plerique radices pilorum conſiſtunt ſunt, & per interſtitia ex utroque latere cujuſque rugæ cutaneæ ordinè parallelo diſponuntur, vel minores, quarum innumeri ſpacia cuncta pluribus interjecta quaſi punctis creberrimis adimplent. Ut ergò Cutis magis polita alba & nitida evadat, plurimum intereſt poros ejus omnes ſucco benigno dulci ac oleoſo impleri, ita namque dum meatus omnes pleni ac teſti ſunt, totius Cutis planities læviſſima apparet: attamen ſi humor vitioſus poris iſtis ſuppediatur, aut qui inſuit benignus, nimis exhauritur, Cutis promiſe aſpera, ruſoſa ac nigra fiet. Sic victus craſſior, labores duri, æris inclementia, ac imprimis calor ſiſ frigoris exceſſus, Cutem aſperiores nigrioremque etiam, è contrâ educatio mollis & delicata, tenorem ac texturam magis ſubtilem leviorum, ac politam reddunt.

*Furfuratio* eodem modò, ac ſuprà de Scabie dictum eſt, oritur, glandulis ic. & tubulis lymphaticis & ſubcutaneis obſtructis & erolivis variz generantur Maculæ & Puſtulæ, quæ prout

diverſa eſt ſanguinis ac ſuccorum intemperies, ipſius Cutis diverſa textura, laxior vel conſtrictior etiam per eorum minimis diverſitatibus ratione ſiccitatis, humiditatis ac redinisque majoris, figuræ magnitudinis, vel quatenus cum aliis morbis conjunguntur. Certum enim eſt, *Furfuratio* cauſam eſſe plurimas particulas ſalinas accedente acido in Cutem delatas, & in liquamas & furfures per coagulationem degenerantes.

Absque eroſione Cutis deturpantur ſæpe artus plurimis Maculis, upote *Lentiginibus*, quæ nunc, potiſſimum æſtate accidunt, cute rariori texturâ à nativitate donatâ exiſtente, dum tubuli æthere plures aliquando particulæ à craſſioribus aveluntur, & cum exhalationibus reliquis ad ſuperficiem machinæ corporeæ delatæ, non ita rite poros permeant, ſed inibi hærentes & per aſtatem novis ſemper inſequentibus ſuſtentatæ, tales maculas producant.

Lentiginum ergò origo, & aliarum macularum ſanguinis aliorumque ſuccorum corruptioni & ſtagnationi debetur, omnes enim maculæ, ſive ſint flavæ, ſive rubræ, ſive fulcæ, nil aliud ſunt, quam in tubulis Cutis coagulati & ſtagnantes & quaſi cadaverizati ſucci. Solis quoque calor multum ad humorum in tubulis exiſtentium concretionem conferre poteſt, quatenus volatiles, mites ac oleoſi avolant, & reliqui magis exſiccati ac inepti retinentur, hinc *Lentigines* foramina quoque piloſa,

Hhhh 2 quæ

quæ & sudatoria dicuntur, ob transpirationis beneficium (tempore æstivo præsertim) effluvia copiosiora continuo emittunt, quare majora semper illa ac potentiora videntur; sin verò à frigidulculo aëre externo hæc subito ocludi contigerit, vapores intus coërciti Cutim circa eruptionum loca undique inflant ac in moleculas seu maculas attollunt. Certum enim est, quod succi vitiosi quidam in subtili cuticula coagulantur, & per cuticulam transparent, & sic formam macularum talium repræsentant.

Tempore autumnali cum Sol non admodum ardeat, hinc coagulatur & inspissatur sensum ac sensum influente mitiore æthere attenuantur & educantur, hinc Cutis pristinam recuperat formam. Maculas ferè omnes ab obstructis ac erosis vasis capillariibus enascuntur, quando sc. sanguis ac reliqui succi evasantur, particulæ volatiles avolant, reliquis crassioribus, quæ ob lentorem non tam ritè progredi possunt, sed in ambitu corporis (ceu littore Microcosmico, quod aluit sanguinis unda) extravasatur & fixæ hærent, prout nunc sanguis magis unagisque ab indole sua degener factus, ejusque crasis vehementius vel mitius destructa fuerit, sic quoque diversæ macularum apparitiones variabunt. Rubræ si appareant, signum est sanguinem non usque adeo corruptum esse, unde rubore adhuc suffusus sunt. Sin livide appareant, majorem sanguinis ac succorum corruptelam innuunt, pessimè verò omnium notæ existunt nigre, quæ summum sanguinis flatum putrilagiosum, & ad nigredinem vergentè indicant, & maculæ hæc sunt superficiei Cutis mortificationes Sphacelo haud ab similes.

*Epheli-*  
*dum.*

*Ephelides* itidem exoriuntur ex coagulatione sub Cute stagnantis succorum, imprimis ab obstructione mensium obortæ; hæc enim maculæ sub vel in Cute generantur, exinde, quia sanguis fit crassior & minus mobilis, adeoque faciliè in superficie corporis hærent; sunt & sæpè fermenta quædam vel acida minutissima, quæ in hisce cutaneis porulis latentes humores præcipitant coagulantque, ita ut amplius suum circulum continuare nequeant. Et quod *Ephelides* in gravidis stagnantibus mensibus aliisque oboriuntur, & dein fluentibus lochiis mensibusque iterum evanescent, hinc faciliè causa *Ephelidum* erui potest.

*Nevarum.*

*Nevarum causa primaria* est coagulatio varia succorum, in Cutis tubulis facta à forti imaginatione vel terrore matris uteri materni claustris adhuc incluso foetui impressa, à quâ perversa imaginatione, & improvilo terrore ejusmodi stigmata tenellulis embryonibus imprimi solent. Experimentiâ enim constat, quod si gravidæ vehementi aliquâ animi passione aliquid appetant, ejus signum foetui in uteri claustris adhuc contento imprimi; ita si quæ gravis tempore quodam, summo & insatiabili desiderio appetiverit fructus, vel cerasa, vel mora, vel pyra, &c. si sui compos fieri nequeant, tunc horum fructuum imaginem imprimet isti parti foetus, quam mater in suo proprio corpore attigerit inanimadvertenter, cum magno percelleretur horrore. Sic si de improvilo pyrum vel prunum decidat in gravidæ caput, & fuerit inde perterrita, & caput tetigerit, infans post natiuitatem talem fructum iconem exhibebit. Difficillimi hujus problematis causam reddere hoc opus hic labor est: si verò cogitemus, quod corpus nostrum sit ubivis per-

meabile, & quidem ad momentum fulminis instar, ita ut spiritus animales undequaque admitat, quia fibrillæ capillares & minutissimæ adfunt & inserviunt pro ipsorum canalculis, si igitur jam gravis magno teneatur terrore percutiatur, faciliè nobis persuademus, animam hisce unictè esse intentam, & hæc fructuum imagines ita conjugere cum spiritibus animalibus per totum corpus diffusis, adeoque ipsum uterum permeantibus, ut illæ imagines nullo negotio imprimi possint tenello corpusculo foetus intra contenti; observamus enim hæc figurarum signaturas non nisi gestationis mensibus foetui communicari à matre. Ratio autem, cur in corpore matris non sequatur idem effectus, hæc est, quia illud est nimis solidum, & durum, adeoque instar terræ mortuæ sigillum respicit, cuius tamen impressionem faciliè recipit molle foetus corpusculum, quod instar ceræ mollioris flexi potest: cur autem ista imago præcise imprimatur illi foetui parti, quam mater in proprio corpore tetigit, ratio hæc est, quod anima eo tempore nullius amplius motus est conscia, quàm tantum illius, quo mater certam sui corporis partem contraxit, unde etiam huic unictè inherens, ei junxit istam imaginem hujus vel illius fructus ardentè desiderati, vel animalis cuiusdam; sed cum hæc spirituum determinatio ad hanc partem matris radiavit ad ipsum uterum, factum est, ut etiam tenderet ad simile membrum foetus, eique suam imaginem imprimeret, ut egerit dislerit *Celeberr. D. Craan, Amicus meus, dum vivere singulari*. Faciliè etiam hic effectus oboriri potest, si gravis obvius factus est de improvilo vel mus, vel aranea, vel rana, vel bûfo &c. & ubi mulieres prægnantes se tangunt, ibi stigma apparet. Quomodo verò impressio hæc fiat, non dubitandum, ab ipsis spiritibus animalibus id contingere, si enim gravidæ ob causam aliquam terrore afficiuntur, hinc solent in loco, quem manu tangunt, fibrillæ infantum etiam simul commoveri, ut in majorem sanguinis quantitatem admittant, quàm aliis solenne est, hinc illæ extenduntur, majores redduntur, & per consequens rubicundiores, quod si diu durat, manet macula rubra, hinc rubor modò in facie, modò in oculo, modò in dimidiâ facie, modò aliis in partibus apparet.

*Macularum Volaticarum causa* ferè eadem est *Macularum Volaticarum*, lymphæ enim in volatica est subtilior, acrior in extremis Cutis tubulis stagnans, humores enim acriores ac mordaciores vasa minutissima capillaria subcutanea faciliè corrodere possunt, evasati humores quoad particulas volatiles ac subtiliores abeunt in auras, relictis in Cutis tubulis crassioribus stagnantibus, maculas tales in infantum tenellorum Cute excitantibus.

Ubi contigerit, ut vel propter abundantiam *Macularum* particularum crassarum salinarum, vel acidarum magis vel minus corrosivarum in toto sanguine, vel humoribus existentibus, vel propter præcipitationem fortuitam, alio quodam à fermento inductam fiat obstructio, ab eâ diversis generis oriuntur maculæ, & sic etiam *Macula Hepatica* dicitur; & hic non ad hepar inlons respiciendum est, sed observanda venit tam intemperies sanguinis, prout enim illa variat, ita & ipsæ maculæ colore variare possunt; quàm lævis tubulo-

# CAP. XIV. DE CUT. NIGRED. FURFUR. & NÆVIS. 613

bulorum, prout plures vel pauciores, majores vel minores affecti sunt, macula erit major, si occupat tubulos laxioris texture, hinc dilatationem facit admittunt, & cum humor etiam fuerit viscosior, i. e. pluribus particulis ramosis & chylosis confertus, major fit congestio & stagnatio.

*Prognosis  
Nigredinis  
in Cutis  
Macularum.*

§. 11. Quod *Prognosis* Macularum Cutis concernit, *Cutis Nigredo* à nativitate vix emendabilis erit, juxta sacrum Codicem, *Jeremia c. 13. v. 23.* Nunquid mutabit æthiops pellem suam, & Pardus maculas suas? At cum à morbo vel sorditis succorum ad Cutem depositis oriatur *Nigredo*, ista aliquomodo corrigi potest.

Reliquarum macularum, ut *Lentiginum*, *Ephelidum*, &c. curatio licet ex se non sit necessaria, à plerisque tamen magis, quam vel alius gravissimi morbi, expeti solet. Maculæ enim hæc sunt Curatu difficillimæ, & sæpè, me judice, incurabiles.

Quod Navorum *Prognosis* attinet, Veteres Physiognomici, imprimis *Cardanus* alique recentiores, *Navis* ejusmodi Verrucarios lævæ faciei parte infustos plenis pronuntiaverunt buccis, violentosque exitus portendere crediderunt, quod licet vanissimum, Romanis tamen quoque Veteribus ad superstitionem promptissimis receptum fuisse, ex ipso Cicerone patet, qui *Pisoni* morum sordiatem obiciens, non *Piso*, aiebat, genæ deceptum me, nec *vultus totus*. Navorum igitur curatio quamvis non sit necessaria, à pluribus tamen ob turpitudinem desideratur. Difficillimè in Infantibus & rariùs vel nunquam in adultis curantur, nisi corrosivis & fortioribus remediis, quæ etiam non semper satisfaciunt.

In *Maculis* Infantum *Volaticis* refert *Sennerius*, si maculæ illæ orificium aliquod, os putat, nares, oculos, aures, nates attingerint, & eo usque penetrarint malum lethale esse, quod tamen nos nondum observare potuimus, sed licet tumor igne suo totam faciem, labia, nares, oculos & aures occupaverit, morbi tamen lætum eventum subsecutum vidimus.

*Maculæ* Hepaticæ sæpè spontè abeunt, sæpè etiam difficulter curantur, facileque recurrunt, nihil præter Cutis desedationem inferentes.

*Diatæ in  
maculis  
bis ob-  
servanda.*

§. 12. In externis minis affectibus etiam *Diatæ* ratio habenda est. Aëris enim constitutio diversa diversos in Cute colores producere posse testantur varæ nationes: hinc Galli nigriores sunt, quam Angli, aut Dani, aut Germani, ubi enim Aër magis temperatus est, quam nimis calidus vel frigidus existit, colore etiam incolæ præditi gratiore & splendidiore. Solis enim æstui exposita Cutis alba facili in nigrorem abit, prout videmus in rusticis, qui ruri habitant, à quo etiam mulieres formosæ se optime munire norunt lævis Masque dictis. Huc etiam pertinet victus, qui sitis tenuis, blandus, boni succi, vitetur crassior, acidior ac salisior, qualis enim chyli, talis Cutis; educatio enim mollis, & delicata reddit Cutem subtilem, levio rem ac politam; imprimis verò potus calidus conducet, cerevisia herbis ac radicibus sanguinem purificantibus maricetur, ut sunt rad. gram. bellid. caryophyll. lign. santali, citr. chin. &c. præ aliis commendamus puellis & virginibus, ut & foeminis pulchritudini studentibus potum Caffææ & Theæ, qui juxta versus Germanicos sequentes omnis generis maculas abstergit mundificatque:

*Flecken / Finnen / Eiterbeulen /  
Kupfer-Masen und Gesicht /  
Da der Wein mit Macht ausbricht /  
Wilstu auß dem Grunde heilen /*

*Recipe*

*Edlen Thee,  
Der wird vom Gesicht und Masen /  
Solchen Unflar bald wegblasen.*

Delicatus etiam haud nimis vigiliis, item motibus nimis incumbant, & imprimis eo anantantur, ut excernenda consuetudo exeant tempore, atque summo per animi pathemata vehementiora fugiant, & iram, iracundiam, sollicitudines omni studio vitent, & quod asterisco notandum, abstineant à Mercurialibus cosmeticis.

§. 13. Hisce deductis ad *Curam Chirurgicam Galenicæ* & *Pharmaceuticam* nos conferamus, & prius Veteres Galenicæ de Curâ harum Macularum *du em-  
audi* audiamus, qui ad nigredinem Cutis commendant facinam fabarum, cum succo interiore pæponis mixtam, & in trochiscos octo redactam, & tres ex his imponunt aquæ & illiunt Cutem. Herbarum quoque Rhodiam ex aceto tritam illiunt & siccescere permittunt, atque ita eluunt. Vel recipiunt Iridis contritæ, farinæ psifanæ, farinæ fabarum, farinæ ervi, spumæ nitri, costi, cujusque chnæcis partem quartam, amygdalas amaras N. xx. informant cum candido ovorum & lacte asinino, exsiccant in umbrâ ac utuntur. Aliud multo usu exploratum dicitur, Thuris sesquialtiam, cerullæ probæ lotæ, spumæ argenti in decocto cicerum alborum ad Solem frequenter ablutæ, amyli recentis, scobis marmoris albiissimi, masticæ spumæ, spumæ nitri albensis, testar. sepæ sing. unc. j. saponis Gallici ʒij. candid. ovor. n. x. M. Sequens fuisse Cleopatrarum dicitur Reginz odoratum & pretiosum: ʒ. Costi, myrrhæ trogloditici, iridis, spicæ nardi, amomi, folii malabathri, cassiæ, floris junci odorati aa. ʒi. Myrobalan. lbjv. spumæ nitri. lbj. Contund. cribr. & utere. Cutis nigredinem emendant per ea, quæ modicè detergent, qualia psifana, aphronitrum, amygdalæ amaræ, &c.

*Furfurum* curationem sic peragunt; evacuant totum corpus imprimis melanagogo. Dein cimoliam aquæ præmedicatam ad betæ succum admiscunt, illiunt, & donec, resiccetur sinunt; deinde abluunt, & thus cum vino ac oleo terunt ac illiunt: posttridie verò staphidem silvestrem cum oleo illiunt: sequentem etiam commendant formulam:

*ʒ. Nitri*

*facis vini nſſa*

*myrobal. aa. lbj.*

*staphidum silv. lbj.*

*vino dissolva parti affecta affricant.*

Verum ad humidiores porrigines muci aut lupinorum decocto ad abluendum utuntur.

*Lentiginæ* ac *Ephelides* isdem curant remediis externis, optime nempe extergentibus ac discutientibus, cujusmodi est assum aphronitrum

Hhhh

& farina

*Lentigines* & farina ervi. Ad maculas solares & lentigines  
seq. commendant.

℞. Terra Cimolia toirefacta heminx dimi-  
dium.

aphronitri coll. ʒj.

farina ervi ʒb.

ramentor. sellis laurini ʒj.

Trita affricant.

Vel:

℞. Facis vini

farina erviaa. ʒx.

fabafrese ʒix.

veratri albi ʒv.

aphronitri ʒx.

alcyonii ʒix.

M. & conficiant.

Vitis alba item nigrae radices cum oleo deco-  
quunt, donec succulentae reddantur; laudant  
quoque oleum amygdalarum cum cera, radicem  
lilii cum melle. Maxime autem omnium len-  
tigines delere dicunt gummi & nitrum aequali  
pondere, melle permixta. Item Brassicae se-  
men aqua contritum illinunt. Columbae quo-  
que sterus cum acri aceto terunt ac utuntur.  
Ad diuturnas Lentigines seq. magni astant.

℞. Radici Cucum. sylvestr. sextant.

Cimolia ʒj.

in pulverem redigunt ac reponunt.

Vel:

℞. Bulborum depurator.

Thuris aa. ʒj.

conterunt, adjecto cochlearum terrestrium ma-  
gnarum croore, oportet autem ipsas adhuc vi-  
vas stylo pungeri, atque id quod effluit muco-  
sum pharmaco injicere, melle quoque exce-  
ptum inungunt. Eundem effectum praestat ari-  
radix sicca cum melle, & umbilici Veneris radix  
cerato liquido excepta atque illita. Brassicam  
contritam & illitam ad maculas Sole productas,  
& lentigines, atque omnia illa, quae mediocri ex-  
terfione ac repurgatione indigent, utilem dicunt.  
Similiter & lepis, testae ustae, aut testae purpura-  
rum ac buccinorum cum melle illitae condu-  
cunt. Vel seq.

℞. Cera Tyrrhenica ʒxv.

olei rosacei ʒviib.

pingu. anserin. ʒj.

spuma argent. lota

& dealbat.

ceruss. aa. ʒj.

gumm. ʒb.

mellis Attici ʒj.

Dissoluta illinunt, & post spatium horarum sex  
spongia detergunt ac lavant cum sapone.

Alii lupinos in lixivio per triduum maceratos  
conterunt, & cum iis vel Lentigines vel Ephe-  
lides illinunt, donec avelli possint. Saponem  
Gallicum aqua tritum modice adjecto melle in-  
ungunt, & per horas tres inhaerere sinunt. Lau-  
dant quoque myrobalanos, bulbum crudum  
per se vel cum ovi luteo, aceto aut melle radices  
narcissi in aceto decoctos, imò quilibet Vete-  
rum experimentum singulare jactat, & integer  
tractatus non sufficit ad omnia haec comprehen-  
denda.

*Pannum* seu maculam istam fuscam non aliter  
Veteres curandam volunt, quam ipsum *Nevum*  
*maternum*, qui juxta ipsas curatur sequenti ra-  
tione.

℞. calc. viv. ʒvi.  
faecul. col. ʒij.  
nitri ust. ʒj.

Haec terunt & lixivio de cinere caprisi facta,  
vel de samentis immiscent, ad icunctu erubri-  
ca aliquid aut atramenti, quo possit colorari,  
quae simul mixta in patella fictili coquunt ad  
mellis spissitudinem, & recenter parato utuntur.

Adhibent etiam sinapi cum aqua calida in for-  
mam pulvis redactum, vitellum ovi allatum tri-  
tum & Nervis impositum, item costum cum  
aqua & melle applicatum commendant, nec  
non Alysson, fell, gallin, saponem album, san-  
guinem menstruum vel secundinas calide Nervis  
adhibita magni astant, quas aliasque inun-  
ctiones vesperi ante ingressum lecti institui man-  
dant, & matutinis horis decocto sem. lupinor.  
iterum abluere, quae omnia aliaque Topica vix  
voto respondent, hinc plura ex eorum seriniis  
addere non libet.

Ad *Maculas Infantum Volaticas & Hepaticas* *Maculas*  
exterendas utuntur variis internis, & in hepaticis  
semper ad Hepar respiciunt, V. S. & purgatio-  
nes instituunt, dein aquas Epaticas, Endiv. cicchor.  
aliasque refrigerantes exhibent, & serum lactis  
propinant, variaeque ad Hepar confortandum  
exhibent. Inter Topica Gallas immaturas, me-  
lanteriam, itemque malicorium confusa, ut  
suceum emittant, inponunt, & ampelopra-  
sorum succum viridem adhibent, donec teneri  
cerati crassitudinem habeat. Maculas nitro  
perfricandas & abstergendas esse scribunt; quae  
maculae etiam juxta ipsos exteruntur betae de-  
cocto, aut nitro tosto, aut linegmate, quod ex  
ervo conficitur: si vero nigror ex hoc appareat,  
florem artis admiscant, aut per se inspergant.  
Dein tollunt maculas ac cicatrices hunc in mo-  
du: Maculas illinunt resina per dies quinque,  
sexto die solvunt, acubus maculas densis punctu-  
ris pungunt, ut locum aequè vellicent, sangui-  
nemque fluentem abstergant, quumque horae  
diutius ita permiserint, spongia locum munda-  
nt, ac Medicamentum in quamcumque ma-  
culam indunt, tertio die iterum solvunt & de  
ligaturis expediunt.

Vel:

℞. Cera

nitri

aphronitri

calcis viva

lixivii

thuris aa. ʒj.

M. & cum Melle excipiunt.

§. 14. Paracelsus curationem *Cutis Nigredinis* *Paracelsi*  
& *Furfurum* ita instituit, ut primo Cutis Me-  
dicamento corrosivo evellatur, quo postmodum  
nova, pura & immaculata producatur, in  
quem finem sequens commendat.

℞. Album. ovor.

test. ovor. calc.

destill. in aquam, & add.

marcastasi. arg.

chimolea. f. digestio ad mensem & destil-  
lata.

Sic quoque in Furfuribus maxime prodesse dicit  
sequens:

℞. alcali de albuminibus

salis fusi aa. q. v.

Fiat Mixtura pro Furfuribus.

CANTAB.

# CAP. XIV. DE CUT. NIGRED. FURFUR. & NÆVIS. 615

In Panno.

Cura Panni Paracelsus peragit Tincturâ sequenti:]

℞. de floribus fabarum ʒb.

ea levis ovorum ʒij.

salu peregrinorum lbj.

Aqua consolida.

Alcool. vini 22. ʒxv.

Destillas per alembicum, & hâc medicinâ Pannum inungit; & fiet albiore quàm Cutis altera.

Sequentem etiam commendat Tinctura.

℞. Aluminis plumosi

scissi 22. lbj.

Destilla in aquam cum istâ additione:

℞. Caphura ʒb.

sigilli Salomonis ʒij.

Rursum destilla, postea linteolo hâc aquâ madefacto Pannum inungit lavatque.

Cura Nævis matris.

Nævis Matris Paracelsus tantum sanari credit, si res, quæ imaginationem matris agitavit, & quâ mater perterrita est, adhibeatur, vel infans vel re appetitâ fruatur, vel terrore aut timore afficiatur, ut res illa extirpetur, & tum ut extrinsecus ad Cutem deveniat, Cutis aqua aliqua forti, ut Regis eluatur, & dein iterum exsicceatur. Commendat quoque omnia ea, quæ detergunt & cutem transformant, ut sunt Caphura, flores fabar. album. ovorum, calces ac tertia ovorum, sol. argent. stann. plumb. Venus, Marchasit. argent. aurea. chimolea, aqua consolida, sigilli Salomonis, alumen plumosum, scissum, & c. viride æris, & plura alia. ex quibus varias concinnat formulas, imprimis vero hanc præ aliis commendat curam, & sequentibus verbis exprimit: Demus de vermibus imaginem visibilem, coloreque similem in maculâ formâ quovis corporis loco habere: Perquirendum est à Matre primum, cujus magnitudinis, coloris & formæ cum tempore, die videlicet hora, minutoque. quibus accidit, ac adimpleta fuit imaginario talis: perquirenda est istius occasio, tactusque. Si tamen exactè singula per matrem addisci nequeant, quod arduum cuncta recolant, ab Astronomia & magia petendum erit: istæ siquidem artes perfectissimam instructionem dabunt. His ite cognitis, est quod ejusdem generis vermem accipias unum, omni proportionem correspondentem, & si vivus ille fuit, de quo mater imaginationem concepit, vivum etiam sumere decet, si verò mortuus, & mortuum accipito, quem eodem etiam tempore, quo matris accidit imaginatio, super maculam servata concordantiâ quâvis ligato, & vivum in mortem usque relinquito, mortuum autem usque ad purrefactionem immotum. Et si forte matri ex appetitu contigisset, infans eo satians fuit & contendendus: si tamen ex timore terroreque, simile quid infanti fuerit incutiendum interea temporis, quo superligatur & vernis. Ad hunc modum eradicari dicit à fundamento Vermem extra carnem, non tamen extra Cutem intrinsicè. Ad hoc autem adsumendum esse ait aquam fortem vel Regis vehementissimam, tum prius aquâ recenti locam Cutem, illam perliniendam. Ejusmodi Cutis in octo vel quatuordecim diebus ad summam auferetur, & recens ac munda nascetur alia. Hâc viâ, inquit, poteris nedum animalium quasunque maculas ejus detegere generis, verum & fructuum & creaturarum omnium

per ei simile quod matrem ad imaginationem traxerit. Hanc curam occultissimam neminem ante ipsum revelasse scribit.

Macularum Infantum Volaticarum & Hepaticarum curam consistere ait in absterfione & correctione salum, hicque omnia ea prodesse scribit, quæ superius in Panno communica-  
vimus.

§. 15. Helmontius Maculas has nigras, item Helmontii Lentigines, Ephelides, Pannum, & ipsos etiam Nævos sponte evanescere promittit, si maculas janî characteritatis manus cadaveris longatabe extincti, omnique vitæ proprietate exuti, admoveatur & applicetur, donec frigus partem maculatam penetraverit.

§. 16. VVillisus, cum affectum istum Cutis, sc. Nigredinem, à bile in sanguine redundante deducat, illam foras ejicere statim anxie curat, quare hoc Medicamentum ante omnia adnatis-  
tatur:

℞. Sulphur. ʒiij. gr. viij.

scammon. sulph. gr. viij.

crem. Tartar. ʒb.

M. f. Pulv. detur è cochleari j. panatella.

Sequentem bolum deinceps exhibet:

℞. Electuar. è succo rosar. ʒiv.

rhubarbar. ʒb.

Subsynb.

crem. tartar. 22. ʒb.

Syr. de rhubarb. q. l.

M. f. bolum.

Elixir. propr. cum vehiculo idoneo propinatum commendat ad gutt. xx. manè & hora quinta pomeridiana. Martialisbus magnam etiam efficaciam tribuit hisce in affectibus. Topico tandem sequenti alienum istum colorem Cutem defecantem tollit:

℞. Rad. agri

bryoni.

sigill. Salam. rec. 22. ʒj.

sem. fœnigrac. pulv. ʒj.

camphor. ʒb.

simul contus. affand.

ol. ʒi per deliq. ʒiij.

Fiat exprelli. applicetur cum petia bis in die.

In Furfuribus VVillisus statim pororum Furfuris apertioni illudet, materięque serosę stagnantis bu.

per eos excretioni, blandè diaphoreticis. Sallium acrimoniam verò compescit sero lactis, ac balneis aquę dulcis tepidę, & partem Furfuribus afflicta hac linimento inungit.

℞. ol. Tartari per deliq.

nunciat 22. p. æq.

M. f. linim. locis affectis bis in die illinendum.

Lentigines, Ephelides, & Maculas Hepaticas nulla medendi methodo indigere ait, sed his Ephelidibus & Maculis Hippocratico illinit.

℞. Sulph. viv. pulv. ʒj.

sapon. nigr. ʒij.

ligata in petia suspende in aceti lbj. per dies 12. dein in usum adhibeatur, loca, affecta bis in die ablundo & confricando.

Postea in usum adhibet lac istud Virginis:

℞. Solutionem lubar. syr. in aceto destillato

fasciam, f. ejus precipitatio ol. ʒi per deliq.

à quo liquor instat lactis aliscans de-

venit,



venit, eoque facies & manus bis in die laventur, ac blande confricentur.

Vel:

℞. Minium in aceti. solut. q. v.

aut ejus loco ceruss.

F. eorum præparatio cum aqua aluminis aut sal. gemmæ.

*Nevus Maternus* curare tentat Author Cosmetici, quibus utitur ad reliquas Cutis defædationes abigendas.

*Maculæ infantum volaticæ.*

*Maculæ Volaticæ* infantum sanat illorum pulci admiscendo grana aliquot sal. absynth. & ocul. ʒ. ppt. vel ʒnii diaphor. & corall. rubr. adeo ut stomachi phlegmata dissolvantur, ejusque fermentum validius reddatur, & sanguini requisita fluiditas tribuatur, ejusque coagulationes dissipentur. Quoad externa verò Medicamenta, hoc solummodo utitur:

℞. Camphor. incis. ʒij.

teratur in mortario vitæ.

sensim affundendo succ. unius limonii, dein add. vin. alb. ʒij.

F. colatura, & Camphora residua in perialigata suspendatur in vitro.

*Sylvis extra in cutaneis his affectibus abigendis.*

§. 17. *Sylvis Cutis Nigredinem, Furfures, Lentiginos, Ephelides, Pannum* aliasque Maculas non prius curari alicui, quam propulso humore obstruente foras, superataque in totum causa, quod verò sudoriferis obtineri posse contendit, commendat in eum finem varia decocta lignorum, ʒnium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, & salia volatilia ex animalibus parata, quæ omnia causam, nempe acidum, tollunt, & simul materiam in Cute hærentem foras propellunt. Forisecus autem cum commodò insurpari posse promittit foris ex vino vel aceto, cum Theriaca & Camphorâ, myrrha & similibus misto, & calidè sæpius applicato, ut & inferius dicendis.

Sic quoque ad *Nevus, Maculas Infantum Volaticas & Hepaticas*, pro diversitate causæ varia commendat remedia; ad rubras & flavas abigendas Maculas utitur lixiviosis, ut farina orobi, sale Armoniaci, Melle, succo ceparum, & felle animalis cujusdam in linimento redactis, vel oleo ʒri; ad nigras vero maculas tollendas laudat subacida, ut succum limonium, simum columbinum cum aceto subactum, lac Virginis, quibus illini posse omnivarias maculas contendit.

*Cortesiæ normæ apparatus ad curandum Nigredinem.*

§. 18. *Cortesiæ* Ethiopem quidem lavare, ut albeat, aut inatam *Nigredinem* penitus auferre non aggreuntur, eam verò, quæ delicatius ante candida satis Cuti præditis post diuturniorem in Sole commorationem contigit, quod succi corporis è ductibus consuetis ab externo calore adurentem versus superficiem prolekti, & frequentius per poros cutaneos evaporati eodem dilataverint, & acutiores ejus partes fibrillas quasdam erolerint, atque moleculæ quasdam eorum obscuriores circa easdem hæserint, emendare interdum student remediis quibusdam interius diaphoreticis impunitas istas cutaneas reimoventibus, potissimum verò externis fortitum quamvis absorbentibus, abstergentibus, fibras aliquantulum constringentibus aut relaxantibus, & poros dilatatos particulis quibusdam oleosis replentibus, ut radii luminare non amplius susfoceatur, quapropter delicatis hujusmodi pulchritudini corporis studentibus sua-

dent, ut Solis se subtrahant radiis, aut obectis facie & manibus, si ambulandum sit, iidem occurrant, frequentissime verò umbraticam agant vitam, & membra decolorata sequentibus emundent remediis.

℞. Unguent. rosar. ʒij.

magister. marcasti. ʒj.

ol. ʒ. lign. Rhod. ʒt. vj.

express. succ. Persic. ʒiʒ.

F. Linimentum, quo partes uigredine defædatæ ante introitum lecti probe illinantur.

℞. Mal. Medic. N. j.

scindatur in frustra orbicularia, quæ ad bora natus spatium macerentur in ʒij. vini, super igne cinerum, postea fiat colatura cum levi expressione.

Liquori transcolato adde

Aq. rosar. ʒiʒ.

Album. ov. N. ij.

Agitentur omnia virga beculi, ut rite commiscantur & spumescant, post subsidentiam liquor decantatus servetur ad usum;

quo partes unguento prius illinitæ manè denuò abluantur. Parant etiam linimentum ex magisterio illo marcastiæ cum aqua spermatis ranarum, quo vespertini crocos demigratos obducunt, & manè illud abluunt eadem aqua spermatis ranarum, vel sequenti destillato coinctico egregio.]

℞. Mali Cirrii N. iij.

Limon. N. ij.

in calcas scissis superfund.

lact. vaccin. ʒi. ij.

Sint per noctem in digestionem, postea destillantur per alambicum, cujus rostra imponatur nodulus aliquid camphora, benjoini & storacis, cum granis aliquod ambra continens. Liquor exstillans servetur pro ablutione. Laudant etiam essentiam benjoini, tanquam remedium inter cosmetica minime ultimum existimandum.

Uti cutis à *Furfuribus* mundetur, præter interna sudorem excitando particulis acutis per poros eliminantia, hosque apertos servantia, ut evaporatio recrementorum promoveatur, externa abstergentia, posthæc fibras cuticulares lubricantia admovent, ne tam facile obrigescant, & à particulis acutangulis lædantur. Furfures igitur furfuribus abigere norunt, abstergendo Cutem furfuribus triticeis in sartagine tantillum fixis & adhuc calidis, quibus postmodum decidebitis, simul furfures cutanei delabuntur. Similem instituunt absterfionem decocto herbarum parietariæ, saponariæ, agrimonie, seminis lupinorum, radice cucumeris asinini, aliorumque, post quam ablutionem partem unguento Medicamentoso *Mynichti* inungunt; vel urinâ calidâ, in quâ flores ʒis sunt dissoluti, ejusmodi peragunt ablutiones. Præmissis hæc fibras rigidiore relaxant & emolliunt oleosis, unguento pomato, pulpâ ex amygdalis dulcibus, anaris, semine melonum; papaveris albi contusis, addito spermate ceti, & oleo ligni Rhodi, cujus pulpæ portio in aquis roiarum & hyperici dissolvitur, eaque pars furfurosa inungitur. Oleum etiam laudant amygdalarum amararum, nucum, balauinum, selsamihum, & alia Cutem emollientia.

*Lentiginibus* autem remedia, *Lentiginos* quæ

## CAP. XIV. DE CUT. NIGRED. FURFUR. & NÆVIS. 617

quæ cuticulam penetrantes succos in poris cutaneis coagulatos resolvere, & poros ita disponere possunt, ut alia succorum crementa tam facile non admittant, suadentque propterea, ut maculis hæc tincti longo tempore spiritum mellissæ tum intus usurpent, tum foris adhibeant, lentiginis eo tangendo & abluendo, vel balsamum florum anthos illinant, aut aquâ ari, vel satyrii maculosi, cum aquæ calcis vivæ tertiâ, parte, mistâ, additaque portione camphoræ, aut sequenti aquâ Gallicanâ Epiphani Empirici Rudiosè abluant.

℞. Qi ad albedinem cremati lbj.  
massick.

tragacanthaa. 3℔.

camphor. 3vj.

album. ovor. N. iiii.

Trita & mixta in aquâ rosacâ destillentur.

Commendat quoque liquorem sive aquam destillatam limacum, præsertim quæ cum sale gemmæ paratur, succum bryoniæ, in quo ali- quid ℞ci sit dissolutum, vel sequentem aquam.

℞. Borrac. 3j.

camphor. 3℔.

alum. commun. 3iij.

gum. Arab.

tragacanthaa. 3℔.

sarcocoll.

ass. dulc. aa. 3ij.

ceruss. 3iij.

Omnia bene trita misceantur & infundantur in

aq. serpentar.

flor. lilior. aa. lb℔.

geniſſ.

solan.

nymph. aa. 3iij.

M. destillentur in alembico vitreo.

Quamvis autem optima adhibeantur hujusmodi remedia cosmetica, nõrunt tamen Lentiginis eadem sæpe illudere, quapropter si earum ablatio seriò urgeatur, & adeo non existant numeroſæ, per caustica cuticulam erodunt, & succum coagulatum maculam efficientem destruunt, tangendo nempe lentiginis stilo ligneo acuto spiritu Qis aut Q-li madido bis vel ter in die, donec ulcuscula sint effossa, quæ nihil nisi carnem subrubicundam exhibeant, quod signum est, nihil ulterius de succis istis corruptis superesse, hoc facto ulcuscula ista aq. rosacæ & plantaginis abluant, & adhibito unguento de lapide calaminari, vel tutiâ carnis promovent generationem, ut foveæ deniò adimpleantur, quæ cura ad summum trium septimanarum spatium abſolvetur.

*Ephelides.*

Ad *Ephelides* abigendis utuntur aquâ bryoniæ, cum succo limonum & felle gallinarum, liquore myrrhæ, lacte virginis, & remediis camphoratis, quibus remediis si non cedant, ad vitrioli phlegma, aut mercurialia accedunt, dissolventes sublimati portiunculam in aquâ rosarum, quâ tum maculas attingunt.

*Tarum.*

*Tarum* illinunt oleo tartari, vel albumine ovi, in quo tartarus calcinatus sit dissolutus, vel pulverem seminis crucæ & lupinorum cum succo limonum, & oleo baccarum lauri in lini-

menti formam redigunt, quo maculam hancce iniungunt vespert, & manè aqua rosmarini, vel sigilli Salomonis abluant.

*Nævis* maternos in sætu statim post partum adversos lacte matris recente & calente, vel secundina etiamnum calente, jubent abluere aut detergere, in adultioribus verò præter recensita in prioribus maculis ad fortiora accedunt quandoque erodentia, nævis videlicet existentibus minoribus, quos spiritu Qis aut Q-li attingunt, & eodem modo procedunt, ut in Lentiginibus jam docuerunt, vel illinunt unguento auro. Approbant etiam sequens remedium, quo Nævi sapius tanguntur.

℞. Alcohol. lap. 3j.

Qis subtiliss. trit. 3j.

Superfund. acet. ad supereminentiam duorum digitorum, stent per octiduum & sæpius agitentur, & linteo eodem liquore imbuto nævi illinantur. Oleum myrrhæ per deliquium paratum, & tincturam benzoini etiam commendant.

*Maculis Infantum Volaticis* interna sudorifera convenire dicunt ex aquilegia, funaria, scabiosa, cinnabari ʒij, tinctura tartari antimoniata, maculas verò ipsas abluant aqua omnium florum, liliorum, centaurei minoris, rosarum, in quibus crocus & camphora fuerint dissoluta.

*Maculis Hepaticis* abigendis eadem prodesse censent sudorifera interna antimoniata cum C. C. Philosophicæ pp. & Qe cardui benedicti in aqua fumarie exhibita, posthæc externa abſtergentia, ut cuticula dentis succi vitiosi stagnantes dissolvi, absorberi, & planè auferri possint, quas vires sequens habere dicunt remedium, paucis quidem constant ingredientibus, sed utiliter semper adhibitur.

℞. Aq. flor. sambuc.

hyperic. aa. 3j.

laſſ. ʒiij.

sacch. ʒi 3℔.

camphor. 3℔.

M.

Macula linteo priùs aliquantum fricentur, tum mistura hac bene agitata tepidè illinantur.

§. 19. Præmissis aliorum de *Maculis* hæc opinionibus, nunc & *Nostram* apponamus. In *Cutis Nigredinis Curatione* eò incumbendum est, ut Cutis terſa, candida ac polita seu æqualis evadat, quod obtinemus, si Cutis pori humore benigno, miti, ac velut oleoso impleantur, ita namque, dum meatus omnes pleni ac tensi sunt, totius Cutis planities lævissima ac candida apparet. Ad sanguinis etiam imprimis reflectendum est, hinc varia interna sanguinem depurantia commendamus, inter alia verò pulverem nostrum renovativum ob egregias vires ita à nobis nominatum: Imprimis vero externa conducunt cosmetica, inter quæ ex Talco parata extolluntur, omnia verò asperiora & salina, quæ succum benignum ex Cute exhauriunt, vitanda sunt. Quare si cu uspiam Cute mollissimâ ac planissimâ seu candidâ præditi manus aq. saponatâ, lixiviali, calcariâ, aut etiam sanguine calenti aliquandiu madefient, propterea mox humore salino per sales alios è poris extracto, sulci &

*Nostra methodus curandi Nigredinis.*

rugæ illicò majores & profundiores evadent: quoque feminæ delicatioris lavacra saponata & quævis alia Cutim fulcantia acriora religiosè evitent; Blandiora potius balsamica S. aliphurea alique cosmetica ex Talco parata in u. um vocari possunt, hinc ♡ Talci, ex Talco sæpè calcinato, cum borraçæ, & ♡ lil. alb. vel sigill. Salom. habetur pro præstantissimo cosmetico. Liquor quoque Talci magni æstimatur, de oleo hujus Talci plures præstant descriptiones, verum adhuc cum indulsitriæ quærunt Chymici.

In Cutis Nigredine à primo ortu sequens commendatur aqua, ex fursur. tritic. cum duodecim ovis recentibus cum vino misc. & destilantur. Sic etiam sola ♡ ex albumine ovorum ad duritiem coctorum parata, & Cuti illita à pluribus magni æstimatur. Sequens à Foresto magni penditur.

#### ℞. Porracin

△ rû  
ceruss. aa. 3j.  
camph. in ♡ ros. sol. 3ij.  
pulv. xreos  
fabar aa. 3iib.  
℥ si. fabar.  
rosar.  
fumis terra aa. 3ij.  
F. Mixtura pro lotione.

Sunt quædam divites formosissimi studentes adeo, ut margaritæ alique pretiosæ, solvant, & cuti illinant, Græcæ verò præstantiora sunt, præ omnibus aliis Cosmeticum nostrum commendamus, experientia sæpè comprobatum, ob Empiricos verò non communicandum. Munditiei cutis studentes abstineant à V. S. sæpius instituti, multis purgationibus. hirudinibus. scarificationibus, laboribus vehementioribus, alias incassum tentabunt & optima cosmetica: sed nunc ad alias pergamus Cutis Maculas curandas.

Furfuratio  
tionem.

Furfuratio curatur eodem modo ac Scabies, internis sc. depurativis, sudoriferis ac temperantibus, ut sunt Gnium diaphoreticum, Bezoardicum minerale, cinnabaris Gnii, viperina, Tinctura Gnii Glata, Essent. fumar. lignor. &c. Aliæ quoque calces seu absorbentia omnium optima sunt in cutis affectibus hisce, calces enim hæc licet acido saturatæ, nihilominus tamen magnetes acidi esse non desinunt, temperant enim acida corporibus nostris & præcipuè in externa Cute nocua, quod indubitatis hætenus probatum est exemplis, sunt quippe temperantia potentissima. & continuato usu ut plurimum huic malo medentur.

Externè verò in Furfuribus conducit inter alia liquor ex 9e Cri & myrrha in cella liquefactis, quo pars furfuribus affecta illinatur, & dein cum decocto lupinorum cum urina parato abluatur. Prodest quoque decoctum centaur. minor. ex pisorum brodio paratum, quo lavetur pars furfuracea, inde enim decident fursures. Quidam solo lixivio cum herb. centaur. min. decoct. uti solent, alii illinunt succum scyllæ, & tanquam præstantissimum deprædicant remedium: ~ matricali, vel aqua vitæ, vel aqua Reginæ Hungariæ laventur partes, & sic laterem non lavabam. Multi circule nostrates in malo pertinacissimo Empl. Piccum efficere norunt, quod

vocant tunc Pech-Haubt/ quo Cutem sæpe cum fursuratione tollunt.

Quod *Lentiginum* curationem attinet, *Lentiginum* quamvis illa non tam sanitati, quam Cutis nitorei adversæ sint, attamen formosissimi studentes virgines earum ablationem avidè desiderant, curatu difficillimæ sunt; sed tentari possunt varia extrahentia seu resolvent a, & aliquando Cutis poros constringentia, ne se dem figere commode queant, in quem finem *Agricola* sequens eum expertum laudat,

℞. Sem. sinapi alb. 3ij.  
contund. cum pauco +, ut fiat infus pulvis,  
tunc adde

Θ commun. 3j.  
album. ov. N. j.

M. quo illinantur maculæ in hypocausto calido, & relinque aliquamdiu, dein rursus abluatur aqua sigill. Salom.

Convenit etiam in Lentiginibus ol. ♡ per deliq. vel lixiv. Θ ♡ cum aqua flor. fabar. fact. item ~ vin. canph. ~ matric. Sequens à *C. D.* *Junkin* magni æstimatur.

℞. G. dulc. 3B.  
sacch. 5ss. 3j.  
camphor. gr. xij.  
borrac. 3B.  
magist. marcesc. 3ij.  
aq. sper. mar. ranar.  
f. fabar.  
sigill. Salom.  
ros. aa. q. s. ut fiat infus pulvis, cum

hoc noctu cubitum itur in ungatur facies, manè verò abluatur aqua sigill. Salom. continuetur hoc per 8. dies. Alii commendant pulverem excorticatum amygd. cum pauco oleo Q madefactum, quo illinantur maculæ: sequens verò in aula nostra pro usu receptum est ad sordes quasunque eluendas.

℞. Gnii crud. 1b j.  
pom. citri N. 13.  
ov. N. 8.  
Coq. in aq. pluvialis. & bene agitem, quæ  
mixtura laventur sapissimè Lentiginies.

Vel:

℞. Ol. amygd. dulc. 3B.  
Q per deliq. 3ij.  
M.

Alii Lac Virginis laudant, nonnulli phlegma Θ-li, quidam lac suillium, sequens pluribus profuit.

℞. ♡ cochleis  
limacib. aa. 3j.  
nymph. 3j.  
camph. 3j.  
liq. Q 3ij.  
Tinct. benzoes 3B.  
M.

Sunt

# CAP. XIV. DE CUT. NIGRED. FURFUR. & NÆVIS. 619

Sunt, qui extollunt in Lentiginibus delendis farinam lupinorum cum aceto vel oxymelle subactum & appositum.

Vel:

℞. aq. fl. satyr.  
fabar. aa. ℥ij.  
ol. Œper deliq. ℥ij.  
M.

Vel:

℞. aq. leucoj.,  
figill. Salom. aa. ℥iij.  
cōmet. ℥ij.  
camphor. ʒss.  
ol. Œ. ʒv.  
M.

His nihil iuvantibus ad fortiora accedendum est. Virgo 15. annorum à lentiginibus curata est sequentibus:

℞. mell. opt. ℥ij.  
alum. scissil. ʒij.  
M. & applica vesperti.

℞. phlegm. Œli ℥vij.  
quo facies & artus Lentiginibus conspurcati manè & vesperti abluendi sunt.

Nec his iuvantibus ad corrosiva accedendum est, & proin ꝑ sublimat. ad ʒj. cum aq. rosar. lbijss. misceri potest. & lentigines ea abluantur, hac tamen admonitione, ut cauti his incedamus corrosivis, ne aliæ partes lædantur.

Lentigines sæpe omnia respuunt remedia, imprimis si sint sphacelata, cultro quidem vel corrosivo extirpari queunt, sed cicatrices, quæ relinquantur, sunt sæpè deteriores, quam ipsæ maculæ.

**Ephelid.** Quod verò concernit curam *Ephelidum*, hæc curantur ut aliæ maculæ, internis absorbentibus & temperantibus antimoniacis aliisque superius dictis, & inferius adhuc dicendis remediis sanguinem purificantibus. Externè verò cura *Ephelidum* variis alcalicis Greis & myrrhatis cum Ψ mixtis peragitur. Pro specifico commendant Authores baccharum lauri pulverem, cum melle in linimenti formam redactum, vel alii cum aqua fungorum in formam Epithematis redigunt & illinunt *Ephelidibus*. Liquor Œi & myrrhæ præ aliis nostrâ experientiâ confert. Alii Sulphur calcinatum in aqua solutum commendant, nos Essentiam Benzoes cum momento Camphoræ laudamus, ~ mattrical. Camph. c. aq. figill. Salom. & aq. sperm. ramar. Ψ rosar. &c. optimum erit cutis depurativum.

Si rugæ cutis hisce maculis fuerint conjunctæ conducet albumen ovi cum O in linimentum terendo redactum, & per aliquot dies mane & vesperti applicandum.

**Nævi.** *Nævos* quod attinet, hi curationem etiam possulant: Fæminæ enim, quæ lautissima utuntur fortuna, imprimis in aulis constitutæ, turpitudinem hanc magnis sæpè redimunt sumptibus, ex sequiore enim sexu plures nobis notæ sunt fæminæ pulchritudini maxime studentes, quæ pro qualibet macula deleiâ ducatum obtulerunt,

In his maculis ad externa confugiendum est; pro Specifico commendantur in Maculis his originalibus secundinæ recentè illitæ; sed toties hoc remedium probavimus, nunquam tamen effectum præstitit promissum, quare legi meretur *Observ. 197. Eph. German. Ann. 3.* ubi invenies, quod secundinæ sic illitæ magis noceant, quam prosint, inde enim tumor & inflammatio fuerunt producta. Nos pro secreto commendamus albumen ovi, quod detineatur super igne, donec vesiculæ instar perlarum apparent, quo liquore *Nævi* sæpius de die illinantur, vel seq.

℞. aqua Ψ ʒj.  
ol. Œper deliq. ʒj.  
Tindl. myrrh. ℥iij.  
ciner. clavell. ʒj.  
M.

Vel:

℞. aqua Caryophyllat. ℥ij.  
Ψ ʒi.  
~ Θ \*ci ʒj.  
M.

Quæ Medicamenta cum penicillo Nævo illinantur. Sequens non contemnendum Cl. Muys commendat,

℞. aqua plantag.  
Ψ aa. ʒj.  
ciner. clavell. ʒj.  
M. & utatur. eodem modo.

Cl. D. *Junken*, Medicus Mosbacensis, amicus noster vetus, laudat succum ex viridibus nucum juglandium corticibus exprellum, à quo nigrescet Cutis, quæ separanda, unde *Nævi* minores, ut ille ait, faciliè auferuntur, quod si stigma profundiores egerit radices, cujuscumque etiam sint formæ, nunquam tangantur manu Chirurgicâ, ne exulceratione inducât maior inducatur deformitas, vel in præsentius periculum homo præcipitetur. Idem ad *Nævos* empyreumaticos admodum extollitinctum, matris repetitum. *Nævi* etiam saliva propria illini possunt quotidie; alii scarificant prius partem affectam. camque postea tangunt penicillo butyro Œni imbuto. Cum *Nævi* originales à sætu semanifestantes vix absque excoriatione tolli possint, applicetur ergò sæpius ~ Θ \*ci cum Ψ paratus, quo inuncto fit excoriatio Cutis, quæ dein curatur oleo è vitellis ovorum parato. Adultiores facti turpitudine *Nævorum* commoti aquâ regiâ uti solent loco affecto subtilissimè inuncto, sed aliquando cicatrix redditur turpior, quam ipse *Nævus*. Anglis Cosmeticum sequens in *Nævis* aliisque Cutis Maculis actuberculis solenne est, nostrâ quoque experientia comprobatum, Junioribus ideò Medicis communicandum.

℞. aqua fontan. lbv.  
sem. pap. alb. recent. cantus. lbss.  
f. Emuls. nunc in vitro magno pone ℥iij.  
~ si sæpius loti ʒj.  
album. unius ovi benè conqussatum,  
simul agitentur per horam, tunc add.  
Emuls. papav. cochl. j.  
agit per horam, tunc add.  
liii 2 Cochlear.

*Recheat. ij. emulsionis, & sic deinceps, donec aciculam non omnino singet, per diem & noctem intus dependentem, tunc add.*

*sach. canth. alb.*

*Borrac. albiss. subtiliss.*

*pulv. aa. ʒij.*

*Agita per duas horas, donec nivium candorem conciliat, nihil enim damni adfert. Naviis maculisque aliis & inbercutis illitum.*

*Cura Macularum Volaticarum In sanium.*

Ut in omnibus maculis, sic & in his volaticis Infantum ad sanguinis & succorum purificationem respiciendum est, & quia infantes acido abundant, ad id corrigendum & absorbendum pulveres maxime conducunt, ex Antimonio diaphoret. cinnabar. ocul. ʒ. obor. unicorn. C. C. aliisque bezoarticiis concinnati, præ aliis conveniunt, inter composita, pulverem Anglicum viperinum commendamus ad grana aliquot exhibendum in aqua fumar. vel alio vehiculo convenientiore. Tinctura quoque Antimonii, Essent. fumar. lignor. itidem per vices exhiberi possunt. Externè præter jam dicta in maculis his Volaticis convenit illinitio cum aq. rosar. plantag. in quibus crocus maceratus fuerit, & duplicatis linteaminibus applicandus liquor. Vel ~ Matricialis cum Camphora apponatur.

*Cura Macularum Hepaticarum.*

Cura Macularum Hepaticarum in eo vertitur, ut sanguis ac succi depurentur & corrigantur, ut eo melius stagnatio succorum impediatur, præcipuis internè sequentem commendamus pulverem renovavimus.

*ʒ. ʒiii diaphoret. ʒj.*

*alcol. spinar. viperar. ʒʒ.*

*cinnabar. ʒiij ʒʒ.*

*crystall. mont. ʒj.*

*M. f. pulv. dosis ʒʒ. ad ʒj.*

imprimis hic conveniunt sudorifera blandiora, ex. gr.

*ʒ. Chyl. min. ʒʒ.*

*Diaphoret. ex chyl. ʒj.*

*C. C. phil. pp. ʒʒ.*

*Root. sambuci ʒʒ.*

*▽ cent. min.*

*hyperis. aa. ʒij.*

*M. assumatur cochleatim.*

Sunt qui ad purgantia Olibus admixta accedunt. Alii sanguinis corruptionem sequenti Electuario depurativo corrigere satagunt.

*ʒ. Conserv. rosar.*

*cichor. aa. ʒʒ.*

*rad. cichor. cond. ʒiij.*

*ʒj. ʒ. lat. ʒʒ.*

*pulv. sambuci rubr.*

*citrin. aa. ʒj.*

*ʒ. ʒ. ʒj.*

*M. f. l. a. Conditum, dosis ʒj. ad ʒij.*

*vis in die exhibendum.*

Externè convenit sequens.

*ʒ. liq. ʒ. cum ʒ.*

*myrrh. in cella fus. ʒʒ.*

*succ. plantag. ʒij.*

*aq. chalybeat. ʒj.*

*M.*

Vel:

*ʒ. aq. ʒ. ʒj.*

*f. ʒ. ʒij.*

*ʒ. ʒ. ʒij.*

*M.*

In Maculis his flavis existentibus summo perè juvat sequens.

*ʒ. lat. ʒ. ʒj.*

*camphor. ʒʒ.*

*aq. hyperic. ʒʒ.*

*sol. quercus ʒʒ.*

*M.*

Vel:


*ʒ. ʒ. hyperic. ʒv.*

*ʒ. viv. ʒʒ.*

*M.*

qua Mixtura illinantur macule hepaticæ. Maculæ & foveæ à variolis relictæ optimè etiam iisdem curantur cosmeticiis, quale cosmeticum sibi servat Celeb. Dn. *V. Vilschius*, Serenif. ac Potentissimi Electoris Brandenburgensis Consiliarius ac Archiater dignissimus, Fautor ac Amicus noster colendus. qui dum hæc scribimus Bielefeldæ Serenif. Marchionem Brandenburgensem. *Albertum Fridericum*, variolis laborantem non tantum felicissimè curavit, sed etiam à maculis & foveis quamplurimis, prædicto cosmetico, liberavit. Laudamus etiam in maculis aliis quibuscumque Cosmeticum Anglicum superius descriptum.

FINIS LIBRI QUINTI.



JOH.



JOH. DOLÆI  
ENCYCLOPÆDIÆ  
CHIRURGICÆ  
RATIONALIS.  
LIBER VI.

DE MORBIS ARTUUM, SEU VARIARUM CORPORIS  
PARTIUM, TUM MAGNITUDINEM VITIOSE  
IMMINUENTIBUS, TUM CONTINUITATEM  
DISSOLVENTIBUS.

CAPUT I.  
DE ARIDURA.

§. I.



Nihil sanè in ortu sui perfici, sed spei rudimentum ante perfectionem cernas quotidie, sic ex embryo ne fit infans, puer, adultus, tandem senex, horum individuus comes est corporis quoad tri-  
nam dimensionem extensio, aliàs *Nutritionis* nomine veniens, hac verò cum non gaudeat corpus vel ejusdem Pars, *Atrophia* dicitur, quæ Poëtis mors, item tabida lues, tabidamque malum audit. Quum itaque hanc moriendi sortem omni ætati quàm frequentissimè contingere, variisque insuper modis tot individua tabido hocce corrupti malo videamus, prout Febris hectica, Phthisis ex pulmonum vitio, Atrophia ex Scorbuto, Rachitis Anglorum, Macies puerorum, Tabes dotalis, Marasmus senilis, atque *Aridura partium* hic tractanda, testimonium ferunt sufficientissimum; ideo ultimam hanc speciem, *Ariduram* nempe partium, hic tantùm tractare Nobiscum constituimus, quatenus pertinet ad corporis partes externas, & per consequens ad *Chirurgiam*.

ut sunt membranæ, Tendines atque ossa, quæ potius exsiccantur. Artus ut plurimum contabescunt, observamus enim in praxi sepius ex-  
tenuari solum brachium vel centra, salva reliquorum substantia & mole. Sic non ita pridem observavimus ariduram in pene, item in digito uno & altero, feliciter tamen curatam. Absumpto quippe aliquibus in partibus corido nectare chylolo, nisi citò causa tollatur, malum augeri solet, ita ut adiposæ à defectu oleosarum ac pinguium particularum, dein tendinosæ, ligamentosæ & membranosæ partes chylo & oleo destitutæ imminuantur.

§. 3. *Diagnosis* morborum quorumvis & externorum rectæ curationis clavis est, & quilibet Medicus tantum valet in curando, quantum in cognoscendo: ideoque paucis eam nunc tradere necessitas jubet. Præsens quidem *Aridura Partium* oculos non fugit, ac ex partium coincidentia quilibet haud falsò *Atrophiam* partis concludit. Particularum enim Tabem seu Ariduram facili Marte cognoscimus, quando partem aliquam justò flaccidiorem & minorem, imò aliquando nigriorem, quàm aliàs in statu sano esse solet, deprehendimus, pars enim una atque altera marcescit, reliquis adhuc salvis existentibus, sæpe motus simul perit, & stupor aliquis deprehenditur. Pars enim tabida filo circumligari, & idem filum vel charta alteri sanæ parti applicari potest, unde ex ejus longitudine partis emaciatio & tenuitas explorari potest. Post Paralytin partus alicujus, item post fracturam artus, nec non ex fortiori ligatura ejusmodi Atrophie particulares oboriri queunt, prout toto die in praxi nostrâ quotidianè observamus.

§. 4. Pergendum nunc ad id, quod vel palmarium, vel inter palmaria est, in hoc affectu, nempe ad *causam*, ex cujus accurata cognitione Cura procul dubio dependet. *Vitæ* verò, quibus ratione temporis prioritas debetur, Marcorem membri ab humore putrescente in uente in membrum aliquod deducunt. Sæpe quoque

IIII 3

cupant

*Atrophia.*

*Aridura Partium.*

*Macilentia, Marcor, Macies, Atrophia particularum.*

*Parti affe-  
cto.*

Describitur vulgò, quod sit extenuatio extraordinaria partium externarum, imminutio artuum, ob frustratam nutritionem à pluribus causis oborta.

§. 2. Ut autem in genere quidem Tabi obnoxium sit totum corpus, omnesque illius partes tam solidæ, quam fluidæ, quia ex alimento ac inde facto chylo incrementa capiunt omnes, manifestius tamen & ad sensum consumuntur partes molliores carne & pinguedine investitæ, v. gr. Musculi atque, minus verò partes solidiores,

*Diagnosis Aridura.*

*Causa Atro-  
phicæ  
in admen-  
tum Gaid-  
nicorum.*

culpan't Hepatis intemperiem, unde sanguis non rite paratur & ad membra distribuitur, si vel fuerit inflammatum, vel corruptum, unde musculi à defectu hujus sanguinis ac nutrimenti extenuantur macie. Sic quoque existimant extenuari artus, quando ab articulo luxato preman't arteriæ ac venæ, ut nulla alimenti portio ad membrum conuenire possit. Pluresque alias causas externas ac remotiores allegant.

*Paracelsi.* §. 5. *Paracelsus*, cui *Aridura* membri nihil aliud est, quam transpositio membrorum, & curæ successus pravus, eam oriri dicit, quando per muniam naturæ membra non bene coëant, conueniant ac conjungantur, quodlibet enim membrum siquidem cum alio conuenire debet, idque solum industria Naturæ, non sapientiæ Chirurgi, quapropter ille Naturam vocat Medicam, ac non Chirurgum ipsum dicit Medicum fore vulnerum. Ex glareis aqua vulnerum idem deducit causam *Ariduræ*, inquit enim, cum viscosus liquor ad albumen ovi profluit à vulneribus, indicat accedens periculosissimum, ut membri totius & medullarum exsiccatio, cui nemo poterit obflare, nisi liquor ille iusto pondere fuerit membro profluens aliqua medendi ratione restitutus, alias exsiccat ut lignum ab arbore suâ truncatum; quod accidens Ipsè *Paracelsus* *Aridura* vocatur.

*Helmontii.* §. 6. *Helmontius* in *Aridura* membri existimat aliquando liquorem nutritivum aliò furtim subduci, inò atrophiam hanc oboriri putat ex decepto alimento alicujus membri: equidem retenta juxta ipsum, siue sint transmutata, siue verò transmissa, semper tamen intrinseca insigniuntur idea, ente inquam morbofo, unde sæpe de generationis hostilitate suspiciunt, quare & radix prinari morbi plerumque ipsis adhæret, eandemque idèò æmulantur ac repræsentant, quatenus ipsius sunt producta. Macies ergo omnis nascitur ex elemento substracto, & ut plurimum *Aridura* partium, juxta ipsum, fit à vicio distributivo.

*Walslii.* §. 7. *Walslius* docet, Ar duram induci à sanguine acido factò, vel in eo supra modum exaltatis particulis salino-acidis aut sulphureis summe acerbis, hac enim de causa succus alibilis ex intestinis in cruoris massam appellens, ab ipsa jam depravata rite assimilari nequit, nec idoneus reddi partium nutritivum. Liqueor ergo nutritio sanguinis labem contrahente, & partibus solidis se se non solum nequaquam applicante, verum etiam particulas illarum delibante: ipsæ tum genio suo defraudatæ, tum ab acri illo humore propriis particulis spoliatæ emarescunt, & exarescunt. Liqueor etiam nervosus à tali scaturigine fluens, à natura sua degener existit, crassiorque ac viscidior existens, difficilior per fibras nerveas delabitur, pauciorque copia ad partes appellit, illorumque nutritionem parum promovet. Talem etiam affectum excitant ea omnia, quæ liquoris nutritii magnum inferunt dispendium, vel ejus proventum, uti & spirituum animalium influxum in partem impediunt.

*Sylvii.* §. 8. *Sylvius* particularem *Atrophiam* contingere asserit in determinatis tantum partibus, Artibus præsertim, à vicio ut plurimum sanguinis, aliquando etiam partis affectæ. Sanguinis culpa *Atrophiam* evenire ait, si is deficit in parte aliqua, ut in ineptus est partibus contabescentibus reparandis. Sanguinem ergo deficere dicit

in parte aliqua propter impeditum ejus ad vel in ipsam fluxum, arteriarumque adeò ad ipsam tendentium dissectionem, aut compressionem qualemcumque, ob luxationem ossium, tumores dueros, vincula, &c. corpori continenti, ejusdemque *Partibus* pluribus paucioribusque nutritendis ac reparandis ineptum esse sanguinem ait, propter qualitatem vitiosam, humoresque vitiosos, falsos, viscosos, purulentos, &c. ipsi admittos.

Partium quoque nutriendarum vitio *Atrophiam* accidere arguit, quoties ipsæ à quacumque denum causa & imprimis externa tortuitaque aliquam sunt passæ noxam, ex casu nempe, contusione, vulnere grandi, &c. unde non tantum vasa per ipsas delata rupta sunt aut dissecta, verum carnes ipsæ, ac membranæ, &c. labeſcunt & vitiatæ; quocirca non tantum deficit, verum corrumpitur quoque accedens ipsis alimentum, sanguis. Ab obstructione, compressione, conspatione ac coalescentia *Atrophiam* hanc fieri contendit.

Spicuum animalium transitum & influxum impeditum in partes emaciatas, idem nervorum vel dissectionum, (cujus exemplum etiam habet *Charleto* in sua æconomia animali, exercitat. x. §. 3.) vel compressum vitio ait contingere.

§. 9. *Carsesiani* partem aliquam corporis hu-  
mani *Ariduræ* prehendi & tabescere affirmant, *Carsesiani* *verum*.

quoniam debitum ipsi subtrahatur alimentum. Fieri autem hanc nutrimenti partis substructionem dicunt, non modò quòd illud diversimodè consumatur per diuturniores hæmorrhagias, salivationes, diarrhæas, sudores colliquativos, aliasque succorum extra corpus effusiones, quibuscam materia succo nutritivi destinata simul elabatur; sed quod illud etiam propter canalium occlusionem, compressionem vel destructionem ad partes pertingere nequeat, aut à reliquis quibusdam succi alicujus vitiosi tubulis partis nutriendæ adherentibus corrumpatur, aut antequam ad ipsas istas partes alendas perveniat, jam sit corruptum & ad nutritionem ineptum. Particulas quasdam viscidiores arteriolas obstruere posse credunt, ut aliis aprioribus tranſitis & ad fibras alendas accessus prohibeatur, vincula externa strictiora canales occludere, lympham spissiorum in ductibus suis hærentem vicinos tubulos comprimere, lapsum contusionem, fracturam, & luxationem distorquere, compingere, vulnera & ulcera destrucere, divellere, discedere & erodere, ut sequestrorum canalium extremitates fibrosæ in cincinnos abeant, & meatus eorum obturentur, quibus de causis omnibus liquori nutritivi tranſitus impediatur. Hæc convulsionibus adjungunt & paralyſes, ob quas frequentiores canales distorqueantur aut comprimantur. Acutas quasdam lanceolatas, aut ab utroque latere scindentes particulas, vel nimium angulares, liquorem nutritivum corrumpere existimant, quòd mucronibus & angulis suis partes teretes, anguillares & ramolas chyli divellant, & fibrulis firmius adherentes posteriorum accessum & agglutinationem impendant, sicuti ut plurimum in vulneribus contingat, dum diversi generis ductibus dilaceratis & diruptis sinu corum, lymphaticis nempe, nervosis, tendinosus, sanguis tum venosus, tum arteriosus confundantur, qui in se invicem mediante æthere agentes se se ipsos deltru-

destruant, & dominium tandem capiente lymphæ acidiores, plures ab eo corrodamur canales, ut succi in copiam aliquando effundantur etiam chylosas nutritientes secum auferendo. Succum nutritientem corruptum ad partem deferri referunt, si loco partium chylosarum blandiorum, ramolarum, & teretium diversæ magnitudinis, multæ angulares, cuspidatæ, acicularum instar, sive acidæ & salis ex lympha matla per arteriolarum extremitates ad partem emittantur, quod in scorbuticis frequentius obveniat.

§. 10. Nostro iudicio omnem Tabem jam universalem, quam particularem immediate constituit frustrata Nutritio. Quantum enim ad Nutritionem spectat, scire oportet, primò chylum nostrum constare uniformibus particulis, sed ratione magnitudinis & figuræ valde diversis, utpote ex diversis eduliorum generibus intra stomachum præparatum: dein sciendum est, hæc particulas, ubi per venas lacteas ac ductum thoracicum ad cordis ventriculus pervenerint, in illis porro fermentari, attenuari ac incidere. Perpendendum est, maximam in arteriis dari occasionem illis particulis egrediendi; dum enim sanguis ex ventris culis cordis magno cum impetu erumpens ex spatio angusto & latiori semper debet transire in spatium angustum & minus latum, necessario urgebit & expandet arteriarum tunicas, adeoque & poros earum summopere & ampliabit dilatabitque, per quos facili negotio particule chyli oleosæ & dulces sanguini innatantes, & nondum intente cum ipso mixtæ, capropter ingredi poterunt in singulas partes, per quas sanguis transit. Cum autem illæ particule chylosæ inveniunt poros in corporis nostri partibus, suis figuris & superficiebus accommodatos, illic hærebunt & agglutinantur istis pororum lateribus solâ quiete: hoc igitur modo facile percipimus, quæ particule chyli nutritientes cum nutriendis coherere queant, quare nonnullæ ex his particulis assumentorum potius degenerent in os, aliæ in carnem, aliæ in membranas, aliæ in glandulas, aliæ in pinguedinem, hoc verò non fieri à facultate quadam assimilatrice, notum jam est lippis tonioribusque, quod vocabulum nihil significat, quam chymæram; neque huic satisfaciunt illi, qui statuunt, in chylolattice similem particularum varietatem, quia & nos plerumque & ossa & cartilagineas & carnes assumimus, adeoque has particulas coherere posse cum sui similibus: huic enim responsioni respondere potest experimentum de vacca vel cervo, qui solo vescentes gramine, prædictam partium varietatem nihilominus exhibent. Nec istum rem, meo iudicio, acutè tetigerit, qui statuunt in singulis corporis partibus latitare fermentum quoddam peculiare, quod aptum natum sit alucentes chyli particulas in substantiam convertere similem, ut in poris cartilagineis latet aliud, quam in poris ossium, in his iterum aliud quam in poris membranarum, & sic porro. Sed quibus constat, Machinam nostram ex metis canaliculis constare esse, maioribus, maximis, minoribus, & minimis, facili negotio hæc explicabunt. Nos enim persuasi sumus, opus hoc consistere in eo, prout canaliculi chyli recipientes sunt diversæ magnitudinis vel amplitudinis, liquor crassior recipitur, cum enim chylosæ particule crassiores inveniunt canaliculos ampliores, hinc nutritur *Cere*, si verò canalicu-

los constrictiores & minores transeant chyli particule subtiliores, tunc membranae & cartilago augmentantur: quando verò transeant chyli particule subtilissimæ, tunc ossa nutriuntur, hoc modo unus chylus plures potest nutrire partes; quo enim vasa maiora vel minora sunt, chylus recipitur vel crassior vel subtilior. Duplex ergo statim potest Nutritio, una scilicet, & quidem præcipua, partium fluidarum, altera verò partium stabilium sive solidarum. Inter partium fluidarum, præprimis spirituum animalium restitutio necessaria est; cum enim valde subtiles & ad motum faciles, adeoque sphaeram suam debitam, intra quam moveri possunt, semper quaerunt: hinc inde sentientes per sudatoria cutaneæ, quibus scaturit Cunis innumera, ipsorum quamplurimi auras petunt, & ita præsentia suâ illud defraudant, quod quidem reddunt, quod post diuturniorem aliquando famem animadvertunt homines, qui exinde animo linquntur; subtiliores enim sanguinis particule quæ eundem debite motu & mixtura conservare fideliter solebant, jam dudum avolarunt, contra verò cum partes stabiles & solidæ iuxta se invicem quiescant, per solam enim quietem sunt stabiles.

Quæritur itaque spirituum illorum in corpore nutritio nihil aliud est, nisi continua particularum valde subtilium suppeditatio, ejuſque demum fuerint in oleis particule istæ subtiles. Requiritur itaque ad debitam partium solidarum nutritionem particule tales, quæ leni suâ ramositate & flexibilitate poris partium verè possint accommodari & superficiebus ipsarum applicari, quales sunt blandæ oleosæ, h. e. quæ blande saltem iuxta se invicem repunt: oleosæ dico, nam humidæ cum nimis sint glabres & anguillarum instar lubricæ, eadem, quæ poros irruerunt, facilitate rursus etiam elabuntur, quod sane non requiritur, si aliquid partibus apponere debeat, quietem enim aliquam huc concurrere necessarium est. Acidæ verò particule aquæ, salinæ ac amaræ magis nutritionem, quatenus talem, impediunt, quam juvant, itaque quidem & salinæ, modo non nimis sint acutæ, in tantum etiam aliquid ad nutritionis opus contribunt, quatenus aliis ramosioribus partim inserviunt pro vehiculo, partim ipsi viam præparant ad partium nutriendarum poros ingrediendum, scilicet quæ superficiebus ipsarum applicandû.

Præmissis his, *Atrophia Particularum* causam facile eruere possumus, quæ æquæ ab internâ, quam externâ observatur causa. Ut plurimum præcedentem quandam occasionem externam Tabes hæcæ sequi solet, ob nutrimenti vitium & ejus defectus, sinemque tam sanguis propriè dictus, quam chylus non ritè affluit in partem nutriendam. Ob aliud impedimentum propter arteriæ nempe ad eam tendentis læsionem, & à causâ externa compressionem, vel ex luxatione, vel fracturâ, tumore duro, &c.

Fit ergo *Aridura* vitio tubulorum vel canalium; si nempe fuerint obstructi vel plane rupti ac abscissi, ut per eos liquor chylosus vel nervus emanare ac stagnare nequeat, alias comprimendo & obstructo parti Ariduram inferre potest. Sic in puella nuper hic obiit, quæ in genu defluxionem, ut vocant, sustinuit, Chirurgus verò imperitus acceſſus statim tumorem aperit, ex quo humor stillavit flavus & pau-

*Notæ  
sentia de  
causa  
Atrophie*

cus, remanente tumore, qui Chirurgus nimis audacter eum adhuc semel ferit, efficitque & foramina, sed frustra, tandem resolventibus aliis puelam quidem intra aliquot mensium spatium curavit, remanente Aridura totius Tibiæ, adhuc durante. Affectus hic sæpe oritur à liquore chylifero acore imbuto tenacique, & ad circulationem inepto, canaliculos partis alicujus obstruente, & comprimente vicinos tubulos, hinc succi per eos transire nequeunt. Certum enim est, succum nervum seu *visus* animales ex cerebro fluentes, omnesque ramulos nervos toto in corpore replentes, non modò partium nutrimentum dispensare, ut pars nutrienda ritè suo fungi queat munere, cuiuslibet liquidi enim notum est, spiritus animales esse distributores chyli: Partis enim nutriendæ est succendiculis illis, per pulsionem & motum oblati, fibras suas legitime dilatare, quale & quantum ad sui nutritionem sufficit, dispensare per suos canaliculos. Læduntur verò dictæ Nutritionis operationes in Aridura artuum aut ex culpa spirituum, aut eorundem canalium; spiritus enim peccant vel quantitate vel qualitate: quantitate peccant, ubi insufficientis eorum est copia, & adfertur portio: quod ipsum fit vel ob senectutem nimiam, vel ob cibos acidum vel austerrum ac crassum præbentes chylum, vel ab inedia, aliisque morbis defunctis, imprimis Paralyti, vel evacuationibus nimis. Item quando spiritus animales, etiam si in corpore præsentem, ad alias sæpius vocantur actiones, v. gr. meditationes profundas, curas, mœrores, amores, &c. adeò ut in his nimis occupati & distrahi Nutritionis negotio debita adminicula subtrahant, partesque hæc ratione segnius & insufficienter nutrirî faciant.

Qualitate peccant etiam spiritus animales, ubi particulae ipsi admixtæ sunt salinæ, acidæ ac viscidæ, quæ eorundem motum & vigorem impediunt, & ipsos reddunt torpidiores, imò aliquando ipsos canaliculos nervos lædunt, quales sunt actus scorbuticæ, narcoticæ spirituum velut existeriorum, venenatæ ex fumo arsenici, auripigmenti, ut ita non pridem ex tali fumo instituto Atrophiam hanc particularem in quodam Pharmacutices Studio observavimus. Id quod etiam Metallurgi probant, qui sub quotidiano labore illiusmodi fumos noxios copiosissime atterunt, hinc artuum debilitates, tremores, contræcturæ & imprimis Aridura ipsis obveniunt. Canaliculi omnes, & præcipue ex iis Nervi eorumque fibrillæ inculpantur merito, quando sîdem læsi spiritibus animalibus liberum cursum vel motum denegant, atque hinc eorundem operationes sensum & motum & per consequens ipsam impediunt Nutritionem, & Ariduram partibus inferunt. Notandum porro hic est, non qualemcumque nervorum lesionem statim inducere maciem & abstinentiam, nisi ubi pars pridem omni spirituum animalium influxu prorsus destituta sit. Hinc contingit, membrum Paralyticum motu interdum destitui, superfluit adhuc sensu & nutritione, quæ nutritio tamen plerumque pravitate quandam habet junctam. Læduntur autem Nervi (1.) quando obstruuntur, vel à particulis acidis, austerris, crassis, stipticis eosdem obstruentibus & obstruentibus, vel per vertebraum aliorumque articulorum luxationem, tumorem, cicatricem, aut ulcus vi-

cinum eas prementibus, & sic spiritus animales transcentes suffocantibus: vel quando continuitate solvuntur nervi, ut in vulncribus, fracturis, contusionibus, nec non luxationibus, aliisque stagnationibus succorum acrimia accedit; sæpe etiam ob defectum nutrimenti exsiccantur vasa, quod nutrimentum nunc subtrahitur per nimiam sanguinis & seri evacuationem, v. gr. immodicum synoviae & sanguinis effluxum in faucibus aut ulceribus, per coitum iusto frequentiore, sudores copiosos; nunc ob canaliculos quocumque modo obstructos oritur Aridura. Pertinet huc denique defluxus seu potius stagnatio catarrhalis, quando sc. sine ullâ causâ manifestâ, saltim ob seri evasati decubitus & pressiorem in quandam partem ejusque articulationem, & inde fibrarum ad tendinam, paralyticam flacciditatem, cum sensu doloris obtulo. Fit quoque Aridura membri à dislocatione articuli commentis ligamenta ac nervos, ceu observavit *Hildannus* à dislocatione in coxâ ubi Atrophiam. A gibbo Atrophiam particularem observavimus. Nervorum ergo & fibrarum læsiones causam Tabis particularis aliquando esse, quis negat? Si enim nutrimentum optimum & sufficiens, ejusdem copia per vias destinatas continuo omnibus æquè offertur partibus, & nihilominus pars una atque altera marcescit, reliquis adhuc salvis. Ex his dictis constat, quòd Atrophia particularis oritur vel ex defectu succorum, vel eorum lentore, aut ex eorum acrimoniâ. A defectu, quando sc. vasa seu canaliculi rupti vel corroti, vel ab alia causâ violenta distorti, vel compressi fuerint, hinc crispantur & absque succis in fibras exsiccantur. A lentore seu pigritie succorum oritur Atrophia hæc particularis, quoniam succi circulares crassifunt, & in plures parvos canaliculos intrare nequeunt, ut inde eodem modo collabantur. Ab acrimoniâ succorum, quoniam ab acerbis succis canaliculi hinc inde corroduuntur, qui succi effluent, sique stagnant, & si aperta via est, penitus ex corpore emanant, & tunc hæc vel illa pars iis fraudatur. Sic quoque hic affectus oboritur vicio canaliculorum, quando nempe sunt coacti, vel nimis angusti, vel plane indurati, hinc succi nullus ad partes conceditur transitus, vel si fuerint compressi à variis incumbentibus, hinc ægri ob has causas & per sequentes, sc. per nimios labores, vigilias, jejunia, sitim, mœrores, sudores, nimiam balneationem, violentas purgationes, suctiones infantum, Apoplematia, ulcerationes, fonticulos, V. S. Hæmoptiyn & emarcescunt & patiuntur modò Atrophiam generalem, modò hanc Particularem. Nuper etiam Ariduram brachii observavimus in Lavatrice ex perfrigeratione aquæ frigidissimæ, ubi facta est impedita sanguinis ac succorum reliquorum circulatio. Remotè plures causæ contribuere possunt ad hunc affectum producendum, quas omnes ob nimiam prolixitatem hæc vice recensere supercedemus, & ad Prognosin nos conferimus.

§. II. Quod itaque Ariduræ Particularis Prognosis concernit, sequentia observanda veniunt. Ariduræ Particulares ex nervorum & fibrarum læsione subortæ, plerumque suum reliquo corpori haud impertunt vitium, nec lethales sunt, sed in principio convenientibus relictui possunt recedens: imò eadem soli parti ad mortem usque fixæ inhaerent, reliquis corporis partibus semper salvis, quò major enim causa,

causa, & quò plures simul conjunctæ sunt causæ, eò contumacius & periculosius malum hocce dicendum erit. Affectus hic est Chronicus, & vel paralyficus, vel fracturam sequitur: novimus enim plures, qui membrum aliquod per plures annos emarcidum habuerunt; sæpè etiam partes aridæ motum ac sensum perdunt, hinc etiam hoc laborantes affectu faciliè in apoplexiam labuntur, vel cadunt in motus convulsivos, ob defectum & inde acres fustores spirituum animalium & reliquorum succorum. Generosis enim remediis nil proficientibus, metus est, ne tandem gangræna vel totalis corruptio, Sphacelus nempe, insequatur, ubi in tempore cadaverizata pars auferenda, ne vicinis partibus labem communicet.

Si à luxatione & vulneribus Aridura fuerit, curatu est difficillima, & ferè sæpè optima eludit remedia, sic etiam cum reliquis comparatum est. In Junioribus faciliores sunt curatu Atrophie hæ particularares, quàm in adultis & senibus.

*Diata.*

§. 12. Perpenfa *Prognosi* deducimur nunc ad *Fontem Diateticum*, auxiliis ditiſſimum, utpote cujus solius beneficio sæpè gravissimi tolluntur morbi, & quo sine etiam ut plurimum frustra laborare solent Medici ac Chirurgi. Conſiſtit autem *Diata*, ceu ſæpius dictum est, in legitimâ aſſumendorum, gerendorum & excernendorum concinna adminiſtratione, quoniam ſi illa non ritè obſervantur, cauſæ morborum exiſtunt. *Aër* ergo inter ea primas tenet, quo homo in lucem prodians ſtatim tanquam pabulo vitæ utitur, ſine quo nec homo, nec animal vivere poteſt, ceu hoc probari videmus per antliam noſtram Pneumaticam, in quâ poſita animalia exantlato aëre illico moriuntur, imò, quod mirandum, iſtis vegetabilibus vita ſine aëre perit. *Aër* ergo in Aridurâ debet eſſe temperatus, ſic enim nimis frigidus exiſtit, ſanguinem noſtrum reliquosque ſuccos circulates inſpillat, coagulat & ad motum ineptos reddit, quia aër frigidus in ſe continet multum acidi. Si nimis calidus eſt, anſam dat ad nimis vehementiorem tranſpirationem, quâ ſubtiliſſimæ & volatiliſſimæ particulæ ſanguinis & ſuccorum volant, & reſtans pari modo craſſum, ſpillum ac luſum redditur; præterea omnis calor reddit ſanguinem acriorem, exſiccaturque reliquos corporis noſtri ſuccos: nec hic cum aliis Medicis aërem commendamus humidum, aër enim humidus ſecum fert penetrans frigus, quod catarrhos, vel potiùs obſtructiones valorum lymphaticorum producit, augetque lympham in corpore, per quam ſanguis aquoſior fit, ut in circulatione ſua potiùs impediatur, & ſic motu ſuo fruſtretur. In Atrophia hæc potiſſimum nocet. *Aër* noxiſſimus corroſivoque reſertus acido, vel ab arſenicalibus, ſulphureis, narcoticis aliſque venenatis particulis, vaporibus aut nebulis productus, quia corroſivum acidum ſanguinem circulantem pro gradu acrimoniæ magis vel minus coagulat, & hinc ad Ariduram diſponit, vel eandem incurabilem reddit, hinc eligatur rure aër temperatus, ſi non haberi poteſt, arte corrigatur ſalibus volatilibus, vel ſuſſumigiis aromaticis ac reſinoſis, ut ex ſuccino, bacc. Juniper. gummi. animæ, maſtiche, olivano, &c.

*Cibi* ſunt faciliores digeſtionis, optimi lacteiſque ſucci, ut corpori languido & membris emac-

idis robur & nutrimentum inde accedat, per cibos enim & potum ſucci noſtri, qui per urinam, alvum, ſudorem ac inſenſibilem tranſpirationem quotidie & momentaneò conſumuntur, reſarci debent, ità ut ex 8. libris alimenti aſſumpti quinque per vaſa ſudorifera volent, hinc continua reſtitutio valde eſt neceſſaria. ſi enim particulas per poros corporis continuo egredientes videre poteris, ſemper hominem nebulâ circumdatum aſpicias. *Cibi* quoque elegendi ſunt, qui ab infantia conſueti & ſapori noſtro grati ſunt; guſtu enim deſcimus, cum ab infantia à matribus cum lacte aſſumpto ſæpè deprævetur, ut inde multis præjudiciis occurrat ſinus. Eſto ergo nobis generalis hæc regula, quòd omne id, quod circulantem ſanguinem ac ſuccos in motu ſuo impedit, craſſum, pigrum, luſum ac viſcidum ætremque reddit, ſimulque coagulat, ſummè noxiſſimum exiſtat, hinc tria hæc vitanda ſunt, *Acidum* nempe, *ſaliſſum*, ac *dulce*. Hæc enim viſcoſa, utat ſallem nam maſſæ ſanguineæ optinè inviſcare valeant, vitentur, quia exilia vaſa intarciunt, glutinant, chyli aliorumque ſuccorum tranſitum denegant, ut inde partes corporis, ubi obſtructio facta, tabeſcant; faciliè ergo quilibet eligere poteſt ea, quæ multum ſalis volatilis in ſe continent, uti ſunt omnes carnes, imprimis leporinæ ac cervinæ juniores, vitulinæ ac bovinæ, &c. quæ multum præbent ſalis volatilis; ſic Pharmacopœus quidam ex integro cervo 10. lb. pendente, libras ſex ſalis volatilis more chymico elicit & collegit. Aſſumantur ergo carnes quævis recentes non ſaliæ vel muria conſectæ, vel ſumo indurata, quæ nullum præbent nutrimentum, ſed potiùs ſanguinem ac ſuccos inſpillant. Eligantur hæc & ova recentia, quæ in Atrophia maximi ſunt uſus. Vitentur omnes tranſus acidi, inter fructus verò concedi poſſunt nuges juglandes, avellane, amygdalæ dulces, piſſaciæ, cizæ, pinæ, &c. ſed de his jam ſatis alibi egemus.

*Potus* quoque emaciatis reſicit, ſuccosque noſtros fluidos reddit, ad quod præprimis commendamus potum Ther. cum lacte, vel calidum Capheæ, vel etiam Chocoladæ; in conſuetis concedi poſſunt cereviſiæ, pingues ac temperatæ volatilibus alcalibus imprægnatæ herbis præſtant; alii laudant decoctum hordei cum paſſulis & lign. ſantal. citrin. vinum Gallicum minus acidum, non auſterum, modicè potum conducit, quia ſpiritus animales incitat ad ſores clauſas aperiendas, ubi ſpiritus languent, vinum Hiſpanicum concedi poteſt. Vitanda verò ſunt omnia vina acida, ut ſunt omnia Rhenana, Baccharacenſia, Moſellana; generoſa tamen, quæ dulcedinem præ ſe ferunt, admitti poſſunt, & quidem in conſuetis, quia vina hæc in ſe continent acidum intenſum, quod omnes ſuccos noſtros, qui ſunt lacti vel cremori hordei ſimiles, in corpore noſtro, uti lacti aſſuſa coagulant, & ſic obſtructiones tubulorum pariunt, totamque œconomiam noſtram pervertunt, melius ergo vina conducunt alcalicæ, quale in diſtrictu Hanoviæ Sancti Wilhelmi diſti creſcit, quod vinum m. ximè ſanitati conducit, cum acidum non in tantâ copiâ ac alia vina in ſe contineat; vitandæ verò ſunt omnes potationes & ingurgitationes cuſcuſcunque potus, hæc enim ratione ventriculi tonus & fermentatio deſtruitur, maſſa ſanguinea nimia cruditate accumulatione

Kkk

VITAE



vitiatur, spiritus debilitantur, quid igitur mirum,  
si corpora biborum emarcescant?

Quoad *somnum* ac *vigiliā*; somno æger indulget longiori, & corpus quiescat, nec moribus, curis, maxore, terrore, metu, irā, meditationibus, amore, nimiove Veneris usu enervetur artus. In tubalorum quorumvis nutrimentum vehentium, nec non æreorum obstruccionibus tabificis referendis multum conducit *Morus*, moderatus tamen, non enim sit laboriosus.

*Alvus nec sit nimis adstricta, nec laxa nimis, oblita verò officii sui, quod tabidis solenne est, per blanda solutiva tantum, vel melius spirituosus alcalicis & absorbentibus admoneatur.*

Unout comprehendamus verbo, quæcunque ad nutritionem ritè promovendam sanitatemque tuendam aliis requiruntur, summà operâ tabidis observanda sunt, contraria vitanda. Nutritio enim est vitæ conservandæ medium cum quovis fæctis, illa declinet, ipsa etiam vitæ definit: ratæ enim & ut plurimum fictitiæ sunt illæ abstinentiæ diuturnæ exempla, inòrtaissimæ est historia illa, quam recenset *D. Boissier Abba S. Vincentis de Jacobinâ Nicolet*, quæ intra 35. septimanas nihil comedit & potavit, qualis incidit qui plura exempla desiderat, adeat *Paul. Lentulus* ac *Inedia prodigiis Apollonis & Scireire*. Conferantur etiam *Licetum* de Feriis alitricis animæ, & *Pechinim* de aëris & alimentis defectu.

*Atrophia*  
curan-  
di ratio se-  
cundum  
Galenicos.

§. 13. Datā sic Diætā, restat ut Therapeiam quoque subjungamus, & quidem priusquam sistim aperiamus sententiam, aliorum affectui medic medendi rationem præferemus, inter quos vetustatem *Galenicus* primus conceditur concessus ac locus, vota sua profertendi.

In *Aridum* ergo membra alicujus eo insu-  
dant, ut hepatis interperies corrigitur variis  
hepatitis incum finem internè propinatis, si vero  
Atrophia fuerit ab obliuiscione pituitosa, ma-  
teriam hanc præparant, & dein variis exhibitis  
phlegmæque eam evacuant, dein accedunt ad  
roborantia; quandoque & ex nature, deas-  
trophum partis vitio, & adstrictioribus linteis id  
accidit, ut quasi lidentur, & marcidum mem-  
brum affectum gracilescat. Quandoque etiam ex  
Atrophia partis. Omnia igitur hæc in melius  
commutanda esse ajunt, cum toti corpori pro-  
spiciatur optimis alimentis. In affecto membro  
instaurandum esse vitam jubent, laxandum esse  
deligationem strictiorem, & attrahendum vel  
alio modo eo adigendum esse sanguinem. Lau-  
dant ergo in eum finem dropacæ, linapismos,  
moderatæ aquæ temperatæ perfusionem, ido-  
neas frictions, præterea commodam deligatio-  
nem, sed contrà quàm in Fracturis. Marcescente  
enim tibia, femur superius alligant ab inguine  
ad genu ductâ fasciâ; atque initio quidem ar-  
torem paulatim relaxant, ut à communibus ve-  
nis, quasi rivis, deorsum sanguis exspiratur. Fe-  
more dextro contabescente, vel toto crure, fini-  
stri femori fascias injiciunt, à genu ductis orbi-  
bus, adstrictioris quidem, qui cum desunt in  
inguine, hic etiam ita constringunt, ut parti ali-  
qua sanguinis in gracile membrum derivetur. Eâ  
autem ratione temperant deligationem, ut ne-  
que dolorem creet, neque universum alimen-  
tum à parte incolumi reprimat. Eandem ratio-  
nem servant in superioribus membris. *Gnil.*  
*Fabr. Hydan.* brachii Atrophiam insuflatione

deoſti Caput & inteſtinorum vervecum, vel vituli; & luſione per cucurbitulam corneam arteriis & venis majoribus appoſitam curavit. Hanc Hildani curam ſuâ Experienciâ Tulpus *Obſerv. l. 3. c. 49.* confirmat.

§. 14. *Paracelsus* in *Aridura membrorum* com-  
mendat varias *Vulnerarias* potiones, ex, gr. paracel-  
sum.

R. Flor. spice Mj.

*hypericonis*, Miv.

saxi Mij.

*betonica*.

*Flot. септантика.*

принес. за. МВ

preparata secundum usum de spica  
dictum.

Commendat externè medullam ossium & pinguedines animalium, item medullam humanam ac pinguedinem, item unguenta ex resinis odoratis & balsama varia, ex. gr.

R. Galbani tbi.

*serebinth. lbiii.*

elei Laurini.

olivaceum aa. ℥iij.

**F. olcum**, quo mane vespereque utitur.

Vcl:

*...and the*

*pis vulpis* 32.2

taxi aa. 168.

*mumia de*  
F. Unguentum.

§. 15. *Helmontius in Curatione Aridit. mem-* *Helmon-*  
*bri eo tendit, ut vis distributiva non aberrat, in siccis.*

quem finem laudat internè elementum perlarum  
laeteum, externè adipem & mumiam humanam  
cadaverum violentè mortuorum. Sunt ex se-  
quacibus ejus, qui ad membra confumta & con-  
tubescencia brevi tempore reficienda balneum  
instituit ex foliis falicis, illudque singularibus  
condecorant enomiis.

§. 16. *W*ilfulium *Aridurae membrorum* subvenit  
salfo-acidam sanguinis dyfcrasiam corrigendo,  
fulphurumque acrimoniam temperando, deco-  
ctum lignorum itatim praefcribit, &c. si *Aridura*  
a febris hectica oriatur, passulus lignis adungi ju-  
bet, quippe quae summæ sunt efficacie in hec-  
tica. Perlas & oculos ☉, hoc in casu inter alia  
commendat, pluribusque etiam extollit lactu-  
cam, nymphaeam, endiviam, cichorium, &c.  
Lactis utum in *Aridura* magni facit, æquè ac  
omnia lacticiuia. Topica verò Medicamenta in-  
ternis associat, adeo ut earum opo fibrarum ner-  
vearum obstructions referari possint, quales  
sunt spiritus lumboricorum terrestr. Lavendul. Ju-  
niper. Sal. armon. cum calce vivâ parat. &c. mi-  
næ est quoque virtutis arcanum aluminis cum li-  
nimentis, & pinguedinibus appropriatis appli-  
catum.

§. 15. *Sylvium* particularem *Atrophiam* fieri *Sylvium*.  
 affert in determinatis tantum partibus, *Arbutis*  
 præsertim, eamque ex arteriarum vel nervorum  
 soluta continuitate oriundam incurabilem pro-  
 nunciat: Sin ex arteriarum obstructione cau-  
 sam ducat, ea sublata, eam tolli affert, in quem  
 finem omnia ea medicamenta commendat, quæ  
 non tantum humores glutinosos incidunt, sed &  
 educunt, humorum glutinositatem juxta ipsum  
 corrigunt & emendant, omnia aromatica &  
 sale volatili abundantia, qualia sunt inter ra-  
 dices calam. arom. levistic. galang. §. apertient.  
 pyrethr.

pyrethr. raphan. gentian. zatzaparill. Cortic. Tamarisci, cinam. macis: fol. card. bened. calaminth. meliss. rotisamar. origan. ablynth. scord. petrosel. sacutej. majoran. pimpinell. serpill. sem. anis. fœnicul. carv. cardam. cubeb. gran. paradif. nasturt. eruc. salia volatilia, C. C. urinæ, ☉ ❄ ci singu. hum. olea varia, & quæ sunt talia plura. Ex quibus variz formulæ pro Medici intentione & ægri palato formari possunt, ex. gr.

❧. *∇ meliss.*  
card. bened. 2a. 3i℔.  
vis. Matibol. 3℔.  
~ ☉ ❄ ci gr. xv.  
ol. macis. 3℔℔. gr. iij.  
Syr. s. rad. 3j.

M.

Capiat æger subinde hujus mixturæ cochleare unum vel alterum. Humorem glutinosum quodammodo correctum si abundet, evacuat colocyath. hermodactyl. Mercur. dulc. gum. var. ex. gr.

❧. Gum. sagapen. cum ✚ mund. & infusillat. 3℔.  
trochisc. albandal. 3℔.  
3 dul. gr. xv.

M. F. Pil. N. xv.

Exhibeantur ægro manè.

\*Atrophia quæ arteriarum compressioni, ex tumoribus, luxationibus, & cæteris talibus vitiis adscribitur, iis curatis nutrimentum partibus denuò concedi.

Si ex nervorum compressione ab humore pituitoso circa medullam spinalem vel alibi hærente, præter jam dicta incidentia & attenuantia interna, etiam externa usurpat Cataplasmata, unguenta, linimenta, Emplastra & alia plura, ex. gr.

❧. Ungu. martiat.  
diath. 2a. 3j.  
ol. Philof. 3iij.  
succin. 3j.

M.

Emplastra nervina & ex gummi parata magni facit. §. 18. *Cartesiani* restitutionem alimenti maximam partem curationis *Aridura* sive *Atrophia particularis* existere docent, quam pro causarum varietate diversimodè impetrare student. Defectum enim chyli nutritis supplete aggrediuntur remediis digestionem in ventriculo & distributionem ejusdem succi per venas lacteas promouentibus, ut magna satis copia in massam infuset sanguineam, atque ex eadem omnibus partibus æquè communicetur, qualia existere putant, quæ particulis abundant spirituosius, salinis volatilibus & oleosis, mentham videlicet & ex ea paratam essentiam, nec non essentiam rotisamarini, zedoariz, spiritum salis armoniaci cinamonisatum, tartarum solubilem, aliaque stomachica, præsertim famosum illud specificum stomachicum *Poterii*. Ne verò frustra urgeatur distributio, etiam prospiciunt, ut alimentis facilis digestionis & multum nutritibus debita chyli suppetere copia, quapropter juscula carniū juniorum animalium, & ex lacte parata approbant. Sed quavis in reliquis corporis artubus nulla sentiatur penuria, in certa tamen parte illa nutrimenti contingit defraudatio, eo quod canales & tubuli illius non satis sint dispositi ad transitum particularis nutritis concedendum, operam locant, ut in specie ductus hi particulares referantur, & proinde omnia removeantur

obstacula, quæ succorum influxum possunt inhibere. Crassiores itaque & vilcidiores illas partes sanguini immistas, & atteriolarum extremitates obstruentes attenuant & resolvunt tum internis spirituosius & volatilibus, sudorem excitantibus, & omnes succos fluidiores reddentibus, tum externis poros faciliè penetrantibus, fibras agitantibus, & contentos in canalibus liquores ad motum suscitantibus. Vincula etiam membra nimis stringentia relaxant, fricturas uniant, leniant, & partes luxatas in situm debitum restituant, easdemque ferulis coërcent, ne denuò exidentes vicina vasa & tubulos compriment. Ut autem liquorum motus promoveatur, & canales debite ab eisdem expandantur, lequens vinum medicatum magno exiturum esse dicunt auxilio.

❧. Rad. Levistic. 3iij.  
Angelic. 3j.  
caryophyllat.  
Imperator. 2a. 3iij℔.  
Herb. mentib.

salv.  
origan.  
fol. rotisamar. 2a. M℔.  
rasur. lign. colubr. 3℔.  
flor. cheiri Pi℔.  
bacc. junip. 3iij.  
cardamom. min. 3j.  
cinamon. acut. 3ij.  
❄ ci depurat. 3℔.

F. Species pro Nodulo uni mensuræ vini impendendo.

In Convulsionibus & paralyfi huic morbo præcedens prioribus speciebus adjungunt majoranam, rutam, betonicam, flores lavendulæ, baccas lauri, & tal volatile cornu cervi frequentius exhibent. Promoveant etiam sanguinis & liquoris nutritis in partem influxum remedium externis, ut à debita succorum copia canales compressi sufficienter dilatentur & amplientur, vel distorti in convenientem dispositionem situm, eaque propter haud contemnendas esse affirmant frictiones panno laneo calido, vel foliis & semine urticæ, quibus præmissis partem illam oleis penetrantibus ex castoreo, Philosophorum, erucæ, terræ, terebinthinæ, saponis, vel spirituosius, quale sequens insulam existit, magnum hoc in affectu exhibens commodum.

❧. Herb. abrotan.  
Herb. ruta.  
origan.  
salv.  
sabin.  
menth. Saracen.  
fol. rotisamarin. 2a. M℔.  
flor. chamemill. Roman.  
lavand. vel spic.  
cheiri 2a. Pj.  
Rad. ari 3iij.  
pyrethr. 3j.  
levistic. 3℔.  
bacc. laur.  
junip. 2a. 3iij.  
pip. 3i℔.  
zingib. 3i℔.  
lumbrior. adhuc vivor. 3j.  
formicar. viv. 3℔.  
castor. 3j.  
sophor. 3℔.  
sem. eruc. 3ij.  
Kkkk 2

Debitè

Cartesiani  
coram in-  
ratio Ari-  
dura.

Debitè apparatus affund. Spir. vin. s. q. in vitro ad eminentiam 6. digitorum, stent in loco calido per aliquot dies & noctes, postmodum membrum aridum aliquoties in die calidè liquore hoc illinatur. In defectu hujus infusi aliquando Simpliciores spiritus in usum ducunt, quales sunt Spir. lumbicorum, formicarum, Juniperi, angelicæ, essentia castorei, aqua Anhalidina mirabilis, & similes. Nec unguenta contemnunt, præsertim quando post vulnus vel ulcus magnum & diuturnum plures canales sunt destructi, ut fibræ emollitis, & vicinis tubulis & canalibus liquores majori influant copia, & membrum sufficientibus succis irroretur, quæ de causa sequens unguentum in Ariduris hinc auferendis, & nutritione promovenda summopere deprædicant.

2. Ung. alb. 3viii.  
     arregon.  
     martiat.  
     agripp. 22. 38.  
 Ol. Laurin.  
     Junip. & baccis 22. 38.  
     lign. 38.  
     lumbic.  
     castor.  
     Petra R.  
     spica.  
     hyperic. 22. 3ij.  
 axung. taxi.  
     ursi  
     cani  
     porci  
     mur. mont. 22. 3j.  
     homin. 38.  
     ser. cervin. 3j.  
     pulv. pip. nigr. 3ij.  
     empobr.  
     pyrethr.  
     alum. plumos. 22. 3ij.  
     cera citrin. 3ij.

## M.

Salibus fixioribus refertâ massa sanguinea in scorbuticis volatilia interna & externa scorbutico convenientia in usum ducunt ex cochlearia, nasturtio, armoracia, semine erucæ, sinapi, raphani, non omisso antea internis porosioribus & alcalicis, quibus sales acutiores faciliè adhæreant & ab iis corrigantur, oculis scilicet canerorum, ebores Philosophicè præparato, corallius præparatis, antihæcico Peterii, 3io diaphoretico, nec non arcano duplicato, singulari in hoc affectu remedio. Foris sequens adhiberi potest mixtura spirituosâ & balsamica.

2. Spir. Junip. 3ij.  
     lumbic. 3j.  
     Spir. cochlear. 38.  
     3ci 3ij.  
     Essent. eruc. 38.  
     ol. p. Camemill. Rom. 38.  
     lavendul. gt. viij.  
     terre marin. gt. vj.

## M.

Nec debitas suas hic detrahant laudes balneis & thermis sulphureis & bituminosis, quibus membra arida læpius immergi & foveri volunt iisdem, easque adhuc judicant præstantiores, quæ ex terra proveniunt, multum aluminis plumosi in se continente, ad quarum indolem ac-

cedere videtur fons ille medicatus, ante parvum temporis spatium in Hassia nostra in agro prope Schencklengsfeldiam profluere observatus, cujus usû aliquot jam reconvalescere. Potest tamen harum suppleri defectus aliis quibusdam artificialibus, incoquendo scilicet aquæ communi vel pluviali herbas nervinas, huicque decocto adjungendo sulphur crudum, bitumen & alumen scissile sive plumosum, quod tum pro fotu & balneo salutariter adhibebitur. Spazdrappam nonnunquam imponunt arido membro, ut fibræ non tantum emolliantur, sed ac quoque areatur noxius, ne per poros ingrediat, nec liquores resoluti tam citò exhalescent, qualem sequenti conficiunt ratione.

2. Resin. pini,  
     cera,  
     sevi bircin. 22. 3viii.  
     Dissolvantur super prunis, & immisceantur  
     pulv. sem. hyper. 38.  
     Coquantur invicem, & cola linea Mixtura  
     huic immergatur.

quæ siccata parti tabescenti post fotum & inunctionem commodè imponatur.

§. 19. Perspecta itaque aliorum Cura, operationem dabimus, ut illud etiam, quod Particularem Atrophiam produxit, quantum possibile, auferamus, finemque sic artis, quæ sanitas est, assequamur. Cura ergo, nostre judicio, diminutionis hujus tabescentis restitutionem, median- te nutritione ac quasi regeneratione in carne, pinguedine, &c. præcipit: quod si itaque massa sanguinea orbatâ sit succo nutritio sive chylo à morbis exantatis, ille reparatur cibis, qui in succum ac sanguinem faciliè converti possunt, & multo alcali & sale volatili sunt refecti, ceu jam superius de Diata ad nauseam diximus. Et cum ut plurimum obstructio tubulorum vel à luxationibus, vulneribus, fracturis, contusionibus aliisque compressionibus externis oborta, tolli debeat, quibus enim sublati & curati, & tollitur inde producta Aridura, de horum prædictorum affectuum curatione suo loco agemus. Si ergo ab obstructione nervorum, aliorumque tubulorum à succis crassissimis viscidis ac lutosi oborta, omni studio eò collimandum est, ut hæc auferatur, & si concurrat visciditas ac aciditas, convenienti hoc in casu præ aliis absorbentia sudorifera blandiora ac incidentia, quæ sanguinem cum reliquis succis attenuant, spiritus augent, eosque volatiliores reddunt, sicque obstructionem tubulorum tollunt: conducunt ergo C. C. volat. succin. C. C. volat. oleos. liq. C. C. succin. C. C. succin. imprimis verò spiritus noster Catarticalis, & spiritus C. C. cum C. C. paratus, vel matric. fuliginis, Essent. castor. Zedoar. viperar. lign. aloës, spir. Eboris, lumbic. lil. convall. cochl. urin. formicarum, quæ æquè internè ac externè usurpari possunt, & si acidum coagulans adfuerit intensum, magnetem acidi commendamus, Cinnabarin sc. 3nii & nativ. pulv. spasmod. n. d. specif. cephal. D. M. 3 dulc. in obstructionibus referendis egregium remedium, quod etiam aliis addi potest remediis. In Juniorum gratiam unam & alteram communicabimus formulam.

2. Matricalis 3ij.  
     C. C. volat. oleos. 38.

M. & assumuntur 30. usque ad 60. guttas. Inci-

Incidentia varia interponenda sunt Tartarea, ar-  
moniacalia, & ex herbis atque radicibus aroma-  
ticitis vel formâ vini medicati propinanda, vel  
formâ Essentiz exhibenda.

Dein Cura cò dirigatur, ut promoveatur  
spirituum animalium influxus, tollendo ob-  
structionem, & hinc simul sanguis ac reliqui  
succei, ad partem quo reparatur sufficiens nutri-  
tio pellantur, in specie habenda est ratio, an cum  
solutione continui & effluxu nutrimenti indu-  
cta fuerit Aridura, an verò solâ læsione vel ob-  
structione sine continui solutione, siue hæc à  
vi externâ facta fuerit, siue ab interno lymphæ  
acidæ decubitu, in quem finem acidum abfor-  
bentia interna conducunt, ut oculi &c. Ebur,  
C. C. aliaque corpora terrea, & insipida, quæ  
salium acutorum acrimoniam obtundunt, ut  
corallia, crystall. ment. testæ conchæ, in ditio-  
ribus margaritæ, unicornu, bezoar, &c. ex mi-  
neralibus Sulph. Antihæcticum Poteri, Zinium  
diaphor. Balsamica volatilia oleosa hic apprimè  
profunt, quatenus spirituum animalium influ-  
xum promovent, tubulos obstrictos quoscum-  
que aperiunt, Balsam. noster ævinus, item vo-  
latilis noster contra Atrophiam egregius est,  
quo plures inveteratas sustulimus Ariduras ar-  
tuum. Conveniunt etiam ~ meliss. fl. tuni-  
car. lil. convall. lavendul. rosar. fl. tiliz. salv.  
anthos, siue ex florib. roris marini titulo ∇ Re-  
gin. Hungariz notissimus.

Si particulæ salinæ terrefactæ obstructionem  
tubulorum causantur, & sic Atrophiam indu-  
cunt particularem, in eum finem diuretica lauda-  
mus, quæ simul visciditatem incidunt, ut sunt  
~ ❧ci. succ. liq. ∇ foliat. ~ Juniper.  
lumbri. asell. pil. Terebinth. cum salib. &c.

Purgantia verò quæcunque, ut serè ubivis,  
sic & hic atro notamus carbone, quæ in Aridurâ  
angue pejus fugienda sunt, quia malum po-  
tius augent quam demunt, dum succum nutri-  
tium, aliosque ad nutritionem necessarios eli-  
minant. Sic quoque hic improbamus venese-  
ctionem, quoniam hæmoptoici in ariduram inci-  
dunt, & videmus eos, qui diarrhæa laborant  
diuturnâ, facillè tabescere.

Nec hic Topica varia negligenda, sunt, qui-  
bus solis sæpè malum tollimus, quare protubu-  
lis quoquo modo obstructis rursus aperiendis &  
ampliandis, atque sic in statum ordinarium re-  
vocandis, instituantur frictions cum pannis  
asperis succino sumigatis, vel singulis septimanis  
bis vel ter parti affectæ apponantur 7. aut 8. cu-  
curbitulæ cum flammâ, absque tamen scarifi-  
catione, illæque relinquantur, donec rubescat  
cutis, tunc applicentur varii liquores illinendi  
& infra dicendi. Tulpus Ariduræ nil melius  
esse scribit, quàm ut mediante Cucurbitulâ cor-  
neâ, & per hanc instituto suctu, juxta arteria-  
rum cursum, nutrimentum, ut ille loqui amat,  
rursus attrahatur.

Si cum effluxu nutrimenti aut Synoviz post  
vulnera insignita accidit Aridura, huic profunt  
fotus externi patris aridæ, cum decoctis emol-  
lientibus & nervinis volatilibus ex animalium  
partibus paratis. Sunt, qui partes emacidas  
illinunt pinguedine hominis aut vulpis, lupi,  
canis, faxi vel ardæ, aut castor. vel ranar. lum-  
bricor. Juniperi, apprimè tamen hæc conveniunt  
ol. succini, anthos, spicæ, petræ alb. &c.

Si verò Aridura fuerit ex paralyti, vel à for-

tiori contusione aliaque compressione, postfri-  
ctiones partium dorsum versus instructas lini-  
mentum applicari potest sequens vel simile.

℞. Ol. Laurin.  
ungu. martiaz. aa. ʒi.  
ol. Juniper.  
hyperic. aa. ʒiʒ.  
alumin. plumos. ʒi.  
ol. sabin. dest. ʒij.  
petræ alb. ʒj.

M.

Partes emacidæ cum pannis asperis & calidis  
fricentur sæpius, præsertim in casu, ubi Aridu-  
ræ membri sensus formationis aut stuporis un-  
adscit. ~ lumbricorum etiam, imprimis essen-  
tificat, & cum spiritu formicarum & ❧ci vol-  
lat. vel succin. vel lavendulæ. vel anthos. junctus  
hoc in casu mira præstat, quæ volatilia spirituo-  
sa omnem implent paginam.

In Aridurâ, imprimis in eâ, quæ oritur à ca-  
tarrhali lymphæ effluxu sequens proderit.

℞. Sem. urtic. ʒb.  
rad. aronis  
angel. aa. ʒv.  
piper. long. ʒij.  
affund. bis spir. matricar. lbj.  
add.  
Spir. lumbri.  
urtica aa. ʒi.  
❧ci aromatz. ʒb.  
ol. caryophyll. ʒb.

M. quæ mixtura illinatur partes emacidæ.

Vel:

℞. Infus. arthric. ʒij.  
spir. lumbri.  
formicar. aa. ʒb.  
liq. C. C. succin. ʒij.  
Δ Ψ ʒij.

M.

Vel:

℞. Liq. lumbri. serr. per deliq. in celibano pa-  
rat. ʒij.  
∇ Ψ ʒij.

M.

Vel:

℞. Succ. lumbri. c. ∇ Regin. Hungar. ex-  
press. ʒij.  
ol. de ranis ʒj.

M. & agitentur optimè, quo illinatur pars  
arida.

Ex fotu sequenti plures restituti sunt:

℞. Herb. majoran.  
trifol. fibr.  
salv.  
spic. aa. Mj.  
fl. chamomill.  
melilot. aa. Miʒ.  
sem. cumini.  
farnicul. aa. ʒij.  
❧ci ʒj.  
∇ ʒv.

Dentur incisa ad chart.

Cog. in ∇ communiprestu.

Dein Emplastro de Labdano artubus emaciatis  
imposito curavimus plures, ob partes enim vo-  
latiles gummosas maxime resolvit, sicque ob-  
structiones pertinaces refert, & sic spiritibus  
animalibus transitus rursus conceditur, in quem  
finem alia etiam emplastra ex volatilibus & gum-  
Kkkk 3

mostis parata conducunt, imprimis Nostrum de Theâ. Sic quoque Theriac sulphureæ & nitrosæ conducunt, vel artificiales possunt parari, quæ sæpe magnam præstant emaciatæ opem, in quibus varia animalia, ut canes juniores, item pedes agnorum & vervecum, adfectis formicis, lumbricis, aliisque pluribus sale volatili abundantibus. Balnea enim hæc & fotus idèo juvant, quatenus sc. particulæ quædam volatiles, & dulces ex herbis coctis redundantes communicantur succis per vasa illa partis Atrophici infestæ circulantibus, quo fit, ut obstructions reserentur & nutrimentum cum spiritibus iterum affluere possit. Balnea ergo sunt, seu dictum, ex decocto capitis & pedum vervecis, vel cervi, vel ex herb. origan. majoran. malv. alth. betonic. flor. lil. fol. falicis, salv. rorismar. &c. parata; vel fotus ex ejusmodi herbis concinnatus, ex quo prodeunte vaporem excipiat membrum aridum, quo solo foris plures vidimus curatos, additis nimirum scoris Reguli Znni, vel insituantur suffumigia varia ex succin. ass. forsid. castor. oliban. mastich. & pluribus aliis, quæ sæpius plus præstant, quam unctio & pinguis. His jungendæ sunt frictions cum fumo succini, vel panis asperis institutæ, & calidioribus, vel etiam pelle vulpinâ foveantur. Alii pro fotu utuntur cane, cum sc. ejus vel etiam alius animalis adhuc viventis Thoracem aperiant, eademque retorridam immittunt partem, idque aliquoties repetunt, donec pristinum parti robur & augmentum redierint. Immittunt alii artum emaciatum melleæ coctæ, sive reliquis post coctam cerevisiam (Trebern) sæpiusque reite- rant. Præfectus militaris Dn. du Mont curatus est Aridura Tibiæ laborans applicata sæpe cute vitulina calide applicata. Harimannus com- mendat spiritum mellis singulari modo paratum, atque, mirabili etiam potestate valere in resis- tendis Ariduris aquam flaviasilem, quæ inter aquandum ex oteæ quorum generosorum, postquam biberint, profluere solet, si nempe dili- genter colligatur, & potanda manè & vespere detur, sed de hujus exoptato effectu valde du- bitamus. Melius ergo, cum in primis malum fuerit ab obstructione nervorum aliorumque tubulorum, conveniunt spiritus nervina, ut Balsam. Nervin. m. d. spir. salv. Regia. Hun- gar. vel spir. fl. anth. succinat. alterum nostrum cephalicum; & volat. ❖ci urinof. aliæque sæpius illita. Filix VVurtz arcanum suum Omis aliis unguentis aut pinguedinibus multum com- mendat, quo omnem Ariduram particularem promptissime curari asseverat. Emplustra ex gummatibus, imprimis de Labdano, de Theâ, & omnia, quæ salibus volatilibus prædita sunt, gummatæ verò non in ❖ sed ~ vin. dissolvi de- bent, nec multum ceræ aut resinæ Emplastris addantur, vel ceratum nostrum de Cumino, vel aliud pro picatione in Atrophici membro- rum, ex quacunque causa probatum est. Spi- ritus quoque sequens ad Ariduram egregius est.

❖. Fl. lavendul.

cheiri

fl. hyperic.

lil. convall.

chamomill.

herb. menth.

origan.

Sarracacen.

rorismar.

❖ci. 22. Mij.

Infund. in spir. vin. Gall. stent per mensem indigest. dein colemur cum forti expressione, servetur ad usum, quo ~ membra arida sæpe laventur.

Convenit etiam hic ❖o animale, quod superius in Oesophagi Paralyssi communicavimus. Sic quoque Pedemontanus de Secret. l. 1. p. 38. modum parandi oleum ex cane russo laudat, quo quendam sanavit, qui per 11. annos brachium instar ligni aridum habebat.

Platerus sequens magnificat, quod haud con- temnendi usus est.

❖. Summis. sabim.

Summis. Juniper.

fol. levistie. rec. 22. Mij.

fl. chamomill. P. ij.

gran. Juniper. virid. P. iij.

consis. & consus. add.

ollaurin.

lil. alb. 22. q. s.

acung. porcin. 3j.

❖ vitæ 3ij.

Coq. omnia ad consensionem humiditatis, coletur exprimatque,

adde.

ol. ❖fica 3ij.

pulv. sem. sinapi 3℔.

rad. pyrethri 3ij.

piper long. 3ij.

Cera q. l.

Mf. Unguentum.

Alii sunt, qui succum urticæ membro arido sæpius illunt magni æstimatione. Rarum est exem- plum Tulpi Obs. Med. 49. l. 3. quod Atrophia membri luctu sanata sit. Amuletum è cranio hominis violentâ morte extincti adversus atro- phiam paralyticorum magni æstimatione, Con- trect. Eph. Germ. Decur. II. Ann. 6. Obs. 37.

Est autem alia species Ariduræ sive Atrophie qui dicitur tabes infantæ ac puerorum dicitur Pa- dotrophia cum ventre promisculo, ac duro Cor- poris consumptione lenta, appetitu alimentum aucto, phlogosi post pastum vagæ, calore ves- perino, sudore nocturno & alvo nunc fluida, nunc sicca. Interdum in collo & subauribus propullulant tumores duri, doloris & inflamma- tionis expertes, vel superficiei tenus saltem ac leviter inflammati, qui sensum augentur & raro exulcerantur.

Pædotrophia ex erudo chylo in vasis lacteis & glandulis melaëicis stagnante, ibidemque congesto ac nonnunquam in colli quoque glandulis subsistente, & has manifestè discenden- te.

Pædotrophia iisdem remediis, quibus Rachitis incipiens tollitur, & ventri simul illito un- guento de alth. & martiat. cum oleo laurin. chamomill. & Philopphor. subacto, quod etiam rachiticorum abdomini tumido inungendum est. Si affectus cedere nolit, Millepedum cum vino in mortario tritum succus præderit, per plures dies pueris sub modica exhibitus, qui glandulis quibusvis impactam pituitam resolvit, maxime si ol. adscrophulas Helmont. foris simul colli tumoribus illinatur.

Pædarthrocæ seu spina ventosa, quæ primum tumore duriusculo cuti concolore & parum dolente, circa pedum talos, aut genna, vel etiam in cruribus, manibus, brachiis & aliis Cor-



## CAP. II. DE ULCERIBUS ET FISTULIS. 631

Corporis locis, ipsaque spina dorsu suborto se prodiit, postea ex inflammatione, ibidem cum dolore vehementiore & profundo, junctisque pustulis serum acre fundentibus; quod partem carnosam cum subiecto osse corrodit, febrisque hectica cognoscitur.

Affectus hic est stagnans in ossium cellulis sero viscido & simul acri, quod tandem causticam indolem induit, & vicinas fibras ossicas, ac postea circumpositam carnem absumit, atque ita dolorem, tumorem, inflammationem cum ossis carie & febre hectica infert.

Pædarthroaces remedia interna sunt traumatica & balsamica, nec non humorum acrimoniam temperantia, qualia sunt decocta lignorum cum herbis vulnerariis, Antimon. diaphoret. & ρ, Tinctur. myrrh. balsam. nostr. & c. ut & externa plantarum mundificantium decocta, cum aq. phagaden. dilatis ulceribus sinuosis, infusa linimenta balsam. ea, myrrhâ, camphorâ, oleoque destillato caryophyllorum, imbuta, & Emplastrâ siccantia ac resolventia possit; quod si verò caries major fuerit, hectica aut leucophragmatia supervenient ægrum tandem necat.

### CAPUT II.

#### De Ulceribus & Fistulis.

##### §. I.

UT è quinquaria Chirurgicorum affectuum classe ferè nullus *Ulcerebus*, ita ex *Fistulis* nullum accuratorem considerationem meretur, juxtaque Chirurgum non vulgarem, aut barbitonforem, aut balneatorem, sed dextrum & benè exercitatum, imò ipsum Medicum postulat. Adferunt hoc roborat frequens horum Chirurgastorum ut plurimum impetritæ debitus proventus, nec non difficilis, si non planè impossibilis curatio, unde à vulgaribus *Ulcera* & *Fistulas* ad Divos relata esse, quòd horum ope indigeant, *Perr. Forestus l. 7. Obs. Chir. 16.* existimat memorabiles ad *S. Eligium Guidæ de Cantuariæ*, cum gentilibus remittit, *Chir. magn. tr. 4.* nec non balneatores & Carnifices, qui hæc artem in contemptum Chirurgorum ac Medicorum turpiter sanè exercent. Inò hisce in locis ad fascinum impie confugiant, dicuntque, Cæcodæmonem, modò ministrantibus ejus mancipiis sagis & veneficis, *Ulcera* seu *Fistulas* efficere, ut non ità pridem Cornifex quidam ob *Fistulam* talem curatam, sed infeliciter, ad hoc confugit excusationis asyllum. Sed quàm impie hæc sint dicta, quilibet videt, & omnia hæc ridet, quibus causa & cura *Ulcernum* ritè perspecta ac cognita sunt. Qui Carnifices, non verò Medici, uti quidam existimant, meritò Romæ expulsi fuerit, & adhuc hodierno tempore non in Republicâ benè constitutâ tolerandi essent, qui tantum ad tormentum generis humani artem istam exercent. Ea propter incitat Nos communis hominum salus, ut in *Ulcernum* & *Fistularum* veras causas, signa, & curationem rationalem paulo penitiùs inquirere constituerimus, ut clarè & distinctè absque veneficis appareant.

*Vuln.* *Ulcus* Græci *ulcus* vocant, videturque nomen Latinum à Græco deductum esse, dicitur & *Helcus*, *Huleus*, *Helcolus*. Germani dicunt *ein Geschwür* / oder aliter *Schade*. Statim autem ex jam dictis abundè patet, mihi in præsens rem esse cum *Ulcerebus* continui solutionem ab acris succis stagnantibus, in quibuscumque corporis partibus & tubulos seu canaliculos discendentibus seu corrodentibus factam, & ejusmodi *Ulcera* diversa producentibus. *Ulcus* enim nihil aliud est, quàm solutio unitatis valorum & sæpe eorum osculorum, per quæ, & ex quibus succis, imprimis verò chylous effluit, qui simili modo ad alias manat partes, easque partis mollis pariter ac duræ perurit, corrodit, absumitque substantiam; in quo consistit essentia *Ulceris*.

*Ulcus* differt secundam rupturam & corrosionem vasorum vel majorum vel minorum, item si *Ulcus* occupat vel membranas, vel alias partes five canaliculos, hinc etiam varii effluunt succi. Inter doctrinam *Ulcernum* possunt iure meritoque *Fistula* recenseri, quæ tantum paucis ab *Ulcerebus* differunt; *Fistula* enim dicitur illud *Fistula*, *ulcus*, quod arandis insit fistulosum est, partem, quam occupat, penetrans, corrodensque, & fistulas cavitæ suæ immutans, præsertim muscularum, quæ ut in superiore parte foramen angustum habent, ab inferiore latius, ita hæ ut plurimum os strictum formant, in profunditate in latum extenduntur. *Ulcera* inde Medicis *fistulosa* dicuntur, Spagiricus *Ulcera salis petra*, & *Idiotis divi Quirini foramina audiunt*, Græci *εὐρυγγας* eodem cum Latinis jure, item *τετραγών*; à callo nominant. Germani appellant fistulas *Nöhr* oder *Hohl-Geschwäre* / *Nöhrtrichter*. *Fistula* ergo descendunt, quòd sunt *Ulcera* vetusta *sinuosa*, profunda, in orificiis ut plurimum stricta, in profunditate latiora, cum duræ callosa, in partibus quibuscumque à particulis acris acidis corrosivis, canaliculos maximos perforantibus & discendentibus, atque hinc effluentibus succis oborta. Dantur *Ulcernum* diversæ species. Differentia autem imprimis sumenda est ab excrementis *Ulcernum*, quandoque enim *ulcus* pusalbum, æquale ac minime fecidum excernit, dicitur *Ulcus vulgare*, omnium facillimè sanabile. Ubi verò serosus succus affatim emanat, *ulcus* dicitur *saniosum*, Veteribus rheumaticum, phlegmaticum, vel fistulosum dictum, Germanis *ein fließender / rinnender Schade*. Effluxus hujus copiosus lymphæ dicitur *ichor*, das *Blies-Wasser* / *ulcus*que hoc tam diu insanabile redditur, donec iste effluxus cesset. Ubi autem sordes mixtæ sunt, nempe sanies, aut atrum, lividum, cinereum aut varîe coloratum, crassum ac fœdum, glutinosum & tenaciter ulceri inhærens in eo reperitur excrementum cum fœtore & profunditate, tale *ulcus* dicitur *foetidum*, Veteribus *ulcus melancholicum*, *malignum* & *depascens*. Sic quæcumque depascencia & in profundum ambitumque rodentia *ulcra* à quibusdam vocantur *lupus*, Germanicè *ein freßender Wollf*. Alii tamen per lupum intelligunt *ulcus* quoddam speciemque utpuriimum in carnosa femoris parte sedem ingens, & acerbis cruciatibus affligens, nisi neciter quovide fructum carnis recentis onponent. Alii è contrario sævam inflammationem & narium exulcerationem, quæ aliis *Noli me tangere* appellatur, *lupum* vocant.

*Vlcus phagedanum.* vocant. Sic quoque ejusmodi corrosiva ulcera nuncupantur Phagedana & *Nomodes*, Germanis umb *sich freßender Schade*. Aliis etiam Chironia, à Chirurgo Chirone, aliis dyspepuloica ac Telephia dicuntur, h. e. quæ non duntaxat affectam carnem erodunt, & quasi dentibus devorant excavantque, sed etiam adjacentes & vicinas partes erodendo & exedendo depopulantur. Talem autem inter utrumque esse differentiam volunt, quod nimirum Phagedana sit paulo mitius Nomode, & saltem ambulando (hinc dicitur Foresto ambulatorium ulcus,) & serpendo cutem erodat, sitque species Impetiginis & *Serpiginis*: Nome vero non tantum cutem, sed & carnem excavat. Sed quælo? nonne nomina hæc Tyroem magis confundunt, quam juvant, nauseamque ipsi pariant? Hinc & nos in iisdem nolimus prolixiores esse, sed ad Lexicographos eorum amatores remittimus. Cum autem ulcus cum tumore prædura incipit, ac dein in malignissimum & maxime dolorificum ulcus degenerat, tunc Ulcus dicitur *Cancerosum* seu Cancer exulceratus, de quo suo loco ex professo agemus. Sic quodlibet etiam Ulcus malignum seu virulentum exedens & omnem sanationem respuens *Carcinoma* vocatur. Ulcera particularia etiam suis sortuntur peculiaria nomina, de quibus omnibus in suis capitibus agemus.

*Nome.* Natantur aliquando adhuc alia Ulcera, *Ulcera Verminea* & phthiriasia dicta, variis in locis à vermicibus subcutaneis capillaribus, vulgò *der Haar Wurm*, partes devorantibus; quin & majores vermes in Ulceribus reperiuntur, cum putrida & fetente corruptaque sanie, prout eosdem vermes vidi in milite hujus loci. Ulcus quoque datur cum hypercarcoli sive excrecentia carnis seu luxuriante carne. Sic existit ulcus scorbuticum quod scorbutum comitem habet. Aliud est quod tumorem, aliud quod inflammationem, aliud gangrenam, aliud hydroper excipit. Sic & ulcus cum carie & corruptione ossis interdum conspicitur. Et ita quidè fistulae sunt, sub aliâ tamen atque aliâ differentia, ratione formæ aliæ sunt rectæ, flexuosæ aliæ, nonnullæ unius, aliæ multiplicis sinus, plures breves, multæ aliis penetrantes, vivæ vel mortuæ dicuntur; ratione subjecti quædam nobiles partes, quædam inmobiles occupant, nonnullæ intra musculos desinunt, pars ad articulos & ossa ipsa excurrunt, sæpe ad interiora pertingunt, suumque inde nomen à oculo mutuantur, *carnosæ*, *nervosæ*, *ligamentosæ*, *venosæ*, quasi variæ species dici possunt. Causæ respectu diversitatem etiam inter se alunt, ut causæ ipsæ diversæ sunt, internæ, externæ, benignæ, malignæ, virulentæ, scorbuticæ. Symptomatum intuitu vel cum dolore aliisque symptomatibus stipatæ incedunt, vel sine his; denique ratione materiæ effluentis, deinceps curatu vel faciles vel omnino impossibiles sunt.

*Vlcus cum luxuriantia carnis.*  
*Vlcus scorbuticum.*  
*Vlcus quod alio afficitur.*  
*Vlcus cum cario ossis.*

*Parte affecta.* §. 2. *Subjeetum* quod concernit, Ulcera cum Fistulis commune habent partes machinæ nostræ imprimis molliores omnes, quarum continuum erosioni solvi, & quavis à causa exedi potest, ut difficulter iterum coalescat. Ossa excipi posse, quoniam ad cariem pertinent eò cum vulgo relinquamus. Caro ita non modò propriè dicta miculosa afficitur, sed & glandulosa, fistillæque hæc materia in carnosas partes ex glandulis seu corporis cibus, secundum *Nicolæum Srenonium de glandulis*, ex sanguivehis Fistulis, quas inter

cum sanguine extra glandularum commercia circulat, ex ipsis etiam lymphæ ductibus, quorum rami in carnosas & membranosas partes immediate inferuntur, cum omnibus reliquis canaliculis & tubulis, membranæ, venis, arteriis, vasis lymphaticis, fibris, nervis tendinibus &c. Unam tamen harum partium præ altera magis dispositam esse nemo inficiisbit: ubi præteritum existunt plures canaliculi & vasa lymphatica, ibi enim sunt copiosiores succi, sicque frequentiora Ulcera sunt in inguinibus, abdomine, ano, utero, scroto, perineo, ut hinc inde notata exempla & quotidiana experientia comprobant. Sic quoque sanguis scorbuticus, lue veneræ contaminatus multis scædens particulis acerbis salinis tanquam subiectum caulæ accusari potest.

§. 3. Sequuntur *Signa Diagnostica*, quorum *Diagnosis* narratio videri posset supervacanea, externa siquidem ulcera etiam plebeis & idiotis nota sunt, quoniam vel visu vel olfactu vel tactu deprehenduntur. Nos hæc quidem ulcera etiam certis Medicis imperitis & cognita esse concedimus, sed nosse oportet eorum differentias, quæ curationem maxime variant. Ideoque de istorum ulcerum diagnosi aliquid in medium proferendum, ubi ergo pus apparet ibi ulcus, quod pus est diversum, modo album instar lactis, & crassum instar cremoris lactis, absque odore & fetore, quod optimum habetur, gustu percipitur subacido. Alia ulcera pus flavum, viride, tenue, acre, ac interdum crassum seu spissum exspuunt.

Sunt & *secca Ulcera*, quæ multum negotii faciunt. *Signa & curesse.* cessant Chirurgis, quia ut plurimum reperiuntur in ejusmodi corporibus, quæ ipsam rem in vitam servari nequeunt. Cognoscuntur ejusmodi Ulcera ex siccitate aridâ, nullam digestionem de se præbente, partis squalor & siccitas & quasi quædam rugositas adest, uti & asperitas quædam & durities Ulcerati membri, à perniciatissima obstruktionem canaliculorum proveniente symptomata. Ulcera enim Sphacelata nullum exhibent pus.

Ulcus *Phagedanum* à τὸ φάγειν exedere dictum, quia partes vicinas quasi dentibus comminando devorat: signa ex quibus cognoscitur, sunt sequentia. Ulcera Phagedanica sunt cum Telephiis & Chironiis rebellibus, magna, nullis obedientia Pharmacis, oras habentia duratissimæque; quando enim optima applicantur remedia, in deterius ruunt hæc Ulcera, & magis descendunt sanam carnem cum suis vasis, & ægri adeo vehementem patiuntur dolorem, ut dies noctesque infomnes traduantur; Ulcus denudatum plures angulos & profunditates exhibet, fibræ, venæ ac arteriæ sæpe nudæ in conspectum veniunt, cum metu gangrenæ. Materia quæ effluit nihil aliud est, quam ichor fetidus aut flavum putridum serum. Sæpe erysipelas vel Herpes degenerat in tale ulcus. Ulceris, cui os corruptum subacet, signa hæc sunt; primò materia, quæ effluit, est ipsa instar oleæ pinguedinis, ut plurimum graveolens, aliquando subflavi, interdum viridis coloris, ut plurimum tenuis & fluida ac copiosa effluens, & inde probatur, num os sit corruptum, nempe Chirurgus imponat plumaceolum profunditatis hujus Ulceris, & altero mane exenti plumaceoli pars inferior magis fetet, quàm superior, quod certum signum est, os subiectum esse corruptum. Alii

Alii Chirurgi Emplastrum imponunt, & si hoc altero mane nigritum conspiciatur, de ossis carie non amplius dubitant. Adest 2. carnis Ulceri incumbens mollietas & flacciditas cum spongiosa & fungosa substantia, ejusdem partis livor est modo instar lardi, modo flavi coloris prominet caro. 3. Mali diuturnitas, ad cicatricem enim perducitur nequit, quamdiu os corruptum manet, & quamvis sæpe coalescant labia, postea cum majori incommodo iterum rumpuntur, ceu id quotidie observatur. 4. Est, quod tutissimum, præsentia scilicet ipsius ossis, si nudum conspiciatur & nigrum excoriatum, inæquale, quod & ferro experiri solent Chirurgi, periculosum malum, & non nisi amputatione curatur, est enim sphacelus ossis, ut in carne sphacelus itidem non aliter curatur, quam abscissione, de quibus vide inferius, ubi de *Cariæ ossium* ex professo tractabimus.

*Signa 1. carie Scorbuto.* *Ulcus Scorbuticum* cognoscitur ex signis, quæ scorbuto sunt ut plurimum solennia, primo ergo discipiendum, an parentes hocce malo afflicti fuerint, an æger illis in locis, ubi scorbuto endemicus, ut Belgio, Anglia aliisque locis maritimis vitam degerit, an malo hypochondriaco vel febre quartana, vel alio diuturno laboraverit morbo; inde enim via habetur explanata ad penitentiorem cognitionem, si dolor capitis vel in hoc, vel in illo percipitur loco, & quidem intensus, si æger fuerint somnolenti, vel laborent vertigine, delirio, apoplexia, paralyti, convulsionibus, pyralismo, si simul adit sanguinolentia gingivarum cum sapore intenso halitus, præcordiorum angustia atque difficultate spirandi, & pectoris dolore, tussis, itea, ut pueri jam sese suffocari cum deliquis animo, si in primis viis circa ventriculum percipiunt sæpe dolorem cum nausea, sæpeque vomitu, si abdomen est distentum flatibus, aliquando corripiuntur dysenteria, adhuc percipiunt in artubus dolores vagos arthriticis similes, conspiciuntur maculæ rubræ, purpureæ, aliæque exanthemata in facie, pectoris aliisque corporis partibus. tumor pedum adest cum subsequente sæpe hydrope. Sed quis omnia hæc recensere: in uno hæc, in alio alia apparent phenomena: si caries ossium simul conjuncta est, caro semper in Ulcere luxuriat, ac major puris copia adest, quam Ulceris angustia requirit. Caro enim valde luxuriat & sensibilibus, facile sanguinem stillat. Color hinc in scorbuticis Ulceribus subcæruleus est, cum punctis albis instar lardi, & humor, qui effluit, non est instar albi olei, sed est ichorosus, lutosus & tenax, male olens. Ulceris foetidi seu putridi signa ut attingam, sunt ferè eadem, tumorem enim vel pustulam sequitur: materia intus contenta est, & hæc instar lardi, h. e. tenax, lutosus & maxime loco hærens, in lateribus ic. Ulceris: facile hoc ulcus cocochynicos infestat, h. e. corpus, in quo succi non facis attenuantur vel subtilisunt, vel fluidiores fiunt. Succus ex ulceribus effluens varia quoque à Veteribus sortiti sunt nomina. 1. Pus dicitur, quod nobis est albus & crassiuscula materia bene olens, & nihil aliud est quam conglutatus chylus cremori lactis similis, quæ à Veteribus concocta in Ulceribus habetur materia. 2. Ichorosus sanguis, qui communitur acidum spirat, & gustu deprehenditur salis, & videtur esse serum sanguinis, dicitur *sanies*, & cum permisceatur sanguini, dicitur

tur *pus sanguinolentum*. 3. *Ichor* vocatur tenuis ille humor chyli sulphureus & salis, qui etiam sæpe ex ulceribus effluere solet. 4. *Sordis* dicitur illa materia, quæ lardo similis est, lutosus, spissior, quæ non facile canaliculos carnicos persuadere potest, & lardum repræsentat in Ulceribus difficilioris curationis. 5. *Virus* quod appellatur, est acris, fixidus, tenuis humor, Ulceribus maxime noxius, qui vulnera aperit rodendo & cutem pustulosam reddendo. 6. *Melapium* est oleosus humor, qui ex corruptis ossibus effluit, & instar ossium comminutorum foetet.

*Fistula* dixerunt, ceu superius diximus, tantum profunditate, angustia & diuturnitate ab *Aularum*, Ulceribus, habent enim profundum, fistulosum foramen extrinsecus angustius, latius intrinsecus, cum callosis subinde & duris labiis, intus plures quoque habet canales *Fistula*, qui solum omnes partes explicant, & usque ad superficiem cutis, & valde profunda est *Fistula*, in qua cavitate, tanquam in spelunca comminatur pus, & sensum, & partem emanat, sæpeque coalescit, tunc iterum aperitur; materia quæ effluit etiam in *Fistulis* alba & aliquando vel flava, vel viridis, nonnunquam nigra, interdum albidior, sæpe putrida ac cadaverola, sæpe cum copia materia nonnunquam pauca cum quantitate excreta. Omnes occupant corporis nostri partes, nec ulla pars datur, ubi *Ulcus* vel *Fistula* non produci potest, & pro partis affectu ratione minus vel magis periculosa est *Fistula*; apta enim est quæcumque materia excedens & corrodens vi prædita, in quocunque loco moram necens, siue sanguis restigans, & corruptus, siue alius succus aut sanies sit in contusione, tumoribus, abiectionibus, vulneribus, Ulceribus relicta, ut sinum ad *Fistula* formam excavet. *Fistula* spumosa, aquosa, saniosa materia, subinde virulentam & aliquando cum sibilo ad compressionem eruant, quandoque tamen ferè sicca sunt, varique curationis spe Chirurgum ita plerumque lædant, idque juxta male vel bene institutam dietam, dolor vel nullus vel exiguus adest, nisi pars maxime sensibilis subiat, quia plures fibræ distenduntur, hinc nullus sensus doloris. An simplex, an in plures diducta sinus sit *Fistula*, ex effluentis materie majore vel minore copia colligere est, plura item orificia liquoris injecti habitæ effluxus ratione explicare facile est. Brevem aut alius penetrantem, ut & flexuosam aut rectam stylus prodit intus, qui in flexuosis ex flexili magis materia paratus stylus convenit, aut hujus loco candela cerea substituitur. Veteres ad explorandum, ut dolorem evitarent, variis usi sunt instrumentis. *Galenus* sèta uti voluit: *Hippocrates* aliique recentes caule: *Guido* cum sui temporis Chirurgis petroselinia ut heræ radice *Fistula* altitudinem exploravit. Sed ad quem usum talis apparatus? Explorationes enim has, tanquam periculosas non admittimus. Si *Fistula* in sola carne hæret, quod stylo tangitur molle est, pus exit album, æquale, copiosum: ad nervum quæ pertingit, in profunditate exploratione dolorifica est, pus crassum, oleo haud dissimile exspuit, motumque partis, in quam hic inferitur, lædit, affectis vasibus sanguiferis, sanguis cum pure exit, ex venis quidem crassior, ex arteriis pellucidus magis & aliquali cum saltu & titillatione prosilit. Ubi ad os tendit *Fistula*, durum quid & re-

nitens, & æquale stylo occurrit, dolor, solo periosteo, non omnis abest, sub carie asperum & inæquale est, eoque magis, quo scabies major, pus nigricat, mali odoris & tenue admodum deprehenditur. Num verò Fistula recens aut vetusta sit, continua aut periodica, tempus & res ipsa loquuntur. An callus in orificio solo hæreat, an interiora etiam durior inest, facile distinguitur. Ani fistularum & recti intestini specialia signa videantur superius suo capite.

Veterum  
opinio de  
causa Ul-  
cerum.

§. 4. *Causam Ulcerum* constituunt *Galenici* humores acres erodentes, eosque vel pituitosos, vel biliosos, velleferos, vel atrabilarios. *Causæ Ulcerum*, juxta ipsos, sunt plures externæ, aliæ internæ. Antecedentes sunt cacochymia, vel à toto vel à parte provenientes: externæ causæ rerum nonnaturalium finister usus. Causæ conjunctæ sunt humores acres & erodentes, seu salini, qui uleus excitant, à malâ visceris alicujus diathesi, vel à toto provenientes. Inter causas externas & procatarrhicas numerant Medicamenta corrosiva, adurentia, corpora item fricantia, & intertriginem causantia, item contagium tum Venereum, tum scabiosum, tum pestilens, lepram, &c. Ab Ulceribus tres præcipue humores profluere ajunt, unum subtilem, qui *sanies* dicitur, alium crassum qui *forde*, tertium qui medio modo se habet, & *Pus* vocatur; hinc Ulcera vel *saniosa*, vel *foridâ*, vel *purulenta* indiguntur; quos humores hoc modo fieri asserunt; quod si sc. humores aquosi ad partem confluant, dicitur *sinuosum* Ulcus: si crassi, sordidum; si purulenti, purulentum. Bonum esse dicunt *Pus*, quod est album, læve, æquale, & minime foetidum. Sanies autem dicitur ipsis *Ichor*, aliis *virus*. Ulcera partium etiam fieri asserunt ob mandantis partis affluentiam & humorum copiam, aliquando à partis recipientis potentia attractivâ.

Oïa corrumpi ajunt vel ab *externis* causis, utab aëre nimis frigido vel calido: vel à corpore incidente, contundente, rumpente, Medicamentis acerbis & corrosivis, vel ab apostemate præcedente: vel ab *internâ causâ*, ut sunt humores vitiosi corrosivi, virulenti, siniosi, viscosi, &c. ab humorum quantitate & qualitate peccantium affluxu; unde *Dyspepsia*, *Cacochymia* & *Chiroemia* dicuntur. Juxta ipsos Fluxiones excitant *causa externa*; v. gr. Aër in qualitatibus excedens, cibi & potus mali succi & copiosi, vigilie nimie, somnus longus, motus nimius, cura, sollicitudines, evacuationes consuetæ impedite: *Causa* aliæ sunt quatuor, utpote pars mandans, pars recipiens, humoris fluentis conditio, & via, per quam fit fluxio. Pars mandans humores à se propellit, vel quia potens & valida, vel quia irritata; huc consert via, & partium meatus. Humores autem generari dicunt, vel à pravâ victus ratione, vel ab alicujus visceris nobilioris, vel membri vitio. Partem autem recipientem fluxionis esse causam, vel quia debilis, rara, mollis, vel quia in loco inferiori & patente sita est; humorem fluxionem causare arguunt, quia vel copîa, vel qualitate manifesta, vel malignâ irritat, vel ob fluxibilitatem & pondus; ut in hydropicis: canales autem & via sunt in causâ, eò, quod nimium dilatan-

tur & patent. Et hæc sunt ipsorum causæ fluxus humoralis.

Ulcus *Depascentis* seu *Nomes*, *Phagedenici* seu *Ulcus ambulativum* causa ipsis sunt humores pravi, acres, biliosi, salii, & affectæ partis intemperies calida & siccâ; vel etiam foveatur ab alicujus visceris, aut præcipui membri, simili intemperie, incipiunt sæpius ejusmodi Ulcera post herpetes, seu exurentes pustulas. Causæ sunt illa omnia, quæ calidos, acres, & corrodes humores gignere possunt, uti est aër prætervidus, cibi & potus calidi, ita, Medicamenta acrida, vulnera male sanata, quæque multum degenerant, qualia sæpe evadunt Sclerotorum.

Ulcus *Sordidâ causâ* externam dicunt alimentum pravam, aërem impurum & pestilentem, Medicamenta oleosa; internam verò arguunt pravam & crassum humorem, qui per incalescentiam & fervorem putredinem non parvam noctus est malignitatem; huic à dissipant affecti membri debilitatem.

Ulcus *Sinuosi*, quod angustum orificium, intus verò latum habet ventrem, & interdum cuniculos agit citra duritiem aut callositatem. Causam esse demonstrant à sanie aut puri corrosivo, quod apostema aut abscessus neglectus progeneravit.

Sinuosa hæc Ulcera sæpissimè degenerari in *Fistula*. *Fistulam* obliervant, quæ ipsis nihil aliud est, quam Sinus ulcerosus, angustus, longus & callosus. *Fistula* in modum, per quem humores effluunt.

Fistulam ab eadem causâ, ac Ulceris Sinuosi, deducunt. *Fistula* enim tantum Callo à Sinuoso differt Ulcere. Callum autem in *Fistulis* oboriri consenti erat: & viscidæ materiæ influxu, eum autem potius in sinu orificio, quam in fundo fieri scribunt, cujus ratio ipsis hæc est, quod Natura, ipsum Dealtâ, semper ad curam protrudit excrementa, quæ etiam curis suâ duritie ad calli generationem, non parum contribuit. *Fistulas* enim ex acerbis ac mordacibus humoribus partem mollem exulcerantibus nulli dubitant.

§. 5. *Paracelsi* de Fundamento Ulcerum disserens, ulcus aliquod in corpore præter corrosivâ nullo modo posse fieri statuit, atque, nullum etiam corrosivum extra salium genera reperiri. Inde quorumvis Ulcerum originem ex salibus deducit, non eâ vi quidem, ut sal transmutetur, melius aut pejus reddatur, uti de complexionibus solum arguit. Centuplicatam in corpore salium varietatem existere ait Author, quorum quodque genus peculiare suum Ulcus efficit: ex quorum conditionibus juxta salium existentiam Ulcus pejus fit, aut melius alio. Inde suam formam, conditionem, essentiam ut externa salis sumunt. Sal quod limaturæ ferri permisceatur, ut ille ait, peculiarem suam ferruginem habet: item sal urinæ suam & alumina propriam, &c. quamquam ferrum usum & idem existit, nihilominus transmutationes, quæ per salia sunt, haudquaquam similes, quod in salium conditiones transcant. Et prout unum gustu vehementius est alio, quod à differentiâ percipitur inter Vitriolum, sal commune, sal nitrum, & alumen, quodque peculiarem dolorem infert, ut gustum habet proprium.

Non secus, imò pejus ea efficiere Ulcera dicit, quæ proveniunt ex Realgariis, ut sunt Arseni-

Paracelsi  
opinio de  
causa Ul-  
cerum.

## CAP. II. DE ULCERIBUS ET FISTULIS. 635

Arfenicalia, auripigmenta; usnea, petrea &c. ut ista, pro sui conditione veneni timentia, pungunt, &c. hic etiam ubi produciunt Ulcera, scilicet pelam faciunt. Horum omnium primum fundamentum esse ait, cognoscere totum corpus in huiusmodi salibus constitutum: & quantum externa mineralia comprehendunt, Microscopium tantundem etiam concludere. Ex prædictis fieri Ulcera contendit, non aliis quam super ferrum ferrugo, quod proprium sal confumit. Sic & cuprum, juxta ipsum, suo sale proprio convertitur in æris florem, aut viride æris: non secus in sui consumptionem per salia sua transmutatur corpus. Aliam nonnullorum Ulcerum originem fieri statuit ad hunc modum. Salia quædam subtilia sunt, & liquorosa, quæ per propriam subtilitatem corrumpuntur, eo quod in aliis liquoribus existunt aut separantur postmodum in hunc modum. Vinum integrum & sanum videtur, & in eo sal ejus non percipitur, quia dulce bonumque, nec enim in substantia sua potentissimum: suo tempore post ab eo sal proprium separatur, ac tartarum producit ad latera vasis, quod salacutissimum existit; pariter ratiocinatur Author, in corpore liquorem, qui necessarius est illi, temporis etiam succellu talem in separationem transire: pellis ejus est vas, cui juxta ipsum tartarus adheret, ut in dolio, cum sua differentia tamen, & corpus corrodit. Similiter vinum accescere ait, quia substantia sua separatur ab eo. Nam aliis in corpore liquoribus accidet, qui censipiente variantur, ubi similem in acetositatem incidunt, statim ad eilem corrosivum statuit. Nec est, quod miretur quispiam ob salium in corpore multitudinem, cum id ipsum varietas deinsonstret Ulcerum corporis, in quo generatim omnes elementorum existunt. Latius notat salia corrosiva juxta separationem tartari, nec non acti processum a vino similiter Ulcerum originem esse, quum in suam exaltationem ad hunc modum veniunt: & prout unum diutius altero vinum conservatur, & acutus existit, in corpore salia juxta ipsum haud ablimilem differentiam habent. Nihil enim præter corrosivum in corpore existere posse arguit, quod ulcus forare possit, aut corrosivum esse posse, quod sal non sit. Omnia Ulcera dicit Author mineralia esse, uti se terra corpus est mineralium; accidere enim ait, ut uno in loco reperitur aluminosus, vitriolatus quidem in alio, salita similiter in tertio, quarto vero nihil, &c. Sic etiam contingere in corpore asserit. Ex hisse Noster omnia deducit Ulcera tum interna, tum externa, & non ab humoribus, ut Galenicis fecere. Sal etiam urinæ varia producere Ulcera Author arguit, per urinæ enim viam prout in Cambucâ similibusque, sal istud cum urinâ simul, ut acetum cum vino bibitur, effluere debere testatur. Quum tamen in separationem transit, inde mox centrum sequitur, post eruptio manifestatioque foraminis, quod ad mentem ipsius pro conditione sui salis formam habet. Simili processu cognosci posse ait salia hæc omnia, quæ ex saluo vero corpore profluunt, quæque plura sunt, sub fundamento comprehensa tamen omnia, prout ipse Cambuca continet. De coloribus, qui videntur Ulceribus accidere, solum ex salibus, & quibus oriuntur omnes, procedere pariter & formas vult. Ubicunque sal non fuerit, ibidem juxta ipsum

& color nullus, & in extractione proprietatum salis colores sunt manifesti; sic etiam ex forma varia curantur; idque juxta species: CrySTALLUM in angulos cudit aliud nihil, quam sui salis proprietates; quod citrinus lapis aliam formam habeat, alterius est sui salis causa: sal aliud in Sapphiro, quàm in Granato latere dicit: similiter juxta cum aluminis est alia forma, quam Vitrioli. Salis communis formas varias esse arguit, unam quidem aqueam, cotis instar aliam, granulatam quandam, &c. Sic etiam Ulcera corporis apparere vult longum unum, latum aliud, angulare hoc, rotundum illud, quod salium suorum, ut cuiusque, quæque proprietates, efficit.

*Fistularum* originem pariformiter ac Ulcerum exsurgere contendit, ut, quum alumina simul una cum nutrimentis aliquo loco resolvuntur, hæc juxta cum sum locum includunt appetant, h. e. putreficiant, & non corrodant: estque dulce quoddam alumen earum. In Lacertis cas primùm oriri asserit, tum in juncturis arterias inter aut ligamenta. Postquam oculum ejusmodi putrefactionem fecerint, ante in latum extenderint, spiraculum sibi parare non alia de causa dicit, quàm ad respirationem. Ob debilitatem istius aluminis corrodi entem non posse assererat. Fistulas etiam ex omnibus Vulneribus & Ulceribus nasci posse haud dubitat.

Hujus generis alia multa foramina fieri in corpore statuit, quæ minora sunt extrinsecus, quàm intrinsecus. Istorum esse conditionem ait dolores non inferre, sed prout aluminis dulcis est natura, semper humiditatem emittere, vel in aquam resolvit, sic & Fistularum conditionem esse ait, spumam, aquam & sanie emicere: ubi tamen glaci non fuerit alumen, aut ejus acuitas mortificata, nam per illud dicit Fistulam cavernosum ulcus efficiere. Cum Fistula, (pergit Author,) perseverat in exaltatione sua, manet quousque morbus ad camelus accedat: nam juxta ipsum ex Fistula mors nulla producit. Latius in alumine considerat, id quod plumosum dicitur, sæpius manifestari, de quo mirabiles admodum conditiones oriri asserit, ut sunt scrophulæ, formicæ, & id genus alia, quæ omnia produci ait ex alumine plumoso, quod quum separatur, tria, quatuor, quinque, vel plura centra facit, ulquo in centum vel ducenta, hunc in modum: Quoties gutta separatur, toties ea coagulatur, & hæc duritie circum se corrodit in foraminis productionem: & ubi multæ guttæ resolvuntur, juxta Authorem multa pariter foramina sunt, nodi glandesve donec incidunt. Quandoque mitigari scribit per aluminis dulcis accessum, ut sua foramina dolores non ita vehementes inferant, ac per se nonnunquam ab arsenico malitiam suam adauctam habere notat, quæ perit efficitur, quàm alia existeret. Hujusmodi plumosi conditio, quum incipit oriri, duplici vi manifestatur: Priore, nodis ac duris glandibus præmissis, ex quibus juxta Authorem sunt Scrophulæ, nec non id genus Ulcera multa, quæ sub Scrophulis omnia comprehendit; posteriore, pruritus & ulsionibus primùm aggredditur, ex quibus non adeo magna vel profunda fieri Ulcera asserit, sed peiora satis & acutiora juxta mixtionis incidentiam, scilicet multo minusve manifestare possunt.



Notat insuper fœtorem, profunditatem, vernices & similia, quæ occurrunt in similibus occasione carnis fieri, quæ conditionis illius existit, ut istorum facillè generationem admittat. In carne vernices quandoque nasci arguit, quando putrefactio nimiam in resolutionem tendit, ut, in fœtore transeat. Pariter sicut Gangrænâ, quod Ulcus appareat causam esse putat, qui bonum atque malum accidentia sua recipiunt.

*Helmensis  
ratiocini-  
um de  
causa Ul-  
cerum.*

§. 6. *Helm.* in Ulcerum causam occasionalem & radicem eorum esse ait fermentum quoddam seminale, delecterium atque virus proprium contagiosum susceptum, partisque fundo ac labris seu oris (non cavitati) impressum & insitum, ejusque Artheo exoticum, carnis & cruoris boni corruptivum. Pariter quoque Ulcera fieri asserit vel à vulnere malè curato, vel à contusione, vel ab apostemate erumpente, vel tandem à veneno intus genito, quod sui malignitatem plantat in externâ parte, ibique fermenti sui virulenti proprietates fixit. Unde quoque juxta ipsum, quicquid cruoris alendæ parti in horas distribuitur, id totum in virus vertitur juxta fermenti sui prospiciam. Author valdè insurgit contra Galenicis, eosque ridet; & saniem ac pus non ut illi, dicit Ulceris aut partis excrementa, ut neque digestionis naturalis sed esse ait producta sciminum sive radicum Ulceris, statimque in Ulcere habitare proprium corruptorem, qui cruorem alimentarium vitiat, antequam digeri sit aptus. Degenerari arguit ille & transmutari cruorem in radice partis, qui corruptor locatur residetque, non autem in ipsa Ulceris cavitatè, sive alveo, alioque namque necesse esset, merum atque innoxium cruorem decidere semper in ipsam Ulceris cavitatem, atque ibidem corruptum de degenerare, quod oculos & quotidianâ ipsius experientia falsum asserunt. Radicem ejusvis Ulceris esse in fundo & labris, sive margine, nullus dubitat, i. e. partis cavitati finitinis habitat, quibus nempe sua est coquina, quæ cruor alteratur in corrolivam sanicem, pus, &c. sanies verò ipsa est illi productum, sive effectus positivus Ulcerum, ipsa autem cavitatis ejus, quæ Vulgo medentium ulcus estimatur, est productum privativum, atque deficient. In oris Ulceris enim circumhabitare statuit hostilem corruptorem & hospitem fermentum virulentum, ad quod cernit oras atque fundum diversimodè alterata. Enim verò majora Ulcera pure carere asserit, saniem dumtaxat plorare ait continuam, & subinde decuplo plurius, quàm juxta alioqui cruoris distributio requirit, atque in aquis acres, atque depascentes transmutatum ichorem diffundere putat. Etenim ut acor, ad mentem ipsius, in stomacho est gratus & ordinarius sapor: sic extra stomachum, omnis aciditas est præter naturam & hostilis, hinc quoque corrosioem in Ulceribus ab acido deducit. Author cum Paracelsoto species Ulcerum statuit, quorû talia, quia fundunt synoviam continuam falsam. In Ulceribus rodentibus ac putrescentibus colores prodire ex acido primum concepit. Dolet enim, inquit, anima sensitiva primum, quæ tandem assuetâ, minus exardescit, perinde ut insuetus equus calcarea recusat. Dolorem quandoque in Ulcere ex sola motaque indignatione æstare memorat. Inò Ulcera sanguinem mutare sæpe in aquam purgentem consentit.

*Fistulas* quoque Author à latice corrupto ac aciescente, partes corrodente, ac exedente, produci asserit, & easdem ac Ulcerum causas accusat, differentiamque solum in diversitate salis consistere dicit, qui in Ulceribus nondum illum malignitatis gradum obtinet, juxta quem corporis partes à Fistulis profundius eroduntur, finusque callosos ob cruorem infectum produciunt.

§. 7. Juxta *Villisi* effectum Ulcus generatur ex humore seroso acido salis & glutinosiori, qui in parte quadam laxioris texture moram faciens, acrimoniâ suâ fibras ejus diffecat & discindit, valorumque sanguineorum, è quibus exstillat sanguis, crodens. Cruor in fovam jam excavatam delapsus, in eo stagnat ac remoratur, atque effervesceat, tunc verò volatiliores illius particulæ majorem assecutæ motum ab aliis deficiunt, & exhalantur, salis autem terræque particulæ elevantur, summoque jure potientes, & cum crassioribus sulphureis superfluis mixtæ, atque ab aquosis particulis residuis diluatæ, materiam eximiam acrimoniâ præditam constituunt, quæ partis, in quâ nidulatur, substantiam perpetuò exedens, ampliores semper sibi foveas excavat. Generatur etiam ad mentem Authoris à sanguine in parte quâdam remorante ac putrescente, & acrimoniâ, quam in ebullitione assequitur, partis substantiam erodente.

*Villisi* asserit *Fistulam* fieri ab Abscessu vel Ulcere diuturnioribus, in quibus particulæ ob moram singularem assecutæ acrescunt, & acutiores atque robustiores fiunt, nec à spiritibus, sulphureis subtilioribus particulis jam evaporatis amplius cohibetæ, & continuo motu domatæ, in partem, in quâ continentur, altius sese infnuant, fibrasque sibi circumpositas perpetim erodentes ac discantes, profundiores indefinitè agunt cuniculos. Quam verò fibræ quædam firmioris sint texture, quàm aliæ, materiæque purulentæ vim declinare valeant, pus recto semper non incedit tramite, sed flexus agere cogitur: paries vero *Fistulam* obducens sic exco, quòd viscida illa portio puris falsæ & corrodentes particulas comprehendens fibræ tum carneis tum nerveis exilis applicata, illis adherescit, earumque officia obturat, succus utritius per illas fluens in ipsarum termino remoratur, & à succo nerveo adveniente in earum substantiam convertitur, atque in substantiam semicarilagineam commutatur, ab admixtione succi nervei fibras nervosas nutriende, cum liquore sanguinis alibili commixto.

§. 8. *Sylvius* Ulcera plerique aut consequi vulnera ait, aut excoarctionem circa tertium diem, quando sanguis in pus incipit mutari, aut per se habere ortum dicit ab humoribus acerbis partes molles rodentibus, atque in Ulcus vertentibus. Humores esse ait ferè salios, muraticos vel acidios, à quibus partium superficies, sive cuticula primùm corroditur, ac consumi solet, mox & pars subiecta similiter exedit, quam partis exelæ apertionem *Ulcus* vocat, in quo sanguis è ad nutritionem delatus in pus corrumpitur, semper ad albedinem vergens, nisi mali moris reddatur Ulcus, vel ab errore aliquo in rebus non naturalibus vel Medicamentis commisso illud alteretur ac mutetur. Sic exemplum allegat, quòd pus prius albicans à sulphureis Medicamentis immixto nigricabit. Pleraque Ulcera post cuticulæ corruptionem ac scellum,

novæ

novæ ortum impedire ait, quia continuè in latum vel profundum ferpunt, subjectasque partes consumunt. Ulcera ergo pleraque & ferè omnia deducit Auctor ab *acido-aeri*, non obstante quod plures sint, qui id negant, propter Ulcera tùm à cau-eris potentialibus producta, tùm Gangrænâ sequentia. Sed reperit Auctor, Ulcera per se à dictis Cauteriis salinis lixivis haud produci, sed ab acido in corpore existente, atque ad partes cauterio uistas, vel Gangrænâ corruptas accedente, atque salum lixivum superante: nam si hoc non fiat, nulla fiet partis sanæ ab emortuâ separatio, nulla puris generatio, quin nullum Ulcus. Postquam juxta eum non prius ibi apparet Ulcus, quam & quousque contingit partis utriusque vivæ ac mortuæ separatio: succedente illi separationi Ulcere in parte vivâ, dum mortuâ vel in pus corrumpitur vel reseratur.

*Fistula* in corpore humano ovenientes pariter ut Ulcera ab acido-aeri in parte quâdam collecto, eamque excavante originem sumere contendit.

*Cartesiani* oriri dicunt Ulcera ex erosione fibrarum, tubulos & canaliculos constituentium, factâ à particulis succorum quorundam acutissimis, ab æthere fortis comotis, & transitum non repertibus, quapropter in v. cinas illas fibras vehementius agentibus. easque dirumpentibus, disicindentibus, dissecantibus & perterebantibus. Prohiberi verò succis tranlitum asserunt, quoniam tubuli ab aliis quibusdam incrassatis jam sint obstructi, quorum particulæ cum variis existent generis, volatiliores & tenuiores, utpote ad motum proniores, per poros avolent, acutiores verò iis viciniore impetuosi in fibras pellantur, quibus diruptis, contenti in ductibus diversiliquores effundantur, & inter se ordinatè mixti, purulentiam exhibeant materiam, quem chylum dicunt ab aliis ei junctis succis corruptum & impurum redditum, unde varios quandoque exhibeat colores, odores, sapores, pro diversitate succorum illorum chylis se immiscendum. Dare etiam sæpius destructioni & observationi illi canaliculorum occasionem vulnera, contusiones, ambustiones, inflammationes & inde notos abscessus unanimiter affirmant, à quibus cum liquoribus consuetus inhibeat transfluxus, hi diutius in fossis aut ductibus commorantes à priori suo desileant genio, & ob separatas à reliquis particulas acutiores, & sibi invicem copiosius conjunctas, erodentes & dilacerantes reddantur. Chylum quoque istum corruptum nonnunquam abluunt omnibus particulis volatilibus ita inspissari norunt, ut materiam lardi, aut sebi similem exhibeat. Eum verò succorū congeriem, quæ particulis abundat acutioribus, tam profunde aliquando musculis penetrare recentem, ut in ipsa agat ossa, easque perterebando cariem producat, in Ulceribus quibusdam profundioribus observabilem. Adhæc si contingat, ut unus vel alter pediculus, vel alius quidam vermiculus à capite, vel aliunde, etiam ab alio quodam homine ex improviso ulcus ingreditur, & in eo, tanquam nido, ovula ponat, ex quibus alii excludantur vermiculi, ulcus produci dicunt verminosum, vel cum Phthiriali conjunctum, quo ægri quidam miserè aliquando fuerint excruciat.

Juxta multiorum longitudinem, latitudi-

nem aut profunditatem, si à liquoribus istis, particulis gladiolatis acutis disicindentibus retertis, altior fiat erosio & excavatio, & ex destructis canalibus aut tubulis effluentes succi à liquorum istorum particulis parietes Ulceris fortius verberantibus undique versus eodem compingantur, & in quiete diutius detineantur, *Fistula* emergere docent, quæ modo speluncam referant, si una cavitas effodiatur amplior, modo antra quædam cunicularia, dum plures hinc inde elaborantur. Fieri enim sibi perlixa dent, ut plurimis tubulis & canalibus ita destructis succi magna in copâ effusi nullum reperiant effluxum, sed intra cavitatem istam detineantur, quorum activæ particule sese cum aliis dominiū gerentibus commiscant, crassiores verò ab iisdem à consorcio suo detineantur, quæ circa latera Ulceris hærentes tubulos obturent, & intercedente quiete in scirrhosam occalescant duriem.

§. 10. Uti æterna veritas est, quod nulla ex-*causa* ulceratio sit absque aliquali tumore, ita quoque *causa* firma est regula, quod nullus tumor absque ob-*causa*structione esse possit. Ulceratio ergo oritur, nostro iudicio, à tumore, tumor ab obstructione, obstructio fit ab hoc vel illo stagnante, & ab acido impulato succo, quæ spississimo & viscidatissimo succorum est quoque varia, & pro quorum varietate varii oboriuntur tumores, & juxta horum varietatem & diversâ producuntur Ulcera. Sic & Inflammatio est diversâ, est enim major vel minor, hanc vel illam occupans partem, producit vel à causa externa vel internâ, juxta horum diversitatem tot diversâ generantur Ulcera. Sic quoque gangræna ex diversis producit causis, & juxta hæc diversitatem major vel minor est gangræna, & per consequens inde producta Ulcera diversâ oriuntur. Sic & à vulneribus male curatis, Ulcera generari solent. E enim differentia tumoris & Ulceris in eo consistit, quod tumor id est, quod tantum in tubulis suis conclusum lateat, h. e. tunc dicitur tumor partis, quando materia adhuc in subtilissimis vauclis conclusa maneat stagnetque, & cum ea non effluit, nondum dici potest Ulcus, hinc Ulcus præsens dicitur, quando vas à contenta materia discissa ac rupta seu corrola fuerint, & quod illa pro diversitate materię & modo operandi, diversâ sunt. Ulcerum causa ergo primaria certè est acrimonia salium quorumvis, & tota sæpe massa sanguinea, & exinde profluentes reliqui succi, hisce salibus silvestribus, acris, corrolivis, arsenicalibus, mercurialibus, & quo nomine illa insignire velis, perinde est, reterti sunt, qui perfringendo, corrodo, disicindendo canaliculos viam sibi ad exitum parantes, quæ facta via ulcus produciunt. Manentibus enim vasculis seu canaliculis integris, nullus succus effluit, hinc etiam nullum ulcus, sed potius tumor produci potest: in cauteris quidem rumpuntur aliquando tubuli, sed liquor emanans non valde acris stagnat tantum inter musculos vel cutem, sed materia ulcus excitans acrior & lixivior est, eosque instar lapidis infernalis aliusque cauterii perforat, corroditque omnes, quos aluit, tubulos, unde flavus vel albus, vel dulcis, vel salius aut tenais, vel crassus luccus, qui vulgò pus dicitur, provenit. Unde vero color ille oratur, facile concipere possumus, cum necessitati is succus ex certis canalibus fluere debet, notum

enim est totum hominem constare ex meris tubulis & canaliculis, & quod alia vasa sint arteriosa, alia venosa, alia lymphatica, alia adiposa, alia nervosa, & quæ adhuc plura alia sunt. Ex his vasis mixtæ & variæ, ordine tamen, inter se intertextis, componuntur omnes corpora nostri partes. Ex hisce luce meridianâ clarius apparet, quod pus in Ulceribus ex certis canaliculis effluit, ex quibus effluere nequit, nisi sint rupti, aut corrolati, aut discissi, sanguis enim effluere non potest ex suis vasis arteriosis vel venosis, nisi vasa illa fuerint vel discissa vel corrolata, vel alio modo rupta, & asterisco notandum est, quod omnia vasa inter se contexta sint, quibus ruptis succi inter se immiscentur, ex quibus diversitas puris producit, quod non semper ex puro sanguine, uti Veteres, nec ex puro semper chylo, uti Recentiorum quidam putant, provenit, sed ex succis diversis, quorum canaliculi discissi sunt vel rupti, sæpe verò si fuerint rupti soli chyli ductus, hinc effluens alba & spissa materia nihil aliud est, quam coagulatus chylus, sanies verò seu aquosus sanguis, qui acidum olet & salum saporem habet, est serum sanguinis, quia cum eo commiscetur & sanguinem pus vocatur. Ichor est tenuis succus chylo-sulphureus & salis. Sordes est materiæ lardo similis, quæ lutosa, spissa & non facile per canaliculos musculorum fluit. Virus est tenuis ac fœtida materia, quæ carnem & cutem exedit. Melagium dicitur oleosa materia, quæ communiter à carne ossium oritur & valde foetet. Generatur ergo Ulcus, quando particule acidæ salis & aliz ejusdem farinae confusæ & inordinate mixtæ latent, & nullam occasionem nanciscuntur evasendi propter præsentem obstructionem, hinc vasa simili modo, ac si quis id præster cum mille cutellis, discinduntur, & non apud Chirurgum tot varia inveniuntur instrumentorum genera, quæ hic non reperiuntur in materia ista purulenta, quod probari potest, si vel sanguis, vel materiæ purulenta destilletur & redificetur, quæ decineatur ante nares, vel imponantur guttæ unæ vel alteræ linguz, percipiet destillator, imò ipse incredulus Thomas, quod cutelli admodum sint acuti, fateri debet. Medicus ille Viennensis tempore pestis bubonem pestilentialem alembico immiserat, exinde destillatum liquorem alius gustandum porrexit, ex cuius cutellis omnes canaliculi erosi ac discissi, omnesque succi coagulati fuerunt, & hinc de gustatores mortui sunt. In Ulceribus tria bene consideranda veniunt, multitudo nempe vasorum ruptorum, dein materiæ quæ ex his emanat, & postmodum effusus, quem effluens & effluxa materiæ producit. Si enim plura vasa rupta sunt, plus effluit materiæ, & multitudo ruptorum vasorum dependet à majore circumferentia tumoris, quo enim major est circumferentia, eò plures rumpuntur canaliculi: nihil tamen magis vasa corrodit, quam per fermentationem acrior redditus evalatusque succus, qui acido-albus est, ex chylo nempe producto, modo flavus & tenuis, modo acris ac viridis, modo crassus, flavus & viridis ille succus non ab hepate vel liene aut aliis visceribus, uti Veteres somniarunt, ac hodie plures reperiuntur, qui saltem huic opinioni adstant, sed potius oritur à fermentatione ibidem facta inter succos effluentes, flavus ergo humor non à Bile, uti veteres putarunt, sed flavo hæc oritur

ex liberis particulis volatilibus, acidis & dulcibus inter se mixtis. Fætor verò puris oritur ab eadem causâ, accedente enim fermentatione & diu durante salia volatilia volant fætorumque inducunt.

Cavitas Ulcerum oritur, quando scindentes & mordentes aciculæ salis & acidæ ex proximis vasculis adjacentia minutissima vasa simul dilacerant, discinduntque ac plantæ sæpe erodunt, & sic sibi cavitatem parant tanquam foveam, unde Ulcus ortum suum habet.

Prout ulcus Phlegmonem seu inflammationem ac tumorem sequitur, sic & gangrænam excipere solet, vel ab incongruis remediis gangrænae applicatis, vel si gangræna jam radices egerit. Ulcera verò non semper produciuntur eodem modo, ac supra diximus de eò, quod phlegmonem seu tumorem excipit, nam in hoc pus ejicitur, in illo verò, quod gangrænam sequitur, nullum pus reperitur, & in gangræna cum omnia vasa corripita & rupta sunt, ut plane nullum commercium restet cum aliis vasis, hinc nullus succus nutritius effluere potest, contraarium verò observatur in tumore.

Quod illa Ulcera, quæ comitem habent scorbutum, aliamque intemperiem sanguinis, difficiliora sunt curata, ratio est, quod succi in M.S. non bene constituti sunt, vel particule sunt nimis salis vel acidæ, hinc ulcera sunt manantia, & ab aëre externo adhuc acriores redditici perforant roduntque alios canaliculos proximis & impediunt accretionem carnis. Pro regula enim firma stabienda est sequens veritas, quod omnes succi corporis nostri tam diu in vasis suis circulantur, meliusque in statu suo conservantur, quam illi, qui extra vasa stagnant, quia circulantes succi in vasis suis contenti ab aëre impediuntur, aër enim ipsos succosita non facile coagulare potest, dein per circulationem etiam per cor melius miscentur, à quo succi ab irregulari commixtione & motu servantur, sicque quoque novo fermento imbuuntur circulando, hinc non facile corrumpi possunt.

Si ergo succi sunt acidi, vel nimis salii, aut acidi & paucosale volatili & spiritibus & oleo præditi, facile vase percurrunt & foras emanant aliamque nanciscuntur indolem extra circulationem suam constituti. Salia enim volatilia, olea & spiritus corpora nostra quæcunque à corruptione præservare debent; dantur enim varia acida & salia & maxime inter se differunt.

Nunc paucis rationem reddamus, quomodo sphacelus in hydropicis sæpe Ulcus producit. Hic ergo considerandum est, quod si adsit obstructio vasorum lymphaticorum, v. gr. in Tibia, &c. per quæ succi aliis circulare debent, quod tamen nequeunt ob obstructionem vasorum à muco tenaci factam & minori vi succorû, hæc vasa præter modum à succis istis extenduntur, & extra ordinatum suum statum dimoventur, hinc in parte illa oritur occasio ad diffusionem & corrosionem vasorum, & cum plura discinduntur, & à reliqua carne quasi separantur, tunc fit Ulcus, distenta enim sunt vasa, & non amplius à debili influxu spirituum ad pristinum statum deduci possunt, nec separatim succorum fieri potest.

Ulcera ex scorbuto sæpissime produciuntur à particulis istis salinis acutis sanguini ac reli-

quis succis inexistētibz, tubulosque tandem erodētibz.

*Ulcus for-  
did.*

Si particulæ acidæ pertinaciter poris labio-  
rum Ulcerum inhærentes, succos dulces de no-  
vo alluētes convertunt itidem in acidos, qui ob  
tubulos & Ulceribus ruptos, circulationem con-  
tinuare nequeunt, à succis ergo à tergo conti-  
nuò insequentibus propellantur foras in cavi-  
tatem Ulcerum, quam ad summum usque fere  
semper adimplent succo quidem acri, acido ac  
tenui, cum quædam viscosiores & magis ramose  
particulæ intermiscantur inhærentes in super-  
ficie Ulcerum, illa sordida reddunt.

*Ulcus  
cum carie  
ossis.*

Ulcus cum carie ossis, & fungosa inde nata  
carne oritur ab acido corrosivo, ossium tubulos  
corrodente, & sic ossa cariōsa reddente, vasa  
que sanguifera magis quam par est aperiente, ex  
quibus prolongatis effluens succus transit in car-  
nem fungolam.

Ulcus mirandum est, quod notavit *Celeberrimus*  
*Mays Obs. 4. prax. Chir. rational.* ex qua  
vice prodierunt 30. ova humore limpidi plena,  
deinde per aliquot subsequentes dies plura  
alia egrediebantur, quæ omnia simul sumpta  
numerum centenarium superabant, eorumque  
quædam ovi gallinæ, quædam columbini,  
quædam etiam ovi passeris magnitudinem habe-  
bant, singulaque eorum propria ac à cæteris se-  
paratâ, candidâ quæ cingebantur membranâ,  
quæ chartæ luforiæ crassiem habebat: ovis  
subventaneis hæc ova valde similia apparebant,  
omniaque simul in communi crallâque mem-  
brana inclusa jacebant. Nos & ulcera invetera-  
ta vidimus, ex quibus chartæ luforiæ, vitæ, atæ-  
næ, lacertæ, mulci, pili, ranæ & ejusmodi res  
prodiabant, vide de his *Commerc. nostr. lit. Epist.*  
2. Num hæc à naturalibus causis prodeant, *Cl. Mays*  
curiose explicat; vel num diabolus ejus-  
modi res non animadvertentibus Chirurgis &  
adstantibus substituat, quæ non in ulcere antea  
fuerit. De animatis tandem ratio reddi potest,  
sed de inanimatis, uti vitris, ubi adhuc insignia  
cujusdam nobilis fuerunt impressa, vix credo  
ejusmodi res naturaliter à succis variè dispositis  
produci posse, sed à dæmone mille artium fa-  
bro fuisse potius substituta nemo erit, qui inficia-  
bitur. Sic & frustulum fistulæ adæquantis longi-  
tudinem dimidii digiti, quæ tabaci amatores  
utuntur, in Abscessu vidit prælaudatus *Cl. Mays*,  
sed ab ægro fuit in fauces ductum per lapsum,  
quem ex improvviso substituit, de quo Abscessu  
mirando consere sapius nominati *Cl. Mays Obs.*  
vi. *Chir. ration.*

*Causæ Fi-  
stularum.*

Causæ *Fistularum* ad quatuor capita reduci  
possunt: 1. à vulneribus & puncturis oriri pos-  
sunt *Fistulæ*. 2. à tumoribus vel abscessibus. 3. Ab  
ulceribus inveteratis, & 4. à carie & corruptione  
ossis. A vulneribus enim sive puncturis exoritur  
*Fistula* sequenti modo: Si enim quis profun-  
dè læsus fuerit, & æger in peculiari situ ita con-  
stitutus, ut nemo ad profunditatem vulneris per-  
venire possit, certum dein ut materia stagnet &  
peculiarem succum sibi efformet, facili Marte  
proin accidere potest, ut superius vulnus consoli-  
daretur, remanente materiâ, quæ de die in diem  
acrior redditur, vicina vasa corrodit, unde ef-  
fluxus materiæ major fit, ut cutis iterum corro-  
dat, sicque *Fistula* generatur. Si jam materia  
ex sua cavitæ effluxerit, non tam repente illa  
teplet, hinc restat semper mucus viscidus, avo-

lantibus scilicet particulis subtilibus, hinc crassius  
succus hæret in orificio *Fistulæ*, impeditque ef-  
fluxum tenuis de novo affluentis materiæ. Cal-  
lositas *Fistularum* producit ut plurimum à  
pressione materiæ, prout videmus in callis ma-  
nuum provenientibus à labore. *Fistula* nihil  
aliud est, quam particularis exulceratio, h. e.  
apertio extraordinaria vasorum; in *Fistula* enim  
semper remanet fermentum acidum, prout in  
stomacho liquor quidam gastricus, quod succos  
effluentes alterat, & hinc pus variè alteratur,  
modo sanguineum, modo album, modo flavum,  
aliquando fæsum vel acidum vel crassum, &c.  
Quod in *Fistulis* nullus doloris sensus sæpe per-  
cipitur, ratio est, quod partes *Fistulæ* sint com-  
pressæ & contractæ, vel planè abscessæ & indu-  
ratæ, & labia interna fere callosa; hinc videmus,  
quod callositates manuum vel pedum absque do-  
lore scindi possint. Causa ergo primaria *Fistula-  
rum* ut plurimum est acris & corrosivus succus in  
cavitæ delitescens, plures tubulos & canalicu-  
los discindens. Ansam huic præbet sæpe sanguis  
crassus & stagnationi aptus, si multis nimirum  
acidis & viscosis fuerit repletus particulis, hinc  
portio quædam harum particularum defertur ad  
partem aliquam nostri corporis, & ibidem substi-  
tens moramque trahens in carnem vicinam  
transit, fibrillas distrumpit, redditque sibi cavi-  
tatem ampliorem, sicque *Fistulam* producit. Si  
verò crassiores ramose particulæ circa *Ulcera*  
latera seu labia sibi imperium rapiunt premunt-  
que fortiter vasa, hinc callosam efformant *Fis-  
tulam*. Non tamen necessum est, succos acridi-  
tatem suam aliasque vires ubique, & manifestè  
semper prodere, sed qui occultè subinde sale,  
ut *Helmontius* ait, gaudent, quod sub sanguinis  
tegut involvitur, nec nisi cum secreti fuerint,  
& per se exsisterint, seorsim conspicui fiunt, ho-  
minemque lædunt ac molestia afficiunt, & cujus  
genii aut generis sint manifesti fiunt ex *Hippoc.*  
Res nos ambientes multum faciunt ad *Ulcera* &  
*Fistulas* producendum; & quomodo contribu-  
ant suamque synbolum addant, ex dicta infra  
dicenda apparebit, æt enim acidus & multo sale  
repletus, sanguinem faciliè hinc particulis im-  
pregnat, hinc & ii, qui per mare vehuntur, ob  
salas & acres exhalationes, & dietam viscidam  
ac salinam, sicque incongruam hinc *Fistulis* &  
*Ulcerebus* obnoxii sunt: succedunt alimenta &  
potulenta succo saleque mordaci & acido abun-  
dantia, & in fermentationem, corruptionem facile  
tenduntia: Vinum acidum quodvis nobis suspi-  
cium est, & omnes potus acidi, ut cerevisia acida,  
vinû pomaceum, &c. Ex lacte vitiosi succi infans  
cum nutrice suæ totum corp' multis repletum *Ulcerebus*  
circumtulit, teste etiam ipso *Galeno de ali-  
ment. facult.* Motus nimirum, ut & vigilæ, cacochy-  
mizæ non difficiles causæ operose quoque  
hic sunt ordinari excernenda, si præter modum  
retineantur, v. gr. in viris hæmorrhoides suppres-  
sæ ob stagnationem sanguinis acrioris & viscidæ,  
*Fistulosa* circa anum *Ulcera* dederunt, prout  
apud *Hildan. cent. 2. Obs. 75.* aliosque legere est,  
quod & ipsa testatur experientia. Item ob men-  
ses in feminis stagnantes & aciores collum cer-  
vicis Uteri planè emicrorum exulceratumque no-  
tavit prædictus *Hildan. cent. 2. Obs. 61.* Mulie-  
rem lochiorum fluxu non satis purgatam post  
partum, nuper observavi copiosissimis crurum  
*Ulcerebus* repletam, quæ adhibitis remediis  
congruis

congruis feliciter, Deo benedicente, à me curata fuit. Mœror quoque scorbuticorum Ulceribus fovendis aptissimus est, sic tumores, inflammationes, gangrenæ, hydrops, cacochymia quæcunque, difficiles partus, dilaceratis nempe circa Uterum vasis, causam Ulceri Fistuloso dare possunt: frequenter tamen verò accidit Vulnera in Ulcera, Abscessus & Fistulas degenerare, male præsertim curata. Sic & catarrhi contusiones sæpe in Ulcera & Fistulas degenerant. Excoriationes intestini recti à succis acerbis virulentis in lue Venereâ & gonorrhœa occasione Fistulosis Ulceribus dant, & non ita pridem adhuc virum quandam balsamo nostro divino feliciter curavimus, qui per tricennium & ultra hac affligebatur Fistula, & inde sæpe febrem passus est; post variolas & morbillos male curatos sæpius vidimus Ulcera & Fistulas, sic & post fracturas carumque ossium, item ab ictu, à bubonibus, ex mala dentis extractione aliisque prægressis morbis observantur Fistulæ, ceu quotidiana constat experientia.

*Prognosis  
Vuln.*

§. 12. Quod *Prognosis* concernit Ulcerum; si pus dulce est, & bene olet, optimum signum denotat, facilis curationis ulus, non esse malignum, & quod fermentation non ad summum pervenerit fastigium. Si verò pus sit flavum, vel virido, maximeque foetet, malum est.

Difficilis curationis Ulcerum in eo consistit, quod simul acre redditum pus, reliquum affluens ad partem affectam eodem induit caractere. Illa Ulcera, quæ propter gangrænam ex scorbutico, hydropico & frigore oriuntur, sunt pessimi moris, illa verò, quæ post phlegmonem & tumorem seu abscessum oriuntur, melioris sunt notæ faciliusque curantur. Per calorem enim seu motum succi nostri circulantur, à frigore verò non tantum succi inspissantur, & ad motum inepti redeunt, sed & ipsi canaliculi, per quos circulantur, constringuntur, hinc facilius obstruuntur. Ulcera saniosa sunt curatu difficilissima & diuturna, membranæ enim non tam citò sanantur, quàm caro. Sic & illa, quæ chylum inspissatum instar lardi in se continent, peioris sunt notæ. Fistulæ etiam, quæ occupant juncturas aut partes, ubi majores sunt canaliculi, itidem difficilius curantur, quoniam succi facile effluunt, & in eandem abeunt anurcam, quo ulus profundius existit, eo difficilius est curatu. Atrophiam ulus quandoque excipere solet.

Ulcerum in hydropicis oborta raro sanantur & exsiccantur, quia continuo emanant, omnes enim canaliculi obstructi sunt, vel rupti, vel corrosi sunt, hinc nulla alia via restat, quàm extra cutem ideoque nulla consolidatio fieri potest ob continuum effluxum, aquosæ materię seu ichoris, propter acres pungentesque particulas, quibus vasa disciuntur, hinc etiam melioris sanationis spes elucet, si materia albidior & spissior redditur. Non enim copia aquæ hydropicis mortem accersit, sed obstructio, hinc plures novimus, quibus aqua per aliquot septimanas ante mortem effluebat, & abdomen instar sanorum redditum pus macilentum, attamen paulo post mortui sunt.

Cum in glandulosis partibus aliquid subulis fecernatur & lympham constituat, contumaciora sunt Ulcera, magis quoque dolorosa & corrosiva, quæ facillime degenerant in Fistulas, imò hæc ulcera cancrasam induunt sæpe in dolent.

Ulcerum & vulnerum articularum sunt curatu difficiliora, propter facilem lymphæ aut sanguinis stagnationem, corruptionem ac accrescentiam, sic quoque Ulcera facile producant cariem ossis, quoniam acor lymphæ aut sanguinis ad os subiectum delatus, aut ex alteratione ipsius ossis ab æris contactu ortus, aut etiam ex aciditate intensâ ad os cum chilo delatus, os ipsum corrodit cariosumque reddit.

Quod *Prognosis* Fistularum Signa attinet, *Prognosis* quæ omnes generaliter curatu difficiles sunt, plus tamen difficultatis alia: alia minus habent, imò *Fistula*.

nonnullæ planè incurabiles censentur; sic filia Prætoris cujusdam per annum & ultra in manu cujusdam Empirici versabatur, quæ laborabat Fistulâ circa os femoris, sed frustra operam navavit Empiricus ob profunditatem & multa disrupta vasa majora, cariem ossis subiectam, & atrophiam conjunctam. Simpliciter verò recentes intra carnem non adeo profundæ sub cute transversim existentes, in corpore juvenili robusto, cætera sano, labiis quodammodo mollibus & mucosis præditæ, faciliorem ceteris curationem spondent, difficiliorem autem minantur inveteratæ valde profundæ, & rectâ ad interiora tendentes, scorbuticæ, lardæ similes, tortuosæ, variis sinibus constantes, iensius planè expertes, luem Venericam aut gangrænam redolentes in hydropicis, senilibus emaciatiss corporebus, pueris & junioribus obvia, raroque ita exemplo, quatuor rectum intestinum perforantes Fistulas in infantulo unius mensis perfectè sanavit *Petrus de Marchetti, de Fistula* amp. p. 180. Fistulosæ exulcerationes nostro judicio curationem admittunt, si singularis Medicus aut Chirurgi dexteritas, & ægri obedientia accedant. Periculosæ verò sunt quàm maximè illæ, quæ visceribus vicinis ad musculorum capita, vasa, articulos, dorsum vertebra, ossa, ventrumque cavitates extensæ quoque gravia post se symptomata relinquunt, ut febrem, cachexiam, tabem, lyncopen, degenerant quoque non raro in phagedænica Ulcera in intestinis, sæpe & claudicationem in femore inferunt. Fistulam ventriculi feliciter curatam fuisse ex *Eph. N.C. Ann. 7. & 10. Obs. 31.* à Nobis communicatâ constat, quæ circa juncturas manus aut pedis nascuntur, cum nec manum Chirurgi, nec Medicamenta decenter admittant, difficilior sunt curata. Ut & cancrasæ per difficilis sunt sanationis. Quas etiam plures non semel attingendas esse volunt: curatum tamen talem memorat *Georg. Velschium exoticar. curat.* Fistulæ non bene curatæ facile iterum recluduntur, coarctata materiâ imprimis ubi subest caries ossium, acris autem perforat. Sunt & nonnullæ, quibus ocluduntur Fistulæ, hinc conqueruntur de anxietate & angustia pectoris, respirandi difficultate, &c. ratio est, quod hanc coagulationes in succis nostris. Ex materia effluente majus vel minus periculum concludere potest Chirurgus; si enim materia valde foetet & circa os later, signum est cariei ossis, si circa juncturas prodeat & foetet, signum est corruptionis tendinum. Fistulam pedis gangrænosam lethalem observavit *Celeb. Georg. Francus*, PP. Heid. Decur. *Eph. Germ. A. 6. Obs. 81.*

§. 12. Non duntaxat Medicamenta commoda *Cura dia-* in Ulceribus ac Fistulis interviunt, sed & *Dieta* *testes.* in his non negligenda est, ne Medicus & Chirurgus semper suppeditatâ nova causâ peccante. inane



inanem ludat operam. Aer ergo eligatur purus, nitidus, nullis inquinamentis & nebulosis salis ac aeribus exhalationibus inquinatus, sed temperatus, nimis enim frigidus sanguinē & ceteros circulates succos incalcat, & nimis calidus acrioribus suis particulis sanguinem reliquosque succos replet, & sic anasam Ulceribus ac Fistulis præbet, & quæ vis aeris in sanandis Fistulis sit, legi meretur *Obs. 45. volum. 1. æd. Hassienf.*

Post ærem cibi potusque ratio habenda est, usurpentur ergo omnes cibi volatili gaudentes sale, & vitentur angue pecus omnia acida, salia, acida, saccharata, sive dulcia viscida, de quibus alibi ad nauseam diximus. Hoc asterisco etiam notandum est, quod acia valde noceant, sæpius in mensa assumpta, ex ejusmodi enim acidorum abusu, imprimis succi citri singulis cibis in mensa aspersi. Seren, Elector Palatinus Carolus Princeps certè seriore Libitina dignus, non tantum planè enaciatus est, sed etiam post mortem ipsius in intestinis innumera inventa fuere *Ulcera*. Fugiatque ante omnia vinum Rhenanum æque ac Mosellanum & Baccharacense, si sint sc. acida, quæ ob aciditatem maximè nocent Ulceribus ac Fistulis, concedatur verò vinum Gallicum, aqua pro re nata dilutum, vel Malvaticum, vel Tokayense, potus Theæ in omnibus Ulceribus, item & Capheæ maximè conducit, & nunquam in his negligendus est, quoniam ope hujus potus particulæ acres salinæ viscidæ peccantes vel per urinam, vel per sudorem eliminantur; sive aqua calida, quæ autur Czar ordinariè in Moscovia cum paucis fermenti panis & ad stomachum roborandum interponit aliquando vitrum vino Hispanico repletum & sit longævus, quo potu calido Princeps Septuagenarius Lüneburgico Guelferbytanus utitur. Vel sumatur istius in Galliâ usitatæ aquæ vitæ nomine l'eau de Siam insignitæ parvum vitrum. Somnus sit largior, etsi etiam sit meridianus, quem concidimus, quia is nihil aliud est, quam mortis frater à debiliore influxu spirituum obortus, quo enim quis volatiliorem & subtiliorem sanguinem & succos habet, eo minus ad somnum proclivis est. quo verò sanguis & succi crassiores, tenaciores & viscidiores, eò ad somnum propensiores sunt. Vigilæ verò, ut & lucubrationes modum ne excedant. Vigilæ enim portiones spirituosas in M.S. nimis absumunt, sique sanguinem vappescentem quasi lentumque ac viscidum relinquunt, succos etiam exsiccant, eosque acres ac corrosivos reddunt.

Motus & quies ita alternis vicibus instituenda sunt, quò minus spiritus deprimi aut motus eorum impediri queant, nam per motum sanguis & succi nostri attenuantur, & ad circulationem promptiores redduntur, quies verò nimia succum nostrum nervum seu spiritus animales in musculis nostris, (qui sunt interni motores nostræ machinæ aquæ rotam molarem circumgyrantis) nimis exhaurit, producitque vappescentem, lutosum ac viscidum sanguinem succosque, sicque anasam dat Ulceribus Fistulisque nostris. Per motum etiam nimium volant particulæ subtiliores, remanentibus in M.S. lutosus ac viscidus ramosusque, particulis, sanguinem ac succos incalantibus.

Excreta ac retenta denique ad ordinarias leges debito modo revocandas esse Author ero, præprimis mensum in sceminis Fluxus solitus promoveatur, nec insensibilis transpiratio impediat, sic & urina, fluxus seminis, lac ac saliva, ut &

alvus sit lubrica, ita ut æger ex usu tam Medicamentorum quam Dietæ optimæ regimine cum sanitate pristina in gratiam redire possit.

Animi pathemata, ut moror, ira, &c. Venerisque ludibria nimia maximè hic nocitura rectæ rationis freno coëreantur, ne breve illud gaudium diuturna Ulcera & Fistulas excipiat.

§. 15. Traditâ nunc curâ Dieteticâ, *Pharmaco-Galenicâ*, vel *Chirurgia* manum auxiliatricem alteram porrigit, cum Ulcera neglectis internis remediis non tantum in deterius ruant, sed & plurimum aliorumque vehementiorum ac lethaliū morborum Auctores esse possint, quod præter experientiam monumenta Medicorum abundè testantur. Prius ergo de Ulcerum curatione andiamus *Galenicos*, qui *Indicationes* desumunt ab ipso morbo, à causis ipsius, & à Symptomaticis. Ulcus itaque cum sit solutio unitatis, rennens expectunt, & cum deperdita sit substantiæ portio, repletionem instituunt; causæ indicant sui remotionem, symptomatica verò sui delinutionem. Ut primo satistaciam scopo siccantibus, & perum adstringentibus utuntur ad præscriptum *Hipp.* inquit, quod *siccum est sanum*, quod *madet, ad vitium propriis accedit*. Siccandum esse ajunt ob excrementum tenue, abstergendum vero ob excrementum crassum, quod utrunque in Ulceribus reperitur: eadem tamen & in eodem statu Medicamenta non esse adhibenda docent, nam juxta ipsos Ulcera quatuor habent tempora, *principium* sc. *augmentum*, *statum* & *declinationem*. In principio autem, ubi sanies est valde cruda, & in ipsa parte generatur, præcne inflammatione, dolore, &c. adhibeatur maturantia & dolorem parum sopientia, & tamdiu in suppurationem perficiunt, usque dum pus album, leve & æquale appareat: in augmento crassiori sc. excremento per coctionem se se accumulante abstergunt: in statu, & declinatione, in hac tamen magis, sæcrotica administrant, in fine tantum cicatizantia applicant. Si verò aliquod grave Symptoma Ulceris sit complicatum, quod rationem causæ inducat, & Ulceris curationem impediat; isti ascendendo prius incumbunt.

Primo itaque omnium *Galenicè* in Ulcerum Curatione convenienter instituunt Dietam, tenuiorem sc. & aliquantum siccantem; partis tamen temperiem maximè respicientem: secundo evacuantia, repellentia, aut intercipientia præsidia adhibent, itaque venæsectionem, si ad sit plethora: & purgationem, si cacochymia urgeat, præscribunt, humorum verò qualitatem alterantibus tum alimentis, tum Medicamentis corrigunt, etiam per cucurbitulas, frictions, ligaturas, vinctula, &c. contrariis particulis adhibent, revulsiones & intercepciones instituunt, per Medicamenta frigida humores fluentes intercipient, incassando sc. humores, cogendo, & adstringendo: tertio solliciti sunt de symptomatibus corrigendis: & quarto de omni moda Ulceris curatione. Ut itaque Ulceris sumptici auxilientur, ad maturantia confugunt, ætati & temperamento congrua, in corporibus enim mollioribus mitiora, sufficient, ut gr. illud quod sit ex vitello ovi & ol. rosaceo, in corpore verò non ita molli illud, quod sit ex cerebintina & vitello ovi, in corpore sicco ac adulto adoleum mastichinum, & farinam hordei, pulv. thuris, succum apii, sein. lini pingui, anatis, &c. nec toto Ulceris tempore continuant suppurationem,

Mmm

ex hie

ex metu, ne Ulcus fiat sordidum, sed tantum donec sit optimum fundamentum carnis rubicundæ & vivacis positum: nam deinde sufficere ajunt plumaceolas sive linea filamenta; regenerationem folius naturæ esse opus arguunt, modo sanies & quæ hoc opus impediunt à Chirurgo arceantur. Cum duo hic esse excrementa statuunt, crassum & tenue, crassum abstergunt, & tenue exsiccant, v. gr. farina hordei, semigræci, thure, aloë, ungu. Basilico majore ac minore: si sicciora sunt corpora, adhibent aristolochiam utramque, farinam orobi, lupinorum, fabarum, ungu. de matrisylvia: si vero corpora sint valde secca, ad magis adhuc siccantia deveniunt: ut sunt Chalcitis, lapis calaminaris, cadmia usta ac lota, rutia, ablinth. ungu. Apostolor. Ipsorum abstergentia Medicamenta sunt hydromel, de apio, mel rosaceum, pulv. sem. cruzæ, &c.

Si cavitas repleta est hisce, & remanet tandem simplex seu superficialis Ulcus, præscribunt Cicatrizationem seu epuloticam, uti sunt empl. de lap. calam. diapalm. myrrh. olibanum, aloë, cinis corii ant. qui, pomphol. plumbum ultimum, ungu. de minio balauit bolus Armena, terra sigillata, sem. sumach, nngu. desiccativum rubrum, alumen scissile, pulv. rosar. rubr. fantal. rubr.

Si calida Ulceris fuerit intemperies, ad refrigerantia illico confugiant, ex gr. ungu. album Rhasis, album Camph. de cerussa, de tutia, populeum, refriger. Galeni Santalin. aqu. plantag. rosar. portulac. succ. semperviv. solani, cicuta, burse pastoris, vinum nigrum stypticum, ex quibus plurima parant remedia, intus quoque ea quæ refrigerant, administrent, ut sunt emulsiones, Julapia, Julcula, &c.

Si intemperies Ulcis fuerit frigida ad calida topica confugiant, ut sunt oleum Terebinth. hypericonis, de spica, aethin. camomill. vinum calidum spongiosum applicatum, ungu. Apostol. ceratum, de betonic. quod si magis calefacere oporteat, aquam vitæ vel vinum Hispanicum calide spongiosum applicant, in quibus coquunt salu. hyssop. absinth. pulegium, rosmarin. folia Lauri, lavender. &c. Ino adhibent oleum euphorbiæ, aut de piperibus instillant.

Si intemperies humida fuerit, siccantibus utuntur, siccam verò intemperiem præ reliquis maximè considerant, & eò respiciunt, an intemperies hæc sit ex alimenti defectu, vel ex impressa sicca intemperie, vel ex utroque. Si ex alimenti defectu, quod pars non rite attrahat, cibo euchymo & facili distributionis utuntur, dein adhibent somenta, aquam tepidam, eucurbitulas, picationes, strictiones, &c. donec ipsa pars rubedinem contraxerit; si verò intemperies sicca sit impressa, humectantia adhibent, ut sunt aquæ temperatæ fotus, vel seq. unguentum humectans:

℞. Fol. malv. contus. lbß.

buryri recent. ʒviij.

M. coquantur usque ad mollitiem, trajiciantur, dein addo

ol. lil. alb. ʒiij.

M. F. linimentum.

In Ulcere Phlegmonoso vinum tepidum, in quo mala punica fuerint cocta, vel poscam, vel mulsam aquosam applicant: in Erysipelatoso Ulcere convenire ajunt cataplasma ex cidoniis & pyris acerbis, cum vino & aceto factum: si Oede-

ma adsit, Medicamenta paulò magis calefacientia; si scirrhus, simul emollientia: si durities in Ulceris labiis cum decoloratione adit, eam quamprimum tollunt. Imprimis hoc in casu emollientia commendant, tale parant Cataplasma.

℞. Mucilag. sem. albeæ aq. malv. extr. lbß. pingued. anasis,

anferis,

Galline aa. ʒiij.

farina sem. lini ʒiij.

mica panis triticeæ ʒiv.

c. l. q. lactis coq. ad consistentiam catapl. ita tamen, ut pinguedines ultimò demum inficiant, vel instituunt embrocationes ex decocto carnis arctice, quæ & insigniter emolliunt & temperant. Si durities fuerit à repletionem, evacuationia & resolutiva suadent: si humores grossi duritiem efficiant, eos dissolvunt emollientibus simul inieciendi vi pollutentibus, & Medicamentis in hunc finem acetum admiscunt. Si partis duræ color niger sit, eam novacula à parte sana separant, vel scarificant, vel cauterio ad decidentiam sollicitant, vel corrosivis fortioribus tollunt. Quod si vermes in Ulceribus à putredine & pituitolo, ut illi dicunt, excremento generati fuerint, eos auferunt vel necando & putredinale illam humiditatem tollendo; Vermes auferunt vel specilli cuspidem, vel alio quovis instrumento; quod si hoc efficere nequeant, applicant amara ex absinthio, aloë, centauro minore, tamarco, scordio, helleb. nigr. parata remedia, vel etiam ferro candente eos interficiunt. Ulcera cum osse corrupto curant purgatione ac pro re nata venæsectione instituit, dein os deudant, nisi obstant nervi, venæ aut arteriæ majores. Item si ossa capitis, femoris, vertebrae fuerint corrola, ab incisione & unctione abstinere, & potentialibus tantum utuntur, in aliis autem corruptis partem ossis incidunt, urunt, & auferunt; si caries tantum fuerit superficialis, eam tollunt siccantibus remediis, ut sunt aloë, aristolochia, sem. sumach, pumex calcinatus, cinis ficulneus, calx, fax usta, rad. ieros, &c. quæ tamen ita applicant, ne circumjectæ partes tangerentur, hinc filamentis hæc bene muniunt. Prædictos pulveres vel cum melle, vel cum ungu. Egyptiaco, vel cum terebinthina, pice, cera, &c. miscent & applicant, os autem per Chirurgiam vel abrasione, vel unctione tollunt, quæ omnia videri possunt capite de Carie Ossium.

Ulus virulentum depascens, Phagedenicum seu Ulcus ambulativum curant Galenici humorum peccantium evacuatione, virulentæ materiæ exsiccatione & intemperiei correctione, Ulcis repletionem, consolidationem & cicatrificationem. Primæ indicationi satisfaciunt corpus bene expurgando, sanguinem, si exuperet, extrahendo; humorem intercipiunt per defensivam. Dein ad localia perveniunt, inter quæ frigida, sicca & stiprica commendant, uti est aqua aluminosa, dein ungu. diapompholygos, vel sequens aut simile:

℞. Herb. plantag.

prunell.

buryr. pastor. aa. ʒiij.

ʒ. rosar. rubr.

balauftiorum

mucum cupressi, aa. ʒiij.

Decoq. in aq. fabrorum & aceti partibus æqualibus, quo decocto ulcus corrodens sæpius abluunt, defensivis inter partem mandantem & reci-

recipientem semper diligenter applicatis. Quod si verò hiſce non iuvantibus malum ulterius ſerpat, Gaidonis curam cum laminâ plumbea perforata ſuperligata approbant. Dein ſi nec iſta proſint, ad eſcharotica vel ignem actualem conſugiunt, hoc enim melius & præſtantiſ nullum reperiri, ajunt, & in Ulcere Phagædenico, venerea plerumque malignitate pertinaci 10. vel 12. inſtrumenta ferrea candentia Itali exſtinguunt. Poſt hanc operationem, ne Inflammatio parti ſit inducta, refrigerantibus agunt, ut ungu. albo Camph. album. ovor. ol. roſar. bene conqualatis, vel ſucco ſolani cum ungu. albo R. haſis conjuſcto. Quod ſi omnis malignitas ablata fuerit, tandem Ulcus more aliorum implet, conſolidant, & cicatrifant.

*Ulcus ſordidi* curam peragunt (1.) *Dietâ* ritè inſtitutâ, (2.) humoris peccantis evacuatione per revulſoria, ac deſtoratoria, (3.) topicis ſeu localibus. Quod ad localia pertinet, corpore bene mundato, oriſicii dilatationem quamprimum moliantur, ſemper à nervis, venis & arteriis officiòſe cavendo: vel loco ſectiõnis, eadẽ factâ cautione, cæteris potentialia applicant, dilatationem ſinuque aperiunt. ſi Patiens eam admittere nolit, injiciunt deſtorſoria, & exſiccantia talia, ſunt niſſum, cui aliquid, ad putredinem magis accendandam, oxyimelitis addunt, ad primam inſectionem muriam, lixivium aquæ aluminoliæ, &c. adhæbent, vel etiam, ſi adeſt maligna putredo, injiciunt *Ægyptiacum* in ſpiritu vini cum pauca theriaca diſſolutum, quando Inflammatio abeſt; hæc enim ſi adſit, cremor, hordei cum melle roſaceo mixt. vel ap. muſc. in qua aſiunt. ſymphitum majus &c. eoquunt. Factâ abſterſione vinum calidum rubrum pro corroboratione injiciunt, cui vino incoquant myrrham, thus, aloẽ, ſarcocollam & ſimilia ſarcotica, extra verò ſpongiam vino calido madidam ita applicant.

*Galenicum Cura in Fiſtula*

*Fiſtularum* Curationem perſiciant inſtitutâ *Dietâ*, dein humorum evacuatione, internorum membrorum correctione: & topicis Medicamentis; jecur, lienem, ſtomachum, caput, &c. confortant tum per appropriata, tum per decocta ex lignis & herbis aliquoties repetita. Optinâ ergo *Dietâ* inſtitutâ, expurgare corpore, partibus internis roboratis, fluxione à parte affectâ in contrariam retractâ, vel ſaltem prohibita, aut intercepta, cùm hic ſele plura offerant, utpote ſinus, calloſitas & oriſicii anguſtia, hinc vident, à quoniam horum incipiendū ſit. Fiſtulas enim curari non poſſe ajunt, niſi callo ablato, & oriſicio taliter dilatato, ut Medicamenta ad cavitatis fundum pervenire poſſint. Itaque ab oriſicii dilatatione curam omnino auſpicantur, quod fieri ajunt turundis ex valde comprellâ & colligata ſpongia, vel etiam ex medulla ligni ſambucini cum extractorio ſto, ut, ſi in ſinum ipſum incidere, tutò poſſint extrahi. Talia, poſtquam humores imbibenter, ſele dilatant, adeoque oriſicium ampliant, hinc per 12. horas eſſe relinquenda monent, dein extrahunt; & ſic turundas majores ſemper eſſe introducendas dicunt, donec foramen ſit amplum fuerit reddita; imò uſque ad ſinuoliſe cavitatis fundum, ſi fieri poſſit, pertingant. Hoc factò callum auferunt, quòd ſi Patiens neque uſtionem, neque incisionem ferre velit, callusque non ſit admodum craſſus, cum *Corroſivis* præmiſſa prius ſcarificatione, conſu-

munt, talia ſunt ex ipſorum ſcriniis, uti ungu. *Ægyptiac*, ſuccus tabaci, raſur. rad. ariſtoloeh. rotund. aſphodeli, melle illicæ, ad id maxime laudant rad. hellebor. nigr. per triduum in cavitare detentam. Præterpue ſi ſit ab humore melancholico, conducere ajunt elaterium, terebinthina exceptum & applicatum. Valentiora ipſorum corroſiva ſunt Chalcanthum uſtum, pulvis Cantharidum, Sapo niger, lac eſulæ, lixivium ex cinere & calce viva, &c. Ex his componunt turundas & imponunt, ex.gr.

*Æruginis ʒiſſ.*  
*ammoniæ ʒij.*  
*acetæ q. ſ.*

*M. F. Maſſa.*

Unde formant turundas Fiſtulis indendas.

Alii ex corroſivis illis pulverem conſiciunt, quem deinde in foramen per cannulâ inſuflant, alii eodem pulverem cum muſſa diſſolvunt, & ſiphone injiciunt in Fiſtulæ foramen, id quòd maxime obſervant, ubi Fiſtulæ ſunt valde profundæ, cum-culoſæ & anfractuoliæ: illuc enim ſola liquida penetrare poſſunt. Dam acra hæc adminiſtrant. deſenſiva ſemper ad vitandam majorem à dolore concitam fluxionem & conſequenter inflammationem, applicant; faciliorem verò & breviorẽ viam eſſe arguunt, vel per incisionem, vel per uſtionem, inprimis ubi Fiſtulæ ſunt profundæ: cõenim tendunt, ut ad iplum fundum perveniant. Si ergò ſecate velint, primò ſpecillum ligneum immittunt, ſuprà quòd inſtituunt incisionem cum navicula aut ſcalpello, arque ita omnes ſinus, vitatis vitandis, detegunt & aperiunt, donec eorum finem adinveniant. Sequenti dein die callum vel cauſticò, vel corroſivo conſumunt, adurunt & omnimodò tollunt. Deinde poſt operationem oleo roſaceo cum vitello ovi bene agitato dolore demulcent, quo factò butyro recenti vel aliis unctuoliſe eſcharam paulatim emolliunt, & ad decidentiam præparant, quo peracto, ſi puſalbum, læve & aquale ſuccedat, & Ulceri color laudabilis redeat, boni ſuccelſus ſpem eſſe optimam memorant, ſi præcipue dolor, tumor & alia ſymptomata ceſſerint, & optima caro, loco calli per Sarcotica incipiat regenerari, quod antequam fiat, Ulcus probe eſſe detergendum monent, ne ullum Fiſtulæ ſeminarium remaneat. Quòd ſi, vel ob debilitatem ægroti, vel ob loci, in quo eſt Fiſtula, periculum talis cura inſtitui non poſſet, *Paſſivam* ſufficere *Curam* ajunt, hinc tenuem imperant *Dietam*, corpus autem ſuperfluis ſcatis humoribus optime expurgant, & quantum fieri poſſet, fluxum ad partem minus nobilem derivant, quin &, juxta ipſos, non leve adeſt periculum, ne antequam percurrant Fiſtulam, ſine fluxionis derivatione, materia ad partem mandantem regurgitet; hinc Fiſtulas in pedibus & manibus ad magis conſtantem ſanitatem ſæpe relinquant, quin & in mutatione ætatum, uti ſæpius obſervarunt, deſinunt.

*§. 14. Paracelſus* curam ſanationemque partium *Ulcera*, in Baſſano ſolum conſiſtere *proſequi* cenſet, quod eo corporis loco ſimile Baſſanum *in cura Ulcerum* deſiciat. Addit ſequens exemplum: corpus in ſe Baſſanum continet, quod à putredine conſervat quicquid in illo continetur, ubi tamen eorum aliquid à corpore ſeparatum fuerit, huic baſſano non ſubſcit amplius. Baſſanum, quo ſanari debent *Ulcera*, conſiſtere ait in exterioribus

Minim m 2

bus

bus elementis, & esse id, quod alia genera defendit à putrefactione, nuncupat ergo Mumiam corporis exterioris elementorum, b. e. fructuum eorumdem, quamvis enim Mumia sit, cum tamen ab uno in aliud applicatur, Balsamum esse dicit. Nam quod ex uno corpore transfertur in aliud, vel permiscetur, est *ipsi* Mumia transmutata sub nomine Balsami comprehensa. Hujus extractionem Balsami fieri autumat in separatione, sic, ut hoc ipsum, quod sustentatur à Balsamo, sumatur. Jam ad hæc animadvertit, Balsamum existere, præter liquorem Mercurialem, unde existimat, in Mercurio sanationem omnem contineri. Similem & potentissimum in Thereniabin, & Nostoch, item in aquæ mineralibus terræque fructibus Mercurium haberi memorat. Ex eo colligit, Antimonium excellentissimum Ulcera exhibere Medicamentum, cum hujusmodi liquoris Mercurii plus in se continet, quam alia quævis Margaritæ, Kakimæ & cætera similia. Solum ex eo curam & sanationem suam recipere aurum statuit, quod supremum arcanum ac remedium habeat. Subtiliorem enim liquorem Mercurialem inter ea, quæ per elementum aquæ producuntur, minime reperiri posse existimat. Similiter eorum, quæ terra profert, nullum excellentius arcanum sanationis existere ait, quam liquorem Mercurialem ex Realgare Chelri. Liquorem Mercurialem esse scribit pro parte crocum Martis, pro parte florem Veneris, & pro sua parte spiritum Jovis, non tamen eo prorsum adductum: quum separatim vera facta fuerit, juxta sui recepti vel processus potius tenorem, unumquemque liquorem Mercurialem hujusmodi potentissime curare Ulcera promittit.

Primo, quod ad Balsamum attinet ex auro productum, in Ulcerebus adeo proficuum, in hunc modum elici censet, ut aurum hoc absque spiritu salis omni, tum Realgare vel similibus, in pulverem, oleum, aquam aut hujus generis tale quid adducatur: quod nedum in auro, verum etiam in quovis ei simili corpore per transmutationem fieri debet. Nam absque simili transmutatione mineram nullam suas operationes adimplere posse ait, ut in se continet ac habet à naturâ, licet aliquam similitudinem exhibeat, ex fundamento vero non procedit. Ejus extractionis processus est, ut aurum per Thereniabin crudum in siccum reducatur absque destillatione quâvis. Nam per destillationem sal exaltatur, quod juxta eum in hoc auro nullo modo prædominari debet, nec alia viâ quâcumque reducendum esse ait in pulverem. Receptum ejus est sequens:

✱ *Auri laminati 3j.  
olei de pino 3℔.*

Pone simul in digestionem septimanis quatuor, postmodum oleum ablue, manebit in fundo pulvis. Hunc unâ cum Thereniabin crudo admihiſtrat. Vel alio modo sic procedit.

✱ *fulv. auri 3j.  
olei massici 3vj.*

Digerantur per mensem. Postea separat ab oleo, sicut prius, & affundit alcohol vini, digerit per octo dies, postmodum abstrahi vult à balneo Mariæ. Hoc oleo in Ulcerebus utitur.

Ex ferro similiter balsamum ad hunc modum parat, scilicet, ut cum aceto destillato reverberetur in crocum, à quo postmodum octies aut novies elevari jubet sal armoniacum, & inde

post in oleum redigit optimè dulcificatum. Usus horum, auri videlicet ac ferri designat, ut illud quâlibet septimanâ ter Ulcerebus patentibus imponatur, ferrum verò singulis duodenis horis semel.

Pariter in Cupro similem balsamum existere contendit, quum in Vitriolum rufum convertitur, & hoc in aquam, ejusque postea Colchotar in rubeum oleum, quæ quidem ambo valere ait ad omnia *Vulneraria Ulcera*, sicut Cancer, Lupus, Fistula vel similia corrodentia quæque foramina fuerint.

Ex plumbo etiam spiritum istum parari posse, nullus dubitat, si per acetum destillatum ex cineribus ejus extrahatur, quæ dulcedo postquam in oleum venerit, nedum Ulcera patentium, verum etiam apostematum, & Vulnecum admirandum esse remedium narrat.

Similiter ex Argento Vivo, quum in oleum convertitur, auri balsamo comparandum esse statuit, & ubi congelatum postmodum fuerit à Colchotar, postea cum aquâ Parthenionis administratum, omnia, quotquot sunt, excelsit Balsama, & in crocum versum aut præparatum in florem, Ulcerebus ejusmodi summam curam exhibere dicit.

Præstantissimum etiam ad Ulcera patentia approbat remedium ipsa realgaria, prædictis non immerito comparanda. Arsenicum enim quodcumque patens Ulcus, cujusvis etiam conditionis fuerit, validissime sanandi sufficientes vires habere inquit, hoc suo processu tamen, ut sibi venenum, quod habet, anaseratur ad hunc modum, fixat per sal urinz, demum in oleum per se ipsum convertitur, quodvis Ulcus patens persanandi potentissimum. Hæc viâ cum Antimonio incedit, ubi hoc in pulvis aquâ vitrioli decoquit, & postmodum ab eo sal armoniacum elevat, colat, & rubeum obscurum colorem deponit, & spissum liquorem, eundem, ut antè dictum, virium.

Salum etiam vires ad Ulcera patentia maxime virtutis esse scribit, quum alumina suis privantur corrosivis, absque stiprice suæ conditionis corruptione; sic ut ab alumine liquor sumatur, non tamen à calcinatione; contrâ capi vult à vitriolo suum oleum, & liquorem nullum, à sale colorem deducit puniceum, alio semoto. Ex salibus præparat in hunc finem balnea, quæ mineralia, ut ipsæ thermæ continent, quandoquidem, juxta ipsum, ex salibus omnia balnea procedunt. Horum etiam virtutibus aquam frigidam calefcere arguit in balnea, quæ patentia quævis Ulcera curare, sanareque posse testatur.

Balsama etiam terræ ad sanationem Ulcera adhibet *Author*. Notat ergo, Mumiam terræ balsamum exhibere, quum ad eundem salis urinz modum in aleali reducitur. Postmodum omne, quod ex terrâ nascitur, Mumiam latius præbere ait.

Balsama arborum, qualia Botin & Juniperus exhibet, partim in Ulcerebus aliquid posse contendit in uno quàm in alio magis tamen, aliquando frondes aliis fructus excellere dicit alia. Generale tamen magis eligit Balsamum. Inter arbores aut herbas aliquid Parthenioni simile laudat, quum liquores ejus in modum extrahuntur, ut sua virtus Mercurialis maneat, cum administratione sui vera: hæc viâ potentem evadere ait Chirurgum in Fistulas, Ulcera

corro-

## CAP. II. DE ULCERIBUS ET FISTULIS. 645

cortodentia, cancrum, ferruginem, &c. quocunque modo vel forma fuerint. Et non aliis ac moscus aromatum odores excellit omnes, Parthenion virtutes omnium vegetabilium, arborum, herbarum, &c. quæ terra producit. His ille Balsamis terræ Mumiæ, compositionis ejusdem, & Parthenionis omnium terrenorum balsamorum vires conclusisse vult. Pari modo quod, juxta ipsum, elementum ætheris in suo Thereniabin exhibet, liquosâ Thereniabin existit, supremi balsami. Sed pro tenore suæ contentionis & elementi proprietate, separari debet à suâ humiditate, per additionem Parthenionis non aliis & Nustoch. cum tamen ista non sint in usu, reperiri satis difficilia.

Mortificationem ac Mundificationem in Ulceribus instituit. Mundificatio ipsius est sequens:

- ℞. picis navalis lbj.
- visci pini
- abietis aa. lbss.
- visci locustarum è larice lbss.
- pic. larigna ʒij.

liquefiant omnia simul cum sui omnium terræ medietate, ac olei quantum satis fore videbitur, ut formam acquirat emplastrum. His peractis curam aggreditur sequentibus:

- ℞. Cera
- picis communis aa. lbss.
- aristoloch. rotunda. ʒij.
- mumiæ ʒij.
- antimonii triti ʒi vss.

M. f. Emplastrum & eo mane vespereque ligat, juxta consuetudinem.

Vel:

- ℞. Resin. abietis lbss.
- visci consolidæ ʒij.
- resci chelidonie q. f.

inde fiat Emplastrum.

Ad Ulcera mundificanda tali utitur remedio.

- ℞. Aluminis usi ʒss.
- in ʒ extincti
- mellis ʒss.
- aloë patci ʒi.

pulverisanda pulverizentur, & super ignem coquendo modicè commisceantur. & in emplastro non duci formam reducantur, hoc manè vespereque ligari vult Ulcera. Si vetera sint & prava calcinati parum addunt. & sic mundificabuntur ad fundum usque, moxque suadet sequentem consolidationem.

- ℞. fodicationem emplastri lbj.
- secundum artem Chirurgia composui, cui
- croci & addatur ʒss.
- & calcinati ʒss.

& inter manus commisceantur, hoc Medicamento liganda vult Ulcera manè vespereque in finem conclusionis.

Pro tertia curâ eò respicit, ut quod consolidatum est, hæc ratione stabiliat. ut singulis annis aliquot vicibus venæ magnæ vel varices aperiantur, & venæ sævientes in furis aut nodis extrinsecus aut intrinsicè pro damni respectu.

Curam Ulcerum emortuorum peragi vult per mundificationem & postea consolidationem, mundificationem perficit calcinatis; curam fodicationum emplastris: & conclusionem croco Martis. Calcinata miscet cum unguento de melle, hoc ligat tandiu, donec bonum funda-

mentum appareat, absque putrefactione carnis & fœtore, aut similibus, quod quinto ad summum die fieri dicit. Fodicationum emplastra ex lithargyrio vel colophonâ superponit & ligat, quinto quoque die renovat emplastrum ab initio semper continuando. Concludit curam croco Martis, quem in igne per se combustum aut reverberatione paratum, non peracetum U. a. ceribus istis inspergit quoquo die bis. Secundo etiam inspergit, lavatque prius Ulcus hæc aqua:

- ℞. communis aqua Mens. part. ʒ.
- aluminis ʒi.
- salis communis ʒss.

Et ubi mundè laverit, exsiccat, postmodum inspergit crocum Martis & concludit. Patienti post diaram aut ordinem in cibo & potu præscribit, nec non phlebotomias convenientes supra damni locum. Etiam in Thermis balneate reperit proficuum.

Sic quoque curanda vult Ulcera simul accumulata & crurum per se apertientia, admiscet tantum aliis ungu. de vitell. ovor. cum calcinati, add. oleo ʒi. Imprimis si duri adfuerint nodi. Sequens magni astringit:

- ℞. Coriisum ovorum calcinat. ʒss.
- aluminis usi & extincti ʒi.
- croci & ʒss.
- thuris
- maslicis
- myrrh. aa. ʒss.

His omnibus tritis utitur, ut moris est.

Curam fæciatum Ulcerum peragit Authos itidem mundificatione & consolidatione.

- ℞. Resina pura abietis ʒi.
- cum vitellus f. ungu. add.
- calcinata pro libitu.

consolidationem instituit per sequentia.

- ℞. Cera lbj.
- colophon. lbss.
- resin. quam coxisti ʒij.

liquefac omnia simul; postmodum injicit pulverem hunc maslicis ʒij.

- myrrh. ʒvi.
- carabus flavi ʒss.
- addis postremo.
- consolidæ majoris
- aristolochia rotunda aa. ʒss.

Redigit simul in emplastri formam, quo manè vespereque ligat.

In Cura Ulcerum, quorum unum in aliud genus transmutatur, eadem fere remedia approbat, imprimis Mercurium & lithargyrium: item Uleeris agnati curam & eorum, quæ fracturas, adustiones, vulnera insequuntur itidem peragi vult.

Ad Ulcera ex propriâ constellatione oborta curanda sequens commendat.

- ℞. Chelidonie Mij.
- folior. quercus Mij.

In simo putrescant, & postmodum in oleum destillentur, quo lavat hæc Ulcera, & dein pulverem ex istisdem ad incarnationem inspergit. Plura atque infinita ex ipsius Authoris lectis depromi possent, nos vero hæc vice selectis contenti sumus, non enim animus est omnia describere, sed tantum meliora.

Paracelsus noster de Fistulis differens inquit, Paracelsi nunquam hæcenus auditum esse, genus hoc Ulcus cura in fistulam lanatum per se fuisse, verum per Medicam.

M m m m 3

menta



menta solum & optime conditionata, alias vero minime curari testatur. Duplicem Fistularam agnoscit curam, videlicet internam per potiones, & externam per aquas & emplastra. vel aliis illinitionibus. Cum vero semel consolidata fuerint, nunquam amplius crumpunt, nec indigent conservationibus, & minus diata, in quem finem potionem talem commendat.

*℞. ciclamini Mj.  
sanicula alba Mj.  
herba Sophia M℞.*

Coq. in vino prout vulnerarias potiones.

Postmodum addit  
*caryophyllor. olei per alembicum tracti ℥ij.*

*M.*

Ter quovis die Patientibus dat in potum, ut in quovis haustu iusta sit olei portio mixta & æqualis. Hæc potione sola recentes Fistulas sanat. Ablutionem sequentem commendat.

*Destillat simul ℥ij. olei laterini, ℥vj. olei Terreb. ℥ij. olei caryophyllorum per alembicum,*

& postmodum cum additione hæc rursus destillat.

*℞. mastice  
myrrha  
thuria aa. ℥ij.  
mumia ℥ij.*

Destillato hoc abluit Fistulam immisione per Syringam usque ad fundum quovis die bis: vel intermissis vicibus abluit eodem instrumento saepius vino vel aqua falsa, ut in eis nullo putredo maneat.

Extrinfecus applicat fodicatum emplastrum cum calcinato mixtum, & eo manè vesperique ligat. secundum usum: alia multa quæ Fistulas curant, commendat, ut oleum Saturni, oleum Mercurii, aqua Mercurialis. Hæc certissima esse & minime fallentia Medicamenta renunciat. Sequens quoque commendat ad Fistulas.

*℞. ▽ de cornibus cervi lbj.  
centaurea,  
consolida aurea aa. ℥ij.  
parthenionis ℥ij.  
parthenionis ℥iv.  
His imponit  
rhabarbari  
manna elect.  
stermatis ceti aa. ℥j.*

Hujus optime commoti singulis vicibus mane vesperique exhibet cochlear unum, & mox inde vini cochlearia tria. His potiunculis mundificari ait internè Fistulam, per seque sanari, absque Medicamento latius externeque posito. Et si quid superponere velis, sequens suadet Emplastrum.

*℞. de gummi quatuor ℥ij.  
cera lbj.*

*Coquantur simul & injice  
visce botini ℥ij.*

*Fiat Emplastrum.*

Ad ejusmodi Ulcera putrida cavernosa seu Fistulas croci, hermodactylorum accipit grana vi. olei Nucis grana iv. permisceat ac in quinque partes dividit, quarum unam singulis noctibus administrat. Postmodum sequens Emplastrum imponit.

*℞. cera abietis albi lbj.*

*visci de botin. lbj.*

*resina communis lbj.*

Liquifiant omnia simul & eis addit mucum olei lbj, Mnis,

*Lithargyr.*

*lap. calaminar. aa. lbj.*

*tutia ℥j.*

*carabus ℥ij.*

Terenda conterantur, & ex omnibus fiat cerotum, & postquam satis coctum fuerit, addit

*calci corticum ovorum ℥vij.*

& in magdaliones agita t.

Ad Fistulas sequens empl. magnipendit,

*℞. Empl. de Mumia ℥ij.*

*visci de botin. ℥ij.*

*consolida rubra liquorum ℥j.*

Fiat Emplastrum, quod superpositum immotum ad sex dies maneat.

Postea innovat & æquè diu relinquit.

*Vel:*

*℞. Aqua Galotheni ℥ij.*

*olei vitell. ovorum ℥j.*

*mumia liquorum ℥vj.*

Fiat oleum, quo madidi panni superponantur.

Ad pustulosam Fistulam sequens præscribit:

*℞. liquorum carabis,  
asphaltis,  
armoniaci aa. ℥ij.  
ceroti de Mumia ℥ij.*

*M.*

simul in empl. formam & applicat.

§. 15. Helmontius in Cura Ulcerum instituit ablu-  
tionem fermenti corruptivi remediis vel internis, ut arcanis, quantum à principio interno dependet, vel externis, quæ sunt vel magnetica, vel ordinaria, suntque venena inversa & fixa, jamque mitia & mansucta, quæ ipsum Ulcerum fabrum & corruptorem enecant, non ut corro-  
dentia, & absteriva, ita ut Ulcera pro sua malignitate corrosionis gradus sui que augmenta optent. Talia autem sunt i. Realgaria fixa, unde Balsamus Fuliginis Paracelsi, i. e. Arsenicum vel auripigmentum, primo per Nitrum fixata, dein ad Sulphur adstringens dulcorata & mitigata per repetitam spiritus vini colobationem: quæ ad mentem Authoris Ulcera sanant, non quod rodunt & exedunt, sed quod jam venenum mite inanitumque nactum per sui dulcorationem, quo ipsum Ulcerum Venenum & Fabrum, sanguinisque corruptorem domant & enecant foras applicata.

Colchotar Vitrioli omnem Ulcerum corruptionem necare asserit, idque pro Ulcerum differentia diversis modè applicatum, sc. vel integrè maceratum in vino, quod tum solâ lotionem sufficit.

Laudat quoque terram ejus saltem elatani & edulcoratam ex ædè inspersam, ac nonnunquam in oleo lini coctam usque ad nigredinem, quæ pro basi est unguenti vulnerum Felicis V. Vitzii.

Restitutionem cavitationis per succretionem carnis & cicatrificationem pellis, quæ natura quidem per se præstat, quo semel enecato corruptore caro deinceps sponte à fundo lucretur.

Pescicariam sive piper aquaticum, Consolidam, Sophiam, serpentinam, brastatellam, &c. istud habere peculiare scribit, ut si frigida demergantur in aquam, & super Ulcus aliquan-  
tusque

Helmonti  
cura in VI.  
ceribus &  
Fistula.

## CAP. II. DE ULCERIBUS ET FISTULIS. 647

tisper intepescant, mox defodiuntur, conoso-  
lo : ubi putrere incipiunt, etiam attrahere sa-  
tagunt ex agro, quicquid nocuum est. Ulcera  
tantum odoribus per inuncta applicatis miscel-  
scere vel exasperari inquit. Ubi interim Ulcera  
externa longè peiora, per pharnaca oretenus  
sumpta sanantur : tamen ab ore longius di-  
stent quam interna : eò quòd viscera atque  
membranz internz juxta Authorem alantur san-  
guine plùs quam cruore. Ulcera mitigata irri-  
tariant abstergentibus. In curatione enim sem-  
per eò incumbendum esse inculcat, ut hostilis  
fabricator partique insidens corruptor deleatur,  
quippe qui nil exsiccando abstergendoque re-  
mittit miscellicque. Seminalis videlicet delecte-  
rii qualitas, venenosaque impressa Artheo par-  
tis exotica, bonum cruorem sibi dispenlatum  
pervertens, sui duntaxat ablationem naturaliter  
inducit. Est ergo virus, fermentum quoddam  
atque contagium fundo insitum, cruoris atque  
carnis corruptivum. Sunt enim totidem Ulce-  
rum fermenta, quot Ulcerum diversz corrup-  
tiones, corruptorumque distantie. Est ergo  
juxta eum plenis atque exacta Ulcerum sanatio,  
fermenti sui ablatio, non autem hepatis refrige-  
ratio, non bilis somniant vel fumi abstergio.  
Non enim realgar fixum per salem petre, atque  
in adstringens sulphur dulcoratum sive mitiga-  
tum, sexaginta forte Ulcerum diversitates ex-  
stinguit : quia rodit, exeditque ( etenim sic non  
sui dulcorationem cum repetito spiritu vini  
exposceret : ) sed quia venenum mite jam ha-  
bet. quod ipsum Ulceris fibrum, cruorisque  
corruptorem, est enecando, quo videl cet se-  
mel in totum demortuo, non cessat deinceps  
caro sponte è fundo succrescere. Itaque juxta  
illum cavitas Ulceris carnis succretionem pel-  
lisque cicatrizationem inducat, ut ablata sc. fiat  
restitutio. Author hic maxime carpit *Paracel-  
sum*, quod causas Ulcerum in microcosmi fodinas  
mineralis atque salinas transtulerit. Vult  
nempe cuncta salia, lapides, mineralia, herbas,  
&c. in homine velut feminatis suis delitere;  
non attendens, quod absonum sit, eum Micro-  
cosmum non minùs Aëris & plantis constare ve-  
liti, quam mineralibus, quod potius in salia  
quam in plantas, & quadrupedia se se resolveret.

Postremo totum esse Paracelsum ridiculum  
scribit, docentem; ulcus & Vlnusali herbis,  
balsamo, unguentis. *Helmontius* noster Col-  
corat dicit encrare omnem Vlnum ac Ulce-  
rum corruptorem. Sal Tartari per spiritum  
vini rectificali, donec adstringentem nanciscat  
gustum, magni estimat, esse balsamum Sa-  
mech Paracelli, prout ex Arsenico pro Ulceri-  
bus est ejus balsamum fuliginis : eò quòd apud  
peritos Realgar habeatur fumus Metallorum.  
Sexaginta enim Ulcera sanat Arsenicum fixum,  
quia Ulcerum venena necit, quod etiam præ-  
stat auripigmentum.

§. 16. *Villivus* Ulcus sub curâ habens primò  
istud acido-salium mitigare & extingueret, ac  
deinceps è corpore ejicere conatur, priorem au-  
tem finem attendit interius Medicamenti ex  
ocul. s. corall. rubr. eb. ust. Martial. &c. pa-  
rat : secundum verò diaphoreticis & diureti-  
cis. Externis etiam utitur ad materiam Ulcus  
foventis acrimoniâ contemperandam, qualia  
sunt absinthium, mentha, agrimonia, nicotia-  
na, myrrha, aloë, V. s. vitrioli, Saturnina, &c.

quæ in Curæ principio atque in Ulceribus  
minùs malignis conveniunt. Si verò Ulcus pu-  
tridum ac mali moris fuerit, fortiori adhibet  
Medicamenta acris fortiusque detergentia,  
cujus generis sunt ea, quæ cum Mercurialibus,  
vel oleis volatilibus commincentur; mundato  
enim Ulcere ad glutinanta devenire jubet, qua-  
lia sunt balsama, vel digestiva Vulnecaria pas-  
sim ubique descripta.

Chirurgicus tantum auxiliis munitus Author  
*Fistula* curam suscipit, callosamque ipsius cir-  
cumferentiam præcipitato rubro, vel albo di-  
gestivo admixto, vel cauterio potentialiqua-  
to, cui inungatur turundæ in Fistulam immi-  
tendæ, destruit, & si hæc debiliorem virum  
fuerit, trochiscis ex sublimato corrosivo, opio,  
& gummi tragacanth. paratis ad hunc finem uti-  
tur. Si verò Fistula profundius altiusque serpsit,  
& in corporis superficie posita sit, cultro  
aut forficibus cam ad ipsius usque finem aperi-  
endo, illiusque callosam tunicam supradictis  
Medicamentis excedendo : deinceps remediis  
appropriatis carni generationi, Ulcerisque  
consolidationi studet.

§. 17. *Sylvius* in *Curatione Ulcerum* eò reser-  
vatur, ut obtundatur acrimonia illa in causâ no-  
tata, dein mundentur ipsa à puris fordibus, post-  
ea consolidentur eadem ac cicatrificentur. Ad  
acrimoniam acido-acrem corrigendam laudat  
internè decocta vulneraria, aliasque mixturas  
ex oculis s. gñio diaphoret. paratas, quibus  
acidum acre satis donatur & absorbetur. Mun-  
dationem verò ac consolidationem Ulcerum  
consistere ait in correctione puris acidi roden-  
tisque, ulceratæ parti adherentis, atque san-  
guinem ipsi nutriendæ dicatam ex parte saltem  
corruptentis ac in novum pus vertentis. Cor-  
rigi verò illud pus parti affectæ adhaerens à Sul-  
phuris Balsamo laudato, imprimis ratione olei  
Aromatici, adeoque sale volatili oleoso abun-  
dantis; à quo spiritus acidus in pure luxurians,  
quin sanguinem in pus indies corruptens, non  
tantum obtundatur, sed insuper mitigetur,  
emendeturque ita, ut affluens sanguis partes  
priùs consumptas brevi reparet, consolidatio-  
nemque ultimam expediat. Quamvis autem  
existimet convenire quoque Ulceribus spiritus  
acidus externè applicandos, & quantitate par-  
vâ syrupis & mellitis junctos, præ aliis tamen  
laudat Salia tum volatilia, tum alia blanda per  
oleosa amplius obtusa, temperataque, qualia  
sunt Balsama sulphuris pleræque, & imprimis  
graviora, ut anisatum, succinatum, Juniperi-  
num, Terebinthatum, &c. quæ vel per se,  
vel cum syrupis mellitisque juncta extollit, in  
quibus quoque inesse ait vinum mundantem.

In Ulceribus Venereis approbat decocta su-  
dorifera guajaci, herbarumque aromaticarum,  
item lavationem, cæterasque evacuationes  
Mercuriales laudat. Quæ Ulcera venerea etiam  
abluat ac mundari jubet decocto guajaci, & cæ-  
terorum aromaticorum potentium, quin tan-  
gi posse ait sale volatili liquido & cupri turundâ  
imbuto. Unguentis etiam pro re nata admisceat  
Mercurium tum præcipitatum, tum sublima-  
tum ac præsertim dulcem.

*Fistularum* curam peragat Sylvius sequenti  
modo : callum amidendum esse jubet cauterio  
appropriato, sive sit ferrum ignitum, sive aliud  
Medicamentum consumens, ex late potissimum

*Willisii ra-  
tio curan-  
di vlnus.*

mum lixivioso paratum, quo facilius stylo profunditas ejus explorari possit, dein cuniculos discindendos esse monet, ac *acidum* acre peccantemperat internis sudoriferis, ex oculis *Q.* Ignio diaphor. bezoart. miner. decoct. lign. juniperi, guajaci, salassas. herbarum fumariz, scabiosæ aliarumque salibus volatilibus oleosis pollentium. Externè in Fistulis magnificat Author Balsamum de Capiba, oleum terebinthinæ, ejusque balsamum, vel balsamum sulphuris terebinthinatum, quo & ipsas has Fistulas omnium optime mundari ac consolidari posse non dubitat.

*Corispha.*  
*serum cu-*  
*rati Ulc-*  
*rum.*

§. 18. *Carissianis* ad veram *Ulcera* curationem impetrandam propositum est emundationem eorum omnium primò peragere, quâ obtentâ cavitatem carni student expleri, & cute illam investite, ut parti læsæ debita sua se restituatur integritas. Consistit autem illis emundatio ista Ulceris in separatione fibrarum destructarum, & succorum ex tubulis & canalibus suis diffractis & erosis effusorum & corruptorum separatione à partibus sanis, harumque præservatione, ne à prioribus similiter corruptantur, & succi vicinij inficiantur, ubi prudenter simul advertunt, si ulterior corruptio inhiberi debet, ut particulæ illæ gladiolatz acutæ & scindentes, quibus succi reperiuntur, hebetentur, attenuentur, frangantur, mitigentur & auferantur, ne ulterius ab iis sit timendum periculum, sed ex arteriarum extremitatibus parti læsæ succi communicentur destructibus istis particulis valenter obistentes, & impetum earum fragantes, ineptique ad partis nutrimentum & corroboracionem liquores eliminentur. Depurationem itaque totius massæ illius, ex qua diversè ad diversos diversarum partium ulus distribuuntur succi, remediis instituunt internis tum per secessum, tum diuresin aut diaphoresin recrementa quæcumque è sanguine abolentibus, præsertim ex lignis, antimonio, & mercurio compositis, quibus subjungunt porosa alia reliquias mucronatas recipientia, & impetum earum sistentia, quorum è numero illis exiunt Balsamus *Qii*, *Qus* *Oris*, magisterium *Hi*, nec non oculi *Qs*, myrrha, album *Oræum*, decoctaque magni habent in pretio, quorum sequens esse potest formula.

*Rad. Vincetoxic. 3℔.*  
*aristol. rotund. 3iij.*  
*Pencedan. 3℔.*  
*caryophyllat. 3i℔.*  
*Herb. scabios.*  
*scord.*  
*agrimon.*  
*veron.*  
*card. bened. aa. M℔.*

*summat. cent. min. Pj.*  
*flor. sambuc. P℔.*  
*rasur. lign. sabsfras 3iij.*  
*sem. fraxin. 3i.*  
*F. Decollio in q. aq. simpl.*  
*Colatur. lbij. add.*  
*Essent. Guajac. 3i℔.*  
*Tinctur. 3i℔.*  
*Syr. scabios. 3iij.*

*M. Propinentur ægro singulis diebus mane 3i.*

Ulcus ipsum abluunt spiritu vini crocato vel myrrhato, aut si magna adsit impuritas, deco-

cto scordii, *Ψc*, vel aquâ *Qali*, unguentaque illinunt, vel stupam aut turundam iis obductam imponunt, qualia ex terebinthinâ parantur, vitellis ovi, gummi elemi, & melle rosarum, & quæ fortiora sunt, ex resinâ pini, pice, fuligine, æruginè, alumine, sapone, præcipitato; ex compositis adhibent unguentum Apostolorum, aureum, basilicum, fuscum *F. VVürtzii*, emplastrum diachylon cum gummi, de gratia Dei, simulque inflammationi ulcus ambiens occurrunt unguento albo camphorato eidem filio, vel emplastro diapalmæ, cui colchotar *Qli* immittunt, aut cataplasma apponunt, quale sequens exhibet formula.

*Herb. apii,*  
*absinth.*  
*scord.*  
*rum.*  
*Pheclandra. aa. Mj.*

*flor. sambuc.*  
*melilot. aa. P℔.*

*Fiat decoctio ex vino, & addo farin. orobi 3i.*

*M. ut F. Cataplasma.*

Chylo ita in Ulceribus corrupto & inspissato, ut materiam pinguem lardo similem præsentet, etiam ab eâ Ulcera emundant resolventibus & destructivibus materiam illam inspissatam, præsertim sequenti lavamento.

*Herb. scord.*  
*absinth.*  
*centaur. min.*  
*sabin.*  
*flor. rosar. aa. Mj.*  
*Cog. ex vino ad 3xx.*  
*Colatur. add.*  
*aleci.*  
*myrrh. aa. 3i.*  
*Unguent. Egyptiac. 3i.*

*M. F. Injectio.*

Vermiculosi in Ulceribus nidulantes atque pediculos enecant amaris & *Qalibus*, aloë, myrrhâ, colocynthide, radice gentianæ, hellebori, diptamno, felletauri, melle chelidoniz, ex quibus tum decocta pro injectione, tum linimenta componunt. Factâ hæc ratione Ulceris commodâ emundatione, cavitatem carne implere student, removendo aut demendo reliquias chylum corruptentes, instillantque idpropter balsamum *Qis*, Peruvianum, de Capayvâ, vel remedia adhibent ex radicibus consolidæ majoris, aristolochiæ, ireos, herbis alchimilla, pyrolâ, veronicâ, nummulariâ, solidagine Sarcocodiz, mastiche, myrrhâ, gummi animæ, styrace liquidâ: vel ex compositis, emplastro diapalmæ, de gratia Dei, sicctico *Qali Ang. Sale*, de minio camphorato, quibus adjuvantibus si cavitatis satis carne conspiciatur repleta, operam locant, ut cutis eandem debite investit, coëscendo subtiliores chyli particulas, ne tam faciliè exhalentur, sed cum oleosis aliisque fibris mixtæ in superficie quiescant, & in substantiam cutaneam indurescant, quâ de causa remedia deprædicant ex lapide calaminari, bolo, calce loca, minio, antimonio, tutia, lithargyrio auri & argenti, plumbo uto, cerussâ, pompholyge, mastiche, thure, terrâ *Qli* dulci, ex quibus etiam composita existant unguentum diapompholygos, nutritum, emplastrum de lapide calaminari, diaphi *Myrsichis*, gileum, de Stercor

Stercore canis *Vignis*, oppodeltoch., *Fel. Vulturii*, & præsertim sequens magni æstimant, quo plura Ulcera, etiam satis antiqua nōrunt feliciter fuisse curata.

℞. *Lap. calamin.* ʒiʒ.

*min.*

*corniss.* aa. ʒvj.

*oliban.* nigr.

*alb.* aa. ʒij.

*maſſich.* ʒʒ.

*campbor.* ʒvj.

*olis alb.* ʒij.

*cera.*

*colophon.*

*resin.* aa. ʒij.

*Gummi. Galban.*

*terebinth.*

*ol. ovor.* aa. ʒij.

*Junip.* ʒvj.

*M. F. Emplaſtrum.*

Non tantum emplaſtro hoc ulcus bene mundatur, carne repletur, cute obducitur, & sic in totum conſolidatur, ſed hyperſarcosis prohibetur, & caro ſuperflua abſumitur, quam ob cauſam alias adhibenda ſunt alumen iſtum, præcipitatus, colochar aut oleum ꝑ. li. ærugo, cortices granatorum, lapis alchymia, aqua ꝑ. lis, unguentum fulcum, *Aegyptiacum*, quibus omnia caro illa laxior & ſpongioſior abſumitur, & melioris durabiliorisq. paratur proventus.

*Phila.*

In *Fiſtuſa* Ulcere fortiorum humorum viſioſorum exſiccationem neceſſariam eſſe præcipiunt, & calli abſumptionem, ut impedimentis huſce ablatiſſima carne expleri poſſit, & cura uſu in aliis Ulceribus peragatur. Remedia, quibus ſcopum hunc obtinere ſperant, parare ſolent ex radice chelidonii majoris, gentianæ, ari. heliobori albi, herbis apii, centaurei min. ſoliſ fabuæ, nicotianæ, ſemine ſinapi, raphani, naſturtii, ſucco, ari. chelidoniæ, apii, tithymalli, lixivio, æruginæ, auripigmento, vitriolo, calce, alumine, ꝑ. io ſublimato, præcipitato rubro, aquâ ꝑ. li, viridi *Hartmanni*, unguento ſulco aut *Aegyptiaco*, qualia dum adhibentur, partem ſimul corroborant cataplaſmatibus ex ruta, ſcordio, abſinthio, Phellandrio, ſalvia in vino coctis, vel emplaſtro de cumino, aut cerato ſantalino. Ex unguento ſulco vel *Aegyptiaco* in ſpiſſato turundam parant, eamque Fiſtulæ inſinuant, vel inſtillant liquorem mellis ab ꝑ. io abſtractum *Aug. Sal.* haſſamum ex ſcoriis Reguli ꝑ. li, liquorem ꝑ. li vivi, ꝑ. li ſati, oleum ſeu liquorem arſenici, quibus ſi calloſitas abſumpta ſit, ulcus non aliter quàm uſu ſuperius jam dictum eſt tractare pergunt, donec omnimodò conſolidetur, nec parvi ad ſelicem huiusmodi obtinendam curationem ſequens ducunt unguentum D. *Borhy*, quo plures Fiſtulas norunt ſanatas,

℞. *Plumb. Antor. Philoſ. calcin.* ʒiʒ.

*ꝑ. li viv. cum vitell. ovi agit.* ʒvj.

*Glister rubificat. & ter lei. ab omni acrimonia* ʒix.

*Lap. magnæ.* pp. ʒj.

*Ungu. roſat.*

*Inſig. Galen.* aa. ʒij.

*M. F. a. Unguentum.*

Ad cauterium ſive ipſum ſetrum candens congiunt, ſi prædictis remediis calloſitas abſumi nequeat, & plures cuniculos diſcindunt, ut una exiſtat cavitatis, cui remedia commodiùs queant

applicari, tum Ulcus hènè mundatum & abſterſum perfectè, ſanant, & ſequens propterea laudant emplaſtrum.

℞. *Ol. roſar.* ʒʒ.

*myrtillor.* ʒij.

*ceruſſ.*

*liſhargyr.*

*Lap. calaminar.* aa. ʒij.

*Tur. pp.* ʒj.

*Bol. Armen.* ʒiʒ.

*Campher.* ʒj.

*cera* ʒij.

*M.*

§. 19. Perſpectâ nunc Curâ Aliorum *Pharmaceuticâ*, ordine incedamus, & cuilibet Ulcerum ſpeciei peculiarem, & quidem ad mentem *noſtram* assignabimus Curam, quam etiam poſtulat, *Ulcera*. Ante omnia duo in Curatione Ulcerum accuratè attendenda ſunt, nimirum reſtitutio, ſive redintegratio valorum ruptorum, & materiæ ſtagnantis & intus contentæ acrimoniæ emendatio, quæ corrigenda & edulcoranda eſt, & hoc aliter fieri nequit, niſi materia temperetur, h. e. in primum ſuum, quantum poſſibile, reſtituatur ſtatum.

In Ulcerum ergo Curatione primariò ad acrimoniâ ſalutem reſpicendum eſt. Toti itaque maſſæ ſanguinea priùs per univerſalia proſpicendum, deinde tutiùs ad extrema detergentia, acidum temperantia & obſtructos labiorum poros reſerantia deveniendum, inter quæ laudem merentur ſpirituofa, & pulveres abſorbentes, volatilia oleoſa internè reliquis palmarum præcipitiâ, imprimis oleum baſſam. Peruv. cum cineribus clavellatis reſificatum. ſpir. matic. cum Elix. vitæ, &c. Imprimis enim eò annitendum eſt, ut ſucci peccantes corrigantur, acresque temperentur, quod ad curationem multum facit, hinc præprimis decoctum conſtituimus ſequens vel ſimile:

℞. *Rad. liquirit.* ʒʒ.

*chine*

*ſaiſaparill.* aa. ʒij.

*Herb. ſcord.*

*agrimon.* aa. Mj.

*limat. chalyb.* ʒʒ. vel

*pulv. ꝑ. li crud.* lbʒ.

Cocq. in aquâ communi & vino. De quo decocto æger bis vel ter de die ʒiv. bibat & quidem tepide.

Ubi ſimul Scorbutus conjunctus eſt, antiſcorbutica non negligenda ſunt, ut ſpir. tiſol. fibr. beccabung. cochlear. &c. In omnibus ſpeciebus Ulcerum æquè conducent diaphoretica, quæ omnem abſolvunt paginam, ſive ſint ʒniata ſive volatilia alealica oleoſa, &c. ſunt formulæ:

℞. *ꝑ. li abſor.*

*ſ. ſambuc.* aa. ʒiʒ.

*R. ʒni. ꝑ. li.*

*Eſſ. lignor.* ʒij.

*Syr. ſumar.* ʒvj.

*M. F.* Mixtura d. cochlearit, aſſumendo

℞. *ꝑ. li. ol. ol. ſ. u. d.* ʒij.

*ol. baſſ. Peruvian.* ʒj.

*M. d. gutt. xv.*

Laudamus inter diuretica ſequens ſudoriferum catholicum.

℞. *ꝑ. li. part. 3.*

ꝑ. j. fundantur per horam, ſic primò flamma exhalat, quod nihil aliud eſt, quàm ſpiritus nutriti.

nitis, ut verò hic aquiratur, detonatio per  $\odot$  tubulatam fiat, ita i recipiente acquiritur  $\sim$   $\odot$  tri. Diaphoreticus abluatur  $\nabla$  fontan. qui destruit acidum & sudorem movet: conitat spir. ex alici & nitro. Quibus Chirurgus Hanovienſis VVedling plura inveterata aliis incurabilia Ulcera brevi feliciter curavit. Sic & Brumæ est Empiricus quidam, qui quæcunque Ulcera feliciter sanat, ceu Nobis retulit D. *Gehema*. Extollunt plures viperina, quibus solis sæpius Ulcera auſcultant. Antimon. diaphor. bezoard. miner. optima sunt remedia, quæ constant ex alcali &  $\odot$  omnia quoque salia volatilia C. C. succini, &c. in usum vocanda sunt, quæ attenuant sanguinem & succos, eosque simul temperant. Mercurialia tum internè tum externè maximè conducunt, quod sint in Ulceribus sæpius altera Chirurgi manus, male verò usurpata Ulcera & Gangrænam excitare solent, ceu nuper in Nobili observavi, cui Empiricus artus illi vivit unguento  $\mathcal{E}$ li, à quâ illitione Sphacelus totam faciem cum faucibus devoravit, ut miserè vitam cum morte commutaverit. Conſet *Ephem. Germ. Decur. Ann. 4.* Quare prius succi temperentur, aliàs à  $\mathcal{E}$  omnes acidi acres interne in unam partem coagulantur, & dulcis Nobis in Ulceribus magnum præſticit commodum cum theriac. vel diaſcord. vel conſerv. roſ. ſingulis diebus à  $\mathcal{E}$  ad  $\mathcal{E}$  exhibitus, donec ſalvatio ſequitur. Sal  $\mathcal{E}$  noſtrum egregium exiſtit remedium tum internè, tum externè tutò uſurpandum quod citò, tutò ac jucundè curat ulcera & dulcem &  $\mathcal{E}$  Indi magna quantitate ſuis ægris cum commodo præſcribere ſolent. Sunt, qui ordinant præcipit. rubr. ad gr. iſſ. c. conſerv. roſar. & theriac. in Ulceribus, poſt uſum enim  $\mathcal{E}$  alium Ulcera & Fiſtulæ multum exſiccantur: ſed multi ab his abhorrent, & fateor. conſtatque noſtra experientia, quod sæpe alibus tantùm peragatur cura palliativa, & ægri ſcilè recidivam patiuntur, & majorem fidem adhibeo  $\sim$  matricali cum gum. guajac. vel ſiſſaſtras, vel ol. baſſ. Indic. &c.

Diuretica egregia in Ulceribus inveteratis remedia ſunt, hinc acidulæ. potus Theæ & Capheæ, cum decocto lignorum, vel veronica sæpe maximum aſſerunt commodum, & hiſce partibus, obſervata ſimul diæta exacta plures vidimus curatos & liberatos ab Ulceribus diuturnis & quidem mali moris. Hinc in Ulceribus inveteratis magnam vim habent a ſelli, ſicut præter *Roverium* mirabilia recenset *Celeb. Boyle*, item ſpir. eſſentif. cancror. vel viperar. vel  $\mathcal{Q}$ . baſſ.  $\mathcal{Q}$ . cum ol. lign. ſiſſaſtr. ſpir. cancor.  $\odot$  vol. ſuccin. eſſent. chatrefol. decoct. conſol. med. a dject. rad. chinæ. R $\mathcal{Q}$ . R  $\mathcal{E}$ ni  $\mathcal{Q}$ ſat. liq. terr. ſol.  $\mathcal{Q}$ . R aſellor. ſpir. fragor. cynosbat. &c. C. lidiora  $\sim$  volatilia remedia in Ulceribus quibuſcunque optima ſunt, quia ſuccos acidos & quaſi frigidos ſtagnatione ita ſiſtos, caleſciant, ad motum incitant ac volatiliſant, ſicque reſolvunt: frigidiора omnia nocent ſum opere, quia magis inſpſant ſuccos eosque aciores reddunt.

Purgantia angue pejus in quibuſcunque Ulceribus me judice ſug. eiſa ſunt, quæ tantùm ægros debilitant ſuccosque aciores reddunt, quia ſucci acidi non expurgari poſſunt, & cum centies purgaveris, nullum tamen Ulcus ſanabis, quod experientia quotidiana conſtat abunde. Conſuetudini tamen aliquid dandum eſt: ubi enim ſeroti abundant humores ſequens exuberj potest.

$\mathcal{R}$ . ocul.  $\mathcal{E}$   $\mathcal{E}$   $\mathcal{E}$ .  
reſm.  $\mathcal{E}$ .  
alapp.  $\mathcal{E}$ .  
 $\mathcal{E}$  dule. gr. vij.  
M. ſ. pulv. pro doſi.

Eodem carbone notamus V. S. & quamvis juxta veteres & aliquot recentiores bilis in cauſa ſit, impoſſibile tamen eſt eam V. S. eliminare, totum enim ſanguinem emittas, neceſſe eſt, bilis enim omni ſanguini permixta manet, vel quis ſtatueret debet, bilem tantùm ſolum per V. S. evacuari poſſe, quod certè abſurdum eſt ſtatueret. Sic & fonticuli non multum utilitatis aſſerunt in Ulceribus ſanandis, cum dulcem chylum tantum emittant & non corruptum; corrumpitur enim chylus in ipſo Ulcere ab acri corrupto ichore. Fonticulum pedi Ulcere laborantis adaptatum, parùm verò proficientem obſervavit mecum *Celeb. Franciſ. P. P. Heid. Decur. Ann. 6. Obſ. 31.* Uſum tabaci plures commendant, exinde enim plures Ulceribus diuturnis laborantes reſtitutos fuiſſe legi meretur *Obſ. Cl. Frommanni Decur. Ann. 3. Obſ. 167.* Sudorifica verò egregia ſunt abſorbentibus mixta in quem finem in juniorum Medicorum gratiam aliquot communicamus formulas.

$\mathcal{R}$ .  $\mathcal{E}$   $\mathcal{E}$  cachell.  $\mathcal{E}$ .  
cinnaab. nat. aurar. ppt.  
pulv. vip. vel Angelic. aa.  $\mathcal{E}$ .  
ciascach. cinam.  $\mathcal{E}$ .  
M. F. pulv. in  $\mathcal{E}$ . doſ. divid.  
Vel:  $\mathcal{R}$ . diaphoret. Helm.  
 $\odot$  viſa Berrhaa.  $\mathcal{E}$ .  
 $\mathcal{Q}$   $\mathcal{E}$ ni ſicci. Sylv. gr. vij.  
ciascach. citr.  $\mathcal{E}$ .  
M. F. pulv. divid. in 3. part. xq.

Vel pro pauperibus.  
 $\mathcal{R}$ . Flor.  $\mathcal{E}$   $\mathcal{E}$ .  
pulv. enul.  $\mathcal{E}$ .  
viperar.  $\mathcal{E}$ .  
myrrh.  $\mathcal{E}$ .  
ſacch. albiſſ.  $\mathcal{E}$ .  
M. F. Pulvis.

$\mathcal{R}$ . Extrall. cent. min.  
diaphoret. Helmont.  
bezoard. Oris aa.  $\mathcal{E}$ .  
ol. ſtil. ſiſſaſtr. gutt. iij.

M. ſ. pil. 60. & dentur pro doſi 20. cum  $\nabla$  card. bened. omnia etiam  $\mathcal{E}$ ta & volatilia conveniunt. In Cura externâ ad ſuccum ſeu materiam *Cura ex. interna.* effluentem intus latentem reſpiciendum eſt, num quoque materia craſſa, alba & abſque ſodore ſit, quod Ulcus ſcilè curatur, & non opus eſt multo apparatu, ſed ſolo unguento baſilico calidè inſulo, & emplaſtro ex eodem conſecto impoſito, ſi ſanies verò circa latera Ulceris reperitur, flava vel viridis fluidaque, ad fortiora tranſeundum eſt; quo enim Ulcera ſordidiora ſunt, eo fortiora requirunt remedia. Sequentia ergò conducent, quibus ſæpiſſime feliciter inveterata curavimus Ulcera, & aliquando cum Gangræna conjuncta.

$\mathcal{R}$ .  $\nabla$  calc. viv. lbj.  
viæ  $\mathcal{E}$ iv.  
M. quæ mixtura eluantur Ulcera.  
Dein  $\mathcal{R}$ . ſpir. vin. C.  $\mathcal{E}$ iv.  
oliban. pulv.  $\mathcal{E}$ .  
ſal.  $\mathcal{E}$ ni  $\mathcal{E}$ .  
alum uſſi  $\mathcal{E}$ vj.  
M.



Ipsi Ulceri imponenda.

Sequens omnibus ulceribus convenit.

℞. Nari ʒij.

ʒ crūd. ʒvj.

M. f. pulv.

Calcinetur & cum aq. commun. coq. & f. lixi-  
vium applicetur cum linteis duplicatis.

℞. Ol. hyper. ʒij.

Rgalban. ʒb.

℥ calc. viv. q. s. f. l. a. per agitur.

instar. nutriti. R ʘ à Celeberrimo Dn. Crugio,  
Conf. & Archiatr. Brandenburgico, Amico meo  
Veteri communicata egregias in Vulneribus &  
Ulcerebus navat vires. Omnia verò Medica-  
menta quod asterisco notandum, calide applica-  
canda sunt, quia calor maxime attenuat succos,  
hinc & facculi reliquis emplastris arena calida re-  
pleti imponi solent. Si Ulcus nimis cavum sit,  
injectiones variz fiant, ex decocto scilicet her-  
bar. absynt. scord. hyperic. veronic. agrimon.  
rutæ, cui add. Elix. vitæ, ʘ Regin. Hungar.  
calc. viv. Camphor. ex.gr.

℞. herb. chelid. major.

absinth.

ruta,

scordii,

mentha 2a Mj.

Rad. arisfol. O.

caryophyllat. c. 1010 2a ʒij.

Coq. in ʘ commun. colut. libij. add. ʘ ʒij.

facch. hni ʒij.

camphor. ʒj.

M. f. Mixt. pro injectione Ulcerum, & pro re nata  
addi possunt ʘ præcipitat. & sublimat. Imponi  
possunt ~ metrical. cum Elix. vitæ, facch.  
hni & Camph. vel sequens cum plumaceolis im-  
positum, raro fallens, & ex succ. hyperic. plan-  
tag. fanicul. aloë, myrrh. calc. viv. ʘ paratum.  
Emplastr. nostrum aromaticum sequens egregii  
est usus.

℞. gummi galban. libb.

sagapen.

opopanax 2a ʒij.

ammoniac. ʒiv.

Solv. in ol. sereb. colent. add.

gumm. Elem ʒij.

ol. ʘ per deliq. ʒj.

camphor. ʒij.

myrrhæ ʒv.

caryophyll. ʒij.

picis libj.

colophon. ʒb.

sereb. anth. ʒij.

Θ vola. C. C. ʒij.

cera q. s. M.

si hæc non cedat, sequente utere.

℞. Ung. basil. ʒb.

pulv. castor.

asæ fetid. myrrh. 2a ʒij.

Elixir. vitæ ʒij.

camphor. ʒj. M.

utere calide in Ulcere.

Hæc enim omnia crassum ac viscidum succum  
in Ulceribus attenuant, & simul acidum fer-  
mentum ibidem latens corrigunt, emendant-  
que, Medicamenta enim hæc ex volatilibus  
constant silibus, & gummosis pergratis oleosis  
particulis tubulos consolidantibus, quibus ceti-  
tæ acida & salia optime ligantur; sic & Elix. vitæ,

aliaque spirituosâ, impediunt ulteriorem corru-  
ptionem succorum, qui alias de novo affluentes  
à fermento acido latente corrumpereantur. Cu-  
ratio Ulcerum nihil aliud est, quàm consolida-  
tio seu oclusio apertorum & ruptorum vaso-  
rum, non enim ferre vasa in totum sunt de-  
structa, sed tantum in uno vel alio loco rupta.

Notandum hic, quod utrunque nec Ulceribus,  
nec Fistulis, quicquid etiam obgarriant Chirur-  
gi, sint imponenda, sed potius plumaceolæ un-  
guento aureo vel basilico inunctæ, vel spirituo-  
sis balsamicis oleosis madefactæ imponantur,  
dein totum membrum Ulcere infectum linteis  
circumvolvatur, per tam enim ligationem pori  
invertuntur, ne succi corrupti ita ad partem  
affectam tendant. Sic in Ulcere Tibiæ debet  
totus pes ligari, quia succi influentes, quasi libi  
certos poros formant, quo mediante tali liga-  
mento impugnantur, quod & confirmat expe-  
rientiâ edoctus Celeberrimus May. *Off. de usu  
funiculorum.* Sic quoque in exulcerationibus  
cum Gangræna, in obstructionibus glandula-  
rum, maxime cum fructu utimur cataplasmati-  
bus ex herbis roborantibus, scordio nempe, ab-  
synth. marrubio, ruta, si sambuc. rorissimar. & c.  
addi potest farin. fabar. sem. anis. carvi, & c. in sero  
lactis vel in lixiv. vel cum decocto herbarum in  
cataplasma. redactura, quod antequam impona-  
tur, aspergetur spirit. vini Camph. & Theriac.  
Mercurialia, imprimis sublimat. precipitat. alia-  
que egregia sunt in Fistulis & Ulceribus.

Sic quoque istud Ulcus, quod insequitur  
Gangrænam, non multum differt à curatione  
prædicti, quod sequitur phlegmonem, huic un-  
guentum basilicum prædictum cum gummi ele-  
mi, oleo Guajaci, Elix. vitæ & camphor. para-  
tum optimum erit cum plumaceolis calide Ul-  
ceri gangrænosum impositum, & simul ordina-  
rium emplastrum applicatum vel stypticum, vel  
de isabano, & c. Si vero Ulcus ad meliorem  
reducitur statum, commiserit postulat prædicto  
unguento & absorbentis vitriol. ʘ vel ocul. ʘ,  
vel ʘ diaphor. vel antihæst. Poter. Cannab. hni,  
Ebur. ppt. & mand. blucii piscis, & c. Et, si Ul-  
cus profundum & maxima adest corruptio suc-  
corum, quod ex sætore materiæ affluens appa-  
ret, tunc conveniunt infusiones ex rad. Angel.  
Imperator. Gentian. herb. absynth. rutæ, scordii,  
card. bened. & alij. Elix. vitæ, aloë, myrrh.  
camphor. R ass. fetid. Aër ante omnia ab ejus-  
modi Ulceribus arcendus est, incredibile enim  
dictu, quàm propediem materia in his Ulceri-  
bus gangrænosus corrumpi solet. Si à frigore  
fuerit gangrænosum Ulcus, tunc magis calidiora,  
ut ol. Philoloph. R. castor. bals. Peruv. vel  
bals. Chili Anglorum, aliis prædictis unguentis  
& mixturis addi, calidiusque applicari debent,  
ut & varia cataplasmata ex prædictis concinnata  
& calidissime applicata. Si Ulcera fuerint munda  
& ad mitiora accedendum est, & solus lapis  
sufficit bals. Peruv. vel de Capa. va, vasa vero dis-  
rupta facile consolidari vel cunniri possunt, modo  
consideremus, quod canal. caliper succi nut-  
ritii appositionem elongantur, usque offendant  
alium, quo se simul uniant.

Sic & Ulcera, quæ Anthracem excipiunt, eodem  
modo curantur ac prædicta, præ aliis se-  
quens conducet in hoc Ulcere.

℞. Elixir. propr. f. acido,

vii 2a ʒb.

N o n n 2

~ amme-

*Cura Ulcerum phagedænicorum.*

*Ammoniac. 3j.  
ol. guajac. 3℔. vel 3j.  
camphor. 3ij.*

In Ulceribus Phagedænis dictis conveniunt præter interna sudorifera, fortiora superius dicta, quæ sanguinem & succos simul temporant, decoct. liquor. vel oc. ☉ & diaph. Antihæc. Poter. quia temperata alcalia & non acris sunt diaphoretica, quæ hic præ aliis conducunt, & ægri in hisce affectibus semper ad sudorem disponendi sunt, in quem finem seq. vel simile cochlearim propinari potest.

*☿. ☿ fumar.  
fenicul. aa. 3ij.  
ocul. 20. 3j.  
sal. card. bened. 3℔.  
Elix. vitæ Matthiol. 3℔.  
laud. opiat. gr. j.  
syr. scord. 3j.*

*M.D.*

*Vel: ☿. Aq. card. bened.  
fumar. aa. 3j  
Essent. enul. 3j.  
☿. C. C. volat. 3℔.  
syr. scord. 3℔.*

*M.*

Ad corruptionem impediendam, & obstructionem relevandam, acidumque temperandum seq. socus applicatus apprimè conducet.

*☿. Rad. angel.  
bryon.  
gentian. aa. 3℔.  
Herb. cochlear.  
irisol. fibr.  
scordus  
menib. aa. Mj.*

*myrrh.*

*aloi. aa. 3℔.*

*Coq. in s. q. vini in vase bene clauso, colat.*

*add.*

*elix. vitæ 3℔.  
spir. ☿. 3j.*

*M.*

Varia quoque Emplastra imponantur ejusmodi Ulceribus, imprimis laudatur, quod Cartesianus adscriptum ex cerull. min. camph. lap. calamin. colophon. ol. ovor. &c. parat. quod egregium est, vel pulvis seq. inspergatur.

*☿. Croci ʒi ex ☿. ʒi. ʒij.*

*laet. luna 3℔.*

*myrrh.*

*aloi.*

*macis aa. 3j.*

*caryophyll.*

*camphor. aa. 3℔.*

*M.*

*Vel: ☿. Aq. calc. viv. ʒij.*

*☿. dulc. 3℔.*

*M.*

*Vel: ☿. ☿. calc. viv. ʒi℔.*

*spir. theriacal. camph. 3iv.*

*sachar. ʒij.*

*☿. dulc. 3℔.*

*M. probè.*

Sic post variolas epidemicas phagedænica in tibus cuidam exorta sunt Ulcera, quæ sat diu illucere Chirurgorum manus, & tandem insperso pulvere stercoreis ovilli feliciter à Parentibus fuerunt sanata, prout videre est ex *Obsev. 94. Decem. Eph. A. 6.*

Nunc ad curam Ulceris cum carie ossis conjuncti transeamus; sed cum de carie ossis hac inferius ex professo tractabimus paucis hic tantum nostrum expleamus officium. In his verò Ulceribus semper ad os respiciendum est, nisi enim prius cariem ossis sanaveris, Ulcus nunquam curabis, nam semper caro luxurians excrescit, quæ nullis remediis absumi potest, & si absumatur, statim repullulat, hinc cultro incisoria ad os usque penetrandum est, & animo cordato id faciendum. Cumque ab ære talis caries sæpe producatur, ad eum prohibendum applicetur Balsam. meus nervinus ex ☿ volat. spir. sal. armon. & ol. macis caryophyll. paratus, vel divinus, quo præmissis callum absumentibus remediis, nullum præstantius in Ulceribus ac Fistulis invenies remedium: & quidem calide balsami hi sunt admittendi, in quorum tamen defectu imponatur Ulceri Elixir. vitæ, vel aq. Regin. Hung. vel spir. matric. & per dies aliquot relinquantur, tantum de novo imposito plumaceolo hoc Elixir. imbuto; cave verò ne sæpius æri exponas hujus generis Ulcus, quod dilatandum, immitendumque carioso ossi Euphorbium vel myrrh. oliban. aloë, & spongia combustæ lotæque tantillum in forma pulveris, subinde unguentum digestivum immitendum, & spir. vini adiungendus, ☿ spir. & ☿, & os corruptum eximi debet: vel sequens.

*☿. Aq. Regin. Hungar. 3ij.  
Succ. plantag. 3ij.  
euphorb. pulv. 3ij.  
calchant. 3℔.  
myrrh. 3j.  
aristol. O. & long. aa. 3j.  
calc. viv. 3℔.*

Singulis diebus bis de hac mixtura cum plumaceolis madefactis Os corrupto & cavo impositum, adjunctis spongiolis eodem liquore imbutis. Sunt, qui singulis quoque septimanis cauteria actualia per cannulam cariei apponunt, ut & calchant. pulverem siccum ipsumque euphorbium: Ulceris verò duris labiis digestivum applicant, vel ferrum candens admovent, sine quo vix cariem ossis curari posse plures faveantur.

Si corruptio magna adsit, ejusmodi Ulcera *Cura Ulcerum* elaventur cum aq. Regin. Hung. vel Elix. vitæ, in spongiis addita camphor. & muria humana, vel succ. ab-

*synth. vel:*

*☿. Spir. antih. 3ij.  
Balsam. nervin. m.d. 3℔.  
Camphor. 3℔.  
ol. cochlear. 3j.*

*M.*

*Vel: ☿. Elixir. vitæ 3ij.  
aq. Reg. Hung. 3℔.  
spir. ☿. 3j.  
R. Euphorb. 3j.  
R. Q. 3℔.*

*M.*

Hisce remediis instructus Chirurgus mira præstat, ☿ volatilia enim infringunt acidum Ulcerum æque ac ossibus inimicum.

Si unquam eerte hac in Ulceris specie diaphoretica antiscorbuticis nupta optima & cærgia sunt, imprimis decoct. lignor. cū antiscorbuticis gr.

*☿. lign. sassafras. ʒi℔. aa. 3ij.  
rad. china 3ij.  
pimpinell.  
irisol. fibr. aa. 3℔.*

*Bacc.*

## CAP. II. DE ULCERIBUS ET FISTULIS. 653

*Bacc. juniper.* 3ij.

*Herb. trifol. fibr.*

*secd.*

*nasurt. aq.*

*cochlear. aa. M℞.*

*sal. Qi.*

*absynth. aa. 3℞.*

*Infund. & coq. vel in sero lactis, vel aq. colat.*

*3xxx. edule. syr. trifol. fibr. q. l.*

Interponenda sunt varia acidum absorbentia, & digestiva sepius dicta, ex 3 diaph. Bez. numeral. ocul. 3 Q. lat. parat. vel bis do die ager assumat seq. spirit. in vin. Malvat. vel Gallic. à vino enim acido abstinendum est.

*3. cochlear.*

*Balf. nervin. n. d. aa. 3ij.*

Vel: *3. R. corall. c. spir. Guajac. parat.* quæ est specifica.

Vel *Elixir. vitæ, vel sal. vol. oleos.*

Cerevisiæ ordinariæ iudatur Antimon. crud. lib℞. vel limat. Chalybis, quod maximè mortificat acidum in Scorbuticis, quod acidum & falsum maximè prædominatur. Purgantia hic & ubivis maximè nocent, acidum enim expurgari nequit, sed volatilia & temperantia dicta adhibeantur, hæc quippe interna remedia non tantum acidum temperant, sed & attenuant succos, eosque fluidiores reddunt, & ita Ulcera à corrupto nutrimento præservant. Sic quoque acidum per externa remedia temperatur, cum volatilia alcalia acidum destruant, & spirituosia id temperent. Spirituosa enim acidia infringunt, quod videre est inter alcalia & acidia commista, ubi sic effervescentia, & in effervescentia alcalia acidum abundant, certum enim est, quod in succis nostris certa & proportionata quantitas acidi & alcali seu salis volatilis continetur, & acidum sæpe prævalet, ut solet in Scorbuticis; hinc spirituosia assumpta succis admissa acidum oppugnant vel impediunt, ne corpori maiora mala accersiat, quem effectum etiam præstant ocul. 3. sacch. Hui. Sic & nostro iudicio acidum volatile in Scorbuticis debet restitui, hinc & pluribus Scorbuticis acidia blanda diora maximè conveniunt, & sine iis vi vivere possunt, fermenta enim nostra à primordio corpori nostro insula debent maximè conservari: atque hic sæpe maximo cum commodo utuntur externè spir. 3 Q. lat.

Externè conducunt & hæc topica ex rad. bryon. trifol. fibr. herb. secd. & trifol. fibr. cochl. & 3 Qi in vin. Gall. coct. & hoc eluantur Ulcera Scorbutica, si lardo similis est caro, hinc addi potest balf. nervin. spir. cochl. trifol. fibr. & Ammoniac. & imponatur Empl. superius dictæ, vel liniment. seq. vel simile:

*3. Ung. diapomph.*

*Basil. aa. 3ij.*

*pulv. myrrh.*

*aloes aa. 3j.*

*sal. Hui. spir. trifol. fibr.*

*ocul. 3. aa. 3℞.*

quod ungu. calidissimè Ulceribus Scorbuticis imponi debet, alias laterem lavabis.

Si dolores pertinaces adfuerint & quidem nocturni, tunc reliquis remediis camphor. cum suffic. quant. admisceatur, ut & pro re nata ipsius opium, dolorum dominor. Ulcera probè mundaria curari debent ordinariis remediis, ut Empl. di. vino. Si Ulcera verò forsan in pede vel tibia existant, conducit quoque balneum, vel

fotus, ex supra dictis herbis & radicibus parata, sed simul convenienti ligaturâ instituit. Ex. gr.

*3. lign. sant.*

*cert. Guajac. aa. 3ij.*

*Rad. gentian. 3j.*

*Herb. veron.*

*absynth.*

*trifol. fibr. aa. M℞.*

*nasurt. aquat. M℞.*

*Qi lat. 3ij.*

*M. Coq. in aq. communi,*

& cum Ulcera maligna comitem habeant ut plurimum Cachexiam scorbuticam, ad acres ergo particulas obtundendas collimandum est, ad consolidanda & exsicccanda ejusmodi Ulcera, qua de causa sequens linimentum ob vires egregias nobis sacrum dictum commendamus.

*3. Terr. sigill. frig.*

*Oli. Hass.*

*plumb. us℞.*

*croc. 3. aa. 3℞.*

*camph.*

*myrrh.*

*massick.*

*ceruss. lot.*

*3. dulc. aa. 3iv.*

*Balf. Peruvian. 3j.*

*3. vitell. ovor. q. l.*

*M. F. linimentum.*

In Ulcere hyperfarcosico, seu cum carno luxu- *Cura Mes-*  
riante, eadem interna remedia ac in aliis Ulce- *ri cum la-*  
rum speciebus conducunt, variat enim parum *curatio*  
in cura, & quidem externâ. Si enim corruptio  
maxima est, possunt & absumentia fortiora ap-  
plicari, & quidem seq. modo.

*3. 3. Regis. Hungar. 3j.*

*balf. nervin. 3ij. vel Elix. vitæ.*

*camphor. 3℞.*

*Mercur. sublim. gr. iij.*

*M.*

Communiter Chirurgi utuntur in hyperfarcosico alium, us℞. seu 3. Qi, vel præcipit. alb. vel rubr. nobis verò magis placent aloëtica, myrrhata, ut spir. matric. vel etiam ung. Ægyptiac. inspissat. Si verò hyperfarcosico contumax & magna sit, nil impedit, quo minùs cultro excindatur, hoc enim plus efficimus, quam mille alii in visibilib. cultellis, puta corollivis remediis. Si verò ager ferrum abhorreat, ad caustica trausendum est; ad hoc ergo conducit lapis infernalis, vel nostrum causticem aliquoties laudatum ex cineribus fraxini paratum, hinc escharæ digestivis impositis facile semper separari possunt. Si dolores maximè urgeant, digestivis camphora in majore copia addi potest. Si inflammatio urgeat, antiphlogistica conveniunt, ex gr.

*3. aq. fl. sambuc. 3ij.*

*card. bent. 3j.*

*balf. nervin. n. d. 3ij.*

*spir. fl. sambuc. 3ij.*

*camph. 3℞.*

*M. D.*

Si hyperfarcosico jam fuerit ablata, facile Ulcus convenientibus aromaticis remediis sanabitur, & raro ad ignem accedendum est, nisi summa necessitas urgeat, ac prædicta remedia diu frustra adhibita fuerint, solo enim balsamo divino nostro ea curare potes. Ubi lardo simile quid apparet, calx viva vel mortua imponatur Ulceri,

Nann 3

poly-

polychrestum enim est externum in Ulceribus aliisque, absorbet in se quaecunque acida corrosiva, & Ulceribus antiquis inspersa, absorbet sordes & fermentum Ulcerum acidum, insimul tubulos laceratos consolidat, & inter cicatrificantia optima est; sic quoque  $\nabla$  calcis vi-  
væ, Chirurgus  $\nabla$  benedicta dicta Ulcera sanat, & nuper forma quadam Ulcus habuit in genu, quæ solâ hac aquâ curata fuit felicissimè. Si  $\nabla$  hæc Ulcera abluantur linteaque imbuantur, verminosa licet ac putrida sint, tamen curantur. Supernatât huic calci crusta albicans subpinguis, si illinatur Ulceribus malignis cancris, singulare quid obtinet, destruit enim fermentum Ulceris corrosivum temperando, istud est enim alcali temperatum à  $\Delta$ re.

Curatio  
Viceru for-  
didi.

Sanatio Ulceris sordidi consistit in eo, ut san-  
guis & succi nostri attenuentur, fluidiores ac  
spirituosiores, sive magis fermentescibiles red-  
dantur, hinc conducit læpius dictum decoctum  
ex lign. sant. rad. salsaparil. Enuel. c. rad. chin-  
pimpinel. herb. scord. ped. leon.  $\Theta$  Qi, & ad  
eundem finem obtinendum conducit internè  
sequens.

$\nabla$ . Aq. Regin. Hung.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
Bals. nervin. v. d.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

M. assumentur gutt. 20. vel 30. in cerevis.  
aut vin. Hispan. & cum acidum in succis impe-  
rium exerceat, interponi potest pulv. ex  $\mathfrak{z}$  diaph.  
chalyb. & ocul.  $\Theta$  quod latius potens est in absor-  
bendis acidi aculeis, nec negligendus est spir. ma-  
tric. tum internè ad gutt. 60. assumendus, tum  
externè adhibendus, cui associari potest momen-  
tum gummi guajac. vel salsatr. vel alius: sudori-  
fera ac diuretica hic nunquam negligenda sunt,  
quæ diximus superius in speciebus Ulcerum.

Inter Topica eadem, quæ jam in reliquis Ul-  
cerum speciebus diximus, usurpari possunt,  
commendamus præprimis sequens vel simile li-  
amentum calidè usurpandum.

$\nabla$ . Ung. Apoll.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
Bals. nervin. n. d.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
 $\nabla$  Regin. Hung.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
Extr. absyn.  
cem. min. 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

M. F. Unguentum.

Ungu. nicotian. Vigani in Ulceribus sordidis  
proficuum est. Sequenti mixtura sive decocto  
eluantur Ulcera sordida.

$\nabla$ . Rad. calam. arom.  
gentian. 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
Herb. absynth.  
ruthæ  
scord. 22. Mj.  
 $\Theta$  Q.  
ammon. 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
pulv. colocym.  $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$ .  
M. Coq. in vin. Gall. add.  
colat. ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . Elix. vita  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
aq. Regin. Hung.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

Omnia enim hæc salia volatilia conducunt, qua-  
re & sequenti plures curavimus feliciter.

$\nabla$ . aq. Regin. Hungar.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
bals. nervin. n. d.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
Tinct. galban.  $\mathfrak{z}\mathfrak{iij}$ .  
myrrh.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
aloës  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
ol.  $\mathfrak{z}$   $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

M.

Vel:

$\nabla$ . Herb. trifol. fibr.  
scord. 22. Mj.  
absyn. Mj.  
myrrh. aloës 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
In vin. Gall. vel aq. calc. viv.  
coq. ad  $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ . cui adde  
aq. Regin. Hung.  
bals. nervin. n. d. 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

M.

quo calidè abluantur Ulcera, aut unguentum se-  
quens calidè imponatur.

$\nabla$ . aq. Regin. Hung.  
myrrh.  
aloës 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
 $\Theta$  alcali  
ocul.  $\mathfrak{ss}$ .  
 $\mathfrak{z}$  diaph.  
camph. 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .

M.

quo Medicamento quater de die imbuantur plu-  
maceolæ, & imponantur calidè Ulceri. Extr. ab-  
sint. scord. card. bened. egregia sunt aliis ad-  
denda. Saceharum & myrrha in Ulceribus putri-  
dis reliquis Medicamentis addi possunt. Myrrha  
enim Ulcera putrida veninosa & Gangrenam  
minantia curat. Sal fixum fuliginis, quod reperit-  
ur in  $\nabla$ , resolvi potest in oleum, quod in omni-  
bus Ulceribus mira præstat, cum alcalicâ suâ vi  
destruat acidum: lixivium scoriarum reguli an-  
timonii, egregium est mundans in Ulceribus sor-  
didis: ol.  $\mathfrak{z}$  per deliq. non contemnendum est  
remedium.

Dura labia scirrhusum tumorem referentia, Cura Ple-  
cei dictum, oriuntur ab obstructione & inde fa-  
cta stagnatione succorum, è quibus omne  $\Theta$  duris la-  
biis.

volat. evolavit in auras, quæ labia tum debent  
emolliiri variis emollientibus seu resolventibus  
volatilibus maritatis ex Elis. vitæ,  $\nabla$  Reg. Hung.  
bals. nervin. n. d. spir.  $\Theta$  ei altham. compof.  
Sunt, qui causticis nituntur huic scirrhusum tu-  
morem tollere, inter quæ lapis infernalis notissi-  
mus est, vel sæpe Ulceri imponantur absumentis,  
imprimis sequens:

$\nabla$ . lap. calaminar.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
virid. aris.  
alum.  $\mathfrak{ss}$ .  
vitriol. alb.  
 $\Theta$  com. 10ff. 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
Mra,  
resin. q. s. vel 22.  $\mathfrak{z}\mathfrak{v}\mathfrak{j}$ .

M. & f. l. a. emplastrum.

Hic & interna decocta sudorifera, in quibus to-  
tius curationis cardo vertitur, non negligenda,  
& dieta stricta, & etiam sudorifera observanda  
est; ab acido & salis proflus abstinendum est,  
imprimis verò cavendum est ab album. ov. bol.  
armen. aliisque repellentibus remediis, quæ  
omnia succos magis coagulant inspissantque, &  
sic ad motum & circulationem ineptos reddunt:  
interponenda ergo sunt liquida varia & spirituo-  
sa ac oleosa, ut  $\nabla$  Regin. Hung. bals. nervin. &  
 $\mathfrak{z}$  sublim. aliaque  $\mathfrak{z}$ ilia, imprimis  $\Theta$  nostrum  
Mercuriale hic quoque prosumt: alii seq. vel  
simile commendant pulverem.

$\nabla$ . ocul.  $\mathfrak{ss}$   $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
Aniseth. Poter.  $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$ .  
sang. dracon.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
præcipitat. alb. gr. vj.  
myrrh.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .

M. F.

*M. F. Palv.* inspergendus bis de die Ulceri Fistuloso, Rad. genian. hujusmodi Ulceribus angustis saepe immittitur, ut callum Ulceris Fistulosi exeat. Circa turundarum applicationem, seu dictum, melius plumaceolæ imponuntur quam turundæ, si verò quis præjudiciis occupatus eas potius amet, monendus est, ut filo alliget turundas, ut tutius, si altius descenderint & promptius, si tenacius adhæserint, revocari possint. Nostrates hoc cavent superiori turundæ parte incisâ & explicata, ut reductâ turundâ materia prius effluat, quàm altera & nova substituat, suppressâ enim illâ, sinus major dilatatio, dolor, inflammatio metuenda, quæ contigisse memorat *Scalpet. armament. Chir. p. 2. Obs. 86.*

Hoc in Ulcere verminoso & sanguis ac reliqui siccici corrigendi sunt decocto lignor. & interponantur simul anthelmintica, seu amara quæcunque spirituosius juncta, ex gr.

- ℞. *Elix. viâ,*  
*aq. Regin. Hungar. aa. ʒij.*  
*ess. seni. minor.*  
*R. tanacet. aa. ʒß*  
*myrrh. ʒij.*  
*ol. jassifr. gutt. x.*  
*arant. gutt. vij.*

*M. D.*

assumantur 60. & plures guttulæ in vino. Interponatur pulvis talis digestivus & resolutivus.

- ℞. *Q. O. l.*  
*ʒ. diaphor. aa. ʒß.*  
*myrrh. gr. j.*  
*ocul. ʒ. gr. vij.*

*M. D.* bis in septimâ.

Sic & Mercur. dulc. cum resin. guajac. & gumm. ammoniac. qui hebdomade semel assumi possent. Pueris vel infantibus conducet decoct. chinæ. vel rad. contraïervæ calidè bibendum & propinandum, & seq. iuxta.

- ℞. *Elix. vit. ʒj.*  
*bals. nervin. ʒj.*  
*ol. jassifr. ʒß.*

Gutt. vij. usque ad 10. pro ætatis ratione exhibeantur in vino Malvat. & potui ordinario addi potest *Q. O. latus.*

Externè imponatur panis mellitus Norinb. cum pipere vel mel cum pipere.

Si vulnus ob negligentiam in *Ulcus Verminosum* transierit, ut vermes viventes in corpore vivo conspiciantur, quale quid dum hæc scribo, in milite observavi, qui curatus fuit spirituosius adjectis myrrh. & aloë, imprimis verò Extr. absynth. cent. card. bened. scord. quæ egregia sunt in hisce Ulceribus verminosis: ubi Ulcus cum maximâ inflammatione & pustulis reperitur, omnia conveniunt, quæ de *Inflammatione* diximus, imprimis sequens vel simile.

- ℞. *V. æmât. n. d. vel*  
*aq. Regin. Hung. ʒiv.*  
*camphor. ʒß.*

*M.*

Maximè enim his acidum inflammatorium Ulcus excitans temperatur & obstruendo referatur. In Ulceribus cum maximo frigore calidiora usurpanda sunt. & cum hæc superius dicta sunt, nolumus crainben bis coctam apponere, & toties repetendo lectori nausicam parere.

Audiatis de *Curatione Fistularum* etiam *Notam Crispin.* juxta methodum verò nostram instituitur curatio hæc per remedia interna languis-

nem & succos nostros corrigentia, dein per remedia topica: 3. per ferrum sive cultrum.

Ea, quæ sanguinem ac succos corrigunt, sunt acidum temperantia, ac sudorifera superius jam dicta, v. gr. decoct. lignor. item ʒ. diaphor. bezoart. miner. ocul. ʒ. crystall. ppt. live volat. ~ C. C. sal. viperar. imprimis pulv. noster ex ʒnio & ʒ. paratus: unde in specie *Felix Platerus* in Ulceribus ex lue venerea aliisque diuturnis Diaphoretica potissimam curationis partem absolvente scribit, Diætamque sudoriferam eundem in finem *Marsium ap. Riverium commun.* 4. præscripsit. Hæc enim acres ichores & serolas superfluitates in continuum ad locum affectum fluentes eliminant, exque glandulis exprimunt. Sic quoque diuretica in Fistulis suam spondent opem, hinc potiones vulnerariæ seu diuretici maximo in ulu sunt Germanis seq. modo præscriptæ.

- ℞. *Herb. bader. terr.*  
*ʒl. hyperic. aa. Mij.*  
*Rad. Chinae.*  
*Genian. aa. ʒj.*  
*irras Florent.*  
*arist. l. O. aa. ʒß.*  
*Galang. ʒij.*  
*alb. grec. ʒij.*  
*sem. anis.*

Minutum concis. coq. in vin. Gall. vel Rheum. & aqua.

In hunc etiam finem & commendantur acidulæ de *Q. O. s.*, sale & alcali volatili participant, modicè, tutius & securius conducunt thecæ seu acidulæ calidæ Emblesentes aliæque, à quibus plures Fistulas observavi exsiccatas sanatasque. Loco harum & artificiales parari possunt thecæ & acidulæ. Salia volat. oleosa & quæcumque antiscorbutica egregii hic usus sunt, ~ matric. cum gumm. lassâras & ol. Balsâm Peruvian. destill. & ad gutt. v. vel plures, in aqua convenienti assumptus, & præsertim in sequenti vel simili mixtura propinetur.

- ℞. *aq. flor. sambuc.*  
*veron.*  
*beton. aa. ʒij.*  
*ocul. ʒ. pp.*  
*corall. rubr. pp. aa. ʒj.*  
*nitri fixat.*  
*alcali aa. ʒj.*  
*camphor. ʒß.*  
*syr. ʒ. ʒ. volat. ʒj.*  
*Syr. stryfol. fibr. ʒj.*

*M.*

℞. *Q. volat. oleof. n. d. vel Sylv.* vel alius, dentur gutt. 15. ad 20. & plures. Mercur. dulcis etiam aliis remediis admisceri potest, vel sal viperar. &c. In Mercurialibus latet optima vis.

Inter Topica & Chirurgica præprimis commendamus ferrum seu cultrum, quo incisio instituitur, siue qua *P. de Marchenius* Fistulam nullam curatam vidit, sub 50. annorum præcox suæ cursu, in omnibus enim Fistulis sinus denudandus venit, ut melius Chirurgus operari possit, totus ergo ductus, modo partis conditio ferat, præcunte & quasi viam monstrante specillo aut liquore quodam infuso, syringotomo instrumento hinc inde apud Auctores obvio & depicto, ab orificio ad extremum ulque fundum inciditur. Aliquando verò sine specillo prævio, cerâ muni-

*Cura Verm.*  
*in utrim-*  
*q.*

*Cura An.*  
*sternum.*



innitum in cuspidē scalpellum, ne lædat inno-  
cui: sintransu partes, vel cultro obtusis cuspidi-  
bus, ex arte ita paratis ad fundum Fistulæ immitti-  
tur. Tota caverna ergo aperitur, quæ incisio,  
ut omnium celsissima & momentanea quæsi, ita  
fecit optima censeatur, feliciterque in Curatione  
abscessus in tibia sinuoli à Fabr. Hildan. adhibita  
fuit cap. 4. Obs. 48. Curatio Chirurgica per filum  
olim quidein cridum & lineum, nunc sericum &  
infectum, ab Hippoc. de Fistul. memorata, & à  
C. Celfo plenissime explicata 4.7. c. 8. confratur.  
Tertiam ex filo & syringotomo conpositam  
operationem monstrat Scultetus tab. 45. f. 3. His  
autem omnibus ipsis pro portis conditione, ad  
¶ itur, succellu sæpe infelici, quem nuper in  
desperata partis interioris Fistula post vulnus  
plumbæ sclopeti mamarii glande illatum, reli-  
ctâ laborante obieravi. ubi cum ob venarum  
& nervorum majorem ramos sectio tuto instui  
non posset, aliis etiam Medicamentis neque-  
quam proficientibus, post extractam prius ex in-  
teriori & externa femoris parte glandem, *Frater  
memi Joh. Frid. Dolani, Chirurgus*, & à servitiis  
Serenis. Marchion. Brandenburgensi penicillis  
ex lana carpta extructis, & ¶ sub connubio  
Mercur. dulc. imbutis brevi & feliciter sinus cal-  
losos curavit, nec non balsamo quodam divino  
Nobis dicto mira in Fistulis curandis præstat, qui  
paratur ex viride æris cum saliv. mixt. & cavitati-  
bus Fistulæ applicat, cum turunda, quod reme-  
dium Callum brevi tempore absumit. Sunt,  
qui male hanc aquam, nec non S. O. li. suspec-  
tum reddunt, præsertim in lachrymali Fistulâ,  
ob metum excursus in vicinas partes, plusque  
solidis & crassioribus confidunt, metus hujus  
expertibus. Fistulâ apertâ Ulceri imponantur  
specilla & plumaceola, quæ labia solutæ uni-  
tatis distendant & coitionem impendant, post  
calli rudendum ablationi est, siue Medica-  
mentis, siue ferro, siue igne munita in ambi-  
tu parte. Cautica remedia jam sunt nota.  
Ferro præciditur callositas, si æger consentit  
levi doloris sensu: & sanguine effluente felici-  
ter peracta operatio censeatur. Novacula  
itâ callum à Fistulâ incurabili removit Chirur-  
gus apud Borellum c. 4. Obs. 53. post mundan-  
dum Ulcus aquis vulnerariis, decocto apii,  
& supra dictis incarnandum, & ad cicatricem  
ducendum est. Borellum ubi æger sectionem  
admittere recusaverit, labia Fistulæ alumine  
ustro corrolâ, post ungu. ex alum. ol. nuc. cer.  
& cineribus formato, & ung. ex sacchar. ol.  
olivæ, argent. viv. ad partes æqual. confecto  
obtentum vidit cap. 2. Obs. 67. Solus quoque  
succus plantag. & urtic. vel decoct. persicariæ,  
ad motis simul parti affectæ foliis contusis cu-  
ram absolvit. Antequam verò ad ferrum siue  
ignem actualeni accedamus, ad quem verò  
meo judicio raro confugere aptum erit, facile  
enim nervosæ partes & venæ siue arteriæ læ-  
duntur, tentanda ergo sunt generosa remedia,  
quæ sæpe callositates sanaverunt, ex. gr.

- ¶ *Aq. Regin. 3j.*  
 ¶ *sublimat. 3j.*  
*R. galb. 3℔.*  
*Campb. 3j.*  
*vitriol. alb. 3℔.*  
*spir. ☉ xci volat. 2ij.*

M.

Si ignem amas, applica prius oleum terebin-  
thinæ cum plumaceolo, & dein admove  
ferrum candens, quantum ferre potest æger.  
Ubi plures & anfractuosi sinus, ibi convenit  
sequens:

- ¶ *Unguent. Ægyptiac. 3℔.*  
*aloes 3℔.*  
 ¶ *dulc. 3j.*

Coq. ad consist. pro turundis conficiendis.  
Inflari etiam possunt pulveres sicci cum calamo  
scriptorio. *Sachsum* maxime commendat suc-  
cum cancerorum, qui & nostrâ experientiâ  
comprobatum est in Ulceribus ad cancerum ten-  
dentibus. Seq. ergo per siphonem injectum  
conducat.

- ¶ *ligni sancti.*  
*sassafras.*  
*rad. chin. 2a. 3℔.*  
*gentian.*  
*aristol. O.*  
*ireos florent. 2a. 5ijj.*  
*Herb. nicot. Mj.*  
*Fl. hyperic. M℔.*  
*alum. crud.*  
*aloes.*  
*alv. Graci 2a. 3ijj.*  
*aq. fortian. lbij. vini Rh. lbj.*

Coq. ad consumpt. Med. Colat.

- ¶ *3iv.*  
*succi cancer. 3℔.*  
 ¶ *dulc. 3j.*

M.

Alii quins. essent. 3nii, alii liquor. fl. Δ im-  
mittunt. Alii Empr. sticticæ de gratia Dei, Oppo-  
deltoch, Saturniæque commendant.

Si ossis caries conjuncta sit, prius illa curan-  
da supra dictis & infra adhuc dicendis reme-  
diis, pars enim cariola abradenda, hocque  
legitimè peracto, caro laudabilis brevi iterum  
accreseat. Potest & tantum ossi corrupto eu-  
phorbium inspergi per se, vel cum melle ro-  
sato permixtum, quod in squamis & ossis car-  
ie auferendis, felicissimum semper invenit  
etiam Hildanus, hinc mundificato satis Ulcere  
& reducta carne, pulv. præcipit. balsam. Tô-  
letanum, vel ol. Peruvian. filamentis applicu-  
it, ut cicatrix plana & pulchrior fiat. In Fi-  
stulis diuturnis crystalli stanni cum melle ro-  
sato applicati commendantur à pluribus Chi-  
rurgis.

Cæterum Hnus tanquam quarta Chirurgiæ  
columna est, absorbendo acida, destruit cau-  
sam proximam omnium Ulcerum. Nuper in  
puella 7. annorum Fistulam in coxendice habente  
felici cum succellu sequentem injici curavi  
mixturam.

- ¶ *Decoct. calc. viv. lbj.*  
 ¶ *sublimat. 3j.*  
*succi absynth.*  
*veronic.*  
*scordi 2a. 3℔.*

M.

Spir. essentif. canceror. vel viperar. vel Oj, Bals.  
Δ cum S. lign. sassafr. parata. Bals. flor. vel Δ  
3nii fixati egregium est sanguinis purificans. In-  
ter sudorifera sequens laudamus.

- ¶ *3nii cœni cacheetic. 3℔.*  
*ennabur. nativ. ppt.*

p/sy.

pulv. viperar. aa. ʒj.

elasacch. cinam. ʒʒ.

M. F. pulv. in 3. dof. divid.

℞. Diaphor. Helmont.

aur. vna Burrōi ʒʒ.

℥ ʒni fixat. sty. gr. vj.

elasacch. citri ʒʒ.

M. F. pulv. divid. in 3. part. æq.

Vel pro pauperibus:

℞. Flor. ʒ ʒʒ.

pulv. enul. ʒiiij.

viperar. ʒj.

myrrh. ʒj.

sacch. ʒʒ.

M. F. pulvis.

℞. Extrac. centaur. min.

Diaphor. Helmont.

bezoar. ʒaria ʒj.

ol. ill. suff. sty. gutt. ij.

M. F. pil. 60. & pro dosi 20.

Externa exsiccantia sunt cineres canctorum, tabaci, fulig. omnes calces metallor. edulcorata, Antimon. d'aphor.

℞. Lapid. calam. ʒiiij.

litarg. pulv.

ol. olivar. aa. ʒij.

maslich.

oliban. aa. ʒij.

M. f. l. a. Empl. confert etiam Empl. ʒni, vel sequens:

℞. minii ʒʒ.

ol. olivar. ʒj.

juniper.

peir.

ʒis aa. ʒʒ.

antimon. rubr. ʒj.

M. f. l. a. Emplastum.

Fontanellæ conceduntur à Michæle, item Jüngken Chym. Exper. de Ulcerb.

Acidulæ & thermæ à pluribus commendantur, thermas artificiales ex O, ʒ & pauco ʒ laudat Celeb. D. Joh. Mich. Febr. Praes. Colleg. Curios. Amicus noster singularis. Succus betulae & pini assumi potest.

Diuretica in Fistulis, ʒ ʒ, spir. cancror. sale suo volat. essent. ʒ vol. succin. & ejus liquor essent. chæresol. ocul. ʒ. D. M. liquor. diuret. ex test. ovor. & lap. ʒ. Balsam. ʒ cuminat. juniperin. succin. pineat. & terebinth. Ex antimon. & calc. viva & ʒ cum ʒ lixivial. & applica calidè: item confert lixivium ex cortis ʒni, ol. ʒni. item liq. ʒni bals. ʒ. ol. ʒ rubri ʒni aa. ʒj. M. oppodeltoch Paracels. bals. ʒ saturat. confert etiam in cancro. In foraminulis verminosis applica seq. Agricola.

℞. ol. ʒi per deliq. q. l.

ʒ-li calcinat.

ol. olivar. q. l.

M. ad consist. liniment.

Balsam. vulnerarius cachecticus D. Hagendornii

egregius est, nec non Balsamus vulnerarius contra sphacelum, ne accidat hic Fistula.

℞. Ol. ʒni & caryophyllor. aa. ʒʒ. Camphor. ʒj.

M.

Dein consolida cum Ungu. Aloëpatico Birlingii. Sequens etiam conducit liquor balsamicus ad Ulcera in Fistulis.

℞. Terebinth. Venet. lbj.

Vermic. pistor. lbʒ.

maslich.

myrrh.

thur. aa. ʒj.

V ʒiv.

M. F. Bals.

digerendo & destillando.

In Ulceribus verminosis commendatur à Paterio decoct. ʒ cum ʒ dulci paratum.

In Fistulis optimè instituuntur suffumigia ex mastiche, thur. ass. tartid. gumm. galban. succino, &c.

Sequens magnificat Cl. Blankardus, Amicus noster, in sua Chirurg. & tribuit compositionem feminæ euidam Anglæ, quo remedio, ut ille ait, plures mille hominum curati fuere.

℞. Camphor. ʒi.

ʒis alb. ʒiv.

Contund. minur. & imponatur vasi lapideo, torrefiant parum, ut miscantur, uti in confectioe lapidis alchymiae fieri solet, donec rubescant, & add. bol. rubr. ʒiv. sedulo deinde custodiantur. Hujus pulveris ʒ. cochlear. plena M. c. ʒ pluviali lbj. paulisper bulliant, tum parum ʒ gignatur. ut aq. clarescat, quæ mixtura eluantur sape Fistulae imbuanturque pluviaecola. Praelaudatus Dominus Blankardus commendat etiam sequens:

℞. ʒci ʒiv.

Vitrioli Roman. ʒiiij.

litarg. aur. ʒʒ.

℞. Camphor. ʒj.

Hujus pulv. ʒʒ.

Coq. in ʒ pluvial. dein add.

N. M. ʒʒ.

precipitat. rubr. ʒʒ.

M. ʒ instar soti impone Ulceri Fistuloso.

Sic & Ulcera etæothica plura, frustra adhibitis aliis generosis remediis, cinere tabaci sanata vidit Celeberr. Wedelius, item insperis pulver. terreis, inandibulis lucii piscis, inuprimis Saturninis & Galibus, quibus remediis Ulcera Venerea antiqua & rebellia curantur quotidie.

In Ulceribus & Fistulis egregium est remedium Balsamum de Chili naturale, in Angliâ apud Dn. William Salmon, Profecilorem Medicinæ, usitatum & guttatim applicatum. Vide de balsami hujus viribus Encyclopediam Nostram Medicam in linguam Anglicam à prædicto Celeberrimo viro W. Salmon translatam, & Londini impressam.

## CAPUT III.

*De Gangræna & Sphacelo.*

## §. I.

Cùm nullus ferè in Chirurgiâ cadat ex innumeris calamitatum myriadibus atrocior affectus, inò tota in Medicina vix ullus offeratur morbus lamentabilior crudeliorque ipsa *Gangræna & Sphacelo*, nullus certe infensior Tyrannus est quam Sphacelus; hic enim tantâ atrocitate atque sævitiâ in humanum corpus sævit, ut nulla propè pars sit, quæ ipsius tyrannidi & sævitiæ se subtrahere, aut ab ejus invasione securâ esse possit, inò nobis viventibus integræ partes corporis nostri inmanes inter cruciatus & æstus igneum, tandem omni sensu motuque destitutæ moriuntur atque putrescunt, & ne animantis necrosis sublequatur, congruisque remediis occurratur, ab initio, à vivente reliquo corpore, crudeli manu Chirurghi, ferro & igne separantur & abscinduntur. Neque enim is adest aliorum morborum perfunditor infestator, aut ad salutem quandoque terminatur, sed ubi semel nidum suum elegit, pertinacissimè inhæret, & haud duntaxat partem illam, quam aggreditur, corrumpit mortificatque, sed citò pedè progreditur, ac sæpe, nisi, ceu dictum, citissimè occurratur, totam microcosmi machinam destruit, ægrumque sine ulla salutis spe è medio tollit. Qui ergo hujus pessimi mali sævitiâ auxiliis generosis repelli ac coërceri possit, Tyronibus hisce pagellis breviter declaraturi sumus. Primo itaque ut bene intelligant, de quo affectu scripturi sumus, ejus nomen ante alia explicabimus. *Gangræna* igitur dicitur à γὰρ & φῆμι, quia maxime devorat instar cancri vel lupi, hinc etiam omnes fere Interpretes, N.T. gangrænam in *Epist. D. Pauli ad Timoth. 2. c. 2. v. 17. gangrænam per cancerum vertuntur*, & si λέγει αὐτῷ οὗτος ὁ ἀνθρώπος ἵππῃ, & sermo eorum ut cancer scripit. Omni enim Gangræne proprium est, quamprimum labem communicare partibus sibi vicinis, & hoc quidem brevi. Dicitur & aliis ignis S. Antonii, ignis Persicus, Esthiomenus Germanis vocatur *der heisse Brand* / meliori jure dici potest, *die anfangende Erstörung*. Describi potest, quòd sit alicujus partis incipiens & imperfecta mortificatio, à pluribus causis obsequentibus oborta, hinc à nobis Gangræna incipiens mortificatio succorum nominari solet, sive principium ad perfectam corruptionem sanguinis & succorum.

*Sphacelus.*

*Sphacelus* à Græco nomine σφάκελος, & σφῆτις, à jugulando, enecando, dicitur, quia affectus hic partes corporis humani viventes, modo semel in iis radices egerit, enecat: ab aliis dicitur σφακίλιος, item Esthiomenus, Necrosis, Latinis autem sideratio, i.e. sideris percussio, mortificatio, corruptio, putrefactio, plenique tamen retento Græcorum nomine appellatur Sphacelus, Veteribus Ignis S. Antonii vel Marcelli vocatus fuit. Germanis nostris audit & improprie *der kalte Brand* / meliori vero jure *die vollgogene oder vollkommene Erstörung* / sive perfecta mortificatio. Sphacelus describi potest, quòd sit succorum & solidarum partium humani corporis corruptio ac

mortificatio plenaria, ab obstructione tubulorum omnium orta. Sphacelus enim est mortificatio & corruptio ipsa, quæ nil aliud est, quàm secessio succorum, quòd succi ita confusi inter se commoveantur, ut nunquam iterum ad pristinam suam mixturam redigi possint; sic & textura vasorum simul est dissoluta & rupta.

§. 2. De *Subjecto* Gangræne ac Sphaceli d. *Par. aff. Sa.* ceptatur inter Medicos ac Chirurgos; sunt qui cum Galeno seu Angelo (anagramm.) Gangrænam in carnosus, Sphacelum autem in spermaticis partibus residere statuunt: alii mortificationem & corruptionem in carnosus partibus Gangrænam vel Sphacelum, in ossibus verò exsionem seu erosionem vel *cariem* vocari existimant. Sphacelum verò nostro judicio esse tam carnosarum, quàm ossium partium corruptionem, mortificationemque, quis inficias ibit? Omnes partes corporis humani, tum internas, tum externas Gangrænâ ac Sphacelo affici posse, præter experientiam quotidianam compluribus & innumeris Practicorum observationibus patet: sic uterum, pudendum muliebre, scrotum, brachium, à pulvere pyrio expulso, pollicem, faciem, pedem, tibiam, perinæum, anum sphacelata egomet observavi. Sic nec ab eo insontia sunt v. l. c. tra, imprimis intestina, uti in dysenteria sæpius Sphacelata reperi, quo intestinorum Sphacelo Princeps quidam Hassæ olim, cheu? defunctus est. In gingivis & labiis vidi nuper in infante 3. annor. vicioloso Sphacelum. *Dodonæus* vidit puerum 6. annorum, cui Sphacelus brachia, pedes, & aures occupavit, ita ut puer mutilatis ac amissis membris perierit. Cerebrum quoque Sphacelo affectum nuper in milite observavi. Nec cor immune, sed sideratum & escharoticum in peste intercepto inventum tradit *Helmont. & Tn. Baribol.* Aliorum viscerum Sphacelos notantur Auctores.

Et Nos hinc concludimus, omnes partes corporis, imprimis verò solidas subiectum Sphaceli esse. In Gangrænâ verò sæpè sanguis cum succis tantum absque solidarum partium læsione afficitur, ceu experientia constat, quòd unico applicato remedio omnia iterum restituantur.

Sic in Gangrænâ ac Sphacelo non tantum quæcunque vala corporis nostri, sed etiam tendines & ligamenta mortificantur. Hic asterisco notandum, prout Gangrænâ ac Sphacelus ut plurimum membranosas carnosasque occupant partes, ita si glandulose attingantur, Cancer, si ossa, vocatur affectus *Caries*. Observamus autem toto die, partes illas, quæ paucis gaudent nervis, aut etiam à corde sunt remotiores, h. e. qui sufficientem accipere nequeunt sanguinis ac succorum influxum, potissimum dicto affici malo, unde quoque inferiorem corporis humani præ superiore vulgo invadi Gangrænâ conspicimus, quia scilicet in illo reliquis partibus crassior, adeoque minus mobilis continetur sanguis ac succus, quàm quidem in superiori, uti

uti evidentissimè ex legibus motus sequitur mechanici.

*Diagnosi.*

§. 3. Nunc paucis attingamus Diagnosin. Gangrænæ ex inflammatione indicium est, cum color ab initio flavus apparet, mox ingravescente malo cum diris & immanissimis cruciatibus abit in fuscum & livescens colore, & simul exoritur pulsus grandiores ichore loturæ carniū simili refertæ, multò autem remissior calor, dolor ac pulsus insequitur, quàm qui cum inflammatione præcessit, & quæ pars ad mortificationem tendit.

Tumor quoque, qui antea extensus est, nunc collabescere incipit, & relinquit eum attingendo soeam instar œdematis. Si à frigore oritur Gangræna, tunc adest, (qui tamen brevi mitescit,) dolor pungens, pars fit livida, & locus evadit instar glaciei frigidissimæ, reliquæque jam dicta signa quoque parum apparent; ab hydropæ, ab initio dolores sunt mediocres, si verò pars ad mortificationem tendat, dolores ingravescunt, pulsus cessat, vel fit minor, parsque livescere incipit & insensibilis redditur.

Si à defectu succi nutritii affectus noster producat, ab initio nec dolor, nec tumor, nec inflammatio adfuit, pars verò redditur frigida ac torpida, & affectus hic observatur ut plurimum in externis artubus, manibus scilicet, pedibus, naribus vel auribus, & sæpe affectus hic absque dolore ad perfectam mortificationem transit.

Si à contriçtione, ligaturâ fortiori affectus hic exortus fuerit, ex duritiæ partis, tumore, doloribus intensis & inflammatione, vesiculis aqua repletis & nigrore seu livore partis, cognoscitur, membrum fit grave & immobile, pars cum vaporibus intumescit, & ipsa cutis à carne discedit, si incidatur, nihil præter vaporem cum paucâ lymphæ quantitate effluit.

Si à moriū venenatorum cum ulcere vel abictu, statim insequuntur febres malignæ, cum deliquissimæ, vomitibus & delirissimisque pestiferis morbis solemnibus signis.

*Signa Sphaceli.*

Signa verò Sphaceli Diagnostica quod concernit, cognoscitur ratione temporis incipiens Sphacelus, si calor, rubor, dolor, pulsionis & tensionis accidentia sunt intensiora, quam in suppurationibus esse solent: perfecti Sphaceli signa sunt, cum pars livescat aut nigrescat, tumida, mollis & cadaverosa appareat, idque sine ullo arteriarum pulsû, nec dolor addit, nec sensus ullus, ut etiam sine sensu doloris alitè scalpulum adigi possit; si enim pars ita laborans secetur, pungatur vel aduratur, ut non profusus sentiat æger, ac simul exsucca omnia existant, Sphacelus dici potest, si verò adhuc sentit, dicitur Gangræna. Observamus etiam in Sphacelo, quòd si digitus imprimatur, non facile decedat in profundum, nec postea resiliat & relevetur, nec soeam relinquit. Abscedit quoque à subiacente carne cutis, & scetidum tanquam acrem emitit halitum atque ichorem, quem adstantes vix ferre valent. Febris adest maligna in summo gradu, ac in ipsa peste.

*Ætiologia Gangrænæ ac Sphaceli secundum Galenicum.*

§. 4. Ætiologiā Gangrænæ ac Sphaceli Galenicus hoc modo peragunt. Appellat Gangrænā alicujus partis ob inflammationis, qua conflictatur, magnitudinem, mortificationem non, quæ jam confirmata sit, sed quæ etiam nunc fiat: nam quoniam jam pars emortua est, ipsi Sideratio,

& Sphacelus Græcis, affectus nominatur, quem Gangrænæ terminum dicunt, hanc esse partis corruptionem in fieri dicunt, illam vero in facta esse. Corrupti autem partem statuunt, quando calor ejus natus exstinguitur à valida quadam intemperie, aut à nimio frigore, sive ab hyemali tempestate, sive à medicamentis nimium refrigerantibus; ut in summis inflammationibus. Fieri etiam dicunt à nimio calore externo, qui nativa consumpta humiditate, nativum calorem, subiecto carentem, dissipat & exstinguit; id facere ajunt summam inflammationem, & medicamenta frigida in Erysipellate, Sclopetorum, vel maxime venenatorum ictus, vulnera item ob intemperiem calidam, qua partes eliquantur & nativo suo calore destituntur. Fieri quoque Gangrænā censent à moriū venenati animalis, à crisi, facta nempe humorum pravorum in partem aliquam translatione, ab arteriotomia & ancurismate, à marsamo, à luxationibus, vehementibus ligaturis, compressionibus, contusionibus, & pororum conspationibus, quibus secundum eos naturalis calor suffocatur.

Sphacelum tam mollium, quàm durum partium mortificationem statuunt perfectam, & cum pars sensum amisit, non amplius Gangrænā, sed *sphaxos* appellant. Hunc affectum etiam ossibus accidere putant, quoniam circumfusa caro vitiosos humores saniosos generans his pertrigaverit illa ac putrefecerit.

§. 5. Paracelsus partibus Gangrænā inferri *Causa* arguit, si à natura Narcotica stupor quidam fuerit inductus abolito sensu, & tum calor præternaturalis supervenerit, abs quo ignis hujusmodi accenditur, hinc Author Gangrænā Anodynā quandam vocat usionem inde ortam. Itaque plures ignis Persici species constituit, nam alium comparat lignario igni, alium montano seu *Æthnæo*, tertium salis Niri, alium *Refinæ*, &c.

Alibi Author etiam Persicum ignem dicit Siphureum corpus accensum, quod ex suo transformatione stilido, cum omnibus speciebus sulphuris, & est calx sicca & calx viva liquida, quæ suam accensionem à liquido sale recipit. Postmodum urit, consumitque membrum penitus, uti calx cadaver aliquod. Tium priorum transformationem mortalem efficere consumptionem ait, cum proprium & innatum in ipso calidum sit elementum occultum.

*Sphacelum* partibus inferri ait, quando calor ejus à salibus penitus sit absintus, ita ut melior pars membri penitus destruat.

§. 6. *Helmontius* Gangrænā partiali cui inferri dicit à sale quodam corrosivo, degenerate, tum.

ex lege, & à vitali Republica proscripto, abs quo ingens in parte producat calor, eandem adirens, gangrænans, & instar gliris subinde carnes erodens. Gangræna quoque secundum Authorem totaliter mortificat. Hinc & sæpe ejus causam deducit à spiritu vitali alcalisato; nam ad transmutationis tam peregrinæ & exoticæ (à peregrina sc. & exoticæ imagine productæ; tabiem, quicquid est vitale in ipsamet solida partium substantia, id totum exardescente principio vitali irato, ac succensu, accenditur, variosque morbos (qui in Gangrænâ ac igne Persico), parit.

Ab eodem terrefacti & in rabiem succensi  
Oooo 2 Archi

Archei initio contingere ait, nunc in stomacho, nunc in pelle, tum etiam subinde in ipsamet solida Similarium, unde lethales deducit Sphacellos, atque Escharas contingere vult pro diversitate partium, ad quas Archeus furibundus ac terrore plenus diverterit.

*Causa Gangraenae & Sphaceli secundum Willisium.*

§. 7. *Willisium* opinatur, Gangranam exoriri à cruore ob nimiam vel visciditatem vel crassitiam tardius circulante, & in laxiore quadam parte stagnante, atque à succo nervo similis visui affecto in fibris, per quas fluit, resistente, sanguis enim in aliqua parte cæspitans cito exardescit, ac ebullit, volatilioresque illius particulae mox evehuntur, ipsumque vehementius commovent. Sed quam præ tenuitate sua per poros viam sibi parent, brevi evaporantur, dominiumque cedunt salinis particulis, quæ nec à spiritibus, nec à tenuioribus sulphureis temperatæ fluoris statum assequuntur, & acrimonia sua partis substantiam destruant, spiritus vero animales glutinosiores crassiorive vehiculo fibras nervas obstruunt involuti, partes, ad quas tendebant, attingere nequeunt, vel pauci tantum ad illam perveniunt, quò fit, ut nulla vel exigua solummodo contingat solutio-nis contigui in parte facta perceptio.

*Sphacelo* partem quandam affligi autumat *Celebertinus* Author noster, quando scilicet succi extravasati visciditate aut crassitie donati tantam adepti sunt acrimoniam, prorsus dissipatis vel oppressis, aut narcosi affectis spiritibus animalibus, ut partis, in qua resident, substantiam penitus destruant ac disperdant, absque ulla doloris sensatione, tum enim liquor ille stagnans spissior existens, & fibras nervas comprimens, spirituum animalium sensus uti & motus minorum ad partem accessum impedit. Liquor etiam nervus summa tum temporis pollens crassitie aut visciditate, fureculorum nerveorum tubulis inhaerens, viam spiritibus ex cerebro defluentibus omnino præcludit, partique omnimodum cum cerebro commercium impedit. Liquor autem accidit ex ampliatis ab humore corro-dente fibrarum interstitiis, à quibus lucis radii absorbentur.

*Sylvii opinio de causa Gangraenae & Sphaceli.*

§. 8. *Sylvius* ab acido acri cutem ac carnem corruptentem *Gangranam* oboriri docet, & quidem sæpe corruptionem hanc tantam esse dicit, ut pars colorem rubeum aut subpurpureum nanciscatur, talem tamen, ut ad integritatem redire possit pars affecta; quamprimum autem cutis vel caro ad nigredinem pervenit, con-clamatum esse ait, atque tanquam extremè corruptam emortuamque cutem aut carnem considerat, unde *Sphaceli* ortum suum habet.

*Cartesiani opinio de causa Gangraenae.*

§. 9. *Cartesiani* ad succorum cum sanguine per tubulos partis alicuius prohibitum transfluxum, & omnimodam illorum in ea coagulationem in *Gangrana* causa proxima constituenda confugiunt. Obstructionem enim adesse dicunt vehementiorem & contumaciorum tubulorum & canaliculorum per partem distributorum, ut ipsa illa pars nullum nanciscatur nutrimentum, vel non sufficiens, cum per obturatos canales oculosque arterias succi & sanguis perfluere nequeant, sed hic in fluore suo impeditus subsistat, coaguletur & mora sua reliquo sanguini transfluxum impediatur, ut hic similiter ob-transitum denegatum subsistere & coagulari cogatur, unde interdum non una duntaxat pars, sed totum

corpus subitaute emoriatur. Hanc autem succorum coagulationem & valorum obstructionem originem quandoque sumere docent à frigore externo validissimo, abs quo motui succorum obstitente lymphæ primum, tum sanguis ipse à circulatione ad quietem cogatur & coagulationem, particulae vero succorum stagnantium porosæ & angulares mucronatæ à materia subtili suscitatur, in se invicem impetuosius agentes, fibras vicinas membranosas & musculolas dirumpant, discendant & partes ita destruant. A remediis nimium adstringentibus & frigidis tumoribus calidis live inflammationibus importune appositis, succorum transitum impediri & stagnationem promoveri recensent, uti à combustione, rebus erodentibus, morfu animalium venenatorum, contusione & abscessione vasa & partes dirringuntur, erodantur, & destruantur, ut tubulis ita vasifici destructis vel compressis nulli ulterius succi ad partem devehantur, insuper succi à venenis aut salibus scorbuticis coagulati ad fluxum reddantur inepti. Defectu necessarij alimentij sanguinem etiam & succos interdum inspissari & corrumpi norunt, ut partibus conveniens detrahatur nutrimentum, suaque privetur vitalitate.

Quamdiu coagulatio ista succorum in vasis *Sphaceli* adhuc incipiat, & motus interstitium particulæ etiamnum in succis adsit porosiorum & angularium vehementior, ut pars cum tumore valde incalescat & rubeat, subtiliores vero & volatiliores eorum particulae avolare pergant, relictis solummodo crassioribus obstructioni inducendæ aptis, *Gangranâ* partem laborare fatentur, sed consumtis tandem particulis istis lymphæ, sanguinis & liquoris nervosi volatiliores, & succis istis totaliter coagulatis, ut circulatio in parte omnimodò prohibeatur, pars ipsa colore plumbeo aut atro educatur, & fæcore inficiatur, ipsum *Sphacelum* adesse dicunt, necrosin sive lethalem partem extinctionem, cujus corruptio partis vicinas facile inficiat, quandoquidem lymphæ in proximis vasis, & sanguis in vicinis arteriis in fluore & transitu suo impediri subsistere cogantur, qui dein succi stagnantes aliis affluentibus obicem ponant, usque dum omnes in universo corpore succi coagulentur, & mors totalis subsequatur, nisi pars emortua in tempore amputetur, & totali isti succorum coagulationi prohibendæ studiosè prospiciatur.

§. 10. Enim verò *Nos* existimamus, *Gangranâ* *Nosrasen-* nam incipientem in totali fere omnium tubulo-*rentia de* rum & pororum consistere obstructione usque *causa Gangraenae.* adeo pertinaci, ut non amplius sanguis ac succi, sed subtilis saltem horum succorum vapor ad partem *Gangranosam* perveniat, qui paucos illos succos ibi adhuc existentes commovet, turbat, aciores magisque corrosivos reddit, hinc fibræ nervæ penitus abscinduntur, quo ipso pars magis obstruitur, & omni motu ac sensu destituitur, atque ob denegatam nutritionem livorem induit. Sic *Gangranâ* sæpè ab inflammatione in corpore cacochymico vel scorbutico oborta natales suos habet, vel ab applicatis incongruis remediis astringentibus, repellentibus nempe, aut refrigerantibus & emplastiscis, vel poros obstruentibus, quæ omnino circularem sanguinis cursum ac succorum impediunt, ipsos suc-



cos inspissant ac coagulant porosque obstruunt. Si enim inflammationibus imponuntur adstringentia, succi ab his quasi incarcerationentur, ut coagulati & inspissari debeant, & cum indefixate particulæ in tenellulis vasis hæreant eosque obturent, necessariò impediunt circulationem reliquorum succorum, ut sanguinis, lymphæ & succi nervosi, è quibus dein partes citiori quasi cõguntur, si ipsis congruis remediis haud propediem auxilium afferatur, & exulent remedia repellentia dicta, per ista enim medicamenta imposita, v. gr. bolum cum album. ovor. por. cutis obstruuntur, ac sic particulæ heterogeneæ eliminari nequeunt, atque impeditur, ne materia cœlestis influere & obstructionem queat referre. A frigore intensâ oritur sæpe Gangræna, quoniam frigus succos facili Marte coagulat, imprimis lympham & sanguinem, qui succi stagnantes sæpe totum membrum in putrefactionem ac fœtidam corruptionem præcipitant, hinc à perniciobus ex frigore obortis Gangrænam observavimus sæpissimè. Notandum hic, quòd Gangræna ut plurimum extrema artuum, ut digitos pedum vel manuum occupare solet, & ceu plura novimus exempla, quia h's in partibus adsunt pauca vasa sanguifera, & consequenter paucis sanguis ad calefaciendum, & pressio sanguinis hic minor est, quàm in aliis partibus; sic & impetus sanguinis in has partes cessare incipit, & irradiatio spirituum minor est, & in partibus hisce maxime tunc sunt obstructions. Ab hydropoe sæpissimè oritur Gangræna ac Sphacelus, à quibus præ aliis inferiores partes hydropicorum affici solent, quoniam hæ per longum tempus spatium ab abundantia aquæ fuerint distentæ, sique compressæ, à qua compressione tubulorum, imò ab eorum exsectione & corruptione facillè affectus hic oboriri solet, lymphæ enim in hydropicis corrosiva acrisque exsilit, & hoc in casu adiunt magnæ obstructions in tubulis, pauci enim adsunt spiritus, instar fulminis aliàs influere soliti, & calor minor, quia nulla amplius circulatio succorum in his partibus fit: à defectu succi nutritivi sui chylosi, excitatur sæpe hic noster affectus, cum enim omnes canali culi obturati, vel abscissi, vel nimis compressi fuerint, ut pars nullam amplius nutrimentum accipiat, non potest non fieri, quin pars ista emarcescat ac emoriatur, hinc affectus hic observatur in debilibus macris & emaciatis sæpe subiectis.

Quandoquidem affectus hic noster produci- tur à nimis fortiligatura in fractura ossis, vel ob aliam causam instituta, imprimis si simul parti affectæ à Balnea: ore alioque Empirico astringentia & repellentia, seu refrigerantia ac poros obstruunt medicamenta male applicata fuerint, quæ sæpe in hunc finem apponere solent (ut pessimè ratiocinantur,) ne affluxus fiat humorum ad partem affectam, & hinc uti solent bolo armato, alb. ov. & aliis frigide applicatis obstruentibus. Rara est sequens observatio, quam Celeberrimus Valæschmidt noster notavit: Chirurgus quidam septuagenario majore vesicatorum in tarso pedis applicuit, subsecuta est statim Gangræna, quæ in Sphacelum degeneravit, tandem turbato à pessulenti hoc acore sanguine totius, profundior accessit somnus, quem elapsis aliquot diebus ipsa mors excepit. Causa funesti hujus experimenti fuit lymphæ defectus,

quæ spicula cantharidum aliàs demulcere solet, hæc autem magis sic sui juris facta fibras nervosas amputarunt, quæ in cinnos retroactæ angustationem pororum, partium vicinarum compressionem, & succorum in tali senectute, jamdum vi corrosiva contaminatorum stagnationem creaverunt. A Fractura Tibiæ in senibus facillè observatur Gangræna, quod fit à nimia ecchymosi live compressione live à defectu spirituum, quale quid hodie observavimus in Aulæ magistra nostra.

Affectus hic à morfu venenatorum animalium, imò canum rabidorum oboritur, ceu non ità pridem exemplum hâc in civitate contigit, ubi fœmina rustica à cane rabido fuit morsâ à quo morfu Gangræna & Sphacelus illico oboriebantur in tibia, quam licet Chirurgus ferrâ amputaverat, attamen altero die ad plures abiit, & à fermento venenatorum animalium acido, salivæ inexistenti, dentibus sanguini communicato oritur, à quo massa sanguinea corrumpitur, hinc oriuntur febres, deliquia, deliria, quæ maximam perturbationem sanguinis denotant. A dentibus quoque franguntur vasa lymphatica ac sanguinea ex quibus succi effluunt, hinc comprimuntur reliqua vasa nervæ, à qua compressione spiritibus ut fluxus denegatur, hinc affectus hic oboriri solet. A combustione Gangræna sæpe produci solet, ceu ætate decrepita in indite observavimus, cujus brachium à torme. to bellico VV. censeitini solo pulvere pyrio fuit combustum, quævis propediem congrua adhibita fuerint remedia, nihil potuit effici, quoniam à pulveris pyri igne, nervi, vasa sanguifera ac lymphatica omnesque tubuli fuerint corrosa, abscessus rupti, ut pereat plane nulli succi amplius ad partem, brachium nempe, fluere potuerint, hinc brachium cadaveritatum fuit, quod tandem ferrâ amputatum fuit, secundo vero ab operatione die placide defunctus est æger. Tempus enim amputationis ritè observandum est, aliàs si jam sanguis fuerit infectus, frustra instituitur crudelium hæc operatio.

Affectus hic etiam produci- tur à maximâ confusione succorum, in hac vel illa parte existentium, item à contusionibus, abscessionibus vasorum, anthracibus seu carbunculis, præsertim à scorbutico contumaci & maligno, cæcæ gingivæ aliasque oris partes, præcipue in infantibus, ceu nuper observavi in variolis puero defuncto, qui etiam affectus Batavorum infantibus solemnis esse solet, & ipsi dicunt der Waaterfrees. Tandem ut ritè intelligatur, quo modo in Gangræna calor imminuat, sequentia perpetuata sunt: 1. Tubuli obstructi à tergo venientibus succis ita prenumuntur, ut rumpantur, quibus ruptis, succi evasuntur & fermentatio nulla amplius in iis observatur, stagnantes enim aquæ efficiunt paludes fœtidas, hinc pars necessariò corrumpi debet, similique modo, ac videmus in plantis, quæ reservandi gratia prelo prenumuntur, dein chartæ agglutinantur ad illas exsiccandas pro herbario vivo, primo eas prelo subungimus, quòd si parum premantur, colorem viridem retinent, si vero à prelo vel pondere nimis magno fortius premantur, & quasi læcerantur, tunc statim nigrescere solent herbarum live frutices, quia sic succi unâ vice, & cum impetu exprimuntur.

Affectus hic quoque facillè à scorbutico produ- citur,

citur, item in infantibus in ore sæpe oritur Sphacelus, quia in histextura vasorum est flaccidior, & eorum sanguis nimis fermentans est, sed & crassior, in primis, quando à scorbuticis parentibus nati sunt. Sic & in ore saliva separatur, quæ si existat ex sale & acido aliisque corrosivis particulis, faciliè causam huic affectui dare possunt. Quod verò in Gangræna pars influmata & rubore prædita in lividum transeat, ratio hæc est, quod ob obstructionem nimiam succi in partem affectam influere nequeant, hinc reliquæ particule confusio & inordinata commixtio inspissatorum & coagulatorum succorum itidem oritur ab instructione.

Dein ab heterogenea mixtura succorum oritur sæpe corruptio, quia faciliè à corruptione reliqui succi corrumpuntur, pari modo, ac videmus, quod pomum putridum aliud pomum sibi vicinum eodem imbutus characterè. Sanguis evasatus stagnansque colorem vel rubicundum, vel cæruleum, vel sublividum refert, prout videmus in contusione aliisque coagulationibus sanguinis, pustulæ verò, in quibus sæpe aqua subrubieunda, vel aliquando flava continetur, oriuntur ex eo, quoniam succiacres & cutis tubulos, & per consequens vasa lymphatica & minutissima vasa sanguifera perfrigerint, ex quibus vasis distentis & necessario ipsis ruptis liquor intus contentus effluerè debet. Quod verò pars flaccescere incipiat, ratio est, quia spiritus animales aliqui succi, imprimis ob obstructionem factam influere, & ita partes distendere nequeunt, hinc privatæ partes his liquoribus talem colorem exhibent, dolor verò & sensus pereunt, quia nervi comprimiuntur non tantum, sed & rumpuntur, & per consequens spiritibus animalibus influxus denegatur, quo denegato fibra non irritatur, siquæ neque dolor, neque sensus percipi solent.

In incipiente Sphacelo pars redditur sublivida & frigidissima: ratio est hæc, quod ab obstructione nervorum & denegato spirituum influxu, acidum & alcali in succis non amplius commoventur, hinc nullus motus intestinalis seu fermentatio oritur, omnia enim hoc in casu comprimuntur & effringuntur. Ex hisce ergo omnibus abunde patet, partes tunc Gangræna affici, cum ipsarum tubuli ita sunt obstructi, ut paucissimus sit sanguinis & succorum in illos influxus, aut per illos transeurus, seu circulatio. Dicimus, paucissimum in Gangræna esse influxum, ad differentiam sc. indicandam, quæ circum illam & Sphacelum, in quo nullus planè adest sanguinis & succorum reliquorum influxus: nam in Gangræna relictæ adhuc sunt tubuli quidam aperti, in quos spiritus & succi aliquatenus possunt influere, hinc quoque vita illius partem ad breve aliquod conservatur tempus, nec tam difficilis hæc est curatio, quam Sphacelus.

*Causa Sphaceli.*

Sic Gangræna ac Sphacelus tantum gradibus differunt, eandem enim ferè, seu dictum, agnoscunt causam, in Sphacelo vero omnia deteriora sunt. Nostro iudicio tubuli ferè omnes, in quibus circulatio succorum fit, disrupti, corrosi & fracti sunt, imò sanguis reliquique succi adeò corrupti existunt, ut nullus motus intestinalis, nullaque fermentatio amplius inter ipsas fieri possit, imò sæpe induunt indeoleum & æti corrosivi, omnia erodentis, nil ergo nisi corruptio & mortificatio inde speranda, omnia redduntur

cadaverosa, & vitæ expertia; in Gangræna verò adhuc paucissimi tubuli aperti sunt, per quos succi aliquantulum influere possunt.

Cùm verò tubuli omnes sunt disrupti, nullus succus in istis circulari potest, his enim salvis faciliè fermentatio in succis his excitari potest, novi enim liquorem, qui si in membrum, brachium sc. vel demortui alicujus arteriam infundatur, partem illam reviviscere dices, prout sæpius in demortuis hunc effectum obicrvavi. Sphacelum ergo gigni dicimus, quando in parte quadam adest totalis tubulorum obstructio. Videamus nunc paucis obstructiois hujus causam, crassi enim & acidi corrosivi succi, dum motum suum per partium tubulos pertolvere nequeunt, ibidem hærendo obstructiones multas efficiunt, & interea ibidem continuo cum spiculis istis scindentibus partium fibras solvunt, adeoque efficiunt, ut in cincinnos veluti chordæ tensæ resiliant, unde tubuli totaliter præcluduntur, majorque evadat obstructio, ex qua quoque fibrarum solutione resultat ille in Sphacelo tam hebetus sensus, ut profunda fieri possit in parte affecta incisio sive scarificatio ullo sine sensu, motus enim fibrillis partium communicatus ad sensorium commune perferri ob ipsarum fluiditatem nequit.

Remotiores causæ possunt esse res extraordinariæ plures, & inter quas referuntur temperamentum, quod magni est roboris, hinc pueri, senes mulieres facilius huic affectui obnoxii sunt, quia in his spirituum reliquorumque succorum circulatio est tardior: Sic novi mulierem lactantem in Sphacelo in facie laborantem infantem eodem contagio infecisse. Inter alias nos ambientes res tanquam causas primò se offert aer, qui, docente Hippocrate, ut mortalibus est causa vitæ, ita & morborum & sæpe mortis, inprimis aer frigidissimus multum ad hunc affectum excitandum contribuere potest, in istis enim regionibus, ubi frigus semper prædominatur intensissimum, ut Islandia, Lappia, Grönlandia, Norvegia, &c. plures auribus, naribus & digitis orbari asseritur: sic & nocet aer nimis calidus, novimus enim, quod de recepta æstate diebus sc. canicularibus tres vel quatuor fuerint Sphacelo afflicti & omnes mortui, quamvis membra fuerint amputata. Sic & alimenta frigida, crassa, acida, corrosiva suum symbolum addere possunt, ut & potus corruptus, aqua paludosa; huc referri possunt medicamenta incautiùs usurpata, vel nimis refrigerantia vulgo ita dicta seu repellentia, sic & Tagant. *Instit. Chirurg. l. 1. c. 7.* jam dixit, Sphacelum aliquando contingere ab immoderata & inconsultè ac temerè molitâ inflammationum refrigeratione: à narcoticis & venenis c.issimè Sphacelus oboritur. Motus nimis ob dissipationem spirituum animalium aniam dare potest, inprimis verò animi perturbationes fomites quoque Sphaceli esse possunt, seu constat *Osif. Ratiocin. in Ord. & Method. Spec. l. 2. c. 105.* Nobilis vir 50. annorum territus in solitudine umbræ corporis sui, lunaribus radiis expositi, existimans se videre spectrum, sentis levem rigorem, calorem circa scrotum, inflammatio sequitur, quam illico excipit Gangræna.

Evacuationibus & retentis etiam quandoque adscribenda culpa, ut sunt hæmorrhagiæ magnæ, hæmorrhoidum ac lochiorum mensium-quo

que fluxus immodicus ac retentus, sanguis enim ita retentus & stagnans ulcera ac necrosin inducere apta sunt, ut docent monumenta Medicorum: ex urina suppressione Sphacelum procreatum: ex urina filio observavit *Hildanus*. Refertur ad excreta potest spurcicies illa, quam Chirurghi in necribus putridis relinquunt, vel etiam immundities corrosiva, quam ægroti sæpe in corporibus suis minime curant.

Ex causarum reliquarum censu sunt, seu superius jam dictum, scorbuticum miasma, quod sæpius fomitem subministrat, item inflammatio, quam sæpius Sphacelus excipit. Ex anthraxe & carbunculo Sphacelum provenisse, *Paracelsus* 11. c. 2. *Observat.* dicit. In phthisi, hydropse, febribus, variolis & morbillis, passione liliaca, à partu laborioso, à vena incautus secta, in fracturis quoque & luxationibus, ulceribus, vulneribus, item nervorum læsionibus, & aliis plurimis morbis huic affectui fores aperiri quotidie observamus. *Hildanus* in Podagrico septuagenario Gangrænam vidit. *Borellus Obs.* 82. Cent. 1. meminit Sphaceli & mortis subscutæ clavum pedis resectum. Præterea *Obs.* 7. c. 3. narrat, in nobili quadam matrona digitum fuisse amputatum ob Gangrænam ab aciculæ puncturâ productam. Ex fortiori constrictione fasciarum in fractis membris quotidie observatur Gangræna ac Sphacelus. *Hildanus* rectè in immoderatum ulum adstringentium, quæ Practicis defensiva malè dicuntur, Sphaceli causam sæpe rejiciendam esse censet. In contusionibus non infrequenter Sphacelo partes affici, observationes abunde testantur, rationem puto hanc esse, quòd cum sanguis vel extravasatur, & copiosius ad partes transmissus ob lacerationem venularum circulari sive egredi non possit, mora sua alteretur, corrumpatur, inflammationem putredinemque producat, imò ipsum Sphacelum.

In febribus materia obstruente ad exteriores & plerunque inferiores partes depulsa ibidemque stagnante, Sphacelum produci lippis & tonsoribus notum est. Exemplum hujus sinit *Tulpinus Obs. Med. L. 3. c. 48.* nam mulieri cuidam à febre ardente impensè extorrefactæ, effudit se tanto impetu pellicer morbi humor in brachium sinistrum, ut factò initio non commissum humeri, præcipitaretur una nocte in immedicabilem Sphacelum usque ad extremos digitorum apices: Sic prope Limburgum in pago Pastorem quandam 50. annor. post febrein malignam & petechialem Sphacelo sinistrae tibie usque ad genu correptum fuisse observavi, qui Sphacelatus pes etiam in præsentia meâ ab experto Chirurgo Limburgensi *Dn. Birkenhiel* amputatus, ægerque sanitati restitutus lignum sibi adaptavit pedem, & sic cathedram ascendit & conclamationat. Plura alia restant Sphacelum facili negotio inferre valentia, quæ ex *Ephem. Germ.* aliisque auctoribus peti possunt.

*Prognosis.*

§. 11. Commemoratis causis Gangrænae ac Sphaceli, methodus jubet subnectere *Prognosis*, & cum tanta sit atrocitas hujus mali & malignitas, ut nisi occurrant suppætiæ ferantur, pars interitura, imò mortificationis suæ contagio vicinas partes comprehensura sit, insuper Chirurgus nonnunquam desperato jam peius malo neminem vocatur, insituta exquilita *Prognosis* merito sibi prospiciat, ne incautè se suamque

artem prostituat, est enim juxta *Celsum*, prudentis Medici, ubi gravis metus est in morbis, indicare necessariis periclitantis in difficili rem esse, ut si victa ars malo fuerit, vel ignorasse vel fecisse non videatur, vel si mori contingat laborantem, Medicus occidisse credatur, quem fors dira peremit. Tria autem Medicus vel Chirurgus bene prædicturus considerabit tempus morbi, vires patientis & sedem affectam, Gangrænam ex quacunque causa profectam gravissimum morbum esse nemo est, qui ignorat. Sunt tamen distincti gradus, quibus alia mitiores & curatu faciles, alia perniciosiores & incurabiles existunt, ait enim *Celsus*, Gangrænam, si nondum plantæ obideat & teneat partem, sed adhuc incipiat, curatu non difficillimam esse, præcipue in corpore juvenili. Dicimus ergo recentem Gangrænam, & corruptionem superficiei in cute & carne, haud tamen insigniter nervos, venas, tendines & solidiores partes occupantem, medellam suscipere atque curari posse, minime verò contrario modo se habentem, & in confirmatum Sphacelum degenerantem.

Partium laborantium, eorundemque dignitatis & situs respectu, Gangræna sanabilis vel immedicabilis prædicenda, sic partium internarum Gangræna, præsertim cerebri, hepatis, lienis, massæ sanguineæ, melleæ, intestinorum, rennæ, &c. lethales semper sunt, externarum verò curationem admittunt; partes molles, laxæ, ut gingivæ, palatum, nares, aures, pudenda, osculum matricis vix curationem admittunt; sic & hydropicorum tibus & scroto, quæ supervenit Gangræna difficilis curatur est, quæ tamen ab initio congruentibus applicatis remediis arceri potest, prout sæpius id præstati, & non ita pridem in viro sexagenario latore hujus civitatis *Prang* dicto, hydropico, quamvis Gangræna aderat, attamen remediis idoneis ab ipso Sphacelo liberabatur, qui morti jam destinatus erat.

A causis externis quæ proveniunt, contusione, motu, unctione, fractura, vulnere, &c. sanabilior & minus periculosa habetur eâ, quæ ab internis proficiscitur causis sanguinem coagulantibus, sicuti & illa, quæ ex senilæ ætate, defectu alimenti & succi nutritii oboritur, raro sanabilis est. Summatim, ut paucis multa dicam, Gangræna omnes summo cum discrimine conjunctæ sunt, maxime verò, quæ cum humorum, uti dicunt, affluxu accidunt: & hic asterisco notandum est, si pus album apparet, signum esse, quod Gangræna separanda sit, & inferiores partes affluxum succorum habeant, quia chylus inter emortuas & sanas partes effluit, & pus exhibet. Si Gangræna non statim occurrat, transit in Sphacelum, succi enim continuo magis magisque coagulantur, & sic mortificatio fit, in junioribus major affulget sanitatis spes, quæ in his succi fluidiores sunt, in senib. frigidis verò non facili coagulantur.

Sphacelus terminum suum absolutus difficiliter curatur, unde *Paulus* tanquæ, inquit, est Sphacelus, ferocitatis, ut nisi quis rupta omni mora præsentissimas tulerit suppætiæ, laborans particula facili emoriatur, vicinas sedes invadat, & hominem ipsum jugulet, itaque secundum *Ovidium* dictum,

*Enjæ*

*Ense rescindendum, ne pars sincera trahatur.*

Sphacelus enim seu mortuum membrum nisi à sanis partibus tempestivè præciatur, & amputetur, primum proximas partes, dein totum corpus corrumpti putrescere cogit, quæ sanguis perfluere nequit, sed stagnare cogitur, & hominem sub frigido sudore exstinguit, illud enim, quod in Sphacelo computruit, veneni in medium suo contactu, quod adhuc sanum & integrum est, inficit, corrumpitque, partes etiam molles, ut prædanda os, uterum & anum, pejorem statim præcipit. De dar. tunc huius morbi nil determinare licet, modò enim brevioris termini est, & intra paucas horas vitæ finem imponit, modò longius durat & ad annum alterumque diem protrahitur: immò in Beato Du. Brey, Hanov. Præceptore ad 4. duravit septimanas Sphacelus pedis, antequam finem eiecavit, tandem febre cecidit extinctus est. Inter Chirurgos maxima lis adhuc hodie exsurgit, an membrum sc. sit amputandum? cum sæpe plures sint, qui statuunt, membrum potuisse conservari idoneis remediis, & non statim ad amputationem transeundum esse: alii dicunt, si nimis tarde amputatur, ut sanguis jam fuerit corruptus, tunc amputatio non proderit, sed omnes ferè post eam moriuntur; ut ergò tempus bene attendas necesse est.

Ad salutem terminatur Sphacelus incipiens, si suppetis à medicamentis generosis allatis omnia tolerabilia apparent, gravioraque symptomata evanescent. Ad mortem verò tendit, neque generosissimis medicamentis & auxiliis quid efficitur, sed symptomata ingravescent, pars nigrescit, & cadaverosum spargit furorem, sudor frigidus à toto promanat corpore, & jactationibus, deliriis atque insomniis ac singulo æger defaigatur, vel syncope subsequitur, tunc enim cum horrore & tremore mors horrida cito pede insequitur.

**Dia.** §. 12. *Dia* in his affectibus ita instituenda, ne illius sinister usus morbi causam gignat, & medicamentorum vim impediatur. Aer itaque sit purus, temperatus, serenus, non autem fuliginosus, nebulosus, frigidus ac nimis calidus, aut aliis inquinamentis infectus, si autem talis, corrigendus erit suffumigiis ex santal. citrullig. jun. per. aliisque aromaticis institutis. Eligantur cibi bouisficci facilisque digestionis, facile in lacum & sanguinem abeuntes, commendantur aviculæ, ova, juncula caponum, gallinarum, vitentur contra omnia acida aultera, sultæ ac saccharata sanguinem & succos nostros facile coagulantia, corrumptentia & stagnationem obstructionemque producentia, quæ hic cuipellis fugienda sunt. Potus sit potus Theræ vel Caphræ, vel alius calidus aromaticus, & succolata, vel ceterisvis bene coctæ ac herbis appropriatis correctæ, vel vinum dulce Gallicum vel Hispanicum, vel aliud minus acidum. Potus exulet omnis frigidus. Hæ potius Gallorum proverbium attendendum est: *il est sain boir, ausse chaut, que le Sang. est.*

Motus & quies, somnus & vigilia ut respondeant sibi invicem, summo studio annitendum, alterna enim requie quod caret, durabile non est. Quantum nocent animi pathemata in his affectibus, superius notavimus, ideo rationis freno luit coëcenda. Exercitorum & etendorum ut

in omnibus, ita & in his affectibus maxima habenda est ratio. Alvus sit aperta, & si officium suum denegat, suppositorio, clysterib. Greis cum oleo amygd. dulci sollicitanda. Menfes quoque, hæmorrhoides & urina ut legitimè evacuentur, omni studio prospiciendum.

§. 13. *Veteres* in Gangræna curatione ita procedunt. Perfecit mortificatam partem electrimè rescant, quo loco sanæ parti appropinquat: Gangrænam verò curant sanguinem quamplurimum ex parte affectâ evacuando, quæ si fiat à magna inflammatione, poris sc. conspiciunt, materiam, quæ non potest discuti, illic evacuant, factis in membro profundis scarificationibus vel sectionibus, ut etiam ipsæ venæ sanguine plenæ exonerentur, animadverunt tamen, ne nimia fiat sanguinis evacuatio. Aliqui scarificationum loco hirudines parti gangrænatæ applicant. Post sectionem, seu scarificationem factam, partem muria calida, vel etiam aceto, vel sale, vel lixivio in quo lupini sint cocti, abluunt. Farinam crvi, aut lolii, aut fabarum cum aceto multo: si verò vehementius adhibere velint, salem adjiciunt, aut pastillum Andronis, aut aliquem similem, ex. gr.

℞. *Farina orobi vel fabarum, vel sem. lolii* ℥ss.

*Cum s. q. oxymelitis, F. cataplasma quod apponatur.*

Vel:

℞. *Mellis rosæ colat.* ℥iv.  
*mug. Ægyptiac.* ℥ss.  
*calc. viv.* ℥iij.

*M. & applica.*

Commendant etiam *Galenici* Veteres nuges, urticam, & tithymali succum tempestivè & moderatè adhibitu; vel decoctum lupinorum amarorum assulum: quidam verò post sectionem, securitatis sectionis gratiâ, etiam cauterem adhibent, in quibus sale cum porri succo utuntur, postea autem ad crustam removendam, cataplasma ex pane, aut hordeaceâ aut triticeâ farinâ in aqua & oleo coctum imponunt, item capitalem licet cum pulvillum cum melle applicant; tetracharmæ etiam ac Macedonico appellato utendum esse ajunt. Probrè verò separare dicunt crustas panem cum apio tritum, aut cum ocymo, aut iridem aut panacem, aut aristolochiam, aut acorum cum melle, aut thus. Aufferet etiam secundum eos crustas, Machæionis medicamentum, & Iis, melle excepta in linamentis, verum in mollibus corporibus farina crvi sufficit cum melle.

Alii æruginis rasæ, minii, aluminis scissi singulorum æquales partes aqua tritas illinunt. Gangrænas circum scarificant imposita farina liliacea cum raphano & sale, quandoque etiam aceto, uva passa exemptis vinacis cum cortice, addito sale & aceto multo, nucum regiarum nucleum commendant, alii myrtifolia in vino cocta trita cum melle.

In Sphacelo partem mortificatam electrimè rescindendam volunt, quatenus attingit vicinam sanam, ita ut nihil prorsus putridi ac cariosi relinquantur; deinde locum inurunt, & postea scissum cum melle, vel siccum capitale item cum melle adhibent, dein panem exterius, vel farinam hordeaceam aqua & oleo substantiam imponunt, sed & iris & panacis radices & aristolochiam ac ervum applicant, iisque crustas tollunt, singula

*Galenici.  
tum extra  
rio Gangræna.*

*sphacelus*

### CAP. III. DE GANGRÆNA & SPHACELO. 665

singula cum melle miscenda esse contendunt. Item Machæronis emplastrum, & Isidem cum rosacco & melle diluta adhibent. Ubi verò crustæ exciderint, curationem reliquis ulceribus communem adhibent.

*Paracelsi  
cura in  
Gangræna.*

§. 14. *Paracelsus* ad Gangrænam curandam commendat Realgar sublimatum in aceto eodum addito oleo majoranæ, ut linimenti formam acquirat, item relecteria commendat medicamenta, ut sunt urtica, flammula, & cum curativis eodem modo procedit, ut in ulceribus corrodentibus, approbatoque emplastro ex resina abietis, visco consolidæ, pauco scammonia & succo chelidonis paratum. Gangrænam autem sal-nitrosam per solum Vitriolum resolutum curant. In curando igne hoc Persico imprimis rationem hanc tenet, quæ in exterioribus igitur observari solet. Itaque ignem ex lignis suscitatum quàm facile assusione simplicis aquæ extinguant homines, at ea ipsa aqua non ita in igne Persico operari vult, itaque penitus Medico introspicendum fore ait, in aquæ essentiam, & dicit, eam nihil aliud esse, quàm alumen dulce, ex quo eruitur alumen ad restrictionem ignis Persici adhibendum: itaque quia *Sulphuris laute* Aethnæ ignis iuxta eum restringitur, illud ipsum quoque ad ignem Persicum accommodari vult. Et cum Author plures species ignis Persici constituat, hæc ergo ratione in extinguendo Sulphure Merocolini progreditur, nec ulla alia compendia ex Medicina fontibus excogitari vult illis ipsis exceptis, quæ de Mineralibus annotavit. Præcautionem membrorum Author maxime improbat, æque omnino cum Medicina pugnare dicit: ipse non ferrâ vel instrumento, sed subscripi emplastri usui emortuas partes ab integris separare solet.

¶ *Colofonia lbj.*  
*Liquor Myrrhæ ʒvj.*  
*Ex quatuor Gummiis lbss.*  
*Fiat Emplastrum, quod à parte applicetur, quâ sanum emortuo contiguisse est.*

Verùm ubi os exustione nimium intumuisse constaret, non præter rationem putat ipsum ferrâ discindi, sed à sanis partibus sedulo cavendum & abstinendum ait. Hac ratione emortuas partes auferit, integris quandoque manentibus ossibus. Consolidationem denique per aquam salis & oppodeltoch auspiciandam esse censet. Sequentem aquam sanantem sanam partem agrâ jam remotâ, apponit.

¶ *Aq. salis ex raphano ʒj.*  
*Ex cuticulâ ʒij.*  
*Succi plantaginis digesti ʒviij.*  
Mixa mane & vespere adhibenda esse jubet.

Vel:

¶ *Succi chelidonis,*  
*Aqua Aluminis Roehi,*  
*ʒameniaa. ʒiij.*

*Nitri resoluti ʒij.*  
*M. & utere ut prius.*  
¶ *Oles de Frumento,*  
*de ovizaa. ʒiij.*  
*de Glandulis ʒv.*  
*Cera,*  
*Pisic communis aa. ad pondus omnium.*

Fiat cerotum secundum artem, adhibet pro more vulgato.

Aethneas deinceps per bituminis navalis & Camphoræ resolutæ æqua pondera curare solet.

Gangrænam autem ignilignario respondentes ab eo Thure & Myrrhâ curantur. Sulphuræ verò ac Resinosæ per Lac Virginis ex sulphure paratum ab ipso sanantur plerumque; in usum autem omnium horum eò intendit, ut subinde nova imponantur, nec unquam pars sicca reliquatur, sed perpetuo huæctetur.

Abstinentum esse ait à Medicamentis secundum elementa compositis, à repercussivis à morbillorum unguentis, unctionibus, suffumigiis & Guajacano ligno. Ignis Persici curam duplicem dicit, unam priusquam naus sit morbus, alteram cum jam est vigentissimus. Ad priorem curam seq. laudat.

¶ *Sperm. tanar. lbss.*  
*Capræ ʒij.*  
*Myrrhæ,*  
*thurisaa. ʒj.*

Reduc ad destillationem in Sole, donec liquefaciant. In hunc liquorem pannos intinctos superponit loco affecto, cum siccati fuerint, rursus intingit, superponitque tandem, donec sedetur. Ad posteriorem curam sequens adhibet:

¶ *Terebinthina indurata lbj.*  
*Oxypanacis lbss.*  
*Colebolaris ʒij.*  
*Reduc in emplastrum.*

Mel despumatum cum superioribus ingredientibus mixtum parti scitæ imponi vult.

§. 15. *Helmontius* in cuiuscunque partis Gangræna Lixiviali magnificat, quæ etiam loco prius profunde scarificato adhibenda esse suadet, utpote in quibus Gangrænae causâ, acidum scilicet omne emoriatur. Lixivium enim forte Gangrænas profunde scarificatas potenter sistere contendit, quia in lixivialibus, cum dictum, omne acidum commoriatur necesse est. Sanguinem Talpæ in Gangræna applicatum magni pendit Author.

*Sphaceli* curam nullam ipse agnoscit.

§. 16. *Villifus* sanguinis crassitiam & visci. *Willifus* ditatem corrigendo, succoque nervi subulidatam statim omnem operam impendit, volatilibusque Diaphoreticis hunc scopum attingere conatur, iisque associat ea, quæ spirituum motum intendere, illorumque pemi adaugere valent. Quod ad externa verò medicamenta pertinet, scalpello partis superficiem extemplo dissecat, & si Gangrænae altas egerit radices, profundius ferrum intinuat. Deinde incisas carnes lavat Tinctura ex aloë & myrrhâ in spiritu vini factâ, vel ungu. *Ægyptiac.* in spiritu vini camphorato dissoluto: partemque curat digestivo, cui aloë & myrrhâ admiscetur. Purgotoque ulcere corruptis istis carnibus, ejus consolidationem idoneis medicamentis accelerat.

In *Sphacelo* eadem, quæ in Gangræna proprii *Sphaceli* nat medicamenta, sed cum in eo integra adhuc mortificatio, partem sanam ab agrâ separat, vel cultri ope, vel butyri Antimonii beneficio: interim topica non negligit, & inter alia laudat aquam phagædamicam, decoctum scotiarum Antimonii in aceto factum, spirit. theriac. camphorat. quæ applicantur, ut progressus ultior impediatur. Postmodum ulcus curat suppurantibus

Pppp bus



bus & mundificantibus, illudque tandem iusta methodo ad perfectam consolidationem perducit.

*Sylvius in  
Cura  
Gangræ  
Sphaceli.*

§. 17. *Sylvius* in *Gangrænâ* curanda tanquam optima remedia Diaphoretica laudat quæcunque, suadet quoque cataplasmata ex ruta, scordio, absinthio, floribus sambuci, semine urticæ in muria coctis, addito spiritu fl. sambuci, vel spiritu vini camphor. quæ omnia diligenter jubet imponere & omni modo Sphacelum præcavere. Inter Diaphoretica laudat salia volatilia, ut & oleosa sæpius exhibenda, sic & myrrham, olibanum, massichem, aloen aliaque plura, imprimis ex his confectum Elixir proprietatis internæ sumendum commendat. Externæ verò laudat præter prædicta, aquam calcis vivæ, vel decocta herbarum aromaticarum, quo refert fofus, suffumigia, aliaque totalem corruptionem prohibentia, ut theriacalia, camphorata, aloetica, myrrhata, &c.

*Carsis-  
morum  
modus cu-  
randi  
Gangra-  
nam &  
Sphace-  
lum.*

§. 18. *Carsisiani* toti in eo sunt, ut succorum & sanguinis in *Gangrænâ* incipiente prohibeatur ulterior coagulatio, obstructions vasorum referantur, & necessaria restituatur circulatio, quæ propter ad ipsâ statim properant sudorifera, aliaque remedia satis porosa, particulas acutas & angulares frangantia, ne vasa ulterius ladan & succorum motui obstitant, quorum remedium sequentia communicant paradigmata.

℞. *Aq. card. bened.* ʒj.

℞. *Angelic.* ʒij.

Ocul. ʒ ʒ.

*Sperm. cet.* ʒʒ.

*Myrrh.* gr. vj.

℞. *C. C. volat.* gr. iij.

*Camphor.* gr. ij.

*Syr. Diascord.* simpl. ʒʒ.

*F. Mixtura* una vice exhibenda.

Vel:

℞. *Aq. Hyperic.* ʒʒ.

*scabios.* ʒij.

*Theriac.* ʒj.

℞. *C. C.* ʒj.

*camphor.* ʒʒ.

*Syrup. de scord.* ʒʒ.

*M. d. una vice.*

Interdum etiam ad ipsum accedunt sublimatum præcipitatum, quem cum electuario diascordii & theriaci in forma boli præbent assumendum. Partem *Gangrænâ* affectam ablunt spirituosis & lixivii, quæ remedia ut facilius penetrent, scarificationem ad partem usque sanam admittunt, & vel myrrham, aloen & sal ʒj. vel unguentum *Ægyptiacum* in spiritu vini dissolvunt, eoque partem lavant, addito interdum pro separatione partis corruptæ à sana spiritu vitrioli, ʒj. vel niri. Laudant etiam aquam calcis vivæ & spiritum ʒci, nec non decocta & cataplasmata ex radicibus gentianæ, valerianæ, angelicæ, aristolochiæ, herbis scordii, alliariæ, cicutæ, phellandrii, rutæ, nasturtii, cardui benedicti, salviæ, nicotianæ, foliis quercus, lauri, floribus hyperici, sambuci, meliloti, croci, semine sinapi, danci, cumini, nasturtii, lupini, lini, bacis lauri, nucibus juglandis, cupressi, fructu colocynthis, sale Ammoniaco, ʒri, sulphure, nitro, alumine, xrugino, sapone, fimo columbino, caballino, fermento cerevitiæ. Impetrata convenienti separatione partis

corruptæ à sana suppurationem promovent unguento Apostolorum, aureo, vel basilico, & ulcus consuetumore tractant, ut carne de novo expleatur & cute obduatur.

A *Sphacelo* partem totaliter corruptam penitus solent amputare vel carnem corruptam cultro excindere, ferroque candente usionem instituunt, ne partes vicinæ corrumpantur.

§. 19. Ut jam me audiat paululum vestras mihi præbeatis aures & oculos rogo, qui in curatione *Gangrænæ* collimo, ut ante omnia obstructio tubulorum tollatur, & stagnantibus succis liberior concedatur transitus & motus progressivus, in quem finem exhibere soleo variâ Diaphoretica, absorbentia, spirituosâ, balsamica, oleosa, salia volatilia quæcunque & simul aromatica facta, hinc proiunt *Tinct. be- zard.* vel:

℞. *Elix. propr.*

*Tinct. myrrh.* aa. ʒj.

*M. D.* bis de die assumantur 20. gutt.

Vel:

℞. *Elect. Diascord.* ʒj.

*confect.* alkerm. ʒj.

*pulv. cord. pret.* ʒj.

*c. Syr. scord.*

*F. Elect.* Singulis horis exhibetur quantum cuspidi cultri capi potest. Theriaca sæpe sufficit, si nil aliud ad manus sit. In *Gangrænâ* ab inflammatione, & in ipsâ applicatis remediis contrariis frigidis ac repellentibus eò respiciendum est, ut illa medicamenta prius abiciantur. Dein rationis oculo examinando status partis gangrænose, in qua sæpe succi coagulati & stagnantes sale suo volatili, spiritibus destituti sunt, qui quæ data porta avolant, sanguis cum reliquis succis non amplius circulantibus stagnat, perversequè mixtus est, salia acida ac corrosiva, cum ad partem læsam sibi imperium rapiunt, canaliculos scilicet omnes dirumpunt, & sic fores effringunt reliquis obstructis relictis: ad quas aperiendas, vitam iis cum reliquis partibus reparandam, & succos corruptos stagnantesque fluidiores volatilioresque reddendos, sudorifera ex superius dictis, diascord. theriac. spirit. C. C. vol. ocul. ʒ parata, aliaque acidum imprimis temperantia remedia conducunt. Sequens mixtura coelestis assumatur.

℞. *Card. bened.*

*meliss.* aa. ʒj.

*ther. C.* ʒʒ.

℞. *resar.* ʒʒ.

*C. C.* ʒj.

*Syr. cinam.* ʒʒ.

*M. D.*

Exhibeas patienti per vices Elixir, vitæ ʒj. cum portione salis volatilis C. C. quam dosin singulis diebus assumar necesse est, aliâ laudabilis effectus non sequi solet. Spiritus matricis cum Elixir vitæ maritatus, & ad gutt. 20. sæpius de die assumtus excellens erit remedium. Statim verò externè applicetur linteis duplicatis calidè spiritus matricialis *Dr. Blancard.* qui sequ. est.

℞. *Massich.*

*Myrrh.*

*Oliban.*

*Succin.*

*Succin.* aa. ʒij.  
*Spir.* vini redif. lbij.  
*F. l. a.* destillatio.

Nos verò statim accedimus ad sequens excellens remedium, quod raro me fecellit: vel instituent da statim ablutio sequenti:

ʒ. ~ *vin. Camph.*  
 ▽ *calc. viv.* p. aq.  
*camphor.* ʒij.  
*M. & calidè applic.*  
 ʒ. *Rad. vinetox.*  
*ireos.*

*aristoloch.* O. &c.

Superimposito cataplasmate ex mic. panis albi inveterati lbij. herb. scordii, absynth. aa. Mij. Vini Gallic. q. s. coq. ad formam cataplasmat. Vel imponatur seq. cataplasma ad Gangrænam nobis ioleune.

ʒ. *Rad. Aristol.* utriusque  
*hirsudin.*  
*scorzon.*  
*angelic.* aa. ʒß

*Herb. scord.*

*ruta recent.*  
*absynth.* aa. Mij.  
*prunell.*  
*beton.*  
*majoran.*  
*origan.* aa. Mij.  
*summ. rub. vulgar.*  
*ʒ. sambuc.*  
*chanom.* aa. Mij.  
*sem. lupinor.*  
*cumin.*  
*anis.* aa. ʒj.

*Bacc. lauri.*  
*juniper.* aa. ʒij.  
*myrrh.*  
*aloes* aa. ʒv.  
*sal. q.*  
*ʒ. ʒ. aa. ʒij.*  
*N. M.*  
*caryophyll.* aa. ʒß.

quæ species vel cum linteo duplic. in formam catapl. redact. applicentur, vel quod melius, extrahatur cum V. Q. essentia, vel destilletur spirit. in quo dein myrrh. & aloes ad consistens. cataplasin. solvatur, addatur & spirit. matricial. q. pl. spiritus hic ad usum reservari debet: ingredientiz supra dicta stent infusa per horam unam vel alteram, dein coqu. addita portione panis biscocti & partis Caplicæ, vel farinæ fabarum tollat. Aromaticæ species in fine prius addi debent, ne spirituosæ & efficaces particule inter coquendum in auram abeant, prima vice huic cataplasmati addere poteris Elix. vitæ ʒj. in quo camphor. ʒj. soluta fuit. Secundâ vice addas adhuc Tinct. eathorei ʒß. aliâ vice Tinct. allie scetidæ, quarta vice spirit. sal. ʒ. ʒ. & pro re nata species mutare poteris, & singulis 6. horis rursus applicari debent. Vel:

ʒ. *Lxiv. fortiss. spir. vini* aa. lbij.  
*Herb. rna salvia.*  
*scordii, absynth.* aa. Mij.  
*Rad. aristoloch. utriusque* aa. ʒj.  
*ʒ. ʒ. ʒ. coq. ad tertias*  
*dein add. myrrh. aloes* aa. ʒß.  
 ▽ *vita ʒß.*  
*M. f. l. a. catapl.*

Omnia hæc remedia juyant, quatenus constant

salibus volatilibus oleosis & spirituosis, quæ omnia reviviscere faciunt, spiritus ac liquores nostros, & non duntaxat particule stagnantes ac ad corruptionem tendentes hinc fluidiores redduntur, sed & ipsi succi ad regularem mixturam disponuntur; hinc immediate sequitur, quod obstructions resercentur, & sanguis in vicinas partes ejusque succi recipiantur circulationem, spiritusque etiam animales iterum influere incipiunt, & vasa iterum coarctantur, & propellantur incluses succos mediante pulsu ad partes quascunque, & sic partem salvam sospitemque reddunt: vita ergo hujus partis gangrænosa iterum cum aliis partibus communis redditur, h. e. canaliculi iterum restituntur, & succi iterum per hos circulantur, uti in statu sano, & in hoc consistit quod vivere dicimus. Si verò jam pars gangrænosa fuerit sphacelata, ad separationem sanæ partis à mortua species prædictæ iterum accipiuntur, & ex his paritur cataplasma adjectis gummatibus vel Tinct. ex iis paratis.

De scarificatione partis gangrænosa ac sphacelata hodie inter Medicos etiam Neotericos controversitur, ob sanguinem attrahendum. Veteres dicunt ad resolutas partes, in quibus hæc ratione sanguinis motus & vigor restituitur, & vel lancetta vel novacula in parte inflammata & tumefacta per ipsius longitudinem & latitudinem, *Botallus de Venerib. Scelop.* c. 22. hoc remedio plures se liberasse facitur, & nullum aliud præstantius neque tutius, si tempore usurpetur, inveniri addit: sed *Celeberr. Overcamp.* alique rem attentius examinarunt inveneruntque, quod pars jam sufficienter sit scarificata per minutissimos cultellos intus latentes, per quos textura partium læscatur, dein viz. per quas medicamenta penetrare debent satis aperta sunt, & non opus esset majores efficere: magis ergo juxta ipsos noxæ sunt scarificationes, quia vasa læscant, includunt discinduntque, ex quibus sanguis & succi evasunt & coagulantur, sicque magis ad putredinem ansumant: addunt quod aer externus sanguinem magis corrumpitæ coagulat, quia ipsum jam aperte aggreditur, quod non potuerit efficere, cum sanguis vasculis inclusus fuerit. Experientia quoque constat, si frustum carnis recentis incidatur læpius illud citius putrescere, quam si non fuerit facta incision. Contra *Celeberrimus Broen de duplici bile Veterum* p. 173. ait: Verum me hercle alia plane ratio est inter scissionem illam internam ab acidis particulis, & externam per cultellum incisionem: illa enim malum augeat, hæc verò mitigat, non quidem per se, sed per consequ. Primum enim sanguis sanus & floridus in partem assectam effluens, quatenus per poros suos transmittit materiam ætheream valde peregrinam, ab illa, quæ poros partis gangrænosa vel sphacelosa perfudit, fermentum illud acidum ibidem hærens commodè valet infringere. Secundò mediante illa incisione aditus conceditur liberior medicamenti applicandis, & sic curatio evad. brevior, quemadmodum hoc felicissime non ita pridem est expertus Amstelodami, ubi vocatus fuit ad curandum puellum quendam bien-nalem, cuius scrotum sphacelo plane erat occupatum. Instituta circa vesp. scarificatione ad levè usque sanguinis eruptionem; adhibito uno lavamento ex V. theriacal. & cataplasin. idoneo

parato ex philandr. scordio, absynth. aloë & myrrh. animadvertit ipse matutino tempore insequentis diei jam factam fuisse separationem carnis putridæ à viva, ortum fuisse boni & laudabilis puris proventum, sive ut loquuntur digestionem, & sic porro adhibitis adhibendis brevi temporis spatio integrè ab eodem est restitutus. Multum ergo inquit prælaudatus Author, ad brevem curationem gangrænæ ac instantis sphaceli contribuit debite instituta scarificatio, alias enim facilius proserpit ulterius malum, & tandem pervenit, uti vulgus loquitur, ad cor, h. e. fermentum illud gangrænolium reliquis inficit & corrodit partes fluidas & solidiores circumjacentes, hæc iterum alias, & sic porro pergitur donec tota M. S. hoc fermento est imbutus, unde tandem prorsus coagulatur, in motu suo sistitur, & sic homo mori cogitur. Nec est, ait, quod quispiam æris accessionem metuat in scarificatione, eo forsan ductus exemplo, quod carnes conciliæ facilius in ære corrumpantur quam solidæ, tempus enim non requiritur tam diuturnum, ut noxi aliquid ab ære possit adferri, inprimis cum egregium interea ad usum revoceatur lavamentum lile & oleo volat. turgidum, sed ut has lites non nostras facimus, dicamus, quid de scarificatione sentiamus, utpe eam non modo non noxiam, sed aliquando etiam utilem esse, cum remedia topica eo melius in vasa & tubulos penetrent, & succos in eisdem coagulatos resolvant, potestque Medicus inde colligere, num sensus aliquis supersit, aliis non valde juvat.

In malo contumaciori spirituiosa, ut sunt Elix. vitæ, Tinct. castor. assæ fatid. cum camphor. majori quantitate usurpanda sunt, inprimis spirit. ❧ in bene clauso vitæ calefactus calidissime applicetur, & cataplasma iterum imponatur calide, & omni bihorio repetatur. ▽ calicis vitæ, ▽ benedicta Chirurgor. dicta per se vel cum spirit. vini camphorato mixta in gangrænâ & incipiente sphacelo egregium est remedium: paratur item ex ▽ calc. viv. aqua phagedænica Gallicis Chirurgis solennis, ex hac enim cum ʒ dule, & ʒ paratur lixivium scoriar. ʒiii in locis gangrænâ affectis egregium est, ▽ pomor. destillata contra gangrænâ magni momenti est. Urina humana & sterus vaccinum ob sal volatile, quod possident, in rusticis aliisque plebejis summum remedium est.

Si Gangrænâ producitur, ceu diximus, ab externo frigore à quo succi nostri quasi congelati, & in coagulum abeunt, & quidem à defectu subtilis materię illos persfluentis, cum nempe in acre non sufficiens materia subtilis adfuerit, ad succos fluidiores servandos, hinc stagnant obstructionsque pariant. Ex hoc fundamento omnia phænomena explicari possunt, ad curam ergo hic transcendendum. Non ergo membrum refrigeratum illico igni admoventum est ad congelationem tollendam & membrum calefaciendum; ratio hæc est, quod repentinam irradiationem ignis particulas volatiles resistentes penitus expellat, unde maxima confusio & textura partium plane tolleretur, quod experientia constat, cum id videamus in pomis congelatis, quæ si igni admoveantur, statim putrescunt: sic quoque observamus quotidie in nobismet, quando digitus nostri à frigore immobiles facti, si statim igni admoventur, inde est ac si mille aciculis

pungantur, sensum præbent. Congelata ergo membra prius aqua frigida nivæ fricentur, vel cum ipsa nive: hoc alius Paradoxum erit, sed si ritè rem perpendamus, ratio id nobis persuadebit, cum cura tantum hoc modo inchoetur, sed non perficiatur, sensum enim ac sensum coagulati succi debent resolvi, & ad pristinam mixtionem redigi, & hoc optime perficitur ope ▽ frigida vel nivis frictione; ratio est, quia per partem congelatam aquæ impositam plus materia subtilis persfluit, quam per congelatas, & nimis stricte compreasas particulas, per quam materiam subtilem particule iterum fluidiores redduntur, quæ in parte affecta fixæ fuerant; frictio quoque cum nive capropter juvat, quoniam ipsi in manibus nostris liquefit, & hinc amicabilis sit resolutio particularum congelatarum; adde & quod commotione ista reliquos quoque succos stagnantes ad motum incitat postmodum succi inspissati calore fortiori dissolvendi sunt, in quem finem conducet seq. vel simile balneum, aut ex iisdem paratus lotus.

ʒ. Rad. angelic. galang. aa. ʒss.  
rapar. bryon. aa. ʒij.

Herb. ruta scord. d. veris mar.  
absynth. nicot. aa. Mij.

Semin. cummin. urtic.  
ernæ aa. ʒij.

• piper. long. ʒvj.

❧ ❧ aa. ʒss.

Coq. in part. i. vin. Gallic. & 2. part. urinæ, & bene coct. adde ʒ optin. ʒvj. & membrum congelatum calide immittatur, & dein fricetur seq. vel simili linimento.

ʒ. Spir. vini camphor. ʒij.

Bals. nervin. n. d. ʒss.

Ol. Guajac. Jansper.

Terebinth.

Philosophor.

Tinct. ass. fatid. aa. ʒj.

Spirit. cochlear. ʒss.

M.

Vel oleo ʒ Lulliano simili fricentur partes gelu induratae. Si verò pars tendat ad sphacelum, imponatur cataplasma nostrum superius dictum, & procedatur eodem modo ac superius recensuimus: in hoc præter externa & interna interponenda sunt, præsertim sudonifera, quæ omnem implent paginam; deur etiam cum vino ʒss. spir. C. C.

volat. vel sal ejusdem, vel:

ʒ. Vin. Gallic. vel Rhenan. dule. ʒij.

Elix. vitæ ʒij.

M.

A nimis calidis remediis aliquando ægri Gangrænâ affecti malè se habent, hinc Author sum, ut semper calidissima remedia aqueis temperentur, ut sunt ▽ ʒ, aq. fl. sambuci &c. his enim succi à frigore quasi congelati, à spiritibus & volatilibus oleosis salibus pededentim resolvuntur, & iterum fluidiores redduntur. Imò internis remediis semper adiungendus spirit. matric. qui hîc in affectibus, egregium remedium, quod nostra experientia constat; deur enim per se, v. gr.

ʒ. ~ matric. ʒss.

Bals. nervin. n. d. ʒss.

M. d. ʒo. usque ad 60. gutt.

Si malum hoc fuerit productum ab hydropo, cum partes diu à succis evasatis & stagnantibus

### CAP. III. DE GANGRÆNA ET SPHACELLO. 669

bus fuerint distenta, hinc omnis textura partium perditur ac disrupta à corrosivis istis & fermentantibus succis, qui instar lupi esurientis omnia corrodiunt devorantque, succi quoque in hydropicorum toto corpore existentes corrupti sunt, & privati omnibus spiritibus, hinc circulatio debilis est, & febres lethales simul coincidunt: ad curam ergo properandum, quæ non multum distet à priori jam dicta, & sæpe magno cum effectu seq. remedio uti sumus.

℞.  $\nabla$  calc. viv. lbj.  
spir. vin. campb. lbj.  
Bals. nervin. n. d. ʒj.  
Elix. vitæ ʒiv.

M.

applicetur calide cum linteis, Seq. non contemnendi usus erit in Gangræna ab hydropo producta.

℞. Rad. angel. bryon.  
allior. aa. ʒij.  
Muria limon. ʒviij.  
Θ ʒ ʒb.  
Elix. absynth. spir. matr. Blank.  
Aloes nyrth. campb.

M. l. a. & applica calide cum cannabi vel lino, postmodum applicari potest seq. vel simile cataplasma ex herb. menth. absynth. pulv. scord. bacc. juniper. sambuc. sem. linap. fenic. bardan. Θ ʒ nitri, ʒci, quorum species in urina & faecibus vini coqui possunt. Cui decocto dein addatur farin. lupin. vel fabar. ad consistent. cataplasma. quod calide quantum ferri potest applicetur, & simul supra hoc cataplasma sacculum arena calidissima repletum impone, quo enim pars calidior servatur, eo melius, & si his malum non cedit addi possunt penetrantia remedia & in majori quantitate, Elix. sc. vitæ, vel spirit. Θ ʒci, vel bals. nervin. ad ʒij. &c.

Cura Gangræna à defectu succi nutritivi oritur, cum quasi ipsa pars vitæ privetur à nutrimenti plenario defectu vix curatio superest, sed ne agros plane deserat sequens vel similis forus præscribi potest.

℞. Herb. scord. ruta, salvia,  
majoran. aa. Mv.  
cochlear. Mv.  
Rad. consol. major. ʒvj.  
Sem. card. bened. cruce aa. ʒvj.  
Baccar. myrrh. lauri aa. ʒv.  
∇ calc. lbj.

Coq. in lbj. urina fætidæ & lixivio, & quater de die fovetur pars, simulque fricetur cum ol. terebinth. Guajac. succin. Tinctur. ass. fætid. spirit. lumbrie. bals. nervin. spirit. cochlear. oleo ejusd. quæ omnia succos inspissatos congruatissimosque attenuant: in rusticis aliisque, quibus inopia est, stercus bubuli calidissime sæpe applicetur, cui cataplasmati & add. herb. aromatic. sal. malv. fabin. sem. bardan. eruc. bacc. juniper. & cum urina fætida parati potest cataplasma calidissime sæpius de die imponendum, & diutioribus addi possunt myrrh. aloes in Elix. vitæ vel spirit. matricar. solut.

Vel:

℞. Spir. vin.  
Ol. terebinth. aa. ʒv.  
Θ ʒci ʒb.

M.

In hoc casu nec interna remedia negligenda sunt ad succos crassos fluidiores reddendos, in quem

finem Patiens decoctum ex rad. chin. falsiparil. galang. zedoar. macis, croc. herb. cochlear. nasturt. sem. anis. Θ ʒci in viii. Gallie decoct. & pro libitu bis vel ter de die ager tres assumat uncias, & interpouat. spir. cephal. nostr. vel aliud sal. volatil. oleos. ad ʒo. & plures gutt. assumerd. vel Elix. vit. ʒij. sic & oleum cochli. ad gutt. ʒ. in vino Hispanico assumptum egregiam navabit operam, medicamenta enim hæc resoluunt sanguinem, & succo temperant acidos, circulationem promovent volatilissimæ, & quasi resuscitant; in succis enim alicujus hominis sani lbj. salis volatil. reperitur, ʒi. lb. olei, & 6. lb. spiritus, reliquum erit phlegma.

Malum hoc ut plurimum infantes infestat, Cura Gangræna quorum dentes sæpe omnes excidunt, gingivæ granæ à fæte, os maxilla corruptum corrolivumque conspicitur, febris adest continua, facies pallida, oedematosa ac humida, lingua sæpe multis foraminibus perforata, qui infantes auxilium petunt, tristi ergo affectui ut ocyssime occurratur necesse est, hinc eluantur partes infectæ cum spirit. vini campbor. ʒvj. bals. nervin. ʒj. M. vel quod fortius est seq.

℞. Muria limon. ʒij.  
V. aromatic. ʒlb.  
Spir. dnlc. ʒj.  
bals. nervin. ʒb.  
Elix. vitæ ʒb.  
Q. sal. ʒj.  
Campbor. ʒij.  
Elix. absynth. min. ʒlb.  
V. clau. oleos. ʒb.  
Myrrh. ʒj.  
Ol. cochlear. ʒb.

M.

quæ mixturâ sæpius abluantur partes infectæ & corruptæ; est remedium, quod te raro faller, & experientia nostra sæpissimè comprobatum est. Hæc omnia remedia ad principia magni Cartesii, Philosophi, correspondent; quæ ratio ergo est, quod multi Philosophi hanc docentes relegantur? In promptu causa est, quia veritatis ac pacis amatores sunt, juxta enim Tacitum: *Non minus periculum ex fama magna, quam ex mala.* Deo veraci & æternæ Veritati nostram commendemus rem, qui Veritatem tandem in apicem ducet, per lapsum enim Adami hanc amissimus, & nemini nisi cui ipse Deus revelavit cognita est. In Tesperavi, Domine, & non confundar in æternum. Veritas premitur, non verò opprimitur. Futuro sæculo omnes principii huius Neotericorum imbutores videbis, & post finem Veritatis de die in diem exsurgat. Sed sufficient hæc. Nos ad Curam mali nostri porro Nos accingamus. Si ergo hoc in malo obliervetur macula cærulea & nigra, statim superius mixtura descripta calidissime & sæpissimè applicetur & reiteretur, postmodum imponi potest cataplasma jam sæpius descriptum ex ruta rec. absynth. sal. caryophyll. N. M. myrrh. aloes spirit. vin. aromat. farin. fabar. q. f. pro cataplasma. si durities partium fuerit, addi potest et cataplasma Tinct. gumm. ammon. calior. ass. fætid. & spirit. cochlear. ol. caryophyllor. vel macis parum add. t. Hoc enim in malo semper antiscorbutica admiscenda sunt, ut ex. gr. spirit. cochli. & tol. filic. nasturt. beccabung. &c. Internè conducunt varia antiscorbutica in Encyclop. Med. nostra Cap. de scorbut. præscripta, impramis sequens ad ʒo.

Pppp 3

& plu.





sint, ut citò absque votis suis respondeat institutum. Dein detineatur Patiens vel imponatur in scamnum conveniens, vel & sella imponi potest æger. Chirurgus si ex.gr. pedem sphacelatum altiori scamno firmiter fasciis alligaverit, trahat cutem, nunculos & carnem sursum versus sanas partes, ut sc. operatione peractâ ossi denudato iterum obduci possint, sique arctissime vinculo valido hæc constringat, partim ad doloris imminutionem, partim ad hæmorrhagiam inhibendam. Peractâ hæc ligaturâ in sanâ parte tres digitos latam, quem modum ego cum Hildano, & aliis longe præfero, qui in parte demortua, sit ob rationes ab Hildano aliisque sufficientissime adductas, carnem usque ad os scalpello aliquantulum falcato circumcirca inscindat, ita ut periossium quoque bene persectum sit, quod postmodum in illo loco cui ferra imponi debet, abradendum, caroque musculorum in parte non amovenda, ne obstaculo sit, hinc ferram huic rei aptatam, qualem Hildanus describit, ossi imponat, sique illud citò tutò, agilique cum dexteritate tribus vel quinque tractibus detruncet. Quod tamen, nunquam factum vidi, sed ad minimum decem tractibus hoc factum fuisse notavi, nihil enim interest, quot tractibus id fiat, modò æger leniter tractetur, nam per nimium motum plura mala obvenire possunt, ut citius ægi moriantur. Facta sectione & post solutionem vinculi sunt, qui cauterium actuale aliquando crudele, sed non contemnendum remedium admovent, alii hanc adustionem damnant, & tantum imponunt stuppam cannabinam albo ovor. madefactam, & pulvere styptico seu sola calce viva inspersam, vel solo liquore styptico imbutum liureum imponunt, & vesica bubula obteguunt, & dein deligetur, sique deliga-

tum per duos tresve dies detineatur, his ablatis ligaturis, sique indurata & agglutinata sunt, prius emollitis, eschara ut decidat opera detur, ea delapsa, vel filo vulneris os latis suture constringendum, vel per emplastr. cutis attrahenda, fasciis ulcus involvendum diligenter, ne aet. conglutinationem impediatur & corruptionem ac nigredinem ossi inducat: atque sic pergendum est usque ad plenariam ægi recuperatam sanitatem.

Quamvis autem melius esset, si, quod *Thom. Fienn. lib. Chirurg. 11. cap. 4.* monet, partem non semper in fine sanæ proxime apud ægrum, sed quandoque remotè ab ea ambulare liceret, ex.gr. si Sphacelus sit in pede, etiam si totum crus sit sanum & posset salvari, tamen prope genu amputaretur, quia præterquam, quod non tantus metus sit relictis miserrimis gangranosis, cum sæpe clam ipsam medullam ossium inficit, nihil quoque juvat ægrum ipsius crus longum habere, nulli quippe usus ipsi est, sed magno impedimento: obtemperandum tamen in hisce ægris & adstantibus esse censuimus. In brachio quidem res longe aliter se habet, & ipsius semper tantum relinquendum est, quantum possibile, ut innuiat ferrea manus ei applicari possit. Plura de hujusmodi amputationis operatione vide apud Hildanum, aliosque *Chirurgos celebres*.

Sed hic Asterisco notandum, quod ubi in parte aliqua fuerit Sphacelus, prius caro mortua excindatur, & eò respiciendum, num membrum servari possit, & hoc in casu cauteris utenendum est, ad ambulationem, uti Chirurgi loquuntur, impediendam. Si vero pes vel manus rescanda est, operatio sit cum (*Wissel/*) digitus ressecatur cum forcipe, *mit einer Aneip-*

*Zangen/* vel cum prædicto ferro.

## CAPUT IV.

## De Combustione seu Ambustione.

## §. I.

Verum equidem est, infinitas ignem nobis præbere utilitates de totâ ferè nostrâ vitâ. Imò hoc universum consistit in calore, illoque conservatur, totque insuper utilibus succurrit remediis, ut vix dentur meliora. At cum omnia sano perpenduntur sensu, nescimus, an Prometheo debeamus gratias, aut illi culpam attribuiamus, cum velut & pyxide *Pandora* (sit venia fabulæ:) infinita inde etiam prodierint mala, tot tormenta, tot cruciatus, ac sæpe remedia ipso morbo, ipsique morte crudeliora, id quod de *Combustione* videre est, ut taceam tot in Macrocosmo effectus satis funestos. Valeant igitur phantastici Persarum ritus. Valeant Empedocles, aliique Pythagorei Vivicomburio immortalitatem acquirere. Valeat Agesilaus Themistoclis Frazer ejusque Constantia, Marodonium Regis Persarum Satrapen pro Rege interitum atque errantem dextram comburens. Nos neque minimum corporis nostri partem comburendam trademus, sed potius curabimus, quomodo ignis crudelitatem effugere, aut mitigare queamus. Nobis enim hic est sermo de ignis particulis corpori nostro inflictis, quo-

modo damnum infligat, & quomodo istud curandum sit, quem affectum Medici ac Chirurgi Combustionem, vel Ambustionem, vel *Combustio*, *Ustionem* dicunt, Germanis etiam *Verbrennung/* *Brandt*.

Affectus hic est adeò simplex, ut nullâ indigeat descriptione, sed cum malâ consuetudine *Ejus Descriptio*, receptum sit, dare & in minimis descriptionem & definitionem, in gratiam vulgi hanc apponere lubet. Combustio est solutio continuæ in solidis partibus quibuscunque, cum inflammatione, vesiculis excitatis, doloreque à particulis igneis pungentibus pyramidalibus, vel cxtra applicatis, vel introitus sumptis, facta.

§. 2. *Subjellum* Combustionis sunt vel partes *Partes affe-* externæ variis injuriis expositæ, quod toto *descriptio* observamus dicere, sic non ita pridem totum corpus (quoad externam superficiem,) infinitis annorum incidentis in athenum aqua calidissima refectum ita combustum fuit, ut iterum feliciter curatus fuerit. Omnes ergo nervi, tendines, membranz, fibræ, arteriæ, venæ, ligamenta, caro, ossa, omnesque canaliculi comburi possunt. Sic quoque internæ partes ab hæc

hac combustione haud immunes sunt, quando se. particulæ igneæ altius & profundius in viscera tendant, facile ea comburere ac crispare possunt, quod etiam fieri potest ab aqua forti, spiritui rectificatissimo, aliisque causticis acidis stygiisque aquis ignem feu igneas acerrimasque particulas contingentibus. Totum enim corpus potest, eum dictum, hic affici, ut & omnes Tubuli; quò enim partes subtiliores, eò faciliores comburantur. Nullam partem in corpore nostro offendere potui, quæ minus Combustioni obnoxia est, quam lingua, quia cetera sigillatim liquida & cum flamma ipsi impossibili nullum affert damnum.

*Differentia.* *Differentiam* Ambustionis quod attinet, differt Ambustio ratione partium internarum vel externarum, & ratione causarum; est enim vel ab igne, fulmine, ferro candente, titione, aqua fervente, vel spiritui vini, aqua forti, oleo fervente, vel pulvere pyrio. Ratione symptomatum, alia graviora, alia leviora inducit: ratione magnitudinis, alia enim penetrat cutim, alia musculos, alia nervos, arterias, venas & ipsa ossa: alia Ambustio pustulas excitat, alia non, alia cutim exsiccat, elevatque, alia non idem præstat.

*Diagnos.* §. 2. Variant *Signa Combustionis* pro ratione causarum, symptomatum ac graduum Combustionis. Primi gradus signa sunt cutis rubedo, dolor acerbus pungitivus, locus quoque combustus aliquomodo intumescit: imò à relatione ægri nobis facile innoscit, & non opus est plurimis signis, sed iis utimur, si nobis de profunditate Combustionis non constet; notitia ergo causæ nobis hic placet manifestabit. Si ignita corpora fortasse non satis propè admoda, aut non satis fervida, aut consistentiæ levioris fuerint, tunc non profunda potest produci Combustio, quam excitant ne plurimum aqua fervens, pulvis pyrius accensus, scintilla ignis, limum, stuppa, itamenque accensa.

Secundi gradus signa sunt atrociora, si nempe materia corpus tangat diutius, satisque crassa actenax sit, ut oleum, vernix, sebum, aliaque resinosa, unde etiam statim pars inflatur, rubescit, dolet, & in momento pustulæ elevantur, ægerque conqueritur de nimia cutis tensione, quia hæc corpora ob particulas ramosiores ignem diutius includunt, arque servant, pluresque abscondunt tubulos, unde etiam gravior oboritur Combustio.

Tertii gradus signa dicuntur, si cuti res ignita adhæreat, statumque pustulæ producantur, subiecta cutis nigræcet, sensusque nullus amplius adsit, cuncta existunt exsiccata ac dura, quæ si decidat ulcus profundum aut putridum constituitur, imò hanc fortem Combustionem ut plurimum Gangræna ac Sphacelus sequi solent, eum sæpius id vidimus, ubi scilicet maxima adfuerit confusio: hæc intensâ Combustio fit à metallis fufis, chalybe, auro, stanno, aliisque vehementioribus igneas particulas diutius servantibus, & facile omnes tubulos usque ad os concremantibus, quia in his corporibus non duntaxat ignis, sed & particulæ metalli angulares & cuspideatæ continentur, quæ valde tubulos dirumpere ac discindere apta nata sunt.

Tumor in Combustione ut plurimum accidens, non, ut Auctores communiter statuunt, à

maiore humorum affluxu propter attractionem facta oboritur, attractionem enim hanc falsam esse, lippis ac tonsoresibus notum est; sed hoc in casu librà potius ac viz obstructa sunt, hinc succi non itè per eas circulari possunt, sed semel allati, ibi stagnant, & nisi per canales subterranos resiliant flumina, facile age-retur mare; pari modo etiam in Microcolimo accidit, ubi succi affluentes resiliere nequeunt, necessitatio stagnare ac tumorem excitare debent.

§. 4. Ad *Causarum* investigationem & eno- *Ambustio-* dationem ut me accingam, ordinis ratio postulat, captopter ut profundius in Causarum *causa-* *Combustionis* cognitionem perveniamus, alio- *secundum* rum prius de iisdem percipiamus opiniones, & quidem omnium primò *Galenicorum*; qui in Ambustione acculant ignem, & quæcumque ignita, imprimis globos Scleropetorum, unde contusio & laceratio muscutorum, venarum, articularum, &c. oritur, vel etiam à fulmine hanc Ambustionem fieri posse non dubitant, vel ab aqua fervente, vel oleo aliaque materia utente.

§. 5. *Paracelsus* notat, quæ ratione suas in *Paracel-* corpus imprimat proprietates *Adustio*, quomodo fiat: utpote casum *Adustionis*, vel accidens calorem non existere, sed lubellium spirituum asperitas vel acuitas potius le-cundum eum corpus destruit. Sal iterum accensum ignescit prorsum, & omne, quod ab igne hoc damnatum sit, nitrum efficit, & non est illius complexio. Sulphur etiam accensum, aliam substantiam ad se recipit, est nihilominus Sulphur hoc ipsum, quod autem absumit, istud est in eo, per accensionem tamen, excitatum. Non aliter de *Adustionibus* sentit Author. Quamvis ignis corpus aliquod arripit aduritque, non ad mentem *ipsum* externum ignis hoc efficit, quod damnum existit: Verum accenditur corpus, & quicquid inde sequitur damni, solum ex eo procedere ait, quod accensum est, ac in accentionem incidit, ut lignum carbo per seipsum fit. Nam sulphur corporis, quamvis ipsum exhibeat flammam, ob fixam ejus conditionem, accenditur uriturque tamen, estque juxta ipsum, fixus ignis, & eo per externum adducitur, cui tan-tisper tantumque resistit, quantisper & quantum adfuerit ignis.

*Adustionis* differentiam duplicem statuit Author, unam per flammam, quæ molitur consumptionem, alteram, quæ fit bullientibus. Flamma fit ad mentem ipsius, sive lignorum, pulverum, resinarum aut pinguedinum: Bullitionibus, ut calidorum oleorum, aquatum bullientium, &c. Præterea reperiri aliam naturam habentem dicit, ut ea, quæ fit liquefactis metallis, & similibus.

Ad hæc animadvertendum vult, utrum ex substantia quicquam adhæreat, an non; ut ex pulvere, quod sulphur, & sal nitrum post se vel sui consumptionem accensione factam, reliquam adhuc pinguedinem, relinquunt. Similiter oleum peculiare suum residuum, aliud metallum, aliud retine, aliud aqua, quodque proprium habet, cogniti necessarium; non propter sanationem, sed extremos dolores, quos inferunt hujusmodi reliquie. Salis nitri, sulphuris & resinarum spirituum acuitatem peculiates dolores e de ait, nam ibidem esse spirituum

Spiritus salis arguit. Ex metallis etiam alios ac singulares deducit dolores, quod eo loco sit Mercurius. Ex aliis adurentibus adhuc alios, quia sulphur secundum ipsum, ibidem est resolutum. Huiusmodi sulphuris separationes in membris variare dolores statuit. Adustionum dolores accidentia esse dicit, originem ex igne ducentia, postmodum ex aere quidem exteriore minalem conditionem acquirantia. Notat insuper, post veneni conceptionem istud per meatus & venas in primum suum centrum peruenire, quo mortem inducere ait.

Helmont.  
Bism.

§. 6. Helmontius Ambustionis actum in vivis fieri ait efficienter ab ipsa vita, occasionaliter ab igne. Quod est dicere, vitam esse agens proprium sensationis in sensitivis: & vitam esse ejusmodi causam, quae insuper vim habeat Ambustiones faciendi in vivis, & in materia Medica, imò etiam resistendi, vel non. Quamobrem reperit vitam primum efficiens, ac immediatum sensus, ac doloris. Siquidem vis ignis recepta ac introducta in cadaver, secundum ipsum, non est sensibilis; imò nec proprie ambustiva, qualis in vivis: sed potius allativa vel tostiva. In vivis namque liquor carnis, per indignationem animae sensitivae, celeriter in acre liquorem convertitur, ac substantialiter transmutatur: qui in mortuis non est vitali transmutationi obnoxius. Adeoque inter fibras bulliendo & frizando, carnes torret & assat. Caro enim mortua, ad mentem ipsius, patitur per gradus, quos alia corpora non sensitiva, univoco modo patiuntur ab igne. Verum in vivis etiam aqua bulliens statim vesicas parat: pars solida deinceps velociter contrahitur & crematur. Idcirco istam Ambustionis actionem in vivis ac sensitivis fieri ait efficienter ab ipsa vita: ab igne autem effectivè per modum medii activi, occasionalis & externi. Vita nimirum ipsa sentiens ignis rigorem, acquir suum liquorem, transmutatque in vesicas ac deinceps in escharoticum liquorem. Et quantum scilicet ab igne corripitur, tantumdem postmodum per dispositionem relictam corrumpitur, quia mortuum est.

Willelm.

§. 7. Si à Willelmo rescire voluerimus, quomodo fiat *Combustio*, ipsum *Causam* illius statuentem audiemus in particulis igneis summa subtilitate donatis, & rigidis atque acutis existentibus & introitu suo in quandam corporis partem continuum illius solventibus. Tales enim particulae turmatim, ac vehementi isto, quo aguntur impetu cutim subeuntes, glandulasque miliares impetentes, & fibrillas nervas illas ambientes, aut in earum substantia distributas pungentes ac violentius vellicantes, humorem lymphicum à glandulis fibrarum convulsarum beneficio expriment, & versus superficiem compellunt, qui ibidem aggestus cuticulam in tumorem elevat, vesiculosaeque in eà excitat. Si verò dictae particulae majori vi polleant, copiosioresque partem aliquam subingrediantur, abundantius serum ex glandulis cutaneis eliciunt, cutisque fibris infixae haerentes, illam in rugas extollunt, & liquoris transistum ad cuticulam usque inhihent, eumque in cutis poris remanere cogunt. At si particulae tum mole, tum copia & motu adhuc potentiores partem quandam subintrent, fibras ejus ipsarum impetui sustinendo

nequaquam pares dissecant & comminuant, & crustam in illà excitant, lympham in glandulis cutaneis residentem spissiore factà, post evaporatas ipsius aquosiores tenuioresque particulas, fibrarum ab igne aeternis dissecatarum fragmenta obvolvante.

§. 8. Sylvius calore ignem se nostris manifestare ait sensibus, adeò ut illo in sensu observato judicet Anima ignem adesse: ut autem ab eodem igne rarefiat oleum, aqua, & quodvis aliud, praeter calorem aliud quiddam requiri in igne statuit, cujus vi absolvere possit rarefactionem. Cum enim secundum eum rarefactio sit partium densatarum, densatarumque distractio ab invicem, ac diductio quasi à Centro versus circumferentiam; utique, ut fiat distractio, diductio, expansioque partium ab invicem, opus esse inquit, ut rarefaciens se infuset inter rarefaciendi partes proximè ac densè applicatas. quo se ipsis interponendo illas queat diducere ac quasi removere ab invicem, unde concludit Author, partes ignis esse *Tetraedras*, hoc est Pyramides, sed æquilateras ex triangulis constantes, aut assurgentes. Docet ergo ille, ignem, ut rarefaciat, non posse considerari tanquam calidum, h. e. Calorem produciendo in sensu, sed tanquam *Tetraedris* constantem. Ex his facile Authoris opinionem de Ambustis hæriolari possumus, quòd ignis cutem attingens suis particulis *Tetraedris*, in quibus solis est acumen, non item in Cubis, illam laceret aduraturque. hinc vesicae ac aliquando eschara inducuntur.

§. 9. Carcassiani à re quavis adurente *Combustionem* fieri posse statuunt, nisi partibus corporis nostri propius admoveantur, qualia sunt ferum, plumbum, stannum, titium, carbo, oleum, adeps, pulvis pyrius, calx viva aqua modo dissoluta, aqua fervens & ejusmodi plura. *Lætionem* istam hac ratione peragere credunt, quatenus particulae primi elementi subtilissimae, explosis globulis æthereis in rebus istis magna copia collectæ celeriter agitantur motu, & corpora vicina crassiora & ramola dissolvunt, destruant & in pabulum suum convertunt, attingentes porò per approximationem corporis istius particulis hisce pleni locum quandam, corporis nostri impetu quodam poros epidermidis & aliquando cutaneos ingrediuntur, & fibras abrumpunt, unde dolor maximus oritur, fibrae verò ita diutè & in cincinnos resistentes, vicinos musculorum tubulos obstruunt, quapropter humores per tubulos illos ordinariò ferri, soliti propter obstructions illas circulationem suam illac perficere nequeunt, sed stagnantes & à sequentibus humoribus pressi tumorem in parte illà vel vesiculam producant. Propius verò adhuc ad cutem ipsam accedentes contextum ejus gladiolis suis acutè scindentibus, quorum myriades in igne existere dicunt, & motu vehementissimo inter se agitatæ, disfringere, dissecare & contundere asserunt, quæ textura undique confusa & dissecta Escharam exhibeat. Ad musculos penetrantes gladiolos istos vehementer agitato filamenta carniarum transversim sita nervosa dirumpere adunt, ardoremque in parte ambullā remanere, quamvis res adurens jamdiu fuerit sublata, quoniam materia primi elementi cum impetu per poros ruens, eosdem sibi paraverit figuræ suae convenientes, & quidem iis in partibus, in quibus tales porò ordinatio non erant, hinc cum

per illos poros nil nisi materia primi elementi possit fluere, ardor in parte illa maneat, quamdiu pori in tali figura maneant. Nonnulli ignem fluidissimam dicunt esse congeriem tubulorum sphaericorum, & ramosis, maxime per materiam subtiliorem dilatatis & in gyros infinitos redactis, constanti, & quibus sphaerulis tenuissimis circumgyrantibus salium puncta prominentia sermils & rotulas acuminatas efficiant, superficie undiquaque instar linæ rotundæ acutæ & scindente instructa. Sphaerula itaque una de loco pulsæ & extricata eminentis suis asperis acutis alias etiam de loco pellat necesse esse pronunciant, unde omnes sensim permutuum contactum & levem intricacionem ut rotulæ serrata in horologiis moveri debeant, qua de causâ & ignis corporum divortia acceleret, & sese interstitiis & meatibus & se jam excavatis in transitu suo celerim infinuat & coarcevet, sicque partium ejus situm commutat. Fibrae igitur partium corporis celerim huic ignis motui obstantes dirumpuntur, quæ verò tenuiores sunt, ut illi cedant, & seque flecti patiuntur, adeò non laeduntur, nec distringuntur, & quo magis variis particulam subtilissimarum ignitarum in se invicem motus ab occurrente quodam corpore rigidior impeditur, eo impetuosiùs in fibras ruunt, easque dirumpunt. Ex diversâ quoque corporum tamosorum figurâ, in quorum poris materia primi elementi coarcevatâ detinetur, diversâ illa emergere credunt rerum ignitarum effecta, & quod alix aliis fortius adurant.

*Notam sententia de causâ Ambustionis.*

§. 10. Præmissis aliorum de Ambustione sententiis, nunc & nostram apponamus scripsim. Nulli dubitamus istam solutionem continui fieri & particulis igneis pyramidalibus pungentibus, scindentibus, duris vehementer motis, sine igne enim seu ignis huius particulis non potest fieri combustio, & si consideramus flammam ignis, quæ est corpus densissimum ac simplicissimum omnium aliorum corporum, h. e. in omnibus suis partibus est ignis, quod de nullo alio corpore dici potest; Aer enim non est purus, sed multis aliis conspurcatus particulis, item aqua, terra, aere aliisque crassioribus particulis sunt repleta, ex quo patet, ignem consistere in certo particularum densissimarum ac simplicissimarum motu, uticulus probat effectus; videmus enim scintillas in flammâ volantes sine intermissione moveri. Omnis enim ignis effectus dependet primariò à motu, ejusque figurâ. A motu est, dum flamma collecta solidas partes à se combustibili continuo absumit, adversus externas aëris injurias, ut conservetur, necessariò alix debent succedere in eorum locum, atque inde est, quod ignis indigeat pabulo, materia nimirum ad urendum aptâ, hoc si fieri nequit, talisque materia deest, ab aëre exteriore corrumpitur, excutitur, evanescit atque transit in auram. Itâ videmus ex parva scintilla oriri posse maximum incendium, si nempe ignis congregatus in exigua quantitate conveniens invenit pabulum, illud consumit crescendo, dum partem in suam transmutat substantiam, partem etiam materiam tertii & secundi elementi propellit, atque à se invicem disjungit, ut globuli ætherei eo melius congregentur atque in ignem convertantur, teste *Magno Cartesio* p. 4. *Princip. Phil. p. n. 177*. A figura verò est, dum pro vario motu variè pellitur, figurâ suâ pyramidalis partes occurrentes diversas incidit, attenuat, liquefacit,

condensat, dissipat, urit, ebullitionem efficit, quod autem ipse figura sit pyramidalis atque acuta, probant ejus effectus in dissolutione corporum, quippe si molestus motus in nervis excitatur & à mente perceptus fuerit. Sic ignis urit, cum partes corporis unitate disjungit figura suâ pyramidalis atque celerissimo particulatum motu nonnullas secum auferet, atque ita corpus reddit siccius, in qua diffissione tubulorum & succorum intus contentorum ablatione consistit *Ussie*. Inò si intimius ignis materiam, & quidem ad leges chymicas consideremus, certum est, illum constare ex spiritu, oleo, sale & acido, ignis verò motum fortiorum quodam particulis suis ope subtilis celestis ætheris impellit. Ex hisce præmissis facili mente Symptomatum in Ambustione obvenientium rationem reddere possumus; Dolor enim in Combustione oritur, cum particulæ ignis pungentes scindentque; fibras, quas tangunt, non tantum contundunt, sed & discindunt incidentque, unde molestus hic motus menti representatus excitatur. Si verò omnes fibræ simul discissæ fuerint, nullus apparebit dolor, sed è vehementior erit, quando fibræ dumtaxat incidentur & premuntur. Sic ab initio Combustionis dolor statim percipitur, si sc. fibrillæ ab ignis particulis nimis commoveantur, & succis nimis effervescentibus nimis premantur.

Vesiculæ in Combustione productæ oboriri solent, quando minutissimi valorum lymphaticorum ramuli per ignis pressionem rumpuntur, vel per salis acresque particulas ab igne commotas vascula cutanea eroduntur. Omnia enim vasa ab igne aliquo modo constriunguntur; hinc lymphæ à tergo accedens stagnare cogitur, quæ tandem nimia suâ extensione vasa perfrangit, sicque has vesiculas producit. Vel etiam oriri possunt ab impeditâ transpiratione, quæ facile in Combustione oritur, ob cuticulam enim contractam succi, qui ope glandularum cutanearum discerni debent, necessariò stagnare coguntur, qui tandem aciores facti succi vasa cutanea perfrangunt, vesiculasque attollunt. Materia, quæ his in vesiculis continetur, dolore producta, quia ex salis, acidis, corrosivis aliis innumeris male figuratis constat particulis, hinc ab ordinariâ suâ circulatione impeditæ facile fibrillas concutere valent, à qua concussione dolor iste oboriri solet, hinc succi ad fermentationem tendunt, quæ particulæ fermentantes cum tempore exultationem in parte combusta efficiunt, prout id toto observamus die.

Considerato ignis actualis effectu, pergitur ad potentialem hoc nomine insignitum, ubi invenimus aquam fortem, ejus salia particulis suis aculeatis atque valde angularibus feriunt corporis nostri partes molliores, subtiliores, easque incidunt, findunt, scinduntque parti ferè modo, ac ipse ignis, qui ex ipsissimis constat particulis, dumque sanguis alique succi ad has partes læsas cum spiritibus perveniunt, legitimo modo circulari nequeunt, sed è potius turbantur, ex quâ variâ commotione ac turbatione inflammantur partes, unde sæpe gangrenam inferunt, usque tandem propter nimiam exaltationem spiritus resolvuntur, emoriuntur atque abeunt in vaporem, unde Splanclius, ac tandem mors sequitur; nisi in tempore ei occurramus remediis congruis. Non mirum igitur existimamus, quod

quod has partes molliores spiritus acidi ita afficiant, cum Chymicorum ac Aurisbrorum Laboratoria ac operationes abunde demonstrent, istos variè præparatos spiritus acidos & alcalicos solidissima dissolvere metalla, aurum, argentum, plumbum, &c. quæ solutiones probant, harum aquarum stygiarum vim unice dependere ab ipsorum salium particulis rigidis.

Pertinet hæc Calx viva, quæ satis fortiter etiam comburit, uti observavit *Borellus C. 10. Obs. 30.* si ei aqua adspargatur, quia ita ejus pori adaptati sunt, ut partes aquæ soli primo elemento leptas recipiant, adeo ut globulis artheticis expulsi, sola remaneat materia subtilis, illaque dominetur, unde effervescentia atque auditio: confert *de Cartes. Princip. Phil. P. 4. p. 174.* quam effervescentiam fieri videmus, & quidem haud dissimilem in spir. O-li atque oleo inter se mixtis.

Inter Causas Combustionis referimus etiam fulmen, quod sæpi combustione inferi, imprimis si est cum lapide tonitruali, cum vulnere interdum verò sine Vulnere fit Combustio, imò nos vidimus aureos annulos in digito fuisse à fulmine fusos absque læsione cutis, alios verò fuisse combustos. Si igitur particula nitrosa prævaleant, non sit accensio, sed duntaxat Combustio, quia nitrum impedit, quo minus possit concipere flammam, & plerumque fit cum tonitu atque fragore, scens verò ubi sulphur prædominum habet. Huc & pertinet Combustio à Scelopetis facta, hinc plures Medici ac Chirurgi nescio qualem vim & efficaciam vel pulveri pyrio vel glandibus adscribunt, dicuntque, quod Combustio prius debeat extinguì, alias malum esset incurabile, ajunt enim, quod incendat partes adiacentes, carnes nigrescat & ad corruptionem disponat, sed huic sententia jam contrarius fuit *Paracelsi X. Chir. apol. 1. & 2.* ubi ait, glandestantum calorem non posse concipere, ut causticorum obeant munus; si enim incandescent, colligebant formamque admitterent, quod falsum, quia si glandem ceream intrudamus in Scelopetum, non liquefecit in explosione, quod tamen deberet fieri; ut ceream exiguam illam moram in pulvere pyrio accenso, imò neque charta, neque ceta si transiit, neque vestimenta, quæ prius occurrunt, liquefiunt, aut comburantur, sic etiam plumbum liquefactum aut tivillitio superfusum teste experientia non comburit. Combustio ergo hæc neque à globulo, qui frigidus est, atque me judice id, quod non habet, dare nequit, nec à pulvere pyrio, quia uti citò fit, ita citò perit, neque etiam à motu, qui continuus esse deberet, dum urere possit. Sunt quoque, qui pulverem pyrium dicunt venenatum esse, quod cum *Paracelsi* citato loco negamus, cum nihil eorum, quæ ipsius compositionem ingrediuntur venenatum existat, ac sulphur, ac nitrum, ac carbonem ægris nostris exhibeamus. Symptomata enim maligna his Vulncribus supervenientia potius dependunt à conquisitione globulorum atque tubulorum dissolutione, & ne utiquam à pulvere pyrii venenata qualitate, dum ipsæ fibræ à violento hoc motu globuli, imò omnes ferè tubuli & canaliculi ad nutritionem partis destinati infringuntur, discinduntur ac in cincinnationes abeunt nervuli, ut aliter efformentur, ita ut illa necessario deficiat, unde à sanguis, lymphæ & spiritus ad partes illas

perveniant, viam non invenientes inter se effervescunt, abeuntque in Vappam ac putrefactionem, unde Gangræna, Sphacelus ac nigredo labiorum Vulneris, de quibus *Capite sequenti de Vulncribus* fusius dicemus.

Inter causas remotiores & ferrum candens, aliaque metalla ignita referimus, quæ vehementissime urunt, superant tamen hæc omnia Aurum, quia partes ejus ardent inter se complicantur, ignemque ob hoc diu servant foventque; porique adeo sunt exigui, ut soli materię primi elementum dent ingressum. Excandescit autem ferrum, dum partes ignis poros ferri subeunt, atque ita ejus substantiam augent, quod manifestum videmus ex vulnere illato, quod semper majus est, ac ipsum ferrum. Præterea id percipimus, si baculum ligneum ejusdem magnitudinis efformemus, atque adaptemus ipsi ferro jam ignito, videbimus esse dissimilem, idque quia particula ignis sunt in perpetuo motu, quæ latera ferri extendunt. Urit autem vehementissime ferrum, quia ejus partes satis sunt rigide, angulosæ, ac proinde si accendat ipsius ignis pyramidales, fortiter impingunt in subjactam partem, atque sic continuum solvunt, comite dolore gravissimo punctivo, Inflammatione aliisque symptomatibus gravioribus.

Similiter fit combustio ab aqua fervente, alio tamen modo urit, effervescit ac commovetur, dum partes igneæ subeunt poros aquæ, ejusque partes commovendo à se invicem divellunt, ut majus acquirant spatium, quia ab ingressa materia subtili augentur, quod videmus in cacabo aqua ebulliente semper. Omnis autem urendi vis hujus aquæ dependet, cum dictum, ab igne, cum ob particularum flexibilitatem aqua ferri nil contribuit, secus ac in ferro, ubi ejus particularum rigiditas augeat solutionem. Oleum eodem modo incalcescit, sed cum habeat particulas ramosas variis hamis unisque inter se repentes, materiam subtilem intropulsam tenaciter retinet, atque ita vehementius urit, quæ aqua, imò ob hoc ipsum difficulter etiam empyreuma potest evocari; id quod vel cotidie videmus in cibis incensis apposis, ubi alii citius, alii diutius calorem perdunt.

Huc etiam tanquam ignis referri potest, novum Anglorum inventum, Phosphorus dictus, quia levi frictione in apertum quasi ruit flammam, saponi Veneto duro est similis, aqua fontana frigida debet conservari, ne in auras abeat, calori expositus statim liquefit, in frigore verò iterum coagulatur. Sunt, qui hoc Inventum vel adscribunt *Helmontio*, vel celeberrimo *Roberto Boyle*, nonnulli verò attribunt hoc arcantum Medico cuidam *Hamburgensi*: sunt ex *Anglia*, qui id tribunt celeberrimo *Dno Sutor Anglo*, amico nostro singulari: alii qui clarissimum Dominum *Weidenfelsium* pro autore agnoscunt. Omnes ferè fatentur debent, Phosphorum hunc ex urina fieri; modi plures describuntur, uti apparet ex tractatu Germanico *Nochelucæ* nomine insignito. Sequentem vero Nobilissimum *Helmontius Junior* Amico nostro *Dni Kürlinero* communicavit.

4. □ satis, coq. ad consist. mell.

add. aren. part. iij.

Desiit. per retortam, recipiens sit magnum & aqua repletum, da ignem fortem. Alii addunt bolum.

Q999 2

Phos-



Phosphorum in formâ liquidâ in Laboratorio nostro Seren. Principis ex urina laboravimus, in Anglorum sicco Phosphoro jam sumus occupati, ex hoc Phosphoro facile ignis indolem explicare licet, sed hæc ad alia nobis reservamus; nunc verò ad *Combustionis* Prognosis pergendum est.

*Prognosis.* §. 11. Cum *Signa Prognostica* Medico magnam famam, si rectè prædixerit, (quod tamen non semper, quanvis expertissimo, fieri potest,) ingens verò vituperium, si secus fecerit, sibi conciliare potest, meritò ergò Medicus ac Chirurgus in eo totus esse debet, ut hæc in parte quantum per artem licet, studium suum colloct. Affectus nostri *Prognosis* desumitur à magnitudine causæ, corpore læso, ac symptomatibus concomitantibus. Sic levis combustio facile sanatur & sæpe nulla remanente cicatrice; contrà verò magna, & quæ nimis profundè membranas ac tendines combusserit, est periculossima, quæ aliquando lethalis à nobis aliisque observata est. Vix sanantur combustiones absque relictis cicatricibus; quia cutis & carnis fibrillæ planè aliter efformantur, ac erant ante solutam unitatem. Periculosa est combustio partium nobilium, ut oculorum, intestinorum, aliarumque partium maxime sensibilibus, partim ob earum constrictionem, ubi vasa per se satis oxilia planè comprimuntur vel abscedunt, vel comburuntur, ita ut nutritio in parte fieri nequeat, inde sequitur atrophia, sæpe si majora attingat vasa, Gangræna ac Sphacelus oboriri solent. Corpori cacochymico si accidat combustio, facile in ulcus fœdum ac malignum abit, cui id non ita pridem in virgine scorbutica observavimus, & hoc accidit sæpe ob lymphæ celeritè circulantis (lymphæ enim intra unius horæ spatium vigelies per vasa sua circulat,) acrimoniam ac corruptionem, sæpe etiam lymphæ stagnat, & continuo affluxu partes vellicat, nutritionemque plane tollit vel inutilem reddit. Si combustio nervos vellicet, supervenit facile convulsio, quæ lethalis, imprimis si fuerit universalis, teste *Hippocr. S. V. v. aph. 2.*

Periculossima omnium habetur illa combustio, quæ à fulmine oborta est, quia secundum *Paracelsum libr. 1. Chirurg. Magn. iv. 5. Cap. IX.* non extingui potest, ita ut omnia animalia solo contactu occidere, ac hominem vix evadere possit, testetur *Plinius lib. 2. cap. 540. Histor. Natur.* Hinc cæci Veteres fulmina adorant. Sed hæc aliter se habere docet quotidiana experientia, sic novimus plures ex sexu sequiore in arc Schauburgensi ad Lahnam fulmine tactas, quæ omnes à me, DEO benedicente, felicissimè curatz fuere. Si verò fulmen fuerit intencum, & quasi omnes combusserit tubulos, & sanguinem cum succis in acidam vappam una vice redegerit, ut videtur est in cerevisia tempore fulminis, tunc malum exiit lethale, & omnino nobis adimis *Antidotus* spem, uti vult *Barbette Chirurg. pag. 2. l. 3. cap. 41.* & hoc non provenit à vi pessimâ, quæ vulgo dicitur inesse fulmini, nec à facultate supernaturali, uti dicunt, sed potius, quia sulphur tenaciter ob particulas ramosas partibus inhaeret, sicque si causâ difficulter tolli potest, multo magis causatum. Multum quoque hoc in passu efficit metus atque consternatio, ubi spiritus ani-

males satis tuchati obruuntur, ac pessimadantur. Eventus ergò curationis combustionis ambiguitus est, ob diversitatem materiæ utentis vel ignis, diutius quoque tempus requiritur ad hanc vel illam curandam. Periculosa quoque est illa combustio, quæ est ab aqua falsa, sapone, alumine, aut vitriolo maritata, quæ facile pessunt inducere pessima symptomata.

In varietatibus Combustionum id solum est observandum, inquit *Paracelsus præcit. de Vulneribus pag. 568.* ut si combustio spiritum habeat penetrativum & vel cephalicam, vel cordis venam tetigerit, & combullerit, tunc illa penetratio tendit ad mortem. *Pegit,* olea, aquæ, ligna &c. quando calida sunt, nihil habent penetrativi, sed calor ex sale nitri proveniens affert mortem; nam habet, ut ille ait, vim penetrativam. Sed ad magis vitia. Certum est, quod combustio sæpe diu duret, & nullum sequatur pus, quod etiam celeberrimus *Dn. May;* notavit, qui vidit mulierculam 70. circiter annorum, quæ semiebria in ignem prolapsa fuerat, ac dimidiam capitis partem ita combullerat, ut quidquid etiam mageretur, nullum pus sequeretur, nec ullæ etiam vesiculæ excitatz fuerant. Sed temporis progressu cutis cum panniculo carnosio & perieratio in unam clesham coacta, separabatur, nec hoc solum, sed dimidia scime cravii portio ingentem ac valde crassam laminam de se mittebat, quâ ablata ulcus tandem, licet tardissime coaluit, subinde tamen parvis ulcusculis hic atque illic redeuntibus.

In Milite Castellano idem observavimus, qui brachium à pulvere pyro ita combullerat, ut nullum sequeretur pus, sed secum manserat, tandem accessit Sphacelus & mortuus est.

§. 12. Aggre diemur jam ad ipsam *Curam Dia. Dietæ* in Ambustione vehementiori observandam. In Combustione ergò omnis vitetur aër, imprimis frigidior, quem incautè admissum mala varia posse inducere demonstrat *Fabrit. cap. 4. Obs. 93.* quare etiam vulnera ob hunc intempestivè admissum cacoëthica facta fuisse, testantur monumenta Medicorum. Aër ergò omnimodo arceatur à combustiones, & æger in conclavi sit temperato. Victus sit laudabilis, qui optimum nutrimentum lacteum præbet, ut eo facilior possit succedere sarcosis, seu appositio succi nutritii. Somnus ac vigiliz sint ad ordinarias leges institutz, vigiliz si addit nimia à spiritibus maxime mobilibus, somnus provocandus. Corpus, quiescat, motus nimius exulet, donec partes fibrosæ fuerint consolidatz. Moderata sint animi pathemata, exulent ira, mæror &c. reliqua vide in *Dietæ Vulnerum.*

§. 13. Cura juxta *Galenicos* ita instituitur in *Galenicorum Combustione.* Ambusta moderatè detergentibus medicamentis curare statagunt, citra hoc ut manifestè calefaciant aut frigefaciant. Proinde terram Chiam, & Cimolium, & Creticam & omnem levem terram cum aceto non valde acri, aut aquâ admixtâ, illitant magnificiunt, quia bullas excitari prohibent hæc medicamenta; item ovum totum crudum è vestigio impositum laudant, quia moderatè perfrigerat, & citra mordacitatem reficcat, sed & atramentum obliuunt, aut thure aquâ diluto, aut lentacula coctâ tritâ, aut ervo obtegunt. Cæterum ad Ambustiones ex aqua calida, priusquam bullæ excitentur

existantur, olivarum muria conditarum aquam affundunt, & ipsas olivas cum polenta tritas imponunt, aut alumen fistulum tritum cum aceto illinunt, aut fel taurinum cum aqua larga liquatum inungunt, aut lixivium affundunt, aut garo, aut muria perfundunt aut bulbos liliorum, aut hyacynthi, aut narcissi cum rosacotritos, & adstringenti crassitudine reductos illinunt: panniculum melle imbutum & in hordeo obvolutum exiunt. Hinc:

℞. Cineris ejus ℥ij.  
cerussa ℥ij.  
butyri ℥ij.  
Cera ℥ij.  
adipis caprin. ℥ij.  
rosacci ℥ij.

M.

quod si jam bullæ excitatæ fuerint, rhoen & polentam tritam cum aceto imponunt, aut calcem vivam cerato admixtam, & linteo infarctam applicant, quia & sphæration appellatum medicamentum conducere ajunt. Quæ verò ulcerata sunt, porro trito integunt, aut portulacam tritam cum polenta imponunt, aut columbinum stercus linteo involutum exiunt, & cinere ejus oleo diluto uti solent: admirandum esse dicunt remedium in ambullis pinum aut picæ corticem, aut adiantum siccum tritum, aut myrti folia trita ambullis inspersa.

Ut pili ex ambullis nascantur, commendant fici folia in olla torrefacta, cum cerato Emplastri vice imposita, aut sequenti utuntur:

℞. Caricar. ℥ij.  
Samplicis ℥ij.

Trit. cum oleo excipiuntur.

Vel:

℞. Lapidum presagminis 3C.  
squama eris 3C.

Cum aqua pallilli efformentur. Usu verò expetente, partem unam ad octo cerati partes admilcent ac diluunt.

Ceratum ad ambusta sequens commendant Veteres.

℞. Cera alb. ℥ij.  
rosac. ℥ij.  
ovor. num. 6.  
perdicadiis ℥ij.

M.

Facta enim ambustione prodesse ajunt medicamenta frigida potestate polientia, ut sunt album Rhazis, atramentum, cerussa, creta, calx cum oleo rosaceo applicata. Item utuntur unguento refrigerante Galeni, magnificiunt betæ folia, coriandrum, item populeum, item oleum olivarum cum sale mixtum, vel sequens:

℞. Aqua fontis lbj.  
vitell. ovor. Num. ij.  
optimè agitentur, dein adde olei olivarum liquidij ℥ij.

M.

Hæc mixturæ intingunt lintea duplicata, & ambusta parti applicant, siccata sine linteorum ablatione iterum madeficiunt. Vesicas ante tertium vel quartum diem non esse aperendas ajunt, nam dum citius aperiantur, eas difficilioris esse curationis dicunt, & multum dolorificas.

Si magna addit inflammatio, lenticulam cum melle mixtam applicant, si abstergere velint, milcent terebinthnam cum melle & apponunt, si ulcus remaneat, præ aliis sequens æstimant:

℞. Ungu. popul.  
ol. rosac. aa. ℥ij.  
Mucilag. sem. rosar. aq. solan.  
exir. ℥ij.  
vitell. ov. Num. 2.

M.F. Unguentum. Oleo ovorum finiunt curam.

§. 14. Paracelsus in curâ Adfionis cō respici-  
cit, ut solum Sulphur corporis superetur, cum  
in eo sanatio consistat. Flores tilia, verbasci-  
que liquores, oleum lini, butyrum & lardum  
calida liquefactaque, nec non alia plura tan-  
quam vulgaria non multum æstimat: commen-  
dat verò sequentia.

℞. Olei ex laganis avium. ℥v.  
Adipis cervi ℥ij.  
cera.  
liquorum ex ovis aa. ℥iv.

M.

Hujusmodi medicamentum ab initio curæ sufficiens esse in finem usque, nec opus esse alio, quod in eo mumia constituta sit, quæ caloris adustio curatur, vel ij

℞. Oleicosti lbj.  
sevi hircin. lbj.  
cera ℥ix.

Fiat Unguentum, quod singulis quaternis horis applicandum vult, aut sæpius, quo locus melius humiditatem suam retinere valeat.

Cum Metallica ac Mineralia, juxta ipsum, singularem quandam veneni communicandi rationem obtinent, ipsis à propriâ Naturâ implantatam, atque hinc propriam quoque curandi methodum; quæ etsi ad omnia metalla generalis ipsi est, in particularibus tamen quandam diversitatem observat: nam restitudo caloris diversa est in Mercurio, Sale, Vitriolo, ac Alumine, tamen in rubigine. Ad extrahendum autem, ac restinguendum calorem seu unctionem Metallorum sequens commendat: ℞. ad pis suilli, id est lardi, quantum sufficit, liquefacta incalcescat, post calidissime infundatur in aquam solani, agitur, dum consentiant unguenti nature fuerit, hoc unguento perungit malum, ac sine aliorum remediolorum accessione percurat. Ubi à Mercurio quis ustus est, locum affectum in lacte calidissimo intinctis pannis vices vel ultra fovere vult, sic ut ubi refluxerit, semper immutetur, post unguento ex butyro parato calorem extrahit Emplastro de Colophonis, & catricem efficit. Hunc unctionis modum rarum esse ait, contingere tamen si amalgamata, quæ vocant, parentur. Singularia quoque hunc affectum habere scribit Symptomata, odontalgiam ac tremorem, quæ abstinentiâ à contactu Mercurii, usû aquæ vitæ in lotionem marum, tum gargasatione, seu oris collutione cum aqua lavendulæ sine negotio curari promittit. Frequentia hæc esse iis addit, qui Cinnabarim parant, Mercurium per descensum præparant, Metalla separant, alique Metallorum artebus, &c. unctiones porro ab aquis salinarum fontium, aluminis & vitrioli, quocunque tandem modo eas fiant, periculosissimas dicit, nisi enim accuratè empyreuma, id est, calor, extrahatur, gravisissima subsequi mala sæpius observavit. Hoc in casu Author certissimum remedium sub unguenti formâ promittit.

℞. Olei Nucum lbj.  
Sevicervini lbj.

Q999 3

Butyri

*Butyri preparati ibid.**M. F. Unguentum :*

utatur quotidie bis, mane & vespere, donec nihil doloris, phlegmones ac calor super sit. Denique si istis non planè cedat, Balsamo, unguento, vel pulvere traumatico cicatricem facit.

Aduktionis differentias cum varias constituat Author, hinc etiam ejus curandi rationes diversas proponit. Nam quemadmodum medicamenta ad Solem cocta alias vires adipiscuntur, quam ad ignem parata, alias ad flammam, alias in prunis cocta, utique alia est sulphuris, alia aquæ vitæ, alia lactis, alia mellis flamma in prærandis remediis : sic aduktiones ad flammam simplicis, lacte, aquâ, pulvere tormentario, sulphure, fulmine, fulgure, &c. alia sunt ab iis, quæ à vapore, metalli fusionibus, aquâ salis Vitrioli, Aluminis, &c. fiunt, hinc etiam in his distinctam proponit curam. Et flammæ simplicis lignariæ curatio ad mentem ipsius talis est. Primum omnium calorem ad exteriora attrahendum vult, & quidem hoc modo : Recipe Butyri recentis quantum sufficit, calefiat ; calidissimum aquæ frigida infundatur, ac agitur, donec nivis instar albefcat, post abjecta aqua servetur ad usum in formâ unguenti, quod valere dicit ad omnem Aduktionem simplicem à ligno, lacte, oleo, butyro, resinâ, &c. factam. Utendum esse ait bis, ter, quaterve, aut pluries locum affectum eo perungendo, & studet semper pinguius ex butyro servare partem affectam, nec unquam exsiccari patitur, donec planè percursa sit, hoc unguento quemvis maximum calorem extrahit. Quin ubi Aduktion tanta fuerit, ut Ulcera fiant, ipsum sufficere ait, si emplastro stictico inungatur, nec opus esse aliis infundere remediis inquirendis, hoc unico tanquam certissimo contentus est. Observat tamen in Aduktione perpingues res, ut oleum, butyrum, &c. facta, majorem paulo Emplastri stictici usum requiri.

Aduktionem pulveris pyriti, salis nitri, sulphuris præter Cælestem periculosissimam dicit, quemadmodum & eam, quæ à vehementibus Chemicorum aquis, ut Mercurialis, Gradatoria, Regali, &c. excitatur : hanc tamen magis ob Corrosionem, quæ à venenorum acrimonia excitatur, quam aliâ de causâ gravem esse pronunciat. Itaque ut primum quis à pulvere tormentario ultius fuerit, utile fore ait hoc unguento locum passim perungere.

*¶. Butyri ibid.**ol. Nucum.**Sevi cervini 2a. libb.**Medull. Tauri quartar.*

Liquefacta ac fervida infundantur in aquam Nymphæ ter quaterve, agitentur probe & fiat unguentum, quod unguatur æger, ubi incaluerit, renovare convenit, donec dolor quiverit, ac denique ut vulnus simplex curat.

Si à Chemicis aquis ultius facta sit, præter hoc oleis traumaticis, vel stictico Emplastro eorodentem vim frangere nititur, tandemque curat.

In Ambustis à fulmine & fulgure curam ferè nullam superesse ait, Medicinam verò quæ in hoc malo sit, eam dicit, ut autequam empyreuma extrahatur, vehementissimè refrigeret : nam nisi ea adhibeatur, urendi nullus finis est, quem-

admodum hoc ipsum in pulvere tormentario sæpissimè expertus est. Restinctorii illius medicamenti formulam talen proponit :

*¶. Spermat. taur.**Succi fedi.**Astacorum fluvial. 2a. p. æq.**Myrrha.**Vitrioli modicum.*

Mixta omnia imponantur membro affecto donec calor remittat, quo restincto, unguento præscriptis aduktiones, curationem perficit.

Sin eoque malum sevit, ut jam omnia instar Carbonum ulti sint, sequenti emplastro utitur, tum pars emortua à sanâ abscedet ac decidet.

*¶. Colophon. libj.**picis commun. libb.**Cera quarar.**olei terebinth. modicum.*

Malaxetur & Fiat Emplastrum, quod impossibile, vivum à mortuo separat, dein Emplastro stictico curam absolvit.

Empyreuma à glandibus tormentariis factum siue ultiorem hanc periculosam esse censet, quia ejus calor diuturnus est, & metallicam quandam venositate comitem habet, tum ex violento ictu, ad mentem ipsius, difficultatis quid contrahit. His curandis malis primum omnium ad refrigerandum glandem restingente Medicamento nititur, ut sunt Acetum rosaceum, succi Solani, Nymphæ, Sempervi. &c. Succus Astacorum, tum spertiolæ, si per Syringam injiciantur sæpius, donec calor relederit, quo facto, unguentis, balsamis, &c. vulneratis tanquam puncturam simplicem curat. Refrigerantium magnam ubique adesse copiam dicit, ut Limacum, Ranarum, Astacorum, intestinorum terræ, succus Speneolarum & similia. Succum tamen herbarum Nymphæ, Solani, Sempervi potior est ab ipso habentur, neque continent etiam atramentum sutorium. Omnium verò præstantissimum parat medicamentum ex aceto rosaceo & succo Astacorum invicem mixtis : horum verò non hie saltem, sed & in pulveris tormentarii ultiombus utitur. Accidere non raro ait vulneratos perterrefactos aquæ se immergere totos, vel frigida vulnus fovere ; quod ubi factum fuerit, unguento ad Ambusta superius dicto curationem perficere jubet. Notat denique hanc ultiorem speciem interim lethalem fieri, si calor interiora, ac principalia membra, ut cerebrum, &c. petat, quo in casu salutem nullam sperandam amplius esse prædicat. Sin lethale adhuc malum non est, intrinsecus per potiones datas calorem restingere annititur. Potiones autem ipsius in totum refrigeratoriæ sunt aqua, lac, zythum, succus pomorum, præcipue verò commendat aquam prunorum Cypricorum minorum potam, à vino autem omnino arcendos esse ægros monet.

§. 15. *Helmontius* in Ambustis præter interna *Helmontii* diaphoretica, pauca vel nulla habet Medicamenta externa, sed reliqua cum Paracelsio approbat jam dicta.

§. 16. *Villissius* si quædam in hoc affectu interna adhibenda sunt auxilia, ex diaphoretico-curatio rum classe illa depromit : quod ad topica verò *Combustio* spectat, si cuticula integra adhuc subsistat, par- *Ambrus* tem combustionem foveat spiritui vini simplici aut Camphorato, vel essentia rosmarini, aut, juxta Paræi præceptum, carpas crudas contusas *Ambrus*

cum pauco sale admixto illi applicat, vel succo alii eam illinit; cum autem adlunt rugæ, ipsæ statim aperiendæ veniunt, & linimento ex partibus æqualibus ungu. rosatum & populeon sunt inungendæ: tum verò linimento cum oleo communi & vino factu utitur, & deinceps nutritum calcis ex aquâ calcis & oleo rosat. & paucâ censurâ admixtâ paratum adhibet. Nec sequens unguentum contemnit.

℞. Ol. commun. cum ∇ font. ad integrum aqu. evaporat. ℥ij.

Cori. med. an. sambuc. ʒij.

Umbilic. Veneris Mij.

M. F. Ungu. s. a. servandum.

Idem præstat ait decoctum hederæ murariæ, & cortic. median. Ulmi; quando crusta inusta fuit, illius casus citò est promovendus linimento ex butyro recenti in mortario plumbeo agitato, cum decocto malvæ parato & foliis brasicæ tep. disapplicato. Si tale medicamentum non sufficiat, vel ejus effectus expectari nequeat, ferro separanda est eschara. Ulcus autem ut recens aliud Ulcus deinceps est curandum, & solutis in iis casibus remediis ad integram consolidationem est deducendum.

*Sylvestri mon. dicitur eundem Ambustionem*  
 §. 17. Sylvius cum Villis jam dictâ Combustionis curâ fere consentit, interna Diaphoretica & Salia Volatilia maximè extollit, linimentum quoque varia præscribit, laudatque ∇ calcis vivæ, spiritum Vini Camphoratum, æstimat quoque in hoc casu nutritum ex lithargyro, oleo rosatum & aquâ vitæ factum.

*Cartesio. notum rationem eandem Ambustionem.*  
 §. 8. Cartesiani in principio statim ipsius factæ Combustionis non modo approbant, sed etiam tanquam salutare remedium commendant partis ambustæ ad rem illam ignitam, quâ combustio perfecta est, propiore ad motionem, hæc enim ratione non modo poros partis læsæ à particulis materię subtilis à re ignitâ egredientibus apertos reservari dicunt, ut intus in parte læsâ contentæ particulæ glandulæ & serratæ promptioriter repertant exitum, sed easdem ipsas in motu quodam ulterius teneri vatio, absque jam affluo fibrulæ non lædantur, sed motu illo pedetentim cessante, & materię subtili majori in re ignitâ externâ contentarum particularum homogenearum so. fociente acervotemaneant integre; contra enim si contingat, & pars ambustæ aut in aëre contineatur frigido, aut rei frigide admoveatur, idem ei accidere proficuntur, quod vitro calefacto subito aëri frigido exposito, aut aqua vel manû aut digito frigidis tacto, cum occlusis poris & fibrulis à frigore rigefactis materia subtilis in easdem pertinaciùs ei obstitentes, vehementius commoveatur, easque inflexiles dirumpat: Haud ablimilitatione spiritum vini loco materię istius ignitæ proficuum existere pronunciant, siquidem subtilissimæ primi elementi particulæ in eo contentæ priorem præstent effectum, & partem combustam spiritui huic immersam placidissimo affici sensu, non aliter, ac si frigido quodam rore inundetur. Hic etiam de causâ felici cum successu nonnulli cretam in spiritu vini dissolvunt, & linimenti instar adhibent, & Dn. D. Vogelius ipsam calcem vivam in spiritu vini dissolvit ad tenuis linimenti formam, & parti ambustæ, etiam si ipsa cutis læsa fuerit, illinit, cujus ope dolor cito cessat, empyreuma separatur, & excitatum ulcus unguento albo camphorato brevi sanatur. Laudant

quoque eandem ob causam linimentum ex calce vivâ in spiritu vini solutâ, & oleo hyperici vivacem agitatissimum compositum, & spiritum vini camphoratum in ipso principio adhibere singularem habent in pretio. Ad escharam separandam remedia imponunt particulis constantia à subtili materiâ facillè moveri & agitari valentibus, ut motu in carne emortuâ fuscato, fibræ ejus à sanis placidè abrumpantur, uti sunt cepæ coctæ, & saponi Veneto commixtæ, Mercurius præcipitatus ruber axungie porcine commixtus, succus ceparum, oleum raparum cum creta & camphorâ, lardum accensum & in folia lauri stillatum, donec folia ista vertantur in cineres, quæ pinguedo postmodum illinitur. In profundiore combustionem escharam scarificari permittunt, posthæc Unguentum ei admovent ex fuligine, terebinthinâ, butyro recenti & oleo de vacellis ovorum, vel quod sequens exhibet formula:

℞. Cori. sambuc. Mij.

fol. plantag.

fulv. aa. Mij.

Cog. ex aqua ad ʒxx.

Colatura adde

fuligin. ʒij.

butyr. non salit. ʒv.

Sterc. Gallin. res. alb. ʒij.

Unguent. basilic.

Sapon. vulg. aa. ʒij.

M. F. Unguentum.

Illud etiam non contemnit linimentum, quod ex stercore gallinarum albo, foliis plantaginæ & salivæ in butyro non salito affatis & per linteum trajectis componitur, cum felix curatio eo sæpius sit impetrata. Escharâ separatâ curam ut in aliis ulceribus continuant, adhibito unguento aureo, vel basilico, vel emplastro de gratia Dei. Vulgare quidem, sed non contemnendum remedium existere promittunt, si farina avenacæ in butyro aliquantum assetur, & linimenti instar illinatur, nihilque ulterius superimponatur, & illinitio hæc tandiù continuetur, semper relictis prioribus linimenti reliquiis, donec crusta collecta sponte decidat, & pars ipsa conspiciatur sana. Eodem modo linimentum adhibent *Myofichi*, ex oleo olivarum & albumine ovi, invicem ad spumantem albedinem agitatissimum compositum, cui si sacchari Saturni quidpiam addatur, adhuc magis illud æstimant proficuum. Interna diaphoretica ex tincturâ bezoardica, spiritu vini camphorato, theriacâ & discordio. aquâ floritum estiliæ & sambucis sumopere deprædicant, & consolidationi sequens sufficere dicunt unguentum.

℞. Ceruss. ʒij.

Lap. calaminar.

Thuris aa. ʒij.

cera alba ʒij.

olei olivar. ʒiij.

Camphor. ʒij.

aq. rosæ. ʒiij.

album. ovi Num. i.

M. F. Unguentum.

§. 19. Jam peragenda est ipsam Curationem nostra ex fonte nostro Chirurgico ac Pharmaceutico de- promptam. Methodus verò medendi nostra aliquomodo pro causæ ambustionis varietate variat

Præservatoria indicatio est, Præsent. ad ignem apud Veteres ratione fulminis se muniverunt vel lauro quam in capite gestant, qualem cor-

mentum  
 Ambustionem.

nam ex lauro concinnatam turpissimus Imperatorum, Tiberius Nero, ob id gestasse dicitur, teste *Suetonio in ejus vita c. 69.* Sed fabulosum puto. Alii pavidi vituli marini pellem super caput ponunt, alii aquilam ob Jovis armigerum servant, ejusque lapidem, sed omnia fabulosa, superstitiosa, imò irrita esse adversus alticonantis Dei iram credimus, juxta Psalmistam *Psalm. 139. v. 7.* Quò ibò à Spiritu tuo, & quò à facie tua fugiam? Si ascendero in cælum, ibi es, & si stratum fecero in inferno, ecce tu ades, si assumam alas aureas, & habitem in novissimo maris, etiam illuc manus tua deducet & apprehendet me dextera tua.

Missa quoque facinus istorum Impostorum ignem devorantium arcana atque experimenta, quibus se muniunt, ut sine damno possint tractare ac devorare ignem, utur modum nobis tradat *Plin. l. 2. c. 3. & Servander. in seinen Erquickstunden.*

Majoris verò momenti est indicatio curatoria, quæ consistit in hoc, ut fibræ aliæque partes combustæ ac dilaceratæ non in tantas cinnationes transcant, & statim applica sequens Epithema, cum subtili & duplicato linteo loco ambusto, sicque vesiculæ impediuntur.

℞. ∇ Ψ 3v.

*Spir. vini Camph. 3ij.*

*M.*

Vel:

℞. *Spir. vini vel aq. Regin. Hungar. 3iv.*

*Camphor. 3ij.*

∇ *ad ambust. Qu. 3ib.*

*Balsam. nervin. m. d. 3j.*

*vel Elixir. viæ 3b.*

*M.*

Sunt alii, qui ad vesiculas impediendas apponunt liquorem salsum in doliolis butyri saliti reperiibilem, ut & aquam marinam vel salsum, alii saponem nigrum, mel, butyrum, decoctum raparum, muriam Hatengorum, aut muriam brassicæ: præprimis si conqassentur cum oleo lini vel raparum, vulgus applicat atramentum, rustici hiæ in locis loco combusto stercore vaccini parum tostum cum oleo lini vel raparum applicant. Alii albumen ovi tanquam volatile, constans ex animalibus partibus volatilibus ambustis applicatum pro arcano venditant. A Clarissimo Dn. Muys laudatur creta cum spiritu vini camph. imposita cum arctâ ligaturâ.

Unimentum sequens ad Ambusta optimum effectum nobis præstitit, imprimis si combustio à pulvere pyrio fuerit producta.

℞. *Cervusa*

*pulp. rad. consol. maj. aa. 1b.*

*Lithargyr.*

*Lap. calaminar.*

*minii aa. 3iib.*

*Camphor. 3b.*

*ol. rapar.*

*M. f. l. a. Unguentum.*

Hoc tamen fateri debemus, liquida, ut decoct. calc. vel ejus aqua cum Spiritu vini Camph. vel Matricaria, plas nobis præstitisse, quam unguenta ac linimenta: Mixturis enim his continuo calidè partes combustæ laventur & iis madefacta lintea imponantur.

Si tantum cutis externa fuerit ambusta, mulieres nostrates propriam inungunt salivam sale volatili constantem, aliæ cepas cum saponi in forma cataplasmati parant imponuntque. Plu-

res pro experto exclamant remedio calcem vivam cum oleo raparum commixtam, & calidè ambustis partibus impositam. Alii utuntur oleo raparum cum creta. Rustici sterens gallinæ cum butyro & fuligine, additis herbis Salv. corr. sambuc. misc. & ad formam unguenti coquant applicantque non absque levamine.

Aliquando ad generosiora transeundum est, ubi enim definit anicula, ibi septem incipit Medicus, in curandis scilicet morbis, si ambustis ergo profundioribus sequentia eligere solemus.

℞. *Ungu. Basil. 3j.*

*ol. juniperi 3iij.*

*Terebinth. Ven. 3j.*

*ol. anisi 3vi.*

*macis 3b.*

*cera 3iij.*

*Croci 3j.*

*Syrac. liquid. 3j.*

*Gumm. galban. 3b.*

*M. f. l. a. unguentum.*

Quò etiam referri potest unguentum ad Ambustaleq.

℞. *Cort. med. sambuc. 3ij.*

*insund. & coq. in oleo rapar. 1b.*

*colato oleo add.*

*axung. ovilla.*

*cera flavæ aa. 3iij.*

Liquefactis insperge continuo agitando pulv. ceruss.

*minii aa. 3iib.*

*& si parum refrixerint, immisce.*

*Camphora trita 3ij.*

*M. f. l. a. unguentum.*

In gradu secundo, ubi cutis nimis fuerit contracta, ad fortiora transeundum est, & sequens calidè apponi potest.

℞. *Spir. Matricar. 3ij.*

*Tinct. galban. 3b.*

*aq. ad ambust. vel calc. 3ib.*

*camphor. 3j.*

*aq. Regin. Hungar. 3ib.*

*Balsam. nervin.*

*Tinct. castor. aa. 3b.*

*M.*

Urgente etiam necessitate superponi potest ad calorem partis conservandum sequens cataplasma.

℞. *Herb. scord.*

*ruta aa. 1b.*

*fl. rapistr. 1b.*

*melior. P. 1.*

*malv. P. ij.*

*N. M.*

*caryophyll. aa. 3b.*

*Θ 3j.*

*scia aa. 3j.*

cum muls. & urin. tartid. q. f. f.

adjectâ à farinâ fabarum Cataplasma.

Si vero Gangræna ac Sphacelus parti combustæ imminet, confugiendum est ad sequens Cataplasma calidè applicandum, quamvis hoc in casu etiam conducatur aqua calc. cum Spiritu vini camph.

℞. *Herb. salv.*

*ruta.*

*scordii aa. 1b.*

*esp. crud. rec. 3iij.*

*Sapon. liq. nigr. 3b.*

*myrrh.*

aloi



aloes 2a. ʒiij.

Croc. spr. ʒj.

ΘϚ

ʒcia 2a. ʒiʒ.

l. a. c. vin. & muli. f. Cataplasma.

Et, si malum fuerit intensius, ut cutis plane fuerit contracta, Cataplasma prædicto addi potest.

Unguentum Basilic.

Syrac. liquid. 2a. ʒv.

Gummi. elemi ʒvj.

Galban. ʒij.

oleicera ʒiij.

M.

Olum Philosophorum etiam externè illitum egregiam sæpe navat operam, ut & omnia salia volatilia, quæ liberum ac convenientem succis motum restituere, meatus obstructos referare, & a credinem illius obtundere valeat, hic adhibenda sunt. Omnia enim hæc recensita remedia ex particulis volatilibus constant, quæ à materia subtili facili matre commoventur ac agitantur, hinc similem motum communicant carni combustæ ac emortuæ. In graviori Ambustione facces cervicilæ cum pane applicatæ optimum præstiterunt effectum, ut & allium, lentes palustres, limpi. diastaturni *Mysf.* Mucilag. sem. cydon. cum aqua hyper. ranar. extract. additis camphora & scacharo hni, quod elegans est remedium tepidè applicatum.

Momordica in oleo lini infusa & ei addit. ol. hni citra inflammationem Ambustiones sanat, oleum apum cum pauco olei ovorum vel corponum sæpe juvat.

Vel:

ʒ. Calc. vivo. lutei. ʒj.

Δ vivo. ʒj.

ol. lini

rapar. 2a. q. f.

M. pro linimento.

Sunt quoque, qui in Ambustione commendant oleum Nucum cum ovorum luteis mixtum.

Si combustio per prædicta remedia sublata fuerit ad eutem delinendam & dolores sedandos sequenti utere:

ʒ. Ol. lini ʒʒ.

N. M. dest. ʒʒ.

ungu. Basil. ʒj.

Gum. Elemi,

galban. 2a. ʒij.

Campbor. ʒʒ.

ʒ Regin. Hungar. ʒij.

reci ʒj.

M. f. l. a. unguentum.

Omni enim opè à combustione Gangræna arcenda est, hinc varia Cataplasmata ceti jam dicta, ex volatilibus & spirituosius paranda & calidè applicanda sunt, spirituosia enim obstructiones tollunt, tenacem mucum resolvunt, imprimis si Camphorata fuerint simul mixta, hinc sæpe sufficit Spir. vini Camph. c. aq. calc. Tinct. castor. Spir. capar. matricul. Ball. Nervin. Tinct. Galban. quæ omnia compactas particulas valde resolvunt & fluidiores reddunt: sic etiam salia volatilia oleosa adhuc sunt fortiora, quia eorum particula melius penetrant, & solidiores ac firmiores sent, & omnia optimè resolvunt. Hic Chirurgus moneo, ut omnia medicamenta in

combustione calidè applicent, quia actualis calor ipsam sæpe sanat combustionem, succi enim coagulati per externum frigus à calore iterum resolvuntur ac attenuantur. Capæ etiam locis ambustis applicatæ magnam afferunt solamen, quoniam in se continent sal volatile, cujus ope visciditates resolvuntur, hinc, ceteri diximus, omnia salia volatilia, tum internè tum externè in combustionibus conveniunt.

Sapo Venetus est in combustionem egregium remedium, quia constat ex penetranti sale volatili, & acri, cujus ope visciditates facili resolvuntur, item ex oleis particulis, per quas cutis fibræ demulcentur, & acida saliaque particula temperantur.

Aqua forti si quis combustus sit, non inconveniens erit imponi externum Epithema ex aqua sperm. ranar. cum butyro hni. *Mindererus in Med. Militar.* curavit Chymistam ab aqua forti combustum solo oleo lini atque cremore lactis. Sic etiam empyreuma vulgè dictum evocatur. Si in levi combustionem membrum admoveamus igni, particula antea impulsæ & continuum solventes ab aliis ingredientibus retropelluntur, atque simul empyreuma. Male faciunt, qui admoveant combustis paribus caustica, quia magis discindunt fibras. Cavendum quoque, ne applicentur frigida, quæ malum potius augment, quam minuunt, omnia etiam tepidè applicentur.

Crusta vel eschara si adsit, ipsa incidenda ac leniter separanda est, si non est, tunc heri in tota parte, hæc diversis in locis, ut ita scilicet, devoratis fibrillas, subtus contentas quæ cæsi fluerent. Si verò ad nervos usque pertingeret, summa cautione opus est in removenda eschara, & prius applicanda sunt nervina & demulcentia.

Si in oculo est ambustio, ratio præsertim habenda est doloris, in quem finem conducet lac muliebres sæpius tamen mutatum, quoniam facile acescit, reliqua etiam ophthalmica, aqua nempe rosar. nuculag. sem. cydon. senigret. croc. aqu. euphras. hæc verò apprinitè conveniunt arcanum *Timei a Guldensleeq.*

ʒ. Pomor. d. Num. 2.

cog. in aq. Euphras.

rosar. 2a. q. f. ad

mollit. item, trajiciantur per seta-

scum: add.

Sacchar. alb. ʒij.

camphor. gr. xv.

croci gr. v.

M. & applicetur calidè.

Si combustio in juncturis circa tendines & ligamenta observetur, statim ad laudatæ Epithemata & cataplasmata confugiendum est. Conducet etiam in hac combustionem ol. septem florum *Mysf.* cum album. ovi & mucilag. sem. cydon.

Quando ossa simul sunt ambusta, eximantur frustula forcepe, si verò tota pars fuerit adusta, ense recidenda est.

Cùm à pulvere pyrio pars quædam corporis fuerit combusta, & granæ remaneant cuti infixæ, non statim ea acu vel alio instrumento eximenda sunt, sed potius suppurationi relinquenda, quæ dein in conspectum veniunt; si enim granæ pulveris pyrii in frustula fregeris, tantum se magis

Rrrr

cuti implicant, & difficilior aut nunquam eximatur.

Quando verò praeclaudata applicaveris medicamenta, grana illa pulveris è cute ab effervescente lymphâ facili morte propelluntur, quod etiam confirmat *Clariss. Mays* dicens in *Pedulrio suo redivivo*, pag. m. 39. Grana pulveris tormentarii relictâ in facie quidem ope acus chalybeæ eruerentur, sed supervacaneum est, quandoquidem fibrillas per emollientia in tantum flexiles reddere possumus, ut grana sponte prolabantur. Ut etiam paucis interna remedia in combustionem proficua attingamus, sciendum est, si cacochymia conjuncta est, & succus vitritus nimis acris sit, ut consolidari nequeat Ambulatio, conveniunt omnia ea interna, quæ sequenti capite de Vulneribus præferimus, imprimis hic commendamus diaphoretica ex Antimonio & Mercurio dulci parata, Antihæst. Poterii, oculocancri, sacchi Saturni, item sulphurata, camphorata, uirgata, & sæpè interponenda sunt volatilia, quæ visciditates resolvunt, in quem finem etiam Chirurghi cum commo- uti solent decocto lignorum cum Theâ; cum sarcosis & agglutinatione partium dependeat à chylo, & neutiquam à vulgo dictis sarcoticis

emplastris, aliisque Chirurgorum medicamentis; hoc Chirurgis porro notandum est, ut fagiant in combustionem adstringentia & poros obstruuntia medicamenta, tùm interna tùm externa, quia his combustio magis exasperatur, visciditates cumulantur, & particule inclusæ & infixæ marcent partibus combustis.

Si Combustio abeat in fistulam, & Medicus nimis serò advocatus fuerit, sunt, qui in hunc finem commendant butyrum Antimonii rubr. vel lini decoctat. ex caput. Mort. Oli, sed nos commendamus potius Balsamum nostrum divinum, rarò in Fistulis fallens remedium.

In quibuscunque Ambustionibus Agricola extollit sequens:

*ps. Sacch. hni q. f. add.*

*ol. rosar.*

*M. F.* linimentum, quo locus ambustus calide inungendus est. Oleum Hyperici n. d. etiam egregium est sæpius applicatum: inob sexcenta alia possunt proferri, sed hæc non satisficiunt, alia certe etiam vix præstabunt: meliora enim & approbata Junioribus communicamus Medicis ac Chirurgis, quibus in præxi consummati non opus habent.

## CAPUT V. DE VULNERIBUS.

### S. I.

**M**achina nostra ex solidis & fluidis constituta, quàm fragilis existat, ex eo patet, quod Medicina excogitari debuerit ei suppetias ferendo, imò ex propter Medicina ac Chirurgia apud Ethnicos de die in diem excrevit, experienti enim occasionem dedit Necessitas. Nam quàm homines hæderentur à bestis mordacibus, artem hanc excudere cœpere, quæ eo magis necessaria fuit, quo sapius homo homini lupus fiebat, & bestia quavis peior, juxta illud *Juvenalis Satyr. 15. vers. 164.*

*Serpentum major concordia: parvis*

*Cornatus maculis similis fera: quando Leonis*

*Formor eripuit vitam Leo? quo nemore unquam*

*Exspiravit aper majoris dentibus apri.*

*Indica Tigris agit rapida cum Tigride pacem*

*Perpetuam: Saxi inter se convenit ursor.*

*At hominis ferrum ieribale incude nefanda*

*Produxisse parum est, cum rastra & sarcula tantum*

*Affixit coquere & rastris ac vomere lassus,*

*Nescierim primi gladios excudere fabri.*

Nunc ergo ad ipsa transeamus Vulnera, vel ab hominibus vel bestiis violenter infusa, quæ sunt ita simplicia, ut definitione seu descriptione non opus habeant. Vulgo verò in foro Medico

*Descriptio. differuntur Vulnera*, quod sit continui solutio in parte quidam molli & carnosa (Cur non aq̃ue in dura ac fibrola, caro enim dicitur: nequit absque læsione cutis & fibrarum?) ab instrumento aliquo secante vel pungente violenter facta.

Animum ergo Veteres intendunt duntaxat ad partes solidas, atque ad magis sentibiles: sed quis nescit corpus nostrum ex solidis & fluidis componi partibus? Neque illas dividi aut rumpi posse, ut non fluidarum ordo & mixtio turbetur, quo divortio item admissio nova statim sunt

combinationes, concreta, variorumque excrecentiarum, coagulationum, stagnationum, quæque fabri existunt omnium illorum graviorum symptomatum, quæ vulnera comitari solent. Corpus enim nostrum nihil aliud est, quam congeries indefinitorum canaliculorum, tubulorum & vasculorum fluida varii generis corpuscula transmittens. Hinc Chirurghi aq̃ue fluidarum quàm solidarum partium habeant rationem necesse est.

*Vulnerum Differentia* quod attinet, nunc vulnera sunt majora, nunc minora, atque cælim vel punctum infusa, nec ad eandem illata mensuram, sed mille modis variantur. Hinc variæ ab Auctoribus recensentur differentie, quas vulgò in Essentiales & Accidentales dividere solent, illas desumunt à vulneris essentia, partis vulneratæ conditione & causa, has verò à sciendi modo, situ & tempore. Meliori verò jure dividi possunt vulnera in vulnera Sclopetorum, confusa, puncta & morsâ. Item in Vulnera Capitis, Thoracis, Abdominis, Hepatis, Lienis aliorumque viscerum, & externorum Artuum, qualem nos in Chirurgia hac nostra ordinem observare volumus.

*S. 2. Pars affecta* Vulnerum non tantum sunt canaliculi vel partes fibrosæ aliique tubuli totius corporis, sed & ipsi succi in iis contenti, itaque si turbæ his in partibus producantur, & harmonia illa stupenda à legitima pororum dispositione, & particularum ordine dependens, auferatur, eadem contingit infusa emergentia: ibi enim corrosivum sentiens acidum: hic varia habebis saliva; illi cætericum restagnabit liquorem, alibi purulentum conspicies amurcam: hic intumescantiam, ibi inflammationem, alibi excrecentiam & dolores reperiunt

reperies atroces, qui cuncta non tam ex continui solutione, quam ex fluidorum per- verso ordine, statu & mixtione natales suos ha- bent. Partes ergo æquè internæ ac externæ, quæ ex iisdem constant bubulis, à causa vio- lenta lædi possunt.

**Diagnosi.** §. 3. Quoniam ipsa vulnera quoad externam præsertim faciem in sensus incurrunt, inanem ludrem operam, si recensendis *Signis Diagnos- tice* diutius immorari vellem: quod enim interiorem concernit constitutionem, situm & magnitudinem, ea non nisi sagaci conje- cturâ, & accurato Medici iudicio sciri pote- runt, siquidem haut semper facile iudicatu sit, quæ partes internæ vulneratæ sint, & quousque vulnera penetraverint, cum tale Scrutinium Scientiæ anatomicæ, & diligenti partium, ætionum læsarum nec non excre- torum examine nitatur, verbi gratia: in Vul- nere Thoracis sanguis cum tussi si rejicitur, & aer è Vulnerè foras egreditur, certiores reddimur instrumentum in thoracis cavitatem penetrâsse, ipsosque pulmones cum vasîs san- guiferis perfodisse. Ex anatomia ergo sciend- um est, quis partis cuiusvis situs, quis usus, symptomata sinuul considerata sunt, ex qui- bus apparet succorum corporis indoles & dis- positio, hinc & eorum quæ per vulnera eji- ciuntur, conditio notanda.

Propria cuiusque Partis accidentia contem- plari animus non est, cum vulnere particula- rium in propriis Capitulis mentioem jam in- jecimus, quo Lædorem remittimus, sed earum partium vni internarum, tum externarum, quarum iudicium mentio facta est, considerabi- mus: Ex.gr.

Corde vulnerato vel percusso vel transfollo, sanguis multus effluit, ac præsertim si dexter ventriculus vulneretur, unde etiam niger exi- bit sanguis ac fervens: Si vasa lymphatica fue- rint simul discissa, magna lymphæ copia in tho- racis cavitare reperitur, nam ex sinistro cordis Ventriculo sæpè flavus emanat liquor, in his Vulneribus arteriæ languescunt & albescent, vires collabuntur, sudores frigidi cum colore faciei pallidissimo erumpunt, tandem omnia externa frigent, quod frigus sæpè excipit mors atrox.

Septo transverso percusso & vulnerato, præ- cordia sursum quasi attrahuntur, spina dolet, spiritus rarus existit, anxietates præcordiorum cum sanguine spumante ejectione sæpè observantur, magna adest spiratio cum gemitu & dolore per totam humeri partium compagem.

Medullâ percussâ, quæ in spina est, si vulneretur, nervi resolvuntur vel distenduntur. Sen- sus intercidit interposito tempore aliquo, inviti per inferiores partes vel semen, vel urinam, vel æreus excrementa coguntur ægri.

Ictus aspera arteria exiguum sanguinem fundit, ad dorsum plurimus dolor, fauces paulatim san- guine replentur, vox rauca & linguæ aciditas percipiuntur.

Ubi Vulnera venenata sint, seu à venenatis telis aliisque instrumentis infecta fuerint, ea Vulnera reperiuntur statim sicca, & circumcir- ca pallida, sublivida & quasi cadaverosa appa- rent: simul adsumt deliquium animi & cordis palpitatio, caput obfuscat, convulsiones artuum, aliaque symptomata observari solent,

tandem accedit Gangræna ac Sphacelus, quem excipit plurimum Mors. Nota enim est hi- storia de Balneatore, qui lancetâ suâ necavit scarabæos, aliaque plura insecta, unde Vulnera, quæ instrumento hoc instituit in V.S. aliisque operationibus, incurabilia exorta sunt.

§. 4. Nunc ad *Causas Vulnerum* accedamus, & *Ætiologia* primò de iis *Veterum Galenicorum* iudicium au- diamus, qui *Causas Vulnerum* dicunt omnia illa, quæ extrinsecus advenientia, continuum solvere valent: Vulnera enim partibus mollioribus induci fatentur ab externis instrumentis tundentibus, sciudentibus, contundentibus, & dilaceran- tibus, vel animo hostili, vel ex incuriâ, & imprudenti adhibitâ, item vel à lapsu, vel ictu bombardæ, aliisque rei externæ conti- nuum violenter dissolvunt. Symptomatum quoque in Vulneribus obvenientium rationem reddamus ex ipsorum sententiâ. Dolorem, tristem illam sensationem deducunt vel à puris quantitate nimia, vel qualitate, vel à calida vel nimis frigida intemperie, doloris enim causa est continui solutio vel intemperies, non sensum, sed confectum facta, continui autem solutionem fieri ajunt vel ab humorum influxu, vel à corpore præter naturam infixo, vel à qualibet alia to distendente, comprimente & aggravante. *In- flammationem* Vulneri superveientem à sangui- nis & bilis influxu nimio deducunt, *Oedema* ve- rò eidem accidens ex debilitate caloris nativi, alimentum non concoquant, sed in pituitam tantum vertentis fieri asserunt.

*Pruritus* Vulnera sæpè comitantem ab hu- more falso, mordace, & amaro contingere haud dubitant.

*Livorem* verò Vulnerum fieri ajunt vel ob caloris nativi extinctionem, vel ob frigidam in- temperiem, vel ob nigrum in parte contentum humorem, vel ob os subius corruptum.

§. 5. *Paracelsus* inter plurima quæ Chirur- gum nosse decet, primum ac præcipuum illud esse dicit, ut quocunq; tandem oblato Vulnerè, primò statim inuito, qualem illud sit, cog- noscat, qui de curationis possibilitate, ac sine certi quid prædicere queat. Sanorum corpora tot calibus exposita esse inquit, à variis in- strumentis externis inferantur varia & diversa Vulnera, imprimis à plagis casum vel punctum illatis, insci quoque dicit ab hostibus enes, gla- dios, hastas, tela: domesticis quoque usibus venenum contrahere ait instrumenta mecani- ca, ut falces, ex. gr. quæ usûs tempore dum in- calescunt naturam eorum, quæ secant, ut herba- rum, rubetarum, arcarum facile reci- piunt.

Febres in Vulneribus à celo fieri contem- dit, & tales quidem febres, quæ statim periodis rigore & calore paroxysmum periciant, quæ quotidianarum ac tertianarum typos obier- vent, quæque non prius ægrum relinquunt, quam vulnus ipsum coalescit: superveitunt adhuc Vulneribus affectiones, quarum radix non in ipso Vulnerè, sed in toto corpore conti- netur, ut sunt phrenitides, epilepsiæ, spa- smus &c.

Fulorum verò ac aliorum instrumentorum, quæ frequenter manibus versant homines, (ma- lices præcipuè virus admodum pestiferum Vul- neribus exitere arguit, quod ea ex frequenti usu venenum in se sequebantur vehementissimum,

*Hæmorrhagiam* in *Vulneribus* vel ex ira, vel ex Venere, vel ex motu, vel ex repletione, vel ex cœlesti constellatione fieri existimat.

*Synoniam* seu *fluxum glutinis albi* duabus de causis in *Vulneribus* accidere ait, vel enim ægrorum libidine acinobediētiā, vel Chirurgi errore tūm in medicamentis, tūm in deligaturis commissio.

*Phlegmonem* per vim illatam *Vulneribus* obvenire ait.

*Spasmus* verò oboriri aſſerit à nervis in *Vulneribus* laſis.

*Luxuriantem* verò caruem, vel ob medicamenti vim, vel ob plethoricam conſtitutionem fieri aſſerit.

*Helmontii*  
*Opini de*  
*cauſis Vul-*  
*nerum.*

§. 6. *Helmontius* in *Vulneribus* non ſolam continui ſeriat aſſerit ſolutionem, ſed ſimul introduci exoticam qualitatem, unde labra *Vulneris* indignata, mox æſtuant, apoſtemantur, imò totum abinde corpus febris ac variis Symptomatum Syndrome conſtitatur.

Pus fieri *Author* in *Vulnere* ait, cum ſundum vel labra *Vulneris* acor, putredinis index contrahit. Item vermes in *Vulneribus* ob putredinem prodni exiſtimat, uti in culinis, ſi carnes corrumpi incipiant illarum juſcula acere ſolent.

Ipfam Continui ſeparationem eſſe ait quidem immediatam, atque ſufficientem cauſam occasionalem, quatenus nempe aperit, contundit &c. quæque etiam conſolidatione eget.

*Vulnere* dolore ſollicitari ait ab aquâ glareali, quoniam vulnus ex cruore celerem copioſamque parat *Synoniam* ſive glarealem aquam.

Sedationem ergo *Archei* indignat & irritati neceſſariam pro *Vulneribus*; ſorinſectus inſiſtiſtis & duplicatis, quæ proprio nomine ad mentem ipſius dicuntur *Vulnera* ſua, ſcilicet qualitas & diſpoſitio exotica vel maligna, *Vulneribus* aliis ſimplicibus introducta & impreſſa per ideas malignas indignationis, iræ, vindictæ &c. concepta, adeoque ſola cenſura læſionis & ſenſationis injuriæ & indignæ, quando homo læditur, niſi à ſe ipſo, corrente ſimul aeris inimico congreſſu, unde mox ſanguis & *Archeus* in labra *Vulnerum* offenſus æſtuat, intumeſcit, apoſtematur & ſuppuratur: idque per extractionem diſpoſitionis huius peregrinæ, qua labra ab omni accedente dolore & ſuppurationis pure ſervantur, moxque per ſe ſponte accreſcunt, quia ipſa Natura eſt morborum Medicatrix.

*Secundum*  
*Wiliſium*  
*cauſa Vul-*  
*nerum.*

§. 7. *Wiliſius* nullas alias *Vulnerum* cauſas agnoſcit præter res omnes ſcindentes & acutas, quæ parti quidam violentiùs applicata continuum ejus ſolvunt. Eaſdem etiam illorum cauſas cum aliis *Authoribus* ſtatuit, tūm quod ad iſporum vel partis aſſectæ conſtitutionem, tūm quod ad eorum prognofin attinet.

*Juxta Syl-*  
*viuſium cau-*  
*ſa Vul-*  
*nerum.*

§. 8. *Sylvius* eaſdem *Vulnere* cauſas ſtatuit, agnoſcit enim continui ſolutionem à quacunque etiam re externa violentèr indutam.

*Carteſia-*  
*norum ju-*  
*dicium de*  
*cauſis Vul-*  
*nerum.*

§. 9. *Carteſiani* *Vulnera* in Continui ſolutione cum reliquis *Authoribus* conſiſtere haud dubitant, & ea æque in mollibus ac partibus durioribus contingere aſſerunt, lædunt enim juxta ipſos modo caro, oſſa, modo tendines, vaſa alia, ligamenta &c. *Vulnera* agnoſcunt cum aliis externa, & quæ ad inter-

nas penetrant partes, ea enim fieri in Capite, Peſtore, Ventre & Artubus toto obſervantur die, ſunt vel profunda vel ſuperficialia, vel tranſverſa, vel inſiguntur puncturâ, vel à ſclopeto, vel à morſu, vel à lapſu vel idu.

Cauſas ergo *vulnerum* eſſe dicunt vel *res ſcindentes*, ut ſunt culter, forpices, gladii, enſes, vitæ, glacies, cryſtallus; vel *res pungentes*, ut ſunt acus, aciculæ, ſpinæ, dentes, tela, &c. vel *res perforantes*, ut ſunt globuli grandiores & minores; vel *reſcundentes*, ut lapſus, idus, plaga, elevatio ponderis majoris &c. Quæ omnia partibus corporis vi quadam quædam, continuum ſolvunt, & vulnus excitant.

§. 10. *Vulnere* cauſa, noſtro judicio, *Noſtra* ſunt res externæ variè violentèr partibus noſtris ſolidis intruſæ, ſive ſint perforantes, ut gladius, ſtylus, haſta, acus, fructum vitæ, ſpina, idus ac morſus beſtiarum, imò hominum iracundorum, globulis ex ſclopeto ope pulveris pyrii accenſis emiſſis, ſagitta, & innumera alia, quibus diſcinduntur corporis noſtri tubuli, canaliculique, & ſuccis conceditur eſſluxus, & hinc commixtio perverſa oritur, à quâ plura ac innumera deducuntur ſymptomata: ſunt & res ſecantes, ut enſis, culter, &c. ſive contundentes, ut pugnus, baculus, lapis &c. fortiter & impetuoſe machinæ noſtræ partibus mollibus carnis fibroſis, atque duris membranoſis, imò aliquando ipſis viſceribus impuſa intruſaque, interdum & ipſis oſſibus, tunc dicitur vulgo vulnus cum fractura oſſis. Certum enim eſt canales & membranas in vulnere lædi. Apertio enim eorum vulnus facit, & vulnus ſæpe eſt in membranis, quæ canales conſtituunt, quæ canalium ruptio fit vel 1. à rptione, cum vi diſtumpitur canalibus humore, quem continet, impetum faciente, 2. ab eroſione, cum ab acedine canalis perforatur, 3. à vi externa, contuſione, punctura, inciuſione ſive ſectiōne.

§. 11. Relictâ cauſâ tranſitum facimus ad *Prognofis* *Vulnerum*, à qua plurimum ſalus ſapius dependet, intereſt enim ſcire, vivente etiam adhuc vulnerato, an vulnus periculoſum, vel an, uti illi loquuntur, per accidens aut per ſe lethale ſit. Ubi ſtatim ſub conſiderationem venit diſtinctio *vulnerum* in ſimpliciter & ſemper lethalia. Periculi certè plena reſ eſt judicium ſerre de *Vulneribus*, atque an per ſe, an verò per accidens lethalia ſint renunciare, etenim juxta huiusmodi renunciaciones Medicis Juris. Conſulti fontes reos condemnare, inſolentes verò abſolvere ſolent: quia ergo hic de ſanguine & corio humano agitur, qui ſanguis ſemel eſfuſus, nullam reſtitutionem in integrum à Prætorè impetrare poteſt, idè probè & abſque omni præjudicio ſingula accuratè circa vulnus inſiſſimum examinanda ſunt, diuque deliberandum, quod de lethaliſſimo ſemel ſtatuumdum eſt. Nobis diſplicet diſtinctio ab omnibus recepta, nempe inter vulnera *per ſe* & *per accidens* lethalia. Si vulneratus moritur ſymptomatibus diſtoribus, quæ neceſſariò vulnus ſequuntur, cur dicitur tale vulnus per accidens lethale, cum enigma vulnus tale non fuerit inſiſſimum, æger non mortuus fuiſſet. Carnifex vulnera inſigit per ſe lethalia, uno idu mortem inducens: meliori ergò jure, reſpectu graviorum ſymptomatum vulnera poſſiunt dici valde periculoſa.

Quæ

Quâ de causa enim vulnera cordis, cerebri, vesicæ &c. per se æstimantur lethalia? certe quod tendinosæ ac membranosæ, ac nervosæ, item vasa diversa fuerint læsa, liquorumque hinc effusiones, irritationes, stagnationes, convulsiones, deliria concitata & tandem mors oboritur. Contraria tamen testatur experientia & Autopsia edocens, quandoque stupendas fieri curationes, & generosum Medicum nunquam difficillimis in casibus terreri debere. Sic visum est cordis vulnus non lethale in demortuo, ubi in cordis substantiâ musculosâ cicatrix observata fuit ab inflicto ensis ante plures annos factò. Nec in simplici & absolutâ lethaliitate temporis habenda est ratio, cum vulnerati in corde aliisque visceribus & partibus nobilibus quandoque ad diem undecimum, quandoque 15. & plures adhuc supervixerint, profecto non video, quomodo hæc vulnera & absolutè & simpliciter five semper mortifera dicenda sint: confer *Prælium, Bonetum, VVilhelmum Rivam Chirurg. Roman.* Nos quoque Limburgi vulnus profundum cerebri observavimus sanatum. Sic quoque vulnus glande plumbeâ inflictum non fuit lethale, in *Ephem. German. Ann. 9. & 10. Obs. 85.* pari felicitate intestinum jejunum vulneratum sanavit ipse succus nutritius blandus in fauciat corpore existens, in *Zodiac. Gall. Ann. 1. Obs. 5.* adde *Decur. German. Ephem. Ann. 2. Obs. Tulpi*, in quibus stupendas plures vulnerum lationes a dimitteris. Plura enim olim læthalia Vulnera nominabantur quàm hodie, ubi dies diem docuit, & vulnera quædam tot retro seculis pro lethiferis habita, nunc non nisi certis positis circumstantiis sunt mortifera. Ex quibus omnibus patet Vulnera Cerebri non nisi profundiora, nervorum principium & nervos alios attingentia, vel cum lethaliibus symptomatibus sociata, lethalia fore. Vulnera etiam cordis profundius acta nervos, atque magna arteriosa ac venosa vasa lædentia, item vulnera spinalis medullæ non procul à cervice inflicta, nec non vulnera diaphragmatis in parte nervæ, ut & vulnera arteriæ magnæ, venæ cavæ, vel etiam venæ arteriosæ & arteriæ venosæ non procul à corde illata lethalia sæpe sunt: ut & ictus intestinorum tenuium, ubi multa vasa sanguifera concurrunt, in hoc casu sanguis aliique succi effunduntur, & æger mori cogitur. Vulnera vesicæ & ventriculi majora & in parte nervæ inflicta, majorumque tendinum nerveorumque cum diorioribus symptomatibus ex necessitate lethalia cum censeferi possunt, & sunt periculosissima. Vulnera quoque hepatis, lienis, pancreatis, diaphragmatis in parte membranosa, item fibrarum plurium in abdomine contentarum, ut plurimum sunt periculosissima imò lethalia. Idcirco necesse est, ut inspectores Vulnerum in Anatomico Studio ritè sint versati, texturam, constitutionem, connexum, situm, & usum partium internarum probe sciant, Cadaver etiam caute aperiendi & diligenter inspicendi modum calleant: præterea in vulnerati ætatem, statum præstanz sanitatis, vulneris modos & figuras, instrumentum, quin & posituram corporis, in qua tum temporis Vulneratus læsus est, atque insuper in omnes illas circumstantias & accidentia, quæ in ipsa vulneratione & ab ipso Vulnerato, tum ratione curæ, & diætæ, ut & quoto die acciderint, anxie inquireant: & quæ ulterius sciri necessaria sunt ex actis à Judice loci colle-

dispetant, singula attendant trutinantque. Unde manifestò patet, non cuius Barbiton fori, aut Balneatori, aut Carnifici soli Vulnerum inspectione aut Cadaveris apertionem tutò committi posse, sed artis probe peritos Medicos ac exercitatos Chirurgos consulendos esse, videantque illi Judices, quomodo conscientia suæ consulant, qui contingente graviore vulneratione, aut etiam non necessariâ, si quis vulneratus demortuus est, Cadaveris apertione & inspectione, imperitos & quemcumque tandem proximè habitantem Empiricum ad inspectionem vulneris ac curationem Vulnerati, apertionemque demortui requirunt. Etenim quomodo quæso accuratam, legitimam, ac juxta leges artis institutam inspectionem vulneris, aut apertionem Cadaveris, aut etiam æquum super lethaliitate vulneris judicium expectare poterit Judex ab eo, qui artem nunquam studuit. Hoc tamen non obstante, quantum hoc in passu toto die peccetur, optimè norunt Collegia Medici, utpote quæ hujusmodi à Barbitonforibus & Balneatoribus & Carnificibus committos errores, atque absurdas sæpe relationes vix satis detestari possint. Materia hæc meretur, ut intimius examinetur, nobis verò hæc vice non libet, festinandum enim nobis est ad reliqua prognostica, in quâ prognostici ritè formanda observandas sequentes regulas experientia & rationibus sancitas, nobis præfigimus ex quibus periculum hauci potest. 1. Loco Rer pars læsa. 2. Vulneri ipsum. 3. Ipsius curæ. 4. Vulnerati persona. In parte læsa præprimis considerandum, qualis illa sit, an nobilis, & quilibet partibus solidis & fluidis consistat, & an ad vitam simpliciter necessaria sit nec ne? an majora vasa, nervos ac tendines habeat? In vulnere ipso videndum & sciendum est, quo instrumento id factum, an venenatum, an verò minus, an casum, punctum aut contundendo factum, explorandum quoque est, an vulnus sit magnum, transversum, profundum, an in ipso plures fibræ, arteriæ, venæ, tendines, ac nervi dissisi ac lacerati fuerint, quæ necessariò & inevitabiliter graviora post se trahunt symptomata, ex gr. hæmorrhagiam nimiam, dolores, vigilias, subitaneam inflammationem, Gangrenam, Sphacelum, deliria, convulsiones &c. In Cura observandum est, an remediis adit applicandi possibilitas nec ne? an Chirurgus peritus in promptu adfuerit, an iste cum Medico nihil auxilii & remedii oniserit, aut uterque vel ambo inter operandum aliquid erroneum commiserit. In persona Vulnerati perpendendum est, an antea acceptum vulnus sanus fuerit nec ne, an nulum in Diætâ commiserit et torcum, an ex præscripto Medici vixerit.

In genere vulnera punctum inflicta plus alunt periculi quàm quæ casum facta sunt. Vulnus cum intensâ febris inflammatoriâ, dolore, convulsivis motibus, monstri quid aliis, imprimis si ab initio Vulneratus se ritè habuerit, & circa causam aliquam manifestam externam cuat in deterius. Vulnera Nervorum aliquando bona apparent, sed ex improvviso invadit Vulneratos convulsio, hinc infusa sunt, si materia serola effluat instar feri, (*Wie Meissen*) vel si lactea instar albuminis ovorum, vel aquea, dicunt Chirurgi, id esse das *Glied-Wasser*: cum verò nostro judicio vel succus nutritius vel lymphæ ex vasis lymphaticis dissilis emanant se. Si nervus,



aut tendo, aut arteria, aut vena, si in totum fuerint recisa, minus intendunt periculum, quam si tantum ex parte fuerint dilata. Vulnura nervorum, item tendinum aliarumque membranarum gravioribus stipata symptomatibus sunt periculosissima, & ut plurimum lethalia. In Vulnerebus pus laudabile & maturum, seu concoctum uti vulgo dicunt, mox apparet, sicuti testimonium sanguinis succique nutritii rite dispositi perhibet, ita brevi sanatione pollicetur. Tempore æstivo, & quidem circa dies caniculares, nullum vulnus quamvis exiguum in subiecto cacochymico seu scorbutico superficialiter tractandum, cum eo tempore ex parvo vulnere magna oriri possit calamitas, prout id pluribus comprobare possum exemplis; Succi enim nostri non tam multis gaudent spiritibus, quia tum temporis calidissimi per apertam portam putæ cutis spiracula evolvant, & sic sanguinem nostrum reddunt debilem & imbecillum, hinc & ipsa pars suis caret spiritibus, & sic mixtura turbatur & inordinata fit mixtio, unde sæpe Gangræna ac Sphacelus natales suos habent. Sic videmus cerevisiam quoque diebus canicularibus facilius accrescere quam hyeme. Nimirum etiam frigus Vulnerebus etiam obest adco, ut Nobis persuadeamus, si ær à vulnere arceat possit, vulnus sponte iterum conuniturum esse. Frigus enim obstructions parit coagulando succos in vulnere existentes, impedit transpirationem incrementando omnes succos, hinc sæpius inflammatio, gangræna, livor &c. ortum suum habent.

Si in magnis Vulnerebus & pravis tumor non appareat, id ingens portendit Veteribus malum, quod tamen nostra experientia falsum est; melius enim est nullum adesse tumorem; denotat enim partes fluidiores posse circulari, nec tot discit esse canales. Vulnura quo diutius æri exposita sunt, eo facilius sphacelantur. Vulnura si scilicet infecta plus damni inferunt quam alia, non verò propter imaginariam illam ambulationem, quam à glande heci plures persuasum habent, aut ob varium fibrarum, aliorumque canaliculorum fortorem contusionem, & subitanam earum discissionem. Nisi enim is qui bombardam explodit, admodum vicinus sit corpori læso, ita ut flamma pulveris pyrii attingere possit, nunquam ambustio animadvertitur: hinc montes aureos frustra pollicentur ii, qui arcana sua nescio quæ antipyrctica contra ambustionem crepant iactantque. Vulnura venevata sæpius sub pelle vulpinâ ex insidiis suam exercent atrociam, & si in aliis, certe in his momentum temporis, à quo magni exercitus clades hoc tempore sæpius dependet, reverenter habendum, cum præsentia tempora, uti olim, teste *Curtio* apud *Alexandrum*, & segnes Medicos & lenta remedia non expectat. Vulnura, quorum labia maxime disjuncta sunt, ut in rotundis vulnerebus videre est, difficiliora sunt curata, quam eorum quorum labia facile coniungi possunt; ratio in promptu est, quia tubuli sibi propius accedere & sic accrescere possunt. Malum signum habetur, si convulsiones *Vulnus* comitantur, denotat enim lacerationem & contusionem majorum nervorum, ita tamen factam, ut istæ fibræ partes non planè discissæ, sed tantum punctæ fuerint, unde circulatio succorum unimuitur, & per consequens inflam-

matio, gangræna &c. aliæque symptomata producantur.

Vulnura Scelopetorum summam etiam spirituum & sanguinis perturbationem inferunt, semper enim aliquid de ipsa substantia auferitur, sic quoque est semper Vulnus compositum, vitæ enim transit globulus eorum, ut non nervos, tendines, fibrasque varios cum contusione maxima tubulos lædat. Vulnura scelopetorum sunt vel cum vel sine ossis fracturâ: illa sunt periculosa & curatu difficiliora, hæc verò non tam periculosa. Vulnura quæ cavitatem insignem penetrant, ut caput, pectus, ventrem, sunt periculosa quam si transierint partem carnosam.

Vulnus ab acule lethale observatum est, testantibus *Ephemerid.* Germ. Ann. 3. Obs. 315. Sic dum hæc scribimus, quidam duorum digitorum unguibus comprehendit mammæ alicujus femine partem, & fortiter comprimit, & qua pressione tumor ungens exortus est, qui tandem exulceratus, & metus erat, ne cancer ipsam corripit. Vulnura nervorum, cum dixerimus, vix sanabilia sunt, institimus sæpius in canibus experimentum, quibus nervos recurrentes ab utroque latere cultro discicavimus ad omnem vocem vel sonum eis adincedum, altero tamen die vel tercio canes sic vulnerati ut plurimum sine voce moriebantur.

Vulnus à sepe rabidâ Vtule cuidam inflatum non tantum maximam inflammationem, sed & gangrænam accerit illi, quæ tamen congruis infra dicendis remediis feliciter curata fuit. Vulnura aliâ à rabidis animalibus infecta periculosissima sunt, accidit sequens exemplum hoc anno: Puer 17. annorum aucupis aviium *Ocellans* dictarum, ante 4. mensium spatium à cane rabido mordetur in manu, quo motu facto alluivit theriacam & bene sudavit, vulnerique congruis etiam prosperis remediis, ut rite consolidata fuerint vulnura parvula. Quid sit? puer iste hisce diebus absque ullâ datâ causâ de cordis anxietatibus maximis conqueitur, & protinus nihil deglutire potuit ob & spasnum, & sic intra 24. horarum spatium absque ullâ alio obveniente symptomate mortuus est. Sic sæpe fermenta ista venenata in tubulis diu latere possunt, datâ verò occasione facili sanguinem nostrum coagulare & mortem accerere possunt. Idem etiam vespærum & apum aliorumque animalium infligit etiam vulnura, quamvis minima, atamen ut plurimum pungunt corpora compactiora ut sunt partes fibrosæ, tendinosæ ac membranaceæ, hinc etiam oriuntur atrociora symptomata, ut sunt inflammatio, convulsio, gangræna ac nonnunquam ipse sphacelus. Nuper balneario quidam hujus civitatis venam secaturus loco vcnæ nervum tetigit, à quâ puncturâ atrocissima symptomata, ut Inflammatio, gangræna, sphacelus celus ac tandem ipsa mors subsecuta est.

§. 12. Atque hæc quidem de *Prognosi* in *gen.* dicta sunt, cum Vulnere particularium *nerum*, prognosin suo loco jam dixerimus, restat, ut *Diastam* paucis etiam attingamus. Ante omnia vitandus est ær, quicunque enim in vulnere ardens est, qui solas ita poros vulneris destrucere potest, ut Gangræna aperiantur foras. Si eniam recens Vulnus in momento conflagringi possit, ut nec ær externus irrueret, nec amplius quid è vulnere efflueret, à solo liquore nutritio dulci fibrilisque canaliculis rupis appposito consolidaretur.

daretur. Maxime enim aëris habendus est respectus, qui saepe quid in sinu gerit quod Vulneribus inferendum est, uti constat ex oblatione Infusa Candida, ubi Christus stanti tum temporis levissime vulnerati, quicquid etiam adhibuerunt Medici ac Chirurgi, obierunt. Contrā Athiotes ad caput bonae spei habitanter gravissimis Vulneribus nil applicant aliud quam leuissimum ovillum, quod calidum Vulneribus infillatur, ea feliciter curat, navium aërem jam ingressum expellendo & recentem non admittendo. Inprimis verò vitetur aër frigidior ac calidior, & sit postea temperatus, pessime enim consulantur sinuati ægrotorum sinuum illi Chirurgi, qui saepius Vulnera detegunt & aëri exponunt.

Vitetur sit tenuis, boni lacteque succi, hinc enim generatur optimus chylus qui vulnerum est balsamus universalis, & quod Veteres Naturā adscribere, id Nos huic succo nutritio adscribimus. Angue pejus fugiatur omnia acida & salia saccharataque; eò enim semper respiciendum, ut succus nutritius dulcis ac fluidior generetur. Conducunt ergo omnia hordeata, aliaque jascula cum succo Cherefolii, Veronicae, Beccabungae, Portulacae aliusque cocta, item conveniunt varia aromatica. Male ergo Veteres in Vulneribus commendantur digitum frigidior, unde enim magis incassantur succi & functiones reliquae impediuntur. Vulneratis semper alimenta calida dentur, inprimis, si febris adeit, in hoc enim casu frigida maxime nocent.

Potus non sit liberalior, sed moderatus, cerevisia sit tenuis ac rite defecata & herbis vulnerariis maritata, vini generosi usus praesertim in aëstetis non plane interdicatur, uti fecerunt Veteres, eligatur dulces vel Gallicani vel Hispanicum vel Holstadiensis crudior Tartaro non abundans, nec adeò acidum, ut sunt quaedam vina Rhenana.

Sed Vinum optimum non sumatur mensuratione, aut cochlearis, sic enim vinum sanguinem & succos nostros corroborat, & hic multum consuetudini dandum est, si enim succi nostri singulari gaudent mixtura particularum vinorum, iisdem & sustentari volunt, ex. gr. si enim quis vino adusto afflictus sit, & una vice id intermitat, certe maximum vitæ periculum incurret, ceu pluribus exemplis demonstrare possumus. A solo lactis potu calido periculosè vulneratos bene habuisse hætenus observavimus, inprimis si potus Theae fuerit commixtus, vel solus potus Theae vel Caffee, vel Veronicae aliusque herbae Vulnerariæ conducere.

Somnus & Vigiliæ medioeriter se habeant, somnus tamen sit liberalior, magis enim convenit quam Vigilia inmodica, Ager non decumbat in latus laevum.

Excercenda assumptis respondeant quantitate, & iusto excreantur tempore, & alvus astricta solvatur Enemate non ætem singulis diebus applicato. Vitentur præprimis in Vulneribus Animi passiones, nocent enim ira, metus, Venus, quæ existunt sanguinis, ac inprimis succi nervi coagulatores maximi, quæ eo propter ceu pestis fugienda sunt: sic & risus vitetur, cuius noxam vide apud *Hilandum Cent. 1. Obs. 15. pag. 26.* Maxime enim, ceu dictum, ab animi passionibus coagulatur sanguis ac succi corporis reliqui, qui coagulati quam tragediam producant, Medicis omnibus jam notum est, inprimis in Vulneribus, ubi omnes succi liqui-

diores ac fluidiores esse debent, ut eò citius per canaliculos minutissimos fluere & refluere possint, hinc enim fit consolidatio Vulnerum, à stagnatione verò & coagulatione est contrahunt inflammationes, tumores, ulcera & alia plura mala, alibi ad nauticam jam d. cta.

9. 13. *Perfusa Diata* nunc ordo non jubet accedere ad *Curam Pharmaceuticam* ac *Chirurgicam*, prius ergo *Veterum de Vulneribus* audiamus curandi rationem, quæ juxta ipsos consistit in laborum disjunctorum reunionem, ut illa, quæ per divisionem plura sunt facta, unum fiant per unionem, quam dupliciter fieri asservunt, vel à Deo Natura vel à Medico. *Naturam* dicunt id facere tanquam agens præcipuum, & tanquam causam efficientem, aliter, regerantem, alentem, nisi fuerit impedita; Medicus verò secundum eos loquitur tanquam minister naturæ, impedimenta remouet, atque ita secundario curat: quod ut faciat, debet primò efficere, ne quid extraneum in Vulneris incidat, ut sunt pilæ, polvis, oleum, quod conglutinetur, omni impediat: secundo ut, si quid incidit, tollatur, ut sunt sanguinis grana, ossa, terra, &c. quæ si absque ægri meritu deui possint, demenda etiam sunt, idque bistariam, vel instrumentis vel medicamentis. In telorum extractione diligenter attendunt eorum figuram & partem, cui affixa sunt, & quid profunde hæreant: Instrumenta telis extrahendis apta dicunt *ossium corvini, forcipis, novacula, teretia, impellens eorum*; *aperpallorum* *seminum*, *perpallorum* *marem* &c. Medicamenta, quibus externa tela scilicet spumas extrahunt, sunt emplastrum diadematium, sapo ingers, ras diademi albi, aristoloch. rotund. cum melle mixta, arundinis, radix thapsiæ, sagapenum, ammoniacum, lignum vitæ quere in, succinum, magnes præparatus &c. ex quibus prætant emplastrum, vel unguenta vel cataplasmata. Etenim & remotis his, quæ curationem frustulantur, partes disjunctas reunendas esse consulant, labia Vulneris æqualiter & commanter & ungerendo, quod Medici potius quam Doctores *Naturæ* beneficio perfici ajunt: Fieri autem reunionem contendunt, vel vinculo ex quobus istius circumdato, vel ligatura sola, vel sutura, vel fibulis imposita, aut hanc quibusdam emplastris glutinantibus, omnem, quantum hinc potest, dolorem præcedendo: sicut in plerumque fieri debere statuant in partibus mollioribus. Eò etiam respiciunt, ut partes debite situi, pulvinariis, fasciis, aëre competenter conserventur. Veteres de conservanda partis temperie in Vulneribus maxime solerti sunt, hæc enim conservata vulnera facillius conglutinantur & sanari dicunt, cum solus sit temperamentum & naturæ opus. Necesse est: runde ajunt, partis totum & licetatem in suo gradu continere, quod heri dicant optimo instituto victus ordine, pharmacâ, phlebotomia & Topicis medicamentis, inter quæ seccantes, moderate refrigerantes & adstringentes commendant, ut nempe superflua humiditates absorbeantur. Retegenda tamen concentrate ajunt calorem & humorem: Adstringentia verò corroborare & repellere, laxantem partem edimendo, quæ ad hanc animi receptionem plurimum facere asservunt; Giustatione enim & invitatione opus esse dicunt.

qua

quæ plurimum corporum unionem per mixtionem partium procurat.

Vinum nigrum stypticum seu austerum astrigendi & siccandi vi vel facultate polleere dicunt, item sequentia, ut sunt, fœcus millefolii, anagallidis, plantaginis, fol. salicium, vesicatum ulmi, eupressi, equiseti, pulv. sangu. draconis, boli acmeni, cort. granat. balustiorum, gallarum inumatur, rosar. rub. eor. ill. rub. lap. hæmatit. terr. sigillat. santal. rub. mast. sarcocoll. aloë &c. ex his plura componunt medicamenta; magnificiunt empl. diapalm. de cerussâ, ungu. aureum, citrinum, basilicum; ad partis robur conservandum ex iisdem parant varia defensiva, qui superiori parti membri, ad impediendum humorum affluxum applicant. Purgationem quoque Veteres in Vulneribus magnis susceperunt ob revulsionem, si nempe partes superiores fuerint læsæ, per inferiores partes corpus evacuant, & prout humores maximè peccare videntur, & patientis temperamentum indicat, ita & purgationem esse dicunt: Si nempe biliosi redundent humores, cholagoga, si melancholici peccent, melanagoga exhibent. Hipp. & alii in Vulneribus (non vero sine periculo) scammonium promiscuè adhibuerunt. Quod symptomatum Vulnerum curationem attingit, si dolor oriatur à calidâ intemperie, & post illam frigida, calidam intemperiem corrigunt decoctis, vel aqua vel succis refrigerantibus, ut decoctis aqua vel succo solani, lactucæ, endivivæ, rosar. violarum, nenupharis &c. sæpius applicatis, vel albuminibus ovorum bene conqualatis cum oleo, rosaceo, iisque madefactis linteis sæpius adhibitis. Frigidam intemperiem contrariis curant: utpote coquant salivani, rorem marinum, folia lauri, lavendulam, majoranam &c. in vino generoso & applicant, madefactis in colintolis, vel spongiola in oleo vulpino, chamæmelino, de spica, lumbicorum & similibus intincta superligant. Si veneni adit suspicio, hisce semper alexipharmaca & venenum attrahentia commiscunt, si verò corpus quoddam extraneum dolorem excitet, ut v. gr. grumi sanguinis partem distendentes, fluxionem revellendam esse ajunt per venæsectionem; si alia qualiacunque, hæc quamprimum removenda: eodem modo, si à vinculis, vel futuris excutetur dolor, illa laxanda esse dicunt, has verò tollendas.

Si quantitas puris dolorem faciat, huic exitum per dilatationem procurant. Anodyna interdum adhibent, ut oleum menisfarinum, de mandragora cum paucis opio & castoreo ad corrigendum frigus: vel contundatur solanum cum radice, & cum axungia suilla bulliat fiatque unguentum. Medullam panis cum lacte vel aqua ferventi coctam ad modum cataplasmati apponunt.

Si inflammatio vulneri supervenerit, huic quantocius occurrunt, recurruntque ad venæsectionem, deinde contundunt malum granatum dulce in mortario, & affundunt vinum stypticum dulce, parantque ex his cataplasma quod apponunt. Si Erysipelas vulneri accidat, purgant vel corpus, vel cataplasma ex succo solani & farina sem. lini, in ipsum autem vulnus digestivum sequens simile imponunt.

℞. *Terebinth. opt. aq. solani aliquoties lota* 3j.  
*farina hordei vel lini* 3j.  
*vittell.ovi No. j*

Agitant bene simul, & effelunt linimentum. Si convulsio contingit vulneribus, & quæ sit secundum eos ab inanitione, Topica varia eligunt, & hydraeum applicant calide: item ol. amygd. dulc. rosæ violac. lil. alb. pingued. anserin. anatis, butyr. recens. In Vulneribus superficialibus sequentem commendant *pulverem agglutinativum*, albumine ovorum exceptum & appositum.

℞. *Boli armen.*  
*aloes hep.*  
*Olibani*  
*myrrhæ*  
*Majstichis*  
*Sarcocoll.*  
*tragacanth. aa.* 3ß.  
*farin. hordei*  
*fabar. aa.* 3j.  
*M. F. pulvis.*

Exsiccata lintea semper vino madefieri volunt, carnem verò generantia, vel debilitat exsiccantia & abstergentia sunt mastix, olibanum, colophonia, farina hordei, fœnum græcum, aloë, resina, vinum turgent. Mediocritia verò sunt farina lupinorum, orobi, fabarum, aristolochia utraque, iris, ungu. basilicum minus, de betonica, de cerussâ, aureum, de matrisylvia. Maxime autem talia dicunt limaces usti, plumbumustum, myrrh. centaurium minus, unguentum Apostolorum de tertia. Primò ergo Galenici vulnus abluitur vino calido, & concoquentia adhibent, qualia sunt ex vitellis ovorum & terebinth. digestiva dicta: secundo detergentia, quæ parant ex melle, vel syr. rosaceo, fatina hordei, fabar, hisce factis ad sarcotica deveniunt; dein cicatrizantia applicant, qualia sunt cinis coriiusti, galla immatura, malicorium, balauista, acacia, sumach, bolus armenia, cerussâ alba, plumbumustum, pulvis argnollosæ, ungu. de cerussâ, de minio, de lithargyrio, sangu. draconis, terr. sigillat. pulv. rosar. santal. rub. Si cicatrix emineat fuerit, scarificant, dein erodunt & alumenustum adhibent, vel eminentiam novaculâ excindunt, vel pondere laminæ plumbeæ reprimunt.

Supercrescentiam carneam tollunt corrosivis calidis in quarto gradu, acrisbus & abstergis, talia sunt Chaleitis, mify, sory, chalcaptum, xrugeo, alumenustum, rad. asphodeli, trochisci de calcideidem faciunt, sed mitius spongia & stupra cannabinâ minutim incisâ, linamenta antiqua muria imbuta & exsiccata.

Curationem *Vulnerum* à morsu vel ictu venenatorum animalium illatorum dicunt esse debere extemporaneam, antequam vires prosterantur, inkitunt fortem ligaturam, ne venenum cor petat, cucurbitulas siccas, si earum pars sit habilis, applicant, vel cauterium actuale vel potentiale, vel Theriacam cum allii, capis vel pulvere gentianæ apponunt, si magnus adit dolor post cucurbitularum demotionem, gallinam per medium sectam, vel omentum hædi, porcellæ, vel agni adhuc calens superligant. Interea vitalem indicationem minime negligunt, sed Theriacæ 3ij. in vini generosi 3ij. dissolv. & exhibent.

Vel:  
℞. *pulv. camemor. succiatil.*  
*magnus, ppt. aa.* 3ß.  
*Aq. ferri*  
*pimpinell.*  
*vini alb. aa.* 3ß.

*Strup.*

*Syrup. de succo citri 3℔.  
M. F. potio.*

Item Theriacam diateserōn in vino dissolutam propinant, etiam theriacam in oleo rosæ dissolvunt & in vulnus linimentis intrudunt, item æstimant scordium, centaureum minus, terram lenitiā, pulv. cancerum fluviatiliū, diastamnū &c.

In vulnere nervorum à punctura cæca, ut dicunt, instrumento sc. subili factō, egere ajunt dilatatione & interdum omnimodā incisione: si verò punctura non fuerit cæca, sed aperta, tunc adhibet dolorem nigricantiā simul & abstergentiā, ut sunt oleum vetus calens terebinth. hyperic. l. alb. vulpinum, de thæstoro, ovorum, quæ his de applicant. Membrium quoque vulneratum foveri jubent hydrazo calido, ita tamen, ut semper ante refrigerationem deponatur & renoveatur somentum, vel emplastro vulnus muniunt, seu extrato ex cera, terebinth. & piec factō, inunctā tamen prius oleo tuta parte: semper verò ab acerbis cavendum esse ajunt.

*Paracelsi  
cura in  
Vulneribus.*

§. 14. *Paracelsus* Tyrones suos in curatione *Vulnerum* ita docet, ut prius fiant, quānam sit efficiens causa curationis *Vulnerum*, eam enim conveniens medicamentum indicare posse dicunt; statuit ergo, Deastram naturam corporis, carnis, ossium, nervosorumque partium radicalem ac congenitum balsamum in se continere, qui vulnera, puncturas, omnemque continui solutionem curandi facultate prædus sit, quod sic intelligendum vult: Balsamus naturalis in carne reconditus, cernosum vulnus sanat. Sicque secundum Authorem omnis humani corporis pars curationis efficientem causam, i. e. naturalem Medicum in se continet, qui ipsius continuationem solutam denuo conjungat. Non Chirurgum, sed Balsamum hunc vulnera curare ait. definit itaque Chirurgum custodem naturæ (balsami radicalis) ab actionibus externorum elementorum. Pus in vulneribus dententum aliud à putredine esse vulnus dicit, aliud à nutrimento medicamentofo, quod excrementitium pus dicitur. Monet quoque Chirurgo, ut vulgatum sanandum ac albumine ovi oblinendum: vulnere morem abijciant, tanquam naturæ adversissimum: Curationis internam causam intuemdam esse vult, exterius verò vulnus mundum servandum esse præcipit, & ab injuriis tuendum. Hanc namque veram esse curandorum *Vulnere* metho-dum arguit.

Deligandorum *Vulnere* rationem tūm in recentibus cūm inveteratis plagis commendat maxime, aptam namque ligaturam mirifice in inveteratis prodesse scribit, recentia vulnera à symptomatibus præcavenda esse ait. *Vulnus* itaque vel mundum autem, vel jam demum mundatum, singulis diebus his deligandum vult, præcisè semper duodecim horis interpositis; post duodecim enim horas cujusvis medicamenti actionem & nutritionem elanguescere statuit, ex quo vulnus ipsum postea paulatim in deterius prolabitur.

Suturas rejicit author, dicitque, Naturam ipsamque vulnus licet ac conglutinare medicamentis enim legitimè adhibitis nervos, ligamenta, tendines, cutem, carnem naturæ suenda ac glutinanda relinquit. Hinc sciendi rationem non solum ut ab arte alienam, sed ut dolores & fluxiones concitantem improbat, & dolet

tām inartificiofam operationem inter artis secreta numerari. In quarum locum Author lubelluit pulveres glutinatorios ac aquas collecticas.

Deligaturus initio *Vulnus*, primum omnium ipsium oleo vel balsamo vel unguento vulnerario tepidis, unā cum his, quæ in iis intubuerint, implet, dein Emplastro Sticlico imposito accuratè deligat, circa vulnere autem regionem eadem ipsa adhibet, vel oxyrrhodino ipsium membrum irrigat, & istud continuandum præcipit in novem vel octo dies, prout vulnus ipsium magnum vel parvum existerit: immutat autem seu tetat singulis duodecim horis. His ritè perficetis, majore curā nil opus esse ait, nisi vulnus admodum amplum sit, vel in quo tendo vel ligamentum aliquod vulnere atque symptomata minetur: ubi vulnus punctum factum est, Syphone oleum aliquod ex prædictis injicere jubet, vulnusque curat.

In *Vulneribus* scarificationem vel venæsectionem naturæ oppellæ subvenire ait, Languinis verò immodicam profusionem culpatur, quæ sæpè dyspnoeam, quandoque hydropem atque tumores efficere notavit.

Author in *Vulneribus* ad purgandum sanguinem Aquam Cichorææ & Chanedyos exhibet; hæc enim, secundum ipsium, omnia in sanguinis noxam tollere apte sunt.

*Vulnerariarum* potionum facultatem in eo consistere ait, ut auxiliante naturā, intra seculum omne vulnus tam casum quā punctum illatum percurare possint. Potiones enim in his natura ecia alimentum recipit, cui quæ inest necessementosa vis non respuitur à natura. Potiones hæc vulnerariæ, uxta ipsium, conservant naturale temperamentum, omnemque intemperiam corrigunt, adhæc naturam sic alunt, ut planè nil ipsa præterea desideret Simplicia, ex quibus potiones vulnerarias Author parare solet, sunt se quentia: Scenicula alba, silvestris, al. humilla, dracunculus, ophioglossum, spisso, senecia serpents, trifolium, consolidam media, telphium, pastinaca sativa alterius herbe, limonia utaque, mumia, sperma ceti, noctua, terra sigillata vera, Rheubarbarum, Buxi folio, Cyclamen, Periclymenum, Taber, Aristolochia, Agrimonia, Symphytum, Persicaria, Beta utraque, pavonis pennæ, polytrichum aureum five Apuleji, lilium convallium, id est, Ephemeron non lethale. Inter hæc tria esse dicit, quorum succo epoto, omnia vulnera ac punctura curentur, Item duo notata esse, quorum utrumque prius aquæ intinctum, si vulnere imponatur, ipsum vulnus prius glutinari, quam herbe componescant. Estque & unum ex his, quod ter totum vulnera, omniaque *Vulnerum* Symptomata glutinare ac tollere efficax est. Vinum enim nonnullis prædictis herbis in cantharum imponit, ac committitur vasis probe circumclis in duplici vase decoquit; sic enim de vini substantiā æ viribus non solum nil perditur, sed & in illud omnis facultas herbarum decoctarum transiit. Diligenter vinum antiquum album, tenue: vitandam autem esse ait rubrum ac crassum. Possunt ad huncem Authoris vindemiarum tempore, sine coctura, potiones tales parari, si herbe enumeratæ in multo deferbuerint, ac postea cum mentem aliæ recentes impostæ fuerint, ut v. vinum ommentarum qualitatem induat, quod deinde abque ulteriore præparatione, potiois vulnerariæ loco dari poterit: cunnamomum hæc deco-

etis adjicit, tūm gustūs commendandi, tūm restaurandarū v rium gratiā. Simili ratione alimentia vulneraria parat, si carnes vel pullos ac gallinas &c. cum aqua quantum sufficit, adjecit herbis vulnerariis, in duplici vase decoquit, vel si aqua displicuerit, in vino bullire facit, ac dein gelatinam parat; hujusmodi enim alimenta mirum in modum Vulnerum glutinationem adjuvare scribit.

Formulas potionum vulnerariarum sequentes tradit.

- ℞. *Sanicula*  
*Vinca pervinca*  
*centaurea*  
*Beonica* aa. Mj.  
*consolida regalis* Mss.  
*Agrimonia* Mij.  
decoq.

Vel:

- ℞. *Ophioglossi* Mij.  
*Achimilla* Mij.  
*Vinca pervinca minoris* Mj.  
*Periclimeni* Mss.  
*Rhabarbari* ℥ij.  
*Rhapontici* ℥ij.

coq. ut dictum est.

Vel:

- ℞. *Angelia* ℥℔.  
*Mumia* ℥i.  
*Sperm. ceti* ℥ij.  
*glandium* ℥ij.  
*Islephii* Mij.  
*Ciclamini* ℥ij.  
*Limonii nrisque* aa. Mijj.  
*Vini* quantum sufficit, fiat decoctio

in duplici vase.

Alios quoque præparationum modos habet, si herbe in aquis destillatis intabuerint, ac postea in duplici vase coquantur, ex. gr.

- ℞. *Aque limonii sextarium unum, herbarum limonii* Mj.

*Diapensia* Mss.

*Vinca pervinca* Mss.

Fiat decoctio eo, quo dictum est modo, in cantharo. Baccæ Juniperi, in quibus latere dicit singularem ac secretiorem quandam facultatem vulnera respicientem, sequenti modo præferibit:

- ℞. *Baccæ Juniperi contus.* lbj.  
*Limonii nrisque*  
*Periclimeni radices*  
*Diapensia alba* aa. Mss.  
*Ophioglossi* Mss.  
*symphyti*  
*aristolochia* aa. ℥v.  
*persicaria* ℥iv.

Destillantur arte Chemicā, aquæ destillatæ rursus immergantur herbæ dictæ, tūm Baccæ Juniperi cum cinnamomo, & fiat decoctio in diplomate vase benè ocluso. Similiter ex floribus vulnerariis cum spica parare novit pinguedinem quandam, quam parvā dosi, tam in cibo, quam in potu sumptam vulneribus prodesse memorat. ex. gr.

- ℞. *Fl. spica* Mj.  
*hyperici* Mij℔.  
*verbasci* Mss.  
*Bethonica*  
*centaurii minoris*  
*prunella* aa. Mss.

parat id more solito.

Sequens universale dicit:

- ℞. *Rad. Symphyt.* ℥ij.  
*aristolochia* ℥ijj.  
*calami aronis* ℥j.  
*Ireos* ℥℔.  
*herbe vinca pervinca* Miv.  
*sanicula alba* Mss.  
*pennarum extremitat. pavon.* ℥ij.  
*Myrrh.*  
*Masticis*  
*Thuris*  
*Mumia* aa. ℥℔.

coq. in vino vel aqua communi, prout necessitas postulaverit.

Idem Author inter Topica Vulnerum cum antiquis, Græcis, Arabibus, Mauritanis, Aegyptiis laudat unguenta, quorum corpora sunt Melic. & Butyrum, eā ratione, quod Apes & Boves omne genus florum ac herbarum exsurgere & depascere videat, existimans iis varias herbarum facultates communicari: seq. ergo communicat formulas:

- ℞. *Butyri majalis* lbj.  
*Arnoglossæ*  
*limonii nrisque*  
*Bete cum radicibus* aa. Mj.  
*Ophioglossi* Mj.

contundantur & permisceantur cum butyro, & insolentur per menses aliquot, post percolentur ac servantur ad usum.

Diligit ipse efficacissima, ut sunt rad. Symphyti, Aristolochiæ, Ophioglossum, limonium & intestina terræ. ℞. radices & herbas ex eorum moratis quæ plauerint, eas adhuc virides contundit in formam pulviculæ, postea affundit vini tantum, ut paululum supernatet, coquit in duplici vase Cantharo inclusa per horas decem, deinde exempta rursus commisceat & percolat, ac adjecit mellificii apum recentis, vel butyri, quantum sufficit, mixtisque omnibus imponit in cantharum, & coquit ut prius, coctā iterum percolat, ac prelo exprimit, denique Alembico indita infolat usque ad justam consistentiam, & reservat ad usum, quod unguentum magni æstimat.

Ex resinā laricæ & abiegna etiam parare solet unguenta, ut:

- ℞. *Resina laricæ* lbj.  
*album ovor.* No. 10.

Agitentur benè ac subigantur, fiat unguentum colore subflavum, cui permisce

- pulv. rad. Symphyti majoris* ℥℔.  
*aristolochia rotunda* ℥j.  
*farina bordei* ℥vj.

subigantur omnia & fiat unguentum perfectum in omnia Vulnera.

Aliud parat ex abiegna.

- ℞. *Resina abiegna* lbj.

liquefiat paulatim & à sordibus perpurgetur, post adijce.

- Medulla vituli parum,*  
*radicis symphyti vel*  
*intestinum terræ tantundem,*

contundantur omnia & permisceantur in mortario calido, & imponantur vulneri.

Olea seu Balsama Vulneraria magnificat Author, & quidem sequentia composita.

- ℞. *Corporis i. e. olei vel Terebinth.* lbj℔.  
*Camomilla*  
*rosar. rubr.*

*prunella*



*prunella* aa. Miß.

*Hypericonis* Mij.

*Fl. centaurea*

*Chelidonia* aa. Miß.

Mixta omnia ponantur ad Solem per duos menses. Hoc oleo seu balsamo mira se præstare dicit in vulneribus præter omnem dolorem, sequenti anno eodem flores in eodem oleo denuo macerare jubet;

Vel:

℞. *Herbar. Ophingloss.*

*Limonia minoris*

*Agrimonia*

*Sanicula* aa. Miß.

*Hyperici* Mij.

*rad. Symphyt.* Miß.

*Vermium terrestr. mundatorium*

No. 100.

*olei vel terebinth. q. f.*

pro maceratione omnium sistantur ad Solem, ad tempus legitimum digestionis, & utere. Sequens vero Balsamum Vulnerarium præ aliis laudat.

℞. *Olei olivarum* lbß.

*Terebinth. quartar. j.*

*Fl. hyperic. q. f. ad implendum,*

*Fl. verbasc. tertiam partem ad fl. hyperic.*

*Vini alb. generosiss. sextar. j. & b.*

Decoquantur ad consumptionem vini postea ad tempus legitimum insolentur.

Vernicem cum vino carabe, ac Mastice percoquit, vel cum ex oleo & terebinthinâ destillatis conficit Balsamum: Medullas quoque cum dictis herbis petmistas, ad Solem in oleosam quandam formam reducit, præfert tamen aliis humanam, post hanc cervinam, in harum defectu Vitulinam subducit, item caponis, gallinæ, & Thymalli.

Paracelsus etiam curant per Medicamenta expurgantia, vulgò mundificativa dicta, inter quæ referunt salivam, hinc dicunt canes linctu vulnera sua curare, in vino decoquunt aliquas herbas vulnerarias modico salis adjecto, eoque decocto, lavant vulnera, nec non aluminatas aquas; succum plantaginis ac chelidonis, pauco sale adjecto, Vulneribus medicari dicunt; *Paracelsus* ipse Pesticariam occulta vi vulnera expurgare experientiâ comprobavit.

In vulneribus & puncturis curandis author magnificat Emplastra, & præter plura sequens longo usu comprobavit efficacissimum esse.

℞. *cera Virginæ,*

*olei vulnerarii nostri* aa. lbß.

*lithargyr. auri* lbj.

*plumbi loti* lbß.

*fiat Cerotum, cui adde*

*Fernicis cum herbis parati* lbß.

*Terebinthine quartar. j.*

*Gummi ac pulverci, quicumque placuerint,*

macereantur cum Balsamo Vulneratio, ac fiat Emplastrum secundum artem.

Vel:

℞. *Olei olivarum* lbj.

*cera* lbß.

*lithargyr. lbij.*

*coq. in cerotum, cui adde*

*Thuris, Masticis, Myrrh. aa. ʒiijß.*

*commiscantur, & adde*

*Mynii ʒiij.*

pinis manibus extrahendo cum

*Camphora ʒß. in oleo anethino, vel ex verbasc.*

Vel:

℞. *Olivarum olei* lbj.

*Masticis*

*Thuris*

*Myrrhe*

*Oppoponaci*

*Serapini*

*Storacis*

*Bdelii* aa. ʒj.

*coq. in formam, postmodum accipe*

*Cera* lbj.

*Calaminar. ppt. lbß.*

*coq. in Cerotum, & pinis cum*

*Camphora.*

Pulveres etiam Traumaticos in Vulneribus ac puncturis sanandis maximè laudat Author. exempl. gr.

℞. *Thuris*

*myrrh.*

*masticis* aa. ʒß.

*corall. rubr. ʒij.*

*aloes epat. ʒij.*

*M. F. pulvis.*

Vel:

℞. *Acacia, succ. Gall. immaturat.*

*succi Sanicula,*

*clematidis*

*ophioglossi* aa. ʒv.

exsiccentur ad Solem, interim dum siccantur, adde

*Gummi Ammoniaci perpurgat ʒij.*

omnia exsiccata redigantur in pulverem.

Curationem quoque Vulnerum per Cælestes operationes fieri posse approbat, nec non sublimata quædam ac destillata ad Vulnerum curationem commendat, quæ omnia hic recensere nimis longum foret. Nunc ergo *Symptomatum partium Vulneribus* susceperunt Curam ex ipsius principiis addamus, & primò *Hæmorragiæ* curationem tradamus, quam ex ira vel Venere obortam vix curari posse asserit, nisi animus fuerit pacatus. Si in profundioribus puncturibus ac Vulneribus à sanguine pus colligatur, illud expurgandum vult lavamento ex vino, myrrhâ & sale coctis ac per syringam injectis. Emplastrum ergo sticticum imponendum vult, ante omnia verò membra calida servare & ambiens frigus devitare præcipit. Paracelsi sanguinem cohibentia remedia sunt sequentia, Crocus Martis subtilissimè reverberatus, As ulsum instar Croci Martis paratum, Farina volatilis instersa, ut cum sanguine mixta obstruat, pili leporini & præcipue sub cauda, Muscus craniorum cadaverum, Carneolus suspensus vel in manu detentus, Cinis ranarum, Hæmatites lapis, dysentericiæ remedia. Iana seu Xylon in putamine nucis alligatum Vulneri. Cælestem verò operationem non contemnit Author, quæ, juxta ipsum, Characteribus perficitur.

Ad *Synoniam* seu fluxum glutinis albi sistendum Author utitur traumaticis oleis, unguentis ac Emplastris. Ad *pneumonem* tanquam ad caput & calor & frigus referuntur, quibus dein durities ac decoloratio subsequuntur, omnibus istis unicam curationem competere ait, quæ scilicet per Julquianum absolvitur, vel papaver, & collum:

Siſſ 2

Hyoscia-

Hyosciamo quoque Author noster plurimum tribuit, pro conditione scilicet & occasione ægri, ac remedium. Sic quoque jubet, & tanquam pro Canone curationis habet, ut in membro vulnerato quies, corpori somnus concilietur. Formula verò remedi talis est:

*℞. Rad. Hyosciami q. f. digeratur in aceto rosaceo ad Solem, fiat epithema, in eo madeant petiæ lineæ, imponantur loco dolenti tepidæ, donec dolor quieverit.*

*Spasmi* verò vulneribus frequentissimè complicatum per ea, quæ nervos confortant Author pellere studet, inter quæ primum locum obtinere arguit oleum terebinthinæ, quod primò profuit, tum oleum olivæ, quibus locus affectus & partes adjacentes perungi sedulo mandat.

*Luxuriantis seu supererectis carnis* curationem non opus esse eam singularibus remediis vel corrodentibus, ut alumine usto, vitriolo, vel auripigmento vel Mercurio sublimato absumere, sed si vulnera ritè tractentur, facile eam sponte absumi putat.

Frequens quoque & illud esse ait, vulneribus glutinatis ea denuò rumpi, eaque postea *Carcinomata*, *Syrcæ* ac *Fistulæ* subsequi, quæ impediri posse scribit, si vulnus, priusquam primò deligetur, viridi oleo vitrioli ablatur:

Quin etiam juxta ipsum vulneribus curatis *defunctiones typicæ*, (i. e. quæ tempestatum ac motus Lunæ ratione periodicè insistant,) succedunt, eas facile sanari posse promittit factâ evacuatione per pilulas Artheticas, habito quoque personæ respectu, tum oleo laterino in vulnus infuso, si sc. dolores succrescant. Sed quis omnia ea recensere, quæ Author habet de vulneribus, integrum enim complere librum: meliora ergò dedimus, qui plura cupit, ipsum adeat auctorem.

*Helmontii Curatio Vulnerum.*  
§. 15. *Helmontius* Naturas ipsas *Vulneris* Mediatrices esse contendit, Medicum illius tantum ministrum, nec pharmacum in vulnere cariem gignere, sed fatigati, obstatula removerit, quæ aliis unicum ætorem unguentum arceret satis securè & opulenter promittit. Magnetisimum hujus unguenti trahere ait peregrinam illam dispositionem ex vulnere, unde labra, nullo demum accidente prægravata sine dolore sunt, & mox accrescere festinant, nullatenus impedita.

Vulnera quoque Author oloribus per inuncta applicatis mitescere scribit. Juxta ipsum enim certum est, non ipsum unguentum, sed ejus saltem Odores introscerpere & curare Vulnera. Pulverem cancerorum Vulneratis contusis ac ex alto præcipitatis proficere scribit. Sic quoque lapidem ossifragum in Vulneribus internis sanandis magni æstimat.

Si vulnus sit recens, ac balsamo à corruptione munitur, non advenire pus contendit.

In Vulneribus putridis, ubi multum puris later, vel vermes conspicui sunt, commendat Author omnem potionem vulnerariam, occultum Alkali, & quidem volatile, in se continentem, quod omnibus accidentibus ex corruptione naturæ resistit, quatenus Alkali quodvis omnem aciditatem, quam attingit, permittit. Sic nempe lapis cancerorum diureticus est & vulnerarius. Nam vino maceratus, post diem sapit lixivium. Docuit quoque Noster, quantumvis potus vulnerarii cohibeat in extremitate pedis puris fabricam, accidentiumque formidinem, non tamen idcirco potus vulnerarius potiri, quam alioqui reli-

qua pharmaca, juxta ipsum enim non materialiter ad vulnus propter remotionem, hinc vulneraria fabricati in stomacho arguit. Herbas quoque vulnerarias operari virtute cujusdam innati Alkali pluribus ostendit, docetq; nimis, Mercurium tam præcipitatum quam sublimatum facile revivaci, imbibito per bullitionem succo clarificato vulnerarium. Unde consequens, herbis excellentiores in hoc gradu esse, quarum succus ille bullitus cum præcipitato & dein ablatus, facilius atque copiosius Mercurium revivificaverat. Quapropter & in medendo magis præcellere lapidem cancerorum ait, si cum vino, quam si in aqua potetur; eò quod si lapis in vino facillimè vim atque sorem lixivii induat. Hinc juxta ipsum Medicus non abhorere debet vini ulum in vulnere, scire &c. Nam eo ipso, ut sapit Alkali, vini vires atque proprietatem amittit. Sic nempe propinar feliciter Alkali è tilia, non secus atque pulverem cancerorum. Vulnera artuum imprimis sanari per potiones inquit. Collocat quoque enecare omnem vulnere corruptorem arguit. Cum vulnera consolidatione egeant, per collam in vino solutam (est quippe è pellibus animantium parata) mox conglutinari promittit: præsertim si colla è corio hominis violenta morte, id est, integris viribus interempti sit. At alterationes Archei à profuso cruore, conceptæque vindictæ aut indignationis alterius idea genitæ, quas proprio nomine sua vocat vulnera, & non aliena: sive quæ forissecus insiguntur, non sola indigent discontinnui conglutinatione, sed alterati Archei sedatione. Huc veniunt speculant olea, balsama, Emplastra, quæ injuriati Archei insiti, & localis, pacem conciliant. Quorsum nata sunt balsama resinarum, florum, herbærum: Itemque quæ parantur è minio, cerussa vel colocotare. Huc etiam facere ait Sal Tartari per spiritum vini rectificati, donec adstringentem gustum nanciscatur. Est namque balsamus Samech Paracelsi. Vulnus difficulter curari scribit, si lunæ radii illaxerint illud, citò enim putrent omnia.

Helmontius noster vidit frequenter venenatorum Vulnerum factas sanationes, alioqui penitus desperatas, succino dissoluto in spiritu vini applicato.

In omnibus vulneribus commendat remedia quæ sunt mansueta & sedativa, quæ pollent æguntque virtute balsamica, quæ Archei insiti & injuriati & localis pacem & quietem conciliant. Internam verò, eam jam diximus, potionem vulnerariam magnipendit, cujus nempe qualitas spiritalis esse debet Alkali occultis, & quidem volatilis in ea contenti, talem autem esse statuit in lapidibus cancerorum & ossifrago, in spiritu aceti dissolutis, vel in vino bullitis. 2. in herbis vulnerariis dictis, vino & aquâ decoctis. Item in Alkali fixo etiam ligni Frazini & Tiliæ in lixivio assumto.

Externa Balsamica, eaque vel magnetica, eam diximus, magnipendit, imprimis Balsamum Samech Paracelsi sanans quævis vulnera statim sine suppuratione, aut dolore: estque Sal Tartari rectificatum & immutatum in Balsamum, adeo ut ejus sapor lixivialis & causticus in saporem adstringentem & Balsamicum convertatur per conubium, copulamque, & imprægnationem salis volatilis spiritus vini.

Halocnem

Halceem etiam falfam, in morfu canis rabidi applicatam, cum fanare dicit, ante Hydrophobiam triduo renovatam.

§. 16. *VVilifius* partibus separatim uniendis solummodo studens, idque tantum liquoris nutritii beneficio perfici posse certo sciens, ipsi conservando, vel degeneri corrigendo omnem curam impendit, & ea universa, quæ vulneris labiorum, quorum coalitum totis viribus promovet, unionem impediunt, removet. Vulnera ergo & balsamica sudoriferis salinis blandè volatilibus, ut & viperinis ac antimonialibus associata propinat.

Corpus identidem lenibus purgantibus excrementis humoribus subleat. Balsamo autem Peruviano, Tolutano, Sulphuris, aut oleo hyperici vel terebinth. Vultus consolidat, adhibitis tamen moderatis Sarcoticis, in Vulneribus autem capitis, aut in iis, quibuscum conjuncta est contusio, digestiva à principio adhibet, & deinde mundificantium & Sarcoticorum ope illa conglutinat.

§. 17. *Sylvius* in Vulneribus curandis approbat Decocta Vulneraria ex veronica, fânícula, vine. pervinc. chærefol. Plantag. Prunell. rad. histort. liquirit. & similibus parata, pulverem ex Antimonio diaphoretico & oculis ☉, sæpius internè datum magni æstimat, & in forma mixturæ ægris suis propinat, ex. gr.

℞. *Aq. Chærefol.*  
plantag. aa. ʒij.  
cinamom. ʒi.  
ʒni diaphoret. ʒʒ.  
ocul. cancr. pp. ʒij.  
Syr. myrtin. ʒj.  
M. D. cochlearum usque sudor subsequatur.

Salia quoque volatilia ex animalium partibus parata propinanda vult.

Si Hæmorrhagia comitatur vulnera, eam curat mixturâ contra fluxum sanguinis notissimâ. Balsamum quoque Sulphuris anisatum, terebinthatum & succinatum internè ad guttas aliquot exhibitum magni æstimat.

Inter externa laudat myrrham, aloën, balsamum Capivi, cerussam, lapidem calaminarem, plumbum utrum, oleum Hyperici: item ex Sarcocollâ, colophonia, resina pini, pice, mastiche, Gummi Elemi, varia parat Unguenta ac Emplastrâ, ut sunt unguentum aureum, Basilicum, Emplast. Opodeltoch. Stictic. Diasulphuris &c. nec non fatus ex aromaticis & traumaticis paratos magni pendit.

§. 18. *Cartesius* in curatione *Vulnerum* secundum rationem cum salute agrorum prudenter administrandâ, opera præcipua cō dirigitur, ut succi per disrupta vasâ & tubulos in foramen parvis dissociatæ confluentes, per remedia convenientia & ætris externi temperationem, aut à vulnere coercionem ita præserventur, ne quid particularum acutum corruptumque admittant, quo fibræ partium solidarum exedantur, rumpantur ac discindantur, & reunioni fibrarum juncturam, mediante succo nutritivo glutinoso perficiendæ, obex ponatur. Ea propter quàm propediem fieri potest in vulneribus sequentem vel similem internam propinant mixturam.

℞. *Aq. veronica*  
alchimiſſa

fânícula  
card. bened. aa. ʒj.

ocul. ☉. pp. ʒij.  
myrrh. cl. ʒʒ.  
lap. cerat. ʒj.  
ʒni diaphor. gr. xv.  
syr. veronica ʒʒ.  
M. D. cochlearum.

Vel:

℞. *Aq. caprifol.*  
alchimiſſa  
veronic. aa. ʒj.  
Tinct. hyperic. ʒij.  
myrrh. ʒj.  
Spir. lumbic. essentif. ʒj.  
syr. de scord. l. ʒj.  
M.

Vel:

℞. *aq. alchimiſſa*  
aq. veronic. aa. ʒij.  
Antibell. Poterii ʒʒ.  
Ebor. f. Δ. ppt. ʒj.  
☉ xci depravat. ʒʒ.  
syr. Hedec. terr. ʒj.  
M.

Decocta ad potiones vulnerarias etiam magni pendunt, & eos parant ex traumaticis variis, inter quæ excellunt, rad. aristolochiæ, Symphyti majoris, Iridis: herbæ fâniculæ, verbenæ, betonicæ, vincæ pervincæ, veronicæ, virgæ aureæ, consolidæ latracenicæ, consolidæ majoris, Hyperici.

Antequam ad Topicam accedunt curam, omnia extranea vulneribus insita eximenda esse volunt, quæ vel removeant aut instrumentis, aut digitis, aut emplastris ejus ejaculationem promoventibus, eximere ocul. ☉, succino. Sed duriora & solidiora eximi debent instrumentis, alias vulnera hanc coalescunt. Dum hæc scribimus, sequens nobis obvenit casus. Juvenis quidam 25. annorum ab alio Sclopeto in dextricubiti articulo adeo lædebatur, ut globuli minores (Schroot) Num. 12. in cute ejus loci percipi possint: Carnifex quidem vocatus, relicto istis globulis, pinguis ex adipi caninâ & humana pro more solito cataplasmatâ & linimenta parata vulneri applicuit: quid sit? tertio die brachium totum usque ad scapulam planè sphacelatum ac teterrimè fœtens, Juvenem quoque delirantem & agonizantem offendit vocatus *D. Valentinus Schadinus* Medicus Hamburgensis, quamvis brachium ab ipso amputaretur, altero die tamen mortuus est Juvenis, quod non accidisset, si Carnifex apposuisset remedia convenientia. Gangrænæ potissimum resistentia volatilia remedia & spirituosâ & balsamica. Eapropter *Cartesiani* suadent, vulneribus recentibus & contusis indenda esse varia Balsama, Capivi, Peruvianum, Elix. vitæ &c. Digestiva quoque in vulneribus ab initio imposita magniæ unt, quæ parant ex vitell. ovor. terebinth. croco, butyro recent. mell. ros. Spir. matricar. impregnat. farin. hord. fœnigræc. thurc. resina pini, mastiche, Gummi Elemi &c. ex. gr.

℞. Resin. pini ʒj.  
Butyr. majal. ʒij.  
Thuris.  
aristoloch. long. aa. ʒʒ.  
Sicc 3

al. hya

*ol. hyperic.*  
*terebinth.* aa. ʒß.

*M. F. unguentum.*

Inter carnem generantia varia commendant traumatica, ut sunt Aloe, Myrrha, Balsam. Peruvianum, Aris, terra sigillata, ceruilla, plumbumustum, sarcocolla, mastix, gummi elemi, oleum myrrhae, Hyperici, trifolii odorati, unguent. deficcativum rubrum, Aureum Basilicum, Hispanicum, Anglicum, Empl. oppodeltochi de Bectonicæ, Divinum, vel seq. applicant.

ʒ. *o. vina rest.* lbij.

*Fol. Hyperic.*

*chelidon. maj.*

*solidag. Sarracen.* aa. Mj.

*Thuris*

*myrrh.* aa. ʒß.

Infund. destillentur & ferventur usui: vel sequens:

ʒ. *Ol. trifol. odorat.*

*hyperic.* aa. lbijß.

*resin. pini*

*Gumm. Elemi.*

*terebinth.*

*cera* aa. ʒj.

*hyperic.*

*chelidon. maj.* aa. Mß.

*croc.* ʒj.

*pingued. porc. rec.* ʒijj.

coq. & cola per linteum, quo remedia omnia curant vulnera.

Vel:

ʒ. *Spir. vin. rest.* f. ʒijj.

*myrrh. pulv.*

*camphor.*

*masticb.*

*Syrac. liquid.* aa. ʒj.

*M. f. artem.*

Sequens unguentum traumaticum Celeberrimum Blankardus, Cartesianus magnificat in quibusvis vulneribus.

ʒ. *Cera citrin.* ʒiv.

*ol. Hyperic.*

*trifol. odor.* aa. ʒv.

*vini canar.* ʒijj.

coq. donec humiditas evaporata est, cola & add.

*Terebinth. Ven.* ʒijj.

*Balsam. Capayva.*

*Peruvian.* aa. ʒß.

*Syrac. liquid.* ʒv.

*Santal. rubr.* ʒj.

*Bol. rubr.* ʒijj.

*M. F. f. a. unguentum.*

Inter cicatrizantia vel epulotica sequentia commendant, cortices, nimirum granatorum, glandium, flores balauß. ros. rubr. cineres & usta; ut sunt lana cremata, linteumustum, gossypiumustum, sponsia usta, testæ foratae usta, pili leporisusti. Corallia, creta, terra sigillata, tutia, pompholyx, gypsum, scoria ferri, as ustum, plumbumustum, cadmia lota, sulphur, Antimoniumustum, & diaphoreticum, spodium, eburustum, mastix, aloes, sarcocolla, ungu. alb. camphorat. Diapompholyx, Emplast. Norimbergense, de Minio, barbarum, Divinum, griseum. Ex quibus varias concinnant formulas. In Vulneribus etiam ad symptomata advenientia apprimere respiciunt, utq. quæ accidere solet ut plurimum

Hæmorrhagia, quam sicut pulveres insperforii ex aloe, thure, mastiche, farina volatili &c. vel per se inditi, vel cum albumine ovi agitati, illiti: vel imponunt vulncri linteum carptum, vel crepitum lupi, vel arancar. tela &c. Internè exhibent aquam Plantaginis cum Camphora.

In Vulnerum inflammatione ab impedito factorum circuitu factâ, internè exhibent varia sudorifera, imprimis sperma ceti & oculos can. quæ omnia stagnantes particulas fluidiores & ad circulationem aptas reddunt, externè decoctum verbenæ, veronicæ, alchymillæ, puriæ pastor. cum vino Rhenano parant, applicantque.

Si dolor maxime urgeat, sequenti uti solent.

ʒ. *Olei papav.* ʒij.

*ovi Num. i.*

*croc. gr. xvi.*

*Boli ʒij.*

*Camphor.* ʒß.

*M.*

Cataplasmata ex mica panis, croco, lacte, ovis &c. laudant. Convulsiones ac spasmi præventur antispasmodicis intus & extus adhibitis. Internè dantur Essentia Hyperici & Salvæ cum spiritu C. C. succinat. cinnabarina, camphorata, castoreata, balsamica nervina &c. Vulneri verò insilliant oleum terebinthinæ, Spiritu lumbri- corum & camphoræ mariatum. Conducunt quoque olea succini, spicæ, lavendulæ, majoranæ, castorei, ceræ, petræ, anthos &c. ex. gr.

ʒ. *ungu. nervin.* ʒj.

*olei petræ*

*ravismar.*

*Balsamum Peruv.* aa. ʒj.

*M.*

Si vulneribus à punctura nervorum, vel à negligentia Artificis Gangræna vel Sphacelus acciderit, iis statim convenientibus remediis occurrendum est, & in ejusmodi vulneribus imponenda sunt vel oleum ceræ, terebinthinæ, castorei, trifolii odorati, rutæ, lavendulæ, quæ omnia acidum Vulnerum intus necant; ex gr.

ʒ. *Ol. Terebinth.*

*Hypericon.* aa. ʒj.

*Masticb.* ʒij.

*M.*

Vel:

ʒ. *Cera*

*picis*

*resina* aa. ʒijß.

*euphorb.* ʒß.

*terebinth.*

*ol. hyperic.* aa. ʒijj.

*M.*

Ad humiditates sedandas, quæ vel ex nervis vel lymphaticis effluunt vasibus, sequentium extollunt pulverem.

ʒ. *Boli Armeni*

*Nuc. cupress.*

*sang. dracen.*

*sem. Hyperic.* aa. p. ʒq.

*M. F. pulvis.*

In Vulneribus venenatis uti solent theriacâ, vel Orvietano intus & extus, aliisque remediis sudoriferis, vel imponunt Vulneri Cataplasma ex theriacâ, cæpis, Rethore humano, carne viperinâ, Spiritu vini q. s. paratum, suadent quoque salia volatilia vulneribus applicanda. Vel locum affectum adurant ope moxæ vel ferri candentis.

Item

Item in morſu animalium venenatorum vel apum approbant theriacam, quam internè ad ʒi. cum  $\nabla$  card. bened. exhibent, externè verò cum ſpiritu vini mixtam applicant. Commendant quoque oleum ſcorpionum, item veſicatoria, rutam, lac, earicas, muriam, halecem, folia lauri contuſa, ſarum hardei cum aceto, lac ſicilneum, ſtercus bubulinum, thymum, meliſſam, vel etiam locum inurunt innoxà.

Vel parant emplaſtrum ex ſ. m. lini, ſale & aceto, imponuntque.

*Noſtra  
methodus  
evacuandi  
Vulnera.*

ſ. 19. Ordinis vult ratio, ut & *noſtrum* propincuus *Conſilius* curandi *Vulnera*. Ne itaque tenet ratio auſu camauſpicemur, & periculum ſubeamus aleam, ſi miſque vel ſque deſtitut, neciſſe erit, ut indicationes eruamus, quæ intentioni noſtræ vel ſcientiæ: ſufficient quatuor indicationes, quibus *Vulnera* medendi methodus imittitur. Prima jubet, ut omne extraneum è vulnere priùs eximatur, ſiquidem commodè fieri poſſit. Secunda vult, ut adducantur labia & fiat cunctio partis læſæ & laceratæ, & ſinul partis vulneratæ temperies conſervetur. Tertia graviorum Symptomatum medelam urget. Quarta denique conſolidationem commendat. Totius enim curationis *Vulneris* cardo in temporis momento vertitur, ſi enim aëris ingreſſus arceatur, & fluiditas ſuccorum per partem vulneratam circulantium, præſidiis, temperiem partis ſoventibus vulgò dictis, conſervetur, ſua expedita erit via ad curam auſpicandam. Itaque omne illud, quod vulneri immiſſum eſt, ſive ſit glans, ſive telum, ſive ramenta, ſive ſellucæ, ſive ipſa caro *Vulneris* dilacerata & conſuallata, ſive offium fruſtula ſeparata, ſive grumi ſanguinis, ſive pili, ſive vitæ, charta vel aliud quid peregrinum, ſtatim erimi debent, quia accretionem tubulorum, & per conſequens *Vulnerum* curationem impediunt, modo citra largiorem hæmorrhagiam majoremque partis vulneratæ injuriam id tentare liceat. Si enim ager ob inſtantem hæmorrhagiam in præſentiſſimo verſetur vitæ discrimine, ſatiùs eſt ante omnia eam ſedare, ipſumque *Vulnus* probè deligare, quo cohibito ſanguinis effluſus, eo tutius ſcopum ſuum *Chirurgus* poſſit aſſequi: id quod non duntaxat de *Vulneribus* ſelopeto inſiſtit, ſed & de illis in quibus grumi ſanguinis deliteſcunt, loquimur, nam & hi in primo accéſſu nequaquam vi extrahendi ſunt, poſſiſſimum cum læpè *Vulneri* grumi iſti adhuc ſatis profici ſint, frigus externum arcendo & ſanguinem liſtendo: nuper enim obſervavimus, quod *Vulneratū* à grumo ſanguinis vulnus obturante ad aliquot dieſ in vitā conſervatus fuerit, quod nunquam fuerit factum, ſi grumus ſanguinis deſuiſſet: ſi enim hæc extrinſeca vi eximantur, irritatus ſæpius crabrones, *Vulneratum* enim in novum præcipitatum vitæ periculum.

Quod verò extrahendi modum rerum extranearum atinet, quilibet exercitatus *Chirurgus* facile noverit, faciiliùs enim modus oſtendi quàm deſcribi poteſt, hoc tantum notandum, ut *Chirurgus* ab omni dilaceratione *Vulneris* caveat, & ſi ſanguis vel lymphæ in cavitate quādam extravata hæreat, Siphone vel vulneris dilatatione circumſpectā, iſ extrahatur, reliqua extranea vel foreipe vel alio instrumento è vulnere eximantur, nam aliàs impoſſibile eſt

quod vulnus ſanari poſſit, quia hæ res coarctationem canaliculorum impediunt, imò & pili circa *Vulnus* tonſurā tollendi ſunt, & omnis conſpurationis amoveatur, ſi arena, vel fruſtula vitæ minutiſſima, vel ſellucæ & ſimilia vulneri indita ſunt, quæ aut vino rubro generoſo deſurgenda, aut linteis mollioribus abſtergenda, aut volſellis ſimilibusque instrumentis aptis tollenda ſunt. In telorum, globulorum, fragmentorum offium, aliorumque instrumentorum ludentium remotione ante omnia conſiderandum eſt, an poſt eorum extrahendum aliqua vitæ ſpes ſuperſit: Si enim nulla ſuperſit, horum extrahio potiùs non tentanda eſt, ne *Chirurgus* agro mortem accelerāſſe videatur, cūm experientia teſtetur, quod hi per unam vel alteram horam ac diem ſuperſvivere poſſint, qui inter extrahendum aliàs exſpirarent. Sin verò ſpēs aliqua reconvaleſcentiæ ſubſit, mox & antequam inflammatione atque tumore corripitur membrum, extrahantur res extraneæ, niſi adeò firmiter inhæreſcant, ut instrumentis haud cedant, ſed demum interveniente ſuppuratione protrudantur. Scopio hoc feliciter obtento, videndum, quemodo *Vulnus* probè deligari & pars vulnerata commodè locari queat, quibus ſatis faciendū: apparatus requiritur, ex ſplenis, ſerulis, ſaſeis, emplaſtris, ſibulis, acu, filo &c. quæ pro *Vulnerum* conditione nunc plura nunc pauciora numerantur.

Rgmedia generalia in *Vulneribus* ſuere Anticeſſoribus *V. S.* purgatio: ſed quæ quod juvenam præſtare hæc poſſunt, cūm duntaxat ægrum debilitent enerventque, ſuccoſque reſiduos inſcalent acrioreſque reddant; imprimis ſi ſinul parcum victum concedunt, annon hæc ægrum ad mortem potiùs diſponunt? hoc modo certè ſunt *Vulnera* per accidenſ, lethalia, hinc ſequens Proverbium Veteribus adſcribitur: Si Medicum accerſas, lædo affigeris. Meliori ergo jure, ſi *Vulnus* requirit interna remedia, ea quæ acidum abſorbent & ſinul ſuccos fluidiores reddunt, ut ſuccorum circulantium ius & reditus per partem vulneratam ſartus teſtusque ſervetur, commendamus, inter quæ ſunt diaphoretica, quæ ſinul ſanguinem confortant, imò chyloſin ut meliùs peragatur, promovent, cūm è contra *V. S.* non ſanguinem emendet, ſed magis debilitet: obſervavimus enim hæcenus: in *Praxi* noſtrā, quod inſtitutū *V. S.* vel purgatione, materia ſeuſus in *Vulneri* buſin minore quantitate quàm aliàs, reperitur, imò quod inde majores obſtructiones & dolores in *Vulneribus* oboriantur. Certum enim eſt, quod poſt inſtitutam venæſectionem reliqui ſucci adhuc deteriores reddantur, ſi enim homo ægrotat, non ægrotat ob nimiam ſanguinis copiam, ſed quod habeat febrem vel ſanguinem nimis ſpiſſum, quem certè *V. S.* celebratā non attenuabis, nec fibres, hæc inſtitutā, curabis, craſſus ſit enim ſanguis à defectu ſalium volatiliū & ſpirituum à coagulatione ab acido ſadā, quam certè per *V. S.* non impedies, nec per purgantia. Cautè ergo hiſce incedendum eſſe in *Vulneribus* author ſum; Enema tamen in obſtuctione alvi concedi poteſt, ſed non ſingulis diebus, prout *Chirurgi* faciunt, impoſſibile enim eſt, quod *Vulneratus* lædō affixus tor ſedēs habere poſſit ac ſanus, qui laboribus incumbit, quare non dolores ſumptusque fruſtra ſuis ægrotis faciendi



eiendi sunt. propinetur potius pro re nata seq. in iuculo.

℞. ol. amygd. dulc. rec. expt. ʒij.

crem. q. ʒi.

M. D. cum iusculo.

Nos Diaphoretica præ aliis in Vulneribus quibuscumque magni æstimamus, quia chylum Vulnerum consolidatorem & sanguinem optime purificant & dulcificant, ut sunt ocul. ʒs. Antimon. diaphoret. lap. Irland. terr. Japon. Antihæst. Poter. Martialis, Saturnina aliæque innumera. In Juniorum Medicinæ graviam unam vel alteram addamus formulam:

℞. ʒiii diaphoret. ʒs.

ocul. ʒs. pp. ʒij.

sperm. ceti ʒj.

Terr. Japon. ʒs.

⊕ hui gr. iv.

M. F. pulvis, divid. in part. 4. æqual.  
& datur in vehiculo conveniente  
calido & dulci.

Vel in formâ Mixturæ:

℞. ag. menth.

ag. Chæref. l. aa. ʒiis.

pulv. ocul. canc. ʒj.

ʒiii diaphor. ʒj.

⊕ absinth. ʒs.

theriac. Andr.

sperm. ceti.

Elix vita ʒj.

Syr. veronicæ ʒj.

M. detur ad vitrum.

quæ mixtura cochlæatim assumi potest, donec sudor sequitur, sin magna inflammatio & calor cum sit enormi adfuerit, ea aliquo modo mutari potest, & quidem sequenti modo.

℞. a. j. menth.

plantag. aa. ʒij.

El. dialcor. d. Fr. ʒj.

lap. prunell. ʒs.

⊕ hui gr. x. j.

sperm. ceti ʒs.

Campbor. gr. iv.

M. & cochlæatim assumatur, & simul  
interponi potest seq. vel simile decoctum vulnerarium.

℞. Rad. Chin. ʒj.

Contrajerv. ʒs.

Zedoar. ʒvj.

herb. heder. terr. Mj.

sem. anis. ʒs.

⊕ ʒiij.

Infus. coq. in ag. commun. colat. ad ʒxxx.

qui potus calide bibatur, & addantur aliquot guttæ salis Volatilis oleosi, Certè in Germaniâ nulla Vetula, nullus Barbitorfor, nullus Carnifex exstet, qui non singularem potum Vulnerarium vendat. Hic verò, me iudice, planè aliâ incedendum est viâ Veteribus inusitatâ, decocta enim hæc non plenis buccis & mensuratum, sed tantum 6. cochlearia pro unâ vice vulneratis nostris propinare solemus, & quidem calide præsertim in primis diebus, quo de sanguinis statu atque acoris gradu reddemus certiores, id quod desumpto quidem signo à iuvantibus & nocentibus haud erit difficile: huic etiam jungenda sunt & alia interna consolidantia & traumatica, ut Essentia traumatica Hagedornii, vel Nostra sequens:

℞. Rad. A. i. j. toloach.

contrajerv.

ʒi. hyperic.

Myrrh.

Aloes.

Mastic.

Succin.

Terr. Japon.

ocul. ʒs.

terr. Mart. aa. ʒs.

c. ʒss. chærefol. q. s. f. digestionem & rectificationem l. a. Tinctura traumatica, omnem effectum, quem ex decoctis vulnerariis aliis expectabis, in sola hac invenies Tincturâ. Hagedornii est hæc:

℞. Mumia.

sangu. dracon. aa. ʒj.

terr. Japon.

myrrh.

rad. tormentill. aa. ʒs.

ʒi. ros. rubr.

hyperici aa. ʒj.

santal. rubr. ʒiij.

nucis. ʒj.

cancif. & contus. extrah. Sp. ʒss. opt. Oculi ʒs. sæpe soli sufficiunt potui ordinario in diu, vel sæpe in substantiâ assumpti. Traumatica etiam varianda sunt pro ratione affectuum & effectuum. Bals. Peruv. ejusque oleum cum cineribus clavellatis destillatum, cum ~ quodam volatili junctum, erit conveniens vulnerarium: item Bals. de Chili, Tolutanus, de Copaiva ad guttas aliquot exhibenda, quæ remedia egregie iungunt succis corrigendis acerbis, & obtundendis particulis cuspidatis, in diuturnis vulneribus: nec diuretica negligenda veniunt, quæ sæpe omnino implent paginam, hinc & potus Theæ & Conicæ & Veronicæ conducet, item decoctum lignorum, vel & Scarificationes, eucurbitulasque tanquam inutiles rejicimus. Ut verò ad ea, quæ in vulnerum curationem cedamus, omni sedulitate vulnus ab omni immundo liberetur. Galli in hunc finem omne vulnus vino rubro eluunt, sed cum v. num Gallorum non tam acidum quam Germanorum sit, hinc non semper in Germania ablutio hæc concedenda est, quia puris provenitum impedit acidum quodvis, cuius verò generatio omni operâ ac diligentia potius promovenda est, quem in singulis digestiva dicta medicamenta optimis glutinantibus temperata vulneribus imponenda sunt, & quidem calide, quæ sunt terebinthina, gummi elem. resina, cera, thus, mastix, myrrh. ol. ovorum, eorum vitellus, Bals. Tolutan. & Peruvianus, de Thilli, Sæci herbarum vulnerariarum recentier expressi, & Bals. Mindereci sequens Chirurgum ratio deserent.

℞. Terebint. Cypr.

ol. hyperic. aa. q. pl.

liquefiant simul, interim gummi elemi liquefactum, & addatur ad iustam consistentiam. destill. cera p. æcum. f. Balsam. turandus vel plumacolis applicand. superimposio Empl. Upp. deltoch à Zuvolesero correcto.

Sequens etiam oleum in Vulneribus recentibus curandis maximas possidet vires.

℞. ol. Olivæ. q. s.

Flor. hypericon.

trifol. odorat. aa. q. f.

Digerantur per æstatem, & si quid superest, sequenti æstate novis floribus imbuatur, egregium

sic obtinebis oleum in vulneribus proficuum, quod nullo tempore corrumpetur, sed etate evadet melius. Externè quoque mira in vulneribus præstat Tinctura Antimonii dulcis, seu oleum dulce sequens:

℞. Znni crud. vel mizer. pulv. q. l.  
spir. Gl. philoseph. ex 3 una rectificat.  
q. l.

Diger. per mensem, Tincturam rubram decanta, inspissa, donec guttae flavescant, affunde spir. vini, digere, Tincturam iterum decanta & abstrahæ spir. vini, in fundo manet Tinctura & oleum, & balsamus dulcis egregius.

Sic quoque oleum 3ri per deliquium vulneribus cum plumaceolis impositum sanat; quod etiam vidit Celeberrimus VVedelius, quod per se applicari vel misceri vult cum balsamo terebinth. vel balsam. de Peru, &c. Sequens Balsamus Vulnerarius externus vobis solennis est, conglutinat enim vulnera recentia sæpe spatio 24. horarum:

℞. Sem. hyperic. 3j.  
rad. car. d. bened.  
valerian.  
contrajere. aa. 3ß.

Infund. per biduum in vino albo generoso, add.  
ol. vetust. olivar. 3ij.  
frumenti integri 3j.

Coq. ad consumptionem vini, imm fortiter exprime, & add. terebinth. Venet. 3vj.

pulv. olivæ. 3j.

M. F. l. a. Balsamus vulnerarius.

Nos vidimus plurima recentia vulnera curata solis plumaceolis impositis liquoribus volatilibus oleolis, ex gr. ♀ Regin. Hungar. spir. matriç. spir. vin. canph. sal. volat. oleof. ♀ calc. marit. Eliv. vitæ. De Turundis tamen hic notandum est, & admonendi sunt Chirurgi, ne faciant eas longiores, cum aliis carnis generationem impediunt, fibrillas etiam magis coarctant, sunt melius ex linteo inveterato in filamenta redacto quam aliis, quia nimis rigidas habent particulas. Nobis verò magis placent plumaceolæ variis jmi dictis liquoribus imbutæ; quibus etiam Chirurgi Batavi uti solent.

Vulnera debent quoque obtegi Emplastro, quod loco cutis inservit, & materiam & vulnus ab ære exteriori munit, qui aliàs maximam noxam inferre potest. hinc inquit Celeb. VValdschmidius in aureo suo libello Apollineæ certe Bibliothecæ oigno, *Instiit. Medicinæ Rational.* graviter peccant ii, qui vulnera sæpius de die detegunt, si enim coalescentia & unionis impedimenta tollantur, sponte coalescent pates divitæ, & citius, quàm si eruditè nimis & officiosè tractentur. Consistit autem ablatio impedimentorum in tubulorum obstructionibus, ut succorum circulantium itus & reditus per partem vulneratam factus tectusque servetur. Hinc Emplastra dicuntur defensiva, quia vulnera ab ære defendunt. Defensivum sequens Chirurgis commendamus:

℞. Cera alba  
resin. pin.  
terebinth. Ven. aa. lbß.  
ol. lauri 3j.

mixturæ ex rad. consol. maj. ac sem. farig.  
consul. cum ♀ extrah. 3vj.

sandarac. 3ij.  
ceruss. lbß.  
eraci 3ß.  
apii crud. c. ceruss. & craco pulverisat. 3ij.  
camphor. 3j.  
ol. sem. lini, q. f. f. l. a. Empl.

Emplastro hoc contegantur Vulnera, quod dolores lenit, inflammationem aliaque arcer, Clauso sæpe vulnere, pars incipit livescere, & vesicæ oboriuntur, hinc & in magnis & periculosis Vulneribus & Emplastris superponenda sunt varia cataplasmata ad temperiem partis vulneratæ conservandam, & succorum restagnationem, Gangrænam tandem comminantem, præcavendam, quæ ex farinâ fabarum, sem. lini, fenicigræc. baccar. lauri, rad. althææ, flor. chamomæl. melilot. herb. absinth. scordii, sem. cum. &c. parantur: ex. gr.

℞. Summ. absynth. Mij.

bacc. lauri

juniper.

sem. cumin. 3iß.

Sal. Q. 3ij.

coq. vel in vin. vel in aq. addend.

farin. fabarum q. l. pro consuetudine cataplasmat. vel:

℞. Alie. panis biscoll. lbij.

sol. scordii

rutæ

summ. absynth. aa. 3iß.

F. pulv. add. vin. Gall. q. l.

Ducatur super linteum, & tepidum imponatur, tunc & optimum fit pus, cujus indolem paucis nunc examinabimus, quod Chirurgi veteribus & plurimis adhuc hodiernis est incerto quid novi & insoliti, à Naturâ Deastrâ illâ, ope medicamentorum generati. Nos existimamus, ceu sæpius dictum est, pus esse lacteam sanguinis partem seu chylosam, in ipsâ Vulnere plus minus alteratam, cui quedam subinde portionculæ dilaceratorum tubulorum unâ cum calore admiscuntur. Pus ergo cò laudabilis erit, quo magis ad consistentiam chyli & succi nutritii accedet, sin verò acorem nimium contraxerit, inficiet sanguinem, obstructionem patiet, febres excitabit, corrodet atque exedet fluidorum canaliculos. Si aquosum & tenue nimis aut vilcidum foetidum fuerit, peioris merito censetur notæ, nec puris nomine dignum erit, cum contumacis obstructionis, præcipitationis, & putredinis indubitatum perhibeat testimonium. Pus illud primis diebus in vulneribus non prodit, non quod in digestivis primo produci debeat, sed quod id primis diebus nec chylus nec sanguis secernei possit, quod ex fibrarum contortione & illaqueatione tanta facta sit obstructio, ut nec molliori sanguinis parti transitus concedatur, atque aliquot infusantur dies, quibus Chylus cum sanguine arterio advectus fibras reflexas & in situ valde turbatas elongare, & in rectam viam protendere, sibi que liberum transitum procurare possit. Sic quoque consolidatio vulneris seu carnis generatio, nec à Deastrâ natura, nec à medicamento sarcotico fit, vel generatur, omnes enim partes solidæ sunt ex lacte, quo si sanguis abundet, idque per partem affectam liberè dispenset, Vulnus breviter sanabitur: sin verò intemperie acidâ aut salinâ aut perversâ mixtione fuerit contaminatus, lentum opus erit sanatio. Imò frustra expectabitur consolidatio, nisi prius

Tttt

vel

vel infringatur acidum, aut sal acre temperetur, aut legitima sanguinis mixtura restituitur. Et hæc quidem scriptis ex voto succedunt: verum si graviora vel primis statim vel ultimis diebus accedunt symptomata, ea non raro Chirurgum usque adeo angunt, ut relictâ ordinariâ methodo, omnes suas curas ad *Symptomata* urgentiora dirigere cogatur, quæ si non maturè avertantur vel tollantur; ægrum faucibus in præsentissimum conjiciunt vitæ periculum: quapropter & de his paucis discurrendum erit, quorum quinque vulgò recensentur, quæ præ aliis promptissimum desiderant juvamen, ut sunt *Hæmorrhagia*, *Inflammatio*, *Dolor*, *Spasmus* & *Febri*. *Hæmorrhagia* ceterè periculosum, si quod aliud, symptoma, reliquis janua aperit; si enim hic vitæ balsam *Sanguis* nimia copiâ ab initio effundatur, restans vix par est coercendis reliquis fucis, ut metuendum sit, ne pars sauciata tandem emoriatur, & ex vulnere non lethali lethiferum fiat, ceu toto die id accidere observamus: sed quinam modus periculosum hoc sufflaminandi profluvium adhibendus sit, cum quilibet ferè Chirurgus peculiare hic jactet arcum, Nos experientiâ edocti, in *Hæmorrhagia* vulnerum sequentiâ probata reperimus.

℞. *Bol. armen.*

*amyl. alb.*  
*sang. dracon.*  
*col. bon.*

*alos 22. p. æq.*

*M. f. pulvis*, qui vel plumæcælis siccus vulnere imponatur, vel cum ipso vin., vel cum album. ovi applicetur.

℞. *Terr. Hassiac.*

*calc.*  
*sangu. dracon.*  
*Thuris*  
*alos 22. q. v.*

Redigantur in pulverem, & album. ovorum & tel. aranearum miscantur in unguentum. Vel sequens pulvis Stenoticus erit egregius:

℞. *Farin. volat. 3ij.*

*Bol. armen.*  
*Gypsi*  
*Colophon. 22. 3℞.*  
*sang. dracon.*  
*alum. ust.*  
*℞. li. alb. 22. 3ij.*  
*calcis viv. 3i.*  
*pilor. leporin. 3℞.*  
*M. f. pulvis.*

Nonnulli solo pulvere Colophonii vulnere sanguinem stillanti imposito contenti sunt, alii chartam b. bulam, alii crepitum lupi, alii calc. alii linteum, quod in caligis virorum, ubi serotum gestatur, eximunt concremantque, & in *Hæmorrhagia* narium Vulnerumque pro arcano venditant. Nuper quidam in mala dextra fuit vulneratus, & nullis remediis ab *Hæmorrhagia* vulnerum comitante liberari potuit, quàm sequenti appolito.

℞. *℞. li. Cypr. 3ij.*

*terr. Hassiac. 3j.*  
*calc. viv.*  
*Amyl. alb. 22. 3℞.*  
*pulv. caphe seu*  
*fabarum sistrarum 3vj.*

*f. pulv.* qui inspergatur, vel cum liquore pro libi-

tu excipiat, & instar cataplasmati saponatur.

Ceterè Chirurgus sciendum est, læso quocunque gravius vale sanguifero, nisi restringatur, omnem sanguinem effluere necesse esse. Plures Recentiorum confugiunt ad Vitriolum ceu salutis anchoram, neque dubitandum, quin ejus solutio rite facta sit idem ille liquor *stipticus*, quem Gallus quidam Regi Danicæ vendidit, nunc autem publici juris factus est à Cl. *VV. Vbero Archiatro Casareo*, cujus descriptionem dedimus superius capite de *Hæmorrhagia Narium*. Linteamina quadruplicata liquore hoc stiptico probe humectata, Vulneri, vel orificio arteriæ, vel trunco membri extirpati superimponere, cum ad æquatâ ligaturâ, & videbis sanguinem in momento coagulari: linteamina per aliquot dies superimpolita relinque, ne crusta sanguinis, vel sanguis incrustatus simul detrahatur, & sanguini fenestra profluenti aperiatur, sic æptè *Vulnus* nullo alio adhibito remedio perfecte sanatum invenies. Sed famosum hoc arcanum suos habet naves, cum nec expectatiori satisfaciat semper, quod propriâ testari possum experientia. Celebris quoque est liquor *Magneticus Dr. VV. Valschmidii*. Sic ad mentem Celebrissimi *Boluii* spiritus vini hæmorrhagiam *Vulneris* cohibet. Cujus effectus causa sequæ modo explicari potest; & vini in se continet quod sanguinem ex arteriis impetuose profluentem inlibet, ratione verò spirituosi tatis efficit ut sanguinis obstructio prius tollatur, ut eo melius perveniat, nec fluere possit. Alii omnem collocant spem in pulvere Sympetico *Dr. Dygbi*: Inventor hujus remedii celebratur ab ipso prædicto. *Dygi*, Carmelita Monachus, qui hoc secretum ex Oriente adduxerit, à quo hoc arcanum didicit. Paratur nempe ex ovio Vitriolo extemplo adhibito, & pulverisato vel soluto pro re nata, nam idem præstitisse testatur *Dygbi*: vel quod solennius est: ℞. *℞. Cyprum*, vel nostras quoque calcinat, calcinatione nempe ætæ, ex posuim Solis radiis mense Jul. vel Augusto, donec in pulvere albam fuscatur, exuto virore vel cæruleo colore suo, addito pro lubitu, quod nonnullis placet, gummi tragacanthi pulvis ad partem subdecuplam, seu ad 3x. drachm. unam, imò quidam tantum pulveris solius applicatione id præstant, & sanguini effuso inspergant; vide ipsum *Dygbi*. Ab eo tempore quo in Germania inclauit, creduli cum omnibus vulneribus, & instrumentis, quibus vulnera facta fuere, adhibuerunt, de cujus vero effectu mecum dubitant plures, confer Cl. *Dr. de Murato in Ephem. German. Ann. 1. Decbr. 2.* Vitriolum calcinatum, & cum ovi albumine mixtum, in limento implicitum, vulneribus applicatum, optimum sæpè habet effectum: spectat huc alius pulvis colore jucundus, & ex lacca Florentina & Ovi paratus. Prælaudatus *Dr. de Murato* pulverem equiseti tenuissimum contritum sanguini vulneris calenti admiscendum commendat. Alii alia adstringentia austera & liquida, ut aramentum, oxycratum, ipsum acetum, item Uineam turundis inspersam tenuissimè prius pulverisatam laudant, quo & referunt terram Japonicam. Celebr. *VV. Valschmidii* in hæmorrhagia vulnerum tanquam arcanum commendat pannum xylum ustum & cum albumine

ovorum

orum exceptum, sicque, vulnere sanguinem stillanti applicatum, posito desuper crepitu lupi, & cum splenis facta deligatione. Sic etiam concepta linamenta, pili leporis, turundæ compositæ ad mentem ipsius applicari possunt. Cataplasmata ex fungo pulverulento, pilis leporis, mulco crani humani, pulvere gallarum, bussonum & stercore suillo, sæpe plus præstant quam alia: pulvis quoque stipticus noster ex bol. gall. immatur. vitriol. de cypro & camphor. paratus raro nos fecellit, vel lequens aqua stiptica:

*℞. Limat. ℥.*

*ol. vitriol. 2a. ℔℔.*

*M. & effervescent, postea add.*

*aluminis ʒij.*

*lapid. humatis. ʒj.*

*eris usi ʒij.*

*Iterum effervescent, add.*

*aq. commun. pint. j.*

*M. f. f. a. per colat.*

*aq. stiptica* quæ internè guttatim propinari, & externè lineis madefactis applicari potest, quæ egregia & multâ experientia approbata est. Terra Vitrioli sæpe quoque sufficit. Crispant quoque & ferunt cauteria mitiora potentialia dicta, in quem finem sunt, qui laudant Colchotar Vitrioli, sed cum hæc corrosiva sint, non semper præstant effectum desideratum. Vix itaque aliud superesse videbitur remedium, quam ferrum candens, ea sanans, quæ medicamenta sanare nesciunt, juxta versiculos sequentes:

*Sic non morbosos sanant Medicamina, Ferrum*

*Arripe, sui frustra, Pharmacon ignis eris.*

*Hæc tria non possum agris adferre salutem,*

*Amphitryoniadis vobis inane cadet.*

Ignis enim lii orificiis valorum admoveatur, & sanguinem & carnem ita adurit, ut veluti aggere facti sanguinis effluxus cohibeatur. Cauteria enim actualia ignita crispant, corrugant & crustam inducunt, quod certè remedium inter extrema, attamen probatissima remedia plures numerant, modo cum prudentia & exercitatio administraretur Chirurgo. Hoc remedium genus etiam magni æstimavit *Fabr. ab Aquapendente*, ut posthabitis causticis potentialibus semper ferro ignito prius usus fuerit, ex eo quod legem illi modumque imponere poterit, his nequaquam præterea tribuit ferro vim roborandi partem, cum causticum sæpe corrumpat. & putredinem inducat, *vid. l. 2. de Vulnerib. p. 88.* Quod tamen remedium genus timoris ac periculi plenum absque effectu adhibitum vidimus: sic nunquam tuta fides! quod remedium non ita pridem in Nobis de *Byenburg* frustra adhibitum fuit. Alium novimus ligni fabrum *Hannoversensem* in tibia lauciatum, ex quo Vulnere sanguis fortiter exsilliebat, omnia hoc in casu à Chirurgis frustra tentabantur & æger defunctus est. Alii tutius rem confici posse autumant, si situs vas sanguinem fundens prius accurate exploretur, post, digito labia arteriæ comprimantur, ut impetuosis sanguinis effluxus retardetur: & non inficior compressionem talem digitis factam plura sæpius præstitisse, quam alia stiptica, iis præsertim in casibus, ubi vas lauciatum non adeo profunde delituit, Sic in Principe *Auriano* optime cessisse id remedium genus monumenta Medicorum testantur. Sic quoque exemplum recenset *Cl. Runkhusen*, de famoso quodam adultero, qui ex lue

Venerè gravissimâ sanguinis profusione correptus, è faucibus erci revocatus fuit per vas excelsi compressionem, frustra adhibitum remedium stipticis, & cum nullo alio sanguis cohiberi posset medio, conduxit Vulneratus suus Chirurgi aliquot factores, vitæ sedentariæ assuetos, qui alternatim in excubiis sedentes digito vas lauciatum labella comprimebant, & saluti hujus viri juxta lectum invigilarent. Quando verò plura vasa fuerint dilacerata, unius hominis digiti impares erunt foraminulis illis & rivalis obturandis atque occludendis, adeoque iterum efficaciora hic requiruntur remedia, & quidem superius dicta.

Alterum symptoma ægro & Chirurgo multum in Vulneribus faciens negotii est *Inflammatio*, quando nempe in parte affectâ fit obstructio talis, ut particula sanguinis & reliquorum succorum soli materiæ celestis seu subtilissimæ innocent, & talem nanciscantur statum, qualem habent particulae succi nutritii in fœno recens dissecto; hinc ob obstructionem factam Vulus fit sicum, quia vasa sunt contracta; & sic denegatur parti influxus ac perfluxus succorum. Ad hanc Vulnerum inflammationem male certè Veneres frigida ac repellentia applicarunt, quæ tantum obstructionem tubulorum, & per consequens Inflammationem augment & humores inspissant. Dum hæc scribimus, Chirurgus quidam Senior Nobis objicit, quod secundum hanc methodum plures curaverit, & præ aliis Camphoram tanquam frigidum remedium allegavit, hinc est, quod Chirurgi quotidie utantur remediis, quorum vires nesciunt. cum Camphora non frigida, sed calidissima sit. In Vulnerum Inflammationibus prolecribus vulgaria ista externa pingua & oleosa, quæ specioso & splendido nomine *defensiva* appellantur: quibus tantum poros cutis infarciunt, & sæpe Inflammationi Vulnerum janua laxant. Et Nos quidem non videmus, quo sub colore aliquod inde solamen expectare possimus, quin persuasum habemus rationi & experientia non duntaxat magis consonum, sed ipsi parti affectæ etiam proficuum fore, si vel fœculo arenâ calidâ repleto, vino generoso calido, aut spiritu vini camph. aut matricel. aut aq. Regin. Hungar. vel spiritu sambuci trifol. fibrin. crebrius abluatur. Exulcent ergo hic omnia repellentia, adstringentia ac refrigerantia. quæ obstructions augent, succosque machinis crassiores detinent, qui subtilioribus evanescentibus actiones facti fibras discindant, vel rumpunt, unde auctâ obstructione major supervenit tumor, & ad gangrenam via redditur magis expedita. Quod periculum ergo ut maturè averrunctur, necesse erit, ut curas & cogitationes hoc in casu unice in obstructionem intendas, in quem finem conducunt alcalia volatilia aromatica, balsamica, v. gr. spir. vini camph. cum aq. Regin. Hungar. spir. sal. æci Balsam. nervin. n. d. aq. cal. viv. spir. fl. sambuc. sal. volat. oleo. spir. matricel. aq. mea ad Gangrenam, constants ex aq. Ψ & spir. vin. cum multa Camphorâ, Diaçord. & Theriaca, omnia enim, quæ novas inducere valent fermentationes, proficua sunt. Inter omnia, quæ acidum flygium temperant, corrigunt, edulcorantque, quæ Capite de *Inflammatione* ad nauseam jam dicta sunt, hic ea repetere non libet, ne Lectori cramben sæpius coctam propinquemus.

Tert

Inter

Inter *Vulneris* Symptomata & *Dolor* refertur, qui ægis ac Chirurgis multum accessit negotii, cui dolori sæpe tumor supervenit, non propter majorem humorum affluxum, prout omnes Veteres hactenus crediderunt, sed potius ob eorundem resagationem, dum interea semper à tergo sequuntur succi & pruriorum copiam augent. Dolor ille, qui percipitur dum, *Vulnus* infligitur, est ab agitatione, commotione, distensione, dilaceratione & concussionibus fibrillarum nervearum, quo enim fibrillæ vehementius discinduntur, eo majorem Mens de extremo aliquo insolito judicans, percipit dolorem. Verùm ille dolor, qui facta solutione vulneratos torquet, & peritumque aliquot elapsis horis intenditur, est à novo impetu succorum circulantium, quibus transitus ab obstructione denegatur, hinc elabentibus, quæ datâ porta succi ruunt, flexilibus suis particulis emissis, reliquæ aciores factæ rodendo dolorem augent. Sic in ipso *Vulnere* possunt quoque existere resæctræ, vel festuæ, vel frustula vitrorum vel instrumentorum fractorum, vel grani sanguinis acris ac acidi, fibrillas aliæque vascula minima concutientia, quæ dolorem intensum producant. Sic etiam dolor oritur à fluidis cum vulnere extravasatis & stagnantibus, tandemque effervescentibus, unde sæpius accidit, quando aer frigidus *Vulnere* immittitur, tunc dolor in ipso observatur vehemens, quod etiam Veteres notarunt, cum dicere solent, quod aer frigidus *Vulnere* admissus dolorem producat, rationem verò non addidit. Ratio autem hæc est, quod ab aere frigido particulae in *Vulnere* volatiles fermentescibiles & mobiles incassentur & inspissentur, imò hæ particulae volatiles ab aere alias percreginas nascuntur particulae, quæ ordinem turbant, hinc etiam mixtura perturbatur, & aliam induunt indolem, & tum tendunt ad fermentationem, & dein instar lactis acescunt, quæ spicula acida tubulos ac fibrillas concutunt, & sic dolorem producant. Ex hisce præmissis apparet, quàm male Antecessores nostri fecerint, quod dolorem frigidis ac repellentibus remediis coercere allaborarint, quare etiam hocce in casu ca medicamenta rejicienda sunt, & ad ea confugiendum est, quæ succos fluidos reddunt: omnia ergo hæc conducunt *resolventia* vel blande emollientia remedia, quæ copiam salis volatilis in se continent, imò omnia ea hic conveniunt, quæ commendavimus *Capite de Gangranâ*, spirituosâ nempe camphorata, imprimis spir. vin. camph. sal. volat. oleos. spir. matricar. cum fl. sambuc. chamomill. imprimis verò aliis præferimus varia Cataplasmata anodyna ex mica panis, flor. chamomill. theriac. croc. cum lacte & vitell. ov. parata jam sæpius didit.

Ad *Vulnecum* Symptomata quoque refertur *Spasmus*, qui accidit *Vulnere*, ubi tantum causa fortior & commotio ac dissensio fibrillarum major existit, quæ tendinosarum fibrarum læsio adfuerit, quam ut plurimum sequitur *Spasmus*, seu nuper in quodam prope claviculas vulnerato observavimus: & notandum est, quod sæpius in hisce in casibus, ubi tendines vel nervi magis læduntur, statim accedit tumor *fistulæ*, qui, me judice, nihil aliud est, quàm ipsi spiritus animales evasati & formæ vaporis subscitentes. Hic itidem eadem conveniunt remedia, & cataplasmata, ex nervinis aromaticis pa-

rata, ut & oleosa balsamica, castorina succinata, Ammoniacalia, ol. caryophyll. spic. lavendul. cinabarina, bals. spalm. M.

Inter *Vulnecum* Symptomata *Febris* notissima sunt, & accidunt à turbata sanguinis mixtione, cum lætis tot vasculis necessario succi effluere debeant, qui stagnantes, & massæ sanguinæ iterum corrupti advehi mixturam ejus turbant. *Febris* in vulneribus varii generis deprehenduntur, vel ephemeræ: vel putrida continua, vel intermittens tertiana, vel duplicata, adeoque singulis diebus recurrens. Causa *Ephemera* est sæpe in principio, & ut plurimum vel ex calore, terrore, vel nimia spirituum agitatione. *Febris* etiam exasperantur à Medico, si intempestive medicamenta adhibet purgantia fortiora, & sudorifera calidiora, vel acida &c. Item ab astantibus, dum ad iram concitant ægrum. Ab ipso ægro, si vinum acidum haurit, aliæque acida assumit, hinc abit in peccatam putridam vulgo dictam febrem, cujus causa est in ipso vulnere, quando scilicet pusculum succi circulantibus ad massam sanguineam abripitur, eamque nimis turbat. Calor in *Ephemera* est mitior, intensior autem in putrida, & omnia Symptomata sunt graviora quàm in *Ephemera*. Inflammatio febrem excitat, & pro diversitate & constitutione sanguinis, *Febris* vel continua vel intermittens oritur: si enim sanguis semel turbatus, diu manet sæpè talis, sed si puerper intervalla advehitur sanguini, tunc *Febris* habet suas intermissiones. Purgantia semper nocent vulneratis præsertim febricitantibus. Curatio ergo *Febris* *Vulnecum* consistit 1. in blanda diaphoresi, 2. in succorum fermentescientium præcipitatione, ex. gr. sequenti modo:

1. *Lapid. 28. ppt.*  
Bezoar. occ. 22. 3℔.  
M. F. pulvis una vice assumendus.
2. *℥ss. sambuc.*  
Vitronica 22. 3j.  
Essent. irammat. 3℔.  
Syr. trifol. 3iij.  
M. pro vehiculo.

In omnibus vulneribus *Pteronica* palmam alius præcipit, hinc etiam omnibus formulis addenda est: pro altero scopo obtinendo interviit sequens:

3. *C. C. f. Δ ppt.*  
Lapid. scissil. Irland.  
orol. cancr. ppt. 22. gr. vj.  
arcan. duplis. gr. ij.  
M. F. pulv.

Lapis enim scissilis magnam habet præcipitandam vim, hinc nobis solennis est: quod si cui mixtura ardeat, sequens prodegit:

4. *Aq. febrifug.*  
card. bened.  
papav. Err. 22. 3j.  
C. C. citr. 3j.  
Mixt. f. 3℔.  
Syr. papav. Err. 3℔.  
M. D. omni bithorio cochleare unum

& alterum.

In formâ *Tincturæ* vel essentia duntur *Tincturæ* bezoard. volatilis, Essent. citr. tot. aq. cordial. Saxon. Theriacal. Camph. vel Theriac. cum aq. Scordii.

H. s. in *Febris* *Vulnecum* conducunt omnia præcipitantia, salina & absorbentia, v. g. lap.



lap. ꝑ. C. C. Myrrh. Camph. arean. 2. pl. lap. prunell. chin. de chin. rad. gentian. fl. ☉ ✱. Nit. perlat. vel nitrum cum carbonibus alcoholisatum.

Chirurgis notum est, quod vulnerati vel per nimiam hæmorrhagiam, aut ob terrorem, aut ob venenum à mortu sc. animalis in *Syncope* incidunt, ægri enim pallescunt, pulsus cessat, sudore frigido corripuntur: non mirum est, quod à nimio sanguinis effluxu vulnerati deliquim animi patiuntur, quia si sanguis non ad eor lege circulationis redit, necessario ad alias transire partes, sicque horologium pervertitur, per terrorem cor contrahitur, ut sanguis ad partes ruere nequeat, & simul spiritus animales ad liberum suum fluxum impediuntur, hoc in casu conducunt omnia salia volatilia, spiritus volatiles & oleosa, quæ sanguinem ad circulationem incitant. In Juniqum Medicorum gratiam usam & alteram communicabimus formulam:

✱. *Aq. menth.* 3℔.

*cinamomi, bugloss.* 3℔.

*spir. menth.* 3℔.

*rosar.* 3℔.

*ol. sassafras. guc.* 1v.

*Syr. de cinamomo.* 3vj.

M. Mixtura hæc cochlearim absorbatur.

Vel:

✱. *Elix. vita* 3℔.

*ol. cinamom.* gr. ij.

*sal. volat. oleos.* gr. xx.

*aq. Regim. Hungar.* 3℔.

M. dentur aliquot guttule in vino vel alio liquore convenienti. Ante nares detineatur spirit. sal. ✱ volat. vel aromat. cum spirit. anthos, vel sal C. C. volat.

Reliqua quæ in Vulneribus occurrunt symptomata facile Medicus ac Chirurgus ex jam dictis petere poterit.

Nunc nos conferamus ad Vulnera à diversis instrumentis inflicta. Cùm ergò humana astutia in excogitandis variis machinis ad lædendum hominem de die in diem assurgit, sic quoque inventa sunt scelopeta cum pulvere pyritico, ex quibus Vulnera fiunt periculosiora, quàm ab aliis instrumentis, quod lædendi genus vetustati ante 200 annos ignotum fuit, hinc quoque hæcenus eorum ferè omnes Vulnera scelopetorum pro venenatis habeat, atque in eo quidem prudentiæ edunt argumentum, quod ignorantiam suam celare, atque successus parùm felices malignitati ac virulentæ tribuere fatagunt: tantum enim abest, omnia scelopetorum Vulnera venenata esse, ut potius ob rationes satis notas omnium illorum Symptomatum ferax sit. Præterquam enim quòd in his Vulneribus aliquid de ipsa partis læsæ substantia auferatur, etiam hoc majus adhuc infert periculum, quod plures fibrillæ contendantur ac disrumpantur, in aliis autem Vulneribus pauca dumtaxat disrumpantur, inde enim est, quare Scelopeto sauciati Gangrænæ & Sphacelo aut putredini, nec non Spasmo ac febribus præ aliis sint obnoxii, major enim hic est obstructio, major tubulorum & pororum perversio, major in fluidis perturbatio quàm in Vulneribus cælim vel punctum inflictis. Hic etiam simul indolem pulveris pyritici examinabimus, & quòque consideranda est velocitas globulorum ex scelopetis emissorum, à quâ Vulnera producuntur periculosa, juxta enim velocitatis

gradum & globulorum magnitudinem confusio partium varia est, quæ verò de combustionis partis globo trajectæ aut Vulnerum horum empyreumate pro exaggerando periculo plures adducunt, ea cum Celeberrimo *Waldschmidio* nostro cœu anile commentum inter fabulas collocamus, quis enim, inquit, unquam vim ignitam in globulo observavit? Equis nescit ipsos tormenti globos acervum pulveris pyritici transire, sine ullo accensionis metu? nisi forte impetum fecerint in corpus durum, ex quo ignis exeuillus ipsum pulverem pyriticum accendat. Videmus ergò illos qui remedia sua contra Emphyreum in his casibus vendunt, quibus se & alios inani lætare spe uno fallere solent. Vulnera à Scelopeto inflicta apparent ab initio livida, nigra & sæpe flava ut alia Vulnera, & æger concutitur de dolore gravativo, interdum sequitur tumor, nonnunquam aliquid sanguinis è Vulnere effluit, post ictum Vulnus quasi contrahitur, ut vix turunda intrudi possit, ad quod multum facit sanguis congruatus ibi hærens obdipansque, succi enim noctricum spiritibus animalibus vasculis inclusi non sufficientes sunt ad reprimendam vim globuli explosi, hinc non tantum vasculi & canaliculi disrumpuntur, sed & succi cum incredibili velocitate à suo statu permittuntur, unde reliqua symptomata facilius deduci possunt, quod jam alibi deduximus. Nunc verò ad Scelopetorum Vulnerum curationem transeamus, magnam enim ex antedictis foveramus in curatione lucem. Si Vulnus non satis amplum fuerit, id cunctello ineflorio magis dilatandum est, partim ut materix effluxus evocetur, partim ut si adfuerint Ossis testæ vel globuli minores, exstantur felicius: & hoc statim ab initio considerandum, si enim pars læsa fuerit nimis tumida seu tumore oblecta, tunc nimis tardum erit, & si in Vulnere res extraneæ adfuerint, ad eas eximendas debet Patiens in hoc situ locari, quo accipit Vulnus, aliis fibræ distorqueri possunt, inde dolor oboritur maximus. Accidit sæpius, ut vulnus coalescat relictis ossum fragmentis, in quo casu omnis opera impendenda est, ut eximantur, aliis frustra Chirurgus laborabit, cum tempore enim ossa cariem induunt, & ulcus excitant Vulneri pejus. Digni sæpe melius instrumentum sunt ad has res eximendas, & si globus nimis profunde lateat, incisio facienda est, & forceipe eximendus est globulus, nos enim non approbamus istud instrumentum, quod Chirugi *Aligsther* nominant, quia lædendo magis nocet quàm prodest. Deinde accedendum est ad deligationem Vulneris, & cùm ut plurimum caro & fibrillæ contusæ, & succi incrassati fuerint, hinc optima remedia sunt illa, quæ succos attenuant, ut ad circulationem idonei reddantur, & separatio quovis modo tentanda, proderit ergo sequens vel simile remedium in & supra Vulnus applicandum:

✱. *Ungu. Basil.* 3℔.

*Aloes.*

*myrrh.* 22. 3vj.

*aq. Regim. Hungar.* 3℔.

☉ *Eni* 3℔.

*Spir. ☉ ꝑ. carophyllat.* 3℔.

*M. & detur usui.*

Hoc calide cum plumaceolis in & circa vulnus applicetur, vel superponatur vulncri spirit. matricalis cum spiritu sambuci, Vin. camphorat.

Tttt 3

Spir.

Vulnera  
scelopetorum.

Spir.  $\Theta$  ci. Myrrh. Aloës &c. Hiscæ enim remediis insistendum est usque Tumor evanuit. Nihil tamen excellentius quam sequens *unguentum Balsicum*, quo solo Chirurgus Caltrensis in vulneribus à sclopeto inflatis contentus esse potest, nunquam enim ipsum deseret, addito pro re natâ Elix. vitæ n.

*℞. cera citrin.*  
*resina aa. lbj.*  
*ol. olivæ lbj.*  
*picis nigra lbj.*  
*M. F. unguentum.*

si primæ 3. species refrigeratæ fuerint, add. picis nigr. q. v.

Vulnera magna cum confusione vehementi, solo applicato Spiritu Matricali, Spir.  $\Theta$  ci saturato, observavimus curata absque ullo subsecuto pure. Ubi confusio major est, ibi suppuratio promovenda, & additis aliis croco & vitello ovorum, & si suppuratio vix appareat, seq. cataplasma calide applicetur.

*℞. Herb. Absinth.*  
*rovismar.*  
*cent. min. aa. Miß.*  
*bacc. lauri*  
*sem. cumin.*  
*sanicul. aa. 3ß.*  
*campbor.*  
*myrrh.*  
*aloës aa. 3j.*

*Coq. in aq. & add. Farin. fabar. q. f.*

Hiscæ impostis necessario succi ex canaliculis disruptis effusi fermentari debent, quo facti pus subséquitur. Hoc in casu internè quoque conducunt omnia ea, quæ constane particulis volatilibus spirituosus ac oleosus, ut & omnia quæ acidum temperant, & cum suis particulis volatilibus spicula acidorum amplexantur, prout videmus in butyro quod acetum amplectitur: & eum spiritus nihil aliud sit, quam subtile & attenuatum oleum, eundem præstat effectum, sic Spir. Sal. Nitr. dulcescentur cum spiritu vini per cohobationem institutam. Commendamus ergo internè Salia volatilia oleosa, balsam. Nervin. Peruvian. de Chili, aquam Theriacal. campylap. &c. Tinctur. Bezoar. Traumat. volat. Omnia ex Scordio & Veronica conducunt. Antimon. diaphor. Antihæst. Poteri, aliaque absorbentia interponenda sunt, esto formula.

*℞. El. diafcor.*  
*aq. sanicul. 3iv.*  
*chercfol. 3j.*  
*Balsam. nervin. m. d.*  
*ocul. 3s. aa. 3j.*  
*campbor. 3ß.*  
*M. D. cohibeatim.*

*Vulnus à  
morsu ani-  
malium.*

Si globi vel tela fuerint venenata, vel si vulnus à morsu animalium excurret, diaphoretica bezoardica ac Camphorata, Theriacalia per diuturnum tempus continuanda sunt, sæpius enim in tubulis latet venenum, quod data occasione erumpit, & coagulando penitus sanguinem hominem è medio tollit, cu hoc vidimus in pueri Venatoris superius dicti: ea propter sunt, qui radicem gentianæ internè ad 3j. datam magni æstimant. Nos viperina, inprimis pulverem Anglicum & Bezoarticum nostrum, item Tincturam viperinam Viganii, ut & ejus Elix. propr. commendamus. Adversus morsum canis rabidi infallibile expositum commendat *Hanneman-*

*nus*, ejus mentionem facit *Bartholin. Aët. Hæst. Volum. 2. Obs. 110.* beneficio enim ejus multos commorosos, & aliquot jam actu tabidos, felicissimè restituit, & est seq.

*℞. Herb. vicia,*  
*abrotan.*  
*betonic.*  
*angustifolii.*  
*Salvia fol. angust. aa. Mj.*  
*M. incif. affund. Vin. opt. lbj.*

Sique tempus permittit, per aliquot horas maneat in infuso, exprime, expresse add.

*Theriac. Andr. 3j.*  
*M.*

Adultus magnum de eo faciat haustum, junioribus verò & puerulis detur cochleatum, sin verò periculum metuatur, additur herb. card. fulon. Mj. vel hujus sem. contus. 3j. Vulus commorsum per plures dies apertur servandum esse necessum est, & semper ad sudorem disponatur æger, in quem finem sequens vel similis proponitur haustus.

*℞. Theriac. 3j.*  
*cinam. 3ß.*  
*Ol. sassafras gt. vj.*  
*cinamom. gt. iij.*  
*Balsam. nervin. m. d. 3ß.*  
*vin. q. f.*  
*M. F. haustus.*

Nec externa negligenda sunt, vulnere ergo imponatur sequens calidè cum plumbacolis:

*℞. Regim. Hungar.*  
*Spir. matric. aa. 3j.*  
*myrrha*  
*aloës*  
*terebinth. aa. 3ß.*  
*ol. caryophyll.*  
*sassafras aa. 3j.*  
*campbor. 3ß.*

M. & calidissimè infundatur vulnere venenato, vel sæpius eluatur vulnus de cocto scord. rad. contrajerv. rutæ, abrotan, betonic. saliv. in decocto lbj. dissolv.

*El. diafcor. 3j.*  
*Spir. vin. campb. 3iß.*  
*M.*

Alii theriacam morsui applicant, alii busonem vivum loco cataplasmatum imponunt. Boyle ferum candens morsui applicari vult, sic etiam lapidem serpentum contra quæcunque commendat venena. Æstivo tempore vidimus canes à canibus rabidis morsos, ex quorum vulneribus observavimus prolem vermium prodire, quia, me judice, à mulsis hiscæ vulneribus non deligatis impostis ovula imponebantur, quæ à carne semiputrida & quasi fermentante exclusa sunt.

Dum hæc scribimus, Vctula à rabidâ fele in manu mordebatur, tumor manus & totius brachii intensus subscutatus est, exhibitus verò internis sudoriferis ex El. diafcor. 3n. diaphoret. Bezoar. aliisque, & impostis Cataplasmatibus aromaticis, illico remiserunt symptomata & brevi convaleuit: inter externa optimè tulit sequens:

*℞. Ol. Hyperic. n. d. 3j.*  
*scorpion. 3ß.*

M. calidè vulnere infus.

Dolores ac tumor inde statim cessarunt. Si ex *Vulno colore livido vulnerum lenius motusque ablati- cum in- tione, atque cadaverolo frigore mortis princi- pium*

pium, Gangrænam nempe adesse animadvertant Chirurghi, profundiorē statim in confuso instituant scarificationem, quo sanguis acidus & cruoris nomine magis dignus exprimitur. Nos vulnus gangræniolum absque Scarificatione eluimus spiritu nostro bezoardico, vel decocto superius dicto vel aquâ muraticâ, quo obstructions vel pori obstructi cō facilius aperiantur, mox liquorem ex calce vivâ cum aqua pluviali, spiritu vini camph. & Mercurio vel melle applicamus, superimposito cataplasmate de 4. farinis dict. vel totu ex Scordio, Absynth. Marrub. Theriaca. spiritu vini aliisque parata. Neque enim hic ulla admittenda est mora, aut induciæ concedendæ sunt, cum locum hic habeat illud quod *Librius* cunctanti dictum est: *Aut ageant desiste*: quoniam quo citius pars cadaverosa à sana separatur, cō certius æger in tuto collocatur, sin autem nimis sero advocatur, & extremæ calamitatis, & ægro periculosa subeunda critica, atque ad extirpandam hanc hydragm ferrum in subsidium vocandum.

*Nam, quod non sanat medicamentum, hoc sanat ferrum: quod non sanat ferrum, sanat ignis.*

*Hypocritæ  
cassus in Vul-  
neribus.*

*Hypocritæ* etiam in vulneribus obveniens Chirurgis tape impedimento est, quæ aliquando propter visum & inde generatum chylum copiosum, crassiorē tamen ac faciliē coagulabilem exoritur, cō ergo intendendum est, ut eorista frangiosa tollatur, & in quem finem pulveres inspergantur absorbentes, ut Calx viv. Sal Saturni, mandibul. luc. Corall. Camphor. vel Elixir. vitæ, Spiritus Matricar. spirit. vini camph. cum aqua calc. Elixir. vitæ cum sale fini & camphorâ, vel unguentum Ægyptiacum inspissatum, vel imponatur Emplastrum divinum Barbetæ, vel Sticticum, vel Oppodeltoch.

Nonnulla hic addamus de Tendinum vulneribus maxime periculosis, diutius quam alia hæc aperta servanda sunt. Cum igitur hisce in vulneribus dolor valde molestus sit, & inflammatio urgeat. V. S. instituenda est, Medicamenta simul interna & externa calida nervina adhibenda sunt, ut sic viunita, quæ semper fortior est, huic malo occurratur, pro Tendinis quomodoque vulnerati curatione & symptomatum inhibitione totum membrum affectum ad nervorum principium usque inungendum, ol. lumbri-cor. acuto cum ol. lavend. dest. quod hoc in casu excellit, vel ol. sal. succin. &c. Balsamus ex Gnio seq. egregium est. Extrahatur ex scoris Regul. Gni cum Oleo alcalino fixo paratis, mediante aqua sal sulphureum, tum solutio filtrata leni calore inspissatur; huius Oles n. 3j. cum ol. juniper. menthæ, anis. aa. 3j. superfundantur, add. ~ vin. rectif. 3j. hæc invicem probe mixta indantur Retortæ vitreæ, & leni calore arenæ digestio per 12. horas instituat, ita ut forsan 3j. olei exstillet, deprehenditur sic in Retortæ balsamus sanguinis instar rubicundus, paulo crassior, non ingrati saporis, externè vulnera citissime sanat, convenientissimum autem est læsiouibus partium nervearum ac tendinosarum, in quibus periculosa avertere solet symptomata.

Tendo igitur si punctura vulneratus fuerit, videndum, num vel cæca vel aperta sit. In priori, quia sanis collecta nec effluere, nec medica-

menti vis ad locum pervenire potest, opus est, ut vulnus dilatetur per sectionem cutis ac carnis, usque ad tendinem, cavendum tamen, ne cultro tangatur; punctura si aperta sit, latius pro re nata incidenda, patens autem servari debet vulnus, non autem turandis; illic enim dolor exacerbat, imponenda sunt terebinthina, Gummi, Elemi, Carracc. Opobalsamum, bals. Copaiiv. Peruv. Tolut. ~ ol. dest. succin. lavend. sabin. philos. laurin. ~ vin. &c. In hisce enim vulneribus, ubi jam nervus vel tendo denudatus est, nec ungucinum, nec olea pin-guia unquam admoventia sunt, quia maxima inde excitari solet inflammatio; in hoc casu præsertim conducit oleum terebinth. destill. si calidum vulnere tendinum infillitur, ejus loco ol. dulc. in usum vocetur, quib. seq. addi potest.

~ Ol. tereb. dest. 3j.  
~ vin. 3j.  
Camphor. 3ß.

M. quæ commodè puncturæ tendinum instillantur.

Est unicum fermè medicamen Chirurgis hodiernis usitatum, quod calide vulnere imponunt, superimpositus defensivo quodam & fomento ex variis herbis nervinis & confortantibus confecto.

Helmontius tanquam specificum in hisce vulneribus tendinum cerumen commendat, cui addi potest Bals. Peruv. vel ~ ol. nucl. jugland. exprell. vel ol. sem. hyperic. Si monitum infillitur in formam unguenti.

Ad dolorem sedandum conducit quoque cataplasma ex mica panis, lacte & croci tantillo, parti affectæ utiliter applicatur, vel additis quibusdam anodynis felicius consequimur.

~ Mic. pan. alb. libß.  
~ Farin. altheæ 3iß.  
~ flor Chamamill.  
~ aneth. aa. Miß.  
~ Vitell. ov. No. j.

Coq. in lact. dulc. f. cataplasma.

Dein caro inducatur sarcoticis, ut sunt thus, aristoloch. suavia balsama nativa & gummata.

Quod si omnibus hisce seopum nostrum non attingamus, ægerque in pejus quotidie ruit ob symptomatum partim atrocitatem continuam, partim ob gangrænam, marasmi aliorumque metum, melius erit, ut difficiliorē curationem, nonnunquam etiam mortem antevertemus, tendinem nempe in totum dissecando, quo sit ut mala præcaveantur imminetia.

In punctura insectorum propediem imponatur plumaceolum sequenti medicamento imbutum.

~ ol. terebinth.  
~ vini aa. 3j.  
~ ol. ceræ, in quo aliquod euphorb. solut. 3ij.

M.

Hæc superimponatur aliud siccum, mox spatula ignita aut stylo planiori applicato, ut calor & vis mixturæ ad interiora læsæ deferatur, hæc inustione peracta, plumaceolum unguent. Balsilic. inunctum priori remoto admoveatur;

Si tendo putrefactus reperitur, abscindendus est.

Si punctura

Si puncturæ fiant ab animali vel instrumento venenato, ne ergo in M.S. venenum penetret, sanguis ante omnia è vulnere exprimendus, idque ablucendum  $\mp$  accerrimo, vel potius ~ vin. f. vel camph. & Theriac. infusum vis eius infringatur alexipharmacis internis, & ad exteriora vocetur per sudorifica antidota, quæ interea in usum semper vocanda sunt, dum in externorum applicatione occupatus est Chirurgus, ad venenum extrahendum utebantur veteres frictionibus per homines certos institutis, qui phyllis dicebantur. Hicce remedium nihil iuvantibus ad sectionem traieciendum est, & hodie experientia constat, quàm vanus nunc nobis appareat metus, quem veteres Medici de hisce vulncribus conceperunt, non credentes, difficilis tendines iterum curari posse, quos tamen hodierna experientia multoties confirmavit; imò vidi in Galli tendines laceratos à Chi-

urgo iterum filo & acn confutos & curatos fuisse, de quibus videatur Mekeranus, Nukius, Silvius alique.

Ad impediendam Synoviam inspergi potest sequens vel similis pulvis.

℞. Testar. Officar. ʒj. cran. adust. oss.  
Sapie.

Mandibul. Lucii pisc. calcin. aa. ʒij.

Spodii ppt. terr. sigillat. vel alum.  
aa. ʒiſs.

M.F. pulvis, qui inspergendus vuln-  
neri.

Polychrestum quoque est remedium, si destil-  
letur  $\nabla$  ex cancr. fluv. confus. cum linteis dup-  
plicatis imposita Synoviam misit.

In nimia Tendinum laxitate & contractura  
convenient Thermæ, imprimis Schvvalbacenses,  
das Schlangen-Baad.

## CAPUT VI.

### *De Ligamentorum Stupore & Laxatione, Nervorum contusione, juncturarum Incurvationibus & Luxationibus.*

#### §. I.

**E**X innumeris Calamitatibus myriadibus, quibus machina nostra undique per omnes sui partes, prohi dolor! est exposita, imò humani corporis pars aliqua, quo dignior & resiliantior quandoque majorem præbet usum totius æconomix, hæc pluribus, hæc atrocioribus morbis est obnoxia, in machinâ enim nostrâ plures reperiuntur partes, quæ ligamentorum & tendinum texturam participare videntur, eò quod æquè dura non sint atque illa, & his minus mollia sunt, cartilaginee incigitantur. Primaria ratio, propter quam nos conjicimus, cartilaginee nil aliud esse quam fibrarum tendinosarum compagem, quæ indurata fuerit ex alcalicorum volutium infarctu, hoc est, quod nulla sit cartilago, in quam non definant multæ fibræ tendinosæ: verisimilis ex eo redditur conjectura nostra, quod cartilaginis substantia, quæ oculis percipitur, nihil aliud sit, quam fibrarum congeries; res enim extra dubium ponitur, eò quod in junioribus animalibus multæ partes, quæ tendinosæ erant, tractu temporis cartilagineæ deveniant, & in vetustioribus animalibus quidem tendines in cartilaginee mutati conspiciantur. Sic hæc ligamenta tendines, ut & nervi suos patiuntur manes, & à Medicis Chirurgicis expectant auxilium, imprimis in *Ligamentorum Stupore*, & eorum *Laxatione*, *Nervorum contusione*, *juncturarum Incurvationibus & Luxationibus*. Quos affectus omnes ordine & more solito examinaturi sumus. *Stupor* dicitur etiam Narce, Narcosis seu Torpor, est propriè sensus motusque abolitio.

*Stupor Ligamentorum* describi potest, quod sit obstructio ligamentorum à succo nervo coagulato, vel à compressione alicujus rei extraneæ, exorta.

*Laxatio* vero ligamentorum describi potest, quod sit eorum in. omniū extensio, à causa violenta vel succorum abundantia ipsa relaxante, producta.

*Contusio Nervorum* sufficienter intelligitur, *Contusio* nec opus est *Descriptione* prolixiore, aut definitione *Logica*, Tyronibus magis inutili, eos dumtaxat confundente.

*Incurvatio juncturarum* itidem facile percipitur, cum sc. juncturæ à causa violenta quædam vel ligamentorum vel nervorum causâ incurvantur ac intorqueantur. Latinis hic Affectus etiam dicitur *Contractura* membrorum, Germanis, et isti contract, et isti frumm und sahm / vel, eine krummung. Græcis dicitur, ἀγκυλῶσις à verbo ἀγκυλῶσαι, quod ipsi incurvare dicitur. Gallis, contract de nerfs, Ital. Incoartato audit. Sed sæpè contingit, ut Spasmus, Convulsio, Paralysis, Stupor & Contractura inter se confundantur.

*Luxatio* est Capitis articuli è propriâ *Luxatione*, de, siue proprio sinu in alienam insolitam situm, sedem prolapsus, cum motus voluntarii laxatione.

§. 2. Partem affectam esse Ligamenta, *Ten-Pars affecta*, dicesque, ut & Nervos, ex jam dictis abundè liquet, nec excludimus Spiritus animales ad hos affectus excitandos symbolum suum addentes. Ad rem ergo extimidi examinandam, ut eò facilius Causam horum affectuum eruiamus, in texturam & compositionem harum partium inquiremus.

Uti ergo tendines nihil aliud sunt, quàm compages fibrarum purissimarum, quæ idèò fibræ tendinosæ appellari merentur: sic etiam non magna differentia est inter tendinem & ligamentum; Fibræ enim arcuæ juxta se invicem oppositæ, constituunt *Tendinem*, adhuc magis verò coarctatæ *Ligamentum*, firmius tandem junctæ & proximè oppositæ *Cartilagineum* & *Os* ipsum exhibent. Et hic asterisco notandum, quod omnes hæc fibræ tendinosæ seu ligamentosæ cavitatem habeant, quæ illas percurrit Siphonis instar; cavitatem equidem illa visu apprehendi nequit, sed prostat experientia, quæ

## CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 705

quæ valide satis evincit, cavitatem eam esse necessariam, ut ab iis, quibus testâ ratio satisfacit, non rejiciatur. Hæc est experientia, nimirum quotiescunque musculus quidam officio suo fungitur, fibra ipsius maxime abbreviatur, & eodem modo crassiores evadunt. Interim mente nullo modo capere possemus, quo pacto fibræ flexiles crassiores & breviores eodem temporis puncto fierent, nisi id contingat ab aliquo liquore, qui adimpleat earum cavitatem, quæ longitudinem earum occupat. His positis admodum difficile non erit videre, quâ ratione ea omnia operari debeant: Singulæ fibræ tendinosæ nervum recipiunt, & singuli nervorum ramuli spiritus animales fundunt in cavitatem singularum fibrarum tendinosarum: Spiritus animales sunt sanguinis partes subtilissimæ & agitabilissimæ, cum cavitates fibrarum tendinosarum subingressi sunt, illas tumefaciunt & abbreviunt. Eodem planè modo, quo aer in intestinum insufflatus ipsum in tumorem extollit, illud quo eodem instanti brevis facit, prout etiam videmus in velsis instans dis.

Sic etiam nervos in ipsorum contusione pro parte affectâ agnoscimus, quorum constitutionem & texturam etiam paucis examinabimus. Superficies cerebri & cerebelli æquæ ac media medullæ spinæ dorsi, observatur ex corpusculorum rotundorum congerie esse constata. Pericipiunt arterias recipere, venas emittere, & ex iis fibrillæ albæ proficiuntur.

Cùm attentioni animo corpora ista rotunda examinentur, nihil aliud in singulis conspicitur, præter arterias, venas & fibrillam albam. Particulæ, quæ à sanguine sequestrantur, per arteriam non abeunt, cùm sanguis ad corpora rotunda ab arteriis advehatur. Venâ quoque non excipiuntur; si hoc enim foret, nulla interellet differentia inter arteriæ & venæ sanguinem. Superest igitur, ut fibrillam albam subeant, & ita compertimus Cerebri superficiem ex minimis tantum glandulis constare, quæ ab arteriis sanguinem accipiunt, per venas demandant, & exiales habent excretorios, ex quibus manat liquor, quem à sanguine separarunt. Vasa, quæ Cerebri aut Cerebelli, (cujus substantia est glandulosa,) hujus verò substantia corticalis dicitur, corpus callosum componunt, ita in illis mutuo sunt complicata, ut rete quoddam referant. Nondum liquet, utrum mutua sit inter ipsa anastomosis, an rete simpliciter contextatur ex eo, quod se decussatim invicem subeant. Tandem in parvos combinantur fasciculos, qui in membranaceis vaginis ocluduntur. Prout in animalis corpus progrediuntur, in plures ramulos dividuntur, & hoc pacto in universas partes expanduntur, ita ut paucissimis Corporis animalis partibus aliquis eorum portio denegetur. Fasciculi isti vasorum excretorios cerebri, cerebelli & spinæ, Nervis, de quibus sermo est, appellantur. Denique spiritus animales examinandi veniunt. Quoad liquorem istum attinet ex tenuissimis & volatilibus sanguinis particulis necessario est compositus. Instat autem subtilissimæ consideratur, quæ in fibras nervorum sese insinuat. Cùm liquidum oculorum nostrorum aciem fugiat, nec vel optima microscopia eam visui nostro repræsentare possint, merito jure autumare valeamus, liquorem omnium, qui ex sanguine in glandulis corporis animalis segregatur,

cum esse tenuissimum. Cognominatur liquor iste, *spiritus animales*, propter summam suam subtilitatem, & illi sunt ea similia, quæ Bruta vivunt, quamvis liquor iste colligi nequeat, ut ejus inquiratur mixtura & constitutio, ab ipsius admissione cum acidis & alcalicis, nihilominus examinabimus, alcalicum volatile in illo prædominium obtinere, cum sulphure supra modum volatili, quod inde constat, quod alcalia omnia volatilia internè ulsurpata Spirituum animalium penu augeant. Sulphura Volatilia idem ferè operantur: & nihil tantoperè eorum abundantiam promovent, quàm alcalia volatilia sulphurata, qualia sunt alcalia omnia volatilia aromatisata. Effectus etiam alcalicorum in sulphura nos in hæc opinione confirmat. Nam alcalica sulphura dissolvunt, eorum partes ab invicem semovendo, & hoc pacto impediunt, quo minus eorum rami inter se intracentur. Inde fit ut interstitia aut spatia ramorum à materiâ æthereâ impleantur, æquæ ac poris, qui inter sulphura & alcalia remanent, qui tùm ampliores sint, quàm forent, si liquor simpliciter alcalinus aut sulphureus fuerit, copiosiores etiam in semetipsum ætherem continent: & quoniam materia ista æthereâ in rapidissima vertitur agitatione, maximo nixu cunctas partes hujusce liquoris commovet, quod parum non conicit ad ejus activitatem & tenuitatem. Sed ne diutius extra olcas vagemur, nunc ad ipsam partem affectam *Juncturarum*, quæ sunt illæ conjunctiones articulorum, qui mediantibus ligamentis & ossibus connectuntur, deveniamus.

§. 3. Quod *Diagnosin* horum Affectuum concernit, *Stupor Ligamentorum* cognoscitur ex motus sensusque oblatione; sensus enim in parte est obscurior, instat fornicarum pereurrentium, pars quoque, cui annexum est ligamentum, vix de uno loco in alium moveri potest, torpescit enim pars, & maxima totius artus debilitas percipitur, quia spiritus animales haud influere possunt, hinc necessario pars quasi flaccescere debet. Sic & cognoscitur ex prægressâ causâ violentâ per Compressionem seu Contusionem fortiter productâ. In Supore seu Torpore non distinctè, sed obscurè & velut in somno constituitur, percipit actionem obiectorum suis fortiter Organum tactus moventium.

*Laxationis Ligamentorum* signa petuntur ex *Laxationis* prægressâ causâ violentâ, & aceratione artuum, *Stupor* vel à nullo opere, ut non ita pridem talem *Ligamentorum* Laxationem vidi in viro, qui magnus pondus elevare frustra conatus est. In membro, ubi laxatio facta est, nullum adeit amplius robur, & sæpè excidit, eeu id observavimus in Virgine Nobili quâdam, quæ ex effuso in tertam adeo fortiter ruebat, ut Laxatio ligamenti in Juncturâ cubiti facta fuerit, & simul exciderit cubitus, quamvis is his vel ter à Chirurgis repositus fuerit, attamen semper rursus excidit, & plures lumpus: c dolores per aliquot annos sult nere coacta, tandem per thermas aliquod solamen percepit. Per vim lapsus caput ossis acetabulo suo est excussum, quod tamen nunquam fieri potest, quin ligamenta debeant laxari, quæ sponte sua quandoque iterum contrahuntur, & os suum trahunt extra acetabulum suum. Magnus quoque adeo dolor, quia ligamento fibra, quæ nunc in parte oppositâ, maxime tenditur. Mox abolebitur, quia Os statim in acetabulo suo



luo. *Imperfecta Laxatio* dicitur, cum laxantur tantum tendines membrorum, ita ut in acetabulo suo Os vix contineri possit.

*Nervorum Contusio.*

*Nervorum Contusio*, facilius cognoscitur ex partis motu & sensu imminutus, & prægressa causa quædam ponderosa contundente, & plagâ, ictu, lapsu &c. & inde exorto partis dolore intenso.

*Incurvationum Incurvationis.*

*Incurvationum Incurvationes* & rigor membrorum ex relatione ægri & sensibus ipsis satis innotescunt, oculis enim Incurvationem ac rigorem membrorum percipimus. Incurvatio enim cognoscitur ex membri contorsione & curvaturâ, signis propriis causæ externæ non indigent, utpote in sensu incurrentes, quamvis hoc in palli aliquid lucis concedat dispositio parentum, quatenus elaudicantes à claudicantibus sæpe generari experientia docet, nam partium solidiorum vitiosa constitutio per hereditatem in prolem transfertur, prout videmus etiam à debilibus parentibus generari rachiticos. Coniunctus sæpe est tumor & durities, succedit his curvitas membri, quatenus sc, ligamenta ac tendines ob fibras musculi breviores redditas, adducuntur versus principium, unaque cum iis ossa, quibus inferuntur, retrahuntur. Nec tamen ulcus percipitur dolor, adeo aliquando partis atrophia, sic vocatur artuum contractio sensum facta, unde flexio impeditur, & non nisi cum dolore & vi quædam peragitur, in vicinis partibus fit macies seu atrophia.

*Luxatio.*

*Luxationis* signa Diagnostica sunt communia & propria, quæ ejus causas harumque differentias manifestant. Illa sunt vel mutatio figuræ membri ordinarii, quatenus in parte ejus altera, tumor, circa sinum seu acetabulum fovea appareat, quod oculis discerni licet in tenerioribus ac mollioribus subiectis ac membris; in carnosis verò & crassioribus contractio simul requiritur: vel longitudo membri vitiatæ, quatenus hæc modo deficit; in Luxatione perfectâ & ad superiora contingente modo nimia est, sc. in subluxatione & prolongatione. Dein motus membri læsi hic aboletur in luxatione completa, seu imminuitur quæ depravatur in Subluxatione. Postremo dolor circa juncturam, nisi tendines & ligamenta nimis laxata fuerint, v. gr. in Luxatione à causâ internâ, ab humorum ad ligamenta atque tendines effluxu, & stagnatione circa juncturas, luxationem esse colligitur, 1. Ex succorum evasationum copia. 2. Si Luxatio sensum atque sensum sit, ita ut luxandum membrum per aliquod tempus huc atque illuc motibus inordinatis agatur, vacillet, ac licet reponatur mox iterum procidat. Callum verò subesse judicatur, si membri ante luxatæ restauratio contingat, præsertim in articulari non multâ carne stipatis, ut in cubito, genu &c. Callus autem sicuti modò durior modo mollior est, ita illius signa sunt, quod articularis gracillimus ac sicciſſimus deprehendatur, nec ab ægro, nec ab altantibus violentiori manu moveri queat, extenuatio & gracilitas membri si sit diuturna.

Molliorem è contrâ adhuc significant, si recens fuerit dislocatio, si membrum aliquantum adhuc moveri queat, ad tactum quoque tumor mollior observetur. Denique Tophum subelle, præter signa causarum internarum & calli durioris generaliora suadet dispositio ægri arthritica.

*Ætiologia* 3. 4. *Causes* causam *Simplicis Ligamentorum*

dicitur esse ex cerebro & dorsæ medulla, nervisque & inde exortis, vel in ipsis ligamentis ex nervosis partibus constantibus, idque vel ex interperie quâpiam, vel ex aliquo impactu humore provenire ajunt, potissimum tamen Torpores Ligamentorum & sentientes difficultates ob refrigerationem accidere volunt, Ligamentorumque sensum obstruunt meatus.

*Laxationis seu Resolitionis Ligamentorum Laxationis* causam effectricem deducunt ex crasso, viscoso, frigido, interdum etiam terrestri & Melancholico humore, volunt etiam vitium hoc ex qualitate calida aut sicca proficisci, ubi calida intemperies sanguinem & humores nimium torrefecerit: similiter etiam ob frigidam qualitatem solam vel ab evacuatione nimia Laxationem hanc provenire contendunt.

*Nervorum Contusio* causam dicitur continui Nervorum solutionem à causâ violentâ, à re externâ quâcunque contundente, & dolore in signem inducente, inò sæpe eutem ipsam solveat & exulcerante, abortant.

*Incurvationum Incurvationes* seu Articulorum contractiones ob humorem pituitosum aliumque impactum, aut nervi affectum quempiam in artubus, oboriri dicunt. Inò has contracturas ex ellobori potione sepe contingere, scribunt.

Articulorum Luxationum causas dicunt Veteres vel internas vel externas. Internæ ipsi sunt humores excrementitii, & status: nam humores ligamenta ita humectant & reolvunt, ut articulos continere non possint, status autem distendunt, ut ossa conjuncta divellant; uti sæpe in passione arthritica & ichthiaca apparere dicunt. Externæ causæ sunt casus, ictus &c. Hereditariæ sunt, quæ licet non necessario fiant, sæpe tamen contingere ajunt, ut gibbosi à gibbosis, luxati à luxatis generentur.

§. 5. *Paracelsus* Luxationem stupescitionem dicit, quando ea læsa dormire videntur, ac si formicæ discurrerent in iis. Laxationem vero ligamentorum ait à nullo alio esse quam à deficiente glutinis albi, seu sinoniz, ligamenta nec vasa effluxum non amplius irrigantibus, sed ab aliis humoribus effluxis ea relaxantibus.

*Nervorum Contusio* causas cataracticas habet vel ruptionem, vel casum ab alto, vel plagam à re externa violentè nervos contundente, nam isti de causis non tantum sanguinem extra vasa effundi existimat, in parte dolente colligi, in grumos abire, ac tandem putrefactum, vicinas partes erodere, ac vulnus facere; sed & nervos ita lædi, ut Sinonia vel gluten album evasetur.

*Incurvationum seu articulorum Incurvationis* seu contracturæ causas plures dicit Author: Unam fieri ait ex læsione corporis, & quidem ab externis accidentibus, utpote verberationum, vel focationum ictibus, casu, vel aliis diversimodè, jaculis, telis, bombardis, abstrusionibus, fractionibus &c. quandoque etiam propter constitutionem in carne, quæ nutrimentum impedit, contracturam contingere statuit, vel propter venarum obstructionem, quæ nutrimento suum transitum impediunt, non ut ille amat loqui, per naturam, sed accidentibus extrinsecis: item contracturas oboriri probat ex alteratione pororum & meatuum in arteriis, sæpius etiam illam contingere arguit, ut propter abbreviationem alicujus membri, vel curvæ defectum, quæ

# CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 707

fiat plerumque ex medicamentorum impertinentia) contractura nascatur, quia, juxta ipsum, causa per quam lapsus jam factus fuit, carnes & venas obstruit atque mortificat, ut nervi prorsus in se ipsas deficiant, membroque nullas vires adhibere valeant, unde etiam ipsum defecere cogitur. Aliam contracturam ex calculo vel tartaro procedere scribit: omnes ergo partes quæ à Tartaro vel calculo recipiunt impressiones, tartareasque proprietates, quas retinet, secumque velut ad regiones, ad quas à natura disponitur, ibidem contracturas oboriri contendit. Quod si pauca fuerit hujusmodi substantia, nec in fundamento hærens, & Incurvationem dorsi facit. At si paulo plus fuerit substantia, progreditur ad femora: si plurimum, ad externas corporis partes, infimasque transiens, contrahit omnes, impotentesque reddit. Arenæ lithiasque materiam lapideam esse dicit acerrimæ concretionis & coagulationis: cum igitur venis, juncturis, ossibus, medullis, & carnibus admiscetur, horum naturam immutat nutrimentum, ductus obstruit, venas & medullam ossium frigidat, ut instar acetii coagulati fiant, per acetosam & tartaream hujusmodi frigiditatem prorsus immobilia membra fieri memorat: nec solum propter frigiditatem, sed etiam ob auctam accedentem ipsæ venæ corroduntur.

Contracturarum ex colica origine humorem acetosum esse dicit, quare humoris vis causat ejusmodi attractiones, & postmodum inducit intoriones in membra capitalia, cum concepta humorum pravorum receptione, ibidemque nascentem irritationem hæc similem tandem, donec per eum humor perniciosus ille vitæ penitus absumatur.

Sic quoque contracturas ex cholera ortum suum habere singulari explicat capite. Fieri ergo potest juxta ipsum, ut ex invidia nascantur Incurvationes, & ex istis contracturæ, prout ex cholera proveniunt.

Sic quoque contracturas ab excessivo potu vini tartari provenire scribit explicatque.

Dolor, qui *dislocatio junctura* inest, Author non aliunde provenire scribit, quam ex liquore, qui extra sinus Anatomiæ excessit, & ex acetositatē hanc membri dolores oriuntur. Nam liquores juncturarum ubi corrumpuntur, secundum eum in incendium transeunt. Pariter Anatomiæ corporis pati minime potest absque dolore, membrorum dislocationes, aut lacerationes fieri, quod in sua sanitate rectam dispositionem capiat: ejusque natura talis est, ut prout concatenata, nervis, arteriis, venis &c. juxta hunc ordinem fore manereque velit & debeat, à quo si perturbetur, dolorem concipit illi similem, qui fit ex vulnere, laceratione, vel rupturâ. Quare juncturarum dislocationes optime considerandas esse monet, quod nonnullæ proveniant ex talibus, alique ex dislocationibus Anatomiæ humore acido, veteri crescentia, reliquæ ex Synochia humorum corruptione. Ex quibus omnibus dolores membrorum oriri posse contendit, ariditas postmodum & contracturas.

Spasmi similiumque morborum occasionem esse dicit Fluxum minerale ex arsenico, natura ejus & conditio est excitare humores & calores.

§. 6. Helmentum dicitur eorum esse spiritum, item traduci in sanguinem arterialem, & dare

spiritum vitalem; cujus favore à mente infunditur atque animatus fiat, & hinc demum transferri in sinus sive stomachos cerebri, ibidem variam suscipere characterum determinationem, ita ut motus fiat in spinali medulla, visus in opticis officinis. Qui si aliquo errore ad linguam ducantur, gustui suam plane inutiles. Quapropter fieri, ut non raro partes vel membra *stupefiant*, ut in nostro affectu, in quo pars aliqua mobilis, vel sensum, vel motum, relicto sensu amittit, causam esse hujus Stuporis, eò quod alieno spiritu & devio, partes irrorentur, sunt nampe juxta eum tactum auctoribus motui impares & vicissim. Stupefactum membrum sensum redeuntem fieri quasi utillando scribit.

Ligamentorum verò Laxationem dicit esse à Ligamentorum copia laticis ligamenta nimium relaxant.

Nervorum Contusionis causam esse dicit injuriam quandam externam nec vos contudentem: juxta ipsum nervus est organum delatium, imperii arbitralis, intus nervum dicit esse medullarem, extra verò tegi membranâ scâ, qui etiam motum ad musculum deferat, quociens ergo illis accidit injuria, vel contunduntur vel etiam contrahuntur.

Incurvationes seu Contracturas Juncturarum Incurvationis seu Contracturas Author esse dicit à convulsivis motibus juncturas contrahentibus. In unoquoque dolore contracturam observasse scribit.

Luxationis causam eandem agnoscit cum Luxationis reliquis Authoribus jam dictis, & modo dicendis.

§. 7. Willisus statuit, Fibram musculi *Incurvationis seu Contracturas* compagem constituent unum motum & sensum à *stipulum causâ* spiritibus animalibus vel influentibus vel insitis pendere, ad idem opus peragendum magnopere non currentibus & liquore nervo & latice sanguineo. Dum enim liber est spirituum animalium per nervos in fibras tendinosas commicatus, liquor nervus in debita crasi perseverat, & sanguis absque ullo impedimento in musculo circulat, tendinesque ligamenta acutissimo sensu gaudent, & ad omnes motus promptissimi exercendos parati existunt. Si vero ex fibris tendinosi aliquales spirituum animalium irradiatione propter compressionem vel obstructionem, aut in ipsis aut in fibris nervis contingente orbentur, vel liquor nervus degener existeris spiritibus rapide convellendis amplius non sit idoneum vehiculum, aut sanguinem tum ob crassitatem, tum ob vicinitatem tardius circulante, vel à compressione aut obstructione valorum sanguinorum præpedita ejus in musculo circulatione, levius tantummodo aducentur spiritus animales in fibris tendinosis; ligamentorum motus & sensus hebetiores fiunt; spiritibus nec motus nec copia sufficientibus tum fibris tendinosis distendendis & contrahendis, tum impressionibus in ligamento susceptis, undulationibus suis ad sensorium commune deferendis, unde Author *ligamentorum stuporem* deducit.

Laxationem verò Ligamentorum orti vult à Laxatione fibrarum nervearum in ejusdem musculi ligamentum tendentium obstructione, vel compressione, aut continui solutione. Fibre itaque ligamenti spirituum afflatu amplius non extenst, collabuntur & concidunt, & contractioni penitus inhabiles fiunt. Si vero aliter succint, spirituum penuligamento communicare nequeunt.

Uuuu a

vint. Sed præter jam enumeratas causas, particulares quasdam narcoticas spirituum extinguias eundem effectum producere posse affirmat, quæ si potentiores fuerint, sine magnarum obstructione ligamentum laxare valent, in nervis ductibus quosdam spirituum manipulos deiciendo, vel à motu supprimendo.

**Nervorum Contusio.** *Nervorum Contusionem* Author adscribit gravi cuidam instrumento violentè parti alicui applicato, & vim suam ad nervum usque parti insertum exercenti, fibrasque ipsius propius ad se invicem admoventi, spirituumque animalium & humoris nervosi per canalem ejus liberum influxum prohibenti.

**Juncturarum Incurvationis** causam reputat Author non solum pendere ab irritatione musculi antagonistæ, in cujusdam articulationis interiori parte positi, verum etiam & præsertim à copula explosivâ & nimis elasticâ spiritibus animalibus adjunctâ, cum liquore nervo à Cerebro descendente, & per nervos in musculos delatâ, & in eorum tendines transeunte. Fatur tamen extraneas istas particulas, nullamque enim spiritibus animalibus proportionem servantes, in nervos sese insinuare possent per eorum fines, & musculi, quem ipsi subingrediantur, contractionem hoc pacto inferre posse, indesinenti autem contingente hujusce materiæ heterogeneæ & spirituum collisione, violentæ ac continuæ eduntur explosiones, spiritusque tanquam cætro perciti vehementer exiliunt, fibrasque ipsos continentes instant atque extendunt. Fibræ enim hæc ratione in latitudine sua auctæ, in longitudine sua imminuuntur, partemque musculo, quem component, appensam ad se retrahunt, ejusque *Incurvationem* inducunt; Talis verò periclit Juncturæ Incurvatio, donec materia illa explosivâ à genere nervoso deturbata fuerit, succusque spirituum irriguus ab ipsa fuerit repurgatus.

**Juncturarum Luxatio.** *Juncturarum Luxatio* statuitur Author vel ab externis vel internis causis, externæ sunt motus cujusdam partis violentiores, ejusdem contusiones, casus, ictus, contusiones &c. ad internas verò causas refert succi nervi varia vitia; quando scilicet liquor iste partibus spermaticis nutriendis viscidior existens, in terrestribusque particulis abundans, fibras cartilaginis cavitatem ossis caput expipientem obducens, quas subingreditur, transcurrere nequit, in iis remoratur, & congeritur. Fibræ verò illius aggestione inflatæ, ampliusque spatium occupantes, ossis caput à receptaculo suo tandem eiciunt: humor quoque nervæ copiosioribus particulis aqueis dilutus, & in ligamentorum fibras delatus, earumque fibras adimplens, ipsas laxiores efficit, & ossi in proprio situ continendo illas inhabiles reddit.

**Secundum** *Sylviu* Ligamentorum stuporem deducit à defectu spirituum animalium & eorum denegato totali influxu, male affectis depravatoque censet spiritus animales, quando 1. nimium torpidi agitatione sunt, aut etiam perpetam moti: quando 2. impuri sunt & à re quavis præter naturam ipsis admixta inquinati. Animalium spirituum Torporem, vel agitationem nimiam, motumve inordinatum observari facillime ait Author in animali motu tunc simul læso. Torpidos & ad motum ineptos esse Animales spiritus censet ob vim Narcoticam ipsis admixtam, vel in

corpore paulatim productam, vel forinsecus introductam, nunc ex aëre inspirato, & carbonum fumo inquinato, nunc ab alimentis medicamentosis, potu generoso præsertim, ac inebriante, ipsisque medicamentis, opio puta, omnibusque opiatis perpetam, h. e. immo diu cuiusvis respectu assumptis, vel Ligamentis applicatis, hinc ipsorum sæpius oboriri scribit *Ligamentorum stuporem*.

In *Laxatione Ligamentorum* author culpæ humores pituitosos & aquosos circa ligamenta hærentes, ipsorum tunicas, membranasve hinc & Medullam humectantes, ac forsan catenus laxantes, ut ipsæ per vitibulentiam collabens Tubulos suos transmittendis Animalibus spiritibus ineptos reddat, evincere videtur Laxatio Ligamentorum à pluvia frigidiore, post vestes inde madentes partem hanc aut illam afficiente orta, ut nunc vel hæc vel illa vel plures partes motum ac sensum plus minus amittant.

**Nervorum Contusio.** *Nervorum Contusio* Author fieri ait à causa externâ, ictu, lapu &c. nervos contundente, unde spiritibus animalibus denegatur totalis influxus, hinc necessario in parte affectâ sensum ac motum imminui statuit aliquando cum aliquo partis Stupore ac Torpore.

**Juncturarum Incurvationem** dicit oriri vel à Ligamentorum obstructione, à materia viscidâ tenacique, vel ab eorumdem læsione violenta, spirituumque animalium influxu denegato.

Sicut Ossium vel Juncturarum extraordinario mutatum Author dicit esse *Luxationem* vel *Subluxationem*, prout vitum fuerit gravius vel levius. Juxta ipsum fit Luxatio, quando partes duæ pluresve solidæ, duræque, ossa puta, sibi mutuo adaptantur, ut alii functioni, motui nempe interserviant, uti fieri affert in Ossium articulatione, dicuntur ab ipso ita sitæ, hicque ipsarum esse situs, quem quoties mutant, dicit Ossa luxari ac dislocari, patique morbum in situ, quoniam functionem, motum partibus lædunt.

**§. 9.** Cartilagini causam *Stuporis Ligamentorum* deducunt ab ipsorum obstructione, non enim dubitant illa usum eundem ac nervos præstare, obstrui verò Ligamenta posse concedunt vel à causa externa premente vel contundente, vel à ligatura forti, vel à tumore vel ab onere incumbente, idem à succis nimis crassis viscidis ac tenacibus, spiritibus animalibus transitum denegantibus, quibus partes destitutæ necessarii stupere debent. A defectu spirituum animalium à magnis morbis defunctis oborto, hunc affectum sæpe obvenisse notant prædicti.

**Cartilagini** lymphæ copiosioris circa ligamenta stagnationem causam pronunciant eorum *Laxationem*, quatenus fibrosa substantia ab ea nimium distendatur, hæcque ita distensa & relaxata lapsum quandam mentitur. Nec quoque vim violentam excludunt, à quâ sæpe ligamenta ita distenduntur & relaxantur, ut elabi debeant, nullumque amplius robur relinquatur Ligamentis.

**Nervorum Contusio** vel ictu, vel casu à re quadam externâ durâ & obrusâ exciari statuitur, unde cute non soluta, non tantum venulæ vel arteriolæ conqussatione dilaceratæ sanguinem, sed & ipsi nervi confusi aliquando succum nervum profundum, qui succi extravasati, nec in debitas vias regressientes cutem extollunt, & promajori vel minori sui corruptione filamenta membranæ, & nervulos plus minus exagitan-  
vel

# CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 709

vel vehementiorem vel remissiorem causant dolorem.

*Juncturarum Incurvationem* esse vel abortu, vel à causâ internâ vel externâ statuunt, internam esse vel contractionem ligamentorum à succis acidis, vel accidit Incurvatio ob Luxationem, Fracturam, vel ob humoris serosi copiosam in juncturâ quadam collectionem & stagnationem, subsequenter tumorem durum ac sæpe dolorem. Sic quoque Juncturarum articuli sæpe quasi ligantur & immobiles redduntur, debili existente succo nervo spirituofo, & imprimis à stagnatione & coagulatione humorum ab acido. Vel etiam fieri posse contendunt hanc Incurvationem, à motibus convulsivis & paralytici, motui quaruuncunque partium maximè contrariis.

*Luxationem* sæpius contingere nôrunt ab ingressu infelicitèr peracto, aut re violentâ obveniente, lapsu, concussione & interdum, quamvis rarior, à musculorum debilitate, ob spirituum animalium parciorem influxum, quo fieri solet, ut musculorum fibræ non sufficienter tendantur, sed flaccescentes ab levi quacunque causâ articuli protuberantes pristino suo loco excidere possint. Sed ut plurimum Dislocationes seu Luxationes oboriri solent à casu, ictu, saltatione, cursu, extensione violentâ Juncturarum. Vel ab internis causis, si sc. humores in Juncturis evasantur, ibidemque distillant, tandem Subluxationem efficiunt.

§. 10. Restat ut & nostra nunc addatur Crisis. Nos verò medio tutissimè inter prædictas opiniones ibimus. Verissimum est, quod *Suporis Ligamentorum Causa* plures esse possint; Est verò ut plurimum ab eo, quando scilicet nervi premuntur, ut liquor nervus per suos tubulos liberè perfluere nequeat, sive viæ præcludantur à succis coagulatis ibidem latentibus, vel à tumore vel callo ipsos comprimentibus, vel à fortiori ligaturâ à quæ causâ violentiori graviter premente. Hic enim notandum velini de Ligamentis, quòd non sunt tantum partes simplices ut Veteres existimant, nec duntaxat Ossâ colligant, sed, me judice, ligamenta præstant usum tendinum ac nervorum, & plus ad motum quàm muscoli contribuunt, quia ceu dictum, ex fibrillis constati sunt, qui pro succo spiritus animales vehunt. Et cum in Stupore obstructio non adeo sit vehemens, ac impacta, ut omnes fibræ tendinosæ constipate fuerint, sed nonnulli spiritus adhuc transcant, si enim totalis obstructio fuerit, partis etiam totalis mortificatio seu paralytis oboritur. Præter has causas adhuc alie adduntur, nempe tumores, polypi, hydropes particulares, succi extravasati, unde canaliculi & fibrillæ tendinosæ comprimuntur, ut spiritus eas perfluere nequeant, item læsiones ex Vulneribus, casus ab alto, similiaque, quibus fibrosa Machina quoad partem quandam articuli læditur: quod etiam fieri potest à quocunque liquoris nervi defectu abortu: quemadmodum enim obstructio in cerebro Apoplexia dicitur, sic & in nervis facta obstructio, & quidem extra crania menia, Paralytis vocatur, quâ impeditur, ne ad hanc vel illam partem spiritus vel succi moventes transcant, hinc vel in uno latere existit, vel ambo latera medullæ spinalis obstructa sunt, & tunc Paralytis universalis dicitur. Ita quoque particularis dici potest, cum

brachium, crus &c. moveri vel officio Funghi non possit: sic quoque quodam ligamento fibræ obstructæ sunt, non in totum, sed quoad partem hanc oritur Stupor. Statuimus enim esse interceptas non in totum sed quoad partem vias, hæc autem viarum interceptio vel oritur à compressione, ceu dictum, vel obstructione, vel in spirituum depravato influxu & quasi narcosi. In prima à succis in vasis, aut extra eadem existente tumore, vel luxatis membris fieri potest. In altera à succis crassis ac viscidis intra eadem vasa. In hac à fumis narcoticis variorum, vel simplicium vel compositorum, vel à spirituum animalium consumptione nimia, à quacunque causâ etiam facta fuerit. Compressionis itaque causæ quandoque erunt succi crassi, viscosi, in vasis vel extra eadem, in juncturis circa ligamenta, & in eorum poris collecti, neque per emunctoria expurgati, vel unico momento elapsi, sive crassi sanguinei sive phlegmatici fuerint, quorum singulorum moles porosam fibrosam tendinosam substantiam vel sensim comprimendo *Stuporem* hunc inferre apta nata sunt: Tumor quoque adjacens *Stuporem* hunc inducere potest, ceu bigam exemplorum novimus.

Sic etiam ab ictu, casu, percussione aut alligione ad corpus durum ligamenta hæc comprimi possunt, ut spiritibus animalibus transitus denegetur. Obstructionem etiam in nostro affectu producent vel sanguis, vel lymphæ, sanguis potissimum in crus, quando scilicet sub forma sanguinis in ligamentorum substantiâ porosâ extra vasa effusus poros ibidem occupando, tales obstructions inferre valens; hujus autem sanguinis effusionis causæ internæ, (procatarticas enim negligimus,) possunt esse vel tenuitas, vel illius motus & volatilitas, aut acredo. Effusio autem jam sanguine fluida & volatilis avolant, & dissunt, unde à tergo grumosa terre tremque sui portionem relinquunt, hujus Affectus sæpe Fabrum.

Serum quoque subviscidum & lentum, quod eodem modo extra vasa ibidem locorum depositum, relicta sua viscidiorè & lentâ portione, tantas clades introducit, & hinc sæpius catharrhis, imo iis, qui ad Apoplexiam inclinant, hic Affectus solennis esse solet. Sæpe & vidimus hunc Affectum à puncturâ nervi, vel alicujus membranae, ceu in V.S. male à Chirurgo institutâ, obortum. Idem præstare poterit spirituum animalium influxus denegatus, atque inde emergens ligamentorum ac tendinum laxitas, prout observavimus sæpius in Paralyticis, & ob sanguinis & succorum effectum indolem in scorbuticis ac Cachecticis observatur Stupor.

*Ligamentorum Laxatio* fit, me judice, item à causa violenta externa, vel à lapsu, extensione nimia, per vim enim lapsus & duricem lapidum substratorum caput ossis alienus articuli acetabulo suo excidit, quo vix fieri potest, quin ligamenta laxentur, inde oritur aliquando luxatio & articulus, imprimis si semar laxetur, fit brevior, & interim ligamenta, quæ sunt in parte oppositâ magis tenduntur, quam solent ordinario, hinc intensus oritur dolor, atque perfecta vocatur luxatio. In imperfecta luxatione laxantur tantum tendines, membranae, ita ut acetabulo suo os articuli contineri vix possit. Laxatio Ligamentorum etiam fieri potest à laxitate

Uuuu j poro-

Tumetur  
funt in  
supra  
u.

Nostre  
sententia  
de causis  
Ligamen-  
torum Stup-  
oris.

Ligamen-  
torum Lax-  
ationis.

pororum, à colluvie serosa productâ, prout sæpe observavimus in catarrhis, vel à fibrillarum tendinosarum ac ligamentosarum disruptione & nimia extensione, ut luxatione artuum fibræ tendinosæ vix abbreviari possint, ut ut elongatæ, sic & oritur à nimia in istis fibris existente spirituum animalium copia, quoniam horum virtus à robore clateris fibrarum augetur.

*Contusio  
nisi Nervorum.*

Diximus superius de parte affectâ, quod nervi nihil aliud sint quàm congeries innumerabilium filamentorum ceterum, quorum multa, non tamen omnia ortum suum habent à superficie concavâ ventriculorum cerebri. Spiritus animales continuè ex ventriculis cerebri inmediate per poros concavitate ventriculorum sive tubulorum, nervorum initium in omnes nervos insiliunt & omnes tubulos impleunt, tum fibrillas omnes nervosas à se invicem separant, & singulas fibrillas in spiritibus innatare faciunt, & in hoc consistit nervorum tensio, flaccidi sunt, cum spiritus non insiliunt in nervorum tubulos, quare omnes subsident & supra se invicem collabuntur fibræ. Contusio ergo nervorum oritur ut plurimum à causâ violentâ externâ, lapsu, ictu, plagâ &c. hinc contusi nervi spiritus animales admittere nequeunt, sic partis interitus imminet. Et cum nervi ex plurimis fibris consistant, hinc plures sæpe contunduntur, salvis relictis & aliis sufficientibus pro motu partis.

*luxationem  
tum In-  
ternam  
tum.*

*Juncturarum Incurvationis causa* possunt esse internæ & externæ; internæ sunt variae, & quidem vel abortu tales prodeunt, vel à succis effusis, vel à contractionibus Ligamentorum ac tendinum ab internis causis exortis, prout videmus in Affectu isto Anglicis puerorum, ab illis Rachitidis nomine insignito, ceteri nobis Germanis itidem satis familiari, cujus Affectus causas deduximus in *Encyclop. Medica de morbis Infantum, capite de Rachitide*. A causâ violentiori quâcunque, itidem influxu spirituum animalium denegato hic Affectus oboriri potest. Sic quoque causâ externâ cum interna concurrat, unde etiam est, quod tenellorum puerorum ossa frequentius & à causâ externa leviori membrorum Constrictiones patiuntur, cò quòd eorum articuli imperfectiores & molliores adhuc sint. Confer *Volch. Confer. de Ossibus Infantum l. 1.*

Dum autem succi abundant & evalantur, spatia & poros fibrarum distendendo contractionem hanc artuum inferunt, imprimis si sint vel succi vel spiritus animales crassitie & tartaro secti, hi enim à motum & circulationem minus sunt apti, unde in musculorum spatiis stagnant, accedente frigore vel calore nimio volatili indurantur, unde topi Podagricorum sæpissime produciunt contractionem. Possimus enim huc referre vapores raritate conspicuos, viscidis & acidis inter se non rite effervescantibus, qui distendendo effectum hunc sinistram aliquando inducunt. Atro quoque notanda sunt carbone salia succis nostris immerita tartarea, austera, acida, tanquam summè nociva. Tanta enim à natura inter acidum, partes solidas, & succos nostros, ut quamprimum istud augmentum capiat, centena præsto sunt mala, tum omnium quidem parvum, tum incipiens nervosarum fibrillarum. Acida enim ut & frigida sicut seu coagulant spiritus fluidissimos, nervos ac membranas stringunt, crispant, hinc non mirum est, *juncturas* ob partes nervosas & mem-

branosas ab iisdem tam sinistram inferre effectum. Motu tandem & quiete etiam peccant succi; isto quidem, quatenus copiose ad has partes deportantur & emassant, sive in ipsâ lætâ parte colligantur, sive à massa sanguinea per vasa istuc ferantur, unde succedet quoque quies sive stagnatio, dum enim succi ob spissitudinem per poros expelli nequeunt, stagnat ibidem & parvulus molesta fit. Multum hic facit dispositio hæreditaria, hæc enim sæpius in gnatis arthritidem scorbutumque frequentes sc. contractionis causas, producere apta est. Inter remotiores causas referri possunt aer tam calidus quàm frigidus, uterque tamen in excessu peccans. De quibus, ut & de cibis videatur *Diat.* Sunt nonnulli qui inter causas referunt fascinum, venena ac phluta. Contractionem à Mercurio præposterè usurpato, non ita pridem in cive observavimus. A Luxatione & fracturis, ulceribus & vulneribus Juncturarum, si non rite curentur, imprimis non rectè deligentur, non raro perfectam contractionem oriri quis negabit? in utrisque enim est disorlio, & in priori quidem, si ad latus aliquid hæret tractio & abbreviatio musculorum, quæ in causâ est, cur ad membra hoc modo affecta restituta sit necessaria quam maximè extensio & deligatur partis.

Contractione alia est universalis, qualem vidimus in duobus Baronibus Thernis Emblematis utentibus, qui rigidi & ita contracti erant, ut nisi à famulis portati non moverentur. Alia verò est particularis, quæ accidit in artuum horum vel illorum juncturis, pedibus, brachio &c. imò ipso quandoque dorso, quod contortum vidit *Tænerus* in mercatore quodam. Alia est connata, *Platerus* enim se vidisse ait quosdam rigido dorso vel inflexo alisque partibus contractionis natos. Hic Castellis est puer & annorum è Galliâ profugus, laborans spinâ ventosa, ubi manus, digiti & semur sunt tumida, imò ipsa spina dorsi plane contorta est, & sic cum ventum tumido contortus incedit, & munia quædam peragit. Ratione morborum affinium differt contractura à convulsione, quod hæc non tam diu duret, sed citò terminetur, ista sit constans ad multos annos, imò usque ad mortem perdurans, & quidem sine dolore, hæc verò summo cum dolore. Convenit contractura cum Paralysis in genere, quod in utraque sit impotentia motus, differt tamen, quod Paralysis à resolutione, Contractura verò à contractione, unde & nomen habet, oriatur.

*Luxationem* causæ itidem vel internæ vel externæ sunt: Internæ præter conformationem ossium, ligamentorum & musculorum vitiosam, (quemadmodum latius ossis innominati acetabulum, & exilius ossis femoris caput Luxationi incurabili occasione dedisse *Kerkringius* Spicilieg. Observat. 61. tradit.) sunt succi imprimis lymphatici extravasati, & in juncturis decumbentes, qui vel ligamenta interiora atque exteriora laxantes, ut horum tono vitato firmiter talis contineri nequeat, vel eosdem musculos & ligamenta externa contrahentes, ut hæc abbreviata, illa è sedibus quas protrahant. Illius generis humores, hincque emergentes Luxationes observavimus in hydropicis, catarrhosis, &c. quæ verò ex musculorum & ligamentorum contractione violenta ore accidunt, convulsivos



fivos præcipue artuum motus pro causa agnoscunt. Imò iidem succi intra articulos congesti & stagnantes, mole & pondere suo ossa extra sedes deturbant, præprimis, si coagulentur, & in tophum abeant, exempli grat. in arthriticis, quod etiam referri debent calli in acetabulis dictis, post tardiore ossium luxatorum repositionem producti: confer *Sculteti Armament. Chirurg. Part. 1. Tabul. 56.* Dein Luxationem inferre potest spirituum animalium influxus denegatus, atque inde emergens ligamentorum ac tendinum laxitas, quemadmodum in paralyticis quotidiana confirmat experientia. Externæ causæ sunt tria violenta, quæ machinæ ac imprimis ejus artubus accidere possunt, scil. extensio, lapsus, ictus &c. ita ut horum vis fortis quoque intra uterum adhuc latitanti Luxationem inferat, prout nuper in puella recens enixa luxationem vidimus, imò in proprio filio meo Johanne Daniele, qui cum luxato pede in lucem prodiiit, tempore enim gravidationis uxor mea *Charissima Susanna*, nata Svvert Hanovienfis, in terram ruebat, remanente pede in scala, & sic eodem modo prodibat infans, qui tamen facile curabatur.

Dislocatio juncturarum sex complectitur differentias, à loco, in quem os prolabitur, petitas, nempe ad inferiora, superiora, dextrorsum, sinisterorsum, in anticum & posticam partem; quamvis paucissimæ articulationes has differentias cunctas sustineant. Dum verb. gratia, maxilla inferior aut osium saltem in adultis luxatur, os femoris ad interiora, exteriora atque anteriora, rarius ad posteriora: Os humeri rarissime fursum aut extorsum, frequenter deorsum seu intro osium luxatur.

*Prognosis.*

§. 11. Pulchrum & ex Medici dignitate est, mortem ipsam aut vehementes dolores prædicere. *Stupor* ergo *Ligamentorum* est malum non contemnendum, hinc ei propediem auxilium afferendum est, alias desinet in perfectam Paralytin, vel Gangrænam ac Sphacelum, imò nunquam excipit Stuporem hunc ligamentorum aridura seu maciæ, omnes enim affectus nervosorum ac tendinosorum partium, imprimis eorum obstructions sunt periculosissimæ. Prodromus quandoque est Apoplexia.

*Laxatio Ligamentorum* est affectus curatu difficilis, & sæpe post se relinquit Paralytin ac debilitatem partis, faciliè etiam malum hoc erudescere solet; semel enim relaxatæ istæ fibræ, facillimè iterum relaxantur.

*Nervosorum Contusio* est affectus periculosissimæ ac ææ, quam facili morte excipit partis Necrosis aut Paralytis aut Stupor, imò inde etiam possunt prodici deliria, febres, tumores, inflammationes & convulsiones, quæ symptomata sæpe excipit mors truculenta, seu id aliquoties observavimus; quare hujusmodi contusiones non parvi faciendæ sunt, sed statim appropriatis remediis obviandum eundem. Nervus enim est pars nobilissima.

Quod signa *Prognostica juncturarum Incurvationis* attinet, omnes confitentur uno ore Præctici esse morbum chronicum, hinc magis molestum, quam periculolum, quia nullis partibus nobilioribus aut ad vitam necessitiis accidit, quod tamen, me iudice, experientie ac rationi contrariatur; nervi enim, tendines & ligamenta partes nobiliores, nobilissimum enim

vehunt succum vitæ nostræ maximè necessarium. Non negamus tamen affectum hunc esse affectum chronicum. Imminuens verò malum facilius curari posse, quam inveteratum diuque affligens, quis negabit? præsertim in junioribus. Incurabile verò habetur jam confirmatum ac tophaceum. Incurvatio quæ cum ligamentorum contractione est, difficillimè sanatur. Nisi enim primis hujus morbi principiis obviam eatur, chronicus fit, & plerumque commotior, eoque molestior & committatione dignior, quo non apprehensorios modò, sed etiam progressorios artus occupare solet, atque sic ineptos ad agendum & ad eundem reddidit. Podagram scilicet, illiusmodi contractura artuum sequitur, si imprimis ab intemptiva topicorum applicatione materia figatur & in tophos coaguletur. Post coxendicum dolorem contracturam observavimus, ut & sæpe post hemiplexiam, prout jam pueri 4. annorum crus dextrum ipsius contractum est, cui medicinam facinus. Sic quoque tumor durus, scirrholus, item vulnera juncturarum, & ulcera ejusmodi contracturam inferre possent, Praxis quotidiana docet. Quam contracturam etiam non ita pridem à lue venerea obortam notavimus.

Quod *Prognosis Luxationum* attinet, sciendum, nullam harum per se esse lethalem, nisi capitis & vertebrarum spinæ, præprimis superiorum, luxationem excipias, utpote quam necessarii spinalis medullæ circa suum principium compressio, hinc ad partes inferiores spirituum animalium influxus denegatus excipit. Specialiorem verò *Prognosis*, & quæ curam faciliorem luxationum aut difficiliorem promittit, suppetenda forma, & conditio Luxationis. Difficilius curatur Luxatio perfecta, quam imperfecta, ratione causæ, quæ si fuerit externa, faciliorem pollicetur curam, quam interna conditio subiecti, quatenus in corporibus puerorum & adolescentium, alias mollioribus, Ossia laxata facilius equidem restituntur, non tamen adeò firmiter retinentur, cujus contrarium in adultis & solidioribus subiectis contingat. Sic quoque tempus observandum est, cujus ratione Luxatio recens cum minore inveterata, cum majore labore curatur. Dein ad Symptomata respiciendum est, quæ quo plura & vehementiora, eo magis curationi obstreperunt, quo pauciora & mitiora, eo feliciorem promittunt restitutionem: hinc v. gr. Luxationes, in quibus Ossium supercilia franguntur, pessimæ sunt, eadem articulus restitutus non firmiter satis retineatur; pariter quibus Luxationibus dolor vehemens, Inflammatio, fractura aut vulnus combinatur, curatu sunt difficiles, eo quod sine Convulsionum periculo restitui nequeant. Tandem membrum luxatum considerandum, quatenus v. gr. Luxatio vertebrarum dorsii, potissimum ad interiora, difficilius curatur, difficilius quoque reponitur Os femoris, (Confer *Ephem. Germ. Ann. 8. Obs. 24. & Aët. Hæst. Volum. 1. Obs. 37.*) quam humeri. In Luxatione imperfecta curatio quoque solet esse difficilis, quates per longum tempus jam confirmatam ineipit habere longitudinem extraordinariam.

§. 12. Investigata igitur & cognita morbi conditione, curationi jam studendum est, & quidem primò *Diatæ* Eligatur ergo ver temperata, nocet enim frigidus, autumnalis ac austrius, dum

dum succorum transpirationem insensibilem in his affectibus valde necessariam impedit. facitque ut nulla excrementitia particulæ in corpore accumulatz ac congestæ effluant, quæ reliquæ magnum inferre possunt damnum. Omnia quoque acida fâlsâ & frigida abroganda sunt, imprimis potus acidus nocet, quæ omnia stagnationem augere, ac ligamentis, nervis ac juncturis incommodum afferre queunt. Sint ergo alimenta boni succi, in specie verò observatum fuit, electionem alimenterum glutinosorum & siccorum in tempore consolidationem promoville, humidorum impedivisse. Potus sit calidus, imprimis Theræ & Coffæ, vel chamædrys, salvis, rorismarini, sed ne quid nimis, nimia enim repletio semper nocet. Ninium motum seu exercitium vehementius detrimentum attulisse hactenus observavimus. Somnus & Vigiliæ sint ordinariæ. Dein alvus aperta semper est asservanda, sic quoque cum aliis excernendis faciendum, restagnantes etiam succi ex morâ dum non amplius cum sanguine circulantur, & spiritibus de novo sæpius imbuntur, & sublimantur, acorem contrahunt, coagulationem subeunt, & sic magnam noxam inferre valent. Animi inter Pathemata, Ira Veneri & Baccho nupta, articulis laborantibus infesta esse solet, dum genus nervosum & articulos valde debilitat, spiritusque absumit. Cæteri animi affectus, mæror ac solitudines hîc affectibus ansam dare possunt, quare summopere vitanda sunt, & potius gaudii aliusque exhilarationibus animus recreandus est.

*Cura  
pharma-  
ceutica.  
Galenicu-  
rum in Li-  
gamentu-  
rum Sin-  
gula.*

§. 13. *Galenicæ ad Curam* horum Affectuum accedentes, attendere jubent causas, à quibus producti fuerit, hinc Suporem seu Torporem Ligamentorum amoliri student, refrigerata excalefaciendo, humoresque extenuando, tum meatus deobstruantibus ac rarefacientibus medicamentis laxando, hoc enim loco commodum imprimis ac attenuantem victum suadent. Prodest, inquit *Celsus*, torpentis membri summam cutem exasperasse, vel urticis casam, vel imposta sinapi, sic ut ubi rubere coeperit corpus, hæc removeantur. Scyllam quoque contritam bulbosque contritos Veteres imponunt. Resinâ quoque cutem tertio die diutius vellunt, pluribus etiam locis, aliquando sine furo cucurbitulas admovent. Unctioni verò aptissimum dicunt esse vetus oleum vel nitrum aceto & oleo admixtum: quietiam fovere jubent aquâ calidâ marinâ, vel si ea non adest, fâlsâ: Thermas & Balnea hoc in affectu magni pendunt.

*In Liga-  
mentorum  
Laxatio-  
ne.*

In *Laxatione Ligamentorum* Altringentia ad Laxantia admiscunt, & frictionem instituant. Laxatis Ligamentis adhibent oleum cum momento nitri & facis vini usque tritæ. Perfundunt quoque membra luxata aquâ calidâ & maximè marinâ, in quâ codæ sunt Lauri bacæ aut viticis germina, aut sampuchus, &c. Rubificationes autem his maximè convenire ajunt, proinde cadunt etiam partes ferulæ, aut urticæ ramusculis, si verò permaneat resolutio seu Luxatio, dropacem imponere mandant. Omnia etiam corroborantia applicari volunt, humorem quoque peccantem evacuant per appropriatam, deinde dant Hieram addita Castorei portione, initio factâ à dimidiâ drachmâ cum fauco melle & aquâ calidâ dissolutam, aut per se, aut pipæris scrupulo dimidio addi-

to: deinde quatuor diebus interpositis exhibent drachmam perfectam, & postea sesquidrachmam, deinde duas treves. Ipsi autem Ligamentis luxatis imponunt medicamenta quædam altringentia, adjectis castoreo, aut pipere, aut pyrethro, aut rorismarini semine. Ad hæc commendant irrigationes ex oleo rutæ, co, aut Sicyonio, aut veteri. Cucurbitas quoque aliquando Ligamentis resolutis apponunt. Alvum quoque subducunt per aloën, aut polypodium, aut scammonium, aut per pulvem ex colocynthide. Instituunt quoque pingues illitiones ex oleo vetusto, in quo scylla invectatur ad dies quadraginta ad Solem. Portiones ex castoreo, item ex Sagapeno pilulas formatas sæpius exhibent. Utuntur etiam acopis calefacientibus, & pituitam per Os detrahentibus. Balneum quoque suadent & post id dropacem: postmodum cataplasmata ex sinapi apponunt, si sc, sensus ac motus perierit. Luxatos articulos contrahere ac firmare ajunt acaciæ succum aquâ dilutum ac assusum, & spinæ Ægyptiæ fructum, rubi item ac myrti, & malicorii, ac foliorum quercus decoctum, & myrteum ac lentiscinum oleum assidue illitum, & malicorium coctum, & cerato myrteo exceptum, aut per se vino coctum tritum ac impositum.

*Nervorum Contusionem* à causâ violentâ quâcunque, vel à lapsu, vel plaga, vel ictu, factam curare satagunt, imprimis si cutis simul contusa fuerit & ulcerata, per farinam fabaceam cum aceto mulso, aut ervi farinam cum sapâ, & modico aceto, applicata, ambas enim dicunt efficaces. Quod si cum contusione dolor adsit, picem liquidam ad fabacæ farinæ Cataplasma addunt, & simul costâ calidâ adhibent. Si verò majori resuscitatione opus esse considerant, tunc pariem mensuram farinæ ervi admiscunt, itaque Iridem Illyricam, si adhuc fortius resuscitare volunt. At si nervus fuerit contusus citra manifestam cutis Contusionem, oleo calido disculso, anethino aut rutaceo locum assidue perfundunt, & lanâ oleo imbuta adhibent; Porro si totus nervus fuerit discessus, nullum quidem periculum imminere dicunt, verum partem mutilam fieri putant, præsertim si nervus discessus magnus fuerit.

*Juncturarum Incurvationes* curari posse promittunt medicamentis laxante, mollientique vi præditis; Ad has convulsorias contractiones, oleo imbuta lintea calida parti affectæ circumdant, & cerata liquida, quæ & Castorei & Sicyonii quid habeant. Ante hæc quoque artus calidâ aquâ perfundunt, item balnea commendant vel naturalia vel artificialia.

*Articulorum Luxationum* curatione quinque scopos Veteres observant: 1. tenendo, 2. trahendo, seu extendendo: 3. impellendo: 4. in debitâ figurâ & situ collocando: 5. Symptomata supervenientia corrigendo. Ad primum scopum quod spectat, quem tenendo assequuntur, ille fit, juxta Veteres, vel in toto corpore, vel in parte; totum corpus valido ministri amplexu firmant, ubi humerus, aut vertebæ, aut femur luxatum est: si verò pars aliqua sit reponenda, utpote cubitus, manus, genu, pes aut crus, partem manu tenere solent. Firmandum ergo esse membrum luxatum fixissimè, ne trahentem aut extendentem sequatur. Secundum scopum perficiunt trahendo, seu extendendo variè,

pro

# CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 713

pro vario musculorum Ossium, aut ligamentorum robore, & in hanc aut illam partem luxatione. Quod si ad hoc manus non sufficiat, in usum ducunt varia organa ac machinas à Galeno aliisque depictas. Nec magis extendendum esse membrum inculcant, nisi quantum Os è directo sui loci naturalis retractum fuerit. Hoc ubi consecuti fuerint, tertium scopum observant, nempe ossis dislocati Caput in suam solem modeste impellendo. Signa autem ossis repositi sunt strepitus quidam, seu sonus, qui percipitur, deinde conveniens figura, magnitudo, & doloris remissio. Hoc factò quantum adimplent scopum, ut Os, postquam repositum est, in suo sinu contineatur, ne amplius resiliat: ad hoc instituunt ligaturas artificiosas cum stupis & splenis, in oxyrhodino maceratis, & convenientibus medicamentis oblitis. Quietem imperant & membrum quatuor ligatum relinquunt, nisi dolor aliquis, aut graviore, à forti deligatione, aut aliunde supervenerint accidentia: quæ secundum quantum scopum sui correctionem requirunt. Si antiquæ fuerint Luxationes, aditque callosa aliqua durities, vel humor aliquis in Ossis cavitate; antequam eas pro repositione aggrediantur, fomentis prius ex Decocto intestinorum vervecis, malvæ, althææ, vel ungu. emollientibus, vel emplastris partem per aliquot dies humectant, & præparant ut magis sit tractabilis; dein humorem quidam partem influxit, attenuant, lubrificant, dissolvunt, ut muscoli, ligamenta, musculorumque fibræ laxentur.

*Paracelsi Cura in Ligamentorum Sinu, Laxatione Nervorum contusione, lundura-vum in-enturatio-ne.*  
§. 14. Paracelsus in Sinu, ac Laxatione Ligamentorum, & Nervorum Contusione, item in Sinu, seu Articulorum Incurvationibus seu Contracturis omnia commendat medicamentâ aperitiva pororum, humorum calefactiva, humectantiaque nervos & arterias. Hoc tamen animadvertit, ut in eodem gradu sint, in quo morbus ipse. Non omne calidum nec humidum quodvis, licet etiam aperitiva sint, facere ad Curam sit, sed ut inclinationem habeant à formâ specificâ, necessarium esse adjungit, particulariterque particularibus etiam Contracturis apta sint. Spiritum vitæ revocandum esse suadet, recuperandumque & renovandum, excellentissimis & confortantibus plurimum remediis, quorum humore novo spiritus ille vi quâdam introducat in membra, de quibus pravi cum suis venenis & infectionibus humores expellantur, singulari Medicina practicâ naturaliter hoc ipsum operante. Duobus modis Curam Contracturæ fieri statuit: uno quidem, ut illa membra, quæ sunt à suo loco mota, restituantur, ut decet. Altero verò, ut maximis Confortativis, prout sunt Aurum potabile, Oleum Solis, Materia Perlarum, Essentia Animoni, Arcana quintæ essentia, Aqua vitæ, oleum Vitrioli, Aqua Tartari, quantum esse gemmarum, Corallorum, & similium, paulatim subleventur, confortentur, & in pristinas vires revocentur.

Sic quoque externum Contracturæ aliorumque Ligamentorum affectuum curandi modum præscribit, per fumigationes ex balsamis & arcanis: per balsama terebinthi, Lauri: per oleum ranarum, adipum, gummi, per arcana, compositionem, solidum, & elementatum curat: varia quoque Unguenta describit. Dixit autem author, Contracturas alio modo curari minimè

posse, quàm per Medicinas in supremis gradibus existentes, ut est aurum Aurum Potabile, cujus dosis est ʒj, qualibet vice olei dosi aurei pondus granorum hordei decem non excedat; & quintæ Essentia aurei, granorum est trium similium per vicem aquæ vitæ bonæ, vel alterius aquæ subtilissimæ commixtorum, maneq. submeridie, & vesperi sumptorum, pro medicinæ quidem exigentia: qua sine sortolivoceum, aut corruptum additione fieri non debet, sequentem Auri potabilis descriptionem tradit:

ʒ. Aurifoliat pulverati, nec non in succum soluti ʒij.

& Aceti destillati q. s. est:

Addito, simulque destillando toties à se mutuo separato, quoad saporis ejus, quod adjunctum est, nihil prorsus maneat. Postmodum sume subsequenti aquæ vitæ ʒv. quas in pellicanum affusas, simul per mensem digerendo, perfectum esse Aurum Potabile scribit:

Authoris Aquæ vitæ descriptio est seq.

ʒ. Vini ardentis lb x.

Rosarum, Melissa,

Rorismarini

Anthos

Cheiri

folior. utriusque allebori

Majorena, aa. Mj.

Cinamomi

nuc. muscata

Caryophyllorum

Granorum Paradisi

pipe um omnium

cubebarum aa. ʒij.

succ. Chelidonia

Turpi

melissæ aa. lbß.

Cinereum sabarum ʒv.

Mixta simul omnia per duodecim dies in pelli- cano digerantur, separa tandem & utere.

Olei Solis descriptio est sequens

Postquam succus ab auto per acetum, uti supra, fuerit separatus, bulliat quindecim dies in digestionem, quæ sequitur, deinceps balneo separetur, & in secundo manebit oleum spissum, quod aurum permixtionis est expert.

Formula conficiendi margaritarum succum.

ʒ. Aceti destillati mundi ssimi,

Aquæ vitæ circulatæ lbß.

margaritarum mundatarum ʒiv.

quæ postquam pulveratæ subtiliter & præparatæ fuerint, unâ cum alitis in circulatorio digerantur per mensem: subsidit materia perlarum, ut pinguis liquor: qui cum apparebit, separentur aquæ per affusionem, succo reservato, de quo dentur grana sex per vicem. Arcana & essentia quintæ sulphuris & aquarum vitæ pro pro Contracturis.

ʒ. Florum Sulphuris lbß.

alb. Animoni ʒiß.

Succi auri ʒj.

Aq. vitæ circulatæ ʒx.

Digerantur ad mensem, & in massam duram congelentur. Huus qualibet vice ʒj. ad ministrat.

Aq. vitæ descriptio penetrantissima:

ʒ. Aq. meliss.

rosar.

cheiri, salvia,

Xxxx

balsami

*balsami* aa. lbj.  
*pipereum omnium.*  
*Cubeborum.*  
*Zingiberis*  
*Cinamomi*  
*Masticis*  
*Myrrabarabae*  
*Maceris*  
*Caryophyllorum* aa. ʒij.  
*succi mellis*  
*Aq. vitæ* restificat. lbv.

Digerantur omnia simul per novem dies, & postea separentur, & in pellicano destillentur ad spiritum. Tandem ad liquorem hunc adde pomum tostum & fractum, & simul unâ cum subsequenter aromatibus, digerantur super cineres per 3. dies, de qua sumantur grana quinque singulis diebus.

ʒi. *Cinamomi*  
*caryophyllorum*  
*macis* aa. ʒij.  
*anthos*  
*echeir* aa. ʒb.  
*ambra* ʒij.  
*musc.* gr. v.  
*Zibet.* ʒb.  
*Zingib. cubeborum*  
*N. M.* aa. ʒib.  
*amomi* ʒij.  
*Zedoaria* ʒiib.  
*gran. paradisi.* ʒib.

post horum omnium digestionem separa servaque vas vitreis obstruissimis.

De Medicamentis Vitrioli & Tartari pro contracturis vide ipsum Authorem latius differentem. Quoad externa; contractum sive pedem sive brachium includit in vas appropriatum satis amplum, ut in eo constrictum non sit, ac vas cooperit valeat, ne fumus exhalare possit. Postmodum accendere jubet quod sequitur, & in vas reconditum cooperit, tantisper ibi maneat, donec fumus ille cessaverit: hoc faciendum esse ait per medium diem. Si suffimentum videatur non sufficere, plura hant, vapores in vase densabuntur in liquorem, ut in alembico solent. Hujusmodi subtilem vaporem, qui propriè fumus non est, penetrare dicit, membrum calefacere, venas & humorem vitæ refocillare, ac ad naturalem vitam revocare.

ʒi. *Olei olivæ*  
*Juniperi* aa. ʒv.  
*Masticis* lbj.  
*Terebinthina* ʒiv.  
*salis Petre* ʒib.

Mixta simul in cacabo succendens, accensa peroptinè super fundum vas inferius & intus ponas, ac membrum teneatur super vaporem, cooperiatur vas fundo superiore, ne vapor exeat. Cum perceperis extinctam esse materiam, exemplam rursus accendas, & imponas toties, donec tempus supradictum impletum sit. Sequens quoque commendat suffimentum.

ʒi. *Taxi pinguedinis*  
*ol. olivæ*  
*adipis rana minimæ viridis*  
*calamites appellata* aa. lbj.  
*myrrh.*  
*masticis*  
*Terebinthina* aa. lbj.  
 Accende sicut dictum est.

Laudabilia quædam præscribit balsama, quibus *Ligamentorum Sinaptes, Laxationes, Nervorum Contusiones, & contractura* curantur, calidis enim membra optinè perungenda esse suadet singulis diebus ter & absque intermissione.

ʒi. *Terebinthina destillata* lbj.  
*Galbani destillat.*  
*Gummi elemi destillat.* lbj.

Rursus destilla simul, & inde fac balsamum à suis fecibus & phlegmate separatum.

Vel:

ʒi. *Terebinthina*  
*ol. laurini*  
*olivæ*  
*Juniperi* aa. lbj.  
*Masticis*  
*Myrrha*  
*Thuris* aa. lbj.

Destilla per se, quæ sunt ejusdem qualitatis, videlicet olea per se, reliqua tria etiam per se, quæ mixta simul iterum destilla semel, & utere. vel:

ʒi. *Adipis Taxi*  
*sevi cervini*  
*ranarum adipis*  
*cere* aa. lbj.  
*masticis* lbj.  
*Thuris* lbj.  
*Euphorbii* ʒiij.

Destilla sicut narratum est.

Vel:

ʒi. *Storacis liquide* ʒib.  
*ranarum No. xx.*  
*adipis taxi* lbj.  
*aceti destillati*  
*vini ardentis* aa. ʒib.

Postmodum mentem exprimens, usui quo reservat.

ʒi. *lignorum Juniperi*  
*fraxini*  
*sabina*  
*fugini* aa. lbj.

E quibus arte communi destilletur oleum, quod quidem rectificato per pellicanum, utere.

Arcanorum quoque in contracturis quatuor species existero ait, videlicet, Arcana Compositum, Solidum, Elementatum, & Metallicum.

Formula arcani compositi sequens est:

ʒi. *Alcool. vini* lbvj.  
*Cantharidum* ʒi.  
*Canapi*  
*fol. tassi*  
*chamomill.*  
*Hypericonis* aa. Mvj.

Tere, misceque simul, & in Sole, vel fimo digerantur per mensem, destillentur postmodum, & huic ea, quæ sequuntur, impone.

ʒi. *Canapi, florum tassi, chamomillæ, Hypericonis, Centauræ, Prunellæ, Betonice* aa. lbj.  
*Masticis, Mumie,* aa. ʒib.  
*Thuris* ʒv.

*Lumbrior. terrestr. ranar. aa. lbj.*

Destillentur in circulatorio per octo dies, hoc utere tanquam balsamo.

Arcanum solidum est sequens:

ʒi. *Succi flammula ex rosa substantia, hoc est, ex florib. caule, foliis & radicibus,*  
*Succi florum tassi* aa. lbj.  
*alcohol. vini* lbj.

Dige-

# CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 715

Digerantur in ventre equino per decem dies.

*Arcanum elementum.*

℞. Chelidonia, Melissa, Erucæ, Iva arthetica, florum tapfi, papaveris, Centaureæ, Bethonica, Parthenionis, Hypericonis aa. Mij. terantur omnia simul, & acetiparumperaddito, putrificentur & exprimantur optimè, succusque per circulatorium vas, decem diebus ascendant absque intermissione, quo liquore utere.

Arcanum metallicum est sequens: Resolutum accipe metallum, quod circuletur 8. diebus, dulcificetur postmodum & in usum assumatur. Metallorum tamen discrimen erit faciendum: Solis est aqua metallina, præ cæteris ad contraturas præstantissima.

In Cura Dislocationis Juncturarum scire Chirurgus vult, ut in dislocatis hujusmodi Juncturis, istas non fore prius medicandas, quam suis restitutæ locis fuerint, eoque redierint, unde exiverant, & harum Juncturarum suo loco restitutiones manu & oculis adidisci posse memorat, quod in usu maximo & in promptitudine consistant. Contingit etiam sæpe, dislocationis ab imperitis Chirurgis depravatas, per se ipsas sanari, ut concretæ & à patientibus non existimantur amplius. Item ut liquores illi cessent, ac ita postmodum in suum locum redeant.

Item sæpius evenire solet, ut Juncturis non dislocatis, vetus crescentia nervique similes dolores concipiant, ut è suo loco fore putentur, & ut Synonia quandoque discedat, & membrum contractum hat, non aliàs ac si dislocatum esset. Notare vult ergo Chirurgus, ut hæc signa probe cognoscant, ne quando Juncturas præsumunt restituere, quæ minime dislocatæ sunt, & hæc viâ discedent eas, quod sæpe contingere ait, ut posteriora pejora fiant prioribus. Sæo ergo primum loco membrum dislocatum restituendum sitadet, post eamomillæ succo vel aggrimoniz ligandum sit. Tamen in frigidata Junctura sit, oleo ex floribus herbæ, flammæ cæli dictæ, mixtæ cum petroleo, cumque maturuerit, in locum restituendum auit. Animadvertere etiam jubet, ne facile terreæris reponendum inter, aut extrahendum: nam sæpe contingere solet, ut dolores hujusmodi non transeat absque punctationibus, quod Junctura contracta sit, quæ verò subducæ sunt, curandum esse taxo laterino. Et si dislocatæ non fuerint, visco de consolidâ dolo rem atque morbum sedendum esse præcipit.

§. 15. Helmonstius in Ligamentorum Stupore præ aliis interna Diaphoretica ac arcana commendat jam sæpius dicta, externa verò Topica, fomenta neni, e, aliaque quæ Ligamenta confortant.

Laxationem verò Ligamentorum per Tincturam succini vel Elixir suum propriet, & per externa nervina curandam esse præcipit.

In Contusione Nervorum internè lapides canerorum & ossifragi commendat. Inter externa verò rad. hyome albe rasam & superimpositam contusioni præ aliis eligit.

In Incurvationibus vel Contracturis æquè externa fomenta, quàm interna, quæ convulsivos motus placent, maxime necessaria esse inculcat.

In Laxationis Curatione, articuli restitutionem de siliat, & præterea aliorum curam tuctè approbat.

§. 16. Willisius Ligamentorum Stuporem cu-

rat & internorum & externorum medicamentorum subsidio: Internè Diaphoretica porrigit, e quibus præcipue notæ esse alicui, decoctum guajaci, lissaparillæ, &c. spiritus & oleum guajaci, inter quæ & sunt Mixt. simplex, spiritus & flores salis Armoniaci, aurum Diaphoreticum, viperarum sal, pulvis & vinum. Bezoarticum minerale, solare, tinctura Ant monii &c. administrationibus externis sudationem etiam promovet, ut materiæ tendinum poros occupantes per poros patentiores facilius exhalentur; Ipsius ergo suasu craticula cum carbonibus aut spiritui vini accensis, Laconicum, & balnea varii generis & forinæ, ac thermæ naturales adhiberi solent.

Ligamentorum Laxationi medetur per internè sudorifera remedia, quæ est decoctum lignorum infra descriptum.

℞. Rajor. lign. sancti. ʒvj.

lissaparill.

lissaparill. aa. ʒiv.

Santal. alb.

citrin.

rad. ebriæ.

C. C. aa. ʒß.

f. a. infund. & coq. in ∇ font. ltvj.

ad medias, addend. Antimon. crud. pulv. & in nodul. ligat. ʒiv.

rad. calami. arom.

galang. min. aa. ʒß.

rad. ʒiv. ʒi.

cardum m. ʒvj.

sem. calandr. ʒß.

Dactylor. No. vi.

f. Dec. utatur etiam pro potu ordinario. Siadet etiam, ut ægri utantur per 14. aut 30. dies, dosi tincturæ sulph. terebinth. aut tincturæ antimon. vel Siccini, quandoque item Elixir. proprietatis aut puzonile, capiatur in cochleari aquæ destillatæ superbibendo eundem ʒiij. Externè commendat decocta ex salvia, rosemarino, lavend. origano, pulegio &c. & tandem ægris thermas præscribit.

In Nervorum Contusione diaphoretica volatilia exhibet, nervumque contusum oleo flavo terebinthine illinit, pattem verò adjucentem oleo chamomillæ aut catellorum illinit.

Juncturarum Incurvationem curat sequentia medicamina extemplo administrando.

℞. Castor.

opopanax.

sang. dracon.

Antimonii.

sem. pæoni. pulveris. aa. p. xq.

M. F. pulvis; dosi ʒ ʒß. ad ʒi.

utatur manè cum vino aut decocto appropriato, aut cum aqua cerasorum nigror.

Vel:

℞. Cran. human. ppt. ʒj.

vise. querc.

cinnabar. sublit.

ungul. alci aa. ʒß.

M. f. pulvis; dosi ʒß. ad ʒi.

Articulum verò contractum hoc inungit limamento.

℞. ol. irin.

verm. terrestr. aa. ʒj.

Castor. pulv. ʒiv.

M. continuo agitando.

Oleum etiam laurinum, laui, Liponis, decoct. Junbu-

In Incurvationem Laxationem seu Dislocationem.

Helmonstii sententia de Curatione Ligamentorum Stuporem.

Ligamentorum Laxationem.

Nervorum Contusionem.

Incurvationem vel Contracturam.

Willisii

methodus in curando Ligamentorum Stuporem.

In Ligamentorum Laxatione.

In Nervorum Contusione.

In Incurvationem.



lumbicorum, pinguedinem humanam & animalium hoc in catu laudat.

*In Luxa-  
tione.*

VVillifius *Luxatam Juncturam* firmare fatagens, factâ repositione, partem foveat decocto ex flor. hyperic. & ros. rub. in vino rubro facto, vel petroleum illi calide inungit, aut emplastrum ex tacamaliaci cum balsamo Peruviano malaxato ipsi applicat. Si vero *Luxatio* à causa interna ortum duxerit, diaphoreticis insilist, lignorumque decoctum pro potu ordinario præscribit, & partem foveat decocto ex radicib. gentianæ, aristol. rot. flor. rosat. hyperic. rot. marin. fol. absinthii, salviæ, origano, querc. &c. vel de Vigone illi imponit.

*Sylvii  
modis  
curandi Li-  
gamentorum  
in Sin-  
gulis.*

§. 17. Sylvius in *Singulis Ligamentorum* eo recipit, ut torpidi & ad motum ineptiores spiritus animales excitentur, & à vi narcotica ipsi admista liberentur per salia volatilia, sed aciora, medicamentaque omnia mordacitate aromatica prædita, piper, Caryophylla, castoreum, allium, rapum ruscianum, Sinapi, Cochleariam, Erythimum & similia sæpius minore quantitate usurpata: ex. gr.

℞. *Tri cochlear.*

*Erysimi aa. ʒi.*

*Tinct. castor. ʒi.*

*ol. caryophyllor. gt. ij.*

*syr. cochlear. ʒvi.*

*M.*

Hujus mixturæ cochleare unum accipiat sæpenuerò Ager, vel seq. decoct.

℞. *Rad. galang. ʒij.*

*raphanum ruscian. ʒij.*

*fol. erysimi Mj.*

*caryophyllor. ʒb.*

Fiat decoctio in vase clauso, ex aquæ & vini abiaz. q. f.

*In colat. ʒxx. dissolv.*

*Syr. cochlearia ʒij.*

*Tinct. cinamomi ʒj.*

*M. F. Apozema.*

Hujus Apozematis cochlearia quinque aut sex aliquoties in die usurpet Ager in lecto decumbens, ac medioeriter tectus, quod si possibile, sudor erumpat levis, agrum levaturus. Horum enim medicamentorum ope non tantum Animales spiritus liberati aut à suo Torpore, verum ipsam vim narcoticam vel in corpore tractu temporis genitam, vel foris secus admixtam quoque corrigi, & tandem superari. Externè varia olea aromatica & volatilia illinenda commendat, item partis frictiones, asperis linteis aliisque pannis insitui vult.

*Ligamen-  
torum Luxa-  
tione.*

Author in *Ligamentorum Luxatione* humores pituitosos & aquosos cire: Ligamenta hærentes, ipsorumque membranas medallamque nimis himectantes laxantesque corrigat ac tollat per interna sudorifera, imprimis aromatica, tum externa incidentia & discutientia, inter quæ iterum laudat salia volatilia; quod si multum in corpore redundent humores suprà dicti pituitosi, commendat phlegmagoga & hydragoga per vias usurpata.

*Nervor-  
um Con-  
tusionem.*

*Nervorum Contusionem* Sylvius curari dicit per interna Diaphoretica, Salia volatilia, his enim Spiritibus animalibus liberor conceditur permeatus, quæ simul defectum Spirituum animalium resiliunt. Externè item commendat varia nervina aromatica, oleum Terbinth. Philosoph. Ungu. Dialtheæ compos. Martia-

Ol. succini, Lavendul. &c. foris quoque laud negligendo amat.

*Juncturarum Incurvationem* item per interna volatilia sudorifera curandam esse inadet, item decocta lignorum Mercutialia, aliaque, ut viscidum solvatur, & obstructio Ligamentorum referetur, spiritibus liberior concedatur transitus, magnificat. Externè varia præscribit nervina, linimenta, unguenta, emplastra, ex aromaticis insignitos lotus, balnea &c.

*Juncturarum Luxationem* quod attinet, in *Luxatione* pristinum suum locum articulum elapsum restituendum vult. Dein varia Emplastra corroborantia, & modice astingentia applicari amat, quorum descriptiones jam alibi dedimus.

§. 18. *Cartesiani* in *Ligamentorum Stuporis Curatione* commodè petificendâ, ipsas adverteunt causas, à quibus fuerit productus, has enim revocare annuntiat, si possibile est, ne quid remaneat, obstaculi, quo minus spiritus animales per Ligamenta perfluere possint: quapropter si fuerit à *Luxatione*, Os luxatum relluunt, si à fractura, illam sanant reponendo Ossa fracta, & postmodum eadem glutinando. Moleculorum verò vitia corrigunt, siue ulcera sint, siue vulnèra, siue convulsiones, siue paralytes, quibus in calibus remedia appropriata seligunt, potissimum proficua esse dicunt succinatæ, callosæ, & nervina, imprimis ubi supore ita defectu spirituum animalium, omnia conducunt salia volatilia, oleosa, inter quæ liquens magni pendunt.

℞. *Elix. viæ nostr. vel Hoffmanni ʒij.*

*syr. sal. & ci volat. ʒj.*

*M. detur guttatim.*

vel in forma Mixturæ propinantur

℞. *Tri Lavendul. ʒib.*

*Ungar. ʒj.*

*Elix. viæ Matthiol. ʒvi.*

*syr. sal. & ci succinat. ʒi.*

*Essent. castor. ʒj.*

*syr. flor. Stachad. ʒj.*

*M.*

vel in forma Electuarii seq. exhibent.

℞. *Conserv. rosmar. ʒij.*

*menth. ʒb.*

*salv. ʒij.*

*Cond. cort. anrant. ʒiib.*

*spec. diamb. ʒj.*

*diagalang. ʒb.*

*pulo. sem. ennc. ʒij.*

*flor. sal. & ci ʒj.*

*Sal. C. C. volat. ʒb.*

*ol. distill. caryophyll. gt. jv.*

*M. f. q. lvi. flor. univ. f. q. opiata.*

Externè etiam foci non negligunt, quos parare solent ex foliis rosmar. lav. majoran. lavendul. origan. fl. paralyf. anth. bac. lauri, Juniperi, lumbicis, formicis in vino coctis, quibus tepidè adhibitis, spiritus etiam limacum, lumbic. & ci, essent. castor. & succin sunt illinenda, ex. gr.

℞. *Spir. lumbic. ʒib.*

*aq. Anhal. ʒj.*

*syr. sal. & ci ʒb.*

*M.*

Balnea quoque & Thermas magni faciunt.

In *Ligamentorum Luxatione* sudorifera magno habent in pretio, & exhibent salvolatiles C. C. ad

# CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 717

C. C. ad 3j. in vino vel alio liquore appropriato, externè varios fatus paululum subadstringentes commendant, ut thermas aluminosas, Emplastro corroborantia & firmantia, qualia dicunt esse de pelle arietina, ad fracturas, & nervinum cum terra Japonica mixtum.

*In Nervorum Contusione.* In *Contusione Nervorum* leviore, ubi nervi tantum superficialiter contusi sunt, sudorifera exhibent dissolventia, attenuantia, ut sic tubuli lesi iterum aperiantur per novum spirituum affluxum, qualia sunt oculi canis. Antimonium diaphoreticum, Sal. C. C. volat. lumblicorum, decoctum Bardanz, & lanx mundæ, Tinct. Mumiæ, spir. sal. & ci succinat. In gravissima verò contusione, in qua cutis & musculi non tantum sunt conqualitati, sed etiam ipsi nervi, sanguis quoque & reliqui immixti liquores imprimis nervi corrupti partes subjacentes Gangranam nuntiant, omni studio malignitatis eorum resistunt, acrimoniam mitigant, & partes ulteriores defendunt, internè Bezoardicis & sanguinem depurantibus, Eleduario verbi grati Bezoartico *Aug. Sala.* Tinctur. Bezoard. volatili Dialcord. Theriac. &c.

Externè fovendo partem affectam spiritu vini theiacali & Camphorato, applicando cataplasmata ex farina orobi, lupinorum, herb. scord. rat. ablynth. cum spiritu vini parata, vel inungendo aut impendendo linimentum sequens:

℞. Medull. cervin. 3j.  
axung. castor. 3ij.  
ol. lumbicor. 3vj.  
petra alb. 5℔.  
Gumm. animæ 3j.  
salvia 3℔.  
lavendul. gr. vj.  
⊕ succin. volat. 3ij.

M. Redigantur omnia f. a. in formam linimenti.

Incurvationis quoque Juncaturarum curationem instituunt juxta causam varietatem, si fuerit à luxatione vel fractura, eas prius curant, si verò fuerit ab obstructione, à spiritu animalium influxu impedito, eos promoveant per spirituosam ac volatilia & ipsa propinant seq. vinum medicatum:

℞. Rad. valerian.  
Imperator.  
pæon.  
Angelic. aa. 3ij.  
Rhapontic. 3℔.  
armorac. 3ij.  
sol. chamædr.  
chamæpyth.  
salv.  
rorismar.  
majoran.  
mench. aa. 3℔.  
flor. paralyf.  
Siachad. Arab.  
lavendul. P. 1.  
raf. ligni Junip. 3v.  
guajaci 3ij.  
bacc. Juniperi 3℔.  
Card. mom. 3ij.  
Cinamom. 3ij.  
Cubeb. 3j.  
⊕ 3℔.  
℞ ci depurat. 3iiss.  
At. pro 4. vel 5. vini libris.

Externè varia commendant spirituosam aromatica ac volatilia imponentia, ut sunt spiritus lavend. lil. convall. matric. ball. Ischiac. Infusi arthrit. Emplastro varia nervina imponent, inter quæ laudant Empl. de Labdano, citr. naborum &c. Balnea, fatus ac thermas quoque magnificiunt. Balnea vel fatus parare solent ex salvia, majorana, betonica, rorematino, pulegio, chamædr. origano, bacc. Juniperi, cunctis Juniperi, Sal. Q vel commun. in vino & aqua decoctis.

*Luxationem* curant articulum clausum ad partem oppositam manibus propellendo, & ita in locum pristinum restituendo, & ne succi crassiores interstitiis illapsi sint impedimento, tum diaphoretica internè, tum spirituosam externè adhibent, ita enim illi succi stagnantes expelluntur ad musculos, & tandem apertis poris sub specie vaporis eliminantur, & penitus discutuntur, quod fatus præstant ex herbis majoranæ, salv. origani, chamædr. fl. sambuc. anth. Sulphuris in Spiritu vini maceratis, tepide adhibiti, nec non spiritus vini camphorati, aliquoties illitus: restitutos articulos quiete & emplastro nervino jubent corroborare.

§. 19. Nos in *Curatione Morborum* horum ita procedimus; In *Stupore Ligamentorum* ad vertiginis causas, à quibus fuerit inductus, has enim prius removece studemus, si possibile est, ne quid remaneat obstaculi in eo enim totius curationis cardo vertitur, ut obstructio in fibrillis tendinosis ac nervosis exiens tollatur, si que promoveatur influxus spirituum animalium liber ac pristinus. Si enim Stupor abortus fuerit à defectu spirituum animalium, vel obstructione crassorum succorum, ante omnia incidendi sunt, & simul volatiliandi, in quem finem internè & externè conducunt salia volatilia alique diaphoretica oleosa, quæ maxime penetrare, & canaliculos subtilissimos fibrillarum tendinosarum aperire valent. Possissimum verò succinara, castoreata, camphorata, alique nervina sunt proficua. In Juniorum Medicorum gratiam unam vel alteram communicabimus formulam:

℞. Matric. *Regin. Hungar.*  
Spir. camphor. 3℔.  
Ceyhal. oleos. 3j.  
At. D. gmitatum.  
Vel:  
℞. rorismar. 3ij.  
mirabil.  
livund. c. castor. aa. 3℔.  
Spir. C. C. 3℔.  
Syr. fl. paralyf. 3vj.

M. aliquoties cochlearim exhibenda, Spiritus Lumblicorum essentificatus, item spir. anthos. salv. spicæ, spir. sal. & ci succinat. Tinctura castorei sunt generosa remedia. Conducunt quoque Cinabarina, pro re nata Mercutialia ritè parata, præsertim commendamus pulverem nostrum Elem Orem, qui nos raro deserit. Item Antimon. diaphoret. Bezoard. Min. Mercuriale, Joviale &c. hoc in casu æstimamus, ex. gr.

℞. gnis diaphoret. 3℔.  
bezoard. Matric. gr. v.  
ocul. ex. ppi. gr. vj.  
Sal. absynth. gr. v.  
Sperm. ceti gr. iv.  
Xxxx j

M. 6



M. f. pulvis pro una vice, detur cum  $\nabla$  lil. convall. vel fl. tiliz &c.

Profluit quoque spir. urii. cran. human. spir. sanguinis mag. cran. human. spir. fulig. C. C. eboris essentii. spir. Tartar. volat. sal. volat. oleos. fœt. Elix. vit. vel detur sequens sudoriferum:

℞.  $\nabla$  card. bened.  
 verismar. aa.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Zni diaphoret. gr. xv.  
 Tinct. croci  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 Sal. card. bened. gr. v.  
 spir. sal. & ci succin. gr. vj.  
 syr. card. bened.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 M. D. ad vitrum.

Hoc in affectu Purgantia V. S. Cucurbitulas, aliaque tormenta proferibimus, aliquando vesicatoria concedi possunt. Si à nimia Lymphæ copia & acrimoniâ fuerit productus affectus, Diuretica commendamus, per quæ superflua ac acris lymphæ à corpore eliminari possunt, sæpe cum maximo fructu.

Topica præsertim in Ligamentorum Stupore æstimamus, quæ sæpe totam implent paginam, inter quæ aliis palmam præcipiunt spirituosâ volatilia, quæ obstructas fibras tendinosas hunc affectum excitantes summo pereferant, hinc egregie conducit spir. Matricialis, convulsivus, & topicus spir. lunbricor. essentif. formicarum, brucehorum, balsam. nervin. extern. & intern. spir. camphor. lign. guajac. Essent. castor. succin. Cataplasmata & foci hic maxime conducunt ex fol. torismar. beton. salv. majoran. lavendul. origan. fl. Paralyt. anth. bacis lauri, Juniperi, mace parat. Item suffumigia ex succin. ass. fetid. galban. castor. mastich. thure concinnata: qui amant mixturam extente applicandam, sequens erit proficiam:

℞. Aq. Regin. Hungar.  
 Spir. vin. camph. aa.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Matricial.  $\mathfrak{z}\text{vj}$ .  
 lunbricor. ess.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Elix. vitæ  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 M. D.

Emplastra ex gummi aliisque volatilibus fabricata egregiam sæpe navant operam, imprimis Empl. Norimbergense, cinnabarinum nostrum, de Theâ, Nervinum. Theriac sulphureo-Martiales, vel nitro-sulphureæ utilem sæpe navant operam, in earum defectu artificiales parari possunt: confer ea quæ inferius de contractura dicemus.

In Ligamentorum Laxitate.

Laxitas Ligamentorum, nisi protinus & brevi tollatur, verendum est, ne affectus diu duret, quoniam à decubitu & stagnatione succorum ligamenta relaxantur, pori ligamentorum longa morâ figuræ extraordinariæ assuehant, similemque capropter materiam peccantem facile transmittunt, qui succus si longas præterea moras circa ligamenta necdat, Laxitatem majorem producere poterit, laxando ac relaxando fibrillas tendinosas: & cum malum hoc potissimum oritur à catarrhis, vel nimio sæto evaluto, id ante omnia eliminandum est vel purgantibus (præmissis incidentibus Tartareis) pulv. sc. laxativ. Extr. diacar. diacitr. aliisque pilulis aloeicis, vel quod sæpe melius succedit, diaphoreticis ac sudoriferis eliminanda venit lymphæ abundans. Dein semper eò incumbendum est, ut ligamenta laxata firmentur corroborenturque. In quem

finem conveniunt fortiora exsiccantia vulgo dicta, cum nervinis juncta, nec non spiritusola, ut spiritibus animalibus melior concedatur transitus, & per consequens pristina fibrarum fiat extensio, hinc commendamus seq.

℞. Spir. matricial.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Sal. & ci succin.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 $\Psi$   $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Elix. vitæ  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

M. & applicetur calide.

quando relaxantur ligamenta tendinsque artuum, unde Luxationes sæpe veniunt, Oleum terræ illitum experimentum est Barbetæ, firmat enim Ligamenta, resolvitque lymphæ congestam auctorem hujus relaxacionis.

Nervorum Contusiois cura potissimum in eo consistit, ut per contusionem evasit, congruenter & stagnantes succi resolvantur, in quem finem præter interna diaphoretica, & incidentia sæpius dicta & assumpta, conducunt, ut sunt aqua charefol. cum spir. C. C. ocul. canc. Zn. diaphor. pulv. contra calum, sperm. ceti, spir. matricial. lap. scissil. Irland. pulv. Anglicæ &c. Externa Topica sæpe aliis palmam præcipiunt, sequens impronatur calide cum quadruplicatis linteis, quod etiam quater vel quinquies de die repetatur.

℞. Spir. matricial.  $\mathfrak{z}\text{v}$ .  
 Balsam. nervin. in d.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 camphor.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 spir. sal. & ci camphor.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 M. D. ului.

Foci, suffumigia ex nervinis discutientibus & emollientibus parata interponenda sunt. Si dolores vehementiores adsint, ol. ovorum addi, & camphora augeri potest, & si hisce non cedat Contusio, sequenti utre:

℞. Spir. matricial.  $\mathfrak{z}\text{xx}$ .  
 charefol.  $\mathfrak{z}\text{v}$ .  
 sem. cumini.  
 carvi  
 anisi aa.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 Sal. Tartar.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .

Stent in digestionem, donec Tinctura rubescat.

℞. hujus prædictæ Tinctura  $\mathfrak{z}\text{vj}$ .  
 camphor.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 balsam. nervin.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 ol. sassafras.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 spir. sal. & ci anisi.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 M. D. ului.

Applicetur linteis, uti antea, sed hæc cautione bene clausum vitrum deinceps in aqua calida, ut tepide applicari possit. Suffusus gummi animæ optimum & tutum in Contusionibus remedium est. Et hisce medicamentis per aliquot dies continuandum, antequam ad alia accedas. Si Emplastrum magis arideat, Empl. de Labdano, de Cumino, vel de Theâ vel seq. resolvens aut simile conducet.

℞. Syrac. calam.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 Empl. Labdan.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 benzoin.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 ol. sassafras.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 cumini  $\mathfrak{z}\text{ij}$ .  
 camphor.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ .  
 spir. matricial. q. f.  
 M. & f. l. a. ceratum.

quamvis ab applicatis Emplastris plures vesiculæ in quibusdam excitentur, quæ non curandæ, sed apertendi sunt.

Nunc

# CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 719

In Lunul.  
parum in-  
curvatio-  
ne.

Nunc pergamus ad curam *incurvationum* Incurvationis seu Contracturæ membrorum. Chirurgia hoc in affectu parum commodi asserens, cum pharmaciâ conjugenda est. Proscribimus è foro Chirurgico V. S. Cucurbitulas, vesicatoria, fonticulos, quæ duo ultima præsidia admittimus, quando malum ab abundante sero oritur. A Chirurgia in Incurvatione mutantur *Extensionem & Deligaturam* partis contractæ seu incurvatæ: quæ tamen non violentæ, sed successiva sit, adhibitis eo fine præter foras, spirituosius volatilibus linimentis & unguentis nervinis, paulo inferius tradendis, si præcipue ex succa sit pars, ut iisdem inunctis emollita & laxata cò facilius cedere discat. Quæ operatio ut eo melius succedat, excogitantur Chirurgi & fasciæ, quibus membrum detentum sensum attollitur: ejusmodi instrumenta descripta & delineata invenies in *Atm. Eruditorum Lipsiens.* imprimis in Luxat. omnibus artuum maxime inervientia. Huic enim malo ut medeamur, oportet artubus ægri adnectere fasciam lineam tere digitos latam. Inò in Incurvatione pedum hisce in locis utimur ocreis in hunc finem à fustice aulico apprimæ factis, sic quoque in reliquis corporis artubus fasciæ vel instrumenta parti appropriata facillè excogitari possunt.

Ex cùm *Incurvatio* hæc sit potissimùm ab obstructione, & inde facta contractione, cò semper respiciendum est, ut succi crassi ac quasi top hæci incidentur ac resolvantur, unde pharmacia consulenda est, quæ nobis calientia, & incidentia, quæ mucum incidunt, depromit, quo nomine præcipue veniunt Tartarea, crem. & crystall. & Tinct. Q. Q. lat. resolut. Tinct. Q. liq. terr. sol. Q. item nitrosa, Arcan. duplic. Nitr. Antimonial. S. digestiv. spir. aperitiv. Moebii: huc quoque referri possunt Martialia, Essent. Guai, spir. matricialis, C. C. Eboris Ceph. oleos. &c.

Tandem & ob amuræ copiam ad Purgantia accedimus, quæ non ex primis solum viis, sed altius etiam infixam materiam morbosam extirpare possunt. Proderunt ergò radix laxativ. Massæ Pilularum Q. vel detur Extract. diacartham, diacitri &c. & alia apud auctores prostantia, quæ proderunt variis in formulis adhibita.

Hisce præmissis ad Diaphoretica tanquam ad anchoram sacram confugiendum est. Hæc enim id quod in vas & glandulis subcutaneis à purgantibus intantum relictum est, expellunt, in quem finem profunt tam volatilia quàm fixa & media, ex. gr. Rad. scorzon. chin. salparill. herb. card. bened. scord. fl. galg. calendul. lign. sassafras, sanct. spir. serpent. viperar. Ql. & oleosus, C. C. eboris, Tinct. bezord. volat. Tinct. Diaphor. Myrs. & liq. ejus, spir. volat. oleosus cephal. Balsam. Nervin. spir. matricialis, Mixt. f. per se & volatilis, item omnia ex Antimonio parata. Orvietanum, Camphora, Bez. min. Ol. cinnabarin. lap. Bez. C. C. spir. viper. quæ omnia & alia pro variis indicationibus à Medico prudenti eligi, combinari, variari, & adhiberi possunt.

Succedunt his *Diuretica*, quæ id, quod neque per Purgantia aut Diaphoretica expelli poterat, per ductus urinarios evacuant. Faciunt huc tam Vegetabilia, quàm animalia & mineralia. Inter Vegetabilia recensemus rad. asparag. rusc. scenicul. ononid. vincetox. saxifrag. herb. heder. terrestr. bellid. &c. Ex animalibus ocul.

es. testacea, ex Chymicis Arcan. dupl. Arcan. Q. Malv. Junip. spir. Junip. ex hæc. spir. Nephrit. Succinata omnia & Terebinthinata, S. succir. volat. spir. & essent. ejusdem Tinct. contra caculum, liq. C. C. succ. balf. Q. &c. Omne tandem ferunt punctum appropriata, nervina, antiscorbutica, antiparalytica, antihypochondriaca, vulgo ita dicta, quia hæc omnia obstructions releverant, proderunt in eum finem omnia Martialia, croc. mart. aperit. Q. lun. mart. spir. euphem. dulcis, vel pulv. Cachect. Cinnabarin. Si malum fuerit ex colicâ, conducunt præ aliis Volatilia spirituosâ, oleosâ, Essent. & spir. cort. citri, Essent. Zedoar. extract. castor. ladan. &c.

*Externa* nunc paucis dilababimus *Topica*, quibus pars incurvata foveri, humectari, lique ad extensionem aptari potest: Excellunt hoc nomine Nervina, spir. matric. aq. Regin. Hungar. spir. Cephal. volar. & oleos. balsam. human. Elix. viæ, spir. sal. æci aromat. C. C. volat. ebor. cum aq. Anhaltina Lumbic. Spir. Camphoræ spir. formicar. &c. Linimenta quoque parari possunt ex pingued. human. axung. viperar. castor. vulp. urs. lupi, ol. Chamomel. aneth. dest. lil. alb. ruth. sapon. Ven. ol. scorpior. terebinth. &c. aliis immittunt oleum pægoricum VVedelii, ol. hyperic. u. d. item conducit balsam. de Cautulis, balf. Indic. de Tolu. Chili, ol. elemi, ol. ex sangu. Cervin. & human. balsam. polychrest. Myrs. Oleis expressis semper addantur olea destillata tum spirituosâ, ut ol. succin. destill. macis, anisi, caryophyllorum, Cumini, Chamomill. Commendantur quoque pelles recentes mactatorum canum, leporum, vulpium, vitulorum, item immisiones membrorum in ventres canum apertos vel vulpium, vel leporum, aliorumque animalium adhuc calentium. Ex Unguentis proderunt Unguentum Nervin. Martial. D altheæ comp. &c. quæ roboranda sunt oleis, ex. gr.

4. Ungu. laurin.

martial. aa. ʒj.

Ol. salvia dest.

majoran. dest.

succini.

angelica.

spica aa. ʒj.

Suffimenta pro usu exsiccatatorio aliquando optimo cum successu adhibentur ex succino, mastich. gumm. animæ, sandas. cinab. Guai, ad sustinung. commendamus spir. vin. vel aq. Regin. Hungar. accensum, super cuxas exhalationem membrum contractum tenendum est. Sunt qui argillam peculiari sale maritatem membris contractis applicant, qualem esse dicunt in fonte Sotero (*Heilbrunn*) nuper in Hassia prope Hirschfeldiam invento; cuius argillæ ope, quæ fons abundat, plures à Contracturâ convalescere, ita ut ligneis instrumentis innixi cum accederent, relictis iisdem tanquam testibus recuperatæ sanitatis abissent. In defectu scaturientium fontium artificialia ex argill. aliisque mineralibus & nervinis paranda sunt, lequens commendamus:

4. Herb. betonic.

salv.

rotisamar.

majoran.

hyperic. aa. Miij.

bacc.

bacc. lauri.

Juniper. 22. 3ij.

A. uv. 3v.

argolla. lbij.

M.

Profuisse etiam vidimus fatus paratos è capite mortuo cerevisiæ, vel ex jam dictis herbis, eadem membrum contractum tepido immergendo & fovendo, cui fini etiam sacculi ex nervinis parati, & spiritibus volatilibus irrorari, vel sicci quoque applicari possunt, huc referri merentur infessus in filiquis uvarum, item formicarum grandiorum acervo, vasi cuidam indito, quibus aqua calida infusa fuerit. Emplastra ex gummi galban. commun. bdell. plurimum in sal. volat. in fe continentibus haud negligenda sunt. Item Empl. Diaph. Myrsin. de Theâ, de Labdan. &c.

In his affectibus præ aliis conducunt Thermae, quarum mineris tuto se concedere possunt ægri, imprimis Emblesis fonticulus, delicatula martiali qualitate & vitriolata dulcedine (vitriolum enim pars essentialis ferri est,) pollens pro potu, & Thermae illæ Sulphureo-Martiales pro balneo eligantur, plures enim contractos & à Colicâ parieticos factos hisce curatos vidimus; Equidem reparandæ Valentudinis aquæ minerales, si minere bene constant, multum præstant, & sæpe plûs, quàm è longo medicamentorum usu in eos redundat emolumenti, qui potu vel lavacro illarum utantur; hinc Sacre priscis dictæ, magnificis & sumptuosius ædificiis honoratæ; aut non sine præmeditatione ex iudicio medicinæ operam dantium, & earum minerarum exploratione accuratâ, atque cautelâ abusu, licentiæ immoderatæ victus libidine, administrat. one contrahatur, quàm emolumenti; quin potius sollicita illarum mixturæ certæ portionis & quantitatis, & temperamentorum seu morborum diversitatis curiosò selectu habenda est ratio, thermis & acidulis secturientibus, si deficient, facilitate artificiales substitui poterunt.

In Luxa-  
tione.

Nunc curam Luxationis videamus: si unquam, certè in Juncturarum seu ossium repositione ipsi Chirurgi quandoque suam produnt ignorantiam, cum non luxatum pro luxato, non repositum pro reposito sæpius habent, quod inde fit, quoniam verum ligamentorum & tendinum situm ac texturam ignorant. Quippe os semel è suo acetabulo elapsum reponi nequit, nisi in ligamenta partis attendas. Tota certè ars Chirurgica consistit in accuratâ & mechanica cognitione œconomiz animalis, quam nonnisi in Scholis Cartesianorum vel rationalium Medicorum ac Chirurgorum addiscunt, hinc merito jure Chirurgia Rationalis appellatur. Non negamus in luxatione curanda opus esse convenienti manuali operatione, cujus tamen fundamentum est ipsa œconomia animalis vel si mavis Philosophia Mechanica. Chirurgia enim pertinet ad Medicos tanquam Dominos, Practica autem ad Chirurgos tanquam Medicorum ministros. Os ergo semel è suo acetabulo elapsum restitui nequit, nisi, ceu dictum, in Ligamenta partis oppositæ curas intendas tuas, hæc enim valde distenta & elongata magis, illa verò in parte, per quam os elapsum est, contracta vel breviora erunt: hinc summâ utendum est cautelâ, ne extendendo membrum lu-

xatum his vel illis ullam inferas injuriam, sed opera potius impendenda est, ut articulus accuratè per eam viam, quâ elapsus est, regredi possit, si enim hic erraveris, ipsam repositionem impossibilem & malum incurabile reddes, unde postmodum tumor, inflammatio, ingens dolor & quandoque abscessus excitantur, prout id quotidie experientia æquè sapientum ac stultorum Magistra comprobat. Quodsi infantibus repositio ad plures dies differatur, penitus illa impossibilis erit, quoniam succi, imprimis lymphæ in acetabuli vacuum copiosissimè transsudans, & in mucilaginem topheam vel cartilagineam excrefcens, omnem elapso articulo præcludit ingressum, ceu id in puellâ s. annorum hac in civitate observavimus.

Extensio etiam vix in omnibus Luxationibus necessaria est, nempe (1) ubi ligamentorum relaxatio nimia, nec (2.) in subluxatione; sed tunc demum, ubi musculi ossi luxato implantati hoc versus suum principium retrahunt. Quod si verò conveniat, quàm maturè erit adornanda, antequam inflammatio superveniat, ejusque instrumenta varia sunt, quorum intuitu duplex reponendi modus ab Auctoribus constituitur, *Palestrinus* nempe, qui solis manibus fit, & *Medicus*; qui iterum duplex, vel *methodicus*, qui habenis, scalis & foribus, aliisque inenarrabilibus peragitur; vel *Organicus* qui machinamentis diversis perficitur; de quibus videantur *Hipp. Paravi*, & *Scultetum*, & alii, illius Galli machina in hunc finem excogitata antecessit machinæ Germanorum, quarum icon in *Alvis Eruditorum Lipsiens. Ann.* 1683. *Menf. Januario* videre est.

Quod si ergo sufficiens videatur extensio, quod judicatur, si luxatum os acetabulo suo è diametro opponatur, & si membrum idem sano aliquando longius appareat, restauratio, *Mocle- gis* dicta, debet fieri, quæ facillimè accidit, si os luxatum manibus suis ita dirigat, articuloque adaptet Chirurgus, ut musculorum tractus observet, ac extensione sensim laxatâ, illud quasi sponte suâ sedem ordinariam repetat. Autem bene restauratum sit membrum, dignoscitur ex iisdem signis, quæ ossa fracta probè coaptata restabuntur.

Deligatio, quia tam topicorum applicationem, quàm fasciationem ac ferularum impositionem involvit, medicamenta in principio convenientia sunt, quæ roborando dicuntur operari, uno verbo illa, quæ sub principium fracturæ etiam admovebantur: si ergo ossa luxata, reposita & succi crassiores interstitiis illapsi internis diaphoreticis discussi fuerint, externè institutis variis fortibus ex herbis majoran. sal. chamædr. flor. sambuc. anth. A. in spiritu vini maceratis tepidè adhibitis, nec non spiritus vini, C. V. regin. Hungar. spirit. matricar. aliquoties illiti; sunt qui Emplastra magnè æstimant, seq. ergo applicari potest:

R. Syrac. calam. 3j.

mastich.

succin.

Benzoi 22. 3ß.

bacc. lauri 3vj.

charyophyll. 3ij.

N. M. 3ij.

cera nova 3v.

resin.



# CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 711

resin. ʒj.

ol. myrtillor. ʒiʒ.

overum ʒʒ.

succi chelidon.

cicuta. aa. ʒʒ.

M. f. l. a. Empl.

Ad impediendam inflammationem fortiter adstringentia intermittenda sunt, sed potius tunc resolventibus, atque nervinis est agendum, verb. gr. Spir. matric. vin. camph. ol. lumbricor. terræ, vulpin. Peruvien. aut instituatür fomentatio ex scord. absinth. herb. salv. rorismar. fl. ros. balauft. bacc. Juniper. lauri, sem. cumini &c. quia se. tendino ærum fibrillarum rigiditas deligatioe introducta aliquomodo corrigitur, spirituumque animalium influxus restituitur.

Quod Fasciationem attinet, fieri potest hæc simili modo ac in fracturâ retentivâ atque expulsiâ simul, seu eadem per unam fasciâ, si scilicet articulus ad prolapsum non adeo prolapsus, seu tribus, pari ratione ac in fracturâ artuum fieri solet; ita tamen ut deligationis principium fiat in latere, per quod os præcedit, iidem etiam fasciâ semper firmius constringatur; speniorum verò, quæ iis supponuntur, plura sint, non tantum melioris firmationis & retentionis gratiâ, sed ut juncturarum quoque cavitates & inæqualitates replentur, pro fasciarum commodiore injectione, horum tamen crassius & maximum illi articulo apponatur, per quem os luxatum prodibat, ne hoc extra eadem suam adeo facile elabatur: de cætero si membri ratio hoc patiatür, & inflammatio non impedit, ferulæ imponantur, observatis illis circumstantiis, quas alibi indigitabimus.

Restitutos articulos quiete & emplastro nervino jubemus corroborare, optinè ergo articuli luxati post repositionem collocentur, ut melius firmantur, ut non rursus elabantur, sic brachium repositum ad pectus teneatur in fasciâ, pedes verò in situ optimo ferventur, & semper commoda ac tempestiva fiat religatio, hinc vulgò dicitur renovatio deligationis ac ejusdem durationis. Quoad renovationem fasciationis, nisi circumstantia aliqua contrarium urgeat, scil. dolor ac fasciarum nimia constrictio, sunt, qui ante 6. & 7. diem hæc non solvant: sed ne iudice periculosum est, omnia sic recta relinquere, melius enim esset, ut Chirurgus quotidie inspiciat, numne Gangræna aliudque malum acciderit. Nuper sceminam quandam ita in deligatione reliquerat Balnearior, cum Empl. tolleret integra tibia sphacelata fuit, & matrona ad plures abiit.

Durationis tempus vix specialiter determinari potest, nisi dicamus, tunc demum tollendas esse fasciâs, si articulus sufficienter firmatus obierit, quod in articulis minoribus, ut digito, de 14. in mediocribus brachio ac tibiâ circa 20. in majoribus verò humero, scapula ac femore, vix intra 40. contingere solet. Quoniam autem pro diversitate subsectorum, regionum, ætatis, anni temporum, roboris, majore ac minore, ligamentorum tensione, Luxatione recenti & veteri magis articulum quoque robur modò celerius modò tardius restituit, tutius illi agunt, qui supradictis diebus aliquot adhuc addunt, ac demum vinculis tubulatis ægrum monent, ne membrum statim motibus vehementioribus exagitet.

Dein ut rigiditatem fibratum tendinosorum emendare laboret per sequens aut simile linimentum.

℞. Ol. lumbric.

Terebinth.

hyperic. n. d. aa. ʒʒ.

Balsam. Pernuv. ʒiʒ.

ol. massich.

vulpin. aa. ʒiʒ.

bals. nervin. ʒiij.

M.

vel cum ∇ Regin. Hungar. spir. topic. vini camph. matricul. artus illinantur.

Si membrum luxatum ritè restitutum fuerit, ex signis sequentibus patet, si nempe in figura, magnitudine, longitudine cum parte sana correspondet, & nullus dolor amplius percipitur, ac membrum moveri potest.

Atque hæc de deligatione simplici, nunc de compositâ notandum, quæ se inflammationem, dolorem, spasmus, callum, vulnus, fracturam aut ligamentorum laxitatem comitem habet, cum pro varietate horum affectuum atque symptomatum curam Luxationis aliquo modo variare conveniat, quippe si dolor, tumor atque Inflammatio urgeant, & quidem sit timante repositionem, his cerè ante omnia succurrendum est, nisi articuli luxati restituito mox tenetur ex partium nervosarum & tendinosarum fibrillarum violentiore distensione, & irritatione, convulsionem, spasmus, alique atrociores mala, imò ipsa mors producantur, quare Luxationes non parvi fac eundæ sunt: Hinc posito membro in medio minusque doloroso situ, applicentur resolutentia cum Inflammatione atque dolore mitigantia, qualia sunt spir. matricalis, ∇ Regin. Hungar. spir. vin. camph. Balsam. nervin. aq. calc. viv. additâ semper camphorâ, item cataplasinata aut foci, quibus simul admiscenda sunt anodyna, scil. herb. malv. parietar. rad. alth. flor. chamo-mill. verbas. sambuc. sem. lini, farin. fabar. &c. Sin repositionem demum symptomata prædicta obocurrunt, ante omnia vincula statim laxentur, ac recensita applicentur remedia.

Si vulnus Luxationi combinetur, in maximo æger versatur periculo, inflammationem, spasmus, imò Gangrænam & mortem sæpe infert, præsertim in juncturis majoribus, si membrum restituatür live secus: Unde Chirurgi prudentiores suavis Hippocrati ab eiusmodi Luxationum restitutione abstinere, imò dicente Celso, nec minorum articulorum repositionem absque prædictione periculi suscipienda sunt, ita quidem, ut si reposito articulo inflammatio major ac spasmus superveniat, melius à quibusdam annotetur, si sine magna violentia hoc fieri valeat, articulum ex sede sua iterum exturbare. Ante omnia itaque in Luxatione membri majoris ratio habeatur Inflammationis atque Convulsionum metiendarum, hinc in media pariter minusque dolorosa figura membrum collocetur aut suspendatur, eadem ac applicando topica appropriata cum anodynis. Minores verò articuli aliquando ante inflammationem interdum illâ topica demum restituntur, & quæ dem extensione medicata, quoniam validam non ferunt: & si restituti fuerint, inflammationem atque convulsionem producant.

Fractura si Luxationi jungatur, affectus sanè

Yyy

articu-

periculosissimum evadit, quæritur ergo non immerito, Utrum huic an luxationi prima manus sit applicanda. Quamvis in praxi hodiernâ & communi prius membrum luxatum reponi, ac postmodum deinde Fracturæ rationem haberi dicunt, quod si tamen ante hujus curationem articulus sine periculo restitui nequeat, primò Fractura: & postquam tempus generationis calli accedit, Luxatio curetur.

Sin callus in Juncturâ ante vel post repositionem oriatur, & quidem tephaceus, ejus curationi frustranea erit; eeu in Virgine Limburgensi observavimus, cui ter vel quater iterum ex sede suâ elapsa fuit ulna, ejus restitutio semper frustra tentabatur. In molliore verò succellus desideratus aliquando contingit. Articulus ergo semper foveatur vel aq. Regin. Hungar. spir. matricul. vel decoct. ex herb. malv. abynth. bis malv. majoran. rad. althææ, eucum. aminor. bacc. juniper. lauri aliisque nervinis, ex quibus cataplasma parari potest. Item Empl. de Gummi, de Theâ, de cicuta, de ranis cum & Cinnabarin. nostr. conducunt: hic asterisco notandum est, quod plures homines emplastra nullatenus ferre possunt, sed statim inde inflammationem ac pustulas in cute nascuntur, quia statim ab iis tubuli obstruuntur: sunt etiam qui pinguis ferre nequeunt, alii verò eum succellu tolerant oleum pingui. human. remedium aliâ egregium & singulare in contracturis partium & luxationibus articularum, pro consolidationis promotione. Suffusus quoque insituantur ex Gummois mastich. succin. thure aliisque resolventibus & cum alibi formulas tradiderimus eas repetere ædet.

*Scultetus* articuli unctionem commendat, eam omnibus aliis remediis anteponendo hujusque administrandi rationem tradit *Armament. Chirurg.* pag. 142.

Quoniam ultimum non raro à deligatione membris luxatis pruritus molestissimus accedit, pro illo sopiendo, religatum membrum perfundatur aut fomentetur aquâ tepidâ communi, vel Sale Armoniac. aut marino maritatâ. Et cum ubiis particularium Luxationum mentio-

nem fecerimus ea hic repetere non libet, ne Lectori nauseam, eam tamen biscoctam offerendo, pariamus, & generalia hæc dicta facili ad eam specialem applicari possunt.

Contractura tendinum solet etiam ut plurimum accidere in Fractura ossium male curata, quando scilicet musculari aliquamdiu contracti sese iterum extendi non pariantur, verum membrum semper contractum relinquunt. Causa hujus quoque in tali Chirurgi incurrit venit adscribenda, membrum aliquod nimis diu incurvum ac immotum relinquendo hoc ægro contrahit, cum potius post fracturam passim singulis post tertiam deligationibus paululum flectere, & leviter iterum extendere illud debuisset. Musculorum namque sic contracti tendines talem pororum fibrarum suarum hinc subeunt mutationem, ut qui antea rotundi erant, hæc diuturna contractione ovales evadant. Verum enim verò humores, qui aliis musculos hosce liberrimo motu pervadebant, iisdem diutius contractis, venisque simul compressis multo tardiori cursu, quam antea moventur, imò fere subsistere coguntur. Particulæ ergo eorum crassiores omnium primò subsistentes, forte sese inter poros illos tendinum ovales insinuant, eosque replendo in figura illa ovali conservant, tandemque succellu temporis quibusdam levioribus ac mobilioribus, quibus antea adhuc sociatæ erant, abeuntibus, sedem ibi adeo fixum sibi figunt ut vix ac ne vix quidem se postea expellere patiantur. Hinc tendines manent contracti, atque breves, duriores, nec prius iterum extendi possunt, nisi Materia hæc ex poris eorum expulsa, illisque naturali figuræ rotundæ restituitur. Ad quod sustinendum sæpe multo opus est labore hinc, v. gr. autores luadent, ut ægri, si hæc contractura sit in brachio; sæpius pondus quoddam gestent in manibus; vel si in pedibus, iis tale quoddam ægro sedente appendatur. Medicamenta verò parti applicantur referantia, resolutiva ac emollientia ut rite ratiocinatur

*Celeberrimus D. Hoffmannus P. Hallensis,*

*Amicus noster exoptatissimus in disputatione.*

## CAPUT VII.

### De Ossium Fractura, Carie & Tophis.

#### §. I.

**A**D Synthefin, operationem Chirurgicam, quæ adducit, conjungit & conjunctas servat partes machinæ nostræ, à quacunque causâ extraordinarie separatas, schola Chirurgica refert inter alia & *Fracturam Ossium*, de qua, ut & de ossium *Carie* & *Tophis* sermo nunc erit.

*Fractura Ossium* describi possunt, quod sint ossium continui solutiones, à causâ violentâ ut plurimum externa factæ.

*Caries* verò ossium vel *Pædarthocæ* describitur, quod sit corrosio ossium à succis acris & corrosivis viscidis proveniens. Imò *Caries*, nostro judicio, nihil aliud est, quam ossium mortificatio seu Gangrena, sibi enim tendinosus cor-

rosus & discissus, necessario ejusmodi mortificationi oboriri debet.

*Tophi* sunt tumores duri, & tactui renitentes, interdum dolentes, in ossium medio enati, à viscidis succis ex acore vitioso ibi imperium sibi rapiente coagulatis, exorti. Tophicæ appellatur Nodi, seu Tuberositates seu gummatæ Gallica, vel aliæ partes lapidosas & fetto quasi renitentem duritiem inducentes. Ejusmodi Tophi hinc inde in corporis nostri observantur partibus, imprimis circa oia; si legimus in *Ephem. Germ. Ann.* 9. & 10. quod membranz & arteriæ in ejusmodi Tophis fuerint mutatz. Sic quoque Celeberrimus *Dn. Drelincurtius* arteriam descendentem potissimum Itacam variis in locis totam in lapidem indurisse notavit. Nos in puero Dizeni vidimus unum digitum & quidem

*Descriptio ossium Fractura.*

*Descriptio ossium Carie.*

*Descriptio Tophorum.*

## CAP. VII. DE OSSIUM FRACT. CARIE & TOPHIS. 723

quidem medium planè in duritiem versum: sic etiam Lugduni Batavorum vir quidam Curiosus manum lapideam monstravit. Confer *Celiberri- mi Franci Lap. dicinam*. Podagricis ac Lue vene- rea affectis Tophi hi solennes esse solent.

§. 2. *Parti affecta* horum affectuum sunt os- sa: ut ergo ipsorum compeditio & textura no- bis constet, paucis in ipsorum constitutionem inquiremus. In animali corpore plures repe- riuntur partes, quæ ossium indolem participare videntur, eò quòd æquè dura non sint, atq; illa, & his miris mollia sint, per quæ Cartilagine indigentur. Sicut tendines temporis tractu in Cartilagine convertuntur, ita etiam cartilagi- nes in ossa abeunt. Si ergo novius Cartilagi- nes nihil aliud esse quam fibrarum tendinosarum compagem, ex eo quòd interdum tendines in cartilagine mutantur, inde necessè iudicare debemus, ossa tantum composita esse ex fibris tendinosis, quæ postquam indurata fuerint, in cartilagineam usque consistentiam, denique in substantiam ossæm induralescunt. Observatio- nes, quæ in factis ossibus insinuuntur, verita- tem istam meridianâ luce clariorem exhibent. Re ipsâ permixta in illis animadvertuntur fibræ tendinosæ, & nomination in cranio, in princi- pio membræ solum ex fibris tendinosis con- textæ speciem refert, cartilagineum deinceps devenit, denum in os penitus accessit. Quibus ita pensatis nihil superesse potest dubium, quin ossa sint congeries fibrarum tendinosarum, quæ ita firmis iunctæ ac oppositæ induraverunt, ut duritiem ossis adeptæ fuerint. Fibræ tendino- sæ indurantur ex facto in se temporis tractu al- calieorum volatilium infusctu. Fibræ nervæ il- larum cavitatum spiritus animales infundunt, & sic subtilius per poros avolat, & crassius rema- net; ita ut fibræ istæ sint extemplo alcalicis vo- latilibus sulphurebusque volatilibus refertæ; dum adunt sulphur, sub cartilagineis formâ apparent, sed simul ac sulphura ablumpta fuere, sive à fibrarum nutritione, sive per poros avolando, sive sese comminendo, Ossium faciem exhi- bent. Inde fit, ut nullæ sint partes in corpore animales, ex quibus tam copiosum sal volatile elici possit quàm ex Ossibus.

Denique observantur Ossa à membranâ con- tegi, quæ Periostrium cognominatur; Membrana ista ad eò arctè Ossibus adhæret, ut quibusdam in locis ab ipsis nequaquam avelli possit, nisi eam scindendo sive dilacerando. Cuni illa membra- na atterius consideretur, ex triplici partium ge- nere constare visitur, ex multis sc. fibris tendino- sis, plurimis ramis nervæis, & aliquibus arte- riolis & venulis, ita ut omnibus ritè perpen- ditur comperiat *Periostrium* nihil aliud esse, quàm contextum fibrarum tendinosarum Ossis, quan- dantem nervorum, & aliquarum arteriarum ve- narumque.

§. 3. Quoniam Medicus ac Chirurgus cu- ram non aggreditur, antequam cognoverit, quæ curanda sint, de signis & hic agere ne- cessum est.

Signa ergò *Fracturarum Ossium* sunt vel com- munita vel propria. Communia observantur, si sc. Fracturarum occasiones atque causæ præces- serint, & æger forsitan aut adstantes simul strepi- tum quemdam perciperint: Dein causam illam dolor atque inflammatio ingens mox excipiat, postmodum si membro inæqualitas notabilis

hinc introducat, & si Ossium extremitates prominent, aut digito vel specillo in hoc im- misso Ossis inæqualitas deprehendatur, ac ulti- mò, si membri læsi actio notabiliter vacillet. In specie verò transversalis seu obliquæ dignoscitur Fractura, si ex contractione membri percipitur strepitus, aut manu illi transversim supposita hoc incurvetur: dein quando illa cum extremitatum Ossium recessu accidit, aut hæc fragmenta sepa- rata deprehenduntur, aut membri notabilis ob- servetur inæqualitas, i. e. in unâ hujus parte fo- vca, in alterâ tumor; postea membri motus tolli- tur, præsertim si à se invicem Ossâ recesserint, aut quamvis extremitatibus eorum adhuc sibi contiguis aliquid motus ipsi superstit, imperfe- ctus tamen admodum hic est. Imò ultimum mem- brum non raro brevius redditur, quatenus reced- entium Ossium partem inferiorem musculi sur- sum retrahunt. *Afferalis* difficillimè dignoscitur, nisi quòd post Fracturæ causam aliquando tumor atque inæqualitas in parte affectâ observetur cum summo dolore. Committuntur enim tandem monstrat eadem membri notabili dolore com- binata inæqualitas ac tumor, imò aliquando par- ticularum Ossis fracti ad digitorum contractio- nem agitatio, membrique ad motum impo- tentia: quamvis & hæc difficultat quoque dig- noscatur, præter signa enumerata exactione læsâ; ut & symptomata ex suis signis iudicanda erunt.

*Caries Ossium* quoad *Diagnosis*, sive ulcere *Diagnosis* sordido aut Fistulâ raro observatur *Caries Os- sum*, prout enim ulcus devorat carnosas fibrosas molles partes, sic *Caries* duriores ac Osses. Pus quod effluit ex tali ulcere carioso, est oleum, pingue, ac maxime fetidum, aliquando fla- vum, subviride, ut plurimum verò tenue est, & fluidum, & plus materię effluit ex tali ulcere quàm ex alio, intense quoque, ceu dictum, fœ- tet, & sæpe emplastra nigro tingit colore. Caro quoque solet esse spongiosa, mollis & fungosa, & in superficie apparet livida pallidaque, est sæpe instar lardi. Quamvis tale ulcus curatum videatur, sua sponte tamen iterum aperitur. Dein ex ipso detecto Ossē carioso cognosci potest, si sanguis sit niger, coagulatus, & Os sit inæquale & molle & quasi cavernulis multis præditum, Cognoscitur ergò *Caries* in Ossē deudato, 1. per autopsiam; 2. ex materiâ promanante, quæ est tenuis, oleaginosa, flava & graveolens; 3. si ul- ceratio vetustior, iuxta *Hipp. Sect. 6. Aph. 4. 4.* si coalescentia ejus difficilior aut post coalitio- nem denuò rumpatur. 5. Si caro circumflans spongiosa, flaccida, pallida & livida observetur; 6. si supra turundas aut Emplastrâ macula nigri- cans appareat, comprobante hoc per experien- tiam *Sculteto Axiomat. Tab. 37.* quibus 7. ad- dunt, si specillo immisso alperitas in Ossē depre- hendatur, imò hoc ab illo perforari videatur. Quorum tamen posterius ita habet, ut quam- vis non observetur, nentiam tamen inferre liceat, nullam Caricem tubellæ: testatur liquidum *Parani Lib. 18. Cap. 26.* Quædam Ossa cariosa ab igne ita induruisse, ut nullo specillo pe- netrare, neque trepano perforare illa liceret.

*Tophorum Diagnosis* quod spectat, illi sunt humores duri ac tactui tenitentes, aliquando dolentes in medio Ossium & ducti, & in diem incumbunt periostrio, subinde ipsis dolore nocturnum, ostocopia gravissimum interant,

Parti affecta.

Diagnosis Fractura Ossium.

tandem partes molles & Ossâ subjectâ erodunt, ipsorum fibrarum tendinosas corroduunt, dilacerantque, ac sic *Cariem* sæpe inducunt, atque tumunt. Isti communiter, qui Luc Veneret diu laborarunt, hoc malo inficisoleant. In Arthriticis observamus etiam ejusmodi nodos Tophaceos raro curabiles.

*Galenicus  
cum judi-  
cium de  
causa Os-  
sium Fra-  
ctura.*

§. 4. *Ætiologiam* horum morborum quod attinet, Veterum sententia est, Ossium Fracturam oboriri à re violentâ externâ. Causæ enim sunt omnia ea, quæ vim habent contundendi, distorquendi, rumpendi, dividendi &c. Fractura enim ipsis est continui in Osse solutio absq; incisione, violentæ extrinsecus à re rumpente, vel contudente facta, ut sunt telum durum & ictus vehemens, tum ipsa habilitas Ossis, ratione cujus alterum altero facilius diffingitur aut retrocedere potest, crassius enim majorem præbet renisum, quàm tenuius, durum, quàm molle. Ratione quoque ætatis & temperamenti Ossâ variare dicunt, in infantibus junioribus & semellis tenuiora sunt quàm in viris & senibus, in humidioribus, quàm in siccis. Proinde tenuiora faciliore Marte frangi posse contendunt, etiam à re non valde durâ, aut vehementi percussione, dura autem non nisi à re validâ vehementiori impetu illatâ. Dicunt Fracturam vel simplicem vel compositam, vel completam, vel incompletam esse, si una tantum pars frangitur, ab ipsâ dicitur incompleta.

*Cariet.*

§. 5. Ossium verò *Cariem* deducunt Veteres ab acrimonia humorum Ossâ singulariter impetente & nullâ parcente.

*Tophorum.*

*Tophos* Galenicus dicitur Gummata, quia gummosum in se continent materiam, Tumores hos duplices esse ajunt, sunt enim alii *Tophacei*, alii non: *Tophacei*, ad mentem ipsorum, sunt ex materiâ lapidosa, & quasi ossâ, dein si materia est mollis, tunc referunt ad speciem atheromatit. Tumores *Tophaceos* ut plurimum oboriti contendunt circa pedes & crura, in ligamentis scilicet articularum Ossibus, periostis, in quibus sunt dolorosissimi tumores, aliquando in Ossis superficie. Materiam, à quâ generatur hic tumor, dicunt esse tenacem, pituitosam, melancholicam, imprimis crassam, ex quâ fieri Tophos haud dubitant.

*Paracelsus  
opinio de  
causa Os-  
sium Fra-  
ctura.*

§. 6. *Paracelsus* Fracturam Ossium non aliter contingere ait, quàm ubi quis accinctus gladio super hunc decidens, illâ vaginâ frangatur ensis, hoc de Osse pariter intelligendum vult ad pellem & carnes comparando, prout vaginæ gladius, cui solum adhibendum esse remedium jubet. Item sapiens ait frangi Os, medullis penitus illâsis. Chirurgus notandum esse præcipit, in qualibet Ossium Fracturâ, dolorem omnem casu proveniente in rupturâ querendum esse. Fracturis plura accidentia contingere memorat, ut sunt calores, frigora, tumores, cruditates, pulsus, nigri glaucive colores, insensibilitas, putrefactiones, fistulæ, concavitates, incendia &c. quæ quidem ex primo casu non procedere ait, sed ex accidentibus, incuriâ vel imperitiâ Chirurgi causatis in hujusmodi membro. Liquores illos membrum sustentantes esse ipsosmet Medicos scribit, curari enim ait Fracturas à Mumia Corporis in Carne, ligamentis, medullis &c. existente, cujus in

medio situm Os & circumseptum est, à quibus omnibus etiam perfratur.

*Cariem Ossium* Author à sale fieri multis comprobatur rationibus & experimentis, ab ulceribus enim diuturnis tanquam pessimum symptomata accidere solet, imprimis carne venis ac nervis erosis, Ossâ tunc quoque cariosa fieri notat.

*Tophos* Author ex mellisibus fieri mineralibus *Tophorum* provenire statuit, item ex arthritide sæpissime Tophos generari, item ex luc veneret ac veneno Gallico.

§. 7. *Helmontius* Ossâ acidissimâ dicens Fracturam ipsorum fieri à quacunque re externa violenta, & in eo cum aliis consentit. Ossâ & enses facilius frangi sub frigoris quibus aliatate memorat. *Cariem* verò deducit à latice corro-

sivo ad Ossâ delato eaque corroddente. *Tophos* exoriri author existimat à mucilagine *Tophorum*, associata pulveri, mucilagine enim in spissâ & corpore suo resoluta facili juxta cum in Tophos transeunt, quos ex mucilagine & pulvere fieri contendit.

§. 8. *Willisus* vult Ossium Fracturam ut plurimum à causa externa violentiori atque insigni eorum substantiam discontiunante prodire; nullo modo tamen inficias ire vult à nimis violentioribusque artuum convulsionibus Ossâ quædam frangi ac discontinuari posse.

*Willisus* accusat ut veram *Cariet* causam, *Cariet*, acido-salas & acres succi alibilis Ossium nutritioni destinati particulas; quæ ob molem & figuram evaporationi nequaquam idoneæ, & ad nutritionem, ob suam cum fibris disproportionem ineptæ, Ossis substantiam corrumpunt, ejus fibras spiculis suis, quæ ipsarum poris desigunt comminutes ac discindentes, atque in minutulas particulas concrecentes.

Ossâ ex *Willisio* Tophis affliguntur, quando *Tophorum* scilicet succus nutritivus particulis acidis satens atque coagulationes patiens, coagulatus, quas in se continet particulas in angustioribus atque in Ossium superficie positas deponit, evaporatis autem tenuioribus marerit istius remorantis atque aggettæ particulis, residua crassiora devenit, & à liquore nervo in substantiam ferè ossæ commutatur. Cum verò in stagnante isto humore alibili contentæ essent salinæ particule, ossæ ista substantia Ossis superaddita scabæ sit, à salium spiculis foris prominentibus.

§. 9. *Sylvius* cum aliis Auctoribus in causa *Sylvii* Ossium Fracturam consentit, & à causa externa quacunque eam provenire posse non dubitat.

*Cariem* verò Ossium produci statuit ab acido spiritu nimis puro in corpore existente, quod ex præviis sæpenumero doloribus intolerabilibus, & à sola aciditate provenientibus liquet. Acrimonia siquidem à lixivo sale oborta, fixior, juxta ipsum, permanet in eodem loco, partemque affectam videtur urere, dum spiritus acidus partem à se correptam repetitis laniationibus impetere aut lacerare aut perforare judicatur; hinc *Cariem* in Luc Veneret sæpe cogredientem ab acido venereo ætissimè Ossibus sese insinuante, illaque ad internecionem corruptente, deducit, difficultatem curationis hujus inde pendere dicit, quod venenum sese intimius insinuet Ossibus, quo penetrare nequeunt remedia illi corrigendo apta; nec facili igne sive cauterio actuali superari possit idem malum. Ossâ sana

vivra

# CAP. VII. DE OSSIUM FRACT. CARIE & TOPHIS. 725

vivere ait Author, in Carie verò Venerea Ossis Carie corrupta pro mortuis habenda esse contendit.

**Tophorum** Tophos seu Tuberostates Sylvius inter Lūs Venereæ symptomata refert, quæ hinc inde Ossibus sub periostio accrescunt, & ubique deformitatem insignem ac inæqualitatem comitem habent. Arthritis quoque solennes sunt. Causam horum Tophorum ipse dicit esse materiam pituitosam, valde tenacem, viscidam ac coagulata stagnantem, & talem tumorem durum ac lapideum quasi producentem. Has protuberantias, pituitum viscidum pro materia agnoscere, visum evincere dicit, & curationem, quæ perficitur per medicamenta eandem pituitam incidentia sententiæ dissolventia, Mercurium imprimis & olea stillatitia, ideoque sale volatili oleoso prægnantia confirmat. Ab acido pingui visciditatem hanc enormem produci statuit, hinc concurrere ait ad gummatum illorum, Tophorum ac Tuberostatum generationem Acidum, à quo ideo & Lueni Venereæ deducit.

**Carie** §. 9. Cariesiani in Ossium Fracturâ non minùs causam remotiorem ponunt nempe quandam externam, durum, ictu vel casu Ossibus vehementius illatam, vel à lapsu, &c. Senioribus facilius Fracturam contingere ajunt, adeò ut ipsa Ossis dispositio causæ proximioris vicem hic obeat, quæ ob filamenta, à quibus Ossa cum cæteris machinæ membris sunt composita, facilius modo uno findi volunt, quàm alio, aut obliquè etiam frangi, cum easdem adhuc fibras retineant, postquam laceraverunt, quas habuerunt sub formâ membranarum & cartilaginum.

**Cariei.** Ossium Caries causam constituit particulam angularem acutam, vel cum succo nutriente ex arteriis, vel cum lymphâ ex ductibus propriis, vel ex succo nervo Ossium poros ingredientem, interstitia illorum tandem dissolventes, maxime si ulcus vel vulnus adit, & diu aëri exponatur.

**Tophorum** Ossium verò Tophos inde produci credunt, quod vel succi nutritii, vel aliorum succorum particule ob figurâ & magnitudinem suarum convenientiam cum Ossibus, intercedente solâ quiete, iisdem fortius adherant, vel ob viscositatem & ramositatem à particulis quibusdam acutis lamellatis in ipsis ossibus jam contentis coagulentur & inspissentur, ut ita non modo in lapideam quandam abeant duritiem, sed Ossibus etiam ob particulis cuspidatis eorum poris unâ inhaerentes firmius annectantur.

**Carie** §. 10. Ista aliorum, hæc nostra est sententia; Causa Fracturarum Ossium sunt externæ ad instrumentum pertinentes, ut sunt ictus, casus, lapsus & occurfus, plaga, &c. & quæcunque continuam Ossis solvere possunt, licet observationes Practicorum testentur, internam dispositionem illius vim non raro augere aut juvare posse, quatenus Ossa seniorum ob rigiditatem atque siccitatem intensiorem franguntur, quàm puerorum molliora, & flexibilia. Pariter Arthritis, atque de fluxionibus acrioribus ac erodentibus laborantes, Fracturis magis obnoxii sunt quàm alii: item qui frequentiore aut diuturniore Mercurii inunctionem passi sunt, quorum exempla Marcellus Donatus Histor. Mirab. L. 5. c. 1. & Hildan. Cent. 2. Observ. 66. 67. 68. recenset. Mirari subit, quod apud auctores etiam fiat mentio fracturarum ex sola ma-

trum imaginatione miseris infantibus contraharum cujus phænomeni rationem explicat de la Forge in not. ad Cartel.

Fracturarum differentias quod attinet, Practici Differentiæ petunt illas à tribus, sc. ab earum forma, parte affecta, & symptomatibus. Ratione formæ alia observatur *transversa*, quæ per transversum Ossis fit, & Fractura *transversa* vocatur: alia *Asperalis* dicitur, quæ secundum longitudinem illius contingit: alia denique *comminuta* seu comminutio, quando os in plura fragmenta secedit. Ratione Subjecti alia est cranii, alia est costarum, alia brachii, alia tibiæ, &c. hæc tandem ratione symptomatum, alia cum tumore, alia cum Inflammatione, vulnere ac contusione est, Germanicè *Blut- flect- & last- Bruch*; item est *ist gang zerschellert*. Ossium substantia & structura nihil aliud est quam Compages quædam ex fibris tendinosissimis in multis laminis formatis, & à singulari interveniente ossis succo in substantiam adeò solidam compactis.

Sed è diverticulo in viam, & videbimus *Causa Cariei* *Ossium*, quæ verò nostro iudicio sequenti modo contingere solet. In Tumoribus quando obstructa sunt vascula quædam, liquor obstruens acidus & acrior factus periostium corrodit, inde sæpe gravissimus dolor, corroedendo enim ipsas fibras tendinosas Ossium frangit, & sic ipsum Os invadit, idemque totum sæpe usque ad intimam consumit, hinc Caries Ossium Lue Venereæ laborantibus toleris est, quæ acidis ac corrosivis scaturit succis. Dum hæc scribimus, in Nobili quodam diu Lue Venereæ laborante observavimus à Carie non tantum omnia faciei, sed & nasi Ossa cum maxilla superiore ac inferiore ita exesa fuisse, ut eximi potuerint, imò ipsius facies cum naso tota collapsa fuit, certè horrendo aspectu, & sic miserè vitam finivit. Post variolas etiam pædarthrocacem obortam fuisse notat Curiosi. Facile quoque Ossa corroduntur ac corrumpuntur, si vulnus exanguine diu exponatur aëri, ita etiam ulcus putridum & usque ad os profundum, ob acidam acrem mordens & spicula corrosiva, fibrillas tendinosas discindere, & sic Cariem Ossis inducere potest. Sunt ut plurimum succi circa Ossa stagnantes & aciores facti, qui hæc fibras ossis seu tendinosas corrodunt, ac Cariem inferunt. Quod succi fibras tendinosas perfluentes Cariem inducere possint, ex eo patet, quia Ossa facilius in corpore vivente corrumpuntur, quàm in defunctorum Ossibus. Ossa enim constant ex sale volatili, dein spiritu, & postmodum oleo, & ultimo sale fixo & acido volatili, quæ particule volatiles non tantum in tubulis reperiuntur, sed ipsa Ossa tales continent, quò Ossa enim adiora, eò plus dant salis volatilis, imò hæc Ossa recipiunt æquè tot succos ac alia partes: & quod Ossa facilius in viventibus, quàm defunctis corrumpantur, causa est, quod ær ambiens acidus succos coagulet & ipsos plane immutet; si enim particule extraneæ cum reliquis in succis contentis commisceantur, inequalis oritur mixtio ac operatio, & hinc resolvuntur succi facili Cariem inducentes. In Ossibus viventium succi continuo affluunt, & sic recitantur hoc Necesse Ossa: quod verò in defunctorum Ossibus fieri nequit, in quibus potius particule penitus incoactæ ac acutius combinatæ ac coagulatæ existunt: cum enim quis moritur,

Yyyy 3

motus



motus succorum, ut in alijs partibus, sic etiam in Ossibus cellat, unde penitus incalcati ac inspissati ab aere amplius commoveri nequeunt. Fractura atque Fissura Ossium aliquando corruptioni Ossium seu Cariei aniam atque occasionem præbent, Ossa enim non ex tam solidis partibus constant, ut flecti possint, ex enim ex salis rigidis ac mollibus partibus conflata sunt, non possunt ergo sic existentia, instar cereæ ac metallorum quorundam flecti, quamvis Ossa humana per machinam quandam noviter emolliantur, instar gelatinæ, ut comedi possint, *Celebrimus DuPain, Professor Marburgensis, & Illustris Boyle*, qui in eum linem peculiates fornaces extruxerunt, qui videri possint in prædictorum Virorum Laboratoriis: hoc verò nostro iudicio non aliter contingit, quàm ex rarefactione aeris inclusi exitum non habentis, Ossium ejusmodi molliem, & flexibilitatem in homine sano, sed qui nec stare nec ambulare potuit, vidit *D. Romelius Test. Eph. G. Decur. 11. A. 7. Obs. 212.* In Osse ergo ipso interdum causa Cariei Ossium generari solet, & quidem à magnis ac diuturnis morbis, in quibus futiens ac corrosivum acidum exiit, uti observamus in Luc Veneræ, in qua sanguis ac succi corporis sensim ac sensim viscidiores ac tenaciores redduntur, ita ut omnes ipsius particule in Ossibus separatæ in materiam gypseam ac Gummi similem abeant, materia hæc ibidem coærcata per animum & ultra absque ullo manifestationis indicio stagnat, sed eam simul acida particula hæc tenaces resolverint, fibrillas tendinosas tum corrodunt, perfinguntque, sicque Cariem inferunt. Si enim acidum cum corrosivo sale mixturatum, in canaliculos se infundit, & cum intus contentis succis commisceatur, necessarib commotio & alteratio succorum oboriri debet, cum ipsorum particule ex multo sale volatili, oleosis & spiritiosis constantes, contrarietur reliquis peregrinis particulis, ut materia celestis non ut antea persilire possit, unde canaliculi vi rumpuntur, & sic ordo & textura frangitur, & confusio fit succorum, unde corruptio oriri debet, hinc oritur Caries sive Gangrænâ Oslis; ut enim caro à Gangrænâ, sic Os à Carie devoratur, corroditur, corrumpiturque.

Causa ex  
inflam-  
matione To-  
porum.

Quemadmodum ex cartilagine aut tendine Os fit, ita ex Osse tandem compactis archius particulis, oleosisque humiditate emuncta, *Tophum* enasci existimamus, ibi flexilibus magis hamosisque particulis, hic paulo rigidioribus, & per cuncta cohaerescunt. In his enim Tophis dum in porulis & vasculis capillatibus, quæ comitantur periossum, succi quidam chyloso alique crudi stagnant, unde partes hæc, circa quas hærent, sensim intumescunt, & instar spongiarum insistant, qui viscidii tumores successivè indurati in specie ex acore vitioso eos ut plurimum imprægnant & coagulante, imo ex acido Luis Venereæ partes nervæ, in specie Ossa infestant tales, humores duros & tactui renitentes constitutum, qui in sanguineis partibus Scirrhi, in spermaticis & oleis, Nodi & Tophi, in glandulis Strumæ seu Scrophulæ appellantur: si enim vitiosus liquor acido junctus in partibus his firmius impingat, eorum chylum corrumpit coagulatque, hinc necessarib ejusmodi succi accedente acido forti, indurari debent, qui indurati & Tartaro imbuti constituunt ejusmodi To-

phos, qui tandem partes vicinas erodendo in ulcera abeunt. Podagricis Tophi ipsi solennes sunt, quia abundant acido & viscido Tartaro, & imprimis eorum succus nerveus nemine characterè imbutus ad juncturas ac membranosa ligamenta & periossum perveniens, ob tenacitatem ac visciditatem stagnare cogitur, & si simul topica astringentia frigida ac repellentia loco affecto applicentur, magis compacta redduntur, quæ tandem in Tophos coagulantur.

§. 11. Quoad Fracturatum Ossium Prognosis, nulla eadem Fracturatum à Chirurgis per se lethalis habetur, sed per accidens duntaxat talis interdum evadit, ex. gr. ratione contusionis ingentis, hincque emergentis Inflammationis ac Sphaceli, earum tamen alia facilius ac citius, alia difficilius ac tardius curatur. Nam (1.) facilius sanatur recens, eum si ultra septimum diem Ossis repositio protrahatur, extremitates hujus facili marte callum contrahant, hinc ad coactionem ineptæ reddantur, aut os corrumpatur; (2.) facilius curatur, quæ in Osse minore, v. gr. digiti, quàm in majore, videlicet senioris; (3.) quæ à causa externâ sola, quàm quæ internam dispositionem conjunctam habet; (4.) quæ sine alijs morbis ac symptomatibus; (5.) quæ in Subiecto juvenili ac puerili; (6.) quæ in corpore puro & sano, quàm in cachectico; (7.) quæ membrum tale occupat, in quo restauratio ac deligatio commodè fieri valeat, ita ut v. gr. Fractura humeri, brachii, tibiæ, &c. felicius fiantur, quàm femoris, vertebrae dorso, &c. Longitudinalis facilius marte sanatur, quàm transversa seu comminutione facta, illa etiam facilius curatur, quæ à junctura & articulo remotior existit, ac quæ in membro, quod duplici Osse gaudet, horum autem unum saltem fractum. Caries Ossium difficillimè curatur, imò si *Cariei* cetera ipsam produxerint, tunc res est periculosa *Ossium* plena, nam acres succi incarnationem impediunt, sicut autem cuncta cum Ossis Carie ulcera non adeo facile consolidantur, hinc inter maligna numerantur; ita majores difficultates pariunt illa, ubi junctura atque capita Ossium, quàm ubi media eorum pars corruptione hæc laborant, utpote quibus remedia Cariosum separantia non commodè applicare licet. Quæ Lucem Veneream comitatur, difficillimè quoque curatur, sed ægros usque ad mortem insequitur, ceu plura novimus exempla. Plures Cariem absque igne nunquam curari posse asserunt.

*Tophorum Prognosis* quod concernit, illi facilius *Tophorum* cile in ulcera ac Cariem Ossium transeunt, hinc difficillimi sunt curatu; Arthriticos ac Venerea Luc laborantes usque ad mortem Tophi comitari solent, & vix curabiles exsunt, hinc eos tangere non licet.

§. 12. Perspecta jam Prognosis, restat ut *Distanti* his in affectibus Ossium attingamus, qua neglecta aliquando in iis curandis frustrâ laboramus, ceu id experientia quotidiana abundè testatur. Eligatur ergo aer temperatus, imprimis vitetur aer nitrolus, ac frigidus, qui quocunque modo à Fractura, Carie & Tophis arcendusest, hic enim solus ita Ossium poros destrucere potest, ut Gangrænæ quæ carnosorum partium ac ossium laxentur fores. Victus sit tenuis, dulcis ac boni lacteique succi, ut chylus ac sanguis laudabilis generetur, alimenta condiantur macere, N. M. croco, cinamomo, ad-

quæ.

## CAP. VII. DE OSSUM FRACT. CARIE & TOPHIS. 727

ditis herbis aromaticis : videntur acida, salina, & indurata, nimis muria, fixa, viscida, ac glutinosa. Potus sit vel calidus Theæ vel Capheæ, vel salvia, veronica, betonica, & bene lupulata, quia non facile acescit &c. vel cerevisia defæcata ac dulcis, inter quæ Anglica, Bregensis, & quæ tardius acescit, præ aliis palam meretur Brunsvicensis duplex, nam eum nautæ lineam sive æquatorem nuperimè transierunt, omnia potulenta, quibus naves instructæ erant, acorem contraxerunt, sola Brunsvicensi excepta, quæ & saporem & odorem servavit. Vinum generosum, Gallicum ac Hispanicum moderate sumtum concedi potest, vel si lubet aliud vinum infusione ocul. &c. vel The volatili alteratum alimur.

Motus sit moderatus, quies enim in Fractura Ossium summum existit remedium, quia sola ipsæ curantur Fracturæ. In somno & vigiliis aurea servetur mediocritas, alvus & vesica officii sui sint memores, ne excrementa in corpore cumulentur. Animi pathemata, ut terror, uxor, exandefectia ac tristitia tanquam Patroni Acidorum & Coagulatorum Succorum, procul abesse jubeantur, contra animus servetur pacatus spe convalescentiæ erigendus.

*Cura Pharmaceutico-Chirurgica secundum Galienum in Ossium Fractura.*  
§. 13. His prælibatis ipsam curam Pharmaceuticam & Chirurgicam transicamus, unde ægrilus levamini perscipiunt. Galeni in Fractura Ossium eò respiciunt, si Ossa sint tenella, ut extensio ab uno, utraque manu facta sufficiat: si verò fuerint dura, non tantum à duobus viris, sed etiam fasciis, circa articulostrahi, & ut reparentur, extendi docent, quam tamen extensionem primis statim debet fieri debere suadent, nam tertio, aut quarto, dum adest inflammatio, fieri eam minime licet, sed novum expectant: primoque inflammationem removere student revulsione instituta per venæsectionem, aut cucurbitulas. Signa Ossis repositi Ipsis sunt: quando dolor est sublevis, & contra recipitur ab ipso Patientē quædam quasi voluptas, quando membrum est alteri æquale, & nulla ad est asperitas aut fovea, &c. tali in statu membra continent & bene deligant, ut callus regenerari possit: Superponunt autem emplastrum aliquomodo refrigerans & adstringens, quale est ad Fracturas rubrum, quod tamdiu relinquendum non esse debent, donec pruritus & dolorem excitet: quod si advertant, tertio die fieri dicunt solutionem: si minus, relinqui posse concedunt ad quintum, sextum aut septimum diem, sed ut tribus Galeni fasciis cum stramineis splenis, aut ferulis ligneis, aliquantulum cavis vineulis & lana bene munitis. Quoties autem solvitur membrum, toties calida aqua fovet usque ad rubiginem, dein iterum superposito emplastro ad Fracturas, vel Diachalciteos cum bolo & sanguine draconis mixto instituunt ligaturam satis strictam, citra ullum tamen dolorem, nam per nimiam adstrictionem fieri dolorem & partis atrophiam observant.

Dum callus incipit fieri, cum augment iis, quæ faciunt ad callum generandum, inter quæ recentent orizum, hordeacea, gelatinas. Membrum sit quietum & satis elatum, ne copiosius humores illuc decumbant. Callum plerumque 40. die confectum esse scribunt, nisi obstitit Inflammatio, dolor, fortis ligatura, squama aliqua ab Ossē secre-

ta, quam prius incisa cute extrahendam esse ajunt.

De crurum Fracturis rectis, seu fissuris, quas Germani vocant *Alag-Brüche* videtur *Felici Tract. Chirurg.* Coxend. & Humeri Fracturæ docta Chirurgi manu adaptari & reponi debent.

Carici Ossium entrationem quod attinet, partem Ossis corrupti tollant, integrum verò conservant. Tollunt verò Os dupliciter, vel manu, vel medicamento, quo irritari ajunt Naturam ad putridi Ossis separationem, quamdiu enim illud, quod est corruptum, demptum non fuerit, tamdiu impossibile esse dicunt ulcus sanari & solidam carnem supercrefcere. Auferunt autem Os vel scalpro exisforio, cum malleolo ut solent statuarii, vel perforant Osteobro fabrilii in tribus aut quatuor partibus scilicet pro percutiendo cum malleolo à foramine ad oramen: agunt etiam aliquando scalpris rasoris. Imprimis totum illud corruptum ablatum esse signum esse dicunt, quando cruor succedit: & tum ab opere cessandum esse monent, inspergunt potius aristolochiæ rot. radic. cum myrrha pulverisita. Sepe etiam Oscariofium adurunt, ut quod corruptum est, omni alimento & humiditate privetur: ablata enim sustentatione, naturam ajunt facilius separare separanda: idem facere scribunt medicamentis siccissima & frigidissima; quale est quod fit ex foliis & semine hyoscyami, cum vitriolo usto coctus, item radix ireos, peucedani, aristolochiæ rotundæ, squama aris, ærugo, aqua aluminis magistralis, quæ sepius Os maledicat, curant ajunt. Crurum abque dolore: Euphorbium juxta costenent inter cetera principatum: sed ita adhibent, ne alias partes vicinas corruptat, miscunt cum pasta ex radice ireos, & ita soli Ossi corrupto applicant, ferro quoque candente Os adurunt: & repetunt unctionem usque dum periciatur opus. Facta unctione Os ab inflammatione vendicant aqua rosarum cum oleo rosar. vel violar. & albumine ovi, stappa exceptis & applicatis: deinde mitigato dolore procedunt ad Ossis separationem, denique sarcoticis ulcus curant.

In Tophis curandis Veteres applicant emplastrum Diachylon cum gummi, cui addunt galbanum & sagapenum cum ammoniaco, vel inungunt oleo amygd. dulc. cum oleo Scorjionum mixto, quando Tophaceam materiam eximere jubent, consumpta materia, carne locus per sarcoticum impletur.

§. 14. *Paracelsi* statuit *Ossi fracto* nihil accideri periculi posse, ac curari sanarique necessario debet à Mumia corporis in carne, ligamentis, medullis, &c. existente, cujus in medullis situm Os & circumscriptum est, à quibus omnibus persanatur. Quandoquidem apertum nil per quod externis accidentibus pateret accessus. Quapropter aptè ligare, naturæ quæ sua requies data, juxta Ipsum, certissimum in istis medicamentum sunt, & indubia cura.

Si tamen ad rupturas accedant Vulnera, per quæ fragmenta quæpiam apparent Ossium à fistulis soluta vel disjuncta, per vulneralia medicamenta jam dicta extrahentia suadet, ut extrahantur, & nullo modo per ferramenta vel alia quævis instrumenta fodiendo eonatur extrahere: nam secundum ipsum vera Mumia potest quicquid est naturæ contrarium elicere, tum quæ semihisulæ sunt, natura per se curat. Membrum

henn liquidem, ubi rectè probeque rursus conjunctum suis aptis ad hoc instrumentis fuerit, ac in temperatura & situ conveniente conservatum, per Mumiam propriam citius multo curari, quàm herbis omnibus fieri queat, ipsius monumenta docent.

Principio ergo *Fracturas Ossium* ut curet, animadvertit, concavis ut instrumentis membra concludens erigat, utque ibi anteriore posterioreque partibus, & quaquavectum liberè possit accedere tangereque. Postmodum vulneralibus ligat medicamentis, & si promptus in eorum usu fuerit, hoc notat, quemlibet viscum nigræ consolidæ, serpentine & aristolochiæ rotundæ rupturas optime curare, mane vespereque superligatum, non usque adeò stricte, singulis vicibus iterum apertis ligaculis recentem & calidum appositum: alia enim medicamenta, quæ per spissadrapp. rotularia, ligacula, vel alius panis sunt, tanquam merè fuilia rejicit, & membri magis ad perditionem, quàm sublevationem facientia. Ligationse tertio quovis die tantum factas, item suffusiones, compressiones nimias, & similes vanas operationes contemnit, quia inde accidentium producuntur centenaria. Verùm uti vulnera forent, & quibus *Ossa* prominerent, erigit, ac ad modum Vulneris curat.

*Ossium  
Cariæ.*

*Cariosa Ossia* à *Paracelso* curanda occurrunt, nec linea vel alio instrumento atterit vel frangit, juxta *Carnificum* tonsorum vulgatum modum, sed tantum ea mundat, & si usæ vel inflammata fuerint, extinguit: deinceps facile carnem *Ossis* superinducit. Remedium ipsius quo *Ossa* crota, inflammata &c. restituere solet, est sequens:

℞. Olei de *Campora* per albumen ovi præparati,

Olei *Caryophyllorum* aa. ʒss.

Mixtis invicem juxta reliqua remedia utitur felicissime.

*Tophorum* *Tophorum* curationem in eo consistere ait *Paracelsus*, ne ea quæ fixa sunt intransmutationem deducantur, liquidem omnia transmutata in membris, non autem in mineralibus subsistunt, quantum ad fixa attinet. Duo mineralia unâ esse arguit, aliud dulce, aliud austerum, sic & juxta cum duæ essentia: se mutuo comitantur, quæ nisi resolvantur, omnem curationis spem præcludunt.

§. 15. *Helmontius* in *Fractura Ossium* eò respicit, ut *Ossa* iterum consolidentur, quæ fracto poro oleo quæunque ætate consolidati existimant. Lapidem quoque *Ossifragum*, spiritu acetæ resolutum & interne assuntum dono appropriato ac specifico sanare *Fracturas Ossium* scitib. Arcanis enim suis in omnibus fidet, in quavis ergo *Fractura Ossium* radice symphyti & lapidem osteocollum alius præfert *Chirurgus*, eum juxta ipsum *Arehæus* isdem sedatus & ad officium vocatus, ipsemet sanationem istarum *Fracturarum* quovis artifice melius & accuratius peragat.

*Cariæ.* *Cariem Ossium* oleo *caryophyllorum*, succini aliusque acidum absorbentibus curandam fore promittit.

*Tophorum* Ad *Tophos* curandos *Author* commendat suum oleum *Strumarum*, item pinguedinem leporis in maxine vestitum, & sanguinem hircinum exterius applicatum.

§. 16. *Villivius* vocat *Ossa fracta* statim re-

ponit, repositaque firmat, naturæque auxilia-  
trices manus confert ad eorum conglutinationem perficiendam, geminam succi alibilis crasin conservando, vel alteratam corrigendo, & si opus fuerit, ejus penam augendo: si pars fracta inflammata fuerit, prius inflammationem curat, & deinde totus est in curâ huius *Fractura*: reposito autem osse partem illinuit sœritu vini, cui infusi fuerint flores hyperici, vel cum eodem cui admixta fuerit tertia pars spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem. Si contusa fuerit pars, inungatur illi mel, cui admixtus sit spiritus vini, illinatur etiam locus fractus ol. Hyper. & Lumbicæ, ter. pauco oleo Jellill. terebinth. & pauco ol. ros. marin. acutus. Applicetur deinceps parti affectæ emplastrum ex resina alba, terebinthina & cera, quibus addatur pulvis radicis barbæ hirci. Internum medicamentum interna præscribitur ad callum promovendum, tum ad symptomata præcavenda, & inter alia eminere asserit rorem marinum, folia agrimoniz, consolidam majorem, Geranium, Robert. Sabinam, & lapidem *Ossifragum*.

Si *Cariæ Ossium* juxta ipsum altius non pene-  
traverit, essentia *caryophyllorum*, aut ol. Guajaci illam tollere conatur. Si verò profundius serpsit, ferro candente illam corrigit, illudque sæpius applicat, ipsiusque ministerio eo usque nititur, donec nulla fœcis, nullusque alius corruptus humor exeat. Ablata enim *Cariæ*, parti affectæ inponit pulverem ex radicibus aristolochiæ, Iride, myrrha, &c. compositum, remediisque vulnerariis calli generationem adjuvat.

*Villivius* ad *Tophos* Nodosque curandos nullo  
peculiari utitur medicamento, in iisque tollendis alios *Autores* sequitur imitaturque.

§. 17. *Sylvius* in *Fractura Ossium* à reliquo-  
rum methodo observanda, ne unguem latum se-  
cedere videtur, sed cum iis consentit.

In *Cariæ Ossium* curatione eò respicit, omnesque vires intendit, ut tota pars *Cariæ* affecta, utpote mortua, separetur à sana & viva, cumque necesse elegerit, nec diu subsistere potest pars *Cariosa*, quin eandem itidem inhecat, & ad corruptionem similem paulatim deducat. Difficile autem esse notat ipse, aut igne ferroque ignito, aut medicamentis convenientibus partem *Cariæ* infectam separare ab integrâ, postquam per cuniculos in sanam se infusum Venenum, imprimis Venericum non quiescens, sed eundo vires acquirens. Sicut manifestum est in omni *Cariæ Venericæ*, ejus cautela non sinitur aut infringitur ab *Ossis* ipsa, quod corrumpitur, sed indies augetur & acrior fit, unde tandem, ubi ad summum pervenit, *Cariæ Venericæ* sic incurabilis. Difficultatem autem summam in *Cariæ* curanda etiam inde pendere arguit, quod remedia ipsi curanda convenientissima sæpenu-  
merò suis convenienter applicari, usurparique non possunt. Partes namque *Ossibus* vicinæ, Membranae, Tendines, nervi, & similes ab actuali cauterio simul læduntur & intolerabiles dolores patiuntur. Augeri autem idem malum existimat, quando sæpius applicantur actualia illa cauteria, quæ unâ vice parùm præstare solent, ut sæpius iteranda sunt, si laudabilem effectum producere debeant. Cætera remedia, quæ *Cariæ* consumenda aut tollenda adhibentur, pro invalidis habet, quia non satis penetrare possunt

ad

ad quævis loca, in quæ se insinuavit venenum Venerum in Aciditate acris consistens ac penetrantissimum. Acidi acrimonia debellant vel salia fixa tam fixa, quam volatilia, vel spiritus volatiles, vel olea, vel aqua. Salia verò lixiva, fixa, quæ acidi sunt inimica, pura & sola si fuerint, in superficie hærebunt, nec aliquid laudabilis magnivè præstebunt, sin aqua diluantur, simul partem aliquam virium suarum amittent; si cū spiritu volatili conjuncta fuerint, penetrabunt quidem quævis ratiō facilius, operabuntur autem simul debilius. Si cum oleo in saponem mutata fuerint, debiliora sunt facta, nec facili ad interiora penetrant, quibus si aqua admisceatur, ut diluantur & ulterius penetrare possint, reddentur simul magis inertia. Ad eò ut inter omnia venenum acido-acre Cuius produens corrigitia & emendantia remedia, post Cauterium, Actuale, nullum præstantius novit; secundum verò locum assignat salibus volatilibus, ut sit satis debilibus ad tantum & tam grave malum curandum. Veram tamen rationem curandi reputat, ut Os infectum, quoties tui licet, totum tollatur, postquam vix unquam siliū potest in ipso Caries, aut pars Ossis corrupta separari à sana. Lauslat maxime in quacunq; Ossium Carie salis volatilis usum, quem laudabiliter fore dicit, si quis salia volatilia plurimum generum produens corrigitia & emendantia remedia & attentam Experimentiam seligat. Usurpanda esse quoque monet in Ossium Carie curanda Turam, Lithargyrium, Cerussam, imò Guajacum in pulverem trita & inspersa: quæ omnia juvant, quatenus acidum in se conceleant, & ab Ossibus allectum avertunt, ne ulterius serpere, ac ipsa corrumpere pergat. Hæc igitur esse blandissima curanda Carie remedia affert, proximali verò esse sive media salia tū volatilia, tū fixa, tanquam Cauteria potentia, potissimum verò esse Cauteria Actuale ad hæc statuit, quorū ope nisi curari possit Caries, habet ipsam pro incurabili.

*Excrecentes* in variis partibus sub membrana Ossis in vestiente, Periochio. *Tuberositates* insignes carere solet per emplastra & unguenta Mercurialia, imprimis universalem curā ope siliivationis infliccam. Si n. Ossis infecerint, & materia pituitosa viscidior illas constituat, vix curatas fore ait, nisi aperto Tumore, atque sublato sentim humore viscido, tum per gummatā aromatica, tum caustica potentia & actualia; perseverando tandem in corundem usu, donec Os mundatum & liberatum ab omni phlegmate observetur, atque tunc pergendo ad consolidationem per remedia Chirurgica vulgò nota.

§. 13. *Caries* Ossium Fracturas curari promittunt, solo Chirurgi manu, Ossia fracta in pristinum restitucndo situm & figuram. Dein Emplastrum quoddam ad rupturas imponendo, aut cataplasma ex radice symphyti, quando se. Fractura existit simplex absq; ullo vulnere, contusione & inflammatione, cum pessimis verò hisce conjuncta majorem repollicere apparatus fatentur, & non modò remedia interna sudorifera, & post hæc volatilia ex Tinctura hyperici, & tū lumbricorum, Tinct. bezoard. & C. C. volat. propinanda esse, sed per incisionem frustula Ossium separata eximenda, & partium carnearum & membranarum aut præcavendam esse corruptionem per spiritum vini camphoratū, crocatum & aquam calis vivæ, aut si hæc præcaveri nequeat, per suppurationem eadem in parte sanā & integra esse separanda; tū por-

tiones Ossium fractæ uniri jubent, eam quæ extra protuberat, manu in situm debitum, ceu dictum, rēponendo, à Chirurgo debite lorando, & impositis fasciis aut emplastro glutinatorio imposito penitus curando.

*Ossium Carie* Curam quod concernit, quando illa non valde accrevit, ne illa amplius incrementum capiat, omni studio prospicere mandant, adhibitis absorbentibus & particulis acutis erodentes frangentibus, pulveribus sc. cancrorum, ex cineribus lumbricorum & camphora compositis. In Carie verò profundiori ipse euphorbium commendat Carici inspersum, vel ferro candente ipsa Ossia Carie infectæ exuri jubent.

*Tophorum* remotionem tentant variis medicamentis exsiccantibus, ut aloë, mastiche, sandaracha, alumine ustio, sale fini, vel etiam aliquando ad fortiora accedunt, & commendant acida corroliva, spiritum salis, sulphuris, nitri: vel ungu. Egyptiac. vel cum melle & tus matricalis misceatur & imponatur; cineres quoque fraxini, vel torismarini magnipendunt impositos.

§. 19. *Nostam* nunc *Fracturam Ossium* curandi methodum referemus. Primò curam pharmaceuticam tradamus.

Omne quod ex pharmaceutica curatione promittere nobis possumus? auxilium, in calli sufficienti generatione, eoq; mediante Ossium disjuncturum consolidatione promovendis situm esse arbitror; utrumq; quidem unanimiliter Veterum quàm Recentiorum consensu solius naturæ circulantis est opus, & medicamenta vix aliud efficiunt, quam quod obstacula, consolidatione impediencia removeant, adeo ut non nisi latè admodum Catognatica, vel parotica vocari debeant; Sic ex. gr. de lapide Osteocollæ, quent & ossifragum nonnulli nominant, quas non legimus observationes? quam non ejus in consolidandis ossibus gignendiq; callo vim deprædicant? Lapis enim absorbendo virtutem suam præstat, ac Corallia, ocul. C. C. ust. acidum consolidationis ac sanguinis fluiditati inimicum potenter absorbendo humores crassos fundendo, tubulos renum stimulo, aut obstructos referendo, diuresin maxime promovere, sicque notabilem feri quantitatem unā cum salibus & M. S. eliminare, quo tunc eò felicius calli generatio, impediencia sublatis succedere possit. Solent autem lapidem osteocollam in jusculis, Helmontius in aceto, alii in vino, alii in aqua destillata, v. gr. Symphyti, Chæresfolii &c. tradere; sequentem formulā vires non contemnendas aliquando in subiecto seniliæ fœminæ nempe Uffel exeriulæ recorder.

*Osteocoll. pp. 3j.*

*Grui diaphor. 3j.*

*Croci gr. vj.*

M. Dentur singulo vespere 3ij. in 7 Cerasor. Dantur adhuc alia medicamenta, quæ ab autoribus ad fracturarū consolidationem & novi calli generationem commendari solent, ut sunt communiter dicta catognatica, quibus omnia antica & acrimonia corrigenia, diaphoretica, sanguinis duplicem motum conferantia, ac poros cutis apertendo, noxia consolidationis saliva simul eliminantia accenseri possunt, ut sunt decocta & essentie Ignorum Guajac. lixiv. cont. & radagimont. aristoloch. fabarici, Jalappæ, stanicula rub. herb. i. cord. veron. card. ben. cent. mui. veron. betonic. oact. i. virg. aur. hyper. flor. sambuc. lip. c. ancr. r. japon. mu. m. oss. dracon. C. C. ust. fang. hirc. juccinum, liq. C. C. succ. Anrim. diaphor. bals. naturalia, myrrha. aloë, Essentia succini &c.

Decocta vulneraria moderatè assumpta aliis palam præcipiunt, imprimis si saccharis non fuerint corrupta; purgantia hic exulare jubeo, verum aptis ali-

Zzzz

144

bacc. lauri.

Juniper. aa. ʒij.

Δ. vit. ʒv.

argollæ. lbij.

M.

Profuisse etiam vidimus fatus paratos ē capite mortuo cerevisiæ, vel ex jam dictis herbis, eisdem membrum contractum tepido immergendo & fovendo, cui finit etiam sicculi ex nervinis parati, & spiritibus volatilibus irorari, vel sicci quoque applicari possunt, huc referri merentur infusus in siliquis uvarum, item formicarum grandiorum acervo, vasi cuidam indito, quibus aqua calida infusa fuerit. Emplastra ex gummi galban. commun. bdell. plurimum sal. volat. in se continentibus haud negligenda ūnt. Item Empl. Diaph. Myrs. de Theâ, de Labdano &c.

In his affectibus præ aliis conducunt Thermae, quarum mineris tutò se concedere possunt ægri, imprimis Embelsenis fonticulus, delicatula martiali qualitate & vitriolata dulcedine (vitriolum enim pars essentialis ferri est,) pollens pro potu, & Thermae illæ Sulphureo-Martiales pro balneo eligantur, plures enim contractos & à Colicâ pareticos factos hisce curatos vidimus; Equidem reparandæ Valentudinis aquæ minerales, si minere bene constant, multum præstant, & sæpe plùs, quàm è longo medicamentorum usu in eos redundat emolumenti, qui potu vel lavacro illarum utantur; hinc Sacrae pricis dictæ, magnificis & sumptuosis ædificiis honoratæ; at non sine præmeditatione ex judicio medicinæ operam dantium, & earum minerarum exploratione accuratâ, atque cautelâ abusu, licentiz immoderate victus libidine, administratione contrahatur, quàm emolumenti; quin potius sollicita illarum mixturæ certæ portionis & quantitatis, & temperamentorum seu morborum diversitatis curiosi defectu habenda est ratio, thermis & acidulis festurientibus, si deficiant, facillimè artificiales substitui poterunt.

in Luxatione.

Nunc curam Luxationis videamus: si unquam, certè in juncturarum seu ossium positione ipsi Chirurgi quandoque suam produnt ignorantiam, cùm non luxatum pro luxato, non repositum pro reposito sæpius habent, quod inde fit, quoniam verum ligamentorum & tendinum situm ac texturam ignorant. Quippe os semel è suo acetabulo elapsum reponi nequit, nisi in ligamenta partis attendas. Tota certè ars Chirurgica consistit in accurata & mechanica cognitione œconomiz animalis, quam nonnisi in Scholis Cartesiorum vel rationalium Medicorum ac Chirurgorum addiscunt, hinc merito jure Chirurgia Rationalis appellatur. Non negamus in luxatione curanda opus esse convenienti manuali operatione, cujus tamen fundamentum est ipsa œconomia animalis vel si mavis Philosophia Mechanica. Chirurgia enim pertinet ad Medicos tanquam Dominos, Practica autem ad Chirugos tanquam Medicorum ministros. Os ergo semel è suo acetabulo elapsum restitui nequit, nisi, ceu dictum, in Ligamenta partis oppositæ curas intendas, hæc enim valde distenta & elongata magis, illa verò in parte, per quam os elapsum est, contracta vel breviora erunt: hinc summâ attentione est cautela, ne extendendo membrum lu-

xatum his vel illis ullam inferas injuriam, sed opera potius impendenda est, ut articulus accuratè per eam viam, quâ elapsus est, regredi possit, si enim hic erraveris, ipsam repositionem impossibilem & malum incurabile reddes, unde postmodum tumor, inflammatio, ingens dolor & quandoque abscessus excitantur, prout id quotidie experientia aequè sapientum ac stultorum Magistra comprobatur. Quodsi infantibus repositio ad plures dies differatur, penitus illa impossibilis erit, quoniam succi, imprimis lymphæ in acetabuli vacuum copiosissimè transudans, & in mucilaginem tephaceam vel cartilagineam excessens, omnem elapso articulo præcludit ingressum, ceu id in puellâ 5. anno-rum hac in civitate observavimus.

Extensio etiam vix in omnibus Luxationibus necessaria est, nempe (1) ubi ligamentorum relaxatio nimia, nec (2.) in subluxatione; sed tunc demum, ubi musculi ossi luxato implantati hoc versus suum principium retrahunt. Quod si verò conveniat, quàm maturè erit adornanda, antequam inflammatio superveniat, ejusque instrumenta varia sunt, quorum intuitu duplex reponendi modus ab Auctoribus constituitur, *Palestrinus* nempe, qui solis manibus fit, & *Medicus*; qui iterum duplex, vel *methodicus*, qui habenis, icalis & foribus, aliisque utensilibus peragitur; vel *Organicus* qui machinamentis diversis perficitur; de quibus videatur *Hipp. Param. Scultetus*, & alii, illius Galii machina in hunc finem excogitata antefertur machinæ Germanorum, quarum icon in *Atlis Ernditorum Lipsiens. Ann. 1683. Menjes* annuario videre est.

Quod si ergò sufficiens videatur extensio, quod judicatur, si luxatum os acetabulo suo è diametro opponatur, & si membrum idem sano aliquando longius appareat, restitutio, *Mochie-ostis* dicta, debet fieri, quæ facillimè accidit, si os luxatum manibus suis ita dirigat, articuloque adaptet Chirurgus, ut musculorum tractus observet, ac extensione sensum laxatâ, illud quasi sponte suâ sedem ordinariam repetat. An autem bene restitutum sit membrum, dignoscitur ex eisdem signis, quæ ossa fracta probè coaptata restabuntur.

Deligatio, quia tam topicorum applicationem, quàm falciationem ac ferularum impositionem involvit, medicamenta in principio convenientia sunt, quæ roborando dicuntur operari, uno verbo illa, quæ sub principium fracturæ etiam admovebantur: si ergo ossa luxata, reposita & succi crassiores interceptis illapsi internis diaphoreticis discussi fuerint, externè instituit variis fortibus ex herbis majoran. sal. chamædr. flor. sambuc. anth. Δ. in spiritu vini maceratis tepidè adhibitis, nec non spiritus vini, C. ♀ regin. Hungar. spirit. matricar. aliquoties illiti; sunt qui Emplastra magni æstimant, seq. ergo applicari potest:

R. Syrac. calam. ʒj.

mastich.

succin.

Benzoi aa. ʒß.

bacc. lauri ʒvj.

charyophyll. ʒij.

N. M. ʒij.

cera nova ʒv.

resin.



# CAP. VI. DE LIGAM. STUP. LAX. NERV. CONTUS. 721

resin. 3j.

ol. myrtillor. 3ib.

ovorum 3b.

succi chelidon.

cicutar. aa. 3b.

M. f. l. a. Empl.

Ad impediendam inflammationem fortiter adstringentia intermittenda sunt, sed potius tunc resolventibus, atque nervinis est agendum, verb. gr. Spir. matric. vin. camph. ol. lumbricor. terræ, vulpin. Peruvian. aut instituatursomentatio ex scord. absinth. herb. sal. rorismar. fl. ros. balaust. bacc. Juniper. lauri, sem. cumini &c. quæ sc. tendino ærum fibrillarum rigiditas deligatione introducta aliquomodo corrigitur, spirituumque animalium influxus restituitur.

Quod *Enfasciatio*em attingit, fieri potest hæc simili modo ac in fracturâ retentivâ atque expulsiua simul, seu eadem per unam fasciam, si scilicet articulus ad prolapsum non adeo proclivis, seu tribus, pari ratione ac in fracturâ articulum fieri solet; ita tamen ut deligationis principium fiat in latere, per quod os præcedit, idem etiam fascia semper firmius constringatur; splendorum verò, quæ iis supponuntur, plura sunt, non tantum melioris firmationis & retentionis gratiâ, sed ut juncturarum quoque cavitates & inæqualitates repleantur, pro fasciarum commodiore injectione, horum tamen crassius & maximum illi articulo apponatur, per quem os luxatum prodibat, ne hoc extra sedem suam adeo facile elabatur: de cætero si membri ratio hoc patiatur, & inflammatio non impediatur, ferule imponantur, observatis illis circumstantiis, quas alibi indigita-

bimus. Restitutos articulos quiete & emplastro nervino jubeamus corroborare, optinere ergo articuli luxati post repositionem collocentur, ut melius firmantur, ut non rursus elabatur, sic brachium repositum ad pectus teneatur in fasciâ, pedes verò in situ optimo servantur, & semper commoda ac tempestiva fiat religatio, hinc vulgò dicitur renovatio deligationis ac ejusdem duratio. Quoad renovationem fasciationis, nisi circumstantia aliqua contrarium urgeat, scil. dolor ac fasciarum nimia restrictio, sunt, qui ante 6. & 7. annu diem hæc non solvant: sed me iudice periculosum est, omnia sic recta relinquare, melius enim esset, ut Chirargus quotidie inspiciat, numne Gangræna aliudque malum acciderit. Nuper feminam quandam ita in deligatione reliquerat Balnearior, cum Empl. tolleretur integra tibia sphacelata fuit, & matrona ad plures abiit.

Durationis tempus vix specialiter determinari potest, nisi dicamus, tunc demum tollendas esse fascias, si articulus sufficienter firmatus observetur, quod in articulis minoribus, ut digito, die 14. in mediocribus brachio ac tibia circa 20. in majoribus verò humero, scapula ac femore, vix intra 40. contingere solet. Quoniam autem pro diversitate subjectorum, regionum, ætatis, anni temporum, roboris, majore, ac minore, ligamentorum tensione, Luxatione recenti & veteri magis articulum quoque robur modo celerius modo tardius restituit, tutius illi agunt, qui supradictis diebus aliquot adhuc addunt, ac demum vinculis sublati ægrum monent, ne membrum statim motibus vehementioribus exagitet.

Dein ut rigiditatem fibrarum tendinosarum emendare laboret per sequens aut simile linimentum.

¶ Ol. lumbric.

Terebinth.

hyperic. n. d. aa. 3j.

Balsam. Peruv. 3ib.

ol. mastich.

vulpin. aa. 3ib.

bals. nervin. 3ij.

M.

vel cum ∇ Regin. Hungar. spir. topic. vin. camph. matric. artus illinantur.

Si membrum luxatum rite restitutum fuerit, ex signis sequentibus patet, si nempe in figura, magnitudine, longitudine cum parte sana correspondet, & nullus dolor amplius percipitur, ac membrum moveri potest.

Atque hæc de deligatione simplici, nunc de compositâ notandum, quæ sc. inflammationem, dolorem, spasnum, callum, vulnus, fracturam aut ligamentorum laxitatem comitem habet, cum pro varietate horum affectuum atque symptomatum curam Luxationis aliquo modo variare conveniat, quippe si dolor, tumor atque Inflammatio urgeant, & quidem firmam repositionem, his certe ante omnia succurrendum est, nisi articuli luxati restitutio mox tentetur ex partium nervosarum & tendinosarum fibrillarum violentiore distensione, & irritatione, convulsionibus, spasmus, aliisque atrociora mala, imò ipsa mors producantur, quare Luxationes non parvi facendæ sunt: Hinc posito membro in medio minusque doloroso situ, applicentur ressolventia cum Inflammatione atque dolore mitigantia, qualia sunt spir. matricalis, ∇ Regin. Hungar. spir. vin. camph. Balsam. nervin. aq. calc. viv. additâ semper camphorâ, item cataplasmata aut foci, quibus simul admiscenda sunt anodyna, scil. herb. malv. parietar. rad. alth. flor. chamomill. verbasc. lambac. sem. lini, farin. fabar. &c. Sin repositionem denum symptomata prædicta obviantur, ante omnia vincula statim laxentur, ac recensita applicentur remedia.

Si vulnus Luxationi combinetur, in maximo æger versatur periculo, inflammationem, spasmus, imò Gangrænam & mortem sæpe infert, præsertim in juncturis majoribus, live membrum restituitur live secus: Unde Chirurgi prudentiores suavis *Hippocratis* ab eismodi Luxationum restitutione abstinere, imò dicente *Celfo*, nec minorum articulorum repositiones absque prædictione periculi suscipiendæ sunt, ita quidem, ut si reposito articulo inflammatio major ac spasmus superveniat, melius à quibusdam annotetur, si sine magna violentia hoc fieri valeat, articulum ex sedē sua iterum exturbare. Ante omnia itaque in Luxatione membri majoris ratio habeatur Inflammationis atque Convulsionum metuentarum, hinc in media pauciter minusque dolorosa figurâ membrum collocetur aut suspendatur, eadem applicando topica appropriata cum anodynis. Minores verò articuli aliquando ante inflammationem interdum illâ topica demum restituntur, & quidem extentione moderata, quoniam validam non ferunt: & in restituti sunt, inflammationem atque convulsiones prohibita apponantur.

Fractura si Luxationi jungatur, affectus san-

Yyy

1 articu-

periculosissimus evadit, quæritur ergo non immerito, Utrum huic an luxationi prima manus sit applicanda. Quamvis in praxi hodiernâ & communi prius membrum luxatum reponi, ac postmodum demum Fracturæ rationem haberi dicunt, quod si tamen ante hujus curationem articulus sine periculo restitui nequeat, primò Fractura: & postquam tempus generationis calli accedit, Luxatio curetur.

Sin callus in Juncturâ ante vel post repositionem oriat, & quidem tephaceus, ejus curationem frustranea erit; ceu in Virgine Limburgensi observavimus, cui ter vel quater iterum ex sede suâ elapsa fuit ulna, ejus restitutio semper frustrata tentabatur. In molliore verò successus desideratus aliquando contingit. Articulus ergo semper foveatur vel aq. Regin. Hungar. spir. matricel. vel decoct. ex herb. malv. abiynt. bis malv. majoran. rad. althææ, cucum. asinin. bacc. Juniper. lauri aliisque nervinis, ex quibus cataplasma parari potest. Item Empl. de Gummi, de Theâ, de cicutâ, de ranis cum G. Cinnabarin. nostr. conducent: hic asterisco notandum est, quod plures homines emplastra nullatenus ferre possunt, sed statim inde inflammationem ac pustulas in cute nascuntur, quia statim ab iis tubuli obstruuntur: sunt etiam qui pinguiâ ferre nequeunt, alii verò cum successu tolerant oleum pingui. human. remedium aliis egregium & singulare in contracturis partium & luxationibus articulorum, pro consolidationis promotione. Suffusus quoque indistinctus ex Gummosis mastich. succin. thure aliisque resolutentibus & cum alibi formulas tradiderimus eas repetere tædet.

*Scultetus* articuli usionem commendat, eam omnibus aliis remediis anteponendo hujusque administrandi rationem tradit *Armament. Chirurg. pag. 141.*

Quoniam ultimum non raro à deligatione membris luxatis pruritus molestissimus accedit, pro illo sopiendo, religatum membrum perfundatur aut fomentetur aquâ tepidâ communi, vel Sale Armoniac. aut marino maritatâ. Et cum ubi vis particularium Luxationum mentio-

nem fecerimus ea hic repetere non libet, ne Lectori nauseam, etiamen bisocam offerendo, pariamus, & generalia hæc dicta facile ad eam specialem applicari possunt.

Contractura tendinum solet etiam ut plurimum accidere in Fractura ossium male curata, quando scilicet musculi aliquandiu contracti sese iterum extendi non patiuntur, verum membrum semper contractum relinquunt. Causa hujus quoque mali Chirurgi incuriæ venit adscribenda, membrum aliquod nimis diu incurvum ac immotum relinquendo hoc ægro contrahit, cum potius post fracturam passim singulis post tertiam deligationibus paululum flectere, & leviter iterum extendere illud debuisset. Musculorum namque sic contracti tendines talem pororum fibrarum suarum hinc subeunt mutationem, ut qui antea rotundi erant, hæc diuturna contractio ovals evadant. Verum enim verò humores, qui aliis musculos hosce liberrimo motu pervadebant, iisdem diutius contractis, venisque simul compressis multò tardiori cursu, quam antea moventur, imò sere subsistere coguntur. Particulæ ergo eorum crassiores omnium primò subsistentes, forte sese inter poros illos tendinum ovals insinuant, eosque replendo in figura illa ovali conscrvant, tandemque successu temporis quibusdam levioribus ac mobilioribus, quibus antea adhuc sociatæ erant, abeuntibus, sedem ibi adeo fixum sibi figunt ut vix ac ne vix quidem se postea expellere patiantur. Hinc tendines manent contracti, atque breves, duriores, nec pr. us iterum extendi possunt, nisi Materia hæc ex poris eorum expulsa, illisque naturalî figuræ rotundæ restituit. Ad quod sustinendum sapè multò opus est labore hinc, v. gr. autores luadent, ut ægri, si hæc contractura sit in brachio, sapius pondus quoddam gestent in manibus; vel si in pedibus, is tale quoddam ægro sedente appendatur. Medicamenta verò parti applicentur reserantia, resolutentia ac emollientia ut ritè ratiocinatur

*Celeberrimus Dn. Hoffmannus P. Halensis,*

*Amicus noster exoptatissimus in disputatione.*

## CAPUT VII.

### *De Ossium Fractura, Carie & Tophis.*

#### §. I.

**A**D Synthefin, operationem Chirurgicam, quæ adducit, conjungit & conjunctas servat partes machinæ nostræ, à quacunque causâ extraordinariè separatas, schola Chirurgica refert inter alia & *Fracturam Ossium*, de qua, ut & de ossium *Carie* & *Tophis* sermo nunc erit.

*Fractura Ossium* describi possunt, quod sint ossium continui solutiones, à causâ violentâ ut plurimum externâ factæ.

*Caries* verò ossium vel Pædarthocæ describitur, quod sit corrosio ossium à succis æterbis & corrosivis viscidis proveniens. Imò *Caries*, nostro judicio, nihil aliud est, quam ossium mortificatio seu Gangrana, sbris enim tendinis cor-

rosi & discissi, necessario ejusmodi mortificatio oboriri debet.

*Tophi* sunt tumores duri, & tactui tenentes, interdum dolentes, in ossium medio enati, à viscidis succis ex acore vitioso ibi imperium sibi sapiente coagulati, exorti. Tophi etiam appellantur Nodi, seu Tuberositates seu gummatæ Gallica, vel aliz partes lapidosæ & ferro quasi renitentes duriciem inducentes. Ejusmodi Tophi hinc inde in corporis nostri observantur partibus, imprimis circa oia; si oleamus in *Ephem. Germ. Ann. 9. & 10.* quod membrana & arteriæ in ejusmodi Tophis fuerint mutata. Sic quoque Celeberrimus *Dn. Drelincourtius* arteriam descendentem potissimum Itacæ variis in locis totam in lapideam indurasse notavit. Nos in puero Dizeni vidimus unum digitum & quidem

*Descriptio Tophorum.*

*Descriptio ossium Fractura.*

*Descriptio ossium Carie.*

## CAP. VII. DE OSSIUM FRACT. CARIE & TOPHIS. 723

quidem medium planè in duritiem versum: sic etiam Lugduni Batavorum vir quidam Curiosus manum lapideam monstravit. Confer *Celeberrimi Franci Lapidicinarum*. Podagricis ac Lue venerea affectis Tophi hi solennes esse solent.

*§. 2. Pars affecta* horum affectuum sunt ossa: ut ergo ipsorum conspectio & textura nobis constet, paucis in ipsorum constitutionem inquiramus. In animali corpore plures reperiuntur partes, quæ ossium indolem participare videntur, eò quòd æquè dura non sint, atq; illa, & his mundis mollia sint, per quæ Cartilaginee indigantur. Sicuti tendines temporistractum in Cartilaginee convertuntur, ita etiam cartilaginee in ossa abeunt. Si ergo novimus Cartilaginee nihil aliud esse quam fibrarum tendinosarum compagem, ex eo quòd interdum tendines in cartilaginee nuntientur, inde necessario judicare debemus, ossa tantum composita esse ex fibris tendinosis, quæ postquam indurata fuerint, in cartilagineam usque consistentiam, denique in substantiam ossium indurescunt. Observationes, quæ in fætu ossibus instituntur, veritatem istam meridiana luce clariorem exhibent. Re ipsa permixtæ in illis animadvertuntur fibræ tendinosæ, & nominatim in cranio, in principio membranae solum ex fibris tendinosis contextæ speciem refert, cartilagineum deinceps devenit, demum in os penitus facit. Quibus ita pensatis nullum superesse potest dubium, quin ossa sint congeries fibrarum tendinosarum, quæ ita firmius junctæ ac oppositæ induraverunt, ut duritiem ossis adepta fuerint. Fibræ tendinosæ indurantur ex facto in se temporis tractu alcalicorum volatilium infusio. Fibræ nervæ illarum cavitatum spiritus animales infundunt, & sic subtilius per poros avolat, & crassius remanet; ita ut fibræ istæ sint ex tempore alcalicis volatilibus sulphureisque volatilibus refertæ; dum videntur sulphurea, sub cartilagineis formæ apparent, sed simul ac sulphura abundante factæ, sive à fibrarum nutritione, sive per poros avolando, sive se comminendo, Ossium faciem exhibent. Inde fit, ut nullæ sint partes in corpore animales, ex quibus tam copiosum sal volatile elici possit quàm ex Ossibus.

Denique observantur Ossa à membrana cuncti, quæ Periostium cognominatur; Membrana ista adeo arctè Ossibus adhæret, ut quibusdam in locis ab ipsis nequaquam avelli possit, nisi eam scindendo sive dilacerando. Cum illa membrana attentius consideretur, ex triplici partium genere consistere videtur, ex multis sc. fibris tendinosis, plurimis ramis nerveis, & aliquibus arteriis & venis; ita ut omnibus ritè perpenfis conperiatur Periostium nihil aliud esse, quàm contextum fibrarum tendinosarum Ossis, quorundam nervorum, & aliarum arteriarum venarumque.

*§. 3.* Quoniam Medicus ac Chirurgus curam non aggreditur, antequam cognoverit, quæ curanda sint, de signis & hic agere necessum est.

Signa ergo *Fracturarum Ossium* sunt vel communia vel propria. Communia observantur, si sc. Fracturarum occasiones atque causæ præcesserint, & æger totum aut adstantes simul strepitum quandam perciperint: Dein causam illam dolor atque inflammatio ingens mox excipiat, postmodum si membro inæqualitas notabilis

hinc introducat, & si Ossium extremitates prominent, aut digito vel specillo in hoc immisso Ossis inæqualitas deprehendatur, ac ultimò, si membri laci alio notabiliter vacillet. In specie verò transversalis seu obliquæ dignoscitur Fractura, si ex contractione membri percipiatur strepitus, aut manu illi transversim supposita hoc incurvetur: dein quando illa cum extremitatibus Ossium recessu accidit, aut hæc fragmenta separata deprehenduntur, aut membri notabilis observetur inæqualitas, i. e. in unâ hujus parte fovea, in alterâ tumor; postea membri motus tollitur, præsertim si à se invicem Ossa recesserint, aut quamvis extremitatibus eorum adhuc sibi contiguis aliquid motus ipsi super sit, imperfectam admodum hic est. Imò ultimo membrum non raro brevius redditur, quatenus recesserint Ossium partem inferiorem in usculi sursum retrahunt. *Asperitas* difficillimè dignoscitur, nisi quòd post Fracturæ causam aliquando tumor atque inæqualitas in parte affecta observetur cum summo dolore. Committunt enim tandem monstrat eadem membri notabilis dolore combinata inæqualitas tumor, imò aliquando particularum Ossis fracti ad digitorum contractionem agitatio, membrique ad motum impotentia: quamvis & hæc difficulter quoque dignoscatur, præter signa enumerata exactione laxa; ut & symptomata ex suis signis judicanda erunt.

*Carici Ossium* quoad *Diagnosin*, sive ulcere *Diagnosin* sordido aut Fistula raro observatur *Carici Ossium*, prout enim ulcus devorat carnosas fibrosas molles partes, sic *Carici* duriores ac Osses. Pus quod effluit ex tali ulcere carioso, est oleum, pingue, ac maxime fetidum, aliquando flavum, subviride, implurimum vero tenue est, & fluidum, & plus materiz effluit ex tali ulcere quàm ex alio, intense quoque, seu dictum, fetet, & sæpe emplastra nigro tingit colore. Caro quoque solet esse spongiosa, mollis & fungosa, & in superficie apparet sublivida pallidaque, est sæpe inflata lach. Quamvis tale ulcus curatum videatur, sua sponte tamen iterum aperitur. Dein ex ipso detecto Osse carioso cognosci potest, si sanguis sit niger, coagulatus, & Os sit inæquale & molle & quasi cavernulis multis præditum, Cognoscitur ergo Caries in Osse denudato, 1. per autophiam; 2. ex materiâ promanante, quæ est tenuis, oleaginosa, flava & graveolens; 3. si ex ulceratio vetustior, juxta *Hipp. Sect. 6. Aph. 4. 4.* si coalescentia ejus difficilior aut post coalitionem denuò rumpatur. 5. Si caro circumstantis spongiosa, flaccida, pallida & livida observetur, 6. si supra turundas aut Emplastra macula nigricans appareat, comprobante hoc per experientiam *Sculteti Arment. Tab. 37.* quibus 7. addunt, si specillo immisso alperitas in Osse deprehendatur, imò hoc ab illo perforari videatur. Quorum tamen posterius itale habet, ut quamvis non observetur, neutiquam tamen inferre liceat, nullam Caricem subesse: testatur liquidum *Paracelsi Lib. 18. Cap. 26.* Quædam Ossa cariola ab igne ita induruisse, ut nullo specillo penetrare, neque trepano perforare illa liceret.

*Tophorum Diagnosin* quod spectat, illi sunt humores duri ac tactui renitentes, aliquando dolentes in medio Ossium producti, & in eadem incumbunt periostio, subinde ipsis dolore nocturnum, ostioscopio gravissimum inferunt,

Yyyy 2 tana

*Fractura Ossium.*

*Diagnosin Fractura Ossium.*

tandem partes molles & Ossâ subjacta erodunt, ipsorum fibras tendinosas corrodunt, dilacerantque, ac sic *Cariem* sæpe inducunt, atque tumunt. Isti communiter, qui Luc Venereâ diu laborant, hoc malo insensibiliter. In Arthriticis observamus etiam ejusmodi nodos Tophaceos raro curabiles.

*Galenicus*  
cum judi-  
cium de  
causa Os-  
sium Fra-  
ctura.

§. 4. *Ætiologia* horum morborum quod attinet, *Petrum* sententia est, Ossium Fracturam oboriri à re violentâ externâ. Cause enim sunt omnia ea, quæ vim habent contundendi, distorquendi, rumpendi, dividendi &c. Fractura enim ipsis est continui in Ossis solutio absq; incisione, violenter extrinsecus à re rumpente, vel contundente facta, ut sunt telum durum & ictus vehemens, tum ipsâ habilitas Ossis, ratione cujus alteram altero facilius diffingi aut retrocedere potest, crassius enim majorem præbet tenuis, quàm tenuis, durum, quàm molle. Ratione quoque ætatis & temperamenti Ossâ variare dicunt, in infantibus junioribus & sæmellis tenuiora sunt quàm in viris & senibus, in humidioribus, quàm in siccis. Proinde tenuiora faciliore Marte frangi possent contendunt, etiam à re non valde durâ, aut vehementi percussione, dura autem non nisi à re validâ vehementiori impetu illatâ. Dicunt Fracturam vel simplicem vel compositam, vel completam, vel incompletam esse, si una tantum pars frangitur, ab ipsâ dicitur incompleta.

*Cariem.*

§. 5. Ossium verò *Cariem* deducunt Veteres ab acrimoniâ humorum Ossâ singulariter impetente & nullis parente.

*Tophorum.*

*Tophorum.* *Tophos* Galenici dicunt Gummata, quia gummam in se continent materiam, Tumores hos duplices esse ajunt, sunt enim alii *Tophacei*, alii non: *Tophacei*, ad mentem ipsorum, sunt ex materiâ lapidosa, & quasi ossâ, dein si materia est mollis, tunc referunt ad speciem atheromatâ. Tumores *Tophaceos* ut plurimum oboriri contendunt circa pedes & crura, in ligamentis scilicet articularum Ossibus, periostis, in quibus sunt dolorosissimi tumores, aliquando in Ossis superficie. Materiam, à quâ generatur hic tumor, dicunt esse tenacem, pituitosam, melancholicam, imprimis crassam, ex quâ fieri *Tophos* haud dubitant.

*Paracelsus*  
opinio de  
causa Os-  
sium Fra-  
ctura.

§. 6. *Paracelsus* Fracturam Ossium non aliter contingere ait, quàm ubi quis accinctus gladio super hunc decidens, illasâ vaginâ frangatur entis, hoc de Ossis pariter intelligendum vult ad pellem & carnes comparando, prout vaginæ gladius, cui solum adhibendum esse remedium jubet. Item sæpius ait frangi Os, medullis penitus illigis. Chirurgus notandum esse præcipit, in qualibet Ossium Fracturâ, dolorem omnem casu proveniente in rupturâ querendum esse. Fracturis plura accidentia contingere memorat, ut sunt calores, frigora, tumores, cruditates, pustulæ, nigri glaucive colores, insensibilitas, putrefactiones, fistulæ, concavitates, incendia &c. quæ quidem ex primo casu non procedere ait, sed ex accidentibus, incurâ vel imperitiâ Chirurgi causatis in hujusmodi membro. Liqueores illos membrum sustentantes esse ipsosmet Medicos scribit, curari enim ait Fracturas à Mumia Corporis in Carne, ligamentis, medullis &c. existente, cujus in

medio situm Os & circumseptum est, à quibus omnibus etiam perfratur.

*Cariem* Ossium Author à sale fieri multis com-

probat rationibus & experimentis, ab ulceribus enim diuturnis tanquam pessimum symptoma accidere solet, imprimis carne venis ac nervis erosâ, Ossatunc quoque cariola fieri notat.

*Tophos* Author ex mellisvis fieri mineralibus *Tophorum* provenire statuit, item ex arthritide sæpissime *Tophos* generari, item ex hic venereâ ac veneno Gallico.

§. 7. *Helmontius* Ossâ acidissimâ dicens *Fracturam* ipsorum fieri à quacunque re externa violenta, & in eo cum aliis consentit. Ossâ & enes facilius frangi sub frigidioribus quàm æstate memorat. *Cariem* verò dedit à latice corrosivo ad Ossâ delato eaque corrodente.

*Tophos* exoriri author existimat à mucilagine *Tophorum*, associata pulveri, mucilagines enim in pislata & corpore suo resolutæ facili juxta eum in *Tophos* transeunt, quos ex mucilagine & pulvere fieri contendit.

§. 8. *Willisus* vult Ossium Fracturam utplurimum à causa externa violentiori atque inligni eorum substantiam discontinue prodeire; nullo modo tamen insicias ire volens à nimis violentioribusque artuum convulsionibus Ossâ quædam frangi ac discontinuari posse.

*Willisus* accusat ut veram *Cariem* causam, *Cariem*, acido-salutem & acres succi alibilibi Ossium nutritioni destinati particulas; quæ ob molem & figuram evaporationi nequaquam idoneæ, & ad nutritionem, ob suam cum fibrâ dispositionem ineptæ, Ossis substantiam corrumpunt, ejus fibras spiculis suis, quæ ipsarum poris desigunt comminutes ac didicentes, atque in minutulas particulas conterentes.

Ossâ ex *Willisio* *Tophis* affliguntur, quando *Tophorum*, scilicet, succus nutritivus particulis acidis scatens atque coagulatione patiens, coagulatus, quas in se continet particulas in angustioribus atque in Ossium superficie positus deponit, evaporatis autem tenuioribus materiei istius remorantibus atque aggettæ particulis, residua crassiora devenit, & à liquore nerveo in substantiam ferè ossiam commutatur. Cum verò in stagnante isto humore alibilibi contentæ essent salinæ particulæ, ossæ ista substantia Ossis superaddita scabra fit, à salium spiculis foris prominentibus.

§. 9. *Sylvius* cum aliis Auctoribus in causa *Sylvii* Ossium Fracturarum consentit, & à causa externa quacunque eam provenire posse non dubitat.

*Cariem* verò Ossium produci statuit ab acido spiritu nimis puro in corpore existente, quod ex præviis sæpenumero doloribus intolerabilibus, & à sola aciditate provenientibus liquet. Acrimonia siquidem à lixivo sale oborta, fixior, juxta ipsum, permanet in eodem loco, partemque affectam videtur urere, dum spiritus acidus partem à se correptam repetitis laniationibus impetere aut lacerare aut perforare judicatur; hinc *Cariem* in Luc Venereâ sæpe cogitentem ab acido venereo artissimè Ossibus sese insinuante, illaque ad internecionem corruptente, deducit, difficultatem curationis hujusmodi pendere dicit, quod venenum sese intimius insinuet Ossibus, quo penetrare nequeunt remedia illi corrigendo apta; nec facili igne sive cauterio actuali superari possit idem malum. Ossâ sana vivra

# CAP. VII. DE OSSUM FRACT. CARIE & TOPHIS. 725

vivere ait Author, in Carie verò Venerea Ossa Carie correpta pro mortuis habenda esse contendit.

**Tophus** seu *Tuberositates* Sylvius inter Litus Venereæ symptomata refert, quæ hinc inde Ossibus sub periclitio accrescunt, & ubique deformitatem in ignem ac inæqualitatem comitem habent. Arthritici quoque solennes sunt. Causam horum Tophorum ipse dicit esse materiam pituitosam, valde tenacem, viscidam ac coagulatam stagnantem, & talem tumorem durum ac lapideum quasi producentem. Has protuberantias, pituitam viscidam pro materia agnoscere, visum evincere dicit, & curationem, quæ perficitur per medicamenta eandem pituitam incidentia sensimque dissolvantia, Mercurium imprimis & olea stillantia, ideoque falc volatilium oleoso pręstantia consuevit. Ab acido pingui visciditatem hanc enormem produci statuit, hinc concurrere ait ad gummatum illorum, Tophorum ac Tuberositatum generationem Acidum, à quo ideo & Luen Veneream deducit.

**Caries** §. 9. *Caries* jam in Ossium Fracturâ non minùs causam remotiorem ponunt rem quandam externam, duram, ictu vel casu Ossibus vehementius illatam, vel à lapsu, &c. Senioribus facillè Fracturam contingere ajunt, adeò ut ipsa Ossis dispositio causæ proximioris vicem hic obeat, quæ ob filamenta, & quibus Ossa cum cæteris machinæ membris sunt composita, facilius modo uno findi volunt, quàm alio, aut obliquè etiam frangi, cùm easdem adhuc fibras retineant, postquam induruerint, quas habuerunt sub formâ membranarum & cartilaginum.

**Cariei.** Ossium Cariei causam constituunt particulas angulares acutas, vel cum succo nutritive ex arteriis, vel cum lymphâ ex ductibus propriis, vel ex succo nervo Ossium poros ingredientis, interstitia illorum tandem dissolventes, maxime si ulcus vel vulnus adsit, & diu acri exponatur.

**Tophorum** Ossium verò Tophos inde produci credunt, quod vel succi nutritii, vel aliorum siccorum particulas ob figurâ & magnitudinem suam convenientiam cum Ossibus, intercedente solâ quiete, iisdem fortissimè adhaereant, vel ob viscositatem & ramositatem à particulis quibusdam acutis lamellatis in ipsis ossibus jam contentis coagulentur & inspissentur, ut ita non modo in lapideata quandam abeant duritiem, sed Ossibus etiam ob particulas cuspidatas eorum poris unâ inhaerentes firmius annectantur.

**Nostre** §. 10. Ista aliorum, hæc nostra est sententia; *Causa Fracturarum Ossium* sunt externæ ad infortunium pertinentes, ut sunt ictus, casus, lapsus & occursus, plaga, &c. & quæcunque continuum Ossis solvere possunt, licet observationes Practicorum testentur, internam dispositionem illius vim non raro augere aut juvare posse, quatenus Ossa seniorum ob rigiditatem atque siccitatem intensiorem franguntur, quàm puerorum molliora, & flexibilia. Pariter Arthritici, atque de fluxionibus acrioribus ac erodentibus laborantes, Fracturis magis obnoxii sunt quàm alii: item qui frequentiore aut diuturniore Mercurii munctionem passi sunt, quorum exempla *Mercellus Dmatius Histor. Mirab. L. 5. c. 1. & Haldan. Cent. 2. Observ. 66. 67. 68.* recenset. Mirari subit, quod apud auctores etiam fiat mentio fracturarum ex sola ma-

trum imaginatione miseris infantibus contraharum, cujus phænomeni rationem explicat de la Forge in not. ad Castelf.

*Fracturarum differentias* quod attinet, Practici Differentiæ petunt illas à tribus, sc. ab earum forma, parte affecta, & symptomatibus. Ratione formæ alia observatur *καυληνδρ*, quæ per transversum Ossis fit, & Fractura *κατ' ἄκρον* vocatur: alia *Ασφαλής* dicitur, quæ secundum longitudinem illius contingit: alia denique *σύντρημα* seu comminutio, quando os in plura fragmenta scedit. Ratione Subjecti alia est cranii, alia est costarum, alia brachii, alia tibis, &c. hæc tandem ratione symptomatum, alia cum tumore, alia cum inflammatione, vulnere ac contusione est. Germanicè *Blut- fled- Klast- Bruch*; item *es ist gang geschwollen*. Ossium substantia & structura nihil aliud est quam Compages quædam ex fibris tendinosis in multiplicibus laminis formatis, & à singulari interveniente osseo succo in substantiam adeò solidam compactis.

Sed è diverticulo in viam, & videbimus *Carie- sam Cariei Ossium*, quæ verò nostro iudicio sequenti modo contingere solet. In Tumoribus quando obstructa sunt vascula quædam, liquor obstruens acidus & acrior factus periclitium corrodit, unde sæpè gravissimus dolor, corroding enim ipsas fibras tendinosas Ossium frangit, & sic ipsum Os invadit, idemque totum sæpè usque ad intimam consumit, hinc Caries Ossium Lue Venereæ laborantibus tolerans est, quæ acidis ac corrosivis scaturit succis. Dum hæc scribimus, in Nobili quodam diu Lue Venereæ laborante observavimus à Carie non tantum omnia faciei, sed & nasi Ossa cum maxilla superiore ac inferiore ita exesa fuisse, ut eximi poterint, imò ipsius facies cum naso tota collapsâ fuit, certè horrendo aspectu, & sic miserè vitam finivit. Post variolas etiam prædarthrocæcæ obortam fuisse notant Curiosi. Facillè quoque Ossa corroduntur ac corrumpuntur, si vulnus exlangue diu exponatur aëri, ita etiam ulcus putridum & usque ad os profundum, ob acidum acre mordens & spicula corrosiva, fibrillas tendinosas discindere, & sic Cariem Ossis inducere potest. Sunt ut plurimum succi circa Ossa stagnantes & aciores facti, qui hæc fibras osses seu tendinosas corrodunt, ac Cariem inferunt. Quod succi fibræ tendinosas pers fluentes Cariem inducere possint, ex eo patet, quia Ossa facilius in corpore vivente corrumpuntur, quàm in defunctorum Ossibus. Ossa enim constant ex sale volatili, dein spiritui, & postmodum oleo, & ultimò sale fixo & acido volatili, quæ particule volatiles non tantum in tubulis reperiuntur, sed ipsa Ossa tales continent, quò Ossa enim duriora, eò plus dant salis volatilis, imò hæc Ossa recipiunt aëre tot succos ac alia partes: & quod Ossa facilius in viventibus, quàm defunctis corrumpantur. causa est, quod aëre ambiens acidus succos coagulet & ipsos plane immutat; si enim particule extraneæ cum reliquis in succis contentis commiscantur, inæqualis oritur mixtio ac operatio, & hinc resolvuntur succi facillè Cariem inducentes. In Ossibus viventium succi continuo affluunt, & sic recreantur hoc Nectare Ossa: quod verò in defunctorum Ossibus fieri nequit, in quibus potius particule penitus inæqualitæ ac acidi combinatae ac coagulatae exsistunt: cum enim quis moritur,

Yyyy ; motus



motus succorum, ut in alijs partibus, sic etiam in Ossibus cessat, unde penitus incrustati ac inspissati ab aëre amplius commoveri nequeunt. Fractura atque Fissura Ossium aliquando corruptioni Ossium seu Cariei anam atque occasionem præbent, Ossa enim non ex tam solidis partibus constent, ut in fractis possint, ea enim ex salsis rigidis ac mollibus partibus conflata sunt, non possunt ergo sic existantia, instar ceræ ac metallorum quorundam flecti, quamvis Ossa humana per machinam quandam novit emollescere, instar gelatinæ, ut comedi possint, *Celebrimus Dr. Papin, Professor Marburgensis, & Illustris Boyle*, qui in cum lineæ peculiare fornaces extrui curavit, qui videti possunt in prædictorum Virorum Laboratorijs: hoc verò nostro iudicio non aliter contigit, quam ex rarefactione aeris inclusi exitum non habentis. Ossium ejusmodi molliem, & flexibilitatem in homine sano, sed qui nec stare nec ambulare potuit, vidit *D. Romelius Testi, Eph. G. Decur. 11. A. 7. Obs. 212.* In Osse ergo ipso interdum causa Cariei Ossium generari solet, & quidem à magis ac diuturnis morbis, in quibus furcens ac corrosivum acidum existit, ut observamus in Luc Veneræ, in qui sanguis ac succi corporis sensim ac sensim viscidiores ac tenaciores redduntur, ita ut omnes ipsius particule in Ossibus separatæ in materiam gypseam ac Gummii similem abeant, materia hæc ibidem coarctata per annum & ultra absque ullo manifestationis indicio stagnat, sed cum simul acidæ particule has tenaces resolverint, fibrillas tendinosas tum corrodunt, perfringuntque, sique Cariem inferunt. Si enim acidum cum corrosivo sale maritatum, in canaliculos se infundit, & cum intus contentis succis commisceatur, necessario commotio & alteratio succorum oboriri debet, cum ipsorum particule ex multo sale volatili, oleosis & spirituosissimas constantes, contrarieut reliquis peregrinis particulis, ut materia celestis non ut antea perfluere possit, unde canaliculi vi rumpuntur, & sic ordo & textura frangitur, & confusio fit succorum, unde corruptio oriri debet, hinc oritur Caries five Gangræna Ossis; ut enim caro à Gangræna, sic Os à Carie devoratur, corroditur, corrumpiturque.

*Causa os*  
*fractura-*  
*temi - Tr-*  
*phorum.*

Quemadmodum ex cartilagine aut tendine Os fit, ita ex Osse tandem compactis archius particulis, oleosisque humiditate emuncta, *Tophum* enasci existimamus, ibi flexibilibus magis hamosisque particulis, hic paulo rigidioribus, & per cuncta coherescentibus. In his enim Tophis dum in porulis & vasiscapillaribus, quæ comitantur periosium, succi quidam chyloli alique erudi stagnant, unde partes hæc, circa quas hærent, sensim intumescunt, & instar spongiarum insistant, qui visci si tumores successive indurati in specie ex acore viscoso eos ut plurimum imprægnant & coagulante, imò ex acido Luis Veneræ partes nerveas, in specie Ossa instantiales tales, humores duros & tactui renitentes constituunt, qui in sanguineis partibus Scirrhi, in spermaticis & ossibus, Nodi & Tophi, in glandulis Strumæ seu Scrophulæ appellantur: si enim viscidus liquor acido junctus in partibus his firmius impingat, eorum chylum corrumpit coagulatque, hinc necessitatio ejusmodi succi accedente acido forti, indurati debent, qui indurati & Tartaro inaurati constituunt ejusmodi To-

phos, qui tandem partes vicinas erodendo in ulcera abeunt. Podagricis Tophi isti solennes sunt, quia abundant acido & viscido Tartaro, & imprimis eorum succus nervus eodem caractere imbutus ad juncturas ac membranosas ligamenta & periosium pervenit, ob tenacitatem ac visciditatem stagnare cogitur, & si simul topica astringentia frigida ac repellentia loco affecto applicentur, magis compacta redduntur, quæ tandem in Tophis coagulatur.

§. 11. Quoad Fracturam Ossium *Prognosis*, nulla eadem Fracturam à Chirurgo per se lethalis habetur, sed per accidens duntaxat talis interdum evadit, ex. gr. tatione contusionis ingentis, hincque emergentis Inflammationis ac Sphaceli, earum tamen alia facilis ac citius, alia difficilius ac tardius curatur. Nam (1.) facilius sanatur recens, cum si ultra septimum diem Ossis repositio protrahitur, extremitates hujus facili marte callum contrahunt, hinc ad coalitionem ineptæ redduntur, aut os corrumpitur; (2.) facilius curatur, quæ in Osse minore v. gr. digiti, quam in majore, videlicet femoris; (3.) quæ à causa externa sola, quam quæ internam dispositionem conjunctam habet; (4.) quæ sine aliis morbis ac symptomatibus; (5.) quæ in Subjecto juvenili ac puerili; (6.) quæ in corpore puro & sano, quam in cachectico; (7.) quæ membrum tale occupat, in quo restitutio ac deligatio commodè fieri valeat, ita ut v. gr. Fractura humeri, brachii, tibiae, &c. felicius sanentur, quam femoris, vertebrae dorsi, &c. Longitudinalis facilius marte sanatur, quam transversa seu comminutione facta, illa etiam facilius curatur, quæ à junctura & articulo remotior existit, ac quæ in membro, quod duplici Osse gaudet, horum autem unum saltem fractum. *Cariei*  
*Ossium* Caries Ossium difficillime curatur, imò si ulcera ipsam prodixerint, tunc res est periculosa, nam acres succi incarnationem impediunt, sicut autem cuncta cum Ossis Carie ulcera non adeo facile consolidantur, hinc inter maligna numerantur; ita majores difficultates pariunt illa, ubi junctura atque capita Ossium, quam ubi media coram pars corruptione hæc laborant, utpote quibus remedia Cariosum separantia non commodè applicare licet. Quæ Luem Veneræ comitantur, difficillime quoque curatur, sed ægrosque ad mortem insequitur, ceu plura novimus exempla. Plures Cariem absque igne nunquam curari posse asserunt.

*Tophorum* *Prognosis* quod concernit, illi facili in ulcera ac Cariem Ossium transiunt, hinc difficillimi sunt curatu; Arthriticos ac Veneræ Luem laborantes usque ad mortem Tophi comitari solent, & vix curabiles existunt, hinc eos tangere non licet.

§. 12. Peripecta jam *Prognosis*, restat ut *Di-*  
*tam* his in affectibus Ossium attingamus, qua neglecta aliquando in iis curandis frustra laboramus, ceu id experientia quotidiana abunde testatur. Eligatur ergo ætatem temperatus, imprimis vitetur aer nitrosus, ac frigidus, qui quocunque modo à Fractura, Carie & Tophis arcedendusest, hic enim solus iis Ossium poros destruere potest, ut Gangræna æque carnosarum partium ac ossiarum laxetur fores. Victus sit tenuis, dulcis ac boni lacteique succi, ut chylus ac sanguis laudabilis generetur, alimenta condiantur macere, N. M. croce, cinamomo, ad-

ditis

ditis herbis aromaticis: vitentur acida, salina, & indurata, nimis muria, fixa, viscida, ac glutinosa. Potus sit vel calidus Theri vel Capheæ, vel salvia, veronica, betonica, & bene lupulata, quia non facile acefcit &c. vel cerevisia defæcata ac dulcis, inter quæ Anglica, Bregensis, & quæ tardius acefcit, præ aliis palmarum meretur Bruniuicenfis duplex, nam cum nautæ lineam five æquatorem nupetrimè tranfient, omnia potulenta, quibus naves instructæ erant, acorem contraxerunt, sola Bruniuicenfis excepta, quæ & saporem & odorem feruavit. Vinum generosum, Gallicum ac Hispanicum moderate sumtum concedi potest, vel si lubet aliud vinum infusione ocul. ss. vel Sc volatilil alteratum alimatur.

Motus sit moderatus, quies enim in Fractura Ossium summum exiit remedium, qua sola ipse curantur Fracturæ. In somno & vigiliis aurea feruetur mediocritas, alvus & vesica officii sui sunt memores, ne excrementa in corpore cumulentur. Animi pathemata, ut terror, incor, exandescencia ac tristitia tanquam Patroni Acidorum & Coagulatores Succorum, procul abelle jubentur, contra animus feruetur pacatus spe conualescentiæ erigendus.

Cura  
Pharmaceutico-  
Chirurgica  
ca fecundum  
Galenum in  
Ossium  
Fractura.

§. 13. His prælibatis ad ipsam curam Pharmaceuticam & Chirurgicam tranſeamus, unde ægrilus levaminis percipiunt. Galenicus in Fractura Ossium eo respiciunt, si Ossa sint tenella, ut extensio ab uno, utraq; manu facta sufficiat: si verò fuerint dura, non tantum à duobus viris, sed etiam fasciis, circa articulostrahi, & ut reparentur, extendi docent, quam tamen extensionem primis statim debet fieri debere suadent, nam tertio, aut quarto, dum adeſt inflammatio, fieri eam minime licet, sed novum expectant: primoque inflammationem removere student revulſione instituta per venæsectionem, aut cucurbitulas. Signa Ossis repositi Ipsi sunt: quando dolor est subleſus, & contra percipitur ab ipſo Patientē quædam quali voluptas, quando membrum est alteri æquale, & nulla adeſt asperitas: aut foſca, &c. talin statu membra continent & bene deligant, ut callus regenerari possit: Superponunt autem emplastrum aliquomodo refrigerans & adstringens, quale est ad Fracturas rubetum, quod tamdiu relinquendum non esse dicunt, donec pruritum & dolorem excitet: quod si advertant, tertio die fieri dicunt solutionem: si minus, relinqui posse concedunt ad quintum, sextum aut septimum diem, sed aut tribus Galeni fasciis cum stramineis splenis, aut ferulis ligneis, aliquantulum cavis vinculis & lana bene munitis. Quoties autem solvitur membrum, toties calida aqua fovet usque ad rubiginem, dein iterum superposito emplastro ad Fracturas, vel Diachalciteos cum bolo & sanguine draconis mixto instituunt ligaturam satis strictam, citra ullum tamen dolorem, nam per nimiam adstrictionem fieri dolorem & partis atrophiam observant.

Dum callus incipit fieri, eum augent iis, quæ faciunt ad callum generandum, inter quæ recensent orizem, hordeacea, gelatinas. Membrum sit quietum & satis elatum, ne copiosius humores illic decumbant. Callum plerumque 40. die confectum esse scribunt, nisi obſtiterit Inflammatio, dolor, fortis ligatura, squama aliqua ab Ossē secre-

ta, quam prius incisa cute extrahendam esse ajunt.

De crurum Fracturis rectis, seu fissuris, quæ Germani vocant *Alag-Brüche* videatur *Felici Tract. Chirurg.* Coxend. & Humeri Fracturæ docta Chirurgi manu adaptari & reponi debent.

Cariei Ossium curationem quod attinet, partem Ossis corrupti tollant, integrum verò conservant. Tollunt verò Os dupliciter, vel manu, vel medicamento, quo irritati ajunt Naturam ad putridi Ossis separationem, quamdiu enim illud, quod est corruptum, demptum non fuerit, tamdiu impossibile esse dicunt ulcus sanari & solidam carnem supercreſcere. Auferunt autem Os vel scalprio excisorio, cum malleolo ut solent statuarii, vel perforant Osterebro fabrilis in tribus aut quatuor partibus scalprio percurrendo cum malleolo à foramine ad oramen: agunt etiam aliquando scalprio rasorio. Imprimis totum illud corruptum ablatum esse signum esse dicunt, quando cruor succedit: & tum ab opere cessandum esse monent, inspergunt potius ar. stolochia rot. radic. cum myrrha pulverisita. Sape etiam Oscariolum adurunt, ut quod corruptum est, omni alimento & humiditate privetur: ablata enim sustentatione, naturam ajunt facilius separare separanda: idem facere scribunt medicamentis sicciſſima & frigidissima; quale est quod fit ex foliis & semine hyoscyami, cum vitriolo uſto contusis, item radix ireos, pucedani, aristolochia rotunda, squama aris, ærugo, aqua aluminis magistralis, quæ sæpius Os maderat, curare ajunt. Ceterum absque dolore: Euphorbium juxta costenret inter cetera precipitum: sed ita adhibent, ne alias partes v. cinas corumpat, miscent cum pasta ex radice ireos, & ita soli Ossi corrupto applicant, ferro quoque candente Os adurunt: & repetunt uſtionem usque dum perſiciatur opus. Facta uſtione Os ab inflammatione vendicant aqua rosarum cum oleo rosar. vel violar. & albunine ovi, stappa exceptis & applicatis: deinde mitigato dolore procedunt ad Ossis separationem, denique sarcoticis ulcus curant.

In Tophis curandis Veteres applicant emplastrum Diachylon cum gummis, cui addunt galbanum & sagapenum cum ammoniaco, vel inungunt oleum: gd. dulce cum oleo Scorpionum mixto, quando Tophaceam materiam eximere jubent, consumpta materia, carne locus per sarcoticum impletur.

§. 14. Paracelsus statuit Ossis fractio nihil accideret periculi posse, ac curari lanarique necessarium debere à Mumia corporis in carne, ligamentis, medullis, &c. existente, cujus in medio situm Os & circumscriptum est, à quibus omnibus perſanatur. Quandoquidem apertum nil, per quod externis accidentibus pateret accessus. Quapropter aptè ligare, naturæ quæ sua requies data, juxta Ipſum, certissimum in istis medicamentum sunt, & indubia cura.

Si tamen ad rupturas accedant Vulnura, per quæ fragmenta quæpiam appaterent Ossium à fistulis soluta vel disjuncta, per vulnura medicamenta jam dicta extrahentia suadet, ut extrahantur, & nullo modo per serra menta vel alia quævis instrumenta fodiendo conatur extrahere: nam secundum ipſum vera Mumia potest quicquid est naturæ contrarium elicere, tum quæ semihiliter sunt, natura per se curat. Membrum

brum liquidum, ubi rectè probeque rursus conjunctum suis apertis ad hoc instrumentis fuerit, ac in temperatura & situ conveniente conservatum, per Muniam propriam citius multo curari, quàm herbis omnibus fieri queat, ipsius monumenta docent.

Principio ergo *Fracturas Ossium* ut curet, animadvertit, concavus ut instrumentis membra concludens erigat, utque ab anteriore posterioreque partibus, & quaquaversum liberè possit accedere tangereque. Postmodum vulnerabilibus ligat medicamentis, & si promptus in eorum usu fuerit, hoc notat, quemlibet viscum nigra consolidat, serpentine & aristolochiæ rotundæ rupturas opimè curare, mane vespereque superligatum, non usque adeò stricte, singulis vicibus iterum apertis ligaculis recentem & calidum appositum: alia enim medicamenta, quæ per iparadrapp. totularia, ligacula, vel aliiis paucis sunt, tanquam merè futilia rejicit, & membri magis ad perditionem, quàm sublevationem facientia. Ligaciones tertio quovis die tantùm factas, item suffusiones, compressiones nimias, & similes vanas operationes contemnit, quia inde accidentium producantur centenaria. Verùm etsi vulnera forent, è quibus Ossâ prominerent, erigit, ac admodum Vulneris curat.

*Ossium  
Caries.*

*Cariosa Ossâ* li *Paracelsus* curanda occurrunt, nec lima vel alio instrumento atterit vel frangit, juxta *Carnificem* tonsorum vulgatum modum, sed tantùm ea mundat, & si ulla vel inflammata fuerint, exstinguit: deinceps facillè carnem Ossâ superinducit. Remedium ipsius quo Ossâ erosa, inflammata &c. restituere solet, est sequens:

℞. Olei de *Campchora* per albumen ovi preparati,

Olei *Caryophyllorum* aa. ʒʒ.

Mixtis iavicem juxta reliqua remedia utitur felicissimè.

*Tophorum*

*Tophorum curacionem* in eo consistere ait *Paracelsus*, ne ea quæ fixa sunt intransmutationem deducantur, liquidum omnia transmutata in membris, non autem in mineralibus subsistunt, quantum ad fixa attinet. Duo mineralia unâ esse arguit, aliud dulce, aliud austerrum, sic & juxta cum duæ essentia se mutuò comitantur, quæ nili *resolvantur*, omnem curationis spem præcludunt.

*Helmontii  
sententia  
de cura  
Ossium,  
Fractura.*

§. 15. *Helmontius* in *Fractura Ossium* eò respicit, ut Ossâ iterum consolidentur, quæ fracto poro oleo quacunque ætate consolidari existimat. Lapidem quoque Ossifragum, spiritu aceti resolutum & internè assumptum dono appropriato ac specifico sanare *Fracturas Ossium* scribit. Arcanis enim suis in omnibus fidit, in quavis ergo *Fractura Ossium* radice *symphyti* & lapidem osteocollum aliis præfert *Chirurgus*, cum juxta ipsum *Archæus* isdem sedatus & ad officium vocatus, ipsemet sanationem istarum *Fracturarum* quovis artifice meliùs & accuratius peragat.

*Caries.*

*Cariem Ossium* oleo *caryophyllorum*, succini aliusque acidum absorbentibus curandam fore promat.

*Tophorum*

Ad *Tophos* curandos *Author* commendat suum oleum *Strumarum*, item pinguedinem leporis maxime vetustam, & sanguinem hircinum exterius applicatum.

*Willisii  
modum cu.*

§. 16. *Villius* noster *Ossâ fracta* statim re-

ponit, repositaque firmat, naturæque auxilia-  
trices manus confert ad eorum conglutinationem perficiendam, geminam succi alibilis crassam conservando, vel alteratam corrigendo, & si opus fuerit, ejus penam augendo: si pars fracta inflammata fuerit, priùs inflammationem curat, & deinde totus est in curanda *Fractura*: reposito autem ossè partem illinì vitru vini, cui infusi fuerint flores hyperici, vel cum eodem cui admixta fuerit tertia pars spiritus lumbricorum terrestrium per putrefactionem. Si contusa fuerit pars, inungatur illi mel, cui admixtus sit spiritus vini, illinatur etiam locus fractus ol. Hyper. & Lumbric. terr. paucò oleo destill. terebinth. & paucò ol. ros. marin. acutus. Applicetur deinceps parti affectæ emplastrum ex resina alba, terebinthina & cera, quibus addatur pulvis radices barbae hirci. Interim medicamenta interna præscribit cum ad callum promovendum, tum ad symptomata præcavenda, & inter alia eminare asserit rorem marinum, folia agrimonie, consolidam majorem, Geranium, Robert. Sabinam, & lapidem Ossifragum.

Si *Caries Ossium* juxta ipsum altius non penetraverit, essentia caryophyllorum, aut ol. Guajaci illam tollere conatur. Si verò profundius scerpserit, ferro candente illam corrigit, illudque sæpius applicat, ipsiusque ministerio eo usque utitur, donec nulla fuit, nullusque alius corruptus humor exeat. Ablata enim *Carie*, parti affectæ inponit pulverem ex radicibus aristolochiæ, Iride, myrrha, &c. compositum, remediisque vulnerariis calli generationem adjuvat.

*Villius* in ad *Tophos* Nodosque curandos nullo peculiari utitur medicamento, in iisque tollendis alios *Autores* sequitur imitaturque.

§. 17. *Sylvius* in *Fractura Ossium* à reliquo *Sylvio* rum methodo observanda, ne unguem latum secedere videtur, sed cum iis consentit.

In *Cariæ Ossium* curatione eò respicit, omnesque vires intendit, ut tota pars *Cariæ* affecta, utpote mortua, separaretur à sana & viva, cumque nec coalescere, nec diu subsistere potest pars *Cariosa*, quin eandem itidem inficiat, & ad corruptionem similem paulatim deducat. Difficile autem esse notat ipse, aut igne ferroque ignito, aut medicamentis convenientibus partem *Cariæ* infectam separare ab integrâ, postquam per cuniculos in sanam se infusum Venenum, imprimis *Venercum* non quiescens, sed eundo vires acquirens. Sicut manifestum est in omni *Cariæ Venerca*, ejus causa non sinitur aut infringitur ab Ossè ipso, quod corrumpitur, sed indies augetur & acrior fit, unde tandem ubi ad summum pervenit, *Cariæ Venercæ* sit incurabilis. Difficultatem autem summam in *Cariæ* curanda etiam inde pendere arguit, quod remedia ipse curandæ convenientissima sæpenuerò satis convenienter applicari, usurparique non possint. Partes namque Ossibus vicinæ, Membranz, Tendines, nervi, & similes actuali cauterio simul læduntur & intolerabiles dolores patiuntur. Augeria autem idem malum existimat, quando sæpius applicantur actualia illa cauteria, quæ unâ vice parùm præstare solent, ac sæpius iteranda sunt, si laudabilem effectum producere debeant. Cætera remedia, quæ *Cariæ* consumendæ aut tollendæ adhibentur, pro invalidis habet, quia non satis penetrare possunt

ad

# CAP. VII. DE OSSIUM FRACT. CARIE & TOPHIS. 729

ad quavis loca, in quæ se insinuavit venenum Venereum in Aciditate aeri consistens ac penetrantissimum. Acidi acrimoniae debellant vel salialixiva tam fixa, quam volatilia, vel spiritus volatiles, vel olea, vel aqua. Salia verò lixiva, fixa, quæ acidis sunt inimica, pura & sola si fuerint, in superficie hærent, nec aliquand laudabilis magnivæ præstabunt, sin aqua diluantur, simul partem aliquam virium suarum amittent; si cū spiritu volatili conjuncta fuerint, penetrabunt quidem quaquaversum facilius, operabuntur autem simul debilius. Si cum oleo in saponem mutata fuerint, debiliora sunt facta, nec facile ad interiora penetrant, quibus si aqua admisceatur, ut diluantur & ulterius penetrare possint, reddentur simul magis inertia. Ad eò ut inter omnia venenum acido-aere Cuiusmodi produces corrigentia & emendantia remedia, post Cauterium, Actuale, nullum præstantius noverit; secundum verò locum assignat salibus volatilibus, ut in satis debilibus ad tantum & tam grave malum curandum. Veram etenim rationem curandi reputat, ut Os infectum, quoties tutò licet, totum tollatur, postquam vix unquam sisti potest in ipso Caries, aut pars Ossis corrupta separari à sana. Lauat maxime in quæcunq; Ossium salis volatilis usum, quem laudabiliorcm fore dicit, si quis salia volatilia plurium generum adornet, atque optima quævis per accuratam & attentam Experimentum seligat. Ufurpanda esse quoque monet in Ossium Carie curanda Tuiam, Lithargyrium, Cerullam, imò Guajacum in pulverem trita & inspersa: quæ omnia javeant, quatenus acidum in se concentrant, & ab Ossibus allectum avertunt, ne ulterius serpere, ac ipsa corrumpere pergat. Hæc igitur esse blandissima curandæ Cariei remedia scribit, proximal verò esse five media salia rûm volatilia, tum fixa, tanquam Cauteria potentialia, potissimum verò esse Cauterium Actuale ad acter statuit, quorû ope nili curari possit Caries, habet ipsam pro incurabili.

*Exercescentia* in variis partibus sub membrana Ossis invadente, Perioostio, *Tuberositates* insignes curare solet per emplastra & unguenta Mercurialia, imprimis universalem curâ ope salivationis institutam. Si Os infectum, & materia pituitosa viscidior illas constituat, vix curatas fore ait, nisi aperto Tumore, atque sublato sentim humore viscido, tum per gummatâ aromaticâ, tum eaustica potentialia & actualia; perseverando tandem in eorundem usu, donec Os mundatum & liberatum ab omni phlegmate observetur, atque tunc pergeudo ad consolidationem per remedia Chirurgica vulgò nota.

§. 13. *Caries* Ossium Fracturas curari promittunt, solo Chirurgi manu, Ossâ fracta in pristinum restituendo litum & figuram. Dein Emplastrum quoddam ad rupturas imponendo, aut cataplasma ex radice symphyti, quando se. Fractura exiit simplex absq; ullo vulnere, contusione & inflammatione, cum pessimis verò hisce conjuncta majorem repulcere apparatus fatentur, & non modò remedia interna sudorifera, & post hæc volatilia ex Tuiura hyperici, & tum lumbicorum, Tinct. bezoard. & C. C. volat. propinanda esse, sed per incisionem frustula Ossium separata eximenda, & partium carnearum & membranarum aut præcedendam esse corruptionem per spiritum vini camphoratam, crocatum & aquam calis vivæ, aut si hæc præcavere nequeat, per suppurationem eadem à parte sanâ & integra esse separanda; tum por-

tionem Ossium fractæ uniri jubent, eamque extra protuberat, manu in situm debitum, ceu dictum, & Chirurgo debite locando, & impositis fasciis aut emplastro glutinatorio imposito penitus curanda.

*Ossium Cariei* Curam quod concernit, quando illa non valde accrevit, ne illa amplius incrementum capiat, omni studio prospicere audent, ahibitis absorbentibus & particulis acutas erodentes frangentibus, pulveribus sc. cantharum, ex cineribus lumbicorum & camphora compositis. In Carie verò profundiori ipsi euphorbium commendant Cariei inspersum, vel ferro candente ipsa Ossâ Carie infecta excutit jubent.

*Tophorum* remotionem tentant variis medicamentis exsiccantibus, ut aloë, mastiche, sandarach, alumine ustis, sale Sni, vel etiam aliquando ad fortiora accedunt, & commendant acida corrosiva, spiritum salis, sulphuris, nitri: vel ungu. Egyptiacæ, vel cum melle & tus matriacalis misceatur & imponatur; cineres quoque fraxini, vel rois mariæ magnipendunt impositos.

§. 19. *Nostram* nunc *Fracturam Ossium* curandi methodum referemus. Primò curam pharmaceuticam tradamus.

Omne quod ex pharmaceutica curatione promittere nobis possumus auxilium in calli sufficienti generatione, eoq; mediante Ossium disjunctorum consolidatione promovendis situm esse arbitror; utrumq; quidem unanimiliter Veterum quam Recentiorum consensu solius naturæ circulanis est opus, & medicamenta vix aliud efficiunt, quam quod obstatula, consolidatione impediencia removeant, adeò ut non nisi latè admodum Catognatica, vel parotica vocari debeant; Sic ex. gr. de lapide Osteocollæ, quem & ossifragum nonnulli nominant, quas non legimus observationes? quam non ejus in consolidandis ossibus gignendq; callo vim deprædicant? Lapis enim absorbendo virtutem suam præstat, ac Corallia, ocul. & C. C. ust. acidum consolidationi ac sanguinis fluiditati inimicum potenter absorbendo humores crassos fundendo, tubulos renum stimulo, aut obstructos referendo, diuresin maxime promovet, siq; notabilem seri quantitatem unâ cum salibus c. M. S. eliminare, quo tunc eò felicius calli generatio, impedimentis sublatis succedere possit. Solent autem lapidem osteocollam in jusculis, Helmontius in aceto, alii in vino, alii in aqua destillata, v. gr. Symphyti, Chæresolii & tradere; sequentem formulâ vires non contemnendas aliquando in subiecto scilicet fœminæ nempe Uffel exterruile recordor.

℞. Osteocoll. ppt. ʒij.

ʒiis diaphor. ʒj.

Craci gr. vj.

M. Dentur singulo vespere ʒij. in ʒ Cerasor. Dantur adhuc alia medicamenta, quæ ab autoribus ad fracturâ consolidatione & novi calli generatione commendari solent, ut sunt communiter dicta catagmatica, quibus omnia antacida & acrimonia corrigentia, diaphoretica, sanguinis duplicem motum conservantia, ac poros cutis aperiendo, noxia consolidationi salia simul eliminantia accenser possunt, ut sunt decocta & essentia lignorum Guajac. i. axin. cent. & radagrimon. aristoloch. savorici, Jalappæ, fœnicula rub. herb. i. cord. veron. card. bent. cent. mu. veron. betonic. oacc. i. auri. virg. aur. hyper. flor. sambuc. lap. c. ancr. ier. japon. mu. m. oil. dracon. C. C. ust. sang. hirc. iuccinum, liq. C. C. iucc. Antim. diaphor. bals. naturalia, myrrh. aloë, & Euteria succini &c.

Decocta vulneraria moderatè assumta aliis palam præcipiunt, imprimis si saccharis non fuerint corrupta; purgantia huc exulare pubeo, verum apta al-

Zzz

1111

In Tophis.

*Caries* ossium opino de curatone Ossium Fractura.

mentis, rad. cichor. C. passul. Endiv. iusculis carnium, potu Cossid. decocto raparum exsiccatum vel bractee rubræ alvum, si opus est, lubricam esse reddendam, vel apoclystere vel suppositorio stimulant. author sum. Purgantia enim, nisi admodum lenia, cum nunquam sine alteratione quadam, imo turbatione sanguinis assumantur, quam hic, ubi febres traumaticæ aliæ rarè abesse solent, ægrisque quiescere nihil melius, nec magis conducibile, sanguinem magis turbando ac febrim augendo præstent opem, unicuique patere mihi persuadeo.

Ratione symptomatum primò *dolor* se avertit, cui æquè internis ac externis prospiciendum; internè sæpè cum effectû dedi cinnabarina cum anodynis, Theriaca cælesti, castoreo, laudano opiat. croc. mixta parçè propinentur.

In *Inflammatione* interne duntaxat absorbentia diaphoretica mixta, ut ocul. cancr. C.C. ust. pulv. cachect. Ludov. aur. fulm. cinnab. nat. & ex ea parat. pulv. Cephal. M. pulv. bezoar. Eissent. Theriac. succin. Crocata profunt & Camphorata. In subiecto plethorico V. S. instituenda, salivariola exhibeantur parçè.

In *terrore*, in *sonno*, qui sæpè ægros extrahit, conducunt talia, quæ obstructions relaxando, saliva acria obtruendo, vel quod melius, eliminando, & spirituum irritatorum ferociam demulcendo operantur; qualia sunt diaphoretica ac diuretica cum nervinis anodynis & absorbentibus mixta; ut sunt Antim. diaphor. ocul. cancr. Cinnabarina, Camphorata, Croc. lau. d. opiat. Castor. Theriac. cel. myrrh. ambra succinum aq. fl. sambuc. syr. li. papav. Err.

℞. *Cinnab. nat.* ʒj.  
pulv. *Anodyn. v. d.* ʒʒ.  
M. detur pro una dosi.

*Cura Fracturarum* jure meritoque à Græcis *νοσηρία* nuncupatur, sicut *extensio*, *capitula*, *deligatio* ac *repositio*: ad quas operationes antequam se accingat Chirurgus expertus ac rationalis, præparat instrumenta, tam quæ si fortassis manus non sufficerent, ad extensionem, quam quæ ad deligationem ac repositionem necessaria. dein æger ante omnia super lectum, in quo permanere debet, sita convenienter collocetur, nec in alio loco facile deligatur. Præter hæc ministras dexteritate & robore polentes. Postmodum attendat, an forte an duplex subsit Fractura, ne unâ neglectâ membri figura & actio depravata maneant. Hoc ætenuè notandum est, quod in Fractura cum dislocatione, prius Os suo loco reponendum, quò excidit, tunc *Fractura* obliganda est. Extensio autem non semper necessaria, imò sæpè impertinens, est, si sc. Ossium extremitates extra situm suum haud commotæ fuerint, tum verò saltem ea opus est, si hæc invicem a se recesserint. Circa extensionis operationem notandum, quod manibus Chirurgi perfici solet, utpote secundum ejus circumstantias extensio sit hodie sæpè semper à Chirurgi manu, à Veteribus facta fuit habens vel machinis in hanc finem à Veteribus variis depictis: ex. gr. in Tibia fracta, alter ministrorum tibiam fractam supra Fracturam & circa genu comprehendat, ita ut utrumque pollicem ipsi Tibiæ imponat, alter verò si dextrum crus affectum fuerit, ejus alteri extremitati prope malleolos manum sinistram supponat, dextram verò tibie applicet, contraria ratione procedendo, si pes sinister laborat, adeoque in ipsa extensione pars ira tractetur, ut lineam rectam atque tractum mulculorum observet. Operationem hæc sæpè ab unico vidimus Chirurgo institutam, qui duabus manibus restitutionem Ossis optimè molitur est. Extendatur etiam membrum sufficenter aliquantum longius, ne Ossa, quæ in reducendo se invicem tangunt, eorum prominentiæ frangantur ac repositionem impediunt. Repositio sit, si Chirurgus manibus oleo quodam inunctis, an sufficiens sit extensio exploret, quod *gnoscit*, si inter extrema aliquis fovea, aut in Fracturæ loco nulla amplius inæqualitas appareat. Mox membrum hinc inde leniter impellat, semper partem ossis eminentiorem in contrarium agendo, quo prominetur. Ossis sponte potius sua, extensione leviter interdum relaxata, se mutuo accipiant, Chirurgus has saltem dirigat, usque dum omnes prominentiæ ad sinus suos repositæ fuerint, quo factò extensio sensim remittatur. Chirurgus pronunciat autem legitimam repositionem 1. ex figura, comparatione facta nimirum

cum artu sano, & v. gr. si pollex pedis cum genu in recta stet linea. 2. Ex superficie ac æqualitate restituta, ac ex doloris majoris cessatione.

Dein ad deligationem se accingat Chirurgus, cujus usus est tam Otiare pulia, quam medicamentis appolita retinere. Medicamenta sint in principio talia, quæ inflammationem arcant, huc Batavi imponunt fumi Emplastum de cumino, idque semper antea illinunt spiritu vini Camphorato: proderunt ergo spiritus Matricalis Camphoratus, spir. vin. Camph. spir. flor. sambuc. &c. hinc convenit præ aliis Emplad. rupturam nostrum mille experimentis comprobatum, quod dum imponatur, membrum prius spiritu vini camph. illinend. vel cum lentis duplicat. imponend. imprimis si contusio adfuerit:

℞. *Cera citrin.*  
Empl. *Diapalm.* ʒa. ʒviij.  
ungu. *Marial.* ʒv.  
pulv. rad. *alibea.*  
*farin. fabar.* ʒa. ʒiij.  
*sem. cumini.* ʒiij.  
*barb. capr.*  
*consol. maj.*  
*sanguac.*  
*lap. olee coll.* ʒa. ʒʒ.  
*camphor.* ʒiij.  
*Terr. japon.* ʒi.  
~ *vin. q. f.*

M. f. l. a. Emplast. ad rupturam.

Sunt etiam qui Empl. de cicuta imponunt, aliique ad rupturam laudant; alii oxycroc. cum Diachalc. mixt. commendant, quæ ramdiu continuantur, donec calicum productum esse conjecturatur, quod apparet ex doloris omnimoda cessatione (2.) si circa locum fractum color cutis natus efflorescat, & si cum vulnere saniei copis imminuat.

Sequens mihi placet methodus restituendi & curandi Fracturam Tibiæ vel brachii: primò Os reponatur manu Chirurgi in suum locum, quod cum strepitu fiat, dein Tibia imponatur capsulæ ex charta (Pappi) confecta, & ligamentis largis ex linteo contextis, & fasciæ ita adaptentur, ut confringi ac relaxari, imò aperiri possint, relicta Tibia fractam in sua sede, ut sic quonidie Tibia à Chirurgo conspici queat, sium Inflammatio vel Gangræna imminet, an forsitan à commotione ægræ impetiva membrum c. situo suo fuerit elapsum; cui dein congrua applicari possunt remedia: à pinguibus oleo popul. ungu. cerufl. &c. abstinentium esse monemus. Quod ipsum deligandi modum attinet, ne sit restrictio nimis, alias Inflammatio aderit, splenia membri conditioni adaptata, & deligationis faciendæ longitudinem emetientia, postquam hac in initio uno vel altero superius recensitorum liquorum tepido fuerint imbuta. Hinc ad manus sint fasciæ 5. panter liquoribus supradictis imprægnandæ, quarum una eaque brevissima circa ipsam Fracturam pervolvatur, postmodum ad membri partem sanam 5. vel 6. circuibus fasciibus ascendat; quo factò alteram quoque unius capitis & priorè duplo longiorem eidem Fracturæ, vel in contrariam plagam pariter bis vel ter circumliget Chirurgus, eademque quater vel quinque descendat, mox iterum per totam ligaturam & sursum ad finem usque prioris redeundo, quod tamen magis demonstrari quam præscribi potest. His aliquando loco spleniorum imponatur linteum quadruplicatum, cuius pars deliganda inæqualis fuerit minoræ quoque splenia apponatur. Ligatio quoque nec nimis laxa sit, alias non retinet, deo arctior iusto, præsertim ubi callus proliferat, ac corpus tenerius fuerit, alias dolorem atque inflammationem, imò atrophiam accersit, cum motus imbecillitate. Oportet ergo, si metus adest Gangræna, ægrum laxius invivere, pro deligationis conditione inquirenda.

Circa Fasciarum religationem notetur, quamvis pluribus Chirurgis religio sit, illas ante dein sextum vel septimum solvere, tertio tamen, vel secundo quoque rectissime, & jubente divino *Hipp. de Fract. Text. 5.* solvantur, vel quia tunc laxari incipiunt, vel ob transpirationem impeditam sæpius inflammatio, pruritus, imò Gangræna metuenda veniunt, qualis

excm-



## CAP. VII. DE OSSUM FRACT. CARIE & TOPHIS. 731

exempla præter quotidianam Praxin apud *Hildan.* Cent. 2. *Obferv.* 92. apparent. Nec etiam credas, quod vel fasciæ vel emplastra ad rupturam tantis polleant viribus ad Fracturam consolidandam, ut Tibi imaginæris, quod sola efficit quies, hinc semper ad symptomata respiciendum est. Fasciis superimponunt ferulas tot, quot ambiendo toti membris sufficiunt, & aliquando eas emplastro nonnullo glutinoso incrustant, quo sponte quasi adhærescunt, usque dum omnes admotæ tribus vel quatuor subligaculis sufficienter constringunt. Post septimum diem callum generantia non saltem exterius plures applicant, sed & interius consolidantia propinquant. Insuper quoque externè Aloën, Myrrham, Labdanum, Tragacanth. &c.

Emplastr. de Labdano impositum egregiè juvat, item ultimò ad corrobordandum, & omnes obstructions tollendas conducunt variæ lotiones & fomentationes. Imò sunt qui, si Callus tardius succedat, admovent dropaces. *Hildanus* & alii osteocollum tanquam specificum hoc in casu extollunt, alii sucum primulæ veris, rad. & fol. agrimoniz magnificiunt. Si vesicula cum nigredine partis oboriantur, istæ sunt aperiendæ, & cataplasmata ex scordio, ruta, absinthio, farin. lupin. add. ~ vin. camph. ☞ calc. viv. &c. internè nec sudorifera negligenda, quæ egregiam navant operam. Chirurgi in Belgio sequenti modo curant Fracturam Ossium, ex. gr. brachii, tibiae, &c. post Ollâ restituta inponunt Empl. de cumino, dein plura lineæ spiritui vini camphorat. imbuta. dein circumvolvunt vigesies, ultimò colligant. Omnia cum fasciis ex chartâ (*Pappen*) confectis, sicque relinquunt ad octidies, antequam iterum aperiunt. Lugduni Batavorum vir quidam ante plures annos Ossium Carie laboravit, decidit in terram & Os tibiae fregit in totum, Ossa enim non aliter ac vitrum dissiliebant sine ullis extremitatibus & inæqualibus : Ossa istius viri restitui nequibant, quia combinari non poterant, sed oblique locabantur à se invicem, & ex carne prodibant, ad hanc Fracturam curandam Chirurgi Batavi usi sunt tali fasciâ, quæ uti solet *Celeberr. Muys*, in eo intenti erant, ut Gangrænam arceant, in quâ in finem decoctum herbarum cum spiritu vini Camph. & Theriaca adhibuerunt, cum plumaceolis & lineis duplicatis impositis, Ossa limabant, & sic feliciter restituebant virum.

Callus in Fractura ossium sæpe major, quàm par est, generatur, & membra reddit deformia, & doloris in eorum motu causa existit; Callus verò naturaliter formatur sequenti modo; ossa suis gaudent vas sanguiferis, perque ea eorum tubulis infundi certum quendam succum, æque ac in aliis corporis nostri tubulis ibi circumlanti, (prout *D. Havers* in osteolog. sua docet.) Hic igitur succus ad fracti ossis extremitates delatus, cùm ulterius ob varia obstacula, à Fractura facta per lineam rectam in cursu semel incepto pergere nequeat, ad latera ossis necessario deflectere cogitur, ubi tunc ejus partes quædam partibus ossis propter superficieculorum convenientiam facili Marte adherent, aliis in auras evanescentibus, sentinque à reliquis, eadem ratione adhærentibus auctæ,

callum tandem constituunt, ossa iterum conglutinantem. Quamobrem optimi Chirurgi erit, ut Calli succrescentis statim in omnibus à 3. vel 4. deligationibus diligenter expiçetur, ægro victum moderatum tantum præberetur, non nimis excresecat callus, quod si videat, quod nimium excreverit, fasciis paulò arctius confectis & emplastro emollente ac discutiente v. gr. meliloti cum anatica portione Empl. de Ran. cum 4plo Mercurii hoc impeaiat, aut si Fractura conditio pariat, lamina plumbea superligata eum deprimat.

Hoc in affectu sæpè ossa, multo interveniente callo, coalescere nequeunt, aliquando ob tubulorum ossium totalem obstructionem; ita ut succus nutritius eorum ad aperturas ad novum callum generandum nullus elaboratur; nonnunquam ob arteriarum ossis nutritioni destinatarum obstructionem, interdum ob sanguinis nimiam acrimoniam, ita ut ex poris tubulorum ad callum delatus rigidus latus auctisque partibus eum semper rursus abrasdat, ut in luc venerea obicervavimus. Sæpè ob victus inopiam, ut in pauperibus; item in senibus ob tubulorum ossium angustiam & rigiditatem, ut etiam si adhuc aliquid succi eos transeat, id tamen adeò tenue fit, ut ad calli generationem vix sufficiat. Culibet causæ propria sua convenit curatio, quæ ex supra dictis facili Marte quivis eligere potest.

Symptoma Fracturæ ossium superveniens satis molestum est Synoviz fluxus, vulgo *das Gleden* Wasser vocatus. Hunc fluxum è vas lymphaticis disruptis maxima ex parte effluere cæso, cui si admisceatur nonnullæ aliz sanguinis rubicundi particule, è tubulis vasisque pariter disruptis effluentes, illa sub ichoris flavescens vel rubicundi colore profluit; in iis verò fracturis, ubi epiphytes sunt diffraçtæ & vulnus in ipsa junctura adest, huius ipsi Synoviz etiam illa mucilago sive lymphæ unguinosa ex glandulis partium muciliginosis, *Havers* dictis, sequastrata commiscetur. Fluxus ergo hic sistendus est, tum quod is aliis consolidationem maximè retardet, tum quod vascula lymphatica, si in locis disruptis occludantur, lympham alias profluxuram facili Marte aliorum per ramos laterales derivare mihi persuadeo. Quomodo verò is sistendus, jam alibi dixi.

Pergimus ad Cariei Ossium curationem, *Ossium Caries*, quæ diversa pro causæ sc. diversitate mittitur debet; à tumore & imprimis in eo contenta materia acida, acri ac corrosiva Os corrumptur; sic quoque ab exulceratione produci potest, à cuius acri materia facili Marte Os corroditur, quam exulcerationem comitatur ut plurimum excrementa carnis seu hypercarcosis. A diu denudato Ole relictis & acri imprudenter expolito, Os corrumpi solet. Juxta harum causarum varietatem cura aliquomodo variari debet, sed vix per medicamenta Ossa à Carie hac liberari possunt, si ad ea pervenire non liceat: ante omnia ergo eo incumbendum est, ut per incisionem ad partem siccam deveniantus ad Ossa

Carie infecta denudanda, sed hac cautione, ne majora vasa æque sanguifera ac membranacea tendinosa discindamus, quod evitabit in Anatomicis parum versato facile innotesce: hinc tantum cultro incisório simplici utendum est, ne cunctando pejus reddatur malum, imò ulceratio ipsa cum labiis suis induratis aperienda & abscindenda est, dein vel Os Carie infectum utendum, vel medicamentis imprimis balsamo divino, utendum. Si patiens ferrum ac cultrum abhorreat, imponatur pulvis corollivus Barbetæ ulcerationi & hyperærcosi, eschagra facta eximatur, usque Os denudatum conspicitur, vel plumaceolis imponatur & sublim. cum ∇ plautag. dein imponatur Cariei balsam. divin. noster.

In casu ergo ubi ab aëre Os erant vel alius partis corruptum fuerit, applicandum est calidè Elix. vitæ, & hoc ter vel quater repetendum erit, & quidem plumaceola eo imbuta imponatur. Ossium quoque corruptionem, præcipuè superficiem in vulneribus, ulceribus, maximè tuctur pulv. irosos florent. Si verò corruptio fuerit in palato ossis, eluantur partes cariøsæ seq. vel simili mixtura,

℞. Elix. vitæ ʒiſs.

extrañ. abſynth. ʒiſs.

Camph. ʒij.

Muræ limonum ʒij.

M. quæ mixtura spongia imbuta applicetur.

Omniem quoque Cariem Ossis non tantum præservat, sed & curat oleum ligni Guajaci, vel per se, vel cum oleo cochleariæ maritatum, addito parum ~ ʒiſs seq. modo.

℞. Elix. vitæ ʒiſs.

~ ʒiſs ʒij.

ol. lign. Guajaci,

cochlear. aa. ʒb.

camphor. ʒj.

~ lumbrior. ʒiij.

M.

Vel sequens:

℞. Rad. aristoloch. utriusque

gentian.

virid. flor. aa. ʒj.

salam. arom.

cinamomi aa. ʒb.

caryophyll. ʒiij.

Infund. in ∇ Regin. Hung. per aliquot dies colat. serva.

Tinctura hac lineæ imbuta cariiosis ossibus bis vel ter quovis die imponantur. Conduet quoque Tinctura euphorbiæ, additis granis aliquot Mercurii sublimati. Vel seq.

℞. ~ matricar. ʒiij.

ol. caryophyllor. ʒj.

~ ʒiij.

Camphor. ʒij.

M.

Celeberrimus Dominus Muratello feliciter curavit Cariem ossis, frontis & claviculæ sequenti remedio:

℞. Ol. myrrh.

caryophyll. aa. ʒj.

Guajaci ʒb.

M. & plumaceola madefacta pars affecta tegatur, exfoliatio intra paucas hebdomadas facta, & æget curatus est, vide Decur. Ephem. Ann. 3. Octobr. 131. Pælaudatus Vir hunc affe-

ctum optimè ad Pædathroacem sive Spinam ventosam refert, de quo affectu exstat Josephi Pandolphini libellus, cum Celeb. Mercurii Annotationibus. Si Tumor adit imponatur Empl. Diaphor. M. magnet. Sal. cum ol. ʒ. maritat. vel Empl. Vig. c. ʒ. vel, quod optimum, Empl. de hyosciamo Lud. ʒij. ʒ. dulc. ʒij. malaxe- tur c. bals. nervin.

In Carie Ossium eò semper incumbendum, ut ossi corrupta separentur, & exulceratio curetur, & quidem sequenti modo.

℞. Pulv. myrrh.

aloes aa. ʒj.

Elix. vitæ ʒiſs.

mell. ros. ʒj.

camph. ʒb.

M.

Thermæ artificiales ex ∆ & calce viva paratæ hic summopere conveniunt.

Interponenda sunt quoque Medicamenta interna ad acidum acre corrosivum corrigendum, & cum ut plurimum in Carie Ossium sanguinis massa à scorbuto infecta, & sanguine viscido ac acido referta est, in quem finem conducet purgans, Antimonialia cinnabarinis juncta, decoctum chinæ aliorumque lignorum, cum carne viperarum, item sal. volat. oleos. cum ~ cochlear. item gn. Diaphor. Antihæst. Poter. ~ volat. viperar. C. C. succini, fuligin. eboris, &c. Omnia enim hæc medicamenta juvant, quatenus constant ex volatilibus salibus, aromaticis, oleosis & resinosis particulis, quæ acidum Os corruptum temperant, materiam viscidam attenuant, & sic obstructions reserant, resolvuntque, sic enim succi corroborantur, volatilisantur, & sic reliquos succos restaurant & præservant, imò amica iterum harnonia confluant, & sic faciliè Os corruptum seu cadaverosum de se pellunt.

Externa remedia omnia eundem effectum præstant. Sunt qui in Carie Ossium propediem ad ignem actuale accedunt, uruntque Ossa cariøsa, & sic sæpe curantur: sed eum ægrè abhorreant metuuntque ignem, & non persuaderi possint, quòd Ossa non sentiant, hinc potius præmittenda sunt remedia supra dicta generosa, his verò nihil proficientibus, nullum est securius & utilius remedium quam ustio, modo à Chirurgo experto sectio ritè instituat, & dein os canterio actuali aduratur: dein applicandus bals. divin. vel possunt ferro ignito infundi varii liquores, ut oleum Terebinth. prope oleus, ut vapor ad Os penetrare possit, quòd sæpe egregium præstat effectum. Si Lues Venerea vel Scorbutus Cariem comitatur, his curatis morbis, Caries faciliè sanatur. Si verò fuerit in digito pedis vel manus melius ferro amputatur, ne sincera pars trahatur.

In curatione Tophorum ac Nodorum, imprimis à Lue Venerea obortorum Mercurialia tum internè, tum externè haud negligenda sunt, corpus enim ab impuritatibus viscidis liberari debet, in quem finem ab initio instituat sequeus purgatio, & repetatur singulis septimanis.

℞. Gummi. Guajac. ʒb.

resin. jalapp. ʒj.

ʒ. dulc. gr. xv.

~ Guajac. gr. vi

M. f. pilulæ, pondere gr. j.

Adû.

## CAP. VII. DE OSSIUM FRACT. CARIE & TOPHIS. 733

Assumantur 13. & plures pro re nata, & interponatur sequens Efficacia, *Antivenerea* nobis dicta.

℞. *Essent. scabios.*

*liqnor.* aa. ʒiʒ.

℥. *matrical.* ʒij.

℞. *Gnii* ʒi.

M. dentur 30. usque ad 60. guttæ in vehiculo appropriato, vel decocto lignorum, vel in vino Hispanico.

Præter interna applicanda sunt varia gummata resolventia, antequam ulcera inferant, convenit empl. de Labdano, cui pro libitu aliquid Gnii addatur, vel Empl. de Ranis cum quadruplo Mercurii, vel lamina Hni cum Gno vivo illita: Elix. vitæ, ℥. *matrical.* cum ol. Guajac. & si urgeant dolores momento addito opii, quod dolores sistit, simulque resolvens, vel illinantur Tincturæ nostræ resolvæ ex cinam, caryophyll. macere, cum spiritu vin. alcaliat. parat.

Tophi præsertim podagrici tolluntur illinitione olei, Δ, spiritus lumbricorum & impositione Emplast. de Labdano vel Disulphuris: vel applicetur seq. vel simile cataplasma:

℞. *Rad. alth.*

*allior.*

*sireos rec.* aa. ʒi.

*sem. lini* ʒiʒ.

*coq. cum vin.* add.

*furio. fabar.* q. l.

*campbor.* ʒij.

M.

Pro argano habetur ulnæ querc. & avellan. cum sapone nigro & nitro mixtus calidè appositus. Sequens non erit contemnendum, mutanda enim sunt remedia.

℞. *Succ. nicotian.* ʒij.

*resin. pini* ʒiʒ.

*terebinth.* ʒi.

*Gumm. ammoniac.* ʒij.

*ol. chamomill.* ʒi.

*Elix. vitæ* ʒiʒ.

*Cera* ʒij.

M. f. *ceratum.*

Egregium est sequens in Nodis ac Tophis quibuscunque, & à quacunque causa obortis:

℞. *Rad. Bryonia nigr. excavatam imple cum Gno* Δ 30, & colloca in humido cellario ad 10. dies, *resolutum exime, & radicem in partes divide, & expressum succum collige, quo Nodi ac Tophi innungantur tepide, deinde succo exarescente locum affectum ungue sequenti:*

℞. *Ol. chamomill. still.* ʒij.

*cera* ʒiʒ.

*add. struthiocamel.* ʒij.

M.

Sequens Emplastrum ad Tophos & gummata multa comprobatum est experientia.

℞. *Empl. Oppodeltroc Penoti aut Crollii.*

*sal. alc. vulg. ant.* Gnii aa. p. æq.

Malaxentur simul cum panxillo gummi Guajaci, & exaluta nodis admoveantur.

## FINIS LIBRI SEXTI.



# JOH. DOLÆI ENCYCLOPÆDIÆ CHIRURGICÆ RATIONALIS. LIBER VII.

## DE MORBIS MANUUM ET PEDUM IN SPECIE.

### CAPUT I.

#### De Morbis Manuum Specialibus, nempe Fissura, Sironibus & Callo.

##### §. I.

**C**orpus nostrum, Machina sensu externo deprehenditur longè artificiosissima, mechanicè constructis organis gaudens, in hoc tamen differt ab aliis automatis, quòd hæc gravitate ponderum vel elatere pinnularum per vestes, rotulas, aliaque moveantur; nostra autem Machina à fluidis præsertim spiritibus animalibus tanquam elatere, movetur, quibus ergo spiritibus & opus habent Artus nostri, Manus scilicet & pedes; sunt enim ejusmodi artus, quibus sine maximo incommodo carere non valeamus, cum plures manibus se nutrire debent, hinc & ipsorum affectus nobis molesti sunt, ea propter eos hoc in Libro pertractaturi sumus, & quidem primò Manuum affectus considerabimus, qui sunt *Fissura, Sirones & Calli*.

*Descriptio  
Manuum  
Fissura-  
rum.*

*Fissuras Manuum* referimus ad solutionem continui. Hæ sunt vel *naivæ*, vel *adventitiæ*. Describi possunt, quòd sint scissuræ seu fossulæ parvæ seu rimulæ in manibus à labore validiore, aliisque acerbis scindentibus internis vel externis causis accedentibus exortæ, hinc effluente liquore acri exulcerationes quasi leves sunt.

*Sirones* vel *Sirenes* vel *Cronæ*, aut *Chirones*, sunt vermiculi sc. minutissimi, quasi pediculares in pustulis serolis prurientibus sub cuticula manuum imprimis & pedum subsistentes; Germanis dicuntur *Seurn*, item *Wittelsien*.

*Descriptio  
Sironum.*

Describi possunt *Sirones*, quòd sint pustulæ in volis manuum & plantis pedum vermiculos intus habentes, à lymphæ seu ichore crassiore ovulis imprægnato, minutissimis tubulis in eutem desinentibus impactæ, & ibidem à calore fermentescente, genitæ.

*Callus* seu *Callositas* in genere dicitur de omni duritie cutanea, carneæ & ossæ, quæ ordinaria, quæ extraordinaria, specialiter verò hic sit dictum de Callo in volis manuum oborto.

*Descriptio  
Calli.*

Callus verò manuum describi potest, quòd sit durities cutaneæ volarum manuum, à tubulis compressis & coarctatis, vel à labore, vel calore externo, &c. producta.

§. 2. *Pars affecta* horum affectuum est manus, *Pars affe-  
cta.* seu organon utilissimum, unde & Philosopho Veteri Instrumentum Instrumentorum dicta est. Manus enim ex pluribus constat partibus, hinc & variis subiecta est affectibus: manus suos habet poros seu certa spatia permeabilia, per quos illa sudat, aut perspirat, imprimis pori hi in manibus notabiles sunt respectu tam eorum positionis, quam amplitudinis. Etenim si quis modo operam impendat contemplandi, ope microscopii, palmam suæ manûs diligenter, & adhibito suppone ablutæ, advertere poterit, præter majores illas lineas à Chiromantis certis nominibus insignitas, ut & eas, quæ mediæ sunt magnitudinis, & rugæ cutis audientes, innumeras strias exiguas æqualis amplitudinis atque distantie, ac ubivis ad semet invicem parallelas. Sciatim verò striæ hæc deprehenduntur in summitatibus ac primis articulis digitorum ac pollicis, in summa parte volæ manûs, & prope radicem pollicis parùm supra carpum. In quibus locis striæ istæ perquam regulariter contextæ sunt in triangula spherica, & ellipses, ut in manu ipsa. Super his striis existant pori, æquis omnes ordinibus ac talis magnitudinis, ut absque microscopio etiam oculo visis acumine pollenti pateant. Quòd si microscopio ejusdam ope conspiciantur, quivis porus speciem exhibet fonticuli ejusdam, ac sudor inibi stagnans apparet æquè limpidus, ut aqua fontana, dein etiam resurgens quoties abërgitur. Manus quoque omnivarios habet tubulos glandulasque, nempe miliares, item lymphaticæ, vasa sanguifera, nervæ, membranacea, item musculos, ossaque. Sed hic nobis duntaxat sermo erit de partibus manuum mollibus, striæ autem manuum maxime juvant usum & motionem manûs, cutis quoque volæ densior est ac superior manûs pars cutanea.

§. 3. Ut igitur expeditiorem medendi methodum indagemus Affectuum manuum, *Signa Manuum  
Diagnosica* faciem nobis præferent. *Fissura* verò *Fissura-  
manuum* oculos nostros incurrit, neque opus habemus Microscopio ad istas visendas querendasque, imprimis si præcesserint labores diuturni,

turni, vel lotio manuum aqua lixiviosa aliisque acribus.

*Sironum.*

Longè à Crinonibus Sirones differunt, sunt pustulae vesiculares, in quibus subsistunt vermiculi minutissimi acari dicti instar pediculorum. Pustulae sunt serosae ac prurientes, sub cuticula manuum quandoque & pedum latent. Vermiculi hi microscopiorum ope distinctè satis & accuratè conspici possunt, colore sunt albicante, pedibus exceptis, qui propius intuenti nigricare videntur, pedibus ex instructi sunt, binis utrinque mox juxta caput positis, quibus talpa-rum rita cuniculos subcuticula agere, & oblongas non raro quasi sulcos trahere, simulque molestissimum pruritus producere videntur, quod ipsorum dorsum sit squamosum seu squamis coopertum, affirmat Celeberrimus Dominus *Rebault, Traité, Phys. Part. 1. c. 21.* inquit enim, non ignotus est *acarus* grano arenæ minus animal, quia progressus ejus observabatur, ac tandem per excogitatum & inventum microscopium jucundo spectaculo deprehendimus acari dorsum squamis coopertum, tripedem esse utroque ex latere, & duabus maculis nigris in capite notatum, quas oculos esse verisimile est, quia ad præsentiam cuspidis aciculæ viam intercepti ad latus deflectit; quandoque acarus incedit, est præditus erucibus, necesse est ea crura juncturas habere, quo ex junctura motu fruantur, oportet adesse musculos, nervos & tendines, nervos illi sibi sibi donari, quales deprehendimus in majoribus animalibus vel saltem in æquipollentes: si verò ulterius structuram ejus perpendere velimus, ac de ejus corde, sanguine, cerebro, spiritibusque animalibus verba facere, id in altum mare nos conjiceret, terræque visum eriperet, & confiteri cogeret imaginationem nostram imparem esse, comprehendendæ summæ exilitati ultimarum partium animalculum illud constituentium. Optarem tamen mentem eò dirigi, dataque opera hic immoratus sum, vitaturus ingenii eorum tenuitatem, quibus quodcumque offertur, ridiculum videtur, nisi congruat cum crassiss illorum ideis, jocoque excipiunt dum apud illos sermo de materia aliqua subtili habetur. Cujus agitatio, & tenuitas viam ubique sibi aperit, locumque ubique concedit. Mirum de cætero est, quantas insolentias tam pusillum animal cuti in se excitaré queat, quas stupenda història pluribus explicat *Monfetus in Theatro Insect. l. 2. c. 24.* Nostris verò vermiculi, animatorum seminatoni communiter in extremis manibus pedibusque, in cubito verò & Tibiis rarissime deprehenduntur. Dignoscuntur ab aliis pustulis, à pruritu in supra dictis locis excitato, & præsertim punctis nigricantibus, in ipsis conspicuis, quæ nihil aliud sunt, quàm Sironum capita extorsum protuberantia.

*Calli.*

*Calli manuum* ipso aspectu & tactu innotescit, cutis enim dura est & quasi ossæ, non est dolorifica, quavis novacula vel cultro seindatur, & fere tactus sensus in hisce partibus abolitus est.

*Ætiologia secundum Galenicum manuum fissuram.*

§. 4. *Ætiologia* prædictorum affectuum nunc instituitur, aliorum sententiam pro more consueti nostræ præmittimus. Agmen autem ducunt Galenici, in *Fissura manuum* causam adferentes laboribus duris, vel acrim humorum ad manus effluxui, vel siccitati vel frigidity. Rimas seu fissuras has aliquando profundas esse

scribunt, aliquando superficiales, aliquando callosas & duras, aliquando molles & humidas, aliquando laticas, aliquando angustas.

Sirones oboriri credunt à dulcis pituitæ co-*Sironum*, piâ, ad manus cutem delatæ, imprimis plurimo calore accedente, materiam putridam in manibus existentem animantem, in *Sironibus* putrescentes culpant humores.

*Callum manuum* dicunt esse tumorem durum *Calli*, indolentem, ab humore pituitoso & melancholico, mediante pressu, attritu, & intertrigine, labore, &c. productum.

§. 5. *Paracelsus manuum Scissuram* provenire *Paracelsi* putat ex sale alopeciz, h. e. vitriolato, mem-*Paracelsi* brorumque locustas propter virtutem expulsi-*manuum* vam occupant. Juxta ipsum cum alopeciz gene-*fissura* ratio deviat, in alias quàm proprias locustas, in-*manu* eis sit ejus etiam productio.

Author vidit Sirones in erucibus apparuisse, *Sironum*, & in causa cum aliis consentit.

*Callus* *Paracelsi* est arsenicalis tumor, ex li-*Calli*, quore carnis aut sanguinis proveniens, si post fricationes aliquod exurgat Apostema rubrum atque tumens, *Callum* esse dicit.

§. 6. Helmontus *manuum Fissuratum* origi-*Secundum* nem adscribit aut laticis falsiori cutem volæ ma-*Helmonti* nuum discendenti, aut duro labori, frigori-*manuum* que unde rugæ nimium distenæ rumpantur, quod facilius contingat, si ob defectum laticis di-*fissura* gnioris cutis volæ Manus non satis fuerit irrigata.

*Sirones* Author deducit à Larice putrido, ad *Sironum* manus volam delato, & in ejus glandulis miliaribus subsistente, & pustulam cum vermiculis producens.

*Callum manuum* deducit à laticis glandulas *Calli*, pellemque volæ Manus non irrigantis defectu, hinc omnia sicca & dura fieri contendit.

§. 7. Willisius existimat, *Fissuram manuum* *Willisii* induci à particulis salino-acribus Lymphæ in *Willisii* glandulis miliaribus residuis, quæ aculeis suis *Willisii* cutis, cujus poros permeare nequeant, textu-*manuum* ram dissecant ac discindunt, fibrasque illius di-*fissura* videntes & erodentes Fissuras ea parte in qua ag-*manu* geruntur, excitant.

*Sirones* deducit ab aliquibus humorum par-*Sironum*, ticulis in manibus cespitantibus & putrescentibus, quarum principia evecta & unâ cœmentia invicemque conjuncta tales progignunt vermiculos manus infestantes.

*Callum* derivat ab humore nutritio viscidior *Calli*, atque glutinosiore, qui ad manus advectus, illarumque fibris inhaerens, post dissipatas subtiliores & aquosiores particulas, spissior devenit, & tandem in *Callum*, eo in loco, ubi congestus fuit, convertitur: ipsius etiam originem attribuit instrumenti cuspidi durioris, & insoliti contredationi, à quo partis fibræ vel disrumpuntur, vel sibi invicem superimponitur & propius admotæ corpus durum constituunt, sub quo particulae salinae per insensibilem transpirationem exhalari assuetæ coarctantur, per coarctatos poros facili exitu illis non suppetente, callique duriciem aggestione sua adaugent, evaporatis aquosis particulis, à quibus dissolvantur.

§. 8. *Sylvius Fissuratum Manuum* causam *Sylvii* esse dicit humores acido-acres lixiviosas cu-*Sylvii* tem manus corroderentes, atque Fissuras has pro-*manu* ducentes.

*Sirones*



*Sironum.* *Sirones* seu *Pustulas* cum *vermibus* deducit à liquore sive sero acri & putrido ibidem in vermiculos degenerante.

*Calli.* *Callum* verò *manuum* vel à succis crassis, vel à labore duro oboritur statuit.

*Cavissum.* §. 9. *Cartesiani Manuum Fissuram* fieri censent à defectu humoris benigni, particulis suis teretibus fibras manuum irrorantis. sique tunicam mollem reddentis, ut citra noxam distendi possit, quem defectum interdum causant particulæ rigidiores terrestres in aëre existentes, stante borea exsiccante, vel à calore interno urente, omne humidum consumente, ut in *Hectica*, quare volæ manūs fibræ humiditate privatae, & ob siccitatem rigidae, ad levio rem quamvis tensionem, vel ob laborem vehementiorem facile dirumpuntur, nonnunquam etiam à particulis angularibus acutis fibræ volæ manus discinduntur aut variis in partibus transodiuntur.

*Sironum.* *Sironum* causam dicunt esse particulæ acutæ & oblongas seu filissas, vel cum succo chylosiore ex sanguine per arteriolas, vel cum lymphæ ovulis imprægnata per ramulos lymphaticos ad manuum cutem delatas, ibidemque à calore illo foras ovulorum & animalculorum ex iis exclusioni maxime accommodato, has pustulas verminosas *Sironum* nomine insignitas provenire contendunt.

*Calli.* A succorum quoque defectu & canaliculorum induratione, & quasi quiete *Callum* oboritur contentum, præsertim à labore duriore diutius instituto, unde comprimuntur fibræ & canaliculi, & cum nullis amplius affluat succus nutritius vel lymphaticus, necessariò ductus hi una cum rete mirabili, cute nempe, in duritiem insensibilem ac ferè oleam transcunt.

*Diffusio.* §. 10. Nunc & Nos accingimus ad *Causas* horum Affectionum explicandas, principiis Mechanicis. ut ubique, sic & in his insinuemus, arduum profecto opus aggredimur, hoc præcipue tempore, ubi magna vis inest manibus agilibus, ubi sermonis suavitatis & verborum copia, quamvis etiam apud plures adsit inopia, ignorantia Practicorum apud vulgum plus valet, quam recta ratio Medicorum conscientiosorum. Multi hodie plus æstinant irrationalem Medicinam vel Chirurgiam, quam rationalem operandi methodum, sed nos invidorum calumniis non curamus, salus publica nobis murus est aheneus, rectè faciendo & veritatem docendo nil timeamus; experientur Tyrones Medicinæ nostris insistentes principiis plus efficere se posse, quam aliorum sæpe multa frustra pollicentium. Nos ergo in *Fissura manuum* causas plures agnoscimus, est enim aliquando quædam siccitas seu species contractionis in tubulis manuum, à quæ sepe oriuntur ejusmodi rimulæ in manibus. Sic quoque particulæ rigidae salutaris ad manus delatas faciliè cutis fibrillas minucissimè findere, ac tales sulcos efficere queunt, quales particulæ observantur tempore hyemali in aëre, à quo tum temporis in manibus *Fissuræ* oboriri solent. Quod etiam observatur à lixivio, hinc lavatrices post lotionem linteaminum ab aqua saponaria sibi tot *Fissuras* manuum & sæpe exulceratas accerunt. Quò etiam pertinent succi acres, salsi, ad volam manus delati, in Hypochondriacis, *Hecticis* aliisque scorbuticis *Fissuras* manuum scindendo producentes. Ad quas *Fissuras* exciandas *Æriæ* suum Symbolum addunt, perquam enim provide

super his striis, ac non in sulcis interjectis possi locati sunt, quò sic eorum structura tanto firmitior esset, nec ita facile depravationi per compressionem obnoxia, per quam ipsam scilicet sulci tantummodo dilatantur aut coarctantur, striis constanter iisdem manentibus, porisque non adeò non alteratis, ac ob eandem rationem pori etiam hi largiores sunt, ut semper tanto melius conferentur cute, quantum maxime compressa ac condensata per usum ac laborem manūs: atque pori hi manuum sic constructi ac muniti admodum benè conveniunt, ac viam aperiunt evacuationi particularum sanguinis magis noxiarum, ut salinarum acrimiarum copiosè nempe ad eos advectarum ope continui usus manuum: hinc videmus quod plurimi homines Hypochondriaci, aut scæminæ hysterice tantum non continuum ardorem persentiant in manuum volis, non autem in eorum dorso, quare partes scilicet non adeò calefieri aut frigari solitæ, minùs aptæ sunt ad recipiendas prædictas particulæ noxias, nec proinde isto pororum genere instructæ fuerunt. In Manuum his *Fissuris* deficit quoque *Succus lubricans*.

Quòd *Sironum causam* attingit, jam ejectione à *Sironum* Phylicorum Scholis sententia est de rebus sponte ac sine semine nascentibus, illa è contra opinio invaluit, quod quicquid in hoc ore sentire, imò quicquid vivere videmus, ex ovo emerit, ipsa quoque insecta, quorum magna pars ad unum illud principium generationis univocæ vix referri posse videbuntur, ex ovo originem ducere, demonstratum est jam à *Francisco Redi*, *Malpighio*, aliisque. Contra quam opinionem non ita pridem Jesuita quidam Italus, *Philippus Bonanni*, in Libro Romæ edito insurrexit, & veterum Peripateticorum Sententiam resuscitare tentavit, & ex putredine insecta produci voluit, imprimis limaces ac vermes, sed solidissimis rationibus iterum à prædicto laudato Viro refutatus est. Ovorum ergò doctrina apud eruditos omnes nimis inclaudit, quam ut operæ pretium judicemus isti stabilizandæ diutius immorari: quapropter superest nobis impræsentiarum demonstrare, quomodo ova quædam intemerata ad manuum volas, pedumque plantas deportentur, ibidemque excludantur. Sciendum ergo est ex quotidianâ experientia, muscas aliâque insecta ovis suis epulis nostras æquè ac potus conspurcare, eaque brevissimo temporis spatio, per ætatem nominatim, in carnibus excludi, sed quum nobis etiam mense accumbentibus vel paulò ante, muscæ cibariis circumvolitent, vel ea in quæ ova sua eructant, qualis est panis vel potus, ipsis ita properè excludendis non obstetricentur, illa integra ore excipimus, & cum ob molis sit ténacitatem dentium attritionem declinent, ac intacta deglutimus; eadem tenuitas à fermenti ventriculi spiculis ipsæ tuetur. Quare cum cibis in eo concretis in duodenum descendunt, in quo uti & in reliquo intestinorum canali quodam exclusa in varias lumbricorum species commutantur, minutiora verò aliquid superant, quæ vel ob exiguitatem, vel immaturitatem cum chylo in venas lacteas abripiuntur, circulationisque lege sanguini permiscuntur, & in universas corporis partes devehuntur. Habitus autem corporis passim est poris pervia, iis verò quibusdam in locis patentioribus, & in aliis arctioribus: unde fit, ut ova illa,

vel

vel etiam vermiculi exclusi, per priores unâ cum sudore vel halitibus perpetim per eos exeuntibus extrudantur; at eum pori in volis manuum plantisque pedum subsistentes posterioris sunt ordinis, seu à primis principiis, seu à continuo attritu, perpetuoque aëris ambients contactu, ova retinent, quæ à vicini sanguinis calore fixa, & ab halitibus indefinenter avolantibus irrorata, in illorum gremio excluduntur, vermiculosque *Sirones* dictos efformant, qui aliquoties & in facie apparent; in iis partibus, in quibus pori strictiores sunt. Multum & hic facit manuum applicatio rebus ejusmodi ovis conspurcatis, quæ dein se insinuant cutis porulis & interstitiis in hunc finem adaptatis, sicque produci possunt. Sicuti Acari è lacticio veterascence facie oriuntur; sic *Sirones* etiam è corruptæ chylositatis ovis refertæ, alimentaris succi roridæ lymphæ particula generari possunt. Quæ dicta animalcula *Sirones* dicti producantur sæpe maxima in copia, hinc vidit Celcb. D. *Daniel Ludovici*, *Eph. Germ. Ann.* 9. & 10. *Observ.* 39. fœminam corpulentam per totum aqualiculum confectariæ ejus miserimè obflectam, & ad summam impatientiam usque vexatam, quæ fœmina præ pudore domestica saltem, nec incongrua adhibuerat remedia, sed frustra: unde affinem aliam, in effodiendis istis animalculis exercitatum, dato Sostro dimidio frumenti carioris modio, adhibuit, quæ continuo per paucos, totos tamen ætivosque dies, labore ultra quatuor millia se excinxisse, & eum glomeram cannabis granum æquans collegisse, in cochleari ferreo cum stridore combustibile jurabat mulier à nugis aliena hodieque vivens. Ista verò sic sibi restituebatur, enchiridion fassa, veneficioque impunita.

**Calli.** Quod *Calli causam* concernit, sciendum est, quod in Callo canaliculi sunt indurati, & motu non gaudent peristaltico, seu adhæc canales sint, seu unâ oclusi in fibras, i. c. filum degeneraverint. Calli ergo ab induratione sunt, cum canales membranz, quæ molles erant, eam duritiem adipiscuntur, qualis in tendinibus, cartilagine & quasi ossibus reperitur. Neque mirari licet, sic indurari tunicas vasorum, quia in cute, imprimis manuum & pedum, non modò frequentes calli sunt, maxime in iis, qui vehementes labores sustinuerunt, verum Anatome defunctorum docuit, arteriam aortam, & arterias carotides, aliaque vasa nimium quantum ossis duritiem assumisse; ita in ipsa senectute cutis à succorum defectu dura fit, & in rugas hinc inde contracta, quod etiam nullum foret, indicio est, membranas omnes cum tempore aut his vel illis de causis indurari, uti cartilagine & ossa, quæ in primis annis ad eam molliam, ut nondum motibus in stando & incedendo suffecerint, paucis annis soliditatem acquirunt, quæ cum facta est, non subsistit, sed ultra pergit: ita quoque membranis contingere & ratio docet & Anatomie. Nam ut membra omnia crescant, atque in majorem molem sensim extenduntur, longioraque & crassiora evadunt, ita etiam duriora redduntur, sensimque per ætatem à fluido & molli principio, unde cæperunt, deficiunt, atque quod lenibus evenit ab annis, id hinc inde à morbis accidere solet, ut nimirum canales indurati cartilaginci, callosi aut ossi facti idcirco sint

minus fluxiles, & quod antiquitus erdebant, fibræ, i. c. fila sine meatu interno, sunt plane exsueca. In Callo enim deficit *Succus lubricans*, qui membranas, runicas, cartilagine & vasa omnia oblinat, lævcmque & glabram efficit superficiem, quali quoque exterius cuticulæ cutis, quæ sulci adimpleantur, hic autem potest deficere, vel crassior ac viscosior reddi, unde facile callus in manibus aliisque locis oboriri potest. Certum ergo est, Callum fieri vel ab induratione & commutatione, seu compressione ac condensatione, cutis canaliculorum in duritiem cartilagineam, aut huic proximam, vel eâ majorem soliditatem, id quod à crassiore alimento efficitur: ita ut brevi ad senium suum perveniant membranz, quæ solent alioquin molles dum remanere, imprimis si succi omnes in istis tubulis quiescant.

§. 11. Quod *Prognosis* attinet, Affectus hi ut *Prognosis* *Fissuræ manuum* nihil mali portendunt, sed tantum manus dedecorant, & quibusdam artificibus impedimento sunt. Inveterate manuum *Fissuræ* difficulter curantur, sed sæpe homines ad mortem usque comitari solent, imprimis si fuerint nativæ.

Nullum quoque à *Sironibus* imminet periculum, sed facili negotio extingui possunt. Sed quum innata partium succorumque dispositio vel difficillime vel nullo modo immutari queat, vix præcaveri potest nova eorum generatio. Cum radices cęgant altiores, du sæpe durant cum maximo & tedioso pruritu, & non prius curantur, quam usque omnes vermiculi excinxi fuerint, ceu constat ex superius dicta historia.

Cum & *Callus* sit affectus cutaneus, nullum *Calli* ergo infert periculum, manibus vero defæcationem quandam affert. Calli inveterati sunt difficillimi curatu, & cum affectus canaliculorum sit, qui raro semel uniti & constructi iterum dissolvi ac dilatari possunt, hinc vix curabitis *Callus* inveteratus existit.

Ut in minimis affectibus *Dietæ* opus est, sic *Cura Dietæ* & hæc in his affectibus necessaria est, tutum *utitur*. enim bona *Dietæ* remedium est, nec in externis affectibus negligendum, quod sæpe vel solum de malo præsentis triumphat. In his ergo manuum affectibus aër sit temperatus, vitetur frigidus ac nimis calidus; temperatus enim optimus est ad succos nostros fluidiores conservandos, è contra frigidus ac asper succos coagulat inspillatque; hinc videmus, quod cutis à frigore densa, crassa ac minus pervia reddatur. Accommodatissimi quoque cibi bene nutritives sint temperati ac humectantes, fugiantur cibi visci, acidi, salini ac frigidi, elegantur potiùs alimenta aromatica & sale volatili turgida, quæ virtute incidentiæ corrigendi succos viscidiores prædita sunt, in *Sironibus* præserventur imprimis alimenta, ne à muscis conspurcentur ovis. Potus sit largior, imprimis in *Callo* manuum, ubi maxima siccitas est & defectus succorum in tubulis, qui ergo sunt irrigandi, capropter potus *Theæ* vel *Cassie* conveniet. In *Sironibus* potulenta optime obtineantur, ne muscarum ovulis perturbentur, Quies corpori concedenda, à laboribus enun abstinentum, ne per hos cutis manuum magis densa ac aspera reddatur, imprimis manus haud laventur lixiviosis aliisque vcnænis acrioribus.

*Curatio  
Gulonis-  
rum in  
Manuum  
Fissuris.*

§. 13. *Galenici* in *Fissura Manuum* ad causam, à qua producit, attendendum esse inculcant, si à laboribus, nam accedente quavis violentia semper recrudescunt, si à lixiviosis saponariis aquis, ea omnia vitare debent, imprimis omnia acris, salia, aut aspera, saponaria. Inter localia maxime laudant pinguis, & adipe asferino aut caprino curant, aut cum medullâ bovillâ aut cervinâ, ita ut cum sempervivo atque terebinthina unita, illinant, aut gallam omphacinam tritam, terebinthina aut clypeo liquido aut melle excipiunt & imponunt. Alii gallam & mastichen quàm tenuissimè trita clypeo, i. e. lanæ succedæ sordibus in formam cerati redactâ excipiunt & utuntur. Nonnulli gallarum unciam unam, cadinæ unam, ceruclæ quadrantem conturunt cum rosaceo & illinunt. Item Miste pastillum cum sapa aut vino dilutum satis crassum imponunt. Alii Adipem asferinam, vel sebum caprinum melle ac solani succo mixto adhibent, vel lacte illinunt. Alii decoctum malvæ vel altheæ cum semine lini factum, vel cremor. hordei & mucilag. tragacanth. sem. malvæ aq. ejusdem extract. tepide lavant. Alii rimas digitorum ac pedum pice liquida oblinunt, cancerum fluxatilem ad carbonem arunt, testam abradunt, ex oleo tereant ad mellis spissitudinem scissuris prius abstergis instillant, & Cornu C. cum sevo caprino mixtum laudant.

*In Sironi-  
bus.*

In Sironibus veteres commendant variâ amarâ, imprimis sequens decoctum, quo manus lavandæ sunt sæpius.

℞. *Herb. absynth.*  
tanacet.,  
cent. min., aa. Mj.  
Coq. in aqua communi vel vino.

Vel:

℞. *Ol. absynth.*  
anagallid.  
cydon., aa. ℥ijj.  
In his dissolvunt  
myrrha 3℔.  
pulv. C. C. 3℔.

M. f. linimentum.

*In Calli.*

In Calli Manuum Balneum ex herbis emollientibus parant & manus imponunt. Pinguibus quoque & oleosis manus callosas lavant.

*Paracelsi  
modus cu-  
randi Ma-  
nuum Fis-  
suras.*

§. 14. *Paracelsus* in *Fissuris Manuum* sequens magnificat.

℞. *Ex quatuor gummi, oppopanas.*  
Serapini,  
Galyani aa. 3℔.  
Colophonie 3℔j.  
Terebinthina lota 3℔ijj.  
M. f. Unguentum.

Liquefac illud super carbones, & sic manus calidum superponatur per duodecim horas, deinceps laventur aquâ mundâ, rursusque superponatur eis calefactum, hoc toties repetendum est, donec liquorem amplius non emittant, quod plerumque fit in quindecim plus minusve diebus. Quatuor gummi peculiarem admirandamque virtutem absterisvam exsiccativamque habere memorat. Abstinendum verò esse inculcat ab aquis corrosivis, cantharidibus, à purgationibus, unctionibus, fumigiis, & signo Guajacano.

*Sirones.*

*Sirones* Paracelsus expellit per vermes in hominibus ortum & sustentationem exhibentes,

siccatos, pulverisatos, nec non hominibus intrinsecus administratos, cum quovis liquore, præsertim in caprino lacte. Externa omnia quæ in ulceribus verminosis profunt, hic quoque conducere ait.

*Callum Manuum* resina locustarum Abietis *Callum* curari alicrit. In Calli cura postquam in apostema transierit, hac utitur descriptione.

℞. *Olei rosar.* 3vj.  
calci viræ extincti 3℔ij.  
caphura 3v.

Fiat Mixtura, quæ superponatur unguenti loco.

§. 15. *Helmontius* in *Fissura Manuum* Medulla inungenda suadet, unde pellis volæ maris rigidior emolliatur, & dissoluta redimitur, eapropter præ aliis medullam crucis vituli linimentum redactum, appropriatum satis reputat esse remedium.

*Sirones* Author dicit haud melius curari posse, In Sironibus si animalcula hæc in pustulis existentia intermitantur, in quem finem commendat aquam communem cum Mercurio vulgi bullitam, quia sæpius laventur manus.

*Callum* verò *Manuum* curare tenet per balnea & fotus, atque calida fotaque unguenta pellis volæ manus applicata, item varia Emplastrâ, quæ odoribus suis resolvunt duram manum pellem.

§. 16. *VVillius* in *Fissuris Manuum* curat illis inungendo vel balsamum Arcei, vel Peruvianum, vel linimentum ex sevo hircino, pauca cerâ & paucò ol. hyperici paratum.

*Sirones* enecat paribus ipsis interstitiis illinen do essentiam aurantiorum, vel pomatum, cui admixtus fuerit Mercurius sublimatus dulcis, vel illas lavando decocto ex herbis absynthii, scorodii, centaur. cort. aurant. aut tandem illas inungit aqua sublimata.

*Callos Manuum* Decoctis emollientibus, & Calli emplastro de Macilagine applicato emollit, eumque dein scalpro aufert.

§. 17. *Sylvius* in *Fissuris Manuum* omnia ea *Sylvius* commendat, quæ acrimoniam humorum temperant ac corrigunt, in quem finem laudat oleosâ plura, oleum ipsium, lac quodvis, & alia acidum abstergentia, ut cretam, saccharum Saturni, tutiam, mastichen, Fissuris manuum inuncta, aliaque cataplasmata sæpius dicta.

*Sironum* cura, juxta ipsum, absolvitur æquè *Sironum* decoctis internis sudoriferis, quàm evacuationibus Mercurialibus, Decocto Guapaci, centaur. min. tanacet. foveri vult, quibus non proficientibus ad Mercurialia transit, nec non Mercurium præcipitatum unguento Diapomphalygos admixtum, & pustulis verminosis manuum applicatum commendat.

*Callum* verò *Manuum* variis emollientibus *Calli* impositis curare satagit, in quem finem oleosâ, cataplasmata ex emollientibus parata, item emplastrâ blandiora laudat.

§. 18. *Cartesiani* ad curationem *Manuum Fissurarum* pro voto obtinendam, operæ pretium ducunt, ut fibræ rigidiores siccæ emolliantur & humectentur, atque quod salis acidi acuti in succis istis cumulatum est, hebetetur & corrigatur, quo consolidatio partium se junctarum faciliè subsequatur. Particulas igitur acuias acido-saliss reliquis intentionibus advertas domant remediis porosis & volatilibus, spiritui sc.

vini

vinī camphorato, ∇Ψ dulci, vel linimento ex oleo lini & terr. ∅-li dulc. vel Fibras rigidiores tum emolliunt pinguioribus, axungijs animalium, oleo ovorum, lumbriecor. inomordia. Mitigatis particulis acutioribus, & fibris emollitis, consolidationem haud diffiulter confecturam esse confidunt, aut ulceribus profundioribus adhuc manus occupantibus oleum myrrhæ, vel balsamum de Capaiva, vel alium appropriatum imponunt, & cavitatis fissurarum manūs opplectionem, sique ipsam consolidationem, vel unguento Diapompholygos, vel emplastro gryseo, stiptico aut Diapalmæ penitus perficiunt.

**Sironum.** Ad corrigendas particulas falsas & acritas in *Sironibus*, & necandis vermibus, medicamentis utuntur porosiss & alcaibis amaris permixtis, à quibus non duntaxat particulae falsæ & acutæ pustulas producentes absorbentur, sed etiam vermes necantur, commendant ergo præ aliis spiritum vini aloëticum & myrrhatum, quo pustulæ sunt illinendæ, vel linimentum, quod parant ex colocynthide, aloë, hellebor. alb. Mercurialia quoque hic magnificiunt, & ex pinguedine & ∅r. dulc. unguentum paratum pustulis istis illinendum, magnificiunt.

**Calli.** In *Manuum Callo* varia emollientia commendant balnea, ac foras, item immersiones in oleum lini; ex spermate Ceti parant ceratum diuque Callo imponunt, vix tamen remedium hic dari approbatissimum existimant.

**Nostre manus curandis Manuum Fissuris.** §. 19. Ea quæ in curandis *Manuum Fissuris* Cartelianis tribuimus, etiam *nostra* facimus, còcniū operam impendunt, ut fibræ manuum rigidiores emolliantur, quod optinere possumus per mucilaginosum per porosa, particulas angulres absorbentis, hinc sequens linimentum solenne est, quod paratur ex Sevo Cervino, Tutia, Camphora, Sale Saturni, Oleo ovorum. Novius aliud parare ex Talco & magisterio Marchasitæ, quod egregium est. Sevin hircinum familiarissimum remedium est contra Fissuras manuum, imprimis à frigore contractas. Nostre Lavatrices in Fissuris manuum ab aqua saponaria productis, uti solent cerevisia calida, in qua vel butyrum, vel sevin hircinum fuerit solutum, quæ lavare solent manus Fissuris defædatis. Ex amygdalis, Benzoinis, Camphoratis, aliisque parare solemus massam instar saponis, quæ manus laventur, item non continendum est unguentum de sevo hircino Mynf. vel Empl. de carne bubula M.

**Sironum.** Quod curationem *Sironum* attinet, quæ nostro iudicio curantur vermiculorū vel evulsionem, vel enecationem, loci affecti ablutione ac inunctione, sæpe hoc in casu sufficit spiritus matricalis, cuius solius usu vermiculi facillè enecantur, & simul pustulæ puriginosæ sanantur. Vel ablutione sequenti vel limilidecocto:

∅. Decoct. quercus 3vj.  
pulu. aloës 3j.  
aluminis,  
myrrh. aa. 3j.  
Succ. absynth. expr. 3ß.

M.

Aqua Theriacalis, cum farina lupinorum, instar epithematis applicata convenit, omnia amara, ut fel animalium, succus flor. persic. acaciar. lapath. nue. jugland. tanacet. absynthiaca, aloëtica, myrrhiata: Item Mercurialia, lauda-

mus imprimis cum Helmontio aquam communem cum Mercurio vulgi bullitam. Omnia ea usurpari possunt, quæ in Phthiasis conducunt, eodem enim ferè modo hic affectus curari potest. Aliquando nec Amara nec Mercurialia vermes pellere & enecare solent, sed potius contra communem methodum piperis & mellis majorem enecandi vim habuisse, in Praxi nostra observavimus; pipere enim muscæ aliaque insecta enecantur, quidni etiam vermes. Sit ergo formula:

∅. ∇ hyperic. 3vj.  
mell. commun. 3ß.  
pulu. piperis 3j.  
M. d. pro cluendis Sironibus.

Vel:

∅. Summ. absynth.  
Tanacet. aa. Mß.  
myrrhæ 3j.  
croci opt. 3ß.

Coq. in f. q. vini Gallic. ut colatura fiat ad 3x. cum spongia Sironibus applicanda. Si quis Mercurialia amet, sequens proderit:

∅. Axung. porci 3j.  
Argent. vivi 3j.  
∇ fort. 3ß.

M. f. linimentum flavum. Sequentia verò prius usurpanda sunt, antequam ad Mercurialia accedamus:

∅. Summ. absynth. Mß.  
myrrh.  
aloës aa. 3j.  
Q. alb. 3ß.  
A. r. v. 3j.

M. & detur usus; coq. in f. q. vin. Gallic. ad 3xij. quibus add.

∅. ∅ci 3j.  
camphor. 3ij.

M.

Vel:

∅. ∅ matric. 3j.  
extr. absynth.  
genian.  
angel. aa. 3ß.  
ol. lign. sancl. 3j.  
myrrh.  
aloës aa. 3ij.  
camph. 3j.  
∅ci 3iß.

M. ad cluendos Sirones.

Et cum ut plurimum hiæ in hominibus Sironibus vexatis adliant sanguis & succi tenece ac viscosi acidi, inde ad ova excludenda apti, prout quotidie videmus in aceto aliisque vinis accefcen- tibus & tenacibus factis ejusmodi vermiculos, quod etiam observatur circa carnem, caseum, &c. itidem facili Marte ex lymphæ acida viscida quasi ad putredinem tendente, cum ovulis tamen imprægnata, ad cutem delatâ, pediculos generari posse haud dubitamus. Quare & interna remedia in Sironibus suademus ad viscidos acidosque succos corrigendos, & sanguinis massam emendandam, in quem finem proderit decoctum lignorum ex Salisfræ, Guajac. rad. gentian. angel. bacc. lauri, herb. centaure. coch. sale Q. Intus, vel in vino Gallic. vel cerevis. vel in sero lactis coctum, ad 3xxx. addit. oxymel squillit. 3j. bibat æger prohibitu. Interponat etiam feq. essent. à 3ß. ad 3j. in vino Hispanico, vel aqua mulia assumentam.

Aaa 22 1

∅. Elix.

- ℞. *Elix. vite* ʒij.  
*extr. absynth.* ʒi.  
*R. corallorum* ʒi.  
*ol. Sassafras* gutt. viij.  
*Aurantior.* gutt. v.  
 M. D. usui.

Ad Mercurialia quoque interdum accedendum, & vesperi pro re nata seq. assumenda sunt pilulæ:

- ℞. *Resin. Guajac.* ʒß.  
*Gumm. ammon.* gr. vj.  
 ʒ *dulc.* gr. v.  
*ol. Guajac.* q. l. f.

#### Pilulæ.

Omnia hic conveniunt, quæ vulgò dicuntur putredini resistentia, ut sunt omnia myrrhata, Antimoniata, aloëtica, volatilia quæcunque, spiritus matricalis internus, sal volatile oleosum, spir. volat. cum ol. Tanacet. vel cort. aurant. vel myrrhatum, quo egregium præstabis effectum. Essent. cent. min. absynth. cort. aurant. flor. persic. Nec non aliquando cum ʒ *dulci*, pulvere Jalappæ, sale absynthii instituitur purgatio, & ovula ista ex primis viis eliminanda.

Optimè cura succedit, si statim, quando se exhibent Sirones, effodiantur, sic scirmina ista cupus mentionem fecimus superius, tali modo à

quatuor mille Sironibus liberata fuit, immunesque ab iis semper vixit.

In *Callomanum* ed respiciendum est, ut *tu-Callum*. buli iterum amplientur, ac flexiles reddantur, ut succum nutritium ac liquorem lubricantem majori copia recipere ac continere queant, in quem finem præter internæ absorbentia, volatilia succos attenuantia, & sic pressione succorum adjuvantia, & per consequens canaliculos ampliantia, ut sunt spir. C. C. volat. ʒ volat. oleos. spir. cephal. &c. conducent, & externa varia Topica emollientia ac resolventia cataplasmata ex aromaticis, fl. chamom. ll. sem. fenigræc. cum lacte coct. & sæpius applicat. vel calulus cum ~ vini, camphorat. crocat. vel ~ matricali fricetur, vel iis imbuta lintea imponantur, vel gum. ammoniac. in ~ vin. solut. & iterum inspissat. applicetur Callo. Balnei ac fotus seu immersiones manuum non negligenda sunt ex emollientibus parata. Spermatæ ceti fuso & liquefacto linteam intrudatur & applicetur callo manuum, sic quoque laudatur succus Sempervi vel Tabaci Callis impositus, hinc emolliuntur Calli, ut postmodum abscindi possint. Sed diutius his immorari non oportet pretium duximus, quia rarissimè Medici vel Chirurgi in his consuluntur ab ægris.

## CAPUT II.

### *De Digitorum Coalitu, Digito Sexto, & Paronychia.*

#### §. I.

**E**Xtremis etiam Articulis insidit in tantum struuntur, nobiliorum ut partium infelicitatem non superent, maximè tamen adxquant. Non dicam jam de cunctis Articulis Adfectibus. Sinto nobis *Digitorum* tormina, quis enim non cuncterore apiciat *Coalitum Digitorum*, vel non admiretur ac stupeat *Digitum sextum*, quis *Paronychia* truculenta ac periculosissima symptomata diu perferre potest? Ut ipsi hi affectus & in Scriptis Medicorum, & in foro Practico minus obviæ, ejus sub tyrannide vel mœsti, vel gembundi, tremebundi ac in *Paronychia* turibundi aliquando eheu! apparent.

*Digitorum Coalitus.* *Coalitum Digitorum* dicitur & ipsorum Coalescentia, Græcis *εὐσύνωσις*, est enim nihil aliud quam unio & compages duorum digitorum in utero matris facta.

*Digitus sextus.* *Sextus Digitus* etiam fit in claustris Matris, quando scilicet infans in lucem prodeat sex Digitis instructus, vel in una vel utraque manu. Meminit etiam Sacer Codex 2. *Sam. 21. vers. 10.* Viti excelsi, qui *Sex* in manibus pedibusque Digitos habebat. Totidem instructum Neostadii ad Orlam Archi Diaconi filium vidit D. *Joh. Petrus Prækelius*, testant. *Eph. Germ. Ann. 9. & 10. Obs. 8.* Sex scæpe, septem verò Digitos in utraque manu vidi semel Limburgi ad Lhanam.

*Paronychia* dicitur à Græco *παρόνυξ* & *ὄνυξ*, i. e. *prope unguem*, quia hic Affectus in summitate alicujus Digiti, lateribusque unguis reperitur, & est Abscessus seu fistula cutis circa radicem unguis. Nonnullis imprimis Latinis *Reduvia* dicitur, alii *reduvium*, item *redubium* appellant: alii verò *Reduvium* alium ducunt affectum, præ-

rygium vocantes. *Panarium* etiam vocatur ab aliis. *Paracelsus* libr. *de Apocrem.* cap. 17. pag. 439. affectum hunc etiam *Pallam* nuncupat, hoc est, distentum, à pato vel pando, quia extremitates digitorum distendit. *Os fractum* à quibusdam nominatur, quia si non recedatur, affectus os corrumpit & perdit. Unguis juncturam Hispani *Panarizo*, Itali *Panaricio* hunc affectum dicunt. Gallis verò dicitur *Panaris*, le ver en doigt, Onglée, i. e. Unguiritio. Belgis *der Rodnagel* seu unguis invidiosus; nobis Germanis audit *der Wurm* à dolore mortificativo vermis ad instar rodente. Aliis vocatur *das Mittel* / quasi mediale, medullarium enim digiti infestat. Pariter ob genuini nominis ignorantiam, partim ob vulgi creduli imaginationes simpliciter *das Ungenamme* / *das scæpe Ding* cognominatur.

Discerni tamen merentur, quod affectus ille sit levis, qui externam solummodo cutim affligit, ex gr. *Reduvia*, inde *Plutarchum* libr. *de mul. pudor.* risu prosequitur hepate laborantem, quod à Medico remedia ad *Reduvium* peteret; unde etiam Proverbium enatum, *Reduviam* curare, i. e. rem leviem: de hoc tamen impræsentiarum animus non est agere. Propriè verò dicta *Paronychia* periculi dolorisque plena, interiores Digitorum partes corroden's *Panarium Arabum* salutatur, & hunc affectum hoc loco enodandum sumimus.

Describi potest hic affectus, quod sit tumor *Descriptio* in extremitatibus Digitorum dolorificus, cum *Parony-* periculosisimis non raro symptomatibus, à stagnatione succorum acrimis, circa prelosum, corum-



eorundemque à tubulis suis effluxu productus. Extuberantia equidem in initio tantum levis est extremis in partibus Digitorum, neglecto autem morbo tota manus, imò brachium ipsum intumescere consuevit. Sunt qui hunc affectum modò per abscessum, seu apostema, modò per inflammationem, modò per ulcus definiunt, cum nonnunquam vel inflammatio, vel abscessus intercurrat, & ulcus sæpe producatur. Sed nostro iudicio nihil interest per quod definias, modò causam & curationem bene noveris.

*Differen-*  
*tia Paro-*  
*nychia.*

*Differentia* quòd attinet; Paronychia alia est superficialis, alia profunda, illa cum exiguo dolore extremas tantummodo partes, hæc verò nervos, periostium, fibras tendinosas, & ipsa ossa immanissimis exerciat doloribus. Paronychia à pterigio differe dicitur, quòd illa plerumque abscessus sit circa unguum radices coeins; hoc verò carnis salutari incrementum, partem tantum operiens, ex Paronychia aliaque causa proveniens. Ratione Subjecti alia extremam solum cutem affligit, ut Rednizæ, alia verò interiores partes, ut duræ matris processum, periostium scilicet & os ipsum clandestino modo afficit: alia insuper in manuum, in pedum digitis reperitur, juxta *Theophr. Paracelsum de Myster. Verm. c. IX.* alia anterioris, media alia, in tertio alia reclinat digito, veram, ac genainam propè unguem, spuriam verò juxta reliquas partes invenire licebit, alia in latere unguis, alia in dorso digiti, alia in ventre ejusdem exiit.

*Parte affe-*  
*cta.*

§. 2. Concinnè *Cornelius Celsus l. 4. de re Medica cap. 1. pag. 53.* inquit, facilius omnium morbi curationesque in notitiam venient, si prius eorum sedes ostendero, quibus Subjecti accuratæ notitiæ necessitatem clarè admodum posteritas reliquit. Sunt ergo Digiti, de quibus hic agimus, qui constant plurimis canaliculis nervis, tendinosis, membranosis seu periostio, venosis, arteriosis, lymphaticis, oleis, &c. hinc iidem externis morbis obnoxii sunt, quàm alia partes extrinsecæ.

Subjectum verò Principale Paronychiæ dici potest Periostium, (aliquando & ipsum os:) Periostium cum membrana sit tenuissima, & nerva, faciliè patet quàm exquisitissime sentiat. Minus principale seu adæquatum, ut cum Scholis loquer, sunt digiti manuum & pedum, eorumque maxime extrema cum annexis partibus, quæ in consensum trahuntur, ut sunt cuticula, cutis, carnosa progenies, venæ, arteriæ, glandulæ & tubuli ad vitam & nutritionem facti, imprimis nervi ad sensum destinati, imò ipsa ossa non sunt à lætione libera, quia non raro cortosionem & cariem ob hanc ipsam causam patiuntur. Experientiâ constat pollicem præsertim huic malo subijci, seu quod major sit, seu quod præ reliquis injuriis externis & laboribus sit expolitus, præcipuè cum ipse singulorum reliquorum quasi minister & adiutor existat.

*Diagnos*  
*is digitorum*  
*consuet.*

§. 3. Nunc paucis Digitorum Affectuum *Diagnosin* perspicimus. *Coalitus digitorum*, quando scilicet factus in lucem prodit, digitos alterutrosque vel utriusque manus mutuo conjunctos & unitos habens, ita ut unicam partem constituere videantur, sufficienter dignoscitur, & oculis nostris percipitur. Sic infans alicujus, cæterè sanissimi, digitus dextræ manus annularis & minimus, itemque pollex & index

ope ligamenti coaluerunt, hoc modò, ut pollex minor iusto indicem annexum, sicut arcum funis incurvat, ad se traheret, accretâ in medio eorum carnis parte, velut novi pollicis rudimento: in sinistra quoque manu pari ratione uniebantur digitus minimus & huic proximus, interjectâ ad superiorem articulationem etiam carunculâ exiguâ: ceteri testantur *Decur. Eph. Germ. Ann. 6. Obs. 58.*

*Digitus sextus*, cum factus in lucem prodit, *Digitus* in sensus nostros incurrit, hinc non necessarium *erati.* ducimus longiorem de hoc affectu proponere *Diagnosin.*

Signa sequentia & imminemem & præsentem Paronychiam produunt. Imminemem enim indicat dolor circa radices Unguum exiguus, levis & adhuc tolerabilis: præsentem verò indicant dolor exquisitissimus, seu eructatus incredibiles, tumoris æquè ac ruboris præsentia, totus enim digitus maxime tumidus est, ut quater crassitudo ordinariam superet; pullatio autem vehemens, quæ accidentia ob consensum nervorum per totum sæpe brachium extenduntur, accedunt vigilie, deliria, quæ dependent ab inflammatione periostii. Appetitus est prostratus, lipothymia, inquietudines percipiuntur à Chirurgis, si dolor non cessat, & remedia inconcinna applicantur, sæpe Gangræna ac Sphacelus aliaque graviora accedunt symptomata.

§. 4. *Causam* horum affectuum, & quidem *Ætiologia* primò *Digitis Coalitis*, ipsi *Galenici* statuunt, *secundum* digitos vel in Utero Matris proximus, vel propter communem exulcerationem coherere, & inde deducunt causam à vi plasticâ. A quâ causâ quomodo derivant

*Sextum digitum* in Utero ob errorem vis plasticæ productum: adnasci enim dicunt digitos, quandoque propè magnos digitos, quandoque juxta parvos, raro autem circa alios digitos violos esse statuunt. Qui verò ita agnoscantur, partim per totum carnosus sunt, partim etiam ossa in se habent, quandoque etiam ungues qui ossa habent, partim ab articulo exortum habent, in commissurâ ad articulum cum altero digito communicantes: partim ab intermedio enati sunt: qui igitur ab intermedio sive spatio inter articulos enati sunt, periculis immobiles sunt, reliqui quandoque moventur. Causam immediateam seu proximam Paronychiæ, dicunt esse *pituitam* seu affluxum humoris factum jam & consistentem, mediatæ proximioris causæ titulum sibi vindicat influxum faciens & irruens humor calidus, biliosus & acris, seu sanguis non quidem floridus, sed humoribus tenuibus, venenatis ac malignis inquinatus, vel pituita conereta putrescens & corrosiva, vel tenuissimus biliosus sanguis. Alii ex ipso corpore classe à sanguine acuto & atrabiliario deducunt causam hujus affectus. Causam quoque ejus aliquando esse dicunt ab ossis ipsius fractura, quâ ossis frustulum partibus nervosis & sensibilibus infigitur. Peccat etiam juxta ipsos sanguis quoad cilendi modum, tum quantitate, si plus ad partem hanc affluit quàm à Destrâ Naturâ ipsi fuit assignatum, si extravasetur, quantillum etiam illud licet, & hinc ob prohibitionem reassumptionem stagnet & coarctatur. Hinc aperture factâ, macula una vel alio rubicundior sæpe occurrit, ceteri causâ continens *omnes* mali. Consideranda volumus hoc in affectu, membrum mandans, recipiens, vias & modum

dum partem mittentem. Ipsi totam pro subiecto causâ agnoscunt nullam sanguineam, concurrunt etiam viscera coctioni & sanguificationi, Hepar imprimis aliaque, dum certa quardam ob impedimenta munia naturalia ritè atque decenter obire non valentia: inde sanguisibile, acribusque imprægnatur humoribus, quæ inausulto auspicio parti affectu affiguntur. Recipiens pars sunt digiti manuum & pedum totius extremitatis, & adeo iusto debiliores & remotiores, hinc eo locorum vitiosam sibi que valde inimicam materiam ablegare consuevit ridicula Natura. Vix ipsis sunt venæ & arteriæ hic desinentes.

*Paracelsi opinio de causa digiti coaliti.*  
§. 5. Theophrastus Paracelsus *Coalitum digitorum* contingere ait ab inæqualitate Spermatidis, & quod Natura in liquore vitæ non sit planè perfecta, ut plurimum autem, quod sperma, ex quo exitus hic Uteri debet, aut defectu aut excessu peccet, unde in superfluum transeat additamentum, quod digitos in Utero matris coharere faciat, in quo Naturæ totum hoc vitium putat attribuendum.

*Digiti sexti.*  
Sextum verò digitum fieri itidem putat ab inæqualitate feminis, quod tamen solummodo excessu peccat, unde in superfluum transeat additamentum, quod sextum efformet digitum, & itidem hoc vitium aberranti abscribit Naturæ.

*Panaritii.* Author noster de Panaritio disserens, in corporibus nostris duplicem putrefactionis ac corruptionis constituit speciem, unam in humoribus naturalibus, in mineralibus alteram, tandemque concludit, affectum hunc pro verâ matre habere humores minerales, quia eo ipso addit rationem, quod in radicibus solum ad ungues locum habet, ibi enim est radix falsi nitri; vel in eo loco, per quem transmigraat. Cum in unguum radicibus dolor, ulcus, tumor & inflammatio tanquam ignis sævirent & corrosio verum in instar panaritium esse dixeris. Sic quoque Crollius, & quamplures alii cum Paracelo ridiculè admodum sacræ vulgi simplicitate persuasi, vermem semper in medio pustulæ latentem nigello capite præditi adstruunt. Plures eorum hypotheseos innixi etiamnum idem propugnandum sacræ vulgi simplicitate persuasi, vermem semper in medio pustulæ latentem nigello capite præditi adstruunt. Plures eorum hypotheseos innixi etiamnum idem propugnandum microscopii fide innixi mira sibi imaginantur.

*Helmontii sententia de causa Digitorum Coaliti.*  
§. 6. Helmontius causa *Coalitis digitorum*, ut & *sexti digiti* ex vitiosa conformatione esse credit, aut ex spermate in Utero ad sextum formandum nimio effuso.

*Panaritium* non esse affluxum cruoris Author existimat, vel defluxum à capite aut seniore. cò missum per ambages viarum intellectui impossibiles: Sed esse laticem acidum tyranidem suam prope ungues in digito exercens. Inquit enim Helmontius: ac licet incautos sensus decipiat, videanturque sentire defluxum superne, sensuum tamen sunt fallacia indicia, prout dolente dente in totum capitis latus deplere videtur augmentum causæ dolenti. Non secus atque ad dolorem Panaritii, glans sub axilla apparet. Topico enim remedio odontalgia abicit, vel eradicatio cessat, & glans evanescit, ubi digitus dolore levatur.

*§. 7. Villiusi arbitratu, Digiti in Utero matris coalere.* quando scilicet sætis manuum altera ab aliqua parte ipsi superimposita, comprimitur, digiti que sibi invicem propius, adjunguntur, & mutua ista, quam inter se patiuntur, contractione, mollem cuticulæ ac cutis solvunt texturam: idem contingere quoque utimur, cum talis accedit in dictis partibus continui solutio ab humore acri & corrode in illis reside: papillæ enim carneæ tegumentis suis tunc exutæ, & à liquore nutritio perpetui adveniente distendit, ac elongatæ, velius oppositum digitum tendunt, ejusque interstitiis implantatæ & adnascentes, atque à subcrefcentibus cute & cuticulâ contextæ digitos mutuâ connexionem colligant.

*Sextum Digitum* formari censet à materia seminali, conceptionis tempore copiosius aggesta eo in loco in quo digiti statumini debent, & à succo spirituosiore in semine contento, & plasticâ vi donato in digitum viciniorum, cujus compositioni tota ista materia distincta erat, consimilem, efformatâ: minor tamen legitimo digito contingit superfluitas, quia supervacanea tantum illa materiam seminalis portuicula illi efformando impeditur. Credit etiam istud evenire ob perceptum à prægnante muliere primis conceptionis temporibus *Sextum Digitum*, talis enim character spiritibus animalibus matris impressus, & in seniorum commune ipsius delatus, ab istis in sætis seniorum commune devehitur, ejusque spiritibus animalibus communicatur, quicquid in imagine induti similes digitum in sætu excitant.

*Paronychia*, juxta Villiusi placitum, oboritur ex humore seroso summe acri & corrode te, aquæ forti simili, nitrosæ ac ardentibus particulis referto, in peristitium vicinasque partes nerveas exstillante, & circumposita vasa sanguiferâ exedente atque aprente. Sanguis enim è vasis suis delapsus, & in parte, in quam excidit stagnans, morâ corrumpitur & putrescit, ac in pus convertitur, tumoremque *Paronychia* nomine producit.

*§. 8. Sylvius Digitorum Coalitum* ad *Sextum* Sylvius *opli* *Digiti* esse vitia à primo ortu & connata, vel à matris forti imaginatione, vel terrore, vel alio modo à superfluo semine producta, statuit.

Author noster succi Pancreatici defensor, illud, succum salsum-acrem ceu inquinantem nascentem sanguineam, ac per consequens talem tumorem *Paronychia* nomine insignitum inducentem accusat.

*§. 9. Cartesiani Digitorum Coalitum*, vel *digitorum* accretioni in Utero, vel extra cum Utericibus malè curatis, succo nutritio glutinoso existentem contingit accensent, unde *Digiti* unâ conerescent.

*Digiti Sextum* itidem in Utero matris contingere ajunt, vel à matris forti imaginatione, vel terrore, materiam feminalem non ritè mediantibus spiritibus animalibus dispensantem.

*Panaritium*, secundum Cartesianorum sententiam, producitur ex succorum quorumvis particulis acidis pungentibus, scilicet: busque in peristitium vicinasque digitorum partes nerveas & membranaceas, imò ossæ effusus, ibidemque vasa omnia tendinosa ac nervea exedente.

dentibus atque corrodentibus, sicque Ulcus Paronychiæ vel Panaritii nomine insignitum prodeuntibus.

*Nota  
causa Di-  
gitorum  
coarctatus.*

§. 10. Adeò, nostro iudicio, miseranda est hominis conditio, ut & ante exitum ab utero materno sexcentis calamitatibus obnoxius sit, innumerisque affligatur affectibus, priusquam communi potiareretur aëre; & ii autem affectus vel illi communicantur à materno, quo sustentatur sanguine, matre scilicet morbo quodam dentatâ, vel à præpostero quodam animi corporisque parentibus doloris potius quàm gaudii à primò ortu creantes, vel ob nancas quasdam partes aut superfusus, vel ob easdem male efformatas ac alienum situm obtinentes; & quum digiti quamplurimis usus sibi necessarii, rectaque eorum dispositio sit maxime requisita, valde dolenda est eorum fors, qui in lucem eduntur, cum iis vel male efformatis aut præ dispositis: tales sunt ii, quorum *Digiti una coalescunt* mutuisque vinculis sunt invicem conjuncti. Fœtus autem in Utero adhuc hospitantis genuinus situs vel ex matris casu, saltu, ictu, vel ejusdem vehementiori animi pathemate, imaginatione scilicet perversa invertitur, illiusque manuum alterutra, vel utraque hoc pacto graviore cui-dam corporis parti supponitur; & ab illa premi-tur. Digni ergo sibi invicem superimpositi, se invicem coarctant, mollemque adhuc cutem tenerosque musculos hæc ratione dilacerant. Fibre itaque discissæ continuo nutrimenti appulsu exerceant & exsurgunt, quædamque ex iis in oppositam partem, seu in adversum digitem deflectuntur, & in eundem inseruntur, ubi cum propriis digiti fibris intricatæ, hisque accretionis opæ actius colligatæ, validiorem efficiunt digitorum Coarctum, principii cujus nulla deinceps animadvertuntur vestigia, cute loco ferruginato superexcrescens. *Coarctum Digitorum* ex matris asnerum vitæ eorum appetitu frustrato enatum (horum enim ferè pedes connexio hæc digitorum amulabatur,) esse, *Ephemerides Decur. Ann. 6.* testantur.

*Digiti  
boni.*

Quantum vis imaginationis valeat in prægnantibus, & sic sæpe factum à matre aliquando signari, exitus historiam in *Ephem. Germ. Ann. 6. & 7. Obs. 118* ubi viri cujusdam uxor prægnans quinto mense accepit dono canctose grægiæ magnitudine, illos admirantis & manu contrectantis digitem minimum unius chela comprimit, ita ut manus adhereret: Illa perterrita quidem cancerum tandem manu excussit, nil amplius de illo sollicita. Quid sit? iusto tempore filium parit, qui in utraque manu digitem minimum habebat duplicem, unum debito loco positum, alterum ab illius articulo infimo dependentem, in sinistra quidem manu magis adhaerentem, in dextra verò planè pendulum. In pede autem dextero digitus minimus uterque articulo suo inserti, sed carne & cute ad superiorem apicem usque sibi adherabant, ut ferè chelyn canerinam formarent. Sic etiam in sinistra in manu dextra geminum formam præ se in filio Limburgensi, uterque enim digitus partes & articulos, ipsum etiam unguiculum habuit, quod & testantur *Ephem. Decur. Ann. 6. Obs. 88.* ut ergo optime intelligatur, quomodo hæc contingant, paulum dilucidius ea explicaturi sumus. Jam plures clarissimi Anatomici non

lùm factum ex ovo formari probant, sed modum, quo partes omnes in eo fabrefiunt, demonstrant. Superflue verò quandoque in fœtu progignuntur partes, quæ non solum inter inutiles referuntur, sed etiam in deformium & incommodarum censu reponuntur; spiritus seminales fibras, quarum contextus embryonem facit, & ex quibus universæ corporis partes constitui debent, subingressi, eas penetrant, transcurrunt & extendunt: Si enim iidem vel robustiores fuerint, vel copiosiores à articulo digiti cujusdam, cujus textura laxior molliorque reperitur, delati fuerint, virtute qua pullent fibras quasdam, ex his quas occupant, & in quibus abundantiores inhabitant, sublevant, & ab aliarum falsoculo separant: quum verò fibræ primariam, qua donatæ sunt in prima formatione, dispositionem non exuant, earumque numerus compositus sit, tum ex iis, ex quibus constitui debent vas sanguinea, & lymphatica: inde fit ut ex ipsarum connectione alter exsurgat digitus illi similis, cujus est appendix; quo tamen minus esse videtur, quoniam potior fibrarum pars spirituum seminalium impetui obstitit, minimeque ab ipsis abrepta fuit. Istud etiam evenire potest, ceu dictum, si gravida mulier fortuito ac cum terrore, vel commiseratione hominem sextum digitum habentem inuenerit, tunc enim in retina Sexti digiti forma depicta, spiritus animales illius occasione certo modo moventur, ut ad Uterum delati. & ad ovum attingentes spiritus seminales, quibus cum conjunguntur, pari motu agant, eosque in eam impellant partem, in qua efformari debet digitus illi similis, cujus ipsi imaginem susceperunt, quod eo facilius accidit, quo partes externæ adhuc sunt mollioræ, cunctis impressionibus excipiendo sunt dispositæ.

Immediata seu proxima causa *Paronychiæ*, me *Paronychie* iudice, est obstructio inflammatoria tubulorum digitorum à succis falso-acribus facta, qui succi aciores facti effluunt, sicque pericilium distendant, lacerant, talenque dolore vehementissimum cum reliquis symptomatibus producant, sciant enim succi totius corporis in ejusmodi agro particulis salinis acerbis corrosivis, insigni igitur acrimonia mixta hæc maritata, ad digitum quendam delata, facili negotio ruptionem tubulorum, ac sic productionem ejusmodi tumoris efficere potens est. Subsistens hic extra sphaeram suam materia magnâ activitate ac fermentatione ferocem suam exercet, & in acerrimam malignam seu quasi venenatam non raro degenerat. Remotè suum symbolum addere possunt corpora cacochymica, quæ facillimè *Paronychiâ* corripuntur.

At frigidus & nimis calidus affectus huic fœres aperire possunt, & imprimis ab inæqualitate aëris subitanea, ut quando ex aere frigido membra rigida statim foco calido admoventur, vel vice versa, cum motu & labore calentia extrema aqua frigida immerguntur, ori namque sæpius observavimus. Cibus quoque qualitate peccans, acris, salius, acidus ac vicius hoc malum producere potest, par ratio est potus, si vina acida, etiam spiritus vini alique potulentia fortiora sanguini phlogosin inducant. & partes sulphureas & acres inferentia, peregrina

copio

copiosius hauriantur, ut & aquae frigidae nimis ingurgitatio, quâ succi nostri facile coagulantur. Vigiliæ mediocritatis limites excedentes suppetias ferunt, excreta & retenta, sudor imprimis prohibitus &c. suum addunt Symbolum.

Ita etiam contusiones, distorsiones, violentæ tensiones, festuæ digito intrusæ, puncturæ &c. infelicem hunc factum non raro excludunt. *Simon Pauli l. cit.* Observationem sequentem domesticam communicavit: *Observare, inquit, mihi visus, vel tarenter vel nunquam Paronychiam ab internis causis obsidere digitos, nisi malorum morum morbi, ut sunt malignæ & petechiales febres diuturnæ tertie, non ut par erat, per crisin desinentes, itemque variolæ & morbilli præcesserint: maxime ubi error vel ab ægro vel adstantibus in eis committitur.*

Jam, dum hæc scribo, puero 6. annorum Medicinam facio, cujus digitus spinâ ventosâ laborat, panaricio non multum ablimili, nisi quod caro magis spongiosa existat. Spina enim ventosa plerumque infantes afficit, præsertim circa articulos, cum tumore, livore, & Ulcere aliquando partium mollium ac carnosarum, quæ non duntaxat ab acido fixo & lentescente lymphâ exedantur, sed etiam ipsum os subiectum, quod focus hujus mali plerumque esse videtur, cariosum & nigrum reddit, hinc non male *Estlin Weinreffer* dicitur; *Apostema quoque ossis est, seu lentus ossis & adjacentium partium Sphacelus, ab acido fixo & maligno fermento intra osseam substantiam, aliquando ipsi in Uteri cunabulis matris primitus congesto, productus. Sicuti enim fermentum variolosum intra tubulos partium carnosarum à lacte, quibus infans nutritur, & ex quo etiam formatur, in ipso Utero colligitur, & postmodum occasione novi & insoliti ætheris cum ære, ventis, vino aliisque advecti in actum erumpit; ita hoc fermentum in ossium uno vel altero tubulo ab eodem lacte corrupto generatur, & morâ, alimentis, novisque allabentibus succis acrius & deterius redditur, donec focum suum perfodiat, os cæterasque partes exeat, lympham inficiat, & malignum hunc producat tumorem. In ære quoque latet aliquid, quod fermentum latens in apricum deducat: sic anno decrepito 1688. Paronychiam observavimus Epidemicam, plures enim infestavit, & plus quam centum hæc in civitate notavimus panaricio affectos.*

*Prognosis  
Dignorum  
Caulium  
& Dignis  
Sensu.*

§. 11. De *Prognosi* nunc aliquid addamus, ante omnia asterisco hic notandum est, in *Constitu Dignorum*, ut & *Digno Sexto* curam esse dolorificam, & post sectionem sæpè Symptomata Vulneribus solennia obvenire solent, ut sunt hæmorrhagia, tumor, inflammatio, aliquando à Medicamentis incautè applicatis ipsa Gangræna ac Sphacelus accidere potest.

Si adnatus Digitus fuerit parvus, & sine ossibus quasi pediculo appendens, curatio facilior est, quàm si sua officula habeat.

*Paronychia.*

*Prognosis Paronychia* quod concernit, liceat ille affectus in principio levi cum dolore partem affectam occupet, adeo ut sæpè susque deque habeatur, nihil minus tam altius paulo si irreperit, tristissimum eventum sortitus est, quoniam nervolas invadit partes, Gangræna & Sphacelus sæpius præsto est, hinc facili Marte accedente ægrotantium supina negligentia, quos-

dam mortem sibi accelerasse Practicorum observationes testantur, & *Mercurialis* Autor est, se vidisse interdum aliquos de vita periclitatos, imò sæpè ex dolore mortuus est æger, observante *Barbette* & *Blankardo*. Nuper vidimus Chirurghum Castrensem nostrum Paronychia periculose laborantem, cum Gangræna, febri & deliquis animi instantibus, qui tamen adhibitis congruis remediis optime convaleuit. Vulnera lethalia Digitorum & notavit *Celeberrimus Bartholinus Histor. Anat. c. 4. Observ. 89.* Dum verò malum adhuc quasi in cunis est, & erudita accedit manus, faciles in promittendo esse possumus. Quò materia stagnans ab ossis & periculis remotior est, eò faciliorem spondet curam, & viceversa, & quo magis conspicuus est tumor, eò melior, *teste Hipp. 5. aph. 63.* Extremam occupans partem periculosior est quàm 2. vel 3. digitorum partem. Si succi sunt dulces ac mites in corpore ægrotum, affectus faciliè terminatur, sin verò corrosivi ac acerrimi existunt, ossis articuli extremi, imò totius digiti corruptio, & pro re nata vitæ periculum metuendum. Quo enim corrosivior & malignior seu acrior succus, eo etiam symptomata graviora sunt.

Modus eventus unicus esse solet, ad salutem terminatur, si succi corrigantur ac fluidiores reddantur, ut affluere ac refluere possint, *Discussione* quoque ad extra resoluta in halitus, & exspirantibus particulis acrioribus; vel ad intra si recipiatur iterum in vasa alisque modis diffusetur, quæ terminatio optima est, & ex eo patet, si membrum ipso fiat levius, calor, dolor & pulsatio cessent. Vel suppuratione, maturatâ materiâ, ut dicunt, adeoque per incisionem purisque extractionem. Ad finitrum verò eventum & mortem quandoque finitur corruptione partis & totali abscissione tubulorum periosii, &c. Unde non tantum actio partis perit, sed & accidentibus, febre, delirio ac convulsionibus ipsa mors sequitur. Malum denique est, si induretur, & caro fiat spongiosa vel nigra, sæpè ultra mensiem cura durat.

§. 12. Cum plerique, qui de *Dignorum affectione*, imprimis de *Panaricio* curatione quicquam æternitati consecrârunt, distandi rationem commendunt, quos inter Chirurghorum non postremus *Jacobus Riffi*: vel hinc hæc in externis digitorum morbis, & nostro judicio, non contemnenda est. Nos ergo æquè in coalitu digitorum, imprimis verò in Paronychiâ violenta aerem quemcumvis, præsertim verò frigidum arcendum esse jubemus, cibis quoque sit euchymus & boni succi, vitentur, eæ dictum, alimenta acida, salia, ac acris quavis. Potus esto moderatus, cerevisia bene cocta & fermentata, hinc laudem meretur Cerevisia Naumburgensis, ac Brunsvicensis, hæc in vicinia Grebentse inensis; acidorum etiam, imprimis vini acidi, usus immoderatus cane & angue pejus fugiendus est, concedi potest vini Gallici vel Hispanici moderatus, nunquam verò internittendus est potus Theæ vel Coffeæ, vel alius herbe vulneribus.

Somnium largiorem in hisce Digitorum morbis concedimus, Vigiliæ verò nimias improbamus, his enim succus nervus vel spiritus animales tantum aciores redduntur, qui ita facti Paronychiæ magnum damnum inferre possunt.

Morus

Motus & quies mediocritatis non transcendant limites, præstat tamen quiete blandi malo inducias procurare, quàm motu intempestivo id irritare, licet ipse dolor præsertim in Paronychia sit atrox hanc sæpissime excutiat.

Alvi lubricitas semper proficua, hinc proderit vel enema, vel ciem.  $\zeta$ . vel per se vel cum oleo amygdalar. mixt. vel passul. vel pruna laxativa &c. Venus medullis forba, variorumque affectuum mater feracissima, præsertim illicita & cum scortis instituta, maximopere vitanda.

Animi affectus temperandi sunt, & ubi vel levissima commotio percipitur, contestem ejusmodi ignis, ut cum *Quercetano* loquar, aqua continentur à ratione sublimate & alembicata, extinguendus est. Videntur ergo ira, mæror, curæ, & plura alia vehementiora animi pathemata, animus è contrâ sit placatus.

*Curatio Pharmaceutico-Chirurgica.*  
*Chirurgica secundum Galenicum in Digitorum Causis.*  
 §. 13. Hisce præmissis ipsam *curacionem Pharmaceutico-Chirurgicam* aggredimur, quam *Galenicus* in Coalitu Digitorum instituunt sequenti modo. primò digitos cohærentes scalpello diducunt, dein separatim utrumque non pingui emplastro circumdant, ita per se uterque sanescit. Si verò sit Ulcus in digito, posteaque malè inducta cicatrix curvum eum reddit, primùm malagma tentant. Dein si id nihil prodest, vident, nervine id vitium an cuius sit. Si nervi est, non attingunt, & tanquam incurabile relinquunt; si cutis, totam cicatricem excidunt, quæ vero callosa efficit, ut extendi digitum non patiatur tunc rectum, sicut novam cicatricem perducunt.

*In Digito Sexto.*  
 Sextum vero digitum non aliter curandum esse ajunt quàm superfluum ferro abscindere, vel si nihil obest, relinquere. Carnosorum verò digitorum facilem esse amputationem, scalpello enim abscindunt: eorum vero qui ab articulo exortum habent, difficiliorem esse aggressiorem dicunt: at eorum qui ab internodio enati sunt, carnem primùm in circulum ad os usque resècant, ipsum verò os excisório Scalpro dissecant, aut serra amputant, dein in curatione radunt ipsa, & cicatrice obducunt, quemadmodum in Vulneribus ossium.

*In Paronychia.*  
*Galenicus* etiam in *Paronychia* suam medendi methodum propinat, qui juxta ipsius gaudet tribus indicationibus, curatoria, præservatoria & denique vitali. Hisce igitur indicationibus manus auxiliatrices suppeditant ex tribus usitatis fontibus, Chirurgico, Pharmaceutico, ac Dietetico. Ex fonte Chirurgico deprimunt venæsectionem, addentes hanc rationem, quod V. S. balsamum vitæ à surbunda bilis effervescentia accensum refrigeret, insinulque febrilis caloris focum destruat. Astrologi veteres suadent, ut ea hora sanguis mittatur, qua Horoscopus signo gaudet idoneo, Dominusque ascendens, &  $\zeta$  in iv. & viii. domo  $\beta$  conspicitur, neque ullum cum Domino viii. ceu mortis domus aspectum habent. Commendant aliquando ceu vicarias cucurbitulas. Frictiones quoque, Sinapismos & vesicæ institunt.

Ex Pharmaceutico fonte deprimunt purgantia modo Electuaria, modo Apozemata: ex rad. acetos. cichor. fumar. fl. borrag. bugloss. ramarind. uv. pass. fol. Senn. Alex. Rhabarb. prun. damaicem. parat. & in sero lactis coct. add. Syr.

de cichor. c. Rhabarb.  $\zeta$ j. Vomitoria quoque ad biliosorum humorum Saburram vim affectantem, feliciore succellu ex corporibus eliminandam, viribus adhuc robustis, concedunt, in quem finem commendant Elect. Darsari F. Dein alterantia his subjungunt, quæ in genere humorum calorem & fervorem, ceu causam morbosam corrigere, & visceribus fontem subministrantibus succurrere apta nata sunt. Si hepar in segregatione officium suum non rite faciat, aperientia, si Uterus in culpa simul sit in sexu semineo hysterica, & sic porro alia quoque opponunt.

Inter Topica externa *Galenici* respiciunt tum humorem influentem, qui divertendus est, tum cum, qui jam influxit, hinc pro temporis diversitate Topica variant, & commendant ab initio *Repellentia* tum acida, tum aqua, & terrea frigida, sive adstringant simul, sive refrigerent, hinc suadent submersionem digiti Paronychia affecti in aquam frigidam, vel acetum, vel applicant succum solani, portulacæ, & sæpè cum oleo rosarum miscent, ex compositis laudant ungu. refrigerans *Galenici*, ungu. de lythargyrio, Empl. a bum Camph. & imprimis ex succis herbarum refrigerantium, solani, hyociani, parat.

Defensiva etiam partibus vicinis, seu manui ipsi applicanda esse jubent, commendantque varia Emplastra Defensiva, præsertim sequens:

$\mathcal{R}$ . *Acet. Saturnisat.*  $\zeta$ ij.

alvum. ov. N. ij.

mucilag. sem. psill. cum aq. solan. extract.  $\zeta$ ss.

Camphor. gr. vi.

M. f. l. a. Emplastrum.

Vel imponunt *Epihema de Marmor. cornu.*

*Schenck.*  $\zeta$ ij.

Ol. Camph. gr. vi.

M.

Post hæc ad Digerentia & Paregorica accedunt, quæ sunt tenuium partium, exsiccant & foveant calorem nativum patris, vel per se adhuc bita, vel cum leniter repellentibus prout usus postulat accuratè permixta. Imprimis omni seculorum memoria à Dioscoride, Galeno aliisque laudatissima ad hunc affectum fuit herba, ob hoc ipsum adepta nomen Paronychia, sed quasi invideretur tantum remedium, dissensus tot Auditorum, quæ & qualis ea sit, dubium reddidit. Ut enim alios plures taceamus Auditorum hypothèses, à *Matthiolo* Celebratissimo Botanico pro eâ exhibetur *Adiantum* & Paronychia altera, à *Dodonæo* Paronychia alfine folia, & altera minor crenata rutaceo, à *Lonicero*, *M. ff. Gesnero*, Lunaria Italica, ab hoc etiam Lunaria arthritica, cui contra *Matthiolum* utrique potius folia pepili attribuit. *Glandorpius* & *Simon Paul.* interim alfine folium *Dodonæi* & *Lobbelii* ab experientia commendant. Quam verò licet commendam relinquimus Botanicis. Veteres ad Paronychias incipientes, priusquam suppurentur, sive in manuum sive pedum digitis lucent, lanam ex aqua frigida imbutam imponunt, ut per lincolium ex aqua expressum. Hisiudè refrigerant. Thus quoque & gallani cum melle trita simul aut scortum imponentes, solia myrti trita inpergentes, aut ceratam in, etc. cum im-

Bbb bb

nen



nentes, aut sordescantium assidue illinentes Paronychia sanant. At si fuerint inflammatae, pauca aqua madefactum cum rosaceo adhibent, vel olivæ folia tenera imponunt, Cadmiā tritam inspergunt, carnem verò undique ab ungue separant, linimentis convulsivis è linteo interpositis, & probe adhibita medicamenta alligant. Spodium quoque simili modo applicant. Ad Paronychias exulceratas alio modo incedunt & opponunt seq.

℞. *Amygdalus.*

*Spiritus argenti* 22. 36.

*Sarcocolla* 3j.

Terunt & largè inspergunt, aut farinam crvi adhibent. Carnem quoque separantes, linteum ex vino expressum, itemque spongiam vino imbutam applicant, et verò depascendo jam proferpentes siliunt, auripigmento usto trito ubertim inspersio. & linteum cum vino madefacto superimposito. Alii Sandaracham & auripigmentum, æquis portionibus simul trita adhibent, & si cicatricem induci sunt, Tereb. liquidam applicant. Quid si suppurata fuerint Paronychia, primum ipsas perforantes humiorem expriment, & deinde lenticulam cum melle imponunt, aut rosas virides, aut siccas aqua madefactas tritas adhibent. Sunt qui statim ab initio ad incisionem mali transiunt quā facta, mundificantibus & detergentibus benignioribus utuntur, quod si sordites major conjuncta sit, cum ung. degeſtivo miscet *Aegyptiac.* Apostol. Alun. ust. &c. Prospiciunt etiam Carieo ossium.

*Secundum  
Paracel-  
sum cura-  
tio Digi-  
torum Co-  
litis &  
Digi-  
torum  
Sextis,  
Panarisii.*

§. 14. *Paracelsus* *B. m. h. s. t. ab Hohenheim* dictus in curando Colitis Digtorum, aliam non novit curationem, quā instrumento euni separare, & deinde curare ut Vulsus. Sic quoque *Digitum Sextum* tollere non valet quā per Sectionem ferro seu Scalpello institutam.

*Panarisii* verò triplicem esse curam scribit, per Characteres unam, quam tamen trifonniſſi Superſtitionalibus, ac aliis ejus farinae Magis relicta vult, cujus fortez dūctū Exoreſta quidam chartæ, cui ſequens inſcriptum: + ut credis + ita + Tibi + eveniat + tritum dic- eum ſpatio ſtrictim digitum involvebat, inſauſto tamen ſuſceſſū vanitatis ſuæ pænas dando. *Mariellus de Med. l. c. 18.* non diſſimili inſtru- ctus Philoſophiæ ſequenti fabulatur de *Parony- chia*: *Parietem continges, & rurſum digitum du- cens diſceſter p. n. p. n. nunquam ego te videro per parietem repere.* Secundam curam per natura- lia fieri aſſerit, ſicut ſunt ſperniolum & anody- na, cū ex corio ſacculus digito conſtructus aptuſque ſpernioloter vel quater madefactus in- ducitur. Etiam externis præſectis curari per- agi poſſe contendit, ut porcorum ſtercore cum aceto decocto ſuperpoſitoque. Author noſter lumbricos vivos imponere jubet.

*Helmontius  
in cura  
in Digi-  
torum co-  
litis,  
in Digi-  
torum  
Sextis,  
Panari-  
sio.*

§. 15. *Helmontius* in Curatione *Colitis Di- gitorum*, & *Sextis Digi*, cum *Paracello* conve- nit & ſcalpello conſita ſeparanda, vel ſcal- pello ſuperflua membra abſcindenda eſſe vult. In *Panariſio* Talpæ cruorem pellem- que recentem digito circumductam una nocte illud mortificari promittit. Idem præſtare ſcribit ſanguinem vespertilionis. Vel juxta ipſum lumbricos terreſtris vivus imponatur, donec mortuatur. Alium quoque cum face cal- culosa Matularum conſutum & miſtum applicat.

§. 16. *Villifus* *Digtos* *Coaleſcentes* matu- re ferro ſeparat, & deinceps vulnera illis illata balſamo Sulphuris aut Peruviano conglutinat, curatque.

*Digitum Sextum* vel filo ſericeo, vel flamen- to radicis *Thymellæ* in radice ligat, & ejus ca- ſum exſpectat.

*Digitum Paronychiæ* aſſiſto opitulatur liquo- re lumbricorum in clibano facto, ſpiritu lum- bricorum, balſamo Sulphuris, linimento ex for- dibus aurium cum ſaccharo ſini admixt. & pau- co avellan. expreſſ. facto. Jubet etiam digitum ſterquilinio intruſi, vel linteum ſterquilinio hu- necatū calide digito applicari.

§. 17. *Sylvius* æque in *Colitis Digtorum* quā *Sylvius* ca- in *Sexto* *Digitum* ferrum commendat, & dein ex- inde facta vulnera ad ipſius mentem traumaticis curanda eſſe præcipit.

In *Paronychiæ* commendat ſalia volatilia quæ, cūque, internè ſumpta æque ac externè appli- cata. Omnia enim, quæ acceſſum acidum abſor- bent, ac emendant, egregie eſſe ſcribit.

§. 18. *Carteſius* *Digtum Colitum* ut rite curent, ad ipſas reſpiciunt cauſas, *Digtorum* accretionem ſeparando cutello, & prohibendo, ne denuo accreſcant, qua in operatione eo ſecutū modo ac Nos, procedere ſolent.

*Digitum Sextum* anabrochiſmo vel ferro euni reliquis Authoribus tollant, dem curant inſtar alius Vulsus.

In *Paronychiæ* præter ſudoriſera ex *ſnio* dia- phoretico, oculis &, myrthæ, Tinctura *ſni*, bezoard. etiam *Q* volatilia oleoſa exhibent: item digitum aſſectum uſque ad os ſe cūndem longitudinem cultro ſecant, & dein ſequenti lavamento cluunt digitum apertum & vul- neratum:

℞. *vin. Camph.* 3ij.  
*Thiariac. veter.* 3ij.  
*mell. chelidon.* 3j.

M.

Imponunt quoque Cataplaſma emolliens cum Emplaſtro quodam deſenſivo.

Aliorum illinunt digitum *Q* *ſris*, vel imponunt *Q* calido, vel immittunt ad imitatio- nem *Riverii* in aurem felis. Alii digito ver- nes vel lumbricos vivos applicant. Nonnulli Moxam inſutum magnificiunt. Item ex alia ſer- tidā, alio & albumine ovorum unguentum parant illinuntque.

Inflammatione ſimul exiſtente intenſiore, non propediem vulnus conſolidant, ſed potiùs apertum ſervant, & quidem per globulum im- poſitum, ut ex melle Chelidon. conſectum. Apparentibus oſſium ſcſtucis, eas ab oſſibus ſeparant eximuntque, corruptumque exci- dunt. Ad conſolidandum Ulcus ſequens magni- pendunt.

℞. *Apſtol.*  
*Baſilic.* 22. 3vj.  
*mell.*  
*terebinth.* 22. 3j.  
*myrrh.*  
*aloiſ.*  
*thuri* 22. 3j.

M.

*Nistro cura in Digitorum Coalitus.*

§. 19. Nostro Consilio *Digitorum Coalitus* cura à ferro tantum, eoque à prudenti Artifice administrato, sequenti modo expectari potest. Cum unionis hujus inconvenientis vinculum sit tenue, nec multis vas sanguineis majoribus aut tendinibus intermixtum, aut solà cute contextum sit, facile curâ succedit. Hoc in casu uno ictus, acutâ fortice incidi potest cutis carnosæ paries integerrimus, excissis utrobique superfluis digitorum uovorum quasi fundamentis; non opus hic est ligno triangulari, ad imitationem *Plateri Mantiss. Observ. 43.* nec scalpello, quo uti solet *Hieronymus ab Aquapendente Part. 2. Chir. c. 101. Obs. 43.* Hic tamen asterisco notandum venit monitum Celeberr. *Ronhff. O. f. 10. p. 41.* quod deligentur digiti in novam cohesionem proni, quod optimè institutis ligaturis ac Medicamentis idoneis facile præcaveri potest. Sic quoque cura *Coalitus Digitorum* feliciter cessit, testantibus *Ephem. nostr. Decur. Ann. 6. Obs. 38.*

*In Digito Sexto.*

*Sexti Digiti* Cura, me arbitro, in ejus ablatione consistit, & optimè perficitur abscissione cum ferro, novacula scilicet, ligaturâ prius instituta, & hoc potest fieri in infantibus. Legimus enim in *Ephem. Germ. Ann. 6. & 7. Obs. 118.* Cum infans tertiam septimanam tantum complevisset, ligaturâ prius institutâ digitum firmius adhærentem novacula absciderunt Chirurgi, mox altera die absque ligatura alium adhuc digitum amputarunt, quod sine magno dolore & sanguinis profusione factum, & vulnera facile sanata sunt, ita ut vix vestigium relictum fuerit, Confer *Cl. Riedelini Obs. p. m. 187.* Sunt qui exemplo *Plateri test. Obs. 42. Mantiss.* à resectione abstinent usque infantes adultiore facti sunt; sed non videmus obquam rationem id omitti debeat. cum digitus tantum quasi petiolo pendeat, & exiguus sit, is instituto *Anabrochii* facile curari potest h. e. ligatura cum filo sericeo institutâ; hinc enim digitus superfluous marcescit & decidit, postmodum facili negotio Medicamentis congruis penitus sanari potest. In adultioribus verò *Digitus Sextus* commodè cum ferro, quod Germani *ein Meissel* dicunt, exstirpari potest.

*In Paronychia.*

*Paronychia* notitia in superioribus abundè detecta, reddit nunc Medicamentorum inventiunem. Curatio ex Pharmacia fonte *Paronychia* conducens institui debet, ut sc. stagnantes actiones corrosivi in Digito affecto subsistentes succi corrigantur ac emendentur, inter quæ absorbentia & sudorifera aliis palmam præripiunt, ab initio verò morbi concedimus *Lenientia Græca* aliaque solutiva ad acres fœculentias in primis viis latentes eliminandas, ne lege circulationis ad partem affectam deveniant, purgantia verò omnia quæ ad sanguinem transeunt, & ibidem tyrannidem suam exercent, hic ac ubique exulare jubemus, uti & vomitoria, & diuretica acriora, mitiora tamen aliquando usum inveniunt.

Sudorifera ergo & absorbentia hic sola sufficiunt pro re nata anodynâ maritata, quæ enim acrimoniam succorum corrigunt, subsistentes & coagulatos succos resolvunt, & per sua vasa iterum refluxu faciunt, ut sunt omnia bezoartica viperina, gniatia, imprimis *R* nostra gni. Sinto in juniorum Medicorum gratiam formulæ nonnullæ.

℞. gni. diaphoret. ʒj.

⊖ C. C. volat. gr. v.

M. F. pulvis. |

℞. ▽ scabios.

fl. sambuc.

card. bened. aa. ʒiʒ.

R gni. nostr. descript. ʒj.

Essent. lignor. ʒij.

Syr. sumar. ʒvj.

M. D. Cochleatim.

℞. Malvat. Sambuccin.

Q. resit. aa. ʒj.

⊖ i. o. gr. vj.

Essent. lignorum ʒj.

M. dentur guttæ ʒo.

Decoda lignorum, item omnia salia volatilia, C. C. viperar. herb. Paronychiæ, item omnia nervina, quæ aliis in doloribus & irritatione nervorum ac membranosorum fibrarum proficua usus monstravit, quibus omnibus palmam præripiunt *Cinnabarina*, verbi gratia *Cinnab. nativ. Ungar.* *Oris gniatia*, *Panacea Hartmann.* *Pulv. spasmod. nostr. descript. specif. Cephal. Michaelis* & alia. *Are Ori* pollentia, Essent. lumbric. terr. succinata, imprimis spiritus noster matricalis internus, oleum balsam. Ind. nigr. Balsam. uervin. quæ quantum possint in solando hoc ardore & dolore, illis nosse datum est, quibus & selectior & accurata praxis obtigit.

Anodyna utpote Symptomati aequè ac acrimoniam succorum urgenti debita, circa horam somni commodè interponi & propinari queunt, ut sunt papaveracea, imprimis *Theriaca celestis* nostra reformata *Caillelana*, singulari modo non ita pridem parata, Anodynum nostrum *Ore*, vel *landan.* opiat. *Theriaca Andr.* item *laudani* *Langelotti*, *cydonist.* *Hoffmanni* vel simplex, Essent. anodyna *Zvelferi*, *Tinctura Nepenthes* nostra, vel liquor opii, vel *Sydenhamii* Essent. sc. anodyn. cum vino *Malvat.* parata, quæ opiatâ simul acrimoniam succorum corrigunt, hinc ea in omnibus Ulceribus cum externis tum internis magni æstimentur, legitimâ verò dosi exhibitâ; sed quis omnes descriptores recensere? Sinto formulæ nonnullæ apprinè in dolore Paronychiæ maximè conducibiles.

℞. ~ lumbric. volat. lignorum.

matricalis aa. ʒj.

R anodyn. ʒʒ.

M. D. guttatim.

Vel:

℞. pulv. spasmod. ʒʒ.

anod. n. A. S. gr. ij.

oleosacch. cinamoni. gr. iij.

M. f. pulvis pro doli vesperi exhibendus.

Vel:

℞. Essent. succin. Q. sat.

R Corallor. cum cerâ parat.

vel menthræ castelli aa. ʒʒ.

Essent. opii liquid. gr. vj.

M.

Vel in formâ boli.

℞. Confect. dehyacinth. ʒj.

landan. opiat. ⊖ gr. ij.

sacch. q. s.

Bbb bb 2

M. f.

M. f. volus, pro una dosi assumendus.  
 Dicitis jam internis generosis remediis Externa  
 To ica semper sunt interponenda, quæ sæpè  
 apud ulgum sola sufficiunt. Siccic enim in di-  
 gitis stagnantes ac jam evasati & visceri, hinc  
 ad resuscitandum in sua vasa inepti facti, resol-  
 vendi, attenuandique sunt. Hinc exulent  
 omnia repellentia tum acida tum aqua &  
 terrea frigida, live adstringant simul, live sine  
 obstructione, ut dicunt, refrigescant,  
 hinc angue. pejus fugienda est, quam com-  
 mendant nonnulli, submersio digiti in  
 aquam frigidam vel acetum. Sed hic potius  
 conveniunt calidissima remedia, quæ te nun-  
 quam affectu frustabuntur, in Panaritio seq.  
 methodo insitimus, præmissis internis abfor-  
 bentibus volatilibus oleosis aliisque sudoriferis  
 superius dictis, seq. cum carpsis linteis impone-  
 re soleo.

℞. Elix. vite. n. d. 3j.  
 ~ Θ xci arom. 3℞.  
 ol. sabm. gr. v.  
 campbor. gr. ij.

M.

Vel sequens simul epichema calidè applicare ju-  
 beamus, & ita plures feliciter curatos vidimus.

℞. ∇ fl. sambuc. 3j.  
 ~ vin. Campb. 3j.  
 fl. sambuc. 3℞.

M.

Vel sola linteæ sequenti liquore madefacta, In-  
 flammationi Paronychiali circumponere solemus:

℞. ~ lumbricor. 3℞.  
 Θ xci cum ∇ parat. 3℞.  
 Vel:

℞. Elix. vite 3j.  
 o. fabina 3℞.  
 Campbor. gr. vj.

M.

Sufficit quoque sal volat. o. vel bals. Peruvian.  
 externè tepidè applicand. Vel in formâ Catapla-  
 smatis seq. modo.

℞. Herb. scord.  
 ruta  
 paronychia  
 fl. chamomilla  
 melilot.  
 farin. lins  
 sanigrac.  
 bacc. lauri.

Coq. in vin. Gallic. vel lact. & calidè Digito affe-  
 cto applicetur sæpius. Vel ~ vini campbor.  
 crocat. cum R castorei vel balsamo arthritico ex-  
 terno, ac essent. rorisinar. vel ∇ Hungar. exten-  
 nè imponi potest. Communissimum reme-  
 dium dicitur, ut digitus Panaritio laborans in  
 panem similitudinem calidam, quantum pa-  
 tientes perferre potest, ponatur, sic R. verius  
 Cent. 4. Obs. 19. & 63. vidit mulierem quan-  
 dam Paronychiâ laborantem, tunc immixtissimè  
 Digito in aurem felis, intra horæ quadrantem  
 sanatam. Lumbrici vivi Paronychiæ impositi  
 sæpè ad experientiam aliorum votis responde-  
 bant. Hinc Julius Casar Baricellus, Ego, in-  
 quit, profecto certissimum experimentum com-

probavi, lumbricos vivos super Panarium allig-  
 atos præsertim in principio mirabiliter aposte-  
 ma compellere & sanare, ut vix dici spatium  
 affectus pertranscat: Consentit Kels. Procris.  
 Chym. LXIV. Crost. de sign. In levi quidem Pa-  
 naritio hoc semel contigisse credimus, in forti-  
 ori vero, negamus, hic enim generosioribus  
 opus est remediis. Inter Emplastia vix melius  
 datur quàm nostrum de Labdano, add. pulv.  
 lumbric. terrestr. 3j. Theriac. 3j vel

℞. Ol. maffich.  
 lumbricor. aa. 3℞.  
 Zvi depurat. 3j.  
 cutia ppi. 3jij.  
 cera alb. 5cent.  
 Gummi. Labdan. depur. aa. 3℞.  
 M. f. l. a. Ceratum.

Sed sæpè egregia hæc remedia frustra adhiberi  
 solent, quin ullum inde refultet commodum,  
 unde sæpè ad ferrum transendum est, imprimis  
 si profundius malum radicatum est, & caries  
 ossium observatur. Hinc Hildanus, Byer,  
 Pareus aliique statim ad sectionem confu-  
 giunt, quâ nihil quicquam ægotantes magis sublevare  
 dicunt. Materia verò altius si penetrat digi-  
 tum, tunc per aliquot dierum lyat um adh. bis  
 suppurantibus incisionem quidam differeudam  
 censent, sectionem tamen instituere solent cum  
 rasorio lateralter ab ungue usque ad os, à sum-  
 mitate Digiti ad juncturam excludive, quamvis  
 antem incilio hæc statim ab initio, non expecta-  
 tâ maturatione, aut notabili tumore, vel inflama-  
 tione, secundum longitudinem à quampluri-  
 mis commendetur, eam tamen Nos instituend-  
 dam, nisi summa urgeat necessitas, non permitti-  
 mus, quid enim proderit tubulos integros ita  
 discindere? Si verò adfuerit caro emortua, ut  
 sæpè accidit, hæc ferro abscindi debet, caustica  
 verò sine carne emortua existente potius fuge-  
 re consultius est; plures enim male statim ab initio  
 uti solent & io præcipito vel sublinato, cavend-  
 um enim est, ne tendinosi fibræ vitium altius  
 affricetur; ossis denique caries non negligenda  
 est, quæ & aliorum & nostrâ observatione sæpius  
 in ossibus Digitorum observata est. Eam autem  
 adesse, doloris pungitivi perseverantia ac con-  
 tinuitas, hyperfarciosis declarare possunt, plu-  
 rimæ enim mihi reservo frustula ossiculorum ca-  
 riosorum à digitis in Panaritio disiecta: quomo-  
 do verò Caries curanda, peculiari jam indiga-  
 vimus Capite, quò lectorem remittimus.

Si verò adfuerit Spina Venosa in Digito, ut  
 sæpè fieri solet, non cum ignavis Chirurgis ad  
 oxycroceum aut stypticum, vel alia adstringentia  
 imprudentius confugiendum est, sed hoc in  
 passu conducet sectio, quæ ad formam crucis in-  
 stituenda, usque ad os ipsum Digiti affecti,  
 quod dein vel scalpendum, aut urcendum aut  
 excindendum. Vulnus dein more solito con-  
 solidandum, & hic egregium est notissimum  
 Emplastrum Norimbergense, cujus vera delicti-  
 ptio est sequens:

℞. Minii subtil. pulv. 3vij.  
 ol. rosar. cod. 3xij.  
 Camphora ol. ros. dissolut. 3℞.  
 Fiat l. a. Emplastrum.

Internè

Internè hoc in casu non negligenda sunt superius iam commendata sudorifera, imprimis bezoarticum Mineral. Joviale ac Martiale, R. Òni nostr. & Qstia. Omnia Viperina etiam hic profunt; ipsæ enim viperæ in brodio carniæ decoctæ & brodia assumta. Vel pulvis Anglicus vel alia gelatina viperina, item vinum viperinum maximè profunt: pilulæ quoque Mercuriales hoc in affectu magnipenduntur.

Externè ~ vini Camph. vel Elix. vit. vel R. O cum spir. ☉ parat. Euphorb. cum melle & spiritu vini Camph. proderit, Empl. Vigon. cum quadruplo Mercurii; quod si malum contumax hæc omnia eludat præsidia generalia, præsentissimum erit remedium cauterium actualè, vel amputatio, de quibus omnibus Consule Severinum & Jacobum van Mekeren.

## CAPUT III.

## De Unguium Inæqualitate, Crassitie, Rugositate, Scabritie, Colorum mutatione, Curvaturâ, Fissura, Casu.

## §. I.

**U**ngues si gibbosi & rugosi sint, maximam inferunt deformitatem in manibus, sic quoque deformes sunt Unguium omnium solutæ continuïtates, eoque magis, si in manibus, cum s. m. er oculis pateant, hæc vitia existant, inter quæ frequentior est *Inæqualitas* & *Scabrities Unguium*, perleverans in quibusdam deformitas, eoque major, si simul illi crassescant, & sic *Crassitie* dicuntur: vel color ipsorum mutetur, & vel liveant, vel etiam nigrescant, vel maculas plures albidissimas accipiant; vel incurvantur. Huc & pertinent *Fissura* Unguium, si nimirum in longum fissi sunt, vel quod sæpissimè contingit, si per transversum divisi, & veluti in duas lamine dissecti existant. Ex quibus vitiis quædam aliorum morborum, ut Pioræ, Elephantiasis ac Luis Venereæ comites sunt, cæterisque copulantur, aliis verò sunt tanquam decorantia vitia, quæ & pertinet ipsorum *Callositas*, duritiæ se prodens. Postremò & Ungues sibi interdum *permutant* huc illicque inclinant, ac mobiles facti sæpè diu antequam decidant, sic hærent & deformitatem inferunt, quandoque etiam planè decidunt. *Recurvia* quoque dici possunt istæ pelliculæ, quæ in digito circa radicem Unguis prostant. Qui Affectus omnes absque *Despositione* aut *Descriptione* sufficienter intelliguntur, hinc non necellarium duximus illam apponere, sed destinamus ad *Partem affectam*.

*Unguium Inæqualitas & Crassities ac Scabrities. Colorum mutatione, Curvaturâ & Fissura.*

*Casu.*

*Parti affectæ.*

§. 2. *Partem affectam* quod concernit, sunt Ungues, qui dicuntur partes solidæ, mediæ ferè inter ossa & cartilagine, in digitorum extremitatibus, quibus numero & magnitudine respondent, occurrentes planæ, licet, læves, albæ seu cornæ, ad majorem digitorum fortitudinem & meliorem operationem facientes. Ungues, nostro iudicio, substantiæ sunt cartilagineæ, membrana senili intus tectæ, extrema digitorum loco superiore claudunt moderatè, molles, flexiles, densi, coloris ex albo rubicundi vinculo circa radices, quas vasa accedunt, firmati, ad id ut velamentum sint atque apprehensionem faciant. Ordinatio Ungues albescent, Athiopiis verò nigrisque brutis magis nigricant. Externè

Ungues sunt convexi, internè verò concavi. Sunt nihil aliud, quàm fibræ tendinosæ invicem concretæ, si enim ope microscopii conspiciuntur, ex plurimis filamentis & canaliculis eos esse constatos diceret. *C. D. Blankardus* ex pilis invicem concretis Ungues esse compositos existimat. Confer prælaudati *D. Blankardi Anatomiam Reformat. Capite de Unguibus*.

§. 3. *Diagnosin* Unguium affectuum quod *Diagnosin* spectat, si per se sufficienter dignoscuntur, *Unguium affectuum*, quàm oculis percipiantur, & in senius notis incurant, hinc amplam *Diagnosin* hic formare non operæ pretium duximus, sed iis studio neglectis, ad eorundem causas explicandas statim nos accingemus, ne inutiliter tempus teramus.

§. 4. Veteres & ex illis maximè *Galenici, Aetiologia* *Unguium Inæqualitatem* originem ducere ajunt ab humoribus vitiosis & excrementitiis non benè dispensatis, & inæqualem nutritionem præbentibus. Sic quoque *Crassitiem Rugositatemque* Unguium deducunt ab humorum crassiorum in Ungues se insinuantium copiâ, tum etiam à topicis refrigerantibus, aut actu frigidis sæpè applicatis, quæ Ungues crassiores reddunt vel rugoliores.

*Unguium Scabritiem* derivant à succo, melancholico seu atrabiliario, coloris verò in album mutationem ab humoribus crassis & imprimis pituita ipsiore Unguibus per frustula unctis, deducunt.

*Curvaturam ac Fissuram*, ut & *Casum* *Unguium* *Curvaturæ*, vel à materia quadam sicca ungues ita *Curvaturæ*, *Fissuræ* depravante, vel à causa violenta, vel ex aliâ *Causa*, quæ offensa, contusione fortiori *Unguium Casum* inducente, provenire ajunt.

§. 5. Ex *Paracelsi Principiis* *Unguium Inæqualitatem ac Crassitiem* causam agnoscit ipsam *Paracelsi* *causam unguum* materiam, sive sal cum Mercurio primo resolutum, & in Ungues majori copiâ influens; & si simul cum Sulphure inspilletur & *Crassitiem Rugositatemque* etiam & *Scabritiem* produci *Crassitiem Rugositatemque* ac *Scabritiem* inducere.

Bbb bb 3

Unguium *Scabrities*.

*Unguium  
Coloris  
mutatio-  
nis.*

Unguium *Coloris mutatio* in albiſſimas maculas, juxta ipſum, oritur à ſeparatione ſpiritus ſalis, cum Mercurio à ſulphure; ſal enim ſubtile fluidius ſcilicet ex conſortio ſulphuris eripiens, & cum Mercurio reſolutum ſubter Unguem ſe diſtendit, & rubedinem ſulphuris exſtinguit, capropter Unguis peregrinum vel induit colorem, vel maculas albas ipſiſ imprimunt Unguibuſ.

*Unguium  
Curvaturam  
& Fiſſuram.  
Cafus.*

*Curvaturam & Fiſſuram* Unguium ex ſale Unguis vel ſanguinis fieri contendit, ex quo ſale *ſciſſura* iſta ſecit unguium oboriuntur.

*Cafum* Unguium idem eſſe ſtatuit ex ſale cauſſico ab ulcere, vel conuulſione productum.

*Helmontii  
ſententia  
de cauſis  
unguium  
inaequali-  
tatis &  
Crassi-  
tatis.*

6. 6. *Helmontii* juxta Fundamenta in hoc diſſert digeſtio unguis à digeſtione aliarum partium: quòd hæc fiat in culmiſ ſibi internis, illa verò in culina radici illorum contingit. *Inaqualitas* ergo & *Crassi-  
tatis* unguium, juxta ipſum, oritur à ſuccis mucilaginolis cum latice ad ungues delatis, atque ibidem inſpiſſatis, qui cum ardè adhæreant, nec ſe tam facile ab unguibuſ patiuntur diſcelli, ejus vel inaqualitatem faciunt, vel ejus ſubſtantiam augent & craſſiorem reddunt.

*Rugofitatem  
ac Scabritiem.*

*Rugofitatem* verò ac *Scabritiem* Unguium idem deducit à latice ſale multo reſerto, & ſic ad ungues delato.

*Coloris  
mutatio-  
nis.*

*Coloris Unguium mutationem* derivat Author ex proximo Venarum nutritio, ad ungues delato, & diverſas maculas, imprimis verò à latice effuſo, albas producente.

*Curvaturam  
ac Fiſſuram.*

*Curvaturam* ac Unguium *Fiſſuras* excitari ait à latice tal quoddam aſperum ſibi copulante, quo ungues diſumpit, quodque illiſ læpiuſ ab externo aëre communicatur.

*Cafus.*

*Cafum* verò Unguium vel oriri credit à latice corrolivo radices unguium non tantum corrodente, ſed planè exedente, hinc eoſ neceſſario excidi debere haud dubitat.

*Porti.*

*Portum* provenire ex acri liquore, qui nutrimentum radicem eſſe debet unguium, ſcribit, notat etiam, ubi portus, non longe diſtant ungues: itaque radices earum in excreſcentiam abeunt, quæ portos efficit. Cum in digitis pedum aut manuum porti naſcuntur, quibus tactuſ dolore inferit, ac indicis magis excreſcunt, in avellana nucis medicatam portus fore dixerit. Ultimo ſimul cum carne creſcunt in unguium duritiem, & cum per corrolivas aquas vel incilionem aperti fuerint, in Elephantia principium incidunt incilionemque majores efficiuntur.

*Junta Wil-  
ſonii cau-  
ſa in qua-  
litate un-  
guium.*

§. 7. *Unguium Inaqualitas* ex ipſiſſis mentibus cauſa, ſic ex craſſioribuſ terreſtrioribuſque ſucci nutritii particulis, quæ ob molem in certis tubulorum, ex quibuſ conſtant ungues, anguſtioribuſ locis retentæ atque ageſcunt, coactura ſua quaſdam producant in unguibuſ exuberationes, quæ ipſoſ *inaquales* efficiunt.

*Crassi-  
tatis  
ac Rugo-  
ſitatis.*

*Crassi-  
tatem* Unguium emergere ſtatuit, quando particula iſta paulo minus craſſa, ſed viſcidis involuta, univerſoſ unguium tubuloſ, totum-

que illorum canalem opplent; ipſiſque inhærentes eoſ extendunt, & elevat, unguemque craſſum reddunt. Si verò quidam tantummodo tubuli à craſſiore viſcidiorum humore interficiantur, reliqui verò liberi ſubſiſtant, rugoſoſ fieri *ungues* ſtatuit, tubuliſ obſtructiſ liberoſ ſuperſtantiuſ.

*Scabros* devenire *Ungues* aſſerit à ſalibuſ li-  
quori alibili viſcidiori permixtiſ, quæ cum li-  
berè per unguium tubuloſ iter facere nequeant, aculeoſ ſuoſ eorum poris inſigunt, qui in ſuperficie prominentes ejuſ *Scabritiem* edunt.

*Color* Unguium, juxta ejuſ ſententiam, *Coloris  
mutatio-  
nis.* mutatur à ſanguine in aliqua eorum parte remorante, & ſtagnante, vel ob vaſa ſuppoſita carniſ à quodam inſtrumento gravi & contundente compreſſa & anguſtata, vel ob ipſum ſanguinem à particulis quibuſdam acidis congelatum, & in iſdem vaſis retentum.

*Unguium Fiſſuras* deducit Author à ſalibuſ *Fiſſura-  
rioribuſ* in lucco nutritio luxuriantibuſ; quæ validiſ, quibuſ gaudet, ſpiculiſ unguium tubuloſ dividunt ac diſſecant, pluresque eorum diſperdentes *Fiſſuras* in ungues excavant.

*Ungues excidere* contendit, quando ſcilicet *Cafus.* genio ſuo deſraudantur, requiſitoque ſucci alibiliſ ſubſidio privantur, quod accidit vel ab obſtructiſ vaſiſ, liquorem ipſiſ nutriendiſ dictum deferentibuſ, vel ab iſdem cum fibris nerveiſ, per quas in ungues accedunt ſpiritus animales, à quodam humore corrolivo inſtar aquæ fortis exciſiſ, vel tandem ab iſdem ſureculiſ nerveiſ obſcuratiſ, ſpirituumque influxum unguibuſ denegantibuſ; quæ de cauſa ſuccuſ nutritioni partiſ deſtinatuſ nequaquam adjuvatuſ, in ejuſ alimoniam nullatenus cedit. Non reparato ergo detrimento à continua evaporatione dilatantur pori, qui papillaſ ex ſuppoſitiſ partibuſ protuberanteſ excipiunt, & ungues hiſce ſuſtentaculiſ orbati, à viciniſ partibuſ ſeparantur, ac tandem decidunt: hocetiam contingere contendit ab exſiſſiſ papilliſ, quæ unguium poris inſolcantur, vel à pure, vel ab alio humore acri & erodente.

§. 8. *Sylvius Unguium Inaqualitatis & Crassi-  
tatis* cauſam deducit à pituita viſcida, cum ſanguine per arteriolaſ unguium humori nutritio affuſa, quæ dum unguium tubuliſ arcuſiſ adhæret, & cum tempore induratur, ungues *crassi-  
tateſ & inaequales* reddit.

*Rugofitatem* ac *Scabritiem* deducit à ſalibuſ *Rugofitateſ  
lixivioliſ* ſanguiniſ & ſucco nutritio commixtiſ, ac *Scabriti-  
em* cum viſcidiorum pituita, & in unguibuſ ſubſiſtentibuſ, eoſque rugoſoſ ac ſcabroſ reddentibuſ.

Sic quoque *Coloris mutationem* à ſanguine circ-  
um ungues ſtagnante, vel pituita commorante  
provenire contendit.

*Curvaturam* ac *Fiſſuras* Unguium à ſalibuſ *Curvaturam  
rioribuſ* in ſanguine luxuriantibuſ & ad un-  
gues delatiſ, quæ dividendo ac diſſecando *Fiſſu-  
ras* producant, incurvando & diſtendendo *Cur-  
vaturam* excitant.

*Cafum* verò Unguium fieri contendit, quando *Cafus.*  
radiceſ



radices ipsorum corroduntur, vel ab acidis vel acris humoribus, sive in massa sanguinea præ-existentibus, sive ab ulcere, vulnere ac contusione, productis.

**Carassio-**  
**rum op-**  
**io de cau-**  
**sa ungui-**  
**um lue-**  
**qualitati.**

§. 9. *Cartesiani* causam *Unguium Inæqualitatis* & *Craffities* imputant variis particulis terrestribus succi nutritii glutinosis commixtis, scilicet fibris illas unguis continentibus inferentibus & quiescentibus, quo pactis fibris illis arctius adherentes, illorum immutat texturam ac Compagem, ut inæquales & craffiores reddantur unguis.

**Rugosita-**  
**en.**

*Unguium Rugositatis* ac *Scabritiei* causam dicunt esse particulas acutas & salias, vel cum succo chylofiore, ex sanguine per arteriolas, vel cum lymphâ per canaliculos lymphaticos unguibus illatas, quarum figuræ minimè respondeant poris & interstitiis fibrillarum eorum, proinde pori à particulis istis pervertuntur, & unguibus *Scabritiem* & *Rugositatem* inferunt, imprimis si deficiat liquor lubricans adeò necessarius.

**Coloris**  
**mutatio-**  
**nis.**

*Unguium Coloris mutationis* causam dicunt esse particulas succi nutritii vel craffiores unguibus illatas, quæ radios solares vel impediunt in eorum progressu vel eos deficiunt, vel quandoque facile permittunt, hinc enim unguis vel li-vent, vel nigrescunt, vel albescent.

**Curvatu-**  
**ra vel Fis-**  
**sura.**

*Unguium* verò *Curvatura* vel *Fissura* à particulis austeris, & multis angulis aut hamulis præditis ad unguis delatis, ibidemque hærentibus, ad mentem *Cartesianorum* inducuntur, unde unguis indurati ac rigidi curvaturam faciunt, & si simul particula hæ rigida deficiant unguum tubulos, *Fissura* eorum oboriuntur.

**Casus.**

*Unguium* autem *Casum* deducunt à succorum unguis irrorantium particulis acrioribus scindentibus ac erodentibus, radices unguum devorantibus, & ita eos plane tollentibus.

**Nostrum**  
**iudicium**  
**de causa**  
**unguino**  
**diagnosi-**  
**stis.**

§. 10. Jam demum & *nostram* de causis *Unguium* morborum proferamus sententiam: Unguis, ceu diximus, variis affliguntur affectibus, tum à propria structura, tum à peculiari succorum dispositione, tum à causarum externarum inclementia enatis; quum enim tubuli, ex quibus contexti sunt unguis, arcè invicem sint connexi, strictioribusque polleant canaliculis, tenuiores tantum admittunt succi nutritii particulas. Si verò in sanguine contineantur crassæ, terrea, viscidæque particula, quædamque ex iis cum sanguine ad unguis deportatæ sese in eorum tubulos infimant, tubuli, qui tales exceperunt particulas ab illis inferiuntur, & à novis continuè advenientibus attolluntur ac extenduntur. Sed quum craffiores sint istæ particula, quàm ut omnes fibras subire valeant, & ad finem usque earum, quas sunt subingressæ, pervenire possint, contingit ut *Unguis* in certis locis promineant, in aliis verò *æquales* remaneant.

**Craffities.**

Cum verò sanguis superiùs dictis particulis, nimisque crassis, paucioribus visciditate involutis scatet, ex quæ abundantes ad unguis appellant universis, vel saltem pterosque eorum tubulos complent & extendunt, & in ipsis novo

affluxu coarctatæ *Unguem craffiorem* reddunt, molemque illius adaugent.

*Unguis* quando *rugosus* apparent, quod tum *Rugositas* fit, quum scilicet propolita jam particulae fibræ eorum aliquales ab origine ad finem usque compleant, dum verò aliæ pristina fruuntur libertate: quum verò hæ constituant interstitia, à quibus illæ ab invicem separantur, efformantur hæc ratione sicut leuæ rugæ, à quibus unguis *rugosus* dicuntur.

Copiosa interdum adsunt in sanguine salinae particulae pluribus præditæ angulis, à quadam terrefcitæ admixtæ parumper obtusis, quæ per circulationem ad unguis delatæ, illorum tubulos subintrant, in iisque ob improporcionatam figuram temoralis coguntur; sed quum perpetuo agitentur motu, penitus in tubulos sese infimant, spiculaque sua fibrarum parietibus infigunt, quæ continuatâ actione sua tandem ad externam superficiem perveniunt, quam densio suo ordine scabram faciunt; illam verò non findunt obtusis, ut jam dictum, earum acuminibus ab adjuncta terra.

Fibræ unguum contextum componentes *Coloris mutationis* sunt ex nervearum genere, coloreque albo ideo donatæ, sed à sanguine ipsas perpetuo affluxu irrorante rubro induuntur colore, facta autem levi quâdam in vasis sanguiferis unguem præteritibus obstruktionem, statim apparet innatus unguum color eo in loco, quem sanguis non inundat; diu tamen non perdurant similes obstrukciones, brevique evanescit color iste albus; sanguis siquidem continuato suo motu, spirituumque animalium subsidio adjunctus, oppositos sibi obices tollit, pristinoque tramite pergit iter suum, quod antea per anatomos inter vasa congeneta communes fecerat.

Craffæ succi nutritii particulae, quæ unguum fibras subeunt, aliquando tantæ sunt molis, ut in limine sese hæreant, earumque principia impleant: & cum salinas easque acuminatas quasdam possident, fibras in origine vellicant; hæc verò sic irritatæ versus principia contrahuntur, & finem vi elastica adhuc gaudentem versus eundem terminum retrahunt, unguemque sic *invenit incurvanturque*.

Particulae salinae copiosæ in sanguine ac succis nostris existentes, si duris rigidisque polleant *Fissura*, spiculis, quæ nullo phlegmate, nullave terra hæbetentur, fibras, in quas protruduntur dilcindunt ac dilacerant, atque ab invicem dividunt, *fissurasque* in unguibus progignunt.

*Unguis* interdum *decidere* conspicimus, quod plurimis causis tum internis tum externis evenire potest; quæ scilicet unguum fibras necessariæ orbant alimonia, vel earum commercium tum cum fibris nervis, tum cum partibus vicinis, quibus sunt alligatæ, interrumpunt: internæ sunt, v.gr. obstrukciones pertinaces, quæ sunt in unguum tubulis, à quibus præ editur influxus spirituum animalium, succique alimentarii; unde sensim emarescunt fibræ, interstitiisque, quibus insculcantur musculorum fibræ, quæ ratione fiebat cum musculis commercium, dilatatis, hæc juris sui fiunt, unguisque dimittunt; qui

qui nullis adminiculis sustentati exsident: nonnunquam verò acres atque liviosæ quædam particule tenuiores, in aliis tamen supradictis casibus in fibris cespitantes, eas senim ac sine senio erodunt ac dissecant, atque ab aliis, quibuscumque coniunctæ erant, dividunt ac separant, obstructionsque mora sua producentes, commo- dum sanguinis Spirituumque commixtum præpediunt, & sic *Unguium Casum* inferunt. Earundem sunt virium Ulcera & Abscessus in partibus unguibus subiectis facta. Causæ externæ, quales sunt confusio, vulnus &c. simili modo ac prædictæ unguium casum inducunt.

*Reduvia.* Causæ Unguium Reduviæ sunt particule aciores ad carnem & radices unguium delatæ, item cuticulam & cutem discindentes, ac ejusmodi Reduviæ excitantes.

*Prognosis.* §. 11. *Prognosis* quod attinet: Omnes hi affectus unguium vix periculum, sed potius de- fœdationem manibus inferunt, sunt etiam ali- quando difficillimi curatu hi affectus. Sic un- guium crassities nimia, si non duntaxat in illis, qui jam sunt, aut etiam in succrescentibus simi- liter se offerat, corrigi nequit, cum, etsi quid ab illis deradatur, rursum in aliis, qui reces- sunt, vitium hoc redeat. Sed hi affectus un- guium non planè negligendi sunt, quia con- stant ex fibrillis & filamentis nervis, & faciliè ex eorum irritatione spasmus, convulsio ac mors oriri potest, ceu patet ex *Ephem. Germ.* ubi est improvida sectione unguium mors secu- ta est.

Puncta & macula albæ in unguibus apparen- tes non pro vitiosis, sed potius pro vitæ longæ- vix indicibus habentur, in juvenibus laudantur, in senibus spem vitæ longioris faciunt, seu vul- gus loquitur.

*Cura Dia- gnetica un- guium af- fectuum.*

§. 12. *Dia* nec in minimis ac vilissimis mor- bis contemnenda est, sic & ea nec negligenda venit in affectibus unguium externis, qui à succo nutritio ex cibis & potu parato hi affectus oboriri solent, & cum ut plurimum hi affectus, ceu in causa diximus, à stagnatione coagulationeque succorum, imprimis succi nutri- titi producentur necessariò eo respiciendum est, ut stagnatio ac coagulatio æquè observati congrua *Dietæ*, quàm applicatis remediis im- pediat. At ergo eligatur purus, temperatus, fugiatque frigus angue pejus, cibi eligantur boni succi lactescentis, ut inde optimus emergat succus nutritius, ab omni terrestreitate ac visciditate alienus, vitentur cibi acidi, salsi, saccharati, muria conditi, gaudeant po- tius copîa salis volatilis. Potus sit cerevisia bene fermentata, ac herbis vel radicibus aroma- ticis, Volatili abundantibus maritata, & vi- num Gallicum interponatur, vel sit potus calidus Theæ vel Caffæ; fugiantur vina acida, aliaque refrigerantia, succos, imprimis nutri- titum tantum coagulantia. In hisce casibus im- primis mundiciæ studendum est, ne manus cum digitis ac eorum unguibus rebus sordidis mul- tum applicentur, vel diutius aquæ frigidæ im- mergantur. Reliqua sunt pro re nata obser- vanda.

*Curationes.* §. 13. Ordine nunc devolvimur ad *curationem*

*Pharmaceuticam & Chirurgicam*, quam Veteres *Galenus* in Unguium *Inæqualitate* & *Crassitie* unguium instituit, evacuando prius humorem super- fluum, pituitosum scilicet; dein ad *Topica* unguum *inæqualitate* & *crassitie*.

transfunt inter quæ humorem crassum attenu- antia maxime laudant, adipem ovillum emol- liunt, & super lintum extensum adhibent, ac tertio die solvunt, & si mollem unguem repe- rerunt, deradunt & eundem rursus imponunt, & tertia die solummodo similiter deradunt, atque hoc tamdiu faciunt, donec ungues glabri & æquales ac tenues sint. Alii thus tritum cum adipe ovillo excipiunt, ac eodem modo utun- tur. Alii alumen scissum asferino adipe mix- tum usurpant pari modo. Nonnulli, ex cuius usu succulentum sentiunt, Masticeam Chiam in aquam ferventem contectam ac emolliatam un- gui imponunt ac obligant, & tertia die sol- vunt & derato ungue iterum imponunt, at- que hoc faciunt usque ad perfectam restitu- tionem.

In *Rugositate* & *Scabritie* Unguium Hordei *Rugositate* farinam cum Pice ad emplatri formam co- ar *Scabritie* quunt ac imponunt, si hæc non juvant ad tor- tiora accedunt, quæ efficiunt, ut ungues ita de- turpati decidunt, & novius meliores recrescant, in quæ finem sequentia laudant. Auripigmen- tum colore aureo, & sandracheni æquis por- tionibus probè terunt, terbinthinam ad em- platri formam excipiunt & imponunt, ubi prius per unum atque alterum diem farinam hordeaceam cum æteto & silvestris cucumeris radice tritam adhibuerint. Item calcem v. v. cum oleo, aut mastichen cum opobalsamo im- ponunt.

In *Coloris mutatione* Unguium rationem com- *Coloris* mendant Veteres, dein varia excoctatoria ex *mutatio-* cantharidibus, sulphure vivo, chalcitide, na- *tu.* sturtio, sinapi, nigella, autamentario sutorio, &c. parata applicant.

In *Curvatura* & *Fissuris* unguium plurimum *Curva-* hic conferre ajunt pulmentum avenaceum, cum *tu.* pulvere radicis althææ in aq. in cataplasmatæ formam coctum. Ungues incurvatos vitro prius terendos esse ajunt, dein adipe ovi sæpius emol- liendos. In *Fissuris* vel *Scissuris* commendant aquam folior. cynoglossi. quam linguam canis vocant, sæpius applicatam.

Ad *mos ungues* ex aliqua offensa, ac caricas *Casus* cum melle tritas mitigare dicunt. Quod si di- *sum.* midium unguis exciderit, nitrum aut saltem cum pari fellis vitulini mensurâ mixtum, adhibent, sanantque.

Ad *confusos* Ungues Myrti & mali Punice folia tenera imponunt, aut felle tauri evacuato, in ipsam fellis vesicam unguem induunt, ac sinunt, donec perfectè sanetur. Vel sal fuisse cum aqua & oleo tritum illinunt.

Au *subcruentos* Ungues, pitem siccam lique- factam, & cum farina mixtam apponunt. Ali- quando subcruentatum unguem in medio perfor- ant, ac cruorem effusum expriment.

Ad *reparandos* Ungues commendant sequens:

℞ Myrrh. ʒi.  
alum. ciss. ʒb.  
panis hordeacei sec. ʒj.  
Excip. melle & imponunt.

Lau-

Laudant quoque ad ungues ægri orientes, Betæ agrestis semen cum aceto tritum ac impositum, vel polium, cum adipe vitulino & terbinthina tritum adhibent.

PARACELSI  
cura in  
unguibus  
Inequali-  
tate &  
Craffiss.

§. 14. *Paracelsus* in Unguine *Inequalitate* & *Craffitie* uti solet resolventibus, ut nimirum coagulum illud ex Se & Mercurio cum Sulphure rite dissolvatur, in quem finem commendat lapidem calamitarem, gummii Arabicum, aliæque commendat.

In Rugositate &  
Scabritie.

In *Rugositate* & Unguine *Scabritie* laudat vapores, qui ascendunt instar fotus ex radic. uticæ minoris; vel sequens laudat:

- ℞. *Farine hordei*,  
    *siliginis* aa. ʒi.
- Pivola*,  
    *Agriomania*  
    *Centaurea*,  
    *Prunella* aa. ʒb.

Aquæ puræ quantum sufficit pro decoctione. Aut illis sequens:

- ℞. *Ol. ex Juniperi* ʒi.
- de spica* ʒij.
- lateris* ʒviij.

Fiat Mixtura.

Ungantur Ungues hoc unguento.

In Coloris  
mutatione.

In *Coloris* *Unguini* *mutatione* commendat Tincturam lapidis scissi, vel sequens:

- ℞. *Camphore* ʒb.
- Sigilli Salomonis* ʒij.

destillat, postmodum linteo hæc in defacto parum inungit lavatque Ungues.

In Curvatura.

*Curvatura* ac *Unguini* *Scissurarum* cura, juxta ipsum, fieri debet si q. m. do:

- ℞. *Rad. urticæ minoris* ʒvj.
- Rapontice* ʒij.
- consolidæ regalis* ʒib.

Aquæ puræ q. s. est pro Decoctione.

In Decoctione superpone Ungues, & olla sit optime cooperta, ut vapor unguis melius tangat, hoc fac singulis diebus quater aut quinque, postea purgabis sanguinem, uti sequitur.

- ℞. *Gamandrea*,  
    *Cichoreæ* aa. q. v.

bulliant in optimo vino. Hanc potionem dicit rectificare sanguinem. Vel in forma unguenti sequens applicetur.

- ℞. *Petrolei*,  
    *Axung. cati silv.*  
    *cervi*,  
    *taxis* aa. ʒb.

M. f. Unguentum super carbones nianè & serò illine.

In Casu.

In *Casu* *Unguini* omnia ea approbat, quæ extrinseca accidentalia avertunt, laudibus extollit oleum quercinum circa radices unguini illitum, vel axungiam cati, vel oleum de coste, de granatis, & quæcunque alia, quæ modicè astringunt; applicat quoque hoc in casu realgar & talem.

In Porro ab incisionibus & corrosivis aquis in Porro. abstinet, & seq. commendat.

- ℞. *Oleum ex bacca Juniperi*,  
    *Besonne*, *Agarici* aa. ʒj.
- fellis bovis* q. s. pro unguento:

Unde dies & noctes linteolo, quo magis triveris eo melius efficiuntur nigri siccanturque: post oppodeltoch ad 4. vel 5. septimanas utere.

Vel:

- ℞. *Realgaris* ʒj.
- Olei vitell. ovor.* ʒb.
- calcis exstinct.* q. s. pro unguento.

§. 15. *Helmontius* ad *Inequalitatem* & *Craffissimam*, ut & *Rugositatem* & *Scabritiem* Unguini corrigendam eo intendit, ut pissioris ita accretio resolvatur, & alliciatur latex purior ad ungues, in quem finem commendat tanquam fissuræ arcum axungiam mucis, sæpius unguibus gustatis ad illinendam.

In *Unguine* *Coloris* *mutatione* omnia ea commendat, quæ laticem purificant, & interitum mucaginem abluunt, & sic ungues nitidos reddunt; in quem finem commendat interna sudorifera, externè verò fel leporis. Si verò à singillatione fuerit, laudat ea quæ in hoc affectu jam dexterrimus.

*Curvaturam*, *Fissuram* & *Casum* isdem curat remediis ac prædicti Authores fecerant.

§. 16. *W. illius* in omnibus supra descriptis affectibus exhibet medicamenta, quæ succo nutritio fluidiori, volatiliore, & dulcoritèdendo conveniunt. Quoad externa verò ea ipsorum singulis juxta variam liquoris Diathesin affectusque naturam administrat.

*Inequalitatem*, *Craffissimam*, *Scabritiem* & *Rugositatem* sanat Empl. de cera, pice aut resina, vel etiam mastiche imposito; ut prioribus decrescentibus novi æquales succedant. Si fortioribus sint detrahendi, folia ranunculi applicata approbat, uti & arsenicum eæ admixtum.

Quum *Coloris* *mutatio* in hoc casu à singillatione ne fiat, Author medicamenta sanguini dissolvendo appropriata præscribit, qualia sunt catapl. ex farina fabarum, fœnigræci, pulv. cymmin. croc. vel catapl. ex melle, nucl. nuc. & sale, item oleum coctum radicis bryoniæ, & unguentum de Alabastræ.

*Curvaturam* *Unguini* corrigit Emplastris in *Curvatura*, emollientibus, qualia sunt Empl. Diachyl. de sara, mucilag. &c.

*Fissuram* *Unguini* medetur Emplastro ex colophonia, terbinthina & thure.

Ars Medica in *Casu* *Unguini* nullum auxilium afferre novit; radix enim Unguis absumta nullis remediis reparari potest, novusque est expectandus, qui ex radice in carne contexta repullulet.

§. 17. *Sylvius* ad curandam *Inequalitatem* ac *Sylvii* *Craffissimam* *Unguini* in eo occupatus est, ut ra in humor peccans ac viscidus corrigatur medicamentis incidentibus & attenuantibus, seu sale volatili præditis tum internis, tum externis.

Ccc cc

Et ti

Et si simul copia peccent hi humores, evacuentur per phlegmagoga tum communia, tum maxime Chymica, Mercurium potissimum dulcem. Externè verò commendat spiritum vini cum oleo aromatico, vel balsamo sulphuris, maritatum sapidus Unguibus applicatum.

*In Rugosi.* Rugositatem Unguium ac Scabritiem, item Coloris commutationem quod spectat in curatione cum aliis consentit.

*In Curvaturâ.* Curvaturam & Fissuras Unguium curat unguis à siccitate rigidus emollientibus, ut unguento Dialthez, axungia caponis, & id genus aliis remediis.

*In Casu.* In Casu Unguium cura Author cum Willisio consentit.

*Corruptio.* §. 18. Cartesiani ad Inaequalitatem & Crassitatem Unguium varia destruentia, resolventiaque, adeoque ab ipsa quiete ad motum excitantia adhibent, ut sunt spiritus vini, calcis viv. &c. sed cum hæc vix sufficiant, ad cultum accedunt, ut Ungues tamdiu rodantur, donec æquales & tenues reddantur.

In Rugositate ac Scabritie commendant medicamenta aliquantum pingua, quibus anguli hebetentur, & rigiditas unguium cornuum flectatur, ut sunt butyrum recens, lardumque ungu. Dialth. &c.

Curvaturam ac Fissuras Unguium corrigunt medicamentis particulas habentibus teretes, lubricas, vim angulorum eludentes, quæ fibris unguium irrepentes, & Fissuras replentes, efficiunt, ut vis illa angulorum scindentium valde minuitur, & benigniores particule succi nutritii admittantur, fibras denuo glutinantes, quod præstant omnia Medicamenta mucilaginosâ & blandiora ramosa, particulas acutas inviscantia & hebetantia, imprimis linimentum ex butyro recenti infusis, cum creta & camphora, vel unguentum aureum.

In Unguium Casu commendant eadem & alia in ulceribus ipsis solennia, ex Saturno, Tutia, &c. parata, ~ vin. camphor. aliaque remedia acidum absorbentia, mitigantia & hebetantia, alibi jam dicta, & inferius adhuc dicenda, adhibent.

*Cura Inaequalitatis unguium secundum Nostram methodum.* §. 19. Quoad Nostram Sententiam, cura in Unguium Inaequalitate consistit in eo, ut emolliantur & dein abradantur; ad emolliendum varii focus, cataplasmata, unguenta, olea, succi, &c. applicari possunt: Emplastrum ex cera, resina, mastiche, & succo heder. arboreæ egregium crit, nec Empl. nostrum de Thea & spermat. ceti, vel de Labdan. contemnenda sunt. Si hisce medicamentis & rationi non cedant, ad fortiora accedendum est, & quidem corrosivis, ut sic prioribus decrepescitibus potius æquales succedant unguis, in quem finem conductæ aqua nostra corrosiva Mercurialis, qua sola imposita statim decidit unguis. Sed semper durante cura unguis ab ære muniatur, facilius enim tunc recrefcunt. Rarum est quod nuper in filio 12. annorum Illustris alicujus Baronis observavi, cui unguis non crefcunt, sed succus nutritius unguibus destinatus ad partem carneam transiit, & ibidem tumorem instar clavi producit.

Vix Crassities Unguium aliis remediis curari potest, quàm abrasione sæpius cultello instructa, vel illinantur elix. vix nost. d. vel ~ matricæ. vel ♀ Regii. Hungar. tunc facile recrefcere solent unguis, & vix impediri potest, ne iterum incrassescant unguis, alluente sc. novo succo nutritio.

Ad Crassitatem hanc Unguium impediendam commendamus etiam varia Emplastrâ, imprimis illud quod solemus parare ex cera, pice, thure, mastiche, succo anagallidis, quod continuo super unguem gestandum est, vel Emp. Cinnabarinum nostrum.

Ungues Scabri vel Fissi vix redintegrari aut æquales fieri possunt, sed procrefcentes tandem cadunt, quod ut melius fiat, neque alii similes succedant, sequentibus uti solemus, vel si adhuc subsistunt, ut auferantur, applicari solemus Empl. de Labdano, vel applicetur cera cum mastiche liquefacta, vel spirit. matricæ, vel fiat cerat. ex colophon. terebinth. addito cre. camphora, & sale xci. Empl. Vigon. cum quadruplo Mercurii. Inter fortiora Ungues scabros detrahentia commendantur varia medicamenta caustica imposita, quibus tamen cautè incedendum esse, Author ero, ne tubulos illos fibrosos nimis irritet & discindat: sic quidam Empiricus oleo gñii unguis tollere conatus est, inde verò puero 12. annorum pessima symptomata acciderunt, caput dolebat & lachrymæ continuo involuntariè ex oculis effluebant.

Si unguis liveat ob pallorem corporis, vel si maculam nigram contineat ob suffugillationem sub ipsis factam, cum hi colores non in ipsis, sed in substratâ carne existant, & per ipsos pellucidos tantum transparent, non alia cura, quàm in pallore ac suffugillatione revelata fuit, his quoque assignanda est, quod si unguis nigri existant, prout apud Bartholinum in Ast. Hæst. T. 1. p. 64. exemplum existat, nulla superest cura arthriopibus. Quod puncta vel maculas unguum albas attinet, cum longevitatem hominibus portendant, & jam præjudicii his occupati homines sint, potius intactæ relinquende, quàm attingendæ sunt, cum Medicus in vili tali morbo artem suam sæpius proficere cogatur. De quibus, ut & de Dentium sera regeneratione vide Helmontium, qui nugæ has inanes optimis instructis rationibus & experimentis rejecit, non deest enim rationalem Medicum hisce aliisque præconceptis opinionibus fidem adhibere.

Quod si experimentum Celeberr. Boyle & Papini Profess. Marburgensis, ad ossa mollia reddenda institui possit in vivis hominibus, in Medicina egregium præstaret usum, imprimis etiam ad unguis emolliendos & planandos, sed cum hoc non possit fieri, ad Medicamenta accedere cogimur, commendamus etiam hic varios focus, linimenta ac Emplastrâ, nec contemnimus spirituosos unguibus sæpius apposita, huc facit præ aliis spiritus Matricæ, Terebinthine, vel Empl. Diachyl. de mucilaginibus, de Thea, de Labdano, de Cinnabari, vel etiam Norimbergense, unguis etiam diu in lacte, in quo flores chamomillæ & meliori cocti

rostri erant, detineatur, qui totus diu continuandus est, vel decocto malvæ fovendus, vel pro re nata aliquomodo radendus est; si malum fuerit ab Elephantiasi, nullam admittit curam.

Casus.

**Casus** Unguium cura in eo consistit, ut Medicus bene advertat, à qua causa casus fuerit productus; si est ab ulcere, illud prius rite curandum est balsamicis ac spirituosis, in quem finem præ aliis balsamum nostrum divinum commendamus; si verò casus oboriatur à particulis acerbis corrosivis, succo nutritivo permixtis, sanguis ac succus nutritivus prius ab ipsis liberandus est, per decocta & Essentias liquorum, Antimonii, aliaque sudorifera balsamica, Elix. antiscorbut. noster. spir. martiall. Si à Lucæa malum ad Mercurialia sæpe transeun-

dum est, ut corrigatur istud acidum-acre, in Lucæa hac ubicunque abundans: itidem conducunt sal vel spiritus Guajacis, Sassafras, Salsaparill. decocta liquorum, essent. Antimonii, & sexcenta alia alibi dicta. Decidentiam unguem, si necesse est, acceleramus scalpello, cum mollior separando, atque emplastr. de ammon. bdellio aut galbaus imponendo. Ungue sublato, quo novus citius lucrefcatur, digitale ex cera virginea, sæpe renovandum imponatur.

**Reductio** primò diligenter amputentur, deinde detineantur digiti in vino adstringenti, in quo bullierit cupressus, & parum aluminis, nam huiusmodi ablutio ita constringit, ut postea non facile renascantur pelliculæ istæ, Reductivæ quoque nomine insignitæ.

Reductio Cura.

## CAPUT IV.

### De Morbis Tibiarum, Roseolis nempe Saltantibus, Zosteræ, & Thymo.

#### §. I.

Roseola Saltantis.

**A**ffectus Manuum Pedumque persequentes, et perimus affectum, qui percrebuit, & cui *Roseola Saltantis* nomen imposuerunt Majores nostri, quæ est pustula subnubra, fæculenta, & recondit tuberculum, quod tactu fabæ vel lupini magnitudinem ac formam repræsentat, dolore se declarans, sæpe & ulceratam pustulam comitem habet. Roseolæ dicuntur, quod rosarum formam & colorem præ se ferunt, vel quod rosidas quasdam inspersiones repræsentant. Dicuntur autem Saltantes, seu Salturiæ, quod Tibias privatim occupare consuevit, per dolorem faciunt, ut stantes & iis vexati homines salturiant, i. e. tibias alterne sublevis aut terra pressis crebro agitentur. Saltantes hæc pustulæ indefinitis ac incertis sedibus inhærescunt, vagisque excipiuntur locis.

Zosteræ.

Alter Tibiarum affectus, *Zosteræ* dictus, aliis vocantur *Zona*, & habetur pro Herpetis specie, quæ occupat Tibiam, & illam quidem regionem, ubi homines *Zona* se cingere solent, unde & aliis *Circinus* appellatur, vocatur & *Zosteræ*. *Helmontio* aliisque *Zirziska* dicitur. Flandri & Batavi vocant *den rodeen Uimcoep* / Germanis dici potest, *der feurige Umbtauff*.

Rarissimus est hic affectus, ex Veteribus enim præter *Scribonium*, *Apulejum*, *Marcellum* & *Plinium* nemo ejus meminit. *Johann Langius Epist. Med. l. 1. Epist. 32.* Sub alterius ejusdem erysipelatis, & quidem perniciosi specie, quæ à Cingulo *Zosteræ* appellatur, eundem quoque depingit & binis exemplis demonstrat. Affectus ergo hic merito vel ad Herpetem vel Erysipelas referri potest, quia unus idemque est affectus, utriusque eadem essentia, una causa, unaque curandi ratio,

discrimen in eo tantum consistere videtur, quod Erysipelas in uno loco plerumque persistat, in volatica autem seu *Zona* rubor priorum locum sæpe deserit, ulterius tamen progreditur, locaque vicina invadit. Liquor quoque *Zonæ* est acrior ac subtilior, tubulosque subtilissimos occupat, quàm fieri solet in Herpete & Erysipelate.

*Thymus*, aliis est verrucæ species, Veteri. *Thymus*. bus verò tumor parvus, asper, subruber & oblongus, qui si abscondatur major effunditur sanguinis copia, quàm pro magnitudine tuberculi, & non solum in ano exuberat, sed & inter coxas. Nomen autem habuit à summmitate vel cacumine Thymi herbæ. Porro eum multum increfcit *Thymus*, in *varicellæ* abit; sicofas eminentias Veteres appellant, quarum duas esse dicunt, malignas, & malignitatis expertes; *Thymum* verò hic tractamus, qui Tibiam occupat.

Sunt qui Roseolas Saltantes cum Pernionibus confundunt, non ergo sunt Chymethia Græcorum aut Perniones Latinorum. Nec sunt Terminthi *Galen*, Roseolæ enim sunt pustulæ latæ potiùs quàm phyma ac tuberculum. Terminthi verò phymata sunt ac tubercula elata supra cutem, & rotunda non latæ & fusæ, suntque superne pustulata. Roseolæ noctu imprimis molestissimæ sunt, quod de Terminthis non observatur. Hinc sunt qui existimant, *Hipp. l. 6. epid. comm. 2. Sect. 30.* per hæc indicasse Roseolas Saltantes: *Latæ pustulæ non admodum pruriginosæ, quales Simon hyeme habebat, qui cum ad ignem inungeretur, aut calida lavaretur, jurabatur, vomitus non jurabant, puto si quis calida fomenta adhibuisset, utilitatem perciperetur.* Roseolæ sunt vel lentes, breviores & curatu faciliores, quæ per se ipsas discedunt appropinquante vere,

C e c c a

quæ



quæ hyeme fuerunt ortæ; aliæ verò sunt superiores dictæ, quæ manuum articulos & internodia afficere confectæ sunt pruriginosæ, ac de uno in alios digitos, deque sinistra in dextram manum vagæ, in metacardylis verò natæ ad extremum discessit ungues ab radicibus plerumque divellunt, proprietates nempe, quæ in alteris non percipiuntur. Affectus Roscolæ dictæ cum plerisque viciis extimi corporis conveniunt, similis enim est Terminthis, latis Exanthematis, Ellëris, Benat noctis, sic & Syphilia tubercula sunt Inflammatoria, noctuque perdolentia, quæ manus pedesque & eminentes omnes corporis partes occupare solent, ad quæ accedunt maximè Roscolæ, accedit & Podagricos quædam fors, quæ jam dictas Roscolas, per excelsitates manibus pedibusque nodulos tuberculos & afflictones æmulantur, sed Roscolæ non articulos tantum, sed & mediam Tibiam occupant, quæ etiam ut plurimum pueris & maximè puellis contingunt, nec non terminis junioribus, præsertim iis quibus menses non ritè fluunt. Si grandioribus id eveniat, apparente quidem imagine Roscolarum, non tamen erunt veræ Roscolæ, plurimum enim Syphitidos & hoc gemen, verrucosam simul & impetiginosam vitii formam referens, quam ex deleteria fua causa sedulus indagator facile deprehendit.

*Parasitica.*

§. 2. Pars horum morborum affecta ut plurimum est Tibia, & varii sunt liquores per hanc circulares, Græcis dicitur Tibia *κνημ*, est tota cruris inter talum & genu in interiori parte sita, cuius Tibiæ pars anterior tennis & carnis fere expert *Oræa* vocatur, posterior verò carnosa pars *Sura* appellatur. Roscolæ crura Tibiasque potissimum affligunt, Zoster verò Tibias non tantum, sed imprimis Zonam, seu eum locum, ubi Cingulum in Tibia gestare solemus, unde & nomen habet, occupat: sic etiam aliquando femora ad genua usque, brachium & manus aliæque corporis loca sub alio tamen titulo afficere solet. Thymus hic etiam Tibiam tantum occupat, cum aliis etiam alia possideat loca.

*Diagnosin Roscolarum Saltantium.*

§. 3. Nunc pergitur ad horum affectuum *Diagnosin*, & quidem primò *Roscolarum*, quarum non una est apud omnes Practicos facies, sunt qui putant esse macularum modo cutem Tibiarum supremam lambentes & efflorescentes, iterumque evanescentes. Ad Suppurationem, me iudice, aliquando perveniunt Roscolæ. Signum Pathognomicum habetur, quòd noctu invadant & exasperentur. Insolens quoque & singularis apparet forma tumoris, qui Roscolarum Saltantium promeritus est nomen, est tumor intra sua limina, non verò ut alii extra, circa septa sua latiusculum, sed uniforme latet tuberculum, quin potius tubercula plurima simul coærcata, singula sua lateribus involuta, ob id autem quod unitate contenta non sint, ob id ipsum à Veteribus Roscolæ numero plurimum sunt nominatæ, singula prædilectam referunt rotunditatem, adeo ut apprimè fabis *Cornicium*, & alii Lupinis æquiparant, videntur in inspectione radii quidam ex albo rubescentes, quas sanguineas fibras dixeris, per cutem translucens, & maximè al-

terantur, luculenterque turgescunt, ubi per noctem dolor simul incitrat. Roscolæ hæc ut plurimum ad hyberna tempora facile erumpunt, & iis Scorbutici ac Cacochymici sæpius afficiuntur.

*Zoster* cognoscitur ex eo, si cutis fuerit *Zosteræ*, exasperata instar Herpetis, in eâ regione media Tibiæ, ad quam homines Zonæ se cingere solent.

*Thymus* autem cognoscitur ex extuberantia *Thymi*, in Tibia oborta, Thymii florem referente & figurâ motum.

§. 4. *Galenici Roscolarum Saltantium causam* Galenicis varias enumerant, & quidem ante omnia èrum opinio quatuor humoribus cunctis, quorum vitio morbus emergat, maximè verò à sanguine vitioso abundante deducunt causam, quod hi affectus plurimum in calidis atque humidis ætatibus, habitibus, &c. visatur, quæ maximè ad sanguineam exuperantiam accedunt. Post sanguinem, eile quoque aliquando pituitam in causa, statuunt, quæ non difficile congeritur in fœminis & albidis corporibus. At neque rejiciunt bilem, quæ vellicatum aliquem & acrimoniam præ se ferat, quia ob pruriginem & dolorem saltare faciunt homines Roscolæ. Multò verò maximè derivant à melancholica portione, præsertim aliqua parte retortitiâ, cuius & malignus mos, & fulcus color, & pertinacia sæpe observantur. Itaque nullum excludunt vitiosum humorem, sed omnes aut plures conflucere ajunt, sæpe sanguini nonnihil viscidæ pituitæ vel ichoris admixtum esse contendunt. Evidentiores ipsis causæ sunt humus morbi, aëres, aquæ & loci, maximè cum ad frigidam ac humidam exuperantiam exoribent. Hunc ergo affectuum populus dicunt esse Endemium, potissimum verò Neapoli frequentem, propter loci situm & victum inordinatum, & quia Lues Venerea seu Neapolitana solennis esse solet, & quasi initia sua ibidem petit. Inter causas remotiores etiam referunt suppressionem superfluum, unde fœminis morbum hunc esse solennem, contendunt.

Modum generationis Roscolarum quod attinet, earum pustularum in aperto corporis generationem aperit *Galenus ipse ad libr. 6. Epidem. text. 30.* dicens: Egerminant pustulæ naturâ corporis altiores sedes repurgante, ut nonnunquam per excretionem, ita & per depositionem ad cutaneas partes, subtiliores liquidum, dilutioresque succos extenuans natura discutit, crassioribus autem cuti, sed potius pelliculæ, quæ epidermis vocatur, utpote dentiori induralescentibus *pustula* exoritur, idque magis incidit, his qui densiore ac duriore cute sunt, difficilis est enim per ipsam pinguiorum tenaciorumque succorum transitus.

*Zonam* seu *Zosterem Galenici* communiter bi-Zonam seu flavam in partem illam Tibiæ, ubi Zonæ se cingere solent homines, effusam accusant, remotiores verò omniae dicunt causas, quæ bilem augere possunt.

*Thymum* verò dicunt esse à pituita viscidâ *Thymi*, aliquando cum melancholico humore commixta, & ad Tibiam delato, ibidemque ejusmodi tumorem producente.

§. 5. *Parasitica.*

Paracelsi  
sententia  
de causa  
Roseolarum  
Saltantium.

§. 5. Paracelsus Roseolas Saltantes ex sale minerali deducit, & quidem in loco Tibiæ cumulatæ, ubi ejus centrum figitur, ibidemque pruritum & dolorem excitat, & sæpe materiam peccantem esse sal aluminatum ab ætæ elementis extra suum chaos expulsum ad cutem secundum æthereorum expulsiuorum operationem.

Zosteren verò esse consumptum sal vitriolatum, hoc primum in tubedinem & corrosiorem, aliquando in ulcerationem transit, locus ejus esse dicitur inter genua & calces circumcirca crus, ibidem enim juxta ipsum est Morbus Mercurialis. Notat etiam, quamvis vitriolatum sal Morbum efficiat, est tamen ipsa minera Mercurialis tantum, à quâ proprium recessit balsimum, & liquor salis, ejusque species pro quantitate recessus demonstrantur.

Thymum à sale stiptico in Tibia succum nutritium coagulante esse contendit.

Helmontii  
opinio de  
causa Ro-  
seolarum  
Saltan-  
tium.  
Zona.

§. 6. Helmontius causam Roseolarum Saltantium in acido consistere, ait, cum latice ad Tibiam delato, ibidemque tyrannidem suam exercente.

Zonam verò seu Zosteren ex ira Archæi esse contendit, & simul esse Apostema igneum, circa Tibiam, ubi homines cingulo se muniant, contendit.

Thymi.

Thymum verò esse pustulam pruriginosam ex latice incassato, & circa Tibiam stagnante.

Willisii  
opinio de  
causa Ro-  
seolarum  
Saltan-  
tium.

§. 7. Willisus Roseolas Saltantes deducit à liquore acido-salto, & à sanguine permixtis: sanguis enim in parte remorans à succo nerveo in carnem protuberantem commutatur; seruius verò superiora petens, & ob visciditatem evaporationi inhabile existens, in cutis poris aggeritur, ibique stagnans corrumpitur, ac putrescit.

Zona.

Zosteren derivat à sale abundantiori atque fixiori, qui per arterias ad glandulas miliares cum sanguine appellens, & per eas ab ipso separatus, in angustioribus cutis poris illa in regione Tibiæ in qua cingimur, colligitur, atque coacervatur, & aggerie sua pustulas in superficie excitat.

Thymi.

Thymum procreari censet à copiosiori succo alibili sanguinem admixtum habente, & in quadam Tibiæ parte ad eum excipiendum disposita aggesto, ibidemque à succo nerveo in carnem illam superfluum efformato.

Sylvii opi-  
nio de cau-  
sa Roseola-  
rum Saltan-  
tium.

§. 8. Sylvius in Roseolis Saltantibus accusat acidum acre pustulam in Tibia excitans. In Zona verò accusat solani bilem sine sanguine in partem illam, in qua cingulo se cingunt homines effusam & eruptam, illamque acrimonia sua vexantem & male efficientem, unde ex conflictu dolor excitatur.

Thymi.

In Thymo accusat acidum pituitam in Tibia tuberculum excitantem.

Cartesii  
opinio de  
causa Ro-  
seolarum  
Saltan-  
tium.

§. 9. Cartesius Roseolarum Saltantium causam deducit à particulis acutis & oblongis sensilibus, vel cum succo chylosiore ex sanguine per arteriolas, vel cum lymphâ per ramulos lymphaticos Tibiæ tubulis illatis, quarum figure minime respondeant poris & interstitiis fibrillarum ejus: proinde poti à particulis istis

pervertantur, & fibrillæ nimis distendantur; unde pustulæ in Tibia emergant, & dolorem maximum inferant, spiculis suis acutis membranas vellicando.

Zosteren seu Zonam derivant à succo quoque Zosteren dam multis particulis angularibus imbuto, sive acido glandulas cutaneas, circa eam Tibiæ partem, quâ Zonam gestare solemus, obstruente, easdemque in tubercula quædam distendente, Zonam oriri volunt.

Thymum verò Cartesiani produci volunt Thymi, quando particula istæ acutæ à crassioribus obstructangulis, quibus succus nutritius simul scætet, adhuc in Tibiæ parte detinentur & opprimuntur, quæ tamen temporis tractu ab acutioribus arroti, attenuari, sicque viaci & pari modo acui possunt.

§. 10. Perceptis ita sufficienter aliorum Nostri judicii, jam demum & nostrum de affectuum horum causis liberum dabimus judicium. Roseolarum igitur Saltantium causam dicimus esse acidum lucos per tubulos Tibiæ circulares coagulans, relicto tuberculo magnitudine fabæ vel lupini, maximum dolorem inferens, succorum enim partiæ salinæ pessimè figuratæ, per tubulos Tibiæ transire nequeunt, quia hæ permotum ex massa sanguinea vel lymphatica segregata, duntaxat densius agglomerantur, ut circa tubulos Tibiæ stagnent, & hæc Roseolas Saltantes inferant.

Zosteres verò aut Zona causam itidem deducimus ab obstructione tubulorum, si enim Tibiæ tubulorum obstructioni interdum glandulæ miliares minutissimæ, quibus cutis maxima ex parte contextitur, obstruantur, & succus, circa eam partem Tibiæ, qua cingulo cingimur, stagnans & evasatus, mediante acido & alcali incalcescat, nonnihil eleuantur tubercula minima, seu pustulas cum robore partis efficiant, quæ etiam ob jam dictam effervescentiam inter alcali & acidum multum pruriunt, inde inter Herpetis species Zosteren seu Zona oboritur.

Thymum quoque esse ab acido viscido ac coagulante, & sæpe à sanguine in Tibiæ tubulis coagulato, vel succo nutritio non rectè assimilato, & speciem floris Thymi exhibente.

§. 11. Et hæc de causis sufficiant: haurienda jam Præfagia. Roseola neminem ad interitus pericula perducit, si Hipp. fides adhibenda 1. Epid. Sect. 3. ajens; nocturna non admodum lethalis, verum longa. Sed tamen in Arthritica & membrorum languores sæpe finiville, observantur Veteres, qui itidem notant, in ulcus etiam sæpe transmissibile latam hanc pustulam, fomentis acerbis & salis in cautè forat: sunt autem morbi mortæ cum obfello corpore semper longæ. Sed cum hic affectus rarissimè, hisce in locis occurrat, capropter non operæ pretium duximus ampliorem prognosin proponere.

Zona seu Zosteren est affectus non negligendus, sæpe enim in exulcerationem transit curatu difficillem, & omnis prognosis Herpetis & Erythipelatis huc applicari potest.

Thymus facili ob acidum, quod haud raro nimis

nimis corrosivum oh stagnationem reddi solet, in Cancrum transit.

*Dicitur.*

§. 12. *Dietam* quod spectat, in his *Tibie* affectibus ante omnia eo respiciendum est, ut aer eligatur calido-temperatus, in iis enim locis, ubi minimus est solis lucisque collustratus, & in ea regione, in qua etiam pluviosa nimium est anni pars, & sæpe austrina constitutio, hinc Affectus; Roseolarum Saltantes dicuntur esse Neapolitani is Joannes, prout testatur M. A. SEVERINUS, in qua urbe propter celsitudinem ædificiorum, quæ se proximè, id est, pauca loci intercapedine spectant, nulla Solis adest collustratio. Quibus causis accedit & victus crassus, ex carne bubula & suilla, ex omni brassicæ genere, & ex salis cibis acidisque, ac piscibus, quibus abutuntur incolæ. Eligatur ergo victus euchymus & eupeptus, lacteus & dulcis, qui optimum in se continet succum nutritium, videntur carnes & pisces minus bonæ notæ, omnia nimis salia, acra, saccharata, acida: Omnes fructus horarii, legumina quæque, fugienda. Item brassica capitata more Germanorum sale condita, quæ maximè est noxia, quamvis plures ex ignorantia ea delectantur, & ob purgationem, quam excitat, amant, sed falluntur & sæpe inde magnas corporis sui luunt pænas. Cerevisia non desecata, item omnis potus glacie refrigeratus perquam noxius exitit, è contra potus calidus Theæ vel Caffæ egregius & perquam utilis est, si simul reliqua potulenta non assumantur nimis frigida, si enim à potu Theæ solum expectare quis velit, omni potui frigido renunciare debet, alias plus noxæ, quam emolumenti experietur. Somnus & vigilie sint moderata. Motus, sive corporis conveniens, nocet verò quies & otium, inde enim sunt cruditates, obstructions, cacoehymia, cacoehylia, & fovetur cacoethia. Alvus & menses in feminis consueto ordini respondeant.

Animi affectus immoderati omnes abigendi, maximè enim nocent Venus, Ira, Bacchus, mæror, sollicitudines.

*Galenicum curam Roseolarum Saltantium.*

§. 13. Veteres Galenici præsertim *Roseolarum Saltantium* Curationem sequenti aggrediuntur apparatu. Primò Dietam præscribunt congruam, dein corpus evacuant purgatione, per quam delinquentem humorum qualitatem expugnant, & *Venasctione*, cujus ope plenitudinem exhauriunt, quam tamen plures non admittunt, qui causam Roseolarum magis in pituita & humore melancholico ponunt. Si mas sit, è brachio vel manu sanguinem detrahendum esse volunt; si verò femina, è pede. Inter Cathartica eligunt phlegmagoga & melanagoga, ex his autem præcipuè laudant mel rosarum solutivum, & Serapium de polypodio, confectio-nem Catholicam *Arnoldi* & Regis *Hamech*, quæ pro virum, habitus, ætatis & regionis modo plus minus committunt, & offerunt Serapiis præparantibus ad hæc ordinatis è cortice citri, & è succo fumarie cum aqua melissæ vel buglossæ. Post hæc viscera corroborant, in quem finem exhibent tanquam specificum genitæ flores saccharo conditas, sunt autem & qui decoctum lentieule cum melle dicant satis benè fecisse. Plurima verò pars polypodium prædicant, optimè juvare, quod humores crassos lentisque terget, digerit, siccant, bilem atram,

& pituitam vel crassam, vel lentam purgat etiam à juncturis, hinc & Sennam exoticam minoris non faciunt. In attemperandi facultate primum asserunt centaurium majus à divino *Chirone* primo quidem Chirurgia, at non secundo Pharmacia Magistro inventum. Magni quoque ab ipsis Roseolis existimatur Smilax, rubus nempe Indorum viticulosus. Ex quibus Medicamentis compositum unum & alterum parant, ex.

*Centaur. Zijj.  
polypod. Ziss.  
senn. ʒi.*

Coq. in lbvj. aquæ commun.

Colat, detur, quale potius genus per tres vel quatuor hebdomadas hauriendum esse dicunt. Vel sequentem exhibent Serapium, ex anguib. cervinis paratum,

*Anguem cervinum ætate media ac bene habito corpore in arcu lignicolâ, quæ fursures ac talem receperit, aliquandiu conclusum, capite & cauda podice tenus exsectis, excoriatum & exenteratum in multas partes concide, & coq. in aqua fontanâ, quanta suffecerit cum his simplicibus medicamentis.*

*Radici Centaurii majoris vulgo rhaipontici succosi in saleas præparati ʒiij.*

*Smilaxis asperæ comisarum ʒij.*

*Polypodii quercini ʒss.*

*buglossi.*

*endivii.*

*cichorei.*

*graminis.*

*asparagorum.*

*adiantoi.*

*asplen. aa. Mj.*

*rad. glycyrrhizæ ʒij.*

*eupatorii.*

*chamadrioi.*

*scabiosæ.*

*rad. pimpinellæ.*

*coronopi.*

*phyllidiot.*

*hepatice.*

*betonice.*

*melissæ aa. Mj.*

*plantaginis Mij.*

*bordei ʒij.*

*uværum excarinatarum ʒss.*

*sol. senn. or. ʒj.*

Ferveant omnia simul ordine competenti, & succi colatura cum saccharo albo condiantur modo & consistentia Syrupi, qui conelarescat ovi albumine despumato S. A. Dosis ab uncis ʒiij. ad unc. ʒvj.

Post hæc ad *Topica* transeunt, & ad pustulas has exsicandas varia commendant exsiccantia sine mortificatione tamen, ut sunt Silphii succus aqua solutus, aut cicuta trita & inspersa. Vel apium cum polenta tritum & illatum laudant, item

item brassicæ folia trita & inposita, vel alterci folia ex melle trita & applicata. Solanum per se, & cum cicuta viridi, aut olivæ foliis cum aqua coctis usurpant alii, & uvæ passas ademptis acinis tritas admiscunt, easque splenio illitas imponunt, adianthum quoque ex melle tritum adjiciunt. Alii addunt argenti spumam & sulphuris ignem non expertum, pari portione cum aceto applicitum; alii myrtum in lavorem redactam sordium illinitione cum oleo & vino æstiment. Alii herbam quoque sanguinaliæ, vel viride coriandrum præ aliis commendant, sic & juxta eodem ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine senigræci mista, sic ut his invicem rosa, atque intybi succus adjiciatur, donec mellis crassitudo fiat. Ex Junioribus Veterum sunt, qui commendant cataplasma ex hyosiani foliis contusis, cum melle mistis, atque ex brassica, apio, & hordei farina concorporatis, vel ex coriandro viridi cum cymis oleum coctis. Alii ad Roseolas fel porcinum aut bovinum adhibent, hordei farina, vel crassiore item aliqua materia, quæ consentiat, exceptum, interim ad 9. dies oblato plantaginis succo. Sed omnia medicamenta hæc superare ajunt Chirurgicum experimentum, quod est Scarificatio, tum ad ipsas Roseolas, tum ad tibiæ anterioriorem faciem, semel aut amplius phlebotomo facta, non alia fermentatione, quàm quæ à Prospero Alpino de Medicinâ Ægyptiorum de Scarificatione vulgata est, à Barbaris plerisque nationibus & Asiaticis exercita, quâ Scarificatione, experientia comprobata, in Roseolis his Saltantibus nullum excellentius ac præstantius esse scribit M. A. Severinus.

aceto eodem, macerata nocte & die admiscetur, & una teritur; postea cætera adjiciuntur, & sunt pastilli, quàm opus est, diluuntur aqua. Ad utrumque autem genus viti, mixticè medicamentum Andronicum facere dicunt.

Thymi curationem in ejus ablatione consistere ajunt, in quem finem commendant Pharmacæ consuetudina ac resuscitantia Thymos, quæ sunt ea quæ communiter curant etiam reliquas verrucas, ex gr.

℞. *Aluminis scissi,*  
*atramenti sutorisusti,*  
*glutinis aa. ʒj.*  
*Squama aris ʒvj.*

Trita glutine excipiunt, & cum aceto prædissoluto illinunt.

Vel:

℞. *Squama aris ʒj.*  
*Sandaracha ʒij.*  
*Antipigmenti ʒj.*  
*aluminis scissi ʒj.*

Terunt omnia & cum rosaceo, & ad strigmentitiam crassitudinem redacta largè illinunt, & rasuram linteoli imponunt, atque bis singulis diebus curant & acreto diluta illinunt. Pastillum Arete dictum magni æstiment, item elaterium. Ubi medicamenta frustra adhibentur, accedunt ad ferrum, & vellellâ radicis excindunt Thymos, & post sectionem, quàm magni fuerint, multi unctionem adhibent ad sanguinem sistendum & regenerationem in posterum prohibendam. Adhibita igitur unctione, curationem decernunt ad perustâ; primum videlicet ea, quæ crustas amovere possunt, applicant, deinde accedunt ad repurgatoria, postea resuscitoria. Crustas autem in talibus removere posse dicunt lac & mel per linamenta adhibita. Quod si scapello solum excisi fuerint Thymi, post excisionem siccum sanguinem sistens adhibent, & reliquum curationis ductum resuscitant.

§. 14. *Paracelsi in Roseolis Saltantibus mundativum æteris sequens commendat:*

℞. *Succi cichoreæ,*  
*Gamandra aa. lbj.*  
*Succi capillorum Veneris lbj.*  
*Manna ʒij.*  
*Liquoris vitrioli ʒj.*

*Paracelsi  
cura in  
Roseolis  
Saltanti-  
bus.*

Fiat Mixtura & destillatio per alembicum, usque ad oleitatem. Dosis à ʒj. usque ad tres.

Sequens quoque mucilaginosum remedium applicari vult:

℞. *Liquoris de mumia,*  
*de massico,*  
*de capbura aa. ʒb.*  
*Mucilag. de Fannegraco,*  
*de psyllio,*  
*de sionis aa. q. f.*

F. l. a. instar Cerati.

Vel:

℞. *Cerussa ʒx.*  
*aluminis scissi ʒib.*  
*Croci ʒj.*  
*Thuris ʒb.*  
*acacie ʒj.*  
*diphysii ʒb.*  
*opii ʒj.*

Ex aqua teritur, & quàm opus est, ex eadem dilutum perungitur.

Vel:

℞. *Galla,*  
*aluminis rotundæ.*  
*chalcididæ.*  
*creta sutoria aa. ʒij.*  
*myssi,*  
*cortis. malorum.*  
*acacie aa. ʒiij.*  
*calcis vivæ ʒxvj.*

Mali cortex in acetis sextario uno decoquitur, donec madida fiat, deinde teritur acacia

Vel:

- ℞. *Realgaris crystallin.* ʒij.  
*Olei ardentis* ʒij.  
*cerussa* ʒij.

M. f. Unguentum. Circumponatur Siro-  
 nibus Saltantibus.

Vel:

- ℞. *Olei lini* ℔ss.  
*aris viridis,*  
*cera ad quartam.*

F. Ceratum,  
 Cui superaddantur  
*Bdellii colari* ʒj.

Liga secundum artem.

*In Zona.* In Zonâ vel Zostere commendat præ aliis  
 Sperniolum.

- ℞. *Spermais ceti,*  
*ΥΑΡΑΤΙΜΟ,*

*Cheressoli,*  
*Juniperi aa.* ʒj.  
 Fiat de stillatio in Sole.

Vel:

- ℞. *Glininis aquatici* ʒij.

Destillentur in aquam, cui situs mineralium im-  
 ponatur, & bulliant simul per horam, aut do-  
 nec in formam pulvium reducantur, adde

*Caphura* ʒj.

Fiat Unguentum, quo cum ligetur crus terno  
 quoque die semel per tres septimanas continuan-  
 do. Postea sæpius ablucendo mundetur aqua  
 foliorum quercu, vel aqua salta.

*In Thymo.* Thymum verò curari asserit per corrosivum  
 dulce:

- ℞. *Olei laterini* ʒj.  
*de Juniper.* ʒss.  
*ex myrrha* ʒij.

Miscantur.

Vel:

- ℞. *Olei laterini* ʒj.  
*Aque aluminosa* ʒss.  
*viriditatis salis ad pondus omnium.*

Fiat Mixtura.

*Helmonti-  
 ana cura  
 in Roscolis  
 saltanti-  
 bus.*

*In Zona.*

§. 15. *Helmontius* in Roscolis Saltantibus  
 acidum peccans per saponaria & lixivialia cor-  
 rigit, sicque affectum hunc curat, omniaque quæ  
 laudat in strumis, hic convenire dicit.

*Zonam* verò seu *Zosterem* sanari ait aqua vi-  
 tæ, vel sanguine leporis, odore enim lintei le-  
 porino cruore uncti & siccæ applicati curari  
 contendit; sic quoque stercus humanum calide  
 applicari vult, quod unâ nocte sæpe omne aci-  
 dum extrahit & necat, ut vix amplius deinceps  
 redeat.

*In Thymo.* In *Thymo*, *Talpa* cruorem, item sanguinem  
 viperationis illinendum esse existimat.

§. 16. *VVillisius* ad Roscolarum Saltantium *WVillisi cu-  
 ram se accingens corpus statim expurgat, me-  
 dicamentaque sanguinem purificantia propinat.*  
 Deinde verò parti illinit unguentum ex flori-  
 bus Sulphuris, butyr. zinzib. pulv. paratum,  
 cum paucis præcipitat. rubr. vel unguent. *Egy-  
 ptiac.* admixto.

*In Zostere* mitia quædam Diaphoretica admi-  
 nistrat, partique inungit linimentum ex un-  
 guento ros. flor. Sulphur, & succ. citri compo-  
 situm, cui si libuerit addi potest Mercurius subli-  
 matus dulcis ad grana aliquot.

*Thymum* curare tenet Author ea propinando *Thy-  
 me,* medicamina, quæ liquori nutritio fluiditatem  
 conciliant, illumque dilcunt applicatione  
 gummi. ammoniaci, galbani, aut Emplast. de  
 meliloto.

§. 17. *Sylvius* in Roscolis Saltantibus com-  
 mendat ad sanguinem & acidum acre corri-  
 gendum decocta lignorum, item filia volatilia  
 ex animalium partibus parata. Externè lau-  
 dat sal volatile cupri tinctura inbutum, quo  
 quascunque pustulas scdæ & plane malignas  
 feliciter curare solet, vel abluit decocto  
 Guajaci & cæterorum Aromaticorum poten-  
 tium.

*In Zonâ* verò magnificat lactis cremorem cum  
 cretâ mixtum, vel aquam calcis vivæ, cum Mer-  
 curio dulci decoctam, appositam, item aquam  
 sambuci externè applicatam. Internè sudorifera  
 blanda propinat.

*In Thymi* curatione externè laudat Author *Thymi,*  
 gummi Bdellium, Galbaum, Ammoniacum,  
 nec non thus, myrrham, &c. Emplastri forma  
 applicata.

§. 18. *Cartesiani* ad corrigendas particulas  
 salas & acutas in Roscolis Saltantibus, medi-  
 camentis uti solent porosis & alcalicis, à qui-  
 bus priores facili Marte possint absorberi, &  
 fibrillæ cutis in Tibia disseutæ in statum pristi-  
 num reponi, ut sunt oculi s. mat. perlar. C.C.  
 f. Δ pp. sal. f. ni. Abstergeptibus quoque ama-  
 ris abluit, & iterum consolidant.

*In Zostere* sive *Zonâ* lympham in glandulis  
 contentam corruptam corrigit, particulas an-  
 gulares pungentes & rodentes abigendis inter-  
 nis itidem sudoriferis, & antimonio potissi-  
 mum & lignis paratis, quibus succus iste circa  
 Tibiæ cingulum attenuatur, & obstructio glan-  
 dularum cutanearum Tibiæ solvitur. Locum  
 affectum, ubi *Zonâ* cingimur, abluit vel aqua  
 Mercuriali vel decoctis lignorum, aut lixivio  
 ex cineribus quercus, vel sequens illinunt un-  
 guentum:

- ℞. *Ungu. ros.* ʒj.  
*sacch. f. ni.* ʒss.  
*ol. sambuc.* ʒij.  
*cinnab. nat.* ʒj.  
*Sui Diaph.* ʒj.  
*M. f. unguentum.*

Dum *Thymus* existit, resolutionem & dis-  
 cussionem duri crassique illius succi institunt,  
 adhibitis topicis gummosis, ex ammoniaco vi-  
 delicet paratis & galbano cocto, vel etiam pro  
 re nata ad sectionem accedunt.

§. 19. Nos in Curatione Roscolarum Sal-  
 tantium, tali ordine procedimur; internè metho-  
 dorum sudori-



curandi  
Rationes  
Saltantes.

sudorifera laudamus subtilia, poros cutaneos citò deobstruentia, lympham spissiotem resolventia & attenuantia, nec non particulas angulares acutas, sive sales acidos acres mitigantia, inter quæ palmam aliis præripiunt spirit. matric. camph. spiritus volat. oleos. eleuatium Dialcord. rob. sambuci, Cinnabar. Antimonii,  $\Theta$  volat. C.C. viperar. Pustulas aliquando aperire iubemus, & aqua theriacali cum Dialcordio permixta abluimus, tum unguento aureo, vel linimento, oleo hyperic. nostro, calce vivâ & Camphora sanamus.

Zonam.

In Zonâ vel Zostere curanda commendamus blandiora & lenia Diaphoretica ex decoctis rad. Chinæ, tantal. citr. Sarsaparill. rob. sambuc. Essent. Guai spirit. matric. &c. Externè verò commendamus varia mundificantia lavamenta, ex gr.

$\Psi$  Decoct.  $\Psi$   $\Psi$   $\Psi$ .  
extr. absynth.  $\Psi$   $\Psi$ .  
myrrh.  $\Psi$ .  
Camph.  $\Psi$ .

M.

Vel:

$\Psi$ . Ungu. rosar.  $\Psi$ .

$\Theta$   $\Psi$   $\Psi$ .

ocul.  $\Psi$   $\Psi$ .

flor.  $\Psi$ .  $\Psi$ .

$\Theta$   $\Psi$   $\Psi$ .

M.

Vel pulveres aspergendi sunt ex cerasâ, lap. calaminar. ocul. caucr.  $\Theta$   $\Psi$ . Cret. Cinnab. &c. Omniaque illa, quæ describi solent in affectu, Herpete dicto, cum tantùm loco differant hi affectus.

Thymi Curationem quòd attinet, cum ex-Thymum, sicandum esse vel medicamentis fortioribus, ut spiritui matricali cum sale  $\Psi$ ni, lap. calaminar. Cinnabar. vel aqua Mercuriali, vel balsamo nostro divino, quod hoc in casu generosum est remedium: vel conducet unguent. ex chalcit. pulv. sandarach. alum. ust. terr. Hassiac. succ. granat. cum melle appositus. Medicamentis nihil proficientibus, ad ferrum accendendum est, si anabrochismus institui nequit, vel unguentum Egyptiacum imponendum, donec decidat Thymus, vel ferro candente leviter & successivè eum tangere ac comburere soleamus.

## CAPUT V.

De Pedis Distorsione, Pernionibus, Clavo, Ungue hallucis sub carne se defodiens, Fætores pedum, ac Dolo in Palma ac Calce pedum.

### §. I.

Nunc, DEO T.O.M. duce pervenimus ad ultimum *Nostre encyclopædiæ Chirurgicæ Rationalis* Caput, & quidem ad pedes eorumque Calcem, quorum affectus etiam more solito tractabimus, ut nihil amplius nobis restet enodandum.

Prædis-  
tortio.

Pedis ergo Distorsio nobis est, quando ipse pes ex articulo suo elapsus, vel vi protrusus fuerit à causâ utplurimùm violenta vel interna, vel externa, vel in utero matris producta.

Descriptio  
Pernio-  
nim.

Pernio, aliis Chinclon, Germanis dicitur die *Frostbeulen*/der *Groß*/ à Veteribus, imprimis *Galeno*, describitur, quòd sit mortificatio partium imprimis pedum à nive facta. Alii definiunt Pernionem, quod nempe sit soluta continuatio aut Fissura, vel in detrimentum manuum & pedum hyberno tempore à summis algoribus, producta.

Nos verò Perniones describere soleamus, quod sint tumores inflammatorii, nunc cum, nunc sine exulceratione, à summo frigore in manuum & pedum utplurimùm extremitatibus aliusque oborti.

Clavi.

Clavi Germanis dicitur *Wesler-Hug*/ oder *Hüner-Hug*/ & quidem à formâ oculi galinaceus. Clavi etiam appellatur, quia instar clavi cuti infixus est, qui est verrucæ species, & non tam tuberculum, quàm callosa est substantia, ad periostia usque penetrans, præsertim ad digitos, & in plantis pedum ex calcei pressu & intertrigine accita interdum dolore sponte feriens, semper verò ingredientibus molesta, à succo crassiore stagnante coagulato

ac inspissato utplurimùm nerveo, & periostium pungente exortus.

Unguis hallucis sub carne se defodiens est nihil aliud, quàm quando Unguis se carni hallu-  
cis inserat, & continuum solvit, ob carnis mi-  
miam excrecentiam, & succi alibilis copiam  
proveniens.

Fætor pedum est ex ipsorum poris expirans Fætor po-  
doris teter & hircum olens, à miasmatis putridis dum  
obortus.

Præ reliquis partibus Pedes sæpius dolore affi-  
ci, arthritici haud interrogati testantur, adeo  
enim illis familiaris est hic dolor, ut & aliis no-  
men præripuisse videatur, nec enim facillè quis  
dolorem Pedum ad Arthriticum non pertinencem,  
sub nomine Podagræ delineatum reperiet, de quo  
dolore Podagræ nunc nobis sermo non est, sed de eo,  
qui vel in palmâ, vel in calce Pedum contingit,  
qualem sæpius in praxi nostra plurius annorum inter mille  
ægros obervavimus: talem dolorem calcis vehementissimum  
in ipsâ Pedum calce, applicatione Cauterii  
potentialis sanatum notavit *Günthelmus Fabricius Hildanus*, Cent. 3. *Obs. Chirurg.* 98. p. 182.  
Sic quoque *Jacobus Hollerius* recenset in *Comment.* ad aph. 93. f. 4. quidam plantam Pedis ita  
incausse, ut eidem comburi pars videretur.  
Quem dolorem & calorem in plantis Pedum  
Hæthici plerumque sentiunt experienturque.

§. 2. Subjectum lea Pars affecta Distortionis Pars affe-  
Pedis est Pescum suo articulo. Pernionum verò  
sunt partes extremæ & à corde remotiores, quæ  
plerumque aëris injuriis magis expolite minus

D d d d

que

que calidæ sunt, ut *Pedes*, manus, imprimis eorum digiti, aliquando etiam aures, apex nasi, labia Penis, cujus exemplum novimus &c. At non tantum harum partium cuticula, & quod substratum est reticulare corpus, inter cuius foraminula crebriora, microscopii ope conspicua sunt sudoris hæc vasculas patitur, sed & tota substantia fibrosa, præsertim quæ proprie Cutis nomen meretur, ex arteriarum, venarum nervosarum, ac tendinosarum fibrarum extremitatibus contexta, cum pyramidalibus papillis, ipsis nervis continuis. & cum sudoris vasculis ad Cuticulam exurgentibus afficitur, quam Cutem Celeberrimus Anatomicus *Dr. Behn* sub fasciculo fibroso ingeniose satis depingit.

**Diagnos.** §. 3. *Signis*, pro dignoscendis his affectibus Pedum, adeo multis opus non est, sunt enim per se satis noti, hi affectus, siveque deformitate cuius se intuitui de facili manifestant, imprimis *Distorsio Pedis*, quare pauca tantum hic addidisse sufficit.

**Velu Distorsionem.** Distorsio pedis incernit in sensus, cum pes vel extrâ vel intra distortus est, & malum sæpe est à nativitate, vel ab alia causâ violentâ externâ, tunc dolor est circa juncturam internus, & gressum impedit.

**Pernionum.** *Pernionum Signa Diagnostica* sunt partis affectus tumor inflammatorius, cum robore & dolore, aliquando pruriginoso aliquando dolorifico, non intenso tamen, aliquando Perniones exulcerantur, & sanies ichorosa effluit. Durante gelu & existente Cælo clariore, non adeo facile inflammantur, quam cum gelu miscere, ac cælum pluviosum vel nive repletum redditur.

**Clavi.** *Clavi* facili Marte cognoscuntur ex tuberculis duris profundius in digitis vel ad latus Pedis latentibus, & patent ex relatione ægri, imprimis si præcellerit fortis calcei nimis angusti pressio. Patet etiam clavus inde, quod centrum quoddam velut foramen habeat, formâ sit rotundâ, & instar clavi fixus.

**Unguis hallucis sub cute se defodiens.** Unguis hallucis sub carne se defodiens cuilibet alicui in conspectum se tradit, cum nempe hallucis Unguis cum dolore maximo, & sæpe inflammatione intensa, se carni protuberanti insinuet, tubulosque ac fibrillas dilaceret.

**Factor pedum.** *Factor pedum* facile nobis percipitur, qui sæpe adeo est pertinax, ut etiam adstantes eum tolerare nequeant: testantibus enim *A. H. Fagga. Volum. 3. Obs. 19.* Fœmina quædam adeo abominabilem spirat pedum factorem, ut nemo eam ferre possit, nisi eum bene odoratis fopiret. Affectus hic passissimè occurrit in iis qui pedes suos negligenter muniant linamentis ac focis.

**Planta ac calcis pedis dolor.** *Planta ac calcis pedis dolor* innoteceat ex relatione ægri. Hæctici ut plurimum de dolore urente plantarum Pedum conqueruntur: sic non ita pridem duobus Paralyticis Medicinam feci, qui maxime de dolore plantarum pedum conquesti sunt, ac præ dolore stare non poterant. Nunc quoque dum hæc scribimus, sub cura nostra versatur fœmina quædam sexagenaria, quæ talem vehementem dolorem in plantis pedum habuit, ut ab initio per totos pedes discurrere coacta fuerit, dein dolor adeo urens factus fuit, ut vix pedes amplius præ dolore plantarum movere valuerit.

§. 4. *Ætiologiam* pedum affectuum nunc instituturi, aliorum opinionem, more solito, nostræ præmittimus. Agmen autem ducunt *Galenus*, pedis *Distorsionis* causam adscribentes vitiozæ in Utero formationi, vel convulsioni, vel catarrho, articuli ligamenta relaxanti: ut plurimum verò dicunt *Distorsionem* hanc fieri vel à causâ violenta, lapsu, ictu, vel pedem distorquendo, vel quorumvis modo ex articulo suo removendo.

**Pernionum** causa juxta ipsos est frigus, quod dolorem excitat, & partem adstringendo debilitat, unde causa antecedens est singuis, qui illuc fluit, & dum in parte continetur, ob prohibitam à frigore condensante distensionem, putrescit, partemque inflammat prius, dein exulcerat.

**Clavum** Veteres dicunt tumorem rotundum, *Clavi*, album, clavi capiti assimilem, circa omnes corporis partes consistentem, maxime tamen in plantis ac digitis pedum; quem oriri statuitur ab humore pituitoso & melancholico, mediante pressu calcei, attritu, intertrigine, labore, &c.

**Hallucis Unguis sub carne se defodiens** causam dicunt esse ipsam Unguem se in carnem nimis prope Unguem exuberantem defodiens, & continuum solvendum.

**Calcem dolore affici** ajunt ab unitatem solventibus, vel fluxione acriori ad plantas & calcem factâ.

§. 5. *Paracelsus Distorsionem pedis* contingere statuit vel ab ortu, vel à motu quodam violento per ictum, lapsum aut ingressum præcipitante factum, à quibus omnibus facile pedem ex articulo suo elabi posse, contendit.

**Pernionum seu membrorum congelationum** causam esse gelu inquit, à quo membrum aliquod prorsus videlicet fit, ab eoque vita separatur, ut, ubi Tibia congelatur, vita moritur in ea, separarique necessus est à vivo. quod mortuum existit, à superiore parte genu videlicet. Ita congelatio priusquam emoriatur membrum, ejus est vehemens in dormitio, postquam à vitâ suâ decidit. Et non aliâs ac ignis membrum aliquod superat ac vincit, frigus ipsum etiam efficit. Item prout aqua fervens etiam ignis ingenti frigore congelatur ac exstinguitur, non secus & naturalis calor, quem arripitur ab illo. Exstinguitur itaque primo calor, & postmodum gelu vincitur. Nam, cum membrum suo calore privatum est, ei nunquam restitui potest. Cum hoc incipit congelari, calor à carne primo recedit, ob lux humiditatis congelationem, postmodum à nervis, & postremo quidem à medullis ossium. Quapropter evenire solet, ut caro frustatim decidat, alia non corrupta, quod istam naturâ vehementer defenderit. Quandoque medullæ emeriuntur, unde postmodum nulla sanitas vera succedere potest.

**Clavum Paracelsus Porrum** dicit, quem pro- venire ait ex avio liquore, qui nutrimentum esso debet Unguini. Ubi Porrum, non longe distant Ungues, itaque radices eorum in exercitiam transeunt, quæ porros efficit.

Quod **Unguis hallucis sub carne se fodiat**, *Unguis hallucis sub cute se defodiens*, accidere ait ex eodem liquore nutritio Unguini in nimia copiâ ad Ungues delato, & dein carnis exercitiam nimia.

*Factor*

*Factoris pedum.* Factorem pedum ex calida natura, & pravis fuliginosis effluviis acionibus à pedibus exhalantibus provenire arguit.

*Planta ac calis dolore.* Planta ac calis dolorem à Mercurio exoriri docet.

*Helmontii sententia de causa pedis Distorsionis.* §. 6. Helmontius Distorsionis pedum ortum eundem agnoscit, quem reliqui Auctores, nimirum dislocationem ex articulo suo, ipse enim Auctor emittit villam, obambulabat cum insigni appetitu, tum fortuito distorsit pedem, lapsus est, rigor statim obvenit cum nausæa, vomitu & suffocato edendi priore appetitu, mox verò distortum pedem, ac semi-dislocatum reposuit, atque eodem instanti redditus ipsi est pristinus appetitus, cessataque est nausæa. Juxta ipsum, officium stomachi erat apertum, tam in appetitu quàm nausæa. Pylorum verò clausum habuit in appetitu, & mox in nausæa apertum, tamen appetitu quàm nausæa.

*Pernionum.* Pernionum causam esse frigus statuit Auctor, frigus enim, juxta ipsum, tollit sensum tactus congelando & abigendo vires iniorsum. Perniones Ulceribus forantur, tanquam si igne ambusti: qui tamen sæpe ante vel post hyemem obveniunt iis, qui tota hyeme in hypocauftis nullum sensere frigus.

*Clavi.* Clavum verò dicit esse à latice coagulato & aberrante.

*Unguis hallucis.* Unguis hallucis sub carne se defodientis causam deducit ab excrecentia sanguinis in Halluce oborta.

*Factoris doloris calis pedum.* Factor pedum esse à putredine vel fermento frascido & plantis pedum producto, ut & dolor plantarum ac calis pedum à spina quâdam infixa illi dicitur.

*Willisii judicium de causa pedis Distorsionis.* §. 7. Willisius Pedis Distorsionem contingere judicat tum à causis externis tum ab internis. Ad externas refert calidum, ictum, aut præposteram pedis positionem, quæ omnia efficiunt, ut ligamenta malleoli-istius, in quem tota causæ vis prorumpit, validius extendantur, ossaque sibi appensa in proprio situ amplius continere nequeant. Eundem quoque affectum exurgere opinatur à convulsis alterius malleoli ligamentis, quæ partem oppositam vehementius ad se attrahentia, ejus ligamenta fortius extendunt, illiusque ossa à naturali situ educunt, & hæc altera ex causis internis, quam sequitur laxitas ligamentorum alterius ex malleoli, quam exoriri ait vel à spiritibus in iis deficientibus, vel ob obstructionem tum fibrarum ligamentorum, tum succulorum nervorum in illis dilaminatorum, aut tandem obredundantem in istis humiditatem.

*Pernionum.* Pernionum originem adscribit succo nervoso in partibus nervis à frigore coagulato ac remoranti, & in iis acescenti. Hinc avolatis spiritibus, massa reliqua stagnare incipit, induitque indolem corrosivam, ac pungit radique, licque inducit Perniones.

*Clavi.* Clavum produci existimat à coærcervatis sub cute, atque aggestis recrementis feri particulis, per poros evaporari solitis, earumque arcta intersticia tum opplentibus, denitatemque ipsarum ac duriciem adaugentibus.

*Unguis hallucis sub carne se defodientis.* Unguis ex Willisio sub carne se defodit, quando vi quâdam latus ejus in carnem suppositam retrahitur, illiusque continuum solvit, &

fibras dilacerat ac discindit, ampliore tum spatio sub ungue existente, canales illius succo nutritio perpetui irrorati, & à nullo corpore ambiente compressi, magis ab ipso dilatantur, ac verius interiora extenduntur, quo fit, ut Unguis profundius adhuc in carne defigatur.

Calcem dolore infestari asserit à succo nervoso acidiorè & viscidiorè, in partium nervearum calcem subingentium fibris remorante, easque pungente & irritante; vel à seco recrementicio aciore per poros evaporando, sed ob eosdem obstructos retento, fibrarumque dictarum partium spermaticarum fibris infixo, & eas vellicante ac convellente.

§. 8. Sylvius Distorsionis pedum originem eandem existere concedit, quam Antecessores jam manifestarunt.

Perniones verò ortum suum debere arguit Acido, quoniam proligantur felicissimè alcalibus, ut sunt cineres, quibus calidis fovendis pedes monet, certum enim esse dicit, cineres acidum imbibendo esse frugiferos: Acida, inquit Hornius, aciditate exuntur per cineres, calces corporum, &c. probatque Auctor per hæc, cum Perniones hyeme oboriantur, tum temporis acidum augeti, viresque acquirere majores, ut latius serpat, tempore aestatis à contra aërem alcalibus volatilibus scateat, id quod abundè satis in oratione sua demonstrat Polybustor noster Sylvius, quæ itidem docet, ubi eruditè diversi tigonis causas, earumque originem incaleat. Particulæ ergo acidæ ab aëre frigido se partibus infinuantes, earum fibras vellicando, inque iis dilacerationem & dolorem & per consequens Perniones inducunt.

Clavum, juxta ipsum, oritur à forti calcei compressione, hinc materia in istis canalibus inclusa fortiter comprimitur, quæ tandem in talem abuturiciem Clavum constitueniem.

Unguis sub carne se defodientis causam esse unguis sub dicit excrecentiam carnis nimiam à sanguine carno se nimis laudabili inductam, & cum Unguis credefodientis, scat, tunc necessarii se in carnem hanc infinuare ac fibras dilacerare debet, unde dolor oritur intensus.

Dolor verò calis oboritur vel à continui solutione, vel ab acrimonia partes nervæ plantæ vel calis vellicante & dolorem inducendum.

§. 9. Cartesiani Pedis Distorsionem sæpius contingere norunt ab incessu infelici, aut violento lapsu, concussionem, ligamentorum laxatione, & aliquando, quamvis rarissimè, ex la musculorum ac Pedum debilitate, ob spirituum animalium parciorem influxum, quo fit, ut musculorum fibræ non sufficienter tendantur, sed flaccæcentes ad levem quancunque causam articulum pedis ex pristino suo loco excedere permittant.

Perniones dicunt à frigore produci, quia illud aniam dat, quod succi in cute tardius circumlentur, adeo ut plus affluxus quàm trausitus ipsis concedatur, propterea partes affectæ, inprimis pedes, intumescere solent. Quando incalescunt, & coagulatae ac rigida factæ particulæ à materiâ subtili plus quàm antea, durante ic frigore, moventur, tunc prorsum valde Perniones. Dum

D d d d 2 verò

verò succi liberum non obtinent transitum, juxta ipsos, particulæ rigidæ coagulati & inspillati succi instar mulcatum inter se commoventur, hinc Incalescentiam & ardorem deducunt, & quoniam ejusmodi commoti commotio fieri nequit absque aliquali quamvis blandiori attractu subtilium canalium ac fibrarum, hinc necessarîo pruritus exoriri debet.

Si verò motus succorum planè cessat in parte aliqua, partem illam mori necessarium esse dicunt, quæ mortificatio observatur primò in superficie cutis, quæ tunc facilè à verâ cute separatur. Si verò frigus fortius admittitur, vera etiam emoritur cutis, & sic Perniones generari contendunt.

Clavus oritur, juxta eos, à succo quodam lymphatico vel nervo inspillato. Dolor verò calcis oritur à particulis pungentibus.

*Causa Distorsionis ex Nostro opinione.*

§. 10. Nostri sententiâ *Causa* Pedis Distorsionis oritur à causa violenta externa, quando scilicet articulus à sua cavitate violentè in intendendo moveatur, item sæpè malum est à natiuitate, imprimis à lapsu matris, cœu plura novimus exempla.

*Pernionum.*

Causam quod concernit *Pernionum*, ex Oeconomia animalî notum, & sæpius à nobis inculcatum est, omnes corporis nostri humores in statu incolumi tubulos partium solidarum, omnisque generis vasa tum majora tum minora, torrentis instar & celeritèr perfluere, quod si eorundem fluiditas imminuat, aut celeritèr ac continuus motus, à quacunque id tandem fiat causa, retardetur ac sufflaminetur, pertinaces hinc oriri obstructiones, ipsosque succos in offam crassam degenerare, uti id in gelatinâ C. C. calido & fluido, dein aëri exposito cernere licet, ut viscositati huic & plurimum affectuum natales merito in acceptis ferantur, utpote à quorum sinu, tanquam ex equo Trojano, prodeunt agmina morborum, variaeque calamitates à tergo sequuntur, ut nulla ferè pars corporis nostri sit, quæ non pœnam prævaricationis hujus luere cogatur. Prælabitis his fontibus, *Pernionum* causam proximam & immediatam facilè eruere possumus, quam existimamus esse obstructionem inflammatoriam, dum fluidi & agiles humores ab externo frigore in motu suo præpediuntur, atque ab æbeuntibus particulis volatilibus, inordinata quædam & confusa reliquarum intra tubulos & extremitates vasculorum introducit mixtura, quæ inepta est ad circulandum, fibras circumjacentes premit, ipsisque spiritibus animalibus obicem ponit, ut pristino more influere nesciant. Quod etiam fieri potest, quando ipsa vasa à frigore quasi coarctantur, corrugantur ac constriunguntur, unde & transitus humoribus denegatur, hinc semper fornicationis sensus tumor, aliaque apparent phænomena, humorum stagnationem & spirituum inertiam haud obscure indicantia.

Tempore enim frigoris deficit in aëre materia subtilis, quæ non sufficiens est ad succos fluidos conservandos, hinc necessario succi stagnare coguntur, sed non in totum stagnant, sed quoad partem. Quod enim cutis vel potius ipsius vasa constriungantur, apparet ex eorum curatione, cum ol. Terebinth. in malo hoc quasi remedium specificum obstructiones resolvit, fibrillas demulcet, redditque

flexiles. De obstructione ergo vasorum nullum restat amplius dubium, quæ tamen duobus modis fieri solet; vel enim tubuli partis alicujus solidæ in totum obstruuntur, ut nec sanguini nec reliquis circulantibus succis, imò ipsis spiritibus animalibus ingressus & egressus concedatur, quæ pars necessarîo emori & Gangrænâ vel Sphacelo corripitur debet; aut tubuli in tantum obstruuntur, ut aliqualis succus concedatur ingressus, isque faciliôr quàm egressus, unde cum plus inferatur, quàm egredi possit, tumores varii oriuntur. Quod si eoque augeatur obstructio, ut salia poros partis alicujus membranose in tantum obstruant, ut exiguus saltem juxta se relinquant intervalla, soli materia primi elementi pervia oritur *obstructio inflammatoria*, h. e. tunc ignis ibidem excitatur, dum rigidæ hæ partes perniciosissimo hujus elementi nullibi inclusi motu agitatæ fibrillas divellunt & dilacerant, quæ in cincinnos resiliunt, vicinos tubulos antè adhuc patulos comprimunt, unde brevi fit inflammatorius tumor, in abscessum tandem, aut etiam Gangrænam, nisi citius occurratur, abiens.

Munc videmus Perniones circa mensem Februarii & Martii exasperari: cum tunc temporis influxus materie subtilis major est, & per consequens succi abundant, & cum vasa hæ nimis contracta sint, ea permeare nequeunt, hinc stagnare coguntur, & aliis à tergo venientibus viam seu transitum denegant. Et cum inflammationis hujus varii dentur gradus, fortè non errabimus, Perniones Inflammationem appellare, & adea referre, eadem enim hæc apparent, phænomena, qualia in partibus inflammatis conspiciuntur, v. g. dolor, tumor, rubedo, calor &c.

Causa ergo mediata proxima est frigus, cuius essentia consistit in quieto, & hoc quidem per se & solitarie nullam inducit corruptionem, sed per accedens ipsam destruit partis alicujus texturam, dum succorum transitum sistendo, mixturam eorandem turbat, quæ nim volatiles & agiles valde sunt, avolant, hinc reliqui acriores facti, eò potentius hæc ludunt dramata.

Clavum progigni existimamus à fibris, à duro Clavo, quodam premente ac constringente corpore vel dilaceratis, vel artius pressis sibi invicem adjunctis ac superimpositis, & à coarctationis sub ipsis atque aggestis recrementis feri particulis, per poros evaporari solitis earumque arcta interstitia tunc opplentibus, densitateque ipsarum ac duritiem adaugentibus.

Unguis se defodit, quando vi quædam in car-nalibus nem suppositam detrudit illiusque continuum solvit, & fibras ejus dilacerat ac discindit. Am-  
*Sub cute se defodit*  
pliores tunc tubuli existentes succo nutritio-nis irrorati faciunt & carnem excrecentem, in quam tunc facilis se insinuat.

*Dolor calcis & palme* oritur ab acribus salinis succis, fibrillas calcis vehementer commovent. *calcis & palma.*

§. 11. Antequam autem ipsam aggrediamur *Prognosis* curationem, necesse est, ut pro extinctione *pedis* Dis-  
*Medici conservanda, Prognosis* introducta-  
mus, quo eventum & modum eventus scire liceat.

*Pedis Distorsio* inveterata, vel in Utero ma-  
tens

terno facta, vix curatur, nisi statim collimetur, ut idoneis ligamentis ad convenientem situm sensum dedicatur, quod sæpius factum fuisse in tenellulis infantibus, sæpe observavimus. Ubi verò Distorsio pedis fuerit facta ex violenta luxatione pedis in junctura tibiæ cum talo, tunc sæpe res periculi plena est, inde enim motus spasmodicus, extremorum totiusque corporis refrigeratio, insolita anxietates, deliria, & sæpe mors sequi solent, ceu id constat exemplo *Eph. Germ. Decur. Ann. 6. Obs. 67.* Imò ipsam mortem à temerariè tentata luxati talis repositione notavit *Nicol. Tulpus lib. 4. Obs. anatom. cap. 47.* Acritur, si ullibi, in hoc scilicet articulo circumspeditione opus esse scribens, Hippocraticisq; testimoniis periculum hujus mali confirmans, occultum enim esse nequit, quàm late se turbatio regiminis animalis extendat, quamque interdum graviter nervoli generis affectiones luere vitæ cardines cogantur.

*Perniones* non exulcerati meliores sunt quàm exulcerati. Perniones non exulcerati nullum habent periculum, molestiam tamen maximam creant ægris.

Nisi statim ab initio radix mali exstirpetur, postea Perniones difficillimè sanantur, ceu nos novimus exemplum in Principe quodam, quamvis optima & egregia usurpata fuerint remedia, tamen ulque recurrunt. Notum enim est, particulas acres paxillorum instar fibrarum poris infixas esse, & acutis suis extremitatibus scindendo continuitatem earum dissolvere, quæ inde choridarum instar in cincinnos resistentes, acres has particulas acutissimè complectuntur, in quorum interstitiis tamdiu pæen: consopite, donec à certâ materia subtili commoveantur.

Hinc jam liquet ratio, cur hyeme potius prurit, dolor, & rubedo sentiat quam æstate. Matera enim subtilissima non semper una eademque versus hæc inferiora spargitur, sed pro diversitate locorum annique temporum nunc parcius nunc copiosius dispensatur, & nunc alia atque alia ad nos accedit, prout scellus vel propius vel longius à Sole aliisque sideribus distat.

Clavi sunt affectus faciles curatu, modò non altas egerint radices, tunc enim sæpe Chirurgum spe sua frustrant, hinc etiam, præsertim si incautè excindantur, periculum maximum oboriri potest, ceu in Nobili novimus exemplum, qui inde in spasmodum, convulsionem ac deliria incidit, quæ symptomata excepti mors atrox.

Affectus hic non vilipendendus est, sed sæpe atrociora inferit symptomata, sic Chirurgus quidam Norimbergensis Unguem hallucis sub carne se defodientem forcipe violentur nimis extraxit, à quo Patiens singulis diebus aliquid Convulsivipassus, quod duravit usque ad ipsius mortem, quæ inter unius anni spatium tubecuta est. Sicque Præses Cameræ *Zedlitz* præcidit sibi Ungues pedum, fecitque incisionem nimis profundam, accedit Gangræna & moritur. Digitum læsum molliter haud traxit, sed potius irascens contra terram tutudat. Vide de his *Eph. Germ. Ann. 3. Obs. 320.* ob fibrarum nervolis ac tendinosas faciliè quis damnum eximie accipere potest.

*Dolores calcis & palma Pedum* inferunt sæpe *Calcidius* Hecticam, & sunt aliquando intolerabiles, & letis. sæpe diu durant, adhibitis tamen congruis remediis faciliè curari possunt, ceu nos aliquot exempla novimus.

§. 12. His in affectibus Pedum etiam ad ea quæ vel ore assumentur, vel externè ipsis accipiunt respiciendum est, ut sanguis ac succi vividiores, hoc est, fluidiores serventur, ut licet melius ad diffusa hæc loca fluere, & calorem ipsis participare queant, ne affectus accerlantur, vel jam præsentem magis advegantur. Ante omnia ergo frigus, quantum possibile, arcendum est, ob frigus enim aëris afficitur sanguis cum reliquis succis in vasis valde exiguis, ac succi in tubulis suis subsistere coguntur, ac progreßu temporis acorem quendam contrahunt, unde tumor inflammatorius, rubor ac dolor. Cibi etiam sint fluidiores ac laudabiles, succo scilicet lacteo volatili gaudentes, vitentur verò crassi, terrestres, acidi, salini & saccharati. Potus sit potus Theæ vel Caffæ, singulis vel alternis diebus assumtus, vel vinum dulce Gallicum, vel Hispanicum. Acida verò vina angue pejus fugiantur. Motus, vigiliæ, animi pathemata sint juxta leges Medicorum.

§. 13. Post *Diatam* ad ipsam properamus *Pharmaciam & Chirurgiam*, ut eò melius hoc fieri possit, aliorum quoque Medicinæ Antistitum consilia de curatione Pedum Affectuum selicet instituendâ percipiemus. Omnium verò primò *Galenicorum* (copus in *pedis Distorsionis* curatione eò collinat, ut primo statim tempore id, quod exciderat, repoluerint, & quò facilius hoc obtinerent, partem affectam prius relaxant fortibus ex decocto malvæ, parietar. alth. sem. sænigræc. & illinitionibus, hinc extendunt pedem, quò spatium sit liberum, dein pannum cerato liquidò ad oleo rosaceo madidum imponunt. Tandem pede satis confirmato vinculum resolvunt, articulum pedis foventes, & Medicamento quodam emolliente illinentes.

*Perniones Veteres* curant pediluvio facto ex decocto raparum, alii pedum in gelidam immersione curantur, non secus ac ova congelata à congelatione aquâ frigida liberantur. Alii ex iis accipiunt mel & sal aut sulphur, isque commixtis manè & vespèri fricant. Nonnulli illorum accipiunt sebum suillum, & cum succo limonium ad unguenti consistentiam agitant, membrumque ad hyemis initium eo illinunt: vel etiam liquefacto iervo cervino in aqua vitæ illinunt manus pedesque, quod si magna adsit inflammatio hyociani succum apponunt, vel decoctum cyclaminis applicat. Tandem: Vel marina tepida vel beæ, aut lenticulæ, aut ervi, aut radicis asphodeli decocto perfundunt Perniones. Post perfusionem lenticulam vino incoctam tritam illinunt, aut siens ex oleo lavigatas imponunt, aut alumen & sariam partibus portionibus in vino coctum adhibent. Myrtæ quoque trientem, aluminis liquidi sextantem, aceti q. s. præparant, & Pernionibus non ulceratis, ac pruriginosis fervidis eruptionibus imponunt. Vel tequens:

Ddd dd 3

p. Succ

*Pernio-*  
*num.*

*Clavi.*

*Hallucin*  
*sub cere*  
*se distor-*  
*sionem.*

*In Pernio-*  
*nibus.*



℞. Succo nova acerba ℔j.  
thuris ʒiij.  
cera ʒij.

Coq. simul ad succi scindem consumptionem,  
deinde in mortario subigunt, & utuntur. Se-  
quens valde dicunt infuse ad reliquas quo-  
que inflammationes commodum.

℞. Cerasse.  
spuma argenti  
aluminis liquidi aa. ℔j.  
myrrh.  
thuris aa. ʒij.  
ovorum assatorum vitell. n. xvj.  
adipis suilli veteris ℔j.

Acida cum aceto terunt, in quo malicorium decoctum est, & ubi strigmentitiam compagem habuerint, adipem adijciunt, ac simul probe subigunt & in plumbeo vase servant: nisi verò postulante, rosaceo aut myrteo oleo diluunt, ac illinunt. Ex alio cum oleo & cera emplastrum parant imponuntque, vel amurcam illinunt. Sequens perniones imminentes parere dicunt:

℞. Atramenti sutorii,  
flos malipunicis sativi aa. ʒß.  
aluminis scissi ʒiij.  
myrrha.  
thuris aa. ʒij.  
cera ʒß.  
adipis suilli ʒj.  
olei Myrti q. l.

Vel:

℞. aluminis rotundi ʒß.  
calcis viva ʒij.  
cera ʒj.  
rosacei aut myrti olei ʒij.  
M.

Ad Perniones ulceratos recipiunt olei omphacini, taurini adipis, succi hyosciami aa. ℔j. spumæ argenti fescuncem, Colophoniz trientem, mellis fescuncem, vel foveantur decocto corticum granatorum, cum aqua & vino facto, cui quoque addunt aliquid aluminis, vel excavant rapam, & implent unguento rosaceo, coquant sub cineribus, & contusum, addito pulvere Cancrorum fluviatilis, applicant. Ad idem imponunt cutem hæcicis infusam, vel talpæ pellem: sequens Unguentum dicunt esse probatissimum:

℞. Cimular. tristici sub nive virescentis q. f.  
Contunde in mortario, dein add.  
Ungu. rosacei vel  
pingued. suille q. l.

Bulliant ad ignem, fiat Unguentum. Cerebrum cornicis Emplastri modo applicatum Perniones infallibiliter curare astringit.

In Clavo. Clavum vix absque curâ recedere ajunt, hinc duplicem instituit curam, vel Instrumentis vel Medicamentis. Balneum pedum ex herbis emollientibus paratum per aliquot dies usurpandum conueniant, dein laminatim cultello, quod fieri potest, circa hæmorrhagiam ex-

scindunt, & per ostium folia sempervivi, viridi pelliculâ exuta, bis de die applicant, renouantque. Vel apponunt picem Burgundicam. Vel sequens.

℞. Resin. pini  
colophon. aa. ʒß.

M. bene ad ignem, & dum omnia fuerint liquefacta, pertrahæ linteola, & fac sparadrapum viridem.

Alii herbam nigellæ cum aceto tritam applicant, vel lupinos exustos cum melle mixtos superponunt. Incisionem non volunt fieri prope nervos, in unctione per caustica etiam cavendam esse inflammationem per rotundum & perforatum defensivum. Ad clavos quoque præmundatos unam aliquam ex corrodentibus compositionibus imponunt, aut æruginem rasam, aut sandaracham, aut fistulis dicatum pulvillum siccum, aut fistulare collyrium; gummi vice ammoniaco exceptum lupinorum crudorum ustorum cinerem cum melle mysi pice liquidâ exceptum, melanchium cum pueri impuberis urinâ, fabæ lomentum cum aceto coctum applicant. Sequens pro experto exclamant.

℞. Cantharidum,  
atramenti sutorii,  
caustici aa. ʒij.

Excipiantur terebinthinâ ad emplastri formam, & clavo præmundato imponunt.

Vel:

℞. Facis vini uste  
calcis viva,  
visci aa. ʒj.

cum lixivio aut urinâ pueri impuberis. Misc. atque applicant.

Ad Unguem in carnem se insinuantem vel cul- In Hallucio  
tello Unguem à carne separant, & dein excre- vngue.  
scientem carnem imposito alumine usto vel gallâ cum melle subsidere faciunt, & varia anodyna & emollientia imponunt, vel in forma Cataplasmatis, vel linimenti, vel olei chamomill. lini, sesami, amygd. &c.

Dolorem vero in Calcis & Palmâ Pedum uren- In Calcis  
tem tollunt internis anodynis, & externis tùm dolores.  
linimentis tùm Balneis, tum fotibus, in quem casum sequens commendat linimentum.

℞. Ungu. populi,  
rûfrig. Galen. aa. ʒj.

M.

quo Unguento illinunt Calcem & Plantas pedum, quod & somnum promovet. Vel Balneum, quod sequitur, laudant.

℞. fol. salicis Mj.  
malv.  
bismalv.  
fl. chamomill.  
nymphæ aa. Mj.  
rad. alib. ʒj.  
sem. lini ʒß.  
fanigræ. ʒß.  
bacc. juniper. ʒiij.

Dcn.

Dentur iocif. pro Balneo, in quo pedes mane & vespere immergantur.

Paracelsi  
cura in pe-  
du Distor-  
sione.

§. 14. Paracelsus Pedis Distorsionem per re-  
stitutionem pedis articuli luxati curari posse as-  
serit, & quo facilius curatio impetretur, partes  
emollit balsamo ex axungis parato, ne verò  
pes restitutus denuò elabatur, ligamenta obfir-  
mat emplastro suo oppodeltoch, quod etiam  
apponit, si ligamenta vel articulus pedis ab alià  
causà fuerit luxatus.

In Pernio-  
bus.

Cura membrorum congelatorum ipsius est, ut  
unius Mumie per additionem conservetur al-  
tera, nempe debilitata hunc in modum, qui  
sequitur.

℞. olei casti lbß.  
sevi hircin. ʒiij.  
cera ʒvß.  
• M.

Fiat Unguentum, quod singulis quaternis  
horis applicandum est, aut sæpius, quo locus  
melius humiditate suam retinere valeat.

℞. Olei ex laganis avium ʒv.  
adipis cervi ʒiijß.  
cera  
liquorum ex ovibz aa. ʒiij.

Misc. simul & utere.

Hujusmodi Medicamentum ab initio curæ suf-  
ficiens esse dicit in finem usque, nec opus  
aliò, quod in eo mumia constituta sit, qua  
quidem frigoris congelationem curari asserit.  
Membrorum congelationes duplicia damna se-  
cutum adferre scribit, ut Paroxysmos & tumefac-  
tiones. Paroxysmi juxta ipsum, successu tem-  
poris nascuntur magis aucti; verùm tumores  
in putrefactionem incidunt. Sequens Medi-  
camentum certò certius expertum esse notat;  
Oleum nempe urina, quod in proprio sale  
suo conservatur, congelationibus in aqua natis  
& similibus omnem Paroxysmum aufert. Quod  
inflationes concernit, sequens experimentum  
pro certissimo venditat. Urina perungantur  
aut laventur optimè membra congelata, post-  
modum fodicationum emplastris ligentur, aut  
conservari poterunt, præsertim ubi mox ab in-  
itio remedium hoc fiat. Si tamen caro morti-  
ficata sit, post illa, fodicationum emplastris,  
aut similibus aliis vulnerariis Medicamentis  
mundificat. Animadvertendum quoque vult,  
ubi gelu tenderet ad interiora cor versus, ut  
Patientibus theriacam & aquam ardentem in  
potum, ambas comitis Medicus administret,  
ut calor in membro congelato restitueretur. Qui-  
quid oleo prædicto fuerit unctum, ante morti-  
ficationem, juxta ipsum, absque damno restitui  
potest in integrum.

In Clavo  
& Porro.

Curationem Clavi sive Porri quod attinet: ab  
incisionibus & corrosivis aquis abstinere, sequens  
verò maxime commendat.

℞. Olei ex bac. Juniperi  
befonna  
agaric. aa. ʒj.

Fellis bovis q. l. pro unguento: unge dica  
& noctes, quò magis triveris eò melius effi-  
ciantur nigri sicanturque. Post hæc commen-  
dar suum Empl. oppodeltoch ad quatuor vel  
quinque septimanas.

Vel:

℞. Realgaris ʒj.  
ol. vitell. ovor. ʒß.  
calcis exstincta q. l.  
pro linimento.

Hoc porros reddit nigros ac putridos.

Unguem sub carne se defodientem curare sata-  
git emollientibus.

Ad Factorem pedum abigendum verò adhibet  
varia Arcana sudorifera, & chelidonium suadet  
calceis imponendum.

Planta ac Calcis pedum dolorem placat dolo-  
rem placantibus soporiferis Medicamentis.

§. 15. Helmontius Distortum ac semidilocu-  
tum pedem restituendum vult in locum pristi-  
num, prout in se ipso comprobavit.

In Pernionum Cura cum aliis Authoribus  
consentit, & nihil peculiare propinat, con-  
glaciatis non vult statim à frigore ad hypo-  
causta deferri.

Clavorum curationem fieri ait per sui mor-  
tificationem extinctionemque totalem tactu  
& impressione Medici agentis & mortificantis  
sympathetici & magnetici, ut lumen lunare  
frigidum in cono collectum unitumque per vi-  
trum cos supernatans, donec à frigore pene-  
trentur, suaviter, adeoque sic in radice morri-  
ficentur, ut deinceps sua sponte evanescant:  
idque Lunà decrecente, quia tùm defectus  
Lunæ crescenti aulescant. Eundem effectum  
præstare dicit cadaveris humani manum im-  
pressionem forti applicatam. Vel sudor agona-  
lis immorientium imponatur, vel pomi trans-  
cissi pulpa interna affricetur Clavis, donec  
putrescant.

Unguis hallucis sub carne se defodientis, item  
factoris pedum ac doloris curationem eandem in-  
stituendam vult, ac reliqui Authores faciunt.

§. 16. Villius Distorsio pedis ligamenta  
corroborat decocto ex herb. betonica, cha-  
mom. cor. marin. summitat. hyperici, rad.  
symph. aristoloch. rot. & sem. 4 calid. maj. in nu.  
aqua & vino rubro coctis, parato, & deinceps  
Unguentum Comitula ipsi illinendo,  
idoneisque fasciis illum constringendo. Si ve-  
rò à convulsione ortum duxerit affectus, anti-  
spasmodica propinat, & externa nervina &  
antispasmodica applicat.

In Pernionibus petroleum illitum commen-  
dat, tum ad curam, tum ad præcautionem,  
quem effectum etiam edere ait oleum pini:  
decoctum quoque ex rapis exlicatis mirè lau-  
dat, ut & unguentum de rapis Myrsiciti. Ap-  
plicat etiam cum linteis multiplicatis paribus  
Ddd dd 4 Pernio-

Pernionibus afflictiis mucilag. sem. cydon. cum aq. solan. extract. cui parum tutiae admiscet.

*Cavi.* Clavum tollit applicatione emplastri de galbano Mynsichti, vel emplastri Vigonis de ranis cum Mercurio.

*Unguis sub carne se defodiens.* medetur parum liniei concepti cui momentum aluminis usli inspersum fuerit, in illud spatium, quod unguis excavavit, immittendo, ad carnem excrecentem exedendam, ut Unguis profundius delapsus forficibus tuto secari possit. & ad pristinum statum recrecentibus deinceps carnisbus reduci valeat.

*Calciu dolor.* Dolorem Calcis Author curat per interna Diaphoretica anodynis admixta. Partem verò dolorificam illinit sapone Veneto V dissoluto, cum spiritu cerasorum nigrorum & liliorum convall. misto. Galbaneti Paracelsi V dissoluti usum quoque laudat.

*Sylviu moro Pedis Disforsonu.* §. 17. Sylvius Disforsonem Pedis curat, articulum elapsum reponendo in locum & situm pristinum. quod manibus potissimum perthetur, deinde retinendo & corroborando illud ipsum, ne denuò excidat, quiete videlicet, abstinencia ab ingreſſu, pulvinis & fasciis, nec non emplastris subastringentibus ex mastiche, olibano, colophonis, resina & oleo myrtin. vel emplastro communi ad fracturas etiam hoc in casu appropriato.

*Pernionum.* In Pernionibus Sylviu, ut praeserventur partes illae extremæ aliis faciliè obnoxiae illi injuriæ, vult, ut prius penè muniantur antequam frigido committantur, manus Chirothecis ex animalium pellibus confusus defendantur, pedes verò, si tibialia & foci linei spiritu vini humedentur: vel juxta ipsum possunt foveri decocto ex herbis aromaticis aëali volatili abundantibus. Spiritus vini tum temporis liberaliori quoque manu intra corpus assumatur, ut ita spiritus aucti liberius per totum corpus ferantur, humoribusque majorem concilient motum, quo minus coagulentur, externum horem aut planè non admittant, aut accedentem promptius ejiciant, aut saltem magis resistant, ne proflus inter necioni dentur.

Quando verò jam partes malo illo obfesse sunt, operam dat ut non statim ad calida & ignem accedant ægri, sed prius nive vel aqua frigida fricent: his peractis fovere jubet pedes cineribus calidis quibuscvis, quo omni extracto frigore, quod cognoscitur ex dolore pungente sedato, foveat partes decocto aliquo, in quo plantæ aromaticæ sunt coctæ, aut lacte dulci tepido incocto iisdem plantis. Alcalibus quoque admiscet lenientia pinguis, quæ poros non nimium occludunt, sed simul discutiunt, ut mel &c. ne inflammationem suppressis effluviis augeat. Medicamenta quoque interna disiccutia aromatica & sudorifera non negligenda vult, ut illa, quæ in roto corporis habitus sunt collecta ex frigido expellantur: commendat ergo varias mixturas hinc inde præscriptas, item decocta lignorum & salia volatilia ex animalium partibus parata, hinc inde jam recensita. Si affectus degeneraverit in Ulcus, curat Author inter alia imposito Un-

guento diapompholygos, in quo præter alia alcalia est plumbum, quod insignem habet vim infringendi acidum, coque nomine est proficuum eius usus in Cancro, ut olim percepimus ex ore Authoris.

In Clavo tollendo commendat varia gum-Clavi. mata, imprimis de galbano, ammoniac. de Labdano, quæ imposita ut plurimum eum tollere perhibet.

Ubi unguis se sub carne defodiat, operam dat, unguis sub ut cultro vel instrumento separetur a carne, & carne se deinceps lenientia imponantur ac mitigantia.

Dolorem vero calcis fugat, internè sudorifera, salia volatilia anodynis mixta portigendo, partem verò illinit sapone Veneto, vel in forma linimenti vel emplastri, vel solum instituit, vel balneum ex emollientibus paratum.

§. 8. Cariesiani, quod attinet Pedis Disforsonem, si sit à leviori causâ, faciliè illam re-  
stitui posse contendunt, & quidem manu experti Chirurgi.

In Pernionum Cura eò resciunt, ut ab initio peragatur frigidis, satius enim esse putant, quam si partes admoveantur calidis, rationem, quæ peragitur illa curatio à frigidis. vide apud Caries. quod curatio, quæ per calida instituitur, in pejus ruat, putant inde fieri, quod acidi figuræ ab igne immutentur, & curvantur, sicque arctius implicentur sibi invicem, quo minus easdem vias relegere queant, per quas intrarunt: adde quod ignis particula illis acidis junctæ abeat in novum acerrimum, quod conspirat in partium interitum, uti apparet ex pomis congelatis, quæ si immittuntur rei calidæ, sunt intus nigra, & sapor perit, aliis illæsa quoad illa phenomena, si solvantur frigidis. Conglaciatum virum liqueſcere dicunt sine jacturâ virium, si vas in aqua frigida suspendatur, sin verò calore ignis solvatur, vires amittit. Medici Cariesiani venæsectionem & scarificationes hoc in morbo continent. Si Perniones non fuerint exulcerati applicant crepitum lupi, qui partes calvas & omne areet trigus externum. Optimum remedium dicunt esse, ut pedes Pernionibus afflicti prox me igni admoveantur, donec frigus expulsum fuerit, item Perniones ex Terebinthina præis illinant, vel imponuntur succo raparum tepesfacto. Vel decoctum flor. Chamomilæ. ablynthii, addita portione salis communis parare solent, coque foveat pedes.

Vel:

4. Terebinth. 3j.  
oli armen. 3℔.  
camp. 3j.

Coq. in consistent. emplastri.

Refinam quoque pini laudant, item Balsamum de Voorden. Magnificiunt quoque rapas & capas assatas Pernionibus impositas. Exulceratos tractant instillaliorum Ulcerum.

In Clavis eadem prodesse dicunt, quæ capite de verrucis commendantur, imponunt quotidie folia hederæ arboræ. Vel succum hederæ terr. chelidon. vel gummi. Ammoniacum, vel resinam pini, vel emplastrum Grauz Dei, vel

vel galbanum, vel Emplastrum viride, succum cithymalli, diachylon, cum gumm. de Ranis cum quadruplo Mercurii imponunt, item pedes Clavis affectos muræ sapis immergunt, & tanquam balneo utuntur. Vel saponem communem Pernionibus alligant. Alii ex ipsis linteam sanguine mentruo tinctum clavo impositum magni æstimant.

*In Ungue* *Unguis ex Cartesianorum sententiâ se desodit sub carne*, à liquore nutritio in Unguim tubulos copiosius affluente, eosque supra modum inflante, sed quum tubuli ad Unguim latera constituti liberius extendi possint, abundantior succum nutritium excipiunt, à quo ultra requisitos fines excrecentes, subiectam carnem lubeant, & in eâ se desodiunt.

*In dolore* *Calcem & Plantam Pedum dolore affici* æntur à succi nervei aliorumque particulis rigidis acutis, scindentibus ac pungentibus, quibus scæter sanguis hæcticorum, scorbuticorumque, quæ particulæ vel in sanguine, vel sero, vel succo nerveo, vel nutritio hospitantes, & ad calcem & plantam Pedum delatæ partes fibrosas, partes has subequentes pungunt ac irritant, doloremque hunc ardentem inferunt.

*Nota en-* *§. 19. Visus sic Aliorum Cirrationibus Pedum*  
*ra in Pedu* *Affectuum, ipsam tandem nostra sententiâ inni-*  
*Dispositio.* *xam aggredimur. In Pedu Dispositione curam*  
maturandam esse monemus, ne cavitas repleatur viscidis humoribus, tum enim difficilior restituitur. Restitutum verò malleolum idoneis fasciis, imposito cerato de cumino & V camphorato madefacto, & adhuc linteo eodem spiritu imbuto superimposito curare solemus. Ultimò ~ lubricorum, bals. lîchiat. vel topico nostro sapis partem ad corroborandos spiritus animales & tubulos obstruendos aperendos illini curamus. Si malum à convulsione originem duxerit, antispasmodicis & nervinis tum internis tum externis uti solemus. Si vero sit à nativitate, difficultius tum curatur, idoneis verò fasciis ac calcis in hunchinem adaptatis sapis pedem ab ortu distortum feliciter curatum vidimus.

*In Perni-* *Pernionum Curam quod concernit statim*  
*nibus.* notandum est, an malum recens sit, an altas jam egerit radices. Quippe in recentibus Pernionibus ipsis frigidis curam rectius auspicamur, quia frigoris lues frigore pellenda est, calor enim subitaneus plus damni infert, diu subito obstructionem solvit, & partes contractas exagitat, quæ plus spatii occupantes, ipsam texturam destrunt, quod quotidie experimur circa rapas & poma congelata, quæ igni statim adnotata redduntur mollia instar pulvis, & postea corrumpuntur ac putrescunt, quod & pulchre ostendit Cl. Dn. Robault in *Physicâ suâ*, in floribus congelatis. Imò si digiti fuerint à frigore quasi rigidi facti, & si tum igni propius admoveantur, sensum percipies, ac si mille aciculis pungeris, quod incommodum non senties, si prius cum aqua frigida vel ipsa nive fricentur membra congelata. Methodus hæc pluribus Paradoxum esse videbitur, cum in succorum stagnationibus frigida maxime noceant; sed si sit hæc examinetur, & quidem rationis trutina pensentur, facile te extricabo.

bis. Cura enim Pernionum frigidis his quidem inchoatur, sed non perficitur, & quod frigida primò applicentur, ratio hæc est, quod congelatæ partes sensum resolvi, & postea ad priorem mixturam redigi debeant, quod præstat lenis frictio cum nive, vel aqua frigida immersio, in qua adhuc amica fluit subtilissima materia, & quæ sine aliqua magna vi congelatis liquoribus aut succis fluiditatem suam ordinariam reddere potest, sine ulla latione allicujus fibræ ad pristinum redeunt statum. Idem enim corpus nostrum experitur fatum, quod pomis congelatis accidere solet, quæ aqua calidæ injecta statim corrumpuntur, igne majori cum impetu in ea irridente, ut in putrilagine, ceu jam diximus, abeant. Vulgus quidem causam hujus rei querit, nescio in qua frigoris extractione, qualem verò nos haud admittimus, sed rectius sit id ob materiam subtilem succis nostris magis amicam, vel quod poma congelata in majori constituta quiete, quam aqua frigida, hinc quandam suæ quietis gradum communicent. Ex his abunde constat, quod æger Pernionibus vexatus è longinquo igni tantum apponendus sit, aut leni primam frictione cum nive frigus demulceatur, & sensim levique agitatione articulari vellicentur, ut instituta frictione sanguis queat revocari, & sopitæ partes citius reviviscant. Sic etiam nix, teste experientia, nostris in manibus soluta amicabilem succis nostris communicat calorem: item per frictionem & agitationem fibrillæ & particulæ sopitæ resuscitantur, & hinc motus succorum promovetur. Sed hæc curam in Pernionibus, ceu diximus, non absolvunt, nec ægrum à malo penitus liberant, sed ad potentiora deobstruentia transeundum est, qualia sunt V camph. Elix. vitæ, ~ Matricul. Terebinth. Juniperi, Philosph. terebinth. ~ lumbricorum, fuligine, eborei fornicarum ~ ❊ ❊ cum bals. lîchiatico mixtus elegans remedium est, Balsamus quoque nervinus extern. ac intern. noster, Tinct. Castor. Tinct. Balsamica De kerri, aff. sætid. ol. Lullian. Cl. Dn. *Widenfelsii*, quod mihi per literas maxime commendavit, ol. Guajac. ol. balsam. Peruvian. Camphor. ~ sinapi, convuls. noster, liq. C.C. succ. ❊ ❊ & sexcenta salia volatilia ex herbis, radicibus, & baccis aromaticis parata. Forum etiam externe magnificimus: esto in Juniorum gratiam atque altera formula.

❊ *Summ. rarissimæ.*  
*herb. salu.*  
*serdii*  
*absynth.*  
*fol. Nicotian. 22. Miß.*  
*Rad. bryon.*  
*galang.*  
*trifol. fibr. 22. 3ß.*  
*sem. anis.*  
*cumin. 22. 3j.*  
*ernica*  
*urtic. 22. 3j.*  
*pip. 3ß.*  
*❊ ❊*  
*Q 22. 3ß.*  
*Cog. in vino Gallico, adde*  
*~ vini 3vj.*

pro pauperibus verò in solâ ☐ coqui possunt, & hinc balneo immergantur vel manus vel pedes Pernionibus affecti.

O. Terebinthinæ tempore pruritûs ad ignem sæpe illitum egregium in Pernionibus est remedium. Crocus cum V membris frigore læsis applicatus à pluribus magni penditur. Sic quoque alii cum Veteribus extollunt decoctum rapum, vel atidum, vel frigore congelatum, alii rapas coctas calidè Pernionibus applicant. Plures sebum cervinum, hircinum, caprinum & vaccinum laudant, quæ in eadum glaciæ liquida infundunt & dein applicant; vel nostrâ experientia sâpo Batavorum niger dict. vitell. ov. aa. P. xij. conquass. invicem, contrio illinatur & Pernionibus applicetur, ab initio vesiculæ excitantur, quæ aperientiæ sunt. Nonnulli ex recentioribus salivam propriam Pernionibus illinant, & dein pedes igni admovent.

Vel:

℞. farin. frumenti, silic. gross. modo parat. (geschroben) subigatur aqua frigida, & applicetur repide ter vel quater de die, & dein inungantur Perniones sequenti linimento.

℞. Picis Martialis. vel aq. Martialis. f. c. cera alb. q. s. linimentum.

Pinguedo anseris, quia subtilis est, præservare creditur contra frigus externum, si membra frigori exposita eo inungantur. Oleum Camphoræ verum ex Indiâ allatum nostrâ experientia egregii usus est. Mutatio quoque aeris multum ad curationem facit, ex gr. Si quis in Italia vel Germania Perniones accepit, & dein ad Indos proficiscitur, vix aliquid incommodi sentiet, seu prostant exempla nonnulla. Optimum verò remedium est ad recidivam arcentiam procul à frigore. Plures sterces ovillum cum butyro recenti frixum & colatum magni pendunt. Cataplasma alii ex pomis putridis confectum applicant. Alii sustinus laudant ex cinnabarinis, & balsamicis resinosis, præstat vapor ex accenso V progrediens, quod si dolor valdè urgeat, conveniunt Paregorica cum anodynis alch. malv. fl. chamom. sambuc. sem. lini, &c. sequens experientia & ratione approbatur.

℞. ~ vini Zij. vel V aqu. Hungar. Zij. R croci Zij.

M.

Illinantur Perniones.

Sic quoque Cineres Juniperi acidum aeris frigidi valde mortificant, si pedes iis calidis fuerint impositi. Sic quoque o° succini pluribus solamen præstat, aliis adeps ex pedibus vitulinis vel hædin. in V decoct. & refrigerat. qua Perniones inungunt. Sunt qui pro Præservatione Pernionum soles vel soccis ex pelle pedum cervi paratis uti solent, quia in hac pelle pori contractissimi sunt, ærem frigidum ac crassum vix permittentes. Terra solista Qui more Tacheniano parata in Pernionibus à pluribus magni æstimantur, ejus præparationem

vide in Apolog. contra Tachen. Zuercher, p. m. 72. Terra hæc liquida externè illinatur Pernionibus, Petroleum, axungia cati silv. oleum Pivi, Unguent. contra Perniones Schraderi, Barbet, ex rapis Mysicht. T. mei: à Guldenkle, & hujus Cataplasma ex farina avenacea à pluribus magni penduntur. Sequenti in Serenissimo quodam Principe cum commodo usus sum.

℞. ~ vini Camphorat. matricar. crocat. aa. Zij. lumbricor. Zij. ☉ xci cum V parat. Zij.

M. pro illinatione.

Vel:

℞. Calc. viv. cum V salu. fiat liniment. add.

ol. hypericon. n. Zij. spica. Juniperi aa. 3℞.

M.

Ubi nodi & tumores inflammatorii adsunt, & dulcis cum axungia Taxi misceatur, quo calidè nodi inflammatorii perungantur, & desuper Emplastr. de Ranis cum Sio Vigonis, vel cum quaduplo Sii imponatur, vel empl. de Labdino, vel nostrum de Thèa tantè in abigendis tumoribus efficaciz. Pro divitibus nihil excellentius est quàm lixivium cum Thèa paratum, in quo infundantur pedes Pernionibus obiecti ac inflammati. Qui linimenta potius amant sequens non erit contemnendus.

℞. Medull. cerv. bovum rec. extr. 3℞. axung. Taxi Zij. viperar. Zij. bals. Jni Zij. ol. Camphor. 3℞.

M.

Vel sequens nostrum polychrestum.

℞. Ol. oliv. opt. lb℞. butyr. rec. 3vj. ras. pini 3ij. medull. vitul. & bovin. 3iv. cera 3i℞. solv. l. a. super Δ add. ☉ Jni 3i. ol. petra. q. s.

M.

Quo calidè Perniones illinantur sapius: Si quis verò majorem effectum ex emplastro expectat, sequens proderit.

℞. Picis resine aa. lb℞. ol. bani 3i℞. axung. bovis ovin. aa. 3iij. ol. lini olivar. aa. lb℞. cera 3vj. sub ignem add. Cinnab. nat. 3℞. Camphor. 3ij. Mui 3i. M. f. Cæstum.

Vel



Vel Empl. saponis ad ʒij. malaxetur eum oleo ʒ  
fœtid, succin. aa. ʒß. M.

Sequens fuit Celeberrimi Faustii, Professoris  
Heidelbergensis remedium.

℞. Ol. resina  
pini aa. ʒj.

M.

Forces quoque Cerevisiæ, vel muria Harangum  
imposita à pluribus laudantur.

Vel:

℞. pingued. vulpis  
lupi aa. ʒß.

M.

Vel:

℞. Ol. laurin. ʒij.  
mell. ʒß.  
terebinth. ʒij.

M.

Singulare experimentum dicitur cerebellum,  
ex capite cervi vel lupi desumtum & Pernioni-  
bus appositum, alii extollunt sequens:

℞. cera flav.  
pic. alb.  
ol. olivæ.  
lini aa. ʒiv.  
sev. cervin.  
vervecin. aa. ʒij.

Thuris alb.

Mimi.

Eni offic. aa. ʒiß.

M.

Omnia ea Medicamenta, quæ multum salis vo-  
latis oleosi in se continent, hic proficua sunt,  
quæ acidum in sanguine ac succis stagnantibus  
corrugunt, sic etiam sperma ceti supra ignem su-  
sum, & calidè inunctum Pernionibus egregium,  
& à Celeberrimo D. Mayr approbatum reme-  
dium.

*Exulceratis Pernionibus* imponatur Balsamus  
noster Divinus, quò nullum datur generosius,  
vel Terebinth. vel Empl. de creta, vel diachyl.  
f. Ungu. Cancrinum; curantur enim instar alio-  
rum Ulcerum, ex quorum capite reliqua pos-  
sunt peti remedia, cineres quoque stercoris ovili  
li inspergantur Pernionibus exulceratis. Cate-  
rum toto curationis tempore frigus externum,  
quantum possibile, arcendum est, in quo totius  
curationis cardo vertitur, hinc pellis leporina  
vel cervina, vel charta emporctica cum V ma-  
defacta, vel vesica bubula cum Terebinthina il-  
lita, vel charta quadruplicata pedibus Pernioni-  
bus vexatis applicata magni penduntur, quia  
frigus arcent. Nos ad præcavendum malum cu-  
curbitulas atque sanguifugas partibus affectis  
applicatas tanquam noxias rejiciamus, quoniam  
hoc modo obstructions vasculorum non tollun-  
tur, sed potius augentur, & vascula distorta ad  
pristinum suum statum haud revertuntur, sed  
magis distorquentur.

In *Pernionibus* nec interna cura negligenda  
venit, hinc Celeberr. *Louversius*, Medicus An-  
glus solis internis Martialibus exhibitis Pernio-  
nes curare promittit. Nostra etiam ex sententiâ  
interponenda sunt varia volatilia, imprimis ole-  
ia, quæ succos stagnantes fluidiores reddunt,  
ut ad impellendum & fores obferatas aperi-  
endas incitant, omnemque stagnationem im-  
pediant, hinc sudorifera omnia conveniunt, &  
commendamus seq.

℞. ̄volat. oleos. n.  
Elux. visa aa. ʒj.  
vin. calid. ʒij.

M. pro unâ vice & sudor expelletur, &  
inde magnum resulabit commodum. Vel ̄  
volat. C. C. ad ʒj. in mensa more solito assu-  
matur.

Cur verò ægri hoc affectu infecti semper hy-  
berno tempore, & quidem vel in principio, vel  
in fine hyemis iterum recidivum patiuntur, ra-  
tio hæc est, quoniam vasa à frigore semel con-  
stricta ac angustiora facta tempore æstivo succis  
quidem transitum concedunt, hyberno verò  
tempore accedente succi nostri aliquantum cras-  
siores redduntur, tunc ipsis canales sunt nimis  
constricti & permeare nequeunt, sed succi sta-  
gnare coguntur, eundem sic affectum producere  
debent. Tempore enim hyberno non influit tan-  
ta copia materiæ subtilis, ut in æstate, in qua  
tuosæ, oleosæ, & aqueæ particulæ in succis  
nostris per continuum transfluxum materiæ sub-  
tilis expanduntur, & sic obstructionem vasorum  
ab externo aëre minitantem impedit. Hinc re-  
media sæpius etiam optima effectum non præ-  
stent, quamvis Celeberr. *Baribolus*. Ad. Haffn.  
Vol. 3. Obs. 10. infallibile dicat remedium adver-  
sus manuum Perniones, cruorem adhuc calen-  
tem ex bove recens mactato effusum, si eidem  
manus vel pedes imponantur, quod remedi-  
um sæpius tentavi, ast frustraneo effectû. Hinc vide-  
mus remedia etiam generosa nobis visa sæpius  
fallere Medicos & ægros, quod quilibet in praxi  
sua experietur.

*Curam Clavorum nostram* quod concernit,  
felicissime eos curavius solo illito ʒo lini vel  
rutæ, tepide facti, prius tamen clavo profundius  
inciso, quod arcanum nobis hætenus fuit, vel  
imponi potest linteo oleo lini imbutum, quod  
teratò fallat. Podex recens galli junioris, in eis  
prius clavo, impositus plurimum magnum attulit  
commodum.

Vel:

℞. Gummi. Galban. ʒij.  
̄ ̄ci ʒij.  
resin. ʒij.  
picis ʒij.

M. f. l. a. Empl.

In Clavis sequens aqua calcis nostra egregia est,  
ut in omnibus fungosis aliis excrecentiis.

℞. Calc. non exstincta. lbij.  
Acet. vin. lbjß.  
̄ commun. lbj.

M. f. calx exstincta, colat. add.  
̄ dulc. ʒij.

M.

Emplastrum de ranis cum quadruplo ʒij valde  
Clavos emollit discutitque. Sunt qui Empl. dia-  
chyl. simpl. cum sale smi columbini magnifici-  
unt Empl. de Thea, de Labdano etiam hic præ-  
stant commodum. Solum sæpè gummi galbani  
impositum juvat. Alii ad corticosa accedunt, ad  
lapidem sc. infernale vel ʒo ʒni, ol. vitrioli,  
butyrum ʒni, quibus tamen cautè mercandum  
esse existimamus, ne fibrillæ nervæ non tantum  
ab his irritentur, sed & plane discindantur, hinc  
omnia hæc cum arsenicalibus improbamus; sunt  
qui cum effectu sulph. citrin. in forma pulveris  
Clavis incilis imponunt munito prius loco gum-  
mi ammoniaco vel instrumento plumbeo, &  
delu-

desuper bis vel ter accendunt, & dein Clavum cum radice eximunt.

*In Ungue  
sub carne  
se desodien-*

*Ungui sub carne se desodienti* medetur sequenti modo, si caro probe unguem nimis propullulat, imponimus parum aluminis usti vel Empl. ex Labdan. vel spir. matricar. dein cultello ad hunc finem excogitato, unguem parum abscindimus, & dein impositis variis balsamicis curam absolvimus. Sæpè inflammatio accedit, quæ abigenda est phlegmate & si egregio remedio internè & externè usurpato in Inflammatione.

*In Pedu  
Calciu do-*

*Dolor Calcis ac Palma Pedum ardens*, si fuerit ab Hæctica, eâ curatâ facile cessat, aliàs & interna æque ac externa postulat remedia hic dolor: imprimis commendamus Diaphoretica cum anodynis mixta, & egregia R. nostra opii volatilis, quæ paratur ex spir. C. C. volat. & opio, quæ ad guttas 20. & 30. usque exhiberi potest, imprimis circa vespertam: notandum enim est junioribus Practicis, quod semper eò reflectant, ut opata semper vespertinis horis suis ægris in quocunque exhibeant morbo. Inter externa hic magnificimus saponem, vel Emplastrum saponis, vel oleum saponis, calci ac plantæ pedum illitum. Sequens nostrum Emplastrum Anodynum, ut in omnibus externis doloribus, sic etiam in hoc magnum afferet commodum:

- ℞. *Minis*  
cerusse,  
sapon. Ven. aa. 3vj.  
ol. olivar. 3ib.  
axung. porc. 3ib.

Coq. ad consistent. Emplastri, add.  
opii 3iv. spir. vini solut.  
Empl. diapalm. 3i.

M.

Vel:

- ℞. *Empl. diapalm.* 3ij.  
sperm. ceti 3ib.

*Campbor.* 3ij.

*croci* 3j.

M. f. Empl.

Vel:

- ℞. *∇ vel decoct.* Ψ  
spir. fl. sambuc. 3ib.

M. calidè imponatur linteis.

Quæ imposita ægrum non deferent: item balnea, fotus, linimenta varia in hunc finem institui possunt.

In *Fætere Pedum* ab Indis maximè laudantur *In Pedum* folia *Pinan* cum *Serbean*, aut *Arrié* foliis cum *sa:ora*. calce paratis, calceis imposita, fætozem arcant, uti in ore masticata omnem gravolentem arcant anhelitum: nihil verò hoc in casu magis juvat quàm mundities, quando scilicet pedes semper novis muniantur loccis cæruleis; alumen usti. & lythargyr. calceis indita juvant. In Tumore pedum ædematoso seq. optimum est remedium:

- ℞. *Flor. Chamomill;* Mij.  
*flor. sambuci, serpill.* aa. Mj.  
*bacci juniper. lauri, ebul.* aa. Mss.

Coq. in f. q. aq. & excipiaturn fumus ad pedes.

Nunc ad finem hujus Operis tandem pervenimus. Faxit Deus Tet-Optimus Maximus, ut quemadmodum hæc omnia suscepimus & absolvimus, (certè inter maxima æquè Aulæ ac Præcos negotia, ) animo candido, in veritatem proclivi, & in publicum mortalium Bonum fervente; ita succedant eadem in Divini Nominis gloriam, juniorum Medicorum informationem, consummatorum verò Præcos confirmationem, ac Ægrorum quovis tempore obvenientium solatium & restitutionem.

## FINIS TOTIUS OPERIS.



## I N D E X

Rerum in Encyclopædiâ hâc Chirurgicâ Rationali contentarum,  
& notatu dignissimarum, omnium locupletissimus,

In quo

Numerus paginarum, litera *a* sectionem ejus priorem,  
b verò posteriorem designat.

## A.

- A**bdominis morbi externi 317. *a* musculi quot sint 379. *a*.
- Abrotanum conducit in Alopecia, Area & Ophi-  
asi 14. *b*.
- Absecessus perinaei 371. *a*. causa Galenicorum,  
Paracelsi & Helmontii 372. *a*. VVillisii &  
Sylvii 372. *b*. Cartesiorum 373. *a*. Auto-  
ris 374. *a*. Prognosis 374. *b*. cura Galenicorum  
375. *a*. Paracelsi, Helmontii & VVillisii  
376. *a*. Sylvii 376. *b*. Cartes. 377. *a*. Auto-  
ris 377. *b*.
- Absecessus vel Apoclema 478. *b*. Pars affecta 479.  
*a*. Species 479. *b*. Diagnolisis 480. *a*. causa Ga-  
lenicorum & Paracelsi 481. *a*. Helmontii  
481. *b*. VVillisii 482. *a*. Sylvii 482. *b*. Carte-  
siorum 483. *a*. Autoris 483. *b*. Prognosis  
487. *b*. cura Galen. 488. *b*. Paracelsi 489. *b*.  
Helmontii 490. *a*. VVillisii 490. *b*. Sylvii  
491. *a*. Cartes. 493. *a*. Autoris 496. *a*.
- Abstinthium conducit in Alopecia, Area & Ophi-  
asi 14. *b*. in hydrocephalo 7. *a*.
- Abstinentia multi morbi curantur 473. *b*.
- Abstergentia phlogosis ab acido volatili in pri-  
mis viis latente sanant 193. *b*. in Odontalgia  
profunt 216. *a*. in gingivis erosio & exulcera-  
tis 225. *b*. in Serophulis, & Strumis 258. *b*.
- Acetosa, & acetosella ad scorbutum maxime  
laudantur 193. *b*.
- Acetum pinguedinem minuit 474. *a*. ad canitiem  
disponit 13. *a*.
- Achor tinea species est 8. *a*.
- Acida dentibus nocent 211. *b*. etiam in Hydro-  
cephalo 7. *a*. eorum figura 61. *b*. acidorum  
austerorum figura 64. *a*. expurgari nequeunt  
650. *a*. 653. *a*.
- Acidulae laudantur in tumore labiorum 181. *b*.
- Acidum maximus est, coagulator omnium hu-  
morum 134. *b*.
- Acria nocent in sternutatione 148. *a*. topica in  
oculorum affectibus periculosa 83. *b*.
- Acrochordones est species verrucarum 599. *b*. Pro-  
gnosis 602. *b*. 604. *a*.
- Adertruch** 386. *b*.
- Adiantum conducit in Alopecia, Area & Ophi-  
asi 14. *b*.
- Adstringentia validiora Anginae nocent 248. *b*.  
fugienda in combustione 682. *b*.
- Aegylops quid? 66. *a*. causa veterum 66. *a*. Pa-  
racelsi, VVillisii, & Sylvii 66. *b*. Cartesiano-  
rum, & Autoris 67. *a*. cura Galenicorum 67.  
*b*. Paracelsi 68. *a*. Helmontii 68. *b*. VVillisii,  
& Sylvii 69. *a*. Cartesiorum 69. *b*. Autoris  
70. *a*.
- Aër acidus humores coagulando uvulae &  
tonsillarum inflammationem, & laxationem  
creat 233. *a*. aquilonius cur ophthalmia se-  
rax 74. *b*. austrius oculis est insensibilis, &  
temperatus predest 76. *a*. autumnalis & ver-  
nus cur Anginae facile suscitetur 241. *b*. frigi-  
dus maximus coagulator lactis 302. *a*.
- Aërginis spiritus sternutationem sanat 157. *a*.
- Aether merus est ignis 485. *a*. producit in-  
flammationem 39. *b*. 74. *b*.
- Agrimonia in Hydrocephalo confert 7. *a*.
- Albedo pilorum puerorum 12. *b*.
- Albediamen, seu tubedo faciei 185. *a*.
- Albugo cornea quid? 85. *a*. causa veterum  
85. *b*. Paracelsi 86. *a*. Helmontii, & VVillisii  
86. *b*. Sylvii 87. *a*. Cartes. & Autoris  
87. *b*. Prognosis 88. *b*. cura Pharmaceutica  
Galenicorum 89. *b*. Paracelsi 90. *b*. Helmon-  
tii 91. *a*. VVillisii 91. *b*. Sylvii 92. *a*. Carte-  
siorum 93. *a*. Autoris 93. *b*.
- Album oculi, seu tunica adnata 72. *a*.
- Alcalia quomodo agant contra acida 61. *a*. suc-  
corum corruptionem impediunt 61. *b*.
- Alcola seu tumor labii 174. *a*.
- Alimenta insipida & crassiora potentius nutriunt  
& corpulentiam augmentant 473. *a*.
- Alopecia quid? Pars affecta 9. *a*. causa Galeni-  
corum 9. *b*. Paracelsi 10. *a*. Helmontii 10. *b*.  
Sylvii 11. *a*. Cartes. 11. *b*. Autoris 12. *a*. Pro-  
gnosis 13. *b*. cura Dietetica 14. *a*. Pharma-  
ceutica Galen. 14. *a*. Helmontii 16. *b*. VVillisii  
17. *a*. Sylvii 17. *b*. Cartes. 18. *a*. Autoris  
20. *a*.
- Alopecia quare à vulpe nomen habeat 8. *a*. à luo  
venerea scorbuto & febris malignis oritur  
12. *a*.
- Alphus quid? 556. *a*. Pars affecta 557. *a*. causa  
Galenicorum 559. *a*. Helm. 560. *a*. VVillisii  
560. *b*. Sylvii 561. *a*. Cartesiorum 565. *a*.  
Autoris 565. *a*. Prognosis 565. *b*. cura Pa-  
racelsi 569. *a*. Helmontii, & VVillisii 569. *b*.  
Sylvii 570. *a*. Cartesiorum 571. *a*. Autoris  
575. *b*.
- Altarnac 54. *b*.
- Alumen est anima oculi 82. *b*.
- Amara sunt generosa remedia, in scrophulis me-  
dicanda

- dendis 258. *b.* pellunt & enecant vermes 739. *b.*
- Anaurosis, vide Gutta serena 103. *a.*
- Ambustio seu Combustio, & Pars affecta 671. *b.* Differentia & Diagnofis 672. *a.* causa Galeni & Paracelli 672. *b.* Helmontii, & VVillifii 673. *a.* Sylvii, & Cartefianorum 673. *b.* Autoris 674. *a.* Prognofis 676. *a.* Diata & cura Galeni 676. *b.* Paracelli 677. *b.* Helmontii, & VVillifii 678. *b.* Sylvii & Cartef. 679. *a.* Autoris 679. *b.*
- Amblyopia seu visus obfcu-ritas 103. *a.*
- Amoris dulcedo 425. *b.*
- Ampullæ seu Eseræ 176. *a.*
- Amuleta in Hemorrhagia iuvant 154. *b.*
- Amygdalæ dulces, pingues reddunt homines 473. *a.*
- Amygdalæ glandulæ seu tonsillæ 231. *a.*
- Anabrochilus curat verruces 606. *a.* 140. *b.* prodest in Plica 19. *b.* in thymo 761. *b.*
- Anacthon 530. *a.*
- Anaphia, vide Aphonia 158. *a.*
- Anastomofis est species hemorrhagiæ 143. *b.*
- Anatomia partium corporis, situm & usum demon-  
strat 683. *a.*
- Anatomici jam plures non solum fetum, ex ovo  
formari probarunt, sed modum quo par-  
tes omnes in eo fabrefcunt demonstrarunt  
743. *b.*
- Anchyloblepharon seu coalitus palpebrarum  
54. *a.*
- Anchylops, vide Agylops 66. *a.*
- Anemones flores in Alopecia, Arca & Ophias  
conveniunt 14. *b.*
- Aneurifma 588. *a.* 593. *a.* Pars affecta 593. *b.*  
Diagnofis 594. *a.* causa Galen. Parac. Hel-  
montii, & VVillifii 594. *b.* Sylvii, Cartef. &  
Autoris 595. *a.* Prognofis 596. *a.* Diata &  
cura Galeni 596. *b.* Paracelli, Helmi. VVill.  
Sylvii & Cartef. 597. *b.* Autoris 598. *b.*
- Angelicæ, radix in hydrocephalo conducit  
5. *b.*
- Angi seu Bubones Gallici 499. *b.*
- Angina 238. *a.* Etymologia, Synonyma, & Dif-  
ferentia *ibid.* Pars affecta 239. *a.* Diagnofis  
239. *b.* causa Galenicorum, & Paracelli 240. *a.*  
Helmontii, VVillifii, & Sylvii 240. *b.* Carte-  
fianorum 241. *a.* Autoris 241. *b.* Prognofis  
242. *a.* Diata & cura Pharamaceutica Galeni-  
corum 243. *a.* Paracelli, Helmontii, & VVil-  
lifii 245. *a.* Sylvii 246. *a.* Cartefianorum 246.  
*b.* Autoris 247. *b.*
- Anguli oculorum, vide Canthi 66. *a.*
- Angustia cervicis uteri 425. *a.* Diagnofis 426. *a.*  
causa Galenicorum 426. *b.* Paracelli, & Hel-  
montii 427. *b.* VVillifii 428. *a.* Sylvii 429. *a.*  
Cartefianorum 430. *a.* Autoris 431. *a.* Pro-  
gnofis 432. *a.* causa Galen. 433. *a.* Paracelli  
436. *a.* Helmontii 437. *a.* VVillifii 437. *b.*  
Sylvii 438. *b.* Cartefianorum 440. *a.* Autoris  
441. *b.*
- Angustia metus urinarii 360. *a.* causa Galeni &  
Paracelli 361. *b.* Helmontii, & VVillifii 362.  
*a.* Sylvii 362. *b.* Cartefianorum 363. *a.* Au-  
toris 363. *b.* Prognofis 364. *b.* cura Galenico-  
rum 365. *b.* Paracelli 366. *a.* Helmoni. 366. *b.*  
VVillifii 367. *b.* Sylvii 368. *a.* Cart. 369. *b.*  
Autoris 370. *b.*
- Anivi passiones, quæ canitiem producere pos-  
sunt 13. *a.* à metu mors una nocte. *ibid.*
- Anima corporis, tam amico sedere juncta est, ut  
nihil ipsi eveniat, quin aut simul gaudio affi-  
ciatur aut tristetur 589. *a.*
- Anthrax seu Carbunculus 497. *b.* Pars affecta  
498. *a.* Diagnofis 499. *a.* causa Galenicorum,  
& Paracelli 499. *b.* Helmontii 500. *b.* Sylvii,  
& Cartef. 501. *a.* Autoris 502. *b.* Prognofis  
504. *a.* cura Galenicorum 505. *a.* Paracelli, &  
Helmontii 505. *b.* VVill. 506. *a.* Sylvii 506. *b.*  
Cartef. 507. *a.* Autoris 509. *b.*
- Anticatarthalia conveniunt in tonsillis inflam-  
matis 249. *b.*
- Antiepileptica sternutationem sanant 156. *b.*
- Antimonii præparatio ad hydrocephalum, re-  
liquosque hydropes prodest 4. *b.* Sal ejus  
6. *b.*
- Antimonium in liquorem & deus in pulverem  
versum curat hydrocephalum, & omnem hy-  
dropem 4. *b.*
- Antiscorbuticæ herbæ recensentur 193. *b.* pro-  
funt in narium ulcere 140. *b.* in hamodia  
220. *b.*
- Antispasmodica laudantur in maxillæ immobi-  
litate 230. *a.* in Strabismo 51. *a.* in Aphonia  
172. *b.*
- Anus seu Podex 335. *a.*
- Apertio Herniæ aquosæ in seroto 402. *a.*
- Apes ictu excitare possunt Empyisma 62. *b.* eo-  
rum spicula nervis inimicissima 57. *b.*
- Aphonia 158. *a.* causa Galeni & Paracelli 159. *b.*  
VVillifii 160. *b.* Cartefianorum 161. *b.* Au-  
toris 162. *b.* Prognofis 164. *b.* cura Galeni-  
corum 165. *b.* Paracelli 166. *a.* Helmontii  
& VVillifii 166. *b.* Sylvii 167. *a.* Cartefia-  
norum 168. *b.* Autoris 171. *b.*
- Apii radix in hydrocephalo utilis est 5. *b.*
- Apoplectici cur non ofuscant 147. *a.* cur non  
deglutiant 233. *a.*
- Apoplexia parva dicitur sternutatio 142. *b.*
- Apostema, vide Abscessus 478. *b.*
- Aqua Anglica laudatur ad maxillæ immobilita-  
tem 230. *a.* antiscorbutica Bontekoe ad la-  
biorum tumorem valet 181. *b.* Anglorum  
in gingivarum consumptione 225. *b.* ad scro-  
phulas procreandas apta est in Carinthia, &  
Styria 254. *a.* calcitrippæ & chelidonix lau-  
datur in oculorum affectibus 110. *b.* Caste-  
lana Autoris ad Alopecia 20. *a.* Corrosiva  
ad ficum 585. *b.* Ducis Candala mœdetur gin-  
givis erosio 554. *a.* Langii ad oculi atro-  
phiam 52. *b.* Maximiliani Imperatoris ad  
Pterygium 83. *b.* Moschata Odontalgia 218.  
*a.* Ophthalmica VVedelii 109. *a.* ad Poly-  
pum Autoris 140. *a.* ad pyulæ dilatatio-  
nem 99. *a.* Regina Hungariæ euid. 7. *a.* in  
pellendis Lochiis egræginum medicamen 457. *b.*  
Sapphirina chirurgorum ad Pterygium  
80. *b.* viridis Autoris prodest in ulceribus  
274. *b.* contra cancerum Hildani 49. *a.* for-  
tis calvitiei product 12. *a.* ad oculorum af-  
fectus 94. *b.* calcis Autoris in clavis pedum  
771. *b.*
- Aquæ dispositio ad Plicam excitandam 10. *b.*  
13. *b.* quædam in Polonia cam gignit.  
*ibid.*

Aqucus

# I N D E X.

**Aqueus oculi humor** 53. *b.* 104. *a.* origo ejus & anfluxus restitui possit 53. *b.*  
**Aquila** 54. *b.*  
**Araueæ** ictu suo excitare possunt Emphysema 62. *b.* earum spicula fibris nervosis inimicissima 57. *b.*  
**Arcanum** quadruplex; compositum, solidum, elementatum & metallicum 714. *b.* duplicatum 477. *a.*  
**Atrea** 8. *a.* Pars affecta & Diagnofis 9. *a.* causa Galenicorum 9. *b.* Paracelsi 10. *a.* Helmontii 10. *b.* Sylvii 11. *a.* Cartefianorum 11. *b.* Autoris 12. *a.* cura Galenicorum 14. *a.* Paracelsi 16. *a.* Helmontii 16. *b.* Sylvii 17. *b.* Cartef. 18. *a.* Autoris 20. *b.*  
**Aridura** seu Atrophia & Pars affecta 621. *a.* Diagnofis & causa Galeni 621. *b.* Paracelsi, Helmontii, VVillifii & Sylvii 622. *a.* Cartefianorum 622. *b.* Autoris 623. *a.* Prognofis 624. *b.* Dixerat 625. *b.* cura Galeni 626. *a.* Paracelsi, Helmontii, VVillifii & Sylvii 626. *b.* Cartefianorum 627. *a.* Autoris 628. *b.*  
**Arsenicum** quomodo conferat in ulceribus 644. *b.* 647. *a.* in fistula maxillæ 229. *a.* calvitiem producit 12. *a.* in cancro exulcerato 312. *a.*  
**Arts medica** brevis sub vitæ spatio longissima 1. *a.*  
**Arteriæ** quid? 593. *b.*  
**Asiæ radix** in Hydrocephalo conducit 4. *a.*  
**Alparagi radix** in Hydrocephalo conducit 4. *a.*  
**Alperæ arteriæ** angustia 269. *a.* Diagnofis & causa Galenicorum 269. *b.* Paracelsi, Helmontii & VVillifii 270. *a.* Sylvii, Cartefianorum & Autoris 270. *b.* Prognofis 271. *a.* cura Galenicorum 271. *b.* Paracelsi, Helmontii & VVillifii 272. *b.* Sylvii & Cartef. 273. *a.* Autoris 273. *b.*  
**Alperæ arteriæ** asperitas 269. *a.* Diagnofis & causa Galeni 269. *b.* Paracelsi, Helmontii & VVillifii 270. *a.* Sylvii & Cartefianorum 270. *b.* Autoris 271. *a.* Prognofis 271. *b.* cura Galenicorum 272. *a.* Paracelsi, Helmontii & VVillifii 272. *b.* Sylvii & Cartef. 273. *a.* Autoris 273. *b.*  
**Astrum cephalicum** Autoris in Aphonia convenit 172. *a.*  
**Atheroma** 585. *a.* Pars affecta & Diagnofis 586. *a.* causa Galeni & Paracelsi 586. *b.* VVillifii 587. *a.* Cartef. 587. *b.* Autoris 588. *b.* Prognofis 589. *a.* cura Galeni 589. *b.* Paracelsi & Helmontii 590. *a.* VVillifii 590. *b.* Cartefianorum 591. *a.* Autoris 592. *a.*  
**Atici** seu Imperforati 335. *a.* Diagnofis & causa Galenicorum 336. *a.* Parac. & VVillifii 336. *b.* Sylvii & Cartef. 337. *a.* Autoris 338. *a.* Prognofis 338. *b.* cura Galeni 340. *b.* Parac. 341. *a.* Helmontii 341. *b.* VVillifii & Sylvii 342. *a.* Cartef. 343. *a.* Autoris 345. *b.*  
**Atrophia oculi** & Pars affecta 44. *a.* Diagnofis & causa Galeni 44. *b.* Paracelsi 45. *a.* Helmontii & VVillifii 45. *b.* Sylvii & Cartef. 46. *a.* Autoris 47. *a.* Prognofis & cura Galeni 48. *a.* Paracelsi & Helmontii 49. *b.* VVillifii 50. *a.* Sylvii 51. *a.* Cartefianorum 51. *b.* Autoris 52. *a.*  
**Auditus & visus** sunt sensaciones præstantiores 125. *b.* quomodo fiat *ibid.*  
**Auribus** specifica remedia 125. *a.*

**Auricularum defectum** refarciendi ratio 123. *b.*  
**Auripigmentum** magnæ contra cancrum est efficaciz 59. *b.* in ulcere gingivarum 224. *b.* lannat ulcera 647. *a.*  
**Auri potabilis descriptio** 713. *b.*  
**Auris interioris structura** 126. *a.*  
**Aurium morbi** 109. *a.*

## B.

**B**Albuties 158. *b.*  
**Balanæ** adeps falso dicitur inferre calvitiem 12. *b.*  
**Balaustia** seu flores granati hydrocephalo auxiliantur 5. *b.*  
**Balneæ naturalia & artificialia** laudantur in scabie 573. *a.*  
**Balneator lancetta** sua necavit scarabæos & alia insecta, unde vulnera, quæ instrumento hoc instituit in Venæsectione & aliis operationibus, incurabilia exorta sunt 683. *b.*  
**Balncatores & Carnifices**, turpiter artem in contemptum Medicorum & Chirurgorum exercent 631. *a.*  
**Balsamus Apoplecticus** Autoris gustus vitia corrigit 172. *b.* Arthriticus externus Autoris, prodest in tracheæ angustia à Paralyti 274. *a.* Odontalgicus Autoris 218. *a.* vulnerarius externus 697. *a.* nervinus Autoris prodest in Aphonia 172. *b.* in Emphysemate 62. *b.* spasmatius Myndichti prodest in Emphysemate 62. *b.* Autoris ad narium ulcera 141. *a.* Peruvianus vulnerarius est, externè & internè 274. *b.* ad spasmus cynicum 182. *b.* Sulphuris in Otalgia 121. *b.* viridis Autoris prodest in ulceribus aurium 122. *a.*  
**Barycoia** seu Difficilis auditus 125. *b.*  
**Batrachon**, vid. Ranula 158. *a.*  
**Battarismus** 158. *b.*  
**Beccabunga** conducit in scorbuto 193. *b.*  
**Betonica** Hydrocephalo auxiliatur 7. *a.*  
**Bilis** quid? 538. *a.* quomodo interserviat Chylificationi 471. *a.*  
**Bilis** separandæ negotium Hepatis maximè necessarium est in economia animalis 350. *b.*  
**Biliositate** sunt corpulenti 476. *b.*  
**Bistortæ radix** in Hydrocephalo prodest 5. *b.*  
**Blasitas** 158. *b.* causa Galeni & Paracelsi 159. *b.* Helmontii 160. *a.* VVillifii 160. *b.* Sylvii 161. *a.* Cartefianorum 161. *b.* Autoris 163. *b.* Prognofis 164. *b.* cura Galeni & Paracelsi 166. *a.* VVillifii 166. *b.* Sylvii 167. *a.* Cartef. 168. *b.* Autoris 172. *b.*  
**Blas** 55. *b.* 59. *b.* lunare 552. *a.*  
**Bocium** seu Bronchocele 250. *b.*  
**Boeti** sunt pingues 472. *b.*  
**Borealis regio** facit ad obesitatem 472. *b.*  
**Brachium** adhibetur in Incontinentia urinæ 371. *b.*  
**Brandt** 671. *b.*  
**Brassica marina** in Hydrocephalo convenit 4. *a.*  
**Brain** 238. *b.*  
**Bronchocele** 250. *b.* Descriptio & Pars affecta 251. *a.* Diagnofis & causa Galenicorum 252. *a.* Paracelsi, & Helmontii 252. *b.* VVillifii & Sylvii 253. *a.* Cartefianorum 253. *b.* Prognofis 254. *b.* Dixerat 254. *b.* cura Galenicorum 255. *b.* Paracelsi 256. *b.*  

Eccccc 2 Hel-



Helmontii 257. *a.* VVillisi & Sylvii 257. *b.*  
 Cartef. 258. *b.* Autoris 261. *b.*  
 Brouchotomia seu Laryngotomia usum habet  
 in Angina 249. *a.* 273. *b.* 268. *a.* in tracheæ  
 angustia 273. *b.* non potest institui in oesophagi morbis 278. *a.*  
 Bronchus quid 251. *a.*  
 Bruch 324. *a.*  
 Bruta cur Herniæ non obnoxia 325. *a.*  
 Brychanium impinguit 473. *a.*  
 Bryonia alba prodest in Hydrocephalo 4. *b.*  
 Bubo 497. *a.* Pars affecta 497. *b.* Diagnos 498. *b.*  
 causa Galeni & Paracelsi 499. *b.* Helmontii &  
 VVillisi 500. *a.* Sylvii 500. *b.* Cartef. 501. *a.*  
 Autoris 501. *b.* Duplex pestilens & venereus  
 502. *a.* Prognosis 503. *a.* cura Galeni 504. *b.*  
 Paracelsi & Helmontii 505. *b.* VVill. & Sylvii  
 506. *a.* Cartesiorum 506. *b.* Autoris  
 507. *a.* criticus, symptomaticus, pestilens &  
 venereus quomodo noscatur 498. *b.* 499. *a.*  
 dividitur in benignum & malignum, & hic  
 rursus in venereum & pestilentem 497. *b.*  
 Buccelli 133. *a.*  
 Bufones conveniunt in Bubonibus 509. *a.*  
 Bullæ vide Eistæ 576. *a.*  
 Bursa testicularum vide Scrotum 397. *a.*  
 Butyrum homines reddit pingues 473. *a.* majale  
 in ophthalmia prodest 83. *b.*  
 C.  
 Cafa ad splenis morbos commendatur  
 354. *b.*  
 Calculus palpebrarum 54. *b.* causa Galenico-  
 rum 55. *a.* Paracelsi & Helmontii 55. *b.* VVil-  
 lisi 56. *a.* Sylvii 56. *b.* Cartef. 57. *a.* Autoris  
 58. *a.* Prognosis 58. *b.* cura Galeni 59. *a.* Pa-  
 racelsi 59. *b.* Helmontii 60. *a.* VVillisi &  
 Sylvii 60. *b.* Cartef. 62. *a.* Autoris 63. *b.*  
 Calculi 60. ex seroto exenti 398. *a.*  
 Caligo 103. *b.*  
 Calida in hydrocephalo conveniunt 7. *a.* 8. *a.*  
 Callus palpebrarum 54. *b.* causa Galeni 55. *a.*  
 Parac. & Helm. 55. *b.* VVill. 56. *a.* Sylvii 56. *b.*  
 Cartef. 57. *a.* Autoris 58. *a.* Prognosis 58. *b.* cura  
 veterum 59. *a.* Parac. 59. *b.* Helm. 60. *a.* VVill.  
 & Sylvii 60. *b.* Cartef. 62. *a.* Autoris 63. *b.*  
 Callus manuum 734. *a.* Diagnos 735. *a.* causa  
 Galen. Parac. Helm. & VVillisi 735. *b.* Syl-  
 vii & Cartef. 736. *a.* Autoris 737. *a.* Pro-  
 gnosis 737. *b.* cura Galeni 738. *a.* Paracelsi,  
 Helmontii, VVillisi & Sylvii 738. *b.* Cartef.  
 739. *a.*  
 Calor in Erysipellate intensior unde 524. *a.*  
 Calva seu Cranium 29. *a.*  
 Calvaria seu Cranium 29. *a.*  
 Calvities 8. *a.* Pars affecta & Diagnos 9. *a.* cau-  
 sa Galeni 9. *b.* Paracelsi 10. *a.* Helm. & VVil-  
 lisi 10. *b.* Sylvii 11. *b.* Cartesiorum & Au-  
 toris 12. *a.* Prognosis 13. *b.* cura Galeni 15. *a.*  
 Paracelsi 16. *a.* Helmontii 16. *b.* VVillisi 17. *a.*  
 Sylvii 17. *b.* Cartef. 19. *a.* Autoris 20. *a.* in  
 senibus quare fiat 9. *b.* 11. *a.* in lue venerea fit  
 11. *a.* à venere nimia & à Phthisi 12. *a.* *b.*  
 Calx viva pilos extreminat & calvitie produ-  
 cit 12. *a.*  
 Capa nuchæ appensa Hemorrhagiam sistit  
 155. *b.*  
 Camphora non frigida, sed calidissima est  
 699. *b.*  
 Cancer mammarum 299. *a.* Diagnos 299. *b.*

causa Galenicorum 300. *a.* Paracelsi & Hel-  
 montii 300. *b.* VVillisi & Sylvii 301. *a.* Car-  
 tesianorum 301. *b.* Autoris 303. *a.* Prognosis  
 304. *a.* cura Galenicorum & Paracelsi 305. *b.*  
 Helmontii 306. *a.* VVillisi 306. *b.* Sylvii 307. *a.*  
 Cartesiorum 308. *b.* Autoris 311. *b.* per  
 plures annos delitescere potest 304. *a.* dif-  
 ficile exulceratus vero vix curatur, ideo cura  
 tantum palliativa adhibenda 311. *b.*  
 Cancer palpebrarum 54. *a.* Diagnos 54. *b.* cau-  
 sa Galenicorum 55. *a.* Paracelsi & Helmontii  
 55. *b.* VVill. 56. *a.* Sylvii 56. *b.* Cartesiano-  
 rum 57. *a.* Autoris 57. *b.* Prognosis 58. *a.* cura  
 veterum 58. *b.* Paracelsi 59. *a.* Helm. 59. *b.*  
 VVillisi 60. *a.* Sylvii 60. *b.* Cartef. 61. *a.* Au-  
 toris 62. *b.*  
 Cancer quid & quotuplex 546. *a.* Pars affecta  
 546. *b.* Diagnos & causa Galenicorum 547. *a.*  
 Paracelsi & Helm. 547. *b.* VVillisi Sylvii  
 & Cartesiorum 548. *a.* Autoris 548. *b.* ver-  
 miculi in cancro observati & Prognosis 550. *a.*  
 cura Galenicorum 551. *a.* Paracelsi 551. *b.*  
 Helmontii VVillisi & Sylvii 552. *a.* Carte-  
 sianorum 552. *b.* Autoris 553. *b.* mercurialia  
 optima remedia 554. *a.* cura per sectionem 553. *a.*  
 remedia mitiora continent & fortioribus  
 exasperatur 550. *b.* si eus cura fieri potest, per-  
 ficitur cultro & medicamentis causticis 554. *b.*  
 555. *b.* si non plenarie, tamen palliative curan-  
 dus 61. *b.* aquosus 549. *a.*  
 Cancer vesicæ 360. *a.*  
 Cancri fluviatiles in curando cancro magni asti-  
 mantur 555. *b.*  
 Canities 8. *a.* Diagnos 9. *a.* causa Galenicorum  
 9. *b.* Paracelsi 10. *b.* Helmontii & VVillisi  
 11. *a.* Sylvii 11. *b.* Cartef. 12. *a.* Autoris 13. *a.*  
 cura Galen. 15. *a.* Paracelsi 16. *a.* Helmontii  
 16. *b.* VVill. 17. *a.* Sylvii 17. *b.* Cartesiorum  
 19. *b.* Autoris 21. *a.* duplex est, ordinaria in  
 senibus, & extraordinaria à morbo orta 8. *b.*  
 à metore vel alio animi affectu 11. *a.* 12. *a.*  
 13. *a.*  
 Cantharides vesicam ad inflammationem dispo-  
 nunt 363. *b.* Alopecia causantur 12. *a.* calvi-  
 tiam produciunt 12. *b.*  
 Canthi oculorum 66. *a.*  
 Capilli quare decidunt post febres malignas &  
 Phthisin 12. *a.*  
 Capillitium ad oculorum suffusionem 84. *b.*  
 Capillorum defluviu vel Alopecia.  
 Capitis contusio vide contusio, capitis 22. *a.*  
 Caput membrum divinisimum, in quo sanctus  
 anime regimen, & vice Regis ipsius micro-  
 cosmetoris 23. *b.* in eo residet cognitio &  
 appetitus, quorum illi sensus, huic motus an-  
 cillatur & sensus, & prudentie sedes est  
 23. *b.*  
 Caput mortuum post olei pini distillationem  
 restitans odontalgiam sanat 218. *b.*  
 Carbo, vide carbunculus vel Anthrax.  
 Carbunculus, vide Anthrax. In omnibus corpo-  
 ris partibus prorumpunt 498. *b.*  
 Carcinoma 132. *a.*  
 Carcinus, vide cancer 546. *a.*  
 Cardimelech est Rex thoracis 238. *a.*  
 Cardonium 435. *b.*  
 Carduibenedicti sal pituitam coagulata solvit  
 5. *b.*  
 Carfundelblatter 497. *b.*  
 Caricæ pinguescunt 473. *a.*

Caries

# I N D E X.

- Caries densium** 205. *b.* causa Galen. Parac. & Helmontii 207. *a.* VVillifii 207. *b.* Sylvii & Cartesiano. 208. *a.* Autoris 209. *b.* Prognosis 211. *a.* cura Galenicorum 212. *a.* Parac. 213. *a.* Helmontii & VVillifii 213. *b.* Sylvii 214. *a.* Cartesiano. 215. *a.* Autoris 218. *b.*
- Caries ossium** 722. *a.* Diagnofis 723. *b.* causa Galenicorum 724. *a.* Paracelſi Helm. VVillifii & Sylvii 724. *b.* Cartesiano. 725. *a.* Autoris 725. *b.* Prognofis 726. *b.* cura Galenic. 727. *b.* Paracelſi & Helmontii 728. *a.* VVillifii & Sylvii 728. *b.* Cartel. 729. *b.* Autoris 731. *b.*
- Carnes temperatæ & mucilaginoſe** potentius nutriunt & corpulentiam adaugent 473. *a.*
- Carnifices**, non Medici olim Roma expulſi fuerunt 631. *a.*
- Caro bubala** adhuc à maceratione calida ſpinam vel ſecticam oculo infixam educit 80. *b.* vitulina hâdina vel vervecina oculis obſtructis ſuceurrit 83. *a.*
- Caro deviata** quid 133. *a.*
- Cartilago mucronata** vel enſiformis 295. *b.*
- Cartilago** quid? 704. *a.* 704. *b.*
- Caruncula aurium** 110. *a.* Diagnofis 110. *b.* causa Galenicorum 111. *a.* Paracelſi 111. *b.* Helmontii 112. *a.* VVillifii 112. *b.* Sylvii 113. *a.* Cartesiano. 113. *b.* Autoris 114. *b.* Prognofis 115. *b.* cura Galenicorum 116. *b.* Helmontii 118. *a.* VVillifii 118. *b.* Sylvii 119. *b.* Cartel. 120. *b.* Autoris 123. *a.*
- Caruncula penis** 412. *b.* Diagnofis 413. *b.* causa Galeni & Paracelſi 414. *a.* Helmontii VVillifii & Sylvii 414. *b.* Cartesiano. 415. *a.* Autoris 416. *a.* Prognofis 416. *b.* cura Galenicor. 418. *a.* Paracelſi 418. *b.* Helm. 419. *a.* VVill. 419. *b.* Sylvii 420. *b.* Cartesiano. & Autoris 421. *b.*
- Caruncula pudendi muliebris** 461. *a.* Diagnofis 462. *a.* causa Galenicorum & Paracelſi 462. *b.* Helmontii, VVillifii & Sylvii 463. *a.* Cartel. & Autoris 463. *b.* Prognofis 464. *a.* Dieta & cura Galenicorum 464. *b.* Paracelſi 465. *a.* Helmontii, VVill. & Sylvii 465. *b.* Cartesiano. 466. *a.* Autoris 466. *b.*
- Caryophyllata** radix in Hydrocephalo commendatur 5. *a.*
- Cafeus alicui ſuo dentium ſtuporem ſanat** 220. *b.*
- Caſtorina** laudatur in ſternutatione 157. *a.*
- Caſtratio** abſque vitæ periculo facta 416. *b.*
- Caſus dentium** 205. *b.* causa Galenicorum. Paracelſi & Helm. 207. *a.* VVill. Sylvii & Cartel. 208. *a.* Autoris 210. *a.* Prognofis 211. *a.* cura Paracelſi 213. *a.* Helmontii & VVillifii 213. *b.* Sylvii 214. *a.* Autoris 219. *b.*
- Caſus unguium** 749. *a.* causa Galenicor. 749. *b.* Paracelſi & Helmontii 750. *a.* VVillifii & Sylvii 750. *b.* Cartel. 751. *a.* Autoris 751. *b.* Prognofis & Dieta 752. *a.* cura Galenicorum 752. *b.* Paracelſi 753. *a.* Helmontii & VVillifii 753. *b.* Sylvii & Cartel. 754. *a.* Autoris 755. *a.*
- Cataplaſma** ad contuſionem cum metu inflammationis, abſceſſus & gangrænæ 422. *b.* ad ſerophulas Overcamp. 259. *b.*
- Cataracta**, vide ſuſuſio 96. *a.* ejus depositio 103. *b.*
- Catheter ſilexilis** in caruncula penis 423. *b.*
- Cauda cervicis** uteri 425. *a.* Diagnol. 426. *a.* causa Galenicorum 426. *b.* Paracelſi & Helmontii 427. *b.* VVillifii 428. *a.* Sylvii 429. *a.* Cartesiano. 429. *b.* Autoris 431. *a.* Prognofis 432. *a.* cura Galenicorum 433. *a.* Paracelſi 435. *a.* Helmontii 437. *a.* VVillifii 437. *b.* Cartel. 439. *b.* Autoris 441. *a.*
- Cauſtica ſine periculo** applicantur carni & glandulis, non verò tendinibus, nervis & vaſis majoribus ſanguiferis 554. *b.* in cancro 555. *b.*
- Cauteria** denti carioſo dolenti applicantur 217. *a.* in deſperata hæmorrhagia gingivarum ſunt adhibenda 225. *b.* ſanguinis æ chyli partem tenuiorem abſumunt, in Elephantiaſi non conducunt 575. *b.* actualia & potentialia in hydrocephalo improbantur 8. *a.* actualia laudatur in carie dentium 218. *b.* in relaxatione uvulæ 237. *b.* indolens Autoris laudatur in fiſtula lachrymali 71. *a.* profunt in hydrocephalo 4. *b.* in odontalgia 217. *a.* in carie osſium 729. *a.*
- Cele ſeu Hernia** 397. *a.*
- Celſa ſeu Talpa topinaria** 576. *b.*
- Centaurium minus** in Hydrocephalo prodeſt 7. *a.*
- Cephalica** in hydrocephalo profunt 7. *a.*
- Ceratum de cumino** in œdematē laudatur 545. *a.*
- Cerebrum** detectum in cranii fractura, unde ſphacelus & mors 30. *b.*
- Cereviſia** abſinthitis enulata & ſalvata in hydrocephalo profunt 7. *a.* Bruſiſicenis multum nutrit & impingat, ut & triticea & hordeacea 437. *a.*
- Cerumen aurium** 111. *a.* producit dolorem 114. *a.* inflammationem 114. *b.* inſpiſſatum & lapideſcens inſert ſordiditatem 125. *b.*
- Cervus** cur deponat cornua 11. *a.*
- Chelidoniz** eſſentia quinta ſalia primitiva reſtaurat & corrigit 59. *b.* in viſus debilitate prodeſt 106. *b.* in ſugillatione 78. *a.*
- Chirurgia** quid? ejus inter omnes medicinz partes effectus eſt evidentiffimus, omnia ad oculum demonſtrat, medicinam non omittit, manu ſturmum præſtat; ut ſpina & membro evellat & dolor ſedetur 1. *a.* in operatione varios modos & varia inſtrumenta habet 7. *b.* therapeutices pars nobiliſſima eſt 1. *a.*
- Chirurgia** cutorum 132. *a.*
- Chirurgus** æque fluidarum, quàm ſolidarum partium habeat rationem neceſſe eſt 682. *b.* eſt cuſtos naturæ 689. *a.*
- Choroides** membrana oculi 43. *a.*
- Chylificatio** quomodo fiat 470. *b.* 537. *b.*
- Chylus** laudabilis quoniam? 470. *a.* iter ad ſang. 471. *a.*
- Cibi ſilini** acres fermentativi corruptioni obnoxii ac vaporoſi oculis nervoſque generi ſunt inimici 76. *a.*
- Ciliorum** morbi 63. *a.*
- Cinnabarina** inter abſorbentia palmas habent 52. *b.* laudantur in ſternutatione 157. *a.* in hydrocephalo 7. *a.* in penis exulceratione 424. *a.*
- Ciræon** 158. *a.*
- Circulatio ſpiricum animalium** 519. *a.*
- Cirſocle** 397. *a.* causa Galenicorum 398. *a.* Paracelſi & Helmontii 398. *b.* VVill. & Sylvii 399. *a.* Cartesiano. 399. *b.* Autoris 400. *a.* Prognofis 401. *a.* cura Galenicorum 403. *a.* Paracelſi 404. *a.* Helmontii 404. *b.*
- Ecc ee 3 VVillifii

- V Villisii 405. a. Sylvii 405. b. Cartel. 406. b. Autoris 409. a.
- Citri succus pingue dinem minuit 474. a. emaciavit Electorem Palat. Carolum 641. a.
- Clavus oculi 96. b.
- Clavus pedum 761. a. Diagnofis 762. a. caufa Galenicorum & Paracelſi 762. b. Helmontii & V Villisii 763. a. Sylvii 763. b. Cartefiano- rum 764. a. Autoris 764. b. Prognofis 765. a. cura Galen. 766. a. Paracelſi 767. a. Helm. 767. b. V Villisii 768. a. Sylvii & Cartel. 768. b. Autoris 769. a.
- Clitoris quid? 425. b. eſt inſtar uvulæ non rela- xata, & in tantam ſepe exercet molem, ut virile membrum referat, *ibid.*
- Coalitus palpebrarum 54. a. Diagnofis 54. b. caufa Galenicorum & Paracelſi 55. a. Helm. 55. b. V Villisii 56. a. Sylvii 56. b. Cartefiano- rum 57. a. Autoris 57. b. Prognofis 58. a. cura Paracelſi, & Helmontii 59. b. V Vill. 60. a. Sylvii 60. b. Cartefian. 61. b. Autoris 62. b.
- Cochleæ contuſe quomodo Hydrocephalo au- xilientur 7. a.
- Cochlearia, eſt herba antiſcorbutica 193. b.
- Codofellæ ſunt Bubones Gallici 499. b.
- Cæci à poſtulatione excluduntur à ſaris. Con- ſultis 103. a.
- Cæcitas in puero natante obſervata ex immer- ſione capitis in aqua frigida 105. b.
- Cæcitas 103. b. caufa Helmontii & V Villisii 104. b. Sylvii & Cartefianorum 105. a. cura Galenicorum 106. b. Helmontii & V Villisii 107. a. Sylvii 107. b. Cartel. 108. a. Autoris 108. b.
- Coffee potus omnes ſtagnationes ſolvens in- flammationi ſuccurrit 488. a.
- Cuſti diſpoſitio ad Plicam 10. b.
- Cohob omne ad ſplenis affectus laudatur 357. b.
- Collum 250. a. ejus niſus, *ibid.* partes 251. a.
- Collyrium Vigonis in Cataracta 102. b. Dolæ in Albugine 94. b. acriora oculis inſenſa 57. b.
- Color fit per modificationem luminis 12. b. albus & niger uti producat 611. b. rubicu- dus in Eryſipelate 523. b. viridis oculis gra- tiſſimus, rubicundus verò noxiuſ 5. a. ſan- guineus cur in inflammatione 484. a. pilo- rum uti ſiant 12. b.
- Coloris unguinum mutatio 749. a. caufa Paracelſi & Helmontii 750. a. V Villisii & Sylvii 750. b. Cartefianorum 751. a. Autoris 751. b. Prognofis & Diæta 752. a. cura Galenicorum 752. b. Paracelſi 753. a. Helmontii & V Vill. 753. b. Sylvii 754. a. Autoris 754. b.
- Columella ſeu uvula 231. a.
- Combustio vide Ambuſtio 671. b.
- Condyloma ſeu Thymus & Pars affecta 335. a. Diagnofis 335. b. caufa Galenicorum & Pa- racelſi 336. a. Helmontii, V Villisii & Sylvii 336. b. Cartefianorum 337. a. Autoris 337. b. Prognofis 338. b. cura Galenicorum 340. b. Paracelſi, & Helmontii 341. a. V Villisii 341. b. Sylvii 342. a. Cartefian. 343. a. Autoris 344. b.
- Condylomata uteri 425. a. Diagnofis 426. a. caufa Galenicorum 427. a. Paracelſi & Hel- montii 427. b. V Villisii 428. b. Sylvii 429. a. Cartefianorum 430. a. Autoris 431. a. Prognofis 432. a. cura Galenicorum 434. a. Paracelſi 436. a. Helm. 437. a. V Vill. 438. a. Sylvii 439. a. Cartel. 440. b. Autoris 442. a.
- Contractura, vide Incurvatio juncturarum ſciz articulorum.
- Contractura tendinum accidere ſolet, in fractu- ra offium 722. b.
- Contrahilura cranii 30. a. eſt Species fracturæ 29. a. exemplum ejusarum 31. a. caufa 31. b. cura 36. b.
- Contrafractura cranii 36. b.
- Contuſio capitis 22. a. Pars affecta & Diagnofis 22. b. caufa Galenicorum, Helmontii, V Vill. Sylvii, Cartel. Autoris 23. a. Prognofis 23. b. cura Diætica 24. a. Pharmaca Galenicorum 24. b. Paracelſi 25. a. Helmontii, & V Villisii 26. a. Sylvii, & Cartefianorum 26. b. Autoris 27. b.
- Contuſio cranii 29. b.
- Contuſio nervorum 704. b. Diagnofis 706. a. caufa Galenicorum, & Paracelſi 706. b. Hel- montii 707. b. V Villisii 708. a. Sylvii & Car- tetianorum 708. b. Autoris 710. a. Prognofis 711. a. cura Galenicorum 712. b. Helmontii 713. a. V Villisii 715. b. Sylvii 716. a. Cartel. 717. a. Autoris 718. b.
- Contuſio teſticulorum 386. b. Diagnofis 387. a. caufa Galenicorum & Paracelſi 387. b. Hel- montii, V Villisii & Sylvii 388. a. Cartefiano- rum 388. b. Autoris 389. a. Prognofis 389. b. cura Galenicorum 391. b. Paracelſi, & Helm. 392. a. V Villisii 393. a. Sylvii 393. b. Car- tetianorum 394. b. Autoris 396. b.
- Cor eſt ſtirps omnium vaſorum 468. b. eſt inſtar aulæ in machina hydraulica 501. a. eſt præcipuum circulationis inſtrumentum 501. b.
- Corneæ tunicæ vitia 85. a.
- Corneæ albugo, vide Albugo corneæ 85. a.
- Corneæ craſſities, vide craſſities corneæ 85. a.
- Corpulentia nimia 468. a. Pars affecta 468. b. Diagnofis, caufa Galenic. & Paracelſi 469. a. Helmontii, & V Villisii 469. b. Sylvii & Car- tel. 470. a. Autoris 470. b. Prognofis 473. a. Diæta 473. b. cura Galenicorum 474. a. Para- celſi, Helmontii, V Villisii & Sylvii 474. b. Cartefianorum 475. a. Autoris 475. b.
- Cornua quid, & Pars affecta 600. a. Diagnofis & caufa Galenicorum 600. b. V Villisii, & Sylvii 601. a. Cartefianorum 601. b. Autoris 602. a. Prognofis 602. b. cura Galenicorum 603. a. V Villisii 603. b. Sylvii 604. a. Cartel. 604. b. Autoris 606. b.
- Cornu cervi præparatum pituitam coſgulatam ſolvit 5. b. ejus ſpiritus lymphæ proventum inhibet, ſpiritus anget, hydrocephalique hac ratione auxiliatur 6. b. ejus ſal volatile in Hy- drocephalo convenit 8. a.
- Corpus noſtrum conſtatum eſt, ex ſuccis & can- alibus 593. a. fit ex ovo 498. b. eſt machina hy- draulica 599. a. morboſum non augetur, ſed minuitur 469. b. ex meris canaliculis conſtat 472. a. eſt congeries indefinitorum, canalicu- lorum, tubulorum, & vaſculorum, fluida varii generis corpuscula transmittens 682. b. actio- nes ejus non læduntur, niſi æſis ſuccis, vel can- alibus, vel ambobus 593. a.
- Coryza 142. b. caufa Galenicorum 143. b. Para- celſi, & Helmontii 144. a. V Villisii, & Sylvii 144. b. Cartel. 145. a. Autoris 146. a. Pro- gnofis 147. b. Diæta 148. a. cura Galen. 148. b. Paracelſi 149. b. Helmontii 150. a. V Villisii 151. a. Sylvii 151. b. Cartefianorum 152. b. Autoris 156. a.

Coſme.

# I N D E X.

Cosmetica sunt pro fuce rugas contrahunt , & cito senescere faciunt 194. *a.* inimica dentibus & gingivis, imprimis mercurialia 194. *a.* urina rufficis cosmetica est 194. *b.* à mercuriali tremor linguæ ortus 170. *a.* tumorem linguæ excitavit 162. *a.* an convenient in gutta rofacea 192. *b.* Anglicum 619. *b.*

Collus quid? 133. *a.* cura Paracelsi 137. *a.*

Costæ 295. *a.* à palpitacione cordis fuisse fractas 295. *a.* sunt duodecim *ibid.*

Cranium 29. *a.* ejus concameratio 30. *a.* humani præparata pituitam coagulatum solvunt 5. *b.*

Crassi quibus morbis sint expositi 73. *b.*

Crassities tunicae corneæ & Diagnosif 85. *a.* causa Galenicorum 85. *b.* Paracelsi, & Helmontii 86. *a.* VVillifii 86. *b.* Sylvii, & Cartesi 87. *a.* Autoris 87. *b.* Prognosis 88. *b.* cura Galenicorum 89. *a.* Paracelsi 90. *b.* Helmontii, & VVillifii 91. *a.* Sylvii 92. *a.* Cartesi 92. *b.* Autoris 93. *b.*

Crassities unguium 749. *a.* causa Galen. & Paracelsi 749. *b.* Helmontii, & VVillifii 750. *a.* Sylvii 750. *b.* Cartesianoꝝ & Autoris 751. *a.* Prognosis & Diata 752. *a.* cura Galenicorum 752. *b.* Paracelsi 753. *a.* Helmontii, VVillifii & Sylvii 753. *b.* Cartesi & Autoris 754. *a.*

Crescendi vini male quidam & irritò conatu ex cerebro per medullam spinalem derivare conantur 472. *b.*

Crispato pilorum unde 14. *b.*

Cristæ 600. *b.*

CrySTALLUS montanus cancerum curat 556. *a.*

CrySTALLUS oculi humor 43. 104. *a.* ejus sedes 104. *a.* humorum oculorum amilorum restitutio 109. *a.*

Cultellivororum hidiorix 319. *b.*

Culus, vide Anus, vel podex.

Cumini semen in Hydrocephalo confert 7. *a.*

Curatio cito, tuto & jucunde fieri debet 151. *b.*

Cutis quid? 608. *b.* 517. *a.* ejus morbi 608. *a.* est litus microcosmicum 522. *a.* pori duplices 557. *b.* ducenti & viginti sex numerantur 575. *a.*

Curvatura unguium 749. *a.* causa Galen. 749. *b.* Paracelsi, & Helmontii 750. *a.* Sylvii 750. *b.* Cartesi, 751. *a.* Autoris 751. *b.* Prognosis & Diata 752. *a.* cura Galenicorum 752. *b.* Paracelsi 753. *a.* Helmontii & VVillifii 753. *b.* Sylvii & Cartesi 754. *a.* Autoris 755. *a.*

Cucurbitulæ in Hydrocephalo sunt suspectæ 8. *a.* sanguinem tenuiorem eliciunt ideoque in Elephantiasi nocent 575. *b.* profunt in Angina 247. *b.* 248. *a.*

Cynanche est species Anginæ 238. *b.*

## D.

**D**ASYMMA seu Trachoma 54. *a.*

Debilitas visus non semper dependet ab ipsis oculis 96. *a.*

Decoctum ad gingivas erosas 225. *a.*

Defectus papillarum, & causa Galenicorum, Paracelsi, & Helmontii 313. *a.* VVill. & Sylvii 313. *b.* Cartesianoꝝ & Autoris 314. *a.* cura Galenicorum, Paracelsi, & Helmontii 314. *b.* VVillifii, & Sylvii 315. *a.* Cartesi 315. *b.* Autoris 316. *b.*

Deidivium capillorum, vide Alopecia.

Deglutitio difficilis in uvulæ laxatione unde 232. *b.* in Apoplecticis 233. *a.*

Deligatura in incurvatione juncturarum, seu articulorum 719. *a.* in luxationibus 720. *b.*

Dentagra seu Odontalgia 205. *b.*

Dentium morbi 205. *a.* Stupor, seu Harmodia, *ibid.* Entomia, interviunt ciborum masticationi, & Sermoni articulo auxiliantur 205. *a.* an dolcant in Substantia sua 206. *a.* quamnam ipsis noxia 218. *a.* artificiales ex quibus parentur & cur 220. *a.* numerus & usus 205. *a.* quare nudi 206. *a.* color varius, pro varia ætate 207. *b.* putredo eorum 213. *a.* comminutio à medicamentis tentatur 219. *a.* eorum dolores quandoque conceptionis signa 206. *a.* quantum doloribus magis obnoxii 206. *a.* gravidis non evellendi 218. *b.* senibus etiam non extrahendis; ab extracto mortale mors 219. *a.* Incisores seu gelusini primarium habent utrum, nec Caninorum tuta est extractio, obcommunicationem nervi oculos moveris 219. *a.*

Dentifricia remedia 220. *a. b.*

Dentulium Etmulleri gingivas erosas, & ulceratas sanat 225. *b.*

Dentium casus, vide casus dentium 205. *b.*

Dentium caries, vide caries dentium 205. *b.*

Dē octo libris assumptorum duæ saltem in nutritionem convertuntur 476. *a.*

Depressio cranii 30. *a.* causa Galenicorum, & Paracelsi 32. *a.* VVillifii, Cartesi & Autoris 36. *b.*

Diabetes emaciat corpus 476. *b.*

Diabolus quid possit in tumoribus, si extranea in illis exstant 588. *b.*

Diæresis est Species Hæmorrhagiæ 143. *b.* in im perforatione pudenti mulieribus 467. *b.*

Diaphoretica Anginam malignam, & Epidemicam curant 248. *a.* Hydrocephalum curant 5. *a.* 7. *a.* maxillæ fistulam sanant 230. *b.* obelitem curant 476. *b.* morbis omnibus à sero oriundis succurrunt 215. *b.* & ideo etiam in Odontalgia *ibid.* in omnibus tumoribus 323. *b.*

Diaphragmatis vulnera, quæ nam periculosa & lethalia 283. *b.*

Diapedesis est Species Hæmorrhagiæ 143. *b.*

Differentia est inter venenatum & noxiunt 169. *a.*

Digestio ortum habet in ventriculo, & à motu partium organico juvatur 468. *a.* quomodo fiat 470. *b.* in primis viis læsa innumeriorum morborum faber est 3. *b.*

Digitum coalitus 740. *a.* Pars affecta, & Diagnosif 741. *a.* causi Galenicorum 741. *b.* Paracelsi, & Helmontii 742. *a.* VVillifii, Sylvii, & Cartesi 742. *b.* Autoris 743. *a.* Prognosis 744. *a.* cura Galenicorum 745. *a.* Paracelsi, & Helmontii 746. *a.* VVillifii, Sylvii, & Cartesianoꝝ 746. *b.* Autoris 747. *a.*

Digitus quid? 741. *a.* ejus morbi 740. *a.*

Digitus latus 740. *a.* Diagnosif, & causa Galenicorum 741. *b.* Paracelsi, & Helmontii 742. *a.* VVillifii, Sylvii, & Cartesianoꝝ 742. *b.* Autoris 743. *a.* Prognosis 744. *a.* cura Galenicorum 745. *a.* Paracelsi, & Helmontii 746. *a.* VVillifii, Sylvii, & Cartesianoꝝ 746. *b.* Autoris 747. *a.*

Dilaceratio uteri 445. *b.* causa Paracelsi 446. *a.* VVillifii 447. *a.* Autoris 449. *a.* Prognosis 450. *a.*



450. *a.* cura Galenicorum 453. *a.* Sylvii 455. *b.* Auctoris 459. *b.*
- Dilatatio arteria, vide Aneurisma 593. *a.*
- Dislocatio articularum, seu juncturarum 707. *a.*
- Distorsio penis, vide Penis distortio 412. *a.*
- Diuretica blandiora in hydrocephalo profunt 7. *a.* in Elephantiasi conveniunt 574. *a.* maxillæ fistulam curant 230. *b.* obestatem curant 476. *a.* Odontalgia opulantur 216. *a.*
- Dolor quid? 484. *a.* 113. *b.* in inflammatione 484. *a.* ejus differentia 484. *b.*
- Dolor calcis pedum 761. *b.* Diagnofis 762. *a.* causa Galenicorum 762. *b.* Paracelli, & Helmontii 763. *a.* VVillifii, & Sylvii 763. *b.* Auctoris 764. *b.* Prognofis 765. *b.* cura Galenicorum 766. *b.* Paracelli 767. *b.* VVillifii 768. *a.* Sylvii 768. *b.* Cartefianor. 769. *a.* Auctoris 772. *a.*
- Dothien, vide Furunculus 510. *b.*
- Dropax, Plateri pilus evellens 22. *b.*
- Ductus oculares novi Nuckii 47. *a.*
- Ductus falivales varii 195. *a.*
- Ductus thoracicus quid? 472. *a.* implantantur venæ subclaviæ & plurimas habet valvulas, *ibid.*
- Ductuum falivalem affectus 195. *b.* causa Paracelli, & Helmontii 196. *a.* VVillifii 196. *b.* Sylvii 197. *a.* Cartel. 197. *b.* Auctoris 198. *a.* Prognofis 199. *b.* cura Galen. & Parac. 200. *b.* Helmontii, & VVillifii 201. *a.* Sylvii 201. *b.* Cartefianorum 202. *b.* Auctoris 203. *b.*
- Dulcia, & faccharata dentibus sunt infensa 218. *a.*
- Dum pus fit, dolores & febres accidunt magis quam confecto 484. *b.*
- Dura meningis iuptura ut curetur 35. *b.*
- Durities in Scirrho unde 359. *a.*

## E.

- E**Bulina in Hydrocephalo commendantur 7. *a.* tinctura hydrocephalum curat 6. *a.*
- Echymoma, vel Echymosis Pars affecta, & Diagnofis 517. *a.* causa Galenicorum, Paracelli, Helmontii, & VVillifii 517. *b.* Sylvii, & Cartefianorum 518. *a.* Auctoris 518. *b.* Prognofis & Dieta 519. *a.* cura Galenicorum 519. *b.* Paracelli, Helmontii, VVillifii, & Sylvii 520. *a.* Cartefianorum, & Auctoris 521. *a.*
- Ectropion 54. *a.* Diagnofis 54. *b.* causa Galenic. 55. *a.* Paracelli, & Helmontii 55. *b.* VVillifii 56. *a.* Sylvii 56. *b.* Cartel. 57. *a.* Auctoris 57. *b.* Prognofis 58. *a.* cura veterum 58. *b.* Paracelli, & Helmontii 59. *b.* VVillifii 60. *a.* Sylvii 60. *b.* Cartel. 61. *b.* Auctoris 62. *b.*
- Efferveſcentia quomodo fiat 335. *a.*
- Ethulio 517. *a.*
- Elatium in Hydrocephalo auxiliatur 4. *a.*
- Elephantiaſis, ſeu Lepra Arabum 556. *b.* Pars affecta 557. vocatur etiam Satyriasis 559. *a.* causa Paracelli 559. *b.* Prognofis 565. *b.* cura Galenic. 566. *b.* Paracelli 568. *a.* Auctoris 573. *b.*
- Elephantiaſis optimo jure cancer totius corporis, ſeu gangrena omnium glandularum dici meretur 563. *b.*
- Elisir cephalicum Michaelis in Hydrocephalo prodeſt 7. *a.* proprietatis Paracelli, & ſalis ejusdem canitem curant 16. *a.*
- Embryulcia, vide Fœtus mortui extractio 445. *b.*

- Emaciation, & innumera ulcera inteſtinorum ex abuſu ſucci citri orta, causa ſunt mortis Electoris Palat. Caroli 641. *a.*
- Eminentia ſcoſa 576. *a.*
- Emollientia ut agant 59. *a.* in Broncheolecte. n. ducunt 261. *b.* in Scrophulis 259. *b.*
- Emphyſema, & Pars affecta 586. *a.* Diagnofis, causa Galenicorum, & Paracelli 586. *b.* Helmontii, VVillifii, & Sylvii 587. *a.* Cartefianorum 587. *b.* Auctoris 588. *b.* Prognofis 589. *a.* cura Galenicorum 589. *b.* Paracelli, & Helmontii 590. *a.* VVillifii 590. *b.* Sylvii, & Cartefianorum 591. *a.* Auctoris 593. *a.*
- Emphyſema mammarum 299. *a.* Diagnofis 299. *b.* causa Galenicorum 300. *a.* Paracelli, & Helmontii 300. *b.* VVillifii, & Sylvii 301. *a.* Cartel. 301. *b.* Auctoris 303. *a.* Prognofis 304. *a.* cura Galenicorum 305. *a.* Paracelli 305. *b.* VVillifii 306. *b.* Sylvii 307. *a.* Cartel. 308. *b.* Auctoris 311. *b.*
- Emphyſema palpebrarum 54. *a.* Diagnofis 54. *b.* causa Galenicorum, & Paracelli 55. *a.* Helmontii 55. *b.* VVillifii 56. *a.* Sylvii 56. *b.* Cartefianorum 57. *a.* Auctoris 57. *b.* Prognofis 58. *a.* cura veterum 58. *b.* Paracelli 59. *a.* Helmontii 59. *b.* VVillifii 60. *a.* Sylvii 60. *b.* Cartefianorum 61. *a.* Auctoris 62. *a.*
- Emplaſtra capiti applicata ad Hydrocephalum 5. *b.*
- Emplaſtrum de curino in œdemate 545. *a.* diachylon ſimplex capitis vulnera curat 27. *b.* contra livorem faciei Myſiſchii ad contuſionem utile 28. *a.* ad ſtrumas 259. *b.* emolliens ad viſcerum ſcirrhos 359. *a.* de laduo ad tumores œdematoſos diſcutiendos 545. *a.* de herba theæ Auctoris in diſſolvendis tumoribus egregium eſt 546. *a.* magneticum prodeſt in Hernia 333. *b.* deſenſum vulnerarium 697. *a.* Norimbergenſe 748. *b.* anodynum Auctoris 772. *a.*
- Empyrema à glandibus tormentariis factum periculolum 576. *b.*
- Encanth's, & causa Galenicorum 66. *a.* Paracelli, Helmontii, VVillifii, & Sylvii 66. *b.* Cartefianor. & Auctoris 67. *a.* cura Galenic. 67. *b.* Paracelli 68. *a.* Helm. & VVill. 68. *b.* Sylvii 69. *a.* Cartefianorum 69. *a.* Auctoris 70. *a.*
- Endivia bilis fervorem reſtingit, & diuretica eſt 193. *b.*
- Enterocœle, ſeu Hernia inteſtinalis 397. *a.* causa Galenicorum 398. *a.* Paracelli, & Helmontii 398. *b.* VVillifii, & Sylvii 399. *a.* Cartefianorum 399. *b.* Auctoris 400. *a.* Prognofis 400. *b.* Dieta & cura Galen. 401. *a.* Paracelli 403. *b.* Helmontii, & VVillifii 404. *b.* Sylvii 405. *b.* Cartefianorum 406. *a.* Auctoris 407. *a.*
- Enteromphalos 379. *a.* cura 385. *a.*
- Ephauſtimata 576. *a.*
- Ephelides 194. *b.* 608. *a.* Pars affecta 608. *b.* Diagnofis, & causa Galenicorum 609. *a.* Helmontii, & VVillifii 609. *b.* Sylvii 610. *a.* Cartefianorum 611. *a.* Auctoris 612. *a.* Prognofis 613. *a.* cura Helmontii, & VVillifii 615. *b.* Sylvii 616. *a.* Cartefianorum 617. *a.* Auctoris 619. *a.*
- Epiglottis 262. *a.*
- Epiglottidis induratio 262. *a.* Diagnofis 262. *b.* causa Galenicorum, Paracelli, & Helmontii 263. *a.* VVillifii, Sylvii, & Cartefianorum 263. *b.* Auctoris 264. *a.* Prognofis 264. *b.* Dieta



# I N D E X.

- Diæta 265. *a.* cura Galenic. 266. *a.* Paracelsi, Helmontii, & VVillifii 266. *b.* Sylvii 267. *a.* Cartesianoium 267. *b.* Autoris 268. *b.*
- Epilepsia à cranii fractura 30. *b.* à sternutatione orta 146. *b.* parva dicitur sternutatio 142. *b.*
- Epinyctides 576. *a.* Pars affecta, & Diagnofis 576. *b.* caufa Galenicorum 577. *a.* Paracelsi & Helmontii 577. *b.* VVillifii 578. *a.* Sylvii 578. *b.* Cartel. 579. *a.* Autoris 580. *a.* Prognofis 580. *b.* cura Galenicorum 581. *a.* Paracelsi 581. *b.* Helmontii 582. *a.* VVillifii 582. *b.* Sylvii & Cartesian. 583. *a.* Autoris 584. *a.*
- Epiphora 71. *a.*
- Epiplocele, feu Hernia umbilicalis 397. *a.* caufa Galenicorum 398. *a.* Paracelsi & Helmontii 398. *b.* VVillifii & Sylvii 399. *a.* Cartesianoium 399. *b.* Autoris 400. *a.* Prognofis 400. *b.* Diæta, & cura Galenicorum 401. *a.* Paracelsi 403. *b.* Helmontii & VVillifii 404. *b.* Sylvii 405. *b.* Cartesianoium 406. *a.* Autoris 407. *a.*
- Epiplocephalus 379. *a.*
- Erythema ad fcapophalus 259. *b.*
- Erythymum Tineæ convenit 14. *b.*
- Erythra, vide Parulis.
- Erythra gingivarum 221. *a.*
- Erythra palati 231. *a.* caufa Galenicorum 231. *b.* Paracelsi, Helmontii & VVillifii 232. *a.* Sylvii & Cartel. 232. *b.* Autoris 233. *a.* cura VVillifii & Sylvii 235. *a.* Cartesianoium 235. *b.* Autoris 236. *b.*
- Erythra testiculorum 386. *b.* Diagnofis 387. *a.* caufa Galenicorum 387. *b.* Helm. VVillifii, Sylvii & Cartel. 388. *a.* Autoris 389. *a.* Prognofis 389. *b.* cura Galenicorum, & Paracelsi 391. *b.* Helmontii 392. *a.* VVillifii 392. *b.*
- Erythra Hydrocephalo in adultis opitulantur 7. *b.*
- Erythra & ejus Pars affecta 523. *a.* Differt ab inflammatione. Diagnofis. color ruber & calor unde 523. *b.* caufa Galenicorum 524. *a.* Paracelsi & Helmontii 524. *b.* VVillifii 525. *a.* Sylvii & Cartesianoium 525. *b.* Autoris 526. *a.* Prognofis & Diæta 528. *a.* cura Galenicorum 528. *b.* Paracelsi 530. *a.* Helmontii 530. *b.* VVillifii, Sylvii & Cartel. 531. *a.* Autoris 532. *b.*
- Erythra an admittat medicamenta humida 533. *b.*
- Erythra à cauterio potentiali inusta à quo removeantur 70. *b.*
- Erythra tartari hydrocephalo competit 4. *b.* Paracelsi ex alhandal, cum aqua præcipitata in hydrocephalo prodest 4. *b.* Antimonii Plicam curat 16. *a.* castorei in Hydrocephalo prodest 7. *a.* viperina Zveffleri ad Alopecia 20. *a.* in tumore glandularum jugularum 249. *b.* carminativa Myrsichitelluri an febri ejusdem mîta specifica est, ad glandularum colli tumores 249. *b.* lignorum prodest in Hydrocephalo 7. *a.* matricalis Autoris in uteri inflammatione 457. *b.* 458. *a.* antivencera Autoris 733. *a.*
- Erythra 576. *a.* Pars affecta, & Diagnofis 576. *b.* caufa Galenicorum 577. *a.* Paracelsi & Helmontii 577. *b.* VVillifii 578. *a.* Sylvii 578. *b.* Cartesianoium 579. *a.* Autoris 580. *a.* Prognofis 580. *b.* cura Galenicorum 581. *a.* Paracelsi & Helmontii 582. *a.* VVillifii 582. *b.* Sylvii 583. *a.* Cartesianoium 583. *b.* Autoris 584. *a.* Eunuchi immunes sunt à calvitie 12. *b.* barbim ipsis producere impossibile 20. *a.*
- Euphorbii oleum Alopecia, Arca & Ophiasii auxiliatur 14. *b.*
- Evulio in carie dentium laudatur 218. *b.*
- Excitio canceri mammarum, quia operatio periculo plenissima non est tentanda 305. *b.*
- Excrementa diutius retenta gravia male inferunt 335. *a.*
- Excrementa gingivæ, & Diagnofis 221. *a.* caufa Galenicorum, Paracelsi, Helm. & VVillifii 221. *b.* Sylvii, Cartel. & Autoris 222. *a.* Prognofis 222. *b.* cura Galenicorum 223. *a.* Helm. & VVillifii 223. *b.* Sylvii & Cartel. 224. *a.* Autoris 224. *b.*
- Excrementa penis 412. *b.* Diagnofis 413. *b.* caufa Galenicorum, & Paracelsi 414. *a.* Helmontii, VVillifii & Sylvii 414. *b.* Cartesianoium 415. *a.* Autoris 415. *b.* Prognofis 416. *b.* cura Galenicorum 418. *a.* Paracelsi 418. *b.* Helmontii 419. *a.* VVillifii 419. *b.* Sylvii 420. *b.* Cartel. 421. *b.* Autoris 423. *a.*
- Ex octo assumptorum duæ in nutritionem convertuntur, reliquæ sex per vias excretorias & insensibilem transpirationem abeunt 476. *a.*
- Exomphalus 380. *b.*
- Exophthalmia, seu Procidencia oculi 44. *a.*
- Exostosis 37. *a.* caufa veterum 37. *b.* Paracelsi & Helmontii 38. *a.* VVillifii, Sylvii & Cartesianoium 38. *b.* Autoris 39. *a.* Prognofis 39. *b.* cura veterum, Paracelsi & Helmontii 40. *a.* VVillifii & Sylvii 40. *b.* Cartesianoium 41. *a.* Autoris 41. *b.*
- Experientia æque flutorum, ac sapientum magistra est 720. *b.*
- Extensio in incurvatione articulorum 719. *a.* in luxationibus 720. *b.* duplex, Palestrina & medica *ibid.*
- Extractio Polypi narium 140. *a.*
- Exstirpatio membri spheclati 670. *b.* 671. *a.*
- Exulceratio cancerosa, à febricitis gradu tantum differt 549. *a.*

## F.

- F**abaria dorso appenda Hamorrhoidibus medetur 345. *a.*
- Facies quid? 226. *a.* *b.* rutilo colore perfusa à læsa matris imaginatione ab incendio 609. *a.* morbi ejus 184. *a.*
- Fallopium ex percussione abdominis materni Hydrocephalo laboravit 2. *b.*
- Farina virginea Myrsichit ad Dentium sorditium, & tophos laudatur 215. *b.*
- Fascia Guidonis in Hydrocephalo confert 7. *a.*
- Fasciarum religatio in fractura ossium 730. *b.*
- Fasciatio in luxatione articulorum 721. *a.*
- Faucium usus & morbi 238. *a.*
- Febris in genere quid? 114. *b.* in Catarrhis unde 114. *b.* in inflammatione 480. *a.* in puerperis lochiis fluentibus 458. *a.* in omnibus inflammationibus non est sensibilis, & ante generatum pus est intensior 484. *b.* quid in bubonibus significet 501. *b.* in Erythelate unde 524. *a.* cura ejus in cancro 554. *a.* succedens Alopecia unde 12. *a.*
- Fermentatio ciborum in ventriculo ut fiat 470. *b.*

FFFF

Fermen-

# I N D E X.

**Fermentorum penuria in senibus non refarcitur** 16. *b.*

**Fermentum ventriculi quid?** 470. *b.* 537. *b.*

**Fervida dentibus sunt inimica** 218. *a.*

**Ficus** 576. *a.* Pars affecta 576. *b.* **Diagnosis**, & causa Galenicorum 577. *a.* Paracelli, & Helmontii 577. *b.* VVillifii 578. *b.* Cartesiano- rum 579. *b.* Autoris 580. *a.* **Prognosis** 580. *b.* cura Galenicorum 581. *a.* Paracelli, & Helmontii 582. *a.* VVillifii 582. *b.* Cartesiano- rum 583. *b.* Autoris 585. *b.*

**Ficus ani** 335. *a.*

**Ficus cancriosus** 44. *a.* **Diagnosis** 44. *b.* causa Ga- lenicorum 45. *a.* Paracelli, & Helmontii 45. *b.* VVillifii, & Sylvii 46. *a.* Cartesiano- rum 46. *b.* Autoris 47. *b.* **Prognosis** 48. *a.* cura Gale- nicorum 48. *b.* Paracelli 49. *b.* Helmontii 50. *a.* VVillifii 51. *a.* Sylvii 51. *b.* Cartesiano- rum 52. *a.* Autoris 53. *a.*

**Ficus scirrhosus** 44. *a.* **Diagnosis** 44. *b.* causa Ga- lenicorum 45. *a.* Paracelli, & Helmontii 45. *b.* VVillifii, & Sylvii 46. *a.* Cartesiano- rum 47. *a.* Autoris, & Prognosis 48. *a.* cura Galen. 49. *a.* Paracelli 49. *b.* Helmontii 50. *a.* VVillifii 51. *a.* Sylvii 51. *b.* Cartesiano- rum 52. *a.* Autoris 53. *a.*

**Fistula labiorum** 173. *b.* **Diagnosis**, & causa Ga- lenicorum 174. *a.* Paracelli, & Helmontii 174. *b.* VVillifii, & Sylvii 175. *a.* Cartesiano- rum 175. *b.* Autoris 177. *a.* **Prognosis** 177. *b.* cura Galenicorum 178. *b.* Paracelli, & Hel- montii 179. *a.* VVillifii 179. *b.* Sylvii 180. *a.* Cartesiano- rum 180. *b.* Autoris 182. *b.*

**Fistula papillarum**, & causae Galenicorum, Para- celli, & Helmontii 113. *a.* VVillifii, & Car- tesiano- rum 113. *b.* Autoris & Prognosis 114. *a.* cura Galenici, Helmontii, & VVillifii 114. *b.* Sylvii, & Cartesiano- rum 115. *a.* Autoris 115. *b.*

**Fistula ani** 335. *a.* causa Galenicorum, & Para- celli 336. *a.* Helmontii, VVillifii, & Sylvii 336. *b.* Cartesiano- rum 337. *a.* Autoris 337. *a.* **Prognosis** 338. *a.* cura Galenicorum 340. *a.* Paracelli & Helmontii 341. *a.* VVil. 341. *b.* Sylvii 342. *a.* Cartesiano- rum 343. *a.* Autoris 344. *b.*

**Fistula narium** 734. *a.* **Diagnosis** 734. *b.* causa Galenicorum 735. *a.* Paracelli, Helmontii, VVillifii, & Sylvii 735. *b.* Cartel. & Autoris 736. *a.* **Prognosis** 737. *b.* cura Galenicorum, & Paracelli 738. *a.* Helmontii, VVillifii, Sylvii, & Cartesiano- rum 738. *b.* Autoris 739. *a.*

**Fistula pilorum** 9. *a.* causa Galenicorum 10. *a.* Paracelli 10. *b.* Helmontii, & VVillifii 11. *a.* Sylvii 11. *b.* Autoris 13. *b.* **Prognosis** 14. *a.* cura Galenicorum 16. *a.* Paracelli 16. *b.* Helm. 17. *a.* VVillifii 17. *b.* Sylvii 18. *a.* Cartel. 19. *b.* Autoris 22. *b.*

**Fistula pudendi muliebris cur ampla sit** 462. *a.*

**Fistula unguium** 749. *a.* causa Galenicorum 749. *b.* Paracelli, & Helmontii 750. *a.* VVillifii, & Sylvii 750. *b.* Cartesiano- rum 751. *a.* Au- toris 751. *b.* **Prognosis**, & Dieta 752. *a.* cura Helmontii 753. *b.* Sylvii 754. *a.* Autoris 754. *b.*

**Fistula** 631. *b.* **Diagnosis** 633. *b.* causa Galenico- rum 634. *b.* Paracelli 635. *b.* Helm. & VVill. 636. *b.* Sylvii, & Cartel. 637. *a.* Autoris 639. *a.* **Prognosis** 640. *b.* cura Galenicorum 643. *a.*

Paracelli 645. *b.* Helm. 646. *b.* VVillifii, & Sylvii 647. *b.* Cartel. 649. *a.* Autoris 655. *a.*

**Fistula ani** 335. *a.* causa Galenicorum, & Para- celli 336. *a.* Helmontii, VVillifii, & Sylvii 336. *b.* Cartel. 337. *a.* Autoris 337. *b.* **Pro- gnosis** 338. *a.* cura Galenicorum 339. *b.* Pa- racelli 340. *b.* Helmontii 341. *a.* VVillifii 341. *b.* Sylvii 342. *a.* Cartesiano- rum 342. *b.* Autoris 343. *b.*

**Fistula dentium** 205. *b.* causa VVillifii 207. *b.* Sylvii, & Cartel. 208. *a.* Autoris 210. *a.* **Pro- gnosis** 211. *a.* cura Galenicorum 212. *a.* VVil- lifii 213. *b.* Cartesiano- rum 215. *a.*

**Fistula pulmonalis**, seu Bronchus 251. *a.* seu Trachea, vel aspera arteria 269. *a.*

**Fistula lachrymalis**, Pars affecta, & causa veterum 66. *a.* VVillifii 66. *b.* Cartel. & Autoris 67. *a.* **Prognosis**, & Dieta 67. *b.* cura Galen. & Paracelli 68. *a.* Helmontii 68. *b.* VVillifii, & Sylvii 69. *a.* Cartesiano- rum 69. *b.* Autoris 70. *b.*

**Fistula maxillarum**, & **Diagnosis** 226. *a.* causa Galenicorum, & Paracelli 226. *b.* Helmontii, VVillifii, Sylvii, & Cartesiano- rum 227. *a.* Autoris 227. *b.* **Prognosis** 228. *a.* cura Gale- nicorum, & Paracelli 228. *b.* Helmontii, & VVillifii 229. *a.* Sylvii 229. *b.* Cartesiano- rum 230. *a.* Autoris 230. *b.*

**Fistula thoracis** 281. *a.* **Diagnosis**, causa Gale- nicorum, & Paracelli 282. *b.* Helmontii, VVil- lifii, Sylvii, Cartel. & Autoris 283. *a.* **Pro- gnosis** 283. *b.* cura Galenicorum 284. *b.* Para- celli, & Helmontii 285. *a.* VVillifii, & Sylvii 285. *b.* Cartesiano- rum 286. *b.* Autoris 288. *b.*

**Fistula vesicae** 360. *a.* causa Galenicorum, & Pa- racelli 361. *b.* Helmontii, & VVillifii 362. *a.* Sylvii 362. *b.* Cartesiano- rum 363. *a.* Autoris 363. *b.* **Prognosis** 364. *a.* cura Galenicorum 365. *a.* Paracelli 366. *a.* Helmontii 366. *b.* VVillifii 367. *a.* Sylvii 368. *a.* Cartel. 369. *a.* Autoris 370. *a.*

**Fistula urinae**, seu urethra 360. *b.*

**Flatus** 588. *b.*

**Fließbrunn** 386. *b.*

**Flug** 185. *a.* 608. *b.*

**Fluiditas in quo consistat** 470. *b.*

**Fluxus synoviae in fractura ossium** 731. *b.*

**Feminae immunes sunt à calvitie** 12. *b.* cur non barbatae, vetulae verò cur barbatae 20. *a.* ca- rum peior conditio est, quia pluribus angos- tibus vexantur, à quibus viri immunes exi- stunt 444. *a.*

**Feniculi radix in hydrocephalo commendatur** 4. *a.* herba ejus in oculorum affectibus com- mendatissima, & ejus liquor saccharatus 83. *a.*

**Factor in cancro unde** 549. *a.*

**Factor oris** 195. *a.* causa Galenicorum 195. *b.* Paracelli, & Helmontii 196. *a.* VVillifii 196. *b.* Sylvii 197. *a.* Cartel. 197. *b.* Autoris 199. *b.* **Prognosis** 200. *a.* cura Galenicorum 200. *b.* Paracelli, & Helmontii 201. *a.* VVill. 201. *b.* Sylvii 202. *a.* Cartel. 203. *a.* Autoris 204. *b.*

**Factor pedum** 761. *b.* **Diagnosis** 762. *a.* causa Pa- racelli, & Helmontii 763. *a.* cura Paracelli 767. *b.* Autoris 772. *b.*

**Fetus extrahendi faciliis methodus** 450. *a.*

**Fetus mortui extractio** 444. *b.* **Diagnosis** 445. *b.* causa Galenicorum, & Paracelli 446. *b.* Helmontii 446. *b.* VVillifii 447. *a.* Sylvii

# I N D E X.

447. *b.* Cartel. 448. *b.* Autoris 449. *b.* Prognosis 450. *a.* cura Galenicorum 453. *a.* Paracelsi 454. *a.* Helmontii, & VVillii 454. *b.* Sylvii 455. *b.* Cartesiorum 457. *b.* Autoris 461. *a.*

Factus vita propria vivit, & matre mortua supervire potest 461. *b.*

Folliculus tumorum cysticorum ut generetur 588. *b.*

Fontanella, seu Sirialis 37. *b.*

Fonticulus laudatur in Angina 248. *a.* nocet in ulceribus 650. *b.* quia sanguinis partem subtiliorem, elicit rejicitur in Elephantiasi 575. *b.* in Ophthalmia inveterata laudatur 82. *a.* in obocitate 478. *a.* au prolic in Odontalgia 217. *a.*

Forisad Tineam 14. *b.*

Fovea mammarum 299. *a.* Diagnosis, & causa Galenicorum 300. *a.* Paracelsi, & Helmontii 300. *b.* VVillii, & Sylvii 301. *a.* Cartesiorum 302. *a.* Aut. 303. *b.* Prognosis 304. *a.* cura Galenicorum 305. *b.* Paracelsi, & Helmontii 306. *a.* VVillii 306. *b.* Sylvii 307. *a.* Cartesiorum 309. *a.* Autoris 312. *a.*

Foveæ papillarum, & causa Galenicorum, Paracelsi, & Helmontii 315. *a.* VVillii, & Cartesiorum 315. *b.* Autoris, & Prognosis 314. *a.* cura Galenicorum, Paracelsi, Helmontii, & VVillii 314. *b.* Sylvii, & Cartel. 315. *a.* Autoris 315. *b.*

Frænum labiorum pudendi muliebris 462. *a.*

Frænum linguae 159. *b.* Diagnosis, & causa Galenicorum 159. *a.* Paracelsi, 159. *b.* Helmontii, & VVillii 160. *a.* Sylvii 160. *b.* Cartesiorum 161. *a.* Autoris 162. *a.* Prognosis 164. *a.* cura Galenicorum 165. *a.* Autoris 169. *a.*

Frænum penis quid 241. *a.*

Frænum linguae non unguibus, sed instrumentis discernendum, neque nuntii acie vel phibotomo B. hyonorum 169. *a.* in aula Castellana sit fornice Paritina 169. *b.* non semper opus est hæc operatio, & quandoque periculosa evadit, inducens Pyralismum, vel convulsionem linguae ex latis vasibus, fibrilibus vel nervis 169. *b.*

Fractura costarum 295. *a.* Diagnosis 295. *b.* causa Galenicorum, Paracelsi, Helmontii, VVillii, Sylvii, & Cartesiorum 296. *a.* Autoris 296. *b.* cura Galenicorum, & Paracelsi 297. *a.* Helmontii, VVillii, Sylvii, & Cartel. 297. *b.* Autoris 298. *a.*

Fractura cranii 29. *a.* Diagnosis 30. *a.* causa Galenicorum, & Paracelsi 31. *a.* Helmontii, VVillii, Sylvii, Cartel. Autoris, Prognosis, & Diata 31. *b.* cura Galenicorum, & Paracelsi 32. *a.* Helmontii, VVillii, & Sylvii 32. *b.* Cartesiorum 33. *a.* Autoris 33. *b.*

Fractura luxationi juncta periculosissima 721. *b.* ejus cura 720. *a.*

Fractura ossium 722. *a.* Diagnosis 723. *a.* causa Galenicorum, & Paracelsi 724. *a.* Helmontii, VVillii, & Sylvii 624. *b.* Cartesiorum, & Autoris 725. *a.* Differentiæ 725. *b.* Prognosis 726. *b.* cura Galenicorum 727. *a.* Paracelsi 727. *b.* Helmontii, & VVillii 728. *a.* Sylvii 728. *b.* Cartesiorum 729. *a.* Autoris 729. *b.* per Syntetismum 730. *b.*

Frigida Hydrocephalo contraria 7. *a.* dentibus

noxia 218. *a.* sanguinem instil gelatinæ coalescere faciunt 450. *b.* effluim & cervorum affectibus inimica 35. *b.* frigida aqua potus Anginam producit 241. *b.*

Frigus humores coagulat, poros obstruit, & spiritus animales inspicit 74. *b.* suppurationem impedit 116. *a.* nasci insit, immationem, & Erysipelas inducit 135. *a.* dentibus est inimicum 209. *b.*

Fucus muliebris 194. *b.*

Fugile apostema aurium Paracelsi 111. *b.* ejus cura 117. *b.*

Fumaria in Tinea laudatur 14. *b.* ejus vires; nam humores acres mitigat in Phlogi 193. *b.*

Fumus in effervescencia inde 535.

Fungus cerebri 37. *a.* Diagnosis, & causa veterum 37. *b.* Paracelsi, & Helmontii 38. *a.* VVillii, & Sylvii 38. *b.* Cartel. & Autoris 39. *a.* Prognosis 39. *b.* cura veterum, Paracelsi, & Helmontii 40. *a.* VVillii, & Sylvii 40. *b.* Cartesiorum 41. *a.* Autoris 41. *b.*

Furci, & Pars affecta 600. *a.* Diagnosis causa Galenicorum, & Paracelsi 600. *b.* Helmontii, & Sylvii 601. *a.* Cartel. 601. *b.* Prognosis 602. *b.* cura Galenicorum 603. *a.* Paracelsi 603. *b.* Sylvii 604. *a.* Cartel. 605. *a.* Autoris 607. *b.*

Fungi venenati tumorem linguae produciunt 162. *a.*

Furfuratio est porrigo 8. *b.*

Furfura in Herpetibus unde 527. *b.*

Furfurati qui dicuntur 8. *b.*

Furfures 608. *a.* Pars affecta 608. *b.* Diagnosis, & causa Galenicorum 609. *a.* Paracelsi, Helmontii, & VVillii 609. *b.* Sylvii 610. *a.* Cartesiorum 610. *b.* Autoris 611. *b.* cura Galenicorum 613. *b.* Paracelsi 614. *b.* Sylvii 616. *a.* Cartel. 616. *b.* Autoris 618. *a.*

Furunculus 510. *b.* Pars affecta, Diagnosis, & causa Galenicorum 511. *a.* Paracelsi, Helmontii, & VVillii 511. *b.* Sylvii 512. *a.* Cart. & Autoris 512. *b.* Prognosis 513. *a.* cura Galen. Paracelsi, Helmontii 514. *a.* Sylvii 514. *b.* Cartel. 515. *a.* Autoris 516. *a.*

## G.

**G**Alli ob ærem calidiorem nigriores Anglis, Danis aut Germanis 613. *a.*

Ganglion 585. *a.* Pars affecta, & Diagnosis, 586. *a.* causa Galenicorum, & Paracelsi 586. *b.* Helmontii, VVillii, Sylvii, & Cartel. 587. *a.* Autoris 587. *b.* Prognosis 589. *a.* cura Galenicorum 589. *b.* Paracelsi, Helmontii, & VVillii 590. *a.* Sylvii 590. *b.* Cartesiorum 591. *a.* Autoris 591. *b.*

Gangræna 658. *a.* Pars affecta 658. *b.* Diagnosis & causa Galenicorum 659. *a.* Paracelsi, & Helmontii 659. *b.* VVillii, Sylvii, & Cartesiorum 660. *a.* Autoris 660. *b.* Prognosis 663. *a.* cura Galen. 664. *b.* Paracelsi 665. *a.* Helmontii, & VVillii, 665. *b.* Sylvii, & Cartesiorum 666. *a.* Autoris 666. *b.*

Gangræna in variolis facile maxillam, & genam invadit 230. *b.* in inflammatione ut præcavenda 495. *b.* in contusione capitis unde 23. *b.* post morsum canis rabidi 661. *b.*

Gangræna perinæ 371. *b.* causa Galenicorum Parac. & Helmontii 372. *a.* VVillii, & Sylvii 372. *b.* Cartesiorum 373. *a.* Autor. 374. *b.* Prognosis 375. *a.* cura Galenicorum 375. *b.* Paracelsi

Ffff 2 &

# I N D E X.

- & Helmontii 376. a. VVillif. & Sylvii 376. b. Cartefianorum 377. a. Autoris 378. b.
- Gargarcon seu uvula 231. a.
- Gargarilina de tormentilla Mynfichti, ad gingivarum erosionem, & exulcerationem laudatur 225. b. ad Anginam 248. b.
- Gas seu halitus 38. a. 536. a. 76. b.
- Gasteranax Rex abdominis est 317. a.
- Geſtrās 32. a.
- Genarum tumor in Odontalgia bonum 211. a.
- Genitalium in viris morbi 386. a. in feminis morbi 900. a.
- Germani natura corpulentiores sunt Gallis & Italis propter aërem borealem 472. b.
- Geſchwär 576. a.
- Gibboſitas vel Gibbus 289. a. Diagnofis, & cauſa Galenicorum, & Paracelli 289. b. Helmontii, VVillifii, Sylvii, & Cartefianorum 290. a. Autoris 290. b. Prognofis 291. a. cura Galen. 292. a. Paracelli, Helm. & VVill. 292. b. Sylvii 293. a. Cartef. 293. b. Autoris 294. a.
- Gibboſi facile fiunt phthiſici, & faucium aſperitatem habent, & difficulter ſpirant 291. a. pauci ſexaginta annos tranſgreſſi ſunt 291. b.
- Gingivæ exereſcentia, vide Exereſcentia gingivæ 221. a.
- Gingivæ multis ad latera glandulis ornata 221. b. conſumitur ut curentur 225. b. earum hæmorrhagia quomodo ſiſtatur 225. b. morbi 221. a. tumor in Odontalgia bonum 211. a.
- Glandulæ conglomeratæ colli ſunt Pars affecta in Scrumis, aliam habent uſum quam conglomeratæ 251. a.
- Glandulæ cutaneæ, quando & quare deficiant 12. a. earum officium 526. a. pilofæ 9. a.
- Glandulæ interſinorum quænam uſum præſtent 471. b.
- Glandulæ jugulares 239. a. miliares 522. b. 526. a.
- Glandulæ lachrymalis vitia 65. a.
- Glandulæ meſenterii afficiuntur in Scrophuloſis 251. a.
- Glandularum affectus, quam aliarum partium, cur difficilior curentur 115. b.
- Glandularum ſtructuræ 498. a. diviſio in conglomeratas & conglomeratas 498. b.
- Glaus penis 413. a.
- Gliederſchmann 600. a.
- Gires dormientes pinguioribus evadunt 473. a.
- Glottis 262. a.
- Glottidis conſtriſtio 262. a. Diagnofis 262. b. cauſa Galenicorum, Paracelli, Helm. & VVillifii 263. a. Sylvii, Cartef. & Autoris 263. b. Prognofis 264. a. Diæta 265. a. cura Galenicorum 265. b. Paracelli, Helm. & VVillifii 266. b. Sylvii & Cartefianor. 267. a. Autoris 267. b.
- Gonorrhœa retenta Aphonia inducens 163. a.
- Goffypium partes habet rigidiores 35. b.
- Grando 65. a. cauſa Galenicorum, Paracelli, & Helmontii 63. b. VVillifii, Sylvii Cartefianorum, & Autoris 64. a. cura Galenicorum, Paracelli, & Helmontii 64. b. VVillifii, Sylvii, & Cartefianorum 65. a. Autoris 65. b.
- Gratiola in hydrocephalo laudatur 7. a.
- Gravido, vide Cryza 142. a.
- Grüßelſucht 576. a.
- Gryllus aurem ingreſſus 122. b.
- Guajacum in hydrocephalo commendatur 5. b.
- Gula, vide æſophagus, ejus affectus 275. a.
- Gumma, vel Gummi calvaſe 37. a. Diagnofis, & cauſa veterum 37. b. Paracelli, & Helmontii 38. a. VVillifii, Sylvii & Cartef. 38. b. Autoris 39. a. Prognofis, & cura veterum 39. b. Paracelli & Helmontii 40. a. VVillii Sylvii, & Cartefianorum 40. b. Autoris 41. a.
- Gurgulio, ſeu uvula 231. a.
- Gutture depravatus, immutatus & abolitus 158. b. cauſa Galenicorum, & Paracelli 159. b. Helmontii 160. a. VVillii 160. b. Sylvii 161. a. Cartefianorum 162. a. Autoris 163. b. Prognofis 164. b. cura Galenica, & Paracelli 166. a. Helmontii, & VVillii 166. b. Sylvii 167. a. Cartef. 168. b. Autoris 172. b.
- Gutture organum quoddam ſit 163. b. acuti cauſa 161. a.
- Gutta roſacea & Differentiæ ejus 185. a. Pars affecta, Diagnofis, & cauſa Galenicorum 185. b. Paracelli, & Helmontii 186. a. VVillii, & Sylvii 186. b. Cartef. & Autoris 187. a. Prognofis 188. b. cura Galenicorum 189. a. Paracelli 189. b. Helmontii, & VVillii 190. a. Sylvii, & Cartef. 191. a. Autoris 192. a.
- Gutta ſerena, ſeu Amauroſis 193. b. Diagnofis 104. a. cauſa Galenicorum 194. b. Autoris & Prognofis 105. b. Diæta 106. a. cura Autoris 109. a.

## H.

- Hæmatomphalos 379. a.
- Hæmodia, ſeu Stupor dentium 206. a. cauſa Galenicorum, & Helmontii 207. a. VVillii 208. a. Cartefianorum 208. b. Autoris 210. a. Prognofis 211. a. cura Galenicorum 212. a. Paracelli 213. a. Helmontii, & VVillii 213. b. Sylvii 214. a. Cartefianorum 215. b. Autoris 220. b.
- Hæmorrhagia cancro ſeſſo, ut curanda 556. a.
- Hæmorrhagia narium 142. a. Pars affecta, & Diagnofis 143. a. cauſa Galenicorum 143. b. Paracelli, Helmontii, & VVillii 144. a. Sylvii 144. b. Cartefianorum 145. a. Autoris 145. b. Prognofis 147. a. Diæta 148. a. cura Galenicorum 148. b. Paracelli 149. a. Helm. & VVillii 150. a. Sylvii 151. b. Cartef. 152. a. Autoris 153. b.
- Hæmorrhagia narium ſingulis ſeptimanis recurrens 156. a. critica & ſymptomatica eſt 142. a. lethalis quæ intra 3. dies 18. libras ſanguinis effudit 142. a. 22. librarum ſanguinis tunc nota, in muliere gravida obſervata 147. a. eam facile hydrops ſequitur, & ex ea cæcitas obſervata 147. a.
- Hæmorrhoides cervicis uteri 425. a. Diagnofis 426. a. cauſa Galenicorum 427. a. Paracelli, & Helmontii 427. b. VVillii 428. b. Sylvii 429. b. Cartefianorum 430. b. Autoris 431. b. Prognofis 432. a. cura Galenicorum 434. a. Paracelli 436. a. Helmontii 437. a. VVillii 438. a. Sylvii 439. a. Cartef. 440. b. Autoris 442. b.
- Hæmorrhoides cæcæ 335. a. 142. a.
- Hæreditaria diſpoſitio ad Plicam excitandam facit 13. a.
- Hæſitatio linguæ 158. b. ejus cauſa 163. b.
- Halſgſchwar 238. b.
- Hepar, ſeu Jecur 345. a.
- Hepata animalium, an cum fructu in Hepate laborante ulſurpentur 152. a.
- Hernia 324. a. an ſemini etiam ſupervenire poſſit

# I N D E X

possit 324. *a.* quænam in praxi frequentiores 325. *a.* à variis visceribus ortæ 378. *b.* non semper à ruptura, sed dilatatione & extensione peritonæi oritur 326. *b.* 378. *b.* intestinalis magnetica curatione depelli potest 329. *a.*

**Hernia aquosa**, vide Hydrocele 397. *a.* non est Species Herniæ, sed tumoris 251. *b.*

**Hernia carnosæ**, vide Sarcocoele.

**Hernia intestinalis**, seu Enterocoele 324. *a.* Diagnosîs, & Herniæ species 325. *b.* causâ Galenicorum, Paracelsi, Helmontii, VVillisi, & Sylvii 326. *a.* Cartesii, & Autoris 326. *b.* Prognosis 327. *a.* Diætâ 327. *b.* cura Galeni. 328. *a.* Paracelsi, & Helmontii 329. *a.* VVillisi 329. *b.* Sylvii 330. *a.* Cartesii 330. *b.* Autoris 333. *a.* cura per Sectionem 334. *a. b.*

**Hernia gutturis**, vide Bronchocele 250. *b.*

**Hernia omentalis**, vide Epiplocele.

**Hernia scroti** 396. ejus species 397. *a.*

**Hernia varicosa**, vide Circocele.

**Hernia veneris** 386. *a.*

**Hernia ventosa**, vide Puncumatocele 397. *a.* non est Species Herniæ, sed tumoris 251. *b.*

**Hernia umbilicalis** 379. *a.* causâ Galenicorum 379. *b.* Paracelsi, Helmontii, VVillisi, Sylvii, & Cartesianorum 380. *a.* Autoris 380. *b.* Prognosis 381. *a.* Diætâ 381. *b.* cura Galenicorum 382. *a.* Paracelsi, & Helmontii 382. *b.* VVillisi, Sylvii, & Cartesianorum 383. *a.* Autoris 383. *b.* ejus quædam species 379. *a.* capitis magnitudine, in qua intestina sentiri poterunt 379. *b.* cur familiaris infantibus etiam Parturientibus 381. *a.*

**Herniotomia** 333. *b.* 334. *a.* 404. *b.* 405. *b.* 406. *a.* 407. *a.*

**Herpes quid**, & Pars affecta 525. *a.* Diagnosîs, & causâ Galenicorum 524. *a.* Paracelsi 524. *b.* Helmontii, & VVillisi 525. *a.* Sylvii 525. *b.* Cartesianorum 526. *a.* Autoris 527. *a.* Prognosis 527. *b.* Diætâ 528. *a.* cura Galenicorum 529. *a.* Paracelsi 530. *a.* Helmontii 530. *b.* VVillisi, & Sylvii 531. *a.* Cartesii 532. *a.* Autoris 534. *a.*

**Herpeton**, vide Herpes 523. *a.*

**Hippocrates Medicinæ parens**, & accuratus omnium rerum medicarum observator est 473. *b.*

**Hirudines sanguinis partem subtiliorem**, absumentes in Elephantiasi, alibi que prohibentur 575. *b.* profunt in Ophthalmia 82. *a.*

**Hippocren** 576. *a.*

**Homo præ cæteris animalibus linguam habet solutam** 157. *b.* est pulchritudinis amans 608. *a.* unus quidam continuus existit tubulus 468. *b.* ex meritis tubulis & canaliculis constat 638. *a.*

**Homines extraordinarie corpulenti recensentur** 468. *b.* ad motum tardi, & anhelosi 469. *a.*

**Honigsteden** 608. *b.*

**Hordeolum** 63. *a.* causâ Galenicorum, Paracelsi, & Helmontii 63. *b.* VVillisi, Sylvii, Cartesianorum, & Autoris 64. *a.* cura Galenicorum, Paracelsi, & Helmontii 64. *b.* VVillisi, Sylvii, & Cartesianorum 65. *a.* Autoris 65. *b.*

**Hordeum pinguefacit** 473. *a.*

**Humanum corpus**, præ aliis viventibus morbis divexatur 1. *a.*

**Humor acido-corrosivus in Gallico**, & Scorbutico morbo laborantibus impedimentum est sanationi vulnerum 24. *a.*

**Humor aqueus à lymphâ gignitur** 53. *b.* an restitui possit 109. *a.* restitutiva remedia 96. *b.* 109. *a.* à circulatione restitui potest 106. *a.* ejus origo 96. *a.* non est excrementum, sed proprium ductum habet 104. *a.*

**Humor vitreus**, & crystallinus restitui nequeunt 109. *a.*

**Humores oculorum quotuplices** 97. *a.* 104. *a.* causâ defectus Helmontii 104. *b.* VVillisi, Sylvii, & Cartesii. 105. *a.* cura Galenicorum 106. *b.* cura defectus humoris aqnei VVillisi, & Sylvii 107. *b.* Cartesianor. 108. *a.* Autoris 109. *a.*

**Hydrargyrum** 761. *a.*

**Hydatis** 588. *a.*

**Hydatis palpebrarum** 54. *b.* causâ Galeni. 55. *a.* Paracelsi, & Helmontii 55. *b.* VVillisi 56. *a.* Sylvii 56. *b.* Cartesii. 57. *a.* Autoris 58. *a.* Prognosis 58. *b.* cura veterum 59. *a.* Paracelsi, & Helmontii 59. *b.* VVillisi 60. *b.* Sylvii 60. *b.* Cartesii. 61. *b.* Autoris 63. *b.*

**Hydragoga Hydrocephalum sanant** 4. *a.*

**Hydrargyrum zonæ inclusum & gestatum tollit omnes cutis defecationes scabiosas** 572. *b.*

**Hydroce**, vide Sudamina.

**Hydrocele** 3. *b.* 397. *a.* causâ Galenicorum 398. *a.* Paracelsi, & Helmontii 398. *b.* VVillisi, & Sylvii 399. *a.* Cartesii. 399. *b.* Autoris 400. *a.* Prognosis 401. *a.* cura Galenicorum 401. *b.* Helmontii 404. *b.* VVillisi 405. *a.* Sylvii 405. *b.* Cartesianorum 406. *a.* Autoris 407. *b.*

**Hydrocephalus**, seu Hydrops capitis, Pars affecta, & Diagnosîs 2. *a.* causâ Galenicorum, Paracelsi, Helmontii, VVillisi, Sylvii, & Cartesii. 2. *b.* Autoris 3. *a.* Prognosis, & Diætâ 3. *b.* cura Pharmaceutica, & Chirurgica Galenicorum 4. *a.* Paracelsi, Helmontii, & VVillisi 4. *b.* Sylvii 5. *a.* Cartesii. 6. *a.* Autoris & cura per Paracethesin 7. *b.* præstat purgare fortius 6. *b.*

**Hydrocephalus infantibus**, & pueris Rachitide simul laborantibus familiaris est 2. *a.* eandem agnoscit causam ac Hydrops, abdominis & differunt saltem loco affecto 3. *a.* in pueris cum Rachitide combinatus sæpe in Apoplexiam transit 7. *b.* quid reddat 4. libras aquæ 3. *a.* dimidium caput occupans 5. *b.* familiaris etiam pueris, quando ipsorum caput in puerperio ab obstetrice rudius contrectatur, & comprimitur 3. *a.* vel oritur à partus difficultate 3. *a.* à flatibus oriri potest 3. *b.* artificialis factus lucri gratia 3. *b.*

**Hydromphalus** 379. *a.* 3. *b.* cura 384. *b.*

**Hydrops species** 3. *b.*

**Hydropicus per serotum**, non aliter ac per cribrum 26. libras aquæ emittit 401. *a.*

**Hydrops capitis**, vide Hydrocephalus 2. *a.*

**Hyemis frigus calvitium producit** 10. *b.*

**Hyperæcarcolis in vulneribus** 703. *a.*

**Hypoglossis** 158. *a.*

**Hysteriæ sæpe sunt aphoniæ** 163. *a.*

**Hypopyon**, & Diagnosîs 85. *a.* causâ Galeni. 85. *b.* Paracelsi 86. *a.* Helmontii 86. *b.* VVillisi, & Sylvii 87. *a.* Cartesianorum 87. *b.* Autoris 88. *a.* Prognosis 88. *b.* cura Galeni. 90. *a.* Paracelsi 90. *b.* Helmontii 91. *a.* VVillisi 91. *b.* Sylvii 92. *a.* Cartesianorum 93. *b.* Autoris 94. *b.*

**Hypophagma**, seu Sugillatio Differentiæ, & Pars affecta 72. *a.* Diagnosîs 72. *b.* causâ Galenicorum, Paracelsi, & Helmontii 73. *a.*



# I N D E X

- VVillisi & Sylvii 73. *b.* Cartel. 74. *a.* Autoris 75. *a.* Prognosis 76. *a.* Dieta 77. *a.* cura Gal. & Paracelli 78. *a.* Helmontii 78. *b.* VVillisi 79. *a.* Sylvii 79. *b.* Cartel. 81. *a.* Autoris 84. *b.*
- Hydroumatica, vide Embryotica, seu fetus mortui extractio 461. *a.* quando locum habet 444. *b.* 457. *b.* 461. *a.*
- I.**
- I**alappa infantibus est purgans tutum ac iucundum, & cum bacca nativa maritata in hydrocephalo conducit 6. *b.*
- Jecur, vide Hepar 345. *a.*
- Jejunum inelimum quare semper reperitur, exinanitum 471. *b.*
- Ignis 674. *a.*
- Ignis Perticus, seu Carboneus 497. *b.*
- Ignis laeet, vide Erysipelas.
- Ignis sylvester vel S. Antonii, vide Erysipelas 523. *a.*
- immobilitas maxillarum, & Diagnofis 226. *a.* causa Galenicorum, & Paracelli 226. *b.* Helmontii, VVillisi, Sylvii, Cartesianorum, & Autoris 227. *a.* Prognosis 227. *b.* cura Galenicorum 228. *a.* Paracelli 228. *b.* Helmontii, VVillisi, & Sylvii 229. *a.* Cartel. 229. *b.* Autoris 230. *a.*
- Imperatoriae radix contra Hydrocephalum laudatur 5. *b.*
- Impetigo 556. *b.* Pars affecta 557. *a.* Diagnofis 558. *b.* causa Galenicorum 559. *a.* Paracelli 559. *b.* Helmontii 560. *a.* VVillisi 560. *b.* Sylvii 561. *a.* Cartel. 562. *a.* Autoris 565. *a.* Prognosis 565. *b.* cura Galenicorum 568. *a.* Paracelli, & Helmontii 569. *a.* Sylvii 570. *a.* Cartesianorum 572. *a.* Autoris 575. *a.*
- Impetioratio papularum, Diagnofis causa Galenicorum, & Paracelli 313. *a.* Helmontii, VVillisi, & Sylvii 313. *b.* Cartesianorum, & Autoris 314. *a.* Prognosis 314. *b.* cura Galen. Paracelli, & Helmontii 314. *b.* VVillisi, & Sylvii 315. *a.* Cartel. 315. *b.* Autoris 316. *b.*
- Impetioratio penis 360. *a.* Diagnofis 361. *a.* causa Galenicorum, & Paracelli 361. *b.* VVillisi, & Sylvii 362. *b.* Cartesianorum 363. *a.* Autoris 363. *b.* Prognosis 364. *b.* cura Galenicorum 366. *a.* VVillisi 367. *b.* Sylvii 368. *a.* Cartesianorum 369. *b.* Autoris 371. *b.*
- Impetioratio pudendi mulieris 461. *a.* Diagn. & causa Galenicorum 462. *b.* Paracelli, Helmontii, VVillisi, & Sylvii 463. *a.* Cartel. 463. *b.* Autoris 464. *a.* Prognosis 464. *b.* cura Galenicorum 465. *a.* Paracelli, Helmontii, & VVillisi 465. *b.* Sylvii 466. *a.* Cartesianorum 466. *b.* Autoris 467. *a.*
- In circulatione humorum non tantum sanitas, sed & vita consistit, hac retardata sanitas penitus verò ablata vita perit 331. *b.*
- Incertantia in inflammationibus obfunt 495. *b.*
- Incurvatio juncturarum 704. *b.* Diagnofis 706. *a.* causa Galen. curam, & Paracelli 706. *b.* Helmontii 707. *b.* VVillisi 708. *a.* Sylvii 708. *b.* Cartesianorum 709. *a.* Autoris 710. *a.* Prognosis 711. *a.* cura Galenic. 712. *b.* Paracelli, & Helmontii 713. *a.* VVillisi 715. *b.* Sylvii 716. *b.* Cartesianorum 717. *a.* Autoris 719. *a.*
- Inaequalitas unguium 739. *a.* causa Galen. & Paracelli 749. *b.* Helmontii, & VVillisi 750. *a.* Sylvii 750. *b.* Cartesianorum, & Autoris 751. *a.* Prognosis & Dieta 752. *a.* cura Galenicorum 752. *b.* Paracelli 753. *a.* Helmontii, VVillisi, & Sylvii 753. *b.*
- Induratio epiglottidis, vide Epiglottidis induratio 262. *a.*
- Infantum arteriarum, & lymphaticarum tunc sunt molliores, quam in adultis 2. *a.* recens natorum ossa crani valentur membranosa 2. *b.* in infantibus humor poae cures thens quibus listendus ne ab illo inferantur convulsiones & Epiphia, vel oculorum inflammatio 69. *b.*
- Inflammatio ab aethere oritur 406. *b.* 411. *a.* ejus variae Species 479. *b.* in ea non refrigerandum 484. *a.* in ea ab acido abstinentiandum 495. *a.*
- Inflammatio aurium 110. *a.* Diagnofis, & causa Galenicorum 110. *b.* Paracelli 111. *b.* Helmontii, & VVillisi 112. *a.* Sylvii 112. *b.* Cartesianorum 113. *a.* Autoris 114. *b.* Prognosis 115. *a.* cura Galenicorum 116. *b.* Paracelli 117. *b.* Helmontii 118. *a.* VVillisi 118. *b.* Sylvii 119. *a.* Cartel. 120. *a.* Autoris 121. *b.*
- Inflammatio manuum 299. *a.* Diagnofis 299. *b.* causa Galenicorum 300. *a.* Paracelli, Helmontii, & VVillisi 300. *b.* Sylvii 301. *a.* Cartel. 301. *b.* Autoris 302. *a.* Prognosis 303. *b.* cura Galenicorum 304. *b.* Paracelli 305. *b.* VVillisi 306. *a.* Sylvii 306. *b.* Cartesianorum 308. *a.* Autoris 310. *a.*
- Inflammatio musculorum abdominis, & causa Galenicorum 379. *b.* Paracelli, Helmontii, VVillisi, Sylvii, & Cartesianorum 380. *a.* Autoris 381. *a.* Prognosis 381. *b.* cura Galenicorum 382. *b.* Paracelli, & Helmontii 382. *b.* VVillisi, Sylvii, & Cartesianorum 383. *a.* Autoris 385. *b.*
- Inflammatio narium, causa Galenicorum, & Paracelli 133. *a.* Helmontii, & VVillisi 133. *b.* Sylvii 134. *a.* Cartesianorum 134. *b.* Autoris 135. *a.* Prognosis 135. *b.* cura Galenicorum 136. *b.* Paracelli 137. *a.* Helmontii 137. *b.* VVillisi 138. *a.* Sylvii 138. *b.* Cartel. 139. *a.* Autoris 141. *a.*
- Inflammatio petuum externarum 478. *a.* Pars affecta 479. *a.* Species ejus 479. *b.* Diagnofis 480. *a.* causa Galenicorum 480. *b.* Paracelli 481. *a.* Helmontii, & VVillisi 481. *b.* Sylvii 482. *b.* Cartesianorum, & Autoris 482. *a.* Prognosis 487. *a.* cura Galenicorum 488. *a.* Paracelli 489. *b.* Helmontii, & VVillisi 490. *a.* Sylvii 490. *b.* Cartel. 491. *b.* Autoris 492. *b.*
- Inflammatio penis 412. *b.* Diagnofis 412. *b.* causa Galenicorum 414. *a.* Helmontii, VVillisi, & Sylvii 414. *b.* Cartel. 415. *a.* Autoris 415. *b.* Prognosis 416. *b.* cura Galenicorum 418. *a.* Paracelli 418. *b.* Helmontii, & VVillisi 419. *a.* Sylvii 420. *a.* Cartesianorum 421. *a.* Autoris 422. *b.*
- Inflammatio perinae 371. *a.* causa Galenicorum Paracelli, & Helmontii 372. *a.* VVillisi, Sylvii, & Cartel. 372. *b.* Autoris 374. *b.* Prognosis 374. *b.* cura Galenicorum 376. *a.* Paracelli, Helmontii, & VVillisi 376. *a.* Sylvii, & Cartesianorum 376. *b.* Autoris 377. *b.*
- Inflammatio scroti 397. *a.* causa Galenic. 398. *a.* Paracelli, & Helmontii 398. *b.* VVillisi, & Sylvii 399. *a.* Cartel. 399. *b.* Autoris 400. *b.* Prognosis 401. *a.* cura Galenicorum 402. *a.* Paracelli, & Helmontii 404. *b.* VVillisi 404. *a.* Sylvii

# I N D E X.

Sylvii 405. *b.* Cartesiorum 406. *b.* Autoris 409. *a.*  
 Inflammatio testium 386. *a.* Diagnofis 387. *a.* cura Paracelli 387. *b.* VVillifii, & Sylvii 388. *a.* Autoris 388. *b.* Prognofis 389. *b.* cura Galen. 390. *a.* Sylvii 393. *a.* Autoris 394. *b.*  
 Inflammatio touffillarum 231. *a.* Diagnofis, & cura Galenicorum 231. *b.* Paracelli, Helm. VVillifii, & Sylvii 232. *a.* Cartesiorum & Autoris 232. *b.* Prognofis 233. *a.* cura Galen. 234. *a.* Paracelli, & Helmontii 234. *b.* VVillifii, & Sylvii 235. *a.* Cartesiorum 235. *b.* Autoris 236. *a.*  
 Inflammatio vetricæ 360. *a.* Diagnofis 361. *a.* caufa Galenicorum, & Paracelli 361. *b.* Helmontii, & VVillifii 362. *a.* Sylvii, & Cartesiorum 362. *b.* Autoris 363. *a.* Prognofis 364. *b.* cura Galenicorum 364. *b.* Paracelli 366. *a.* Helmontii, & VVillifii 366. *b.* Sylvii 367. *b.* Cartel. 368. *b.* Autoris 369. *b.*  
 Inflammatio uteri 444. *a.* Diagnofis 445. *a.* caufa Galenicorum 445. *b.* Paracelli 446. *a.* Helmontii, & VVillifii 446. *b.* Sylvii 447. *a.* Cartel. 447. *b.* Autoris 448. *b.* Prognofis 449. *b.* cura Galenicorum 450. *b.* Paracelli 455. *b.* Helmontii 454. *a.* VVillifii, & Sylvii 454. *b.* Cartel. 455. *b.* Autoris 457. *b.*  
 Inflammatio uvulæ 231. *a.* Diagnofis, & caufa Galenicorum 231. *b.* Paracelli, Helmontii, VVillifii, & Sylvii 232. *a.* Cartel. & Autoris 232. *b.* Prognofis 233. *a.* cura Galenicorum 234. *a.* Paracelli, & Helmontii 234. *a.* VVillifii, & Sylvii 235. *a.* Cartel. 235. *b.* Autoris 236. *a.*  
 Inflammatio vaginæ, & uteri 413. *b.* Diagnofis 413. *a.* caufa Galen. & Paracelli 414. *a.* Helmontii, VVillifii, & Sylvii 414. *b.* Cartel. 415. *a.* Autoris 415. *b.* Prognofis 416. *b.* cura Galenicorum 418. *a.* Paracelli 418. *b.* Helmontii, & VVillifii 419. *a.* Sylvii 419. *b.* Cartesiorum 421. *a.* Autoris 422. *b.*  
 Infantia ab Odontalgia 205. *b.* 210. *b.*  
 Infecta an ex ovo. vel putredine generentur 736. *b.* quomodo noceant 61. *a.* eorum punctiõni quomodo fuccuratur 61. *a.* 62. *b.*  
 Infenfibilis transpiratio 472. *b.*  
 Instrumentatilis extrahendis apta 687. *b.*  
 Inufflatio in venam cruralem animalis, quænam in ejus corpore pariat phenomena 34. *b.*  
 Inteftina 324. *b.*  
 Intumefcentia in vulneribus unde 23. *b.*  
 Invertentia medicamenta quid fint 385. *b.*  
 Ira fanguinis ftagnationem excitat 146. *a.* quomodo noceat 209. *b.*  
 Iridis fuccus Hydrocephalo medetur 4. *a.*  
 Iris in oculorum tunica nvea oritur 97. *a.*  
 Judæi Plica funt obnoxii ob ipforum in mundi- tie, & Diarta errata 18. *a.*  
 Judæorum 8. *b.*  
 Julepi pinguedinem minuunt 474. *a.*  
 Junctura quid 705. *b.*  
 Juniperina in Hydrocephalo conveniunt 7. *a.* ejus lignum contra Hydrocephalum deprædi- catur 5. *b.* bacæ ejus Alopecie, Arie, & Ophiati opitulantur 14. *b.*

## L.

**L** Abia, feu labra 462. *a.*  
 Labiorum fiftula, vide Fiftula labiorum 173. *b.*

Labiorum morbi, & ufus 173. *a.*  
 Labium leporinum 173. *b.* Diagnofis, & caufa Galenicorum 174. *a.* Paracelli, & Helmontii 174. *b.* VVillifii, & Sylvii 175. *a.* Cartesiorum 176. *a.* Autoris 177. *a.* Prognofis 177. *b.* cura Galenicorum 178. *b.* VVillifii 179. *b.* Sylvii 180. *a.* Cartesiorum 181. *a.* Autoris 183. *a.*  
 Labiorum veficulæ 173. *b.*  
 Labium leporinum juxta Sylvium, absque acu curandum 183. *a.*  
 Labores fuccum nutritium attenuant, & nimis per fudorem eliminant 473. *a.*  
 Labia pudendi muliebris, & iterum 462. *a.*  
 Lac in puerperis ab ætate frigida increfcit 302. *b.* pingues reddit 473. *a.*  
 Lachrymæ quid, & earum origo 88. *b.* -4. *b.* in cornæ vulneribus unde 88. *b.*  
 Lachrymalis fiftula, vide Fiftula lachrymalis 66. *a.*  
 Ladanum gummi in Alopecia, Arie, & Ophiati utile eft 14. *b.*  
 Lagophthalmus 54. *a.* Diagnofis 54. *b.* caufa Galenicorum 55. *a.* Paracelli & Helmontii 55. *b.* VVillifii 56. *a.* Sylvii 56. *b.* Cartesiorum 57. *a.* Autoris 58. *a.* Prognofis 58. *a.* cura veterum 59. Paracelli, & Helmontii 59. *b.* VVillifii 60. *a.* Sylvii 60. *b.* Cartesiorum 61. *b.* Autoris 63. *a.*  
 Lapis agerat\* laudatur in laxatione uvulæ 233. *b.*  
 Lapis calaminas Paracellicæ methodo paratus oculorum adfectibus iniecit 68. *a.* 78. *a.*  
 Lapis carmelus fupentis Hæmorrhagiam cura- tur 149. *b.*  
 Lapis ceramius prodeft in Hydrocephalo 7. *a.*  
 Lapis dentalis 110. *b.* Prognofis 111. *b.* cura Au- toris 220. *a.*  
 Lapis medicamentofus Collii fiftulæ lachrymalis medetur 68. *b.*  
 Lapis fpongiz fpecificus eft in ftumis 259. *a.*  
 Laryngotomia, feu Bronchotomia ufurpatur in Angina 244. *b.* 249. *a.* 273. *b.* 266. *a.* 267. *a.* 268. *a.* in tracheæ anguftia 273. *b.*  
 Larynx quid fit 239. *a.* infervit refpirationi, & voci efformandæ 261. *b.* ejus læfio in Angina periculofa 238. *a.*  
 Lavendula in Hydrocephalo conducit 7. *a.*  
 Laxatio ligamentorum 704. *a.* Diagnofis 705. *b.* caufa Galenicorum, & Paracelli 706. *b.* Helm. & VVill. 707. Sylvii, & Cartel. 708. *b.* Au- toris 709. *b.* Prognofis 711. *a.* cura Galenicorum 712. *a.* *b.* Helm. 715. *a.* VVillifii 715. *b.* Sylvii 716. *a.* Cartesiorum 716. *b.* Autoris 718. *a.*  
 Laxatio uvulæ 231. *a.* Diagnofis, & caufa Gale- nicorum 231. *b.* Paracelli, Helmontii, VVillifii, & Sylvii 232. *a.* Cartesiorum, & Au- toris 232. *b.* Diarta, & cura Pharus, Galeni- corum 233. *b.* Paracelli, & Helmontii 234. *b.* VVillifii, Sylvii, & Cartel. 235. *a.* Autoris 235. *b.*  
 Leberflecken 608. *b.*  
 Leucigenes 185. *a.* 608. *a.* Pars affecta 608. *b.* Dia- gnofis, & caufa Galen. 609. *a.* Helmontii 609. *b.* VVillifii, & Sylvii 610. *a.* Cartesiorum 610. *b.* Autoris 611. *b.* 188. *a.* Pro- gnofis 613. *a.* 188. *b.* cura Galenicorum 614. *a.* Helmontii, & VVillifii 615. *b.* Sylvii 616. *a.* Cartel. 616. *b.* Autoris 194. *a.*  
 Leontialis caufa 559. *a.*

Lepra

# I N D E X.

- Lepra duplex** est, Græcorum & Arabum 556. *a.* Pars affecta 557. *a.* Diagnofis 557. *b.* caufa Galenicorum 559. *a.* Paracelfi & Helmontii 559. *b.* VVillifii 560. *a.* Sylvii 561. *a.* Cart. 562. *a.* Autoris 563. *b.* cura Galen. 566. *b.* Paracelfi 569. *a.* Helmontii & VVillifii 569. *b.* Sylvii 570. *a.* Cartefianorum 571. *a.* Autoris 573. *b.*
- Lepra Arabum**, vide Elephantiafis 556. *b.*
- Lepra Leonina** 556. *b.*
- Lepræ** quardam species 559. *b.* in Ægypto eft morbus endemius & frequentior in Afia, Africa & Hispania quam Europa 564. *a.* tempore veteris teftamenti communis erat 564. *b.* eft vel hæreditaria vel acieiticia 564. *b.* eft contagiofa 565. *a.*
- Leporinus oculus**, vide Lagophthalmus 54. *a.*
- Leuce** 556. *a.* Pars affecta 557. *a.* caufa Galen. 559. *a.* Paracelfi 559. *b.* Helm. 560. *a.* VVillifii & Sylvii 561. *a.* Cartefianorum 562. *b.* Autoris 565. *a.* Prognofis 565. *b.* cura Galenicorum 568. *a.* Paracelfi 569. *a.* Helmontii & VVillifii 569. *b.* Sylvii 570. *a.* Cart. 571. *a.* Autoris 575. *b.*
- Leucoma** feu albugo 85. *a.*
- Leucophlegmatia** 538. *b.*
- Libidinis** fedes eft citioris inflar uvulæ 425. *b.*
- Lichen volaticus**, vide Imperigo.
- Lien** feu Splen. ejus ufus & fermentum 346. *a.* æftimatur pars minus princeps 353. *b.*
- Ligamentum** quid 704. *b.*
- Ligamentum Ciliare** 104. *a.*
- Ligamentum Herniæ** 407. *a.*
- Lignum Sympatheticum** ex fraxino cingat Hæmorrhagiam natium 155. *b.* 150. *a.*
- Lingula** feu glottis 162. *a.*
- Lini** femen in Alopeciam, Atca & Ophiali prodeft 14. *b.*
- Linimentum** ad Alopeciam, Atcaui & Ophialin 14. *b.* ad Anginam 248. *b.* ad pilos tingendos 15. *a.* ad Plicam Cnocephelin 21. *b.* ad fero-phulas Autoris 260. *a.* expertum ad Scabiem 570. *b.*
- Lingua** quale organum 158. *b.* ejus tumor à cosmetico mercuriali 162. *a.* inflar canis venatici ex ore prodians & duplex fine loquelæ 162. *b.* ejus fremitus, ynculum & ligamentum 157. *b.* apex, crassities, basis substantia magnitudo extraordinaria, femper madida, eft motus variis æditur modis, topbi, vermes, progloffis & hypogloffis 158. *a.* pinella laborans 162. *b.* ejus ministerio guttamus & loquimur 158. *b.*
- Lingux** calculi 158. *a.* caufa 161. *b.* 162. *a.* cura 170. *b.*
- Lingux** fistula 170. *b.* tremor à terrore 176. *b.*
- Lingux** Frænum, vide Frænum lingux 157. *b.*
- Lingux** morbi 157. *a.*
- Lipodæmus** 412. *a.* Pars affecta 412. *b.* Diagnofis 413. *a.* caufa Galenicorum 413. *b.* Paracelfi & Helmontii 414. *a.* VVillifii & Sylvii 414. *b.* Cart. & Autoris 415. *a.* Dieta & cura Galenicorum 417. *a.* Parac. 418. *b.* Helmontii & VVillifii 419. *a.* Sylvii 419. *b.* Cartefianorum 420. *b.* Autoris 421. *b.*
- Lippitudo** 73. *a.*
- Liquor alkahest** hepatis vulnera curat 354. *b.*
- Liquor coeni cervi** succinatus in Hydrocephalo commendatur 7. *a.* 8. *a.* in maxillæ mobilitate 230. *a.*
- Liquores** corrosivi eptoti Anginam inducunt 242. *a.*
- Liquor fenicali** faccharatus Bartholei landatur in ophthalmia 83. *a.*
- Liquor hepatis** muftela piscis ad oculorum affectus laudatur 102. *b.*
- Liquor thipticus** in Hæmorrhagiam narium 155. *b.* Drelineurtii 556. *a.*
- Lithodontes** feu tartarus dentium corrodit dentes & nigredinem infert 210. *a.*
- Littus microcosmicum** cutis eft 422. *b.* 522. *a.*
- Livor** in fuffillatione unde 74. *a.* in cancro 549. *b.*
- Livor** totius corporis periodica recurrens 517. *b.*
- Lixivium** fermentorum prodeft in Hydrocephalo 7. *a.* in pilis tingendis 21. *a.* 15. *a.*
- Lochia** quid 142. *a.* 302. *b.* coram fluxus promovendus 458. *a.* primiparæ & macilentæ magis hinc fluxui obnoxia 302. *b.* prolunt contra nævos maternos 194. *b.*
- Loquela** amiffa fufficit lingux motus 162. *b.* 163. *a.* exercetur fine lingua 163. *b.* 157. *b.* 162. *b.* impedita ob uvulam in morbo amiffam 231. *a.*
- Lordofis** 289. *a.*
- Lues** inguinaria eft Peflis bubonibus comitata 498. *b.*
- Lues** venerea Alopeciam inducit 12. *a.* Calvitiem 11. *b.* ad Plicam difponit 13. *b.* Neapolitanicum fumit 756. *b.*
- Lumbrici** in liquorum ventriculis ftimulatores funt 318. *a.* inteftinorum næves vellicant & fternutationem excitant 146. *b.* quomodo ex ovis generantur 736. *b.*
- Lumen** oculorum doloris exacerbat 105. *a.* oculis vulperatis noxium eft 95. *a.*
- Luminis** modificationes ad colores 12. *b.*
- Lumella** vide Hypopyon 85. *a.*
- Lupulus** Tincam curat 14. *b.*
- Lupus** 132. *a.* 631. *b.*
- Lupus** narium feu ozæna 132. *a.*
- Lupus** vinculum ad Hernias 328. *b.*
- Lupus** feu cancer 546. *a.*
- Luxatio** articularum 704. *b.* Diagnofis 706. *a.* caufa Galenicorum & Paracelfi 706. *b.* Helmontii 707. *b.* VVillifii 708. *a.* Sylvii 708. *b.* Cart. 709. *a.* Autoris 710. *b.* Prognofis 711. *b.* cura Galenicorum 712. *b.* Helm. 715. *a.* VVillifii 716. *a.* Sylvii 716. *b.* Cartefianorum 717. *b.* Autoris 720. *a.*
- Luxatio** maxillarum & Diagnofis 226. *a.* caufa Galenicorum & Paracelfi 226. *b.* Helmontii, VVillifii Sylvii & Cartefianorum 227. *a.* Autoris & Prognofis 227. *b.* cura Galenicorum 228. *a.* Paracelfi 228. *b.* Helmontii, VVillifii & Sylvii 229. *a.* Cart. 229. *b.* Autoris 230. *b.*
- Luxatio** costarum 295. *a.* Diagnofis & caufa Galenicorum 295. *b.* Cart. & Autoris 296. *a.* Prognofis, cura Galenicorum & Paracelfi 297. *a.* VVillifii Sylvii & Cart. 297. *b.* Autoris 298. *a.*
- Luxatio** vertebraarum, Differentia & Pars affecta 289. *a.* caufa Galenicorum & Paracelfi 289. *b.* Helmontii, VVillifii, Sylvii & Cart. 290. *a.* Autoris 290. Prognofis 291. *a.* cura Galenicorum 292. *a.* Paracelfi, Helmontii & VVillifii 292. *b.* Sylvii & Cartefianorum 293. *a.* Autoris 293. *b.*
- Lympha



# I N D E X.

**Lympha** quomodo fiat 538. *a.* quid sit, & quod circuletur 501. *b.* à saliva vix differt 251. *a.* acida & acris Anginam parit 241. *b.* Differentia ejus juxta varias glandulas 484. *b.* 485. *a.* à saliva parum differt 251. *a.* in capite colligi potest ob insensibilem transpirationem impeditam 3. *a.* in suis vasibus ab acido inspillatur non aliter brodium carnis aëri frigido expositum 3. *a.*

## M.

**Machina humana** constat ex partibus fluidis & solidis 468. *b.* 682. *a.* hydraulica dicitur 599. *a.* ex ovo 468. *b.*

**Macies**, seu Marcor, vide **Aridura**.

**Macula nigra** in naso 132. *b.* causa Galen. 133. *a.*

**Maculae faciei** 185. *a.* Diagnos. 185. *b.* causa Galenicorum & Paracelsi 186. *a.* Helmontii, VVillisi & Sylvii 186. *b.* Cartesiorum 187. *a.* Autoris 188. *a.* Progn. 188. *b.* cura Galenic. 189. *b.* Paracelsi 189. *b.* Helm. 190. *a.* VVillisi. 190. *b.* Sylvii 191. *a.* Cart. 192. *a.* Aut. 194. *b.*

**Maculae hepaticae** 608. *b.* Diagnos. 609. *a.* causa Galenicorum, Paracelsi & Helmontii 609. *b.* VVillisi 610. *a.* Sylvii 610. *b.* Cartel. 611. *a.* Autoris 612. *b.* Prognosis 613. *a.* cura Galenicorum 614. *b.* Paracelsi & VVillii 615. *b.* Cartel. 617. *b.* Autoris 620. *a.*

**Maculae originales**, Navi materni 609. *a.*

**Maculae solares**, vide **Leptogines** 608. *a.*

**Maculae volubiles** 608. *b.* Diagnos. 609. *a.* causa Galenicorum, Paracelsi & Helmontii 609. *b.* VVillii 610. *a.* Sylvii 610. *b.* Cartesiorum 611. *a.* Autoris 612. *b.* Prognosis 613. *a.* cura Galenicorum 614. *b.* Paracelsi 615. *b.* VVillii 616. *a.* Cartel. 617. *b.* Autoris 620. *a.*

**Madarosis** quid 634. *a.*

**Magnanimi**, qui habendi 289. *a.*

**Magnitudo indecora mammarum** 299. *a.* causa Galenicorum, Paracelsi & Helmontii 300. *b.* VVillisi & Sylvii 301. *a.* Cartesiorum 302. *a.* Autor 303. *b.* Prognosis 304. *a.* cura Galenicorum 305. *b.* Parac. & Helmontii 306. *a.* VVillisi 306. *b.* Sylvii 307. *a.* Cartel. 309. *a.* Autoris 312. *b.*

**Malum est species**, Prociditiae oculi 97. *a.*

**Mamma sex aut octo libras pendens** 302. *a.* stupenda 35. librarum 299. *b.*

**Mammæ** quid 299. *a.* earum substantia adenofo est 303. *b.* sunt corpus maxime glandulosum, ideo facile corruptibile 310. *a.* earum morbi 298. *a.* tempore menstruali, vel in-vel detumescunt 302. *b.* dicuntur sanctissimus corporis fons, generis humani educator 299. *a.* earum affectus difficile sanantur 304. *a.* earum descriptio 299. *a.* eis nocent emollientia & suppurantia 310. *a.* ut & repellentia & frigida 310. *b.* canerosi abscessus absque recidiva 556. *a.*

**Mammæ** Emphysema, vide **Emphysema mammarum** 299. *a.*

**Mammæ** Fovea, vide **Fovea mammarum** 299. *a.*

**Mammæ** Inflammatio, vide **Inflammatio mammarum** 299. *a.*

**Mammæ** Cancer, vide **Cancer mammarum**. **Mammæ** Trichiasis 303. *b.* cura Autoris 312. *b.*

**Manuale** operamentum exigunt quidam morbi 1. *a.*

**Manus** quid 734. *b.* affectus 734. *a.*

**Manuum callus**, vide **Callus manuum** 734. *a.*

**Manuum fissura**, vide **Fissura manuum** 734. *a.*

**Maris Balthici** incolæ dentium doloribus, & eorum cariei sunt obnoxii 209. *b.*

**Martileæ**, seu tumor sciculus, & Pars affecta 335. *a.* Diagnos. 335. *b.* causa Galenicorum 336. *a.*

**Masticationem ciborum bonam**, bona sequitur digestio, & qui eam negligit, vitam odit 205. *a.*

**Masticatoria** profunt in Odontalgia 217. *a.*

**Mater** in opere generationis non omnino passiva se habet, neque sætui menstruum sanguinem pro nutrimento suppeditat 564. *b.*

**Matriæ imaginatio laxa**, quomodo in factum agat 610. *a.* 611. *a.* 612. *a.*

**Materiæ diversitas**, ut carbonēs, pili, vitæ, Chartæ, vel linteamina in tumoribus repetita 585. *b.*

**Matrix**, seu vagina uteri 425. *b.*

**maxilla & ejus morbi** 226. *a.*

**Maxillæ fistula**, vide **Fistula maxillarum** 226. *a.*

**Maxillarum immobilitas**, vide **Immobilitas maxillarum** 226. *a.*

**Maxillarum luxatio**, vide **luxatio maxillarum** 226. *a.*

**Meatus urinarius**, seu urethra 360. *b.* inservit urinæ & semini efferendis 361. *a.*

**Meatus urinarii angustia**, vide **Angustia meatus urinarii** 360. *a.*

**Medicinam exercere** est intueri miseriam humanam 386. *a.*

**Medicus**, Diæta, Pharmacia & Chirurgia agrotis auxilium ferre potest 7. *b.*

**Medicæ scopus** primarius est humani corporis, aut conservanda aut restituenda salus 42. *a.*

**Medicamenta spirituosâ pituitam solvunt** 5. *b.*

**Medicus venter**, vide **Pectus**.

**Melagium** quid? 633. *b.* 638. *a.*

**Melas** 562. *b.*

**Meliceris** 585. *b.* Pars affecta & Diagnos. 586. *a.* causa Galenicorum & Paracelsi 586. *b.* VVillii 587. *a.* Cartesiorum 587. *b.* cura Galenicorum 589. *b.* Paracelsi & Helmontii 590. *a.* VVillii 590. *b.* Cartel. 591. *a.* Autoris 592. *a.*

**Melissæ sal**, spiritus augeat & succurrit, Hydrocephalo lymphæ proventum inhibendo 6. *b.*

**Membræ** sunt tactus organum 206. *a.* earum dispositio ad extensionem 380. *b.*

**Membrum virile**, vide **Penis** 412. *b.*

**Menstrum obstructio**, causa est canceri mammarum 303. *b.* barbz in feminis 20. *a.* fluxus quid 142. *a.*

**Menstruæ purgationes** per gingivas prorumpentes in virgine 17. annorum 222. *b.* per oculos in puella 20. annorum 76. *b.* retentæ mammarum cancerum faciunt 303. *a.* uteri cancerum & ulcus pariunt 431. *b.* ipsi suppressis Hæmorrhagia narium superveniens bona est 147. *a.*

**Mentagra**, vide **Impetigo**.

**Mentula**, seu Clitoris in mulieribus 425. *a.*

**Mentula**, seu penis in viris 412. *b.*

# I N D E X.

**Mercurius calvitium inunctione producit** 12. *b.*  
 ex mamma cancroſa ſtillavit 303. *b.* dulcis  
 pro hydragogo prodeſt in Hydrocephalo 6. *a.*  
 6. *b.* acidorum dormitor ſtrenuus 55. *a.* 311. *b.*  
 in Plica uſurpandus 21. *b.* cum anro & argen-  
 to amalgama uſu prodeſt ad ſpalmum cynicum  
 182. *b.* Anginam inferit 242. *a.* cancroſis mam-  
 marum auxiliatur 55. *a.* ad luis venereæ cu-  
 rationem non requiritur; nam per illum cura  
 eſt palliativa 423. *a.* præcipitatus ſolaris Hy-  
 drocephalo medetur 6. *b.* prodeſt in fiſtula  
 maxillæ 229. *a.* ſalivationem uti procreet 197.  
 199. *a.* Scabies ab ipſo circa corpus geſtato  
 ſanatur 572. *b.*

**Mercurialia conveniunt pro reſolvendis tumo-  
 ribus ſtrumofis** 260. *a.* in omnibus puſtulis  
 573. *b.*

**Minima febrile malignum, facile aliis comuni-  
 catur** 418. *b.*

**Microcolimetor ſedem habet in capite, quod  
 ejus metropolis eſt** 24. *a.*

**Mixtura ad Aphoniam** 172. *a.* Ettmülleri pro  
 dentibus & gingivis præſervandis 226. *a.*

**Mobilitas dentium** 205. *b.* cauſa Galenicor. &  
 Helmontii 207. *a.* VVilliiſii, Sylvii & Carte-  
 ſianorum 208. *a.* Autoris 210. *a.* Prognofis  
 211. *a.* cura Galenicorum 212. *b.* Parac. 213.  
*a.* Helmontii & VVilliiſii 213. *b.* Sylvii 214. *a.*  
 Cartef. 215. *a.* Autoris 219. *b.*

**Moror mammarum cancerum provocat** 303. *b.*

**Molops** 17. *a.*

**Mons veneris quid** 462. *a.*

**Morbi à medicamentis non ſanati eos ferrugina  
 ſanati; quos ſerum non ſanati; eos ignis ſanati;  
 & quos ignis non ſanati; illi inſanabiles putan-  
 tur** 7. *b.*

**Morbi ex contuſione capitis oriundi** 23. *a.*

**Morbi multi curantur ſola diæta, multi medica-  
 mentis, & ſi nec hæc ſufficiunt. Chirurgia in  
 auxilium vocanda** 7. *b.*

**Morbi aurium** 109. *a.* ani 335. *a.* Canthorum  
 oculi 65. *a.* ciliorum 63. *a.* dentium 205. *a.*  
 cutanei 56. *a.* faciei 184. *a.* gingivarum 221.  
*a.* faucium 238. *a.* ductuum ſalivarium 193. *b.*  
 labiorum 173. *a.* lingue 157. *a.* maxillarum  
 226. *a.* mammarum 298. *a.* manuum 734. *a.*  
 oris 194. *a.* palpebrarum 54. *a.* pilorum 8. *a.*  
 papillarum 313. *a.* pedum 761. *a.* pudendi  
 muliebris 461. *a.* perinæi 371. *a.* tunice ad-  
 natæ 71. *a.* tunice corneæ 85. *a.* tunice uvæ  
 96. *a.* tonſillarum 231. *a.* tibiae 755. *a.*  
 velicæ 360. *a.* virgæ 412. *a.* uteri 425. *a.*  
 uvulæ 231. *a.* vertebrae 289. *a.*

**Morhorum ſuboles numeroſa eſt** 1. *a.*

**Morbus cichorum quid?** 8. *b.*

**Morbus hæreditarius, vel in veteratũs difficilem,  
 vel nullam admittit curationem recens vero  
 facilem** 14. *a.*

**Morbundi ſunt aphoni** 163. *a.*

**Morpha eſt ſpecies lepræ** 559. *b.*

**Morbus canis rabidi excitare poteſt gangrenam**  
 661. *b.*

**Mors eſt coagulationis & ſtagnatio omnium ſuco-  
 rum circulantium** 473. *b.*

**Motus perſiſtens quid?** 377. *a.*

**Motus littoralis ſanguinis ac ſuccorum** 422. *b.*

**Moxæ inſuſio in Odontalgia** 216. *b.* in morſu  
 animalium venenatorum 695. *a.*

**Mulieres lactantes mammae æri frigido expo-**

**nere non debent, quia facile oritur tumor**  
 302. *a.* pluribus & periculioſioribus morbis  
 præ viris ſunt obnoxie 425. *a.* 444. *a.* 304. *b.*

**Mulci hodie plus æſtillant irrationalem medici-  
 nam vel chirurgiam, quam rationalem ope-  
 randi methodum** 736. *a.*

**Mumia** 55. *a.* 59. *b.*

**Mundantia** 232. *b.* 225. *b.*

**Mures tempore hyemali quieſcentes pinguiorẽs  
 evadunt** 473. *a.*

**Murmur aurium ut ſanetur** 130. *a.* in efferve-  
 ſcentia ut fiat 535. *a.*

**Muſca obtruncata hordeolum ſanat** 64. *b.*

**Muſculi partes & ſtructura** 479. *a.* abdominis  
 379. *a.* oculorum 44. *a.* pectorales 182. *a.*

**Muſculorum abdominis inflammatio, vide In-  
 flammatio muſculorum abdominis** 379. *b.*

**Muttermäſter** 608. *b.*

**Myocephalus** 96. *b.*

**Myopia** 103. *b.*

**Myrmecia** 431. *b.* 600. *b.* Prognofis 601. *b.* cura  
 605. *b.* 606. *a.*

**Myrti baccæ in Alopecia, Arca & Ophialia lau-  
 dantur** 14. *b.* in Hydrocephalo conducunt  
 5. *b.*

## N.

**Nabelbruch** 379. *a.*

**Nachtſtatern** 576. *a.*

**Navi materni** 185. *a.* 608. *b.* Pars affecta 608. *b.*  
 Diagnofis 609. *a.* cauſa Galenicorum & Para-  
 celli 609. *b.* VVilliiſii & Sylvii 610. *a.* Cartef.  
 611. *a.* Autoris 188. *a.* 612. *a.* Progn. 188. *b.*  
 613. *a.* cura Galenicorum 614. *a.* Paracelli  
 615. *a.* Helmontii 615. *b.* VVilliiſii & Sylvii  
 616. *a.* Cartefianorum 617. *b.* Autoris 194. *b.*  
 619. *a.*

**Nates laborant vel per eſſentiam, vel per conſen-  
 ſum** 143. *a.* à lumbricis inteſtinorum velli-  
 gantur 146. *b.*

**Narium hæmorrhagia, vide Hæmorrhagia na-  
 rium** 142. *a.*

**Narium uſus** 131. *b.* 143. *a.* ſunt organum olfa-  
 ctorium 132. *b.* 143. *a.* per eas intrat ær ad  
 reſpirationem neceſſarius 131. *b.* 143. *a.*

**Nafengeſchwür** 132. *a.*

**Nafimur & morimur, quin imò naſcentes mo-  
 rimur** 444. *a.*

**Nafi abſceſſo adulterii pæna fuit apud Aegyptios**  
 132. *a.*

**Nafurtium aquaticum, & hortenfẽ ſcorbuti an-  
 tidotum eſt** 193. *b.*

**Nafus artificialis conſciendus in ejus defectu**  
 141. *b.*

**Nafus depræditus & depravatus** 132. *b.* cauſa  
 133. *a.* 134. *a.* 135. *a.* 135. *b.* cura 136. *b.*  
 137. *b.* 138. *a.* 139. *b.* 142. *b.*

**Nafi morbi** 131. *a.* 142. *a.*

**Nafus proliſerus in aulæ Caſſellano** 135. *a.*

**Natura ſæpe morborum medicatrix** 684. *a.*

**Nebula tunicæ, corneæ & Diagnofis** 85. *a.* cauſa  
 Galenicorum 85. *b.* Paracelli & Helmontii  
 86. *a.* Williiſii 86. *b.* Sylvii & Cartefianorum  
 87. *a.* Autoris 87. *b.* Prognofis 88. *b.* cura  
 Galenicorum 89. *a.* Paracelli 90. *b.* Helmon-  
 tii 91. *a.* VVilliiſii 91. *b.* Sylvii 92. *a.* Cartefia-  
 norum 92. *b.* Autoris 93. *b.*

**Necceſſitas crudælem facit medicum in Spæcicolo-  
 nam**



# I N D E X.

nam præstat in te gravi expectari anceps remedium, quam nullum & membrum emortuum, à sano rescindendum, crudele enim malum crudeli remedio est expugnandum 670. *b.* experientia occasione dedit 682. *a.*  
 Nemo ante coitum calvescit, ait Hipp. & Aristoteles 12. *b.*  
 Nephidicus ictus 55. *b.*  
 Nero Imperator coronam ex lauro gestavit, ut à fulmine se muniat 679. *b.* 68. *a.*  
 Nervi quid? 705. *a.*  
 Nervii in variis partibus in cincinnos abeunt 586. *a.* quare Ariduram particularem membrorum excident 624. *b.*  
 Nervi suas habent arteriolas 105. *b.* recurrentes compressi aphonia producentes 163. *a.*  
 Nervæ fibrillæ uti sunt in musculis dispositæ 479. *b.*  
 Nervus siccus etiam circulator 501. *b.*  
 Nervorum contusio, vide Contusio nervorum 704. *b.*  
 Nisselsucht 576. *a.*  
 Neutha 78. *a.*  
 Nidus hirundinum in Angina, & tonsillarum inflammationibus quomodo juvet 236. *b.*  
 Nigredo cutis 608. *a.* causa Galenicorum 609. *a.* Paracelsi, Helmontii & VVillisi 609. *b.* Sylvii 610. *a.* Cartesii 610. *b.* Autoris 611. *a.* Prognosis 613. *a.* cura Galenicorum 613. *b.* Paracelsi 614. *b.* VVillisi 615. *b.* Sylvii & Cartesiorum 616. *a.* Autoris 617. *b.*  
 Nigredo dentium 206. *a.* causa Galenicorum & Paracelsi 207. *a.* Helmi. 207. *b.* VVillisi & Sylvii 208. *a.* Cartesii 208. *b.* Autoris 210. *a.* Prognosis 211. *a.* cura Galenicorum 212. *b.* Paracelsi 213. *a.* Helmi. & VVillisi 213. *b.* Sylvii 214. *a.* Cartesii 215. *b.* Autoris 220. *a.*  
 Nigredo linguae 158. *a.*  
 Nitri spiritus pinguedinem minuit 474. *a.* pituitam coagulata solvit 5. *b.*  
 Noli me tangere quid sit 132. *a.* 631. *a.* 546. *a.*  
 Noma 632. *a.*  
 Noces eupressi Hydrocephalo auxiliantur 5. *b.*  
 Nulla suppuratio fieri potest absque inflammatione, id est, dolore & rubore partis 480. *b.*  
 Nulla vetula, Barbitonfor, vel Carnifex est, qui non singularem potum vulnerarium vendit 696. *a.*  
 Nullum purgans datur, quod fugare potest acidum 215. *b.*  
 Nullus in Chirurgia morbus atrocior, quam Sphacelus, jubet enim partem sphacelatam à vivente reliquo corpore ferro & igne abscindere 658. *a.*  
 Nullus morbus aegri majorem incutit metum, quam cancer exulceratus nullusque est, qui Chirurgum magis fatigat, cujus opprobrium dicitur 550. *a.*  
 Nutritum quid? 469. *a.* 470. *b.*  
 Nutritio quomodo fiat 623. *a.* 470. *b.* duplex, partium fluidarum & solidarum 623. *b.* cessat, cessante circulatione humorum 295. *a.*  
 Nyctalopia 103. *b.* 104. *b.* Prognosis 106. *a.* cura 106. *b.*  
 Nymphotomia 433. *a.*

## O.

**O** Bauditio, Pars affecta, & causa Galenicorum 124. *a.* cura Galenicorum 127. *b.* Autoris 130. *a.*

Obesi à nativitate citius moriuntur, quam graciles 473. *a.*  
 Obesitas immaturam affert senectutem 473. *a.*  
 Oculi Atrophia, vide Atrophia oculi 44. *a.*  
 Oculi dignitas, indices passionum 42. *a.* constitutio naturalis 42. *b.*  
 Oculis quænam noxia 76. *a.*  
 Oculi sol microcosmicus, & pretiosissima hominis gemma 42. *a.*  
 Oculorum Canthi 66. *a.*  
 Oculorum compositio juxta Paracelsum, ex tribus constat; substantia, materia, forma 45. *a.*  
 Oculorum singulatio, vide Hypophagma.  
 Odontalgia 205. *b.* causa Galenicorum 206. *b.* Helmontii 207. *a.* VVillisi 207. *b.* Sylvii & Cartesiorum 208. *a.* Autoris 209. *a.* Prognosis 210. *b.* cura Galenicorum 211. *b.* Paracelsi & Helmontii 213. *a.* VVillisi 213. *b.* Sylvii 214. *a.* Cartesiorum 214. *b.* Autoris 215. *b.*  
 Odontalgia quandoque signum conceptionis 206. *a.* magis obnoxii populi septentrionales, & rarius Egyptii 209. *b.*  
 Odor, seu Olfactus depravatus 143. *a.* imminutus, & abolitus 143. *a.* causa Galenicorum 143. *b.* Paracelsi 144. *a.* VVillisi 144. *b.* Sylvii & Cartesii 145. *a.* Autoris 146. *b.* 147. *a.* Progn. 148. *a.* Diata 148. *b.* cura Galen. 149. *a.* Paracelsi 149. *b.* Helmi. 150. *a.* VVillisi 151. *a.* Sylvii 152. *a.* Cartesii 153. *a.* Aut. 157. *a.*  
 Oedema 534. *a.* Pars affecta, & Diagnofis 535. *a.* causa Galenicorum, Paracelsi & Helmontii 535. *b.* VVillisi 536. *a.* Sylvii & Cartesiorum 536. *b.* Autoris 537. *b.* Prognosis 540. *b.* Diata, & cura Galenicorum 541. *a.* Paracelsi & Helmontii 542. *a.* VVillisi & Sylvii 542. *b.* Cartesiorum 543. *a.* Autoris 544. *a.*  
 Oedema mammarum 299. *a.* causa Galenicorum 300. *a.* Paracelsi & VVillisi 300. *b.* Sylvii 301. *a.* Cartesiorum 301. *b.* cura Galenicorum 305. *a.* Paracelsi 305. *b.* VVillisi 306. *a.* Sylvii 307. *a.* Cartesiorum 308. *b.*  
 Oedema oculorum 54. *a.*  
 Oesophagus 275. *a.*  
 Oesophagi angustia 275. *a.* Diagnofis 275. *b.* causa Galenicorum, Paracelsi, Helmi. VVillisi & Sylvii 276. *a.* Cartesii & Autoris 276. *a.* cura Galenicorum 279. *a.* Paracelsi, Helmontii, VVillisi & Sylvii 279. *b.* Cartesii 280. *a.* Autoris 280. *b.*  
 Oesophagi tumor 275. *a.* Diagnofis, & causa Galenicorum 275. *b.* Paracelsi, Helmontii, VVillisi, Sylvii & Cartesiorum 276. *a.* Autoris 276. *b.* Prognosis 277. *b.* Diata 278. *a.* cura Galenicorum 278. *b.* Paracelsi, Helmontii, VVillisi & Sylvii 279. *b.* Cartesii & Autoris 280. *a.*  
 Oesophagotomia laudatur in oesophagi angustia 280. *b.*  
 Oshrendruff 110. *a.*  
 Oleum scarabæorum, & scorpionum in aurium dolore conveniunt 121. *b.* in hæmorrhoidibus cæcis 442. *b.* vitrioli calvitium producit 12. *a.* canthium 13. *a.* sulphuris canthium producit 13. *a.* momordicæ prodest in Procidentia uteri 443. *a.* urinz prodest in Pernionibus 767. *a.* Terebinthinæ & Camphoræ etiam conferunt 770. *a.*  
 Omne profluvium sanguinis immodicum est, periculi plenum 147. *a.*

Omnes totius machinæ partes continuo sanguinis & succorum affluxu & refluxu gaudent 449. a.

Omnis inflammatio supponit tumorem, & omnis tumor obstruccionem 484. b.

Omnium liquorum separationes fiunt ope glandularum 498. a.

Omphalocèle, vide Hernia umbilicalis 378. a.

Operatio pelliculæ in cataracta removendæ 103. a. b.

Ophiasis 8. a. Diagnofis 9. a. caufa Galenicorum 9. b. Paracelli 10. a. Helm. 10. b. Sylvii 11. a. Cartefianorum 11. b. Autoris 12. a. Prognofis 13. b. cura Galenicorum 14. a. Helm. 16. b. Sylvii 17. b. Cartef. 19. a. Autoris 20. a. b.

Ophiasis infantes obnoxii 8. a.

Opinio Univerſitarum de uno remedio in omnibus affectibus 2. a.

Ophthalmia & Differentiæ ejus 71. b. Diagnofis 72. a. caufa Galen. 72. b. Paracelli, Helm. & VVill. 73. a. Sylvii & Cartef. 73. b. Autoris 74. a. Prognofis 75. a. cura diætetica 76. a. pharmac. Galenicorum 77. a. Paracelli 78. a. Helmontii & VVillii 78. b. Sylvii 79. a. Cartefianorum 79. b. Autoris 81. b.

Ophthalmica remedia ſpecifica 106. a.

Ophthalmometor lachrymas fundit 71. a.

Oris Coalitus & caufa Galenicorum 195. a. Paracelli 195. b. Helmontii, & VVillii 196. a. Sylvii 196. b. Cartef. 197. a. Autoris 198. a. Progn. 199. b. cura Galenicorum 200. a. Paracelli 200. b. Helm. & VVill. 201. a. Sylvii 201. b. Cartef. 202. a. Autoris 203. b.

Oris Fætor, vide Fætor oris 195. a.

Oris tortura 195. a. caufa Galenicorum & Paracelli 195. b. Helm. 196. a. VVillii 196. b. Sylvii & Cartef. 197. a. Autoris 198. a. Prognofis 199. b. cura Galenicorum & Paracelli 200. b. Helmontii, & VVillii 201. a. Sylvii 201. b. Cartef. 202. b. Autoris 203. b.

Oris vicia 194. a. partes 195. a.

Oſcheo-circocele 397. a. Diagnofis 397. b.

Oſcheo-enterocele 397. a. Diagnofis 397. b.

Oſcheo-epiurocele 397. a. Diagnofis 397. b.

Oſcheo-hydrocele 397. a. Diagnofis 397. b.

Oſcheo-pneumatocele 397. a. Diagnofis 397. b.

Oſcheo-ſarcocele 397. a. Diagnofis 397. b.

Oſcitatio & caufa Galenicorum 195. a. Paracelli 195. b. Helm. & VVill. 196. a. Sylvii 196. b. Cartef. 197. a. Autoris 197. b. Prognofis 199. b. cura Galenicorum 200. a. Parac. 200. b. Helmontii, & VVillii 201. a. Sylvii 201. b. Cartef. 202. a. Autoris 203. b.

Oſſa quid 723. a. cranii in recens natis infantibus videntur membranofa 2. b. mercurialibus non attingenda nam facile corroduntur & nigrefcunt 41. b. emolliri poſſunt inſtar gelatinæ, ut comedi queant 726. a. in vivis hominibus non poſſunt 754. b.

Oſſum caries, vide Caries oſſium 722. a.

Oſſum Fractura, vide Fractura oſſium 722. a.

Otalgia 109. b. Diagnofis 110. a. caufa Galenicorum 110. b. Paracelli 111. a. Helmontii & VVillii 112. a. Sylvii 112. b. Cartef. 113. a. Autoris 113. b. Prognofis 115. a. cura Galenicorum 116. a. Paracelli 117. a. Helmontii, & VVillii 118. a. Sylvii 119. a. Cartef. 119. b. Autoris 120. b.

Ovorum albumina indurata capici applicata calvitium accelerant 13. a. corpus ab ovibus reccutibus valde nutritur 473. a.

Ozæna 132. a. Diagnofis 132. b. caufa Galenicorum & Paracelli 133. a. Helmontii & VVillii 133. b. Sylvii 134. a. Cartef. 134. b. Autoris 135. a. Prognofis 135. b. cura Galenicorum 136. a. Paracelli 137. a. Helmontii, & VVill. 137. b. Sylvii 138. a. Cartefianorum 138. b. Autoris 140. b.

P.

**P**ædarthrocace ſeu ſpina ventroſa 630. b. 732. b. cura 631. a. b. poſt variolas abortu 725. b.

Pædotrophia quid & quomodo curanda 630. b.

Palati eroſio, vide Eroſio palati 231. a.

Palpebræ 54. b. earum morbi 54. a.

Palpebrarum Emphyſema, vide Emphyſema palpebrarum 54. a.

Palpebrarum Hydatis, vide Hydatis palpebrarum 54. b.

Palpitatio cordis gibbum fecit 290. b.

Panaritium vide Paronychia 740. a.

Panis Helmontio eſt theriaca alimentorum & optimum nutrimentum 473. a. 608. b.

Pannus 72. a. Diagnofis 72. b. Pars affecta 608. b. caufa Galenicorum 72. b. 609. b. Paracelli, & Helmontii 73. a. 609. b. VVillii, & Sylvii 73. b. Cartef. 74. a. 611. a. Autoris 75. a. Prognofis 76. a. Diætæ 77. a. cura Galen. 77. b. 614. a. Paracelli 77. b. 615. a. Helmontii 78. b. 615. b. VVillii 79. a. Sylvii 79. b. 616. a. Cartef. 81. a. 617. a. Autoris 84. a.

Panus vide Phygetium 510. a.

Panochiæ ſeu Bubones Gallici 499. b.

Papillæ & eorum morbi 313. a. à ſuſtione earum mulieres voluptatem ſentunt 313. a.

Papillarum Defectus, vide Defectus papillarum 313. a.

Papillarum Fiſſuræ, vide Fiſſuræ pupillarum 313. a.

Papillarum Foveæ, vide Foveæ papillarum 313. a.

Papillarum Imperforatio, vide Imperforatio papillarum 313. a.

Paracentheſis in Hydrocephalo prodeſt, ſit per punctiorem & ſectionem, adhibita cannula argentea, & aqua per intervalla emittenda 7. b. in vulnere thoracis 288. b.

Paralytici cur non oſſiciant 147. a.

Paraphimioſis 412. a. Pars affecta 412. b. Diagnofis 413. a. caufa Galenicorum 413. b. Paracelli 414. a. Helmontii VVillii, & Sylvii 414. b. Cartefianorum 415. a. Autoris 415. b. cura Galenicorum 417. b. Paracelli 418. b. Helmontii, & VVillii 419. a. Sylvii 419. b. Cartef. 421. a. Autoris 422. a.

Paracynanche eſt ſpecies Anginæ 238. b.

Paratynanche eſt ſpecies Anginæ 238. b.

Paronychia 740. a. Differentia & Pars affecta 741. a. Diagnofis, & caufa Galenicorum 741. b. Paracelli, & Helmontii 742. a. VVillii, Sylvii & Cartefianorum 742. b. Autoris 743. b. Prognofis 744. a. Diætæ 744. b. cura Galenicorum 745. a. Paracelli & Helmontii 746. a. VVillii, Sylvii & Cartefianorum 746. b. Autoris 747. a.

Parotis & Pars affecta 110. a. caufa Galenicorum 111. a. Paracelli 111. b. Helmontii 112. a. VVillii 112. b. Sylvii, 113. a. Cartef. 113. b. Autoris 115. a. Prognofis & Diætæ 115. b. cura Galen. 117. a. Parac. 117. b. VVil.

# I N D E X.

VVillifii 119. *a.* Sylvii 119. *b.* Cartel. 120. *b.*  
 Autoris 123. *b.*  
 Partium externarum inflammatio, vide Inflammatio partium externarum 478. *a.*  
 Partus Cæsareus quando locum habet 444. *b.*  
 461. *a. b.* non raro observatus felicissimi eventus 449. *b.*  
 Partus difficilis excitare potest Hydrocephalum 3. *a.*  
 Partus, & Pars affecta 221. *a.* Diagnofis, & caufa Galen. corum, Paracelli, & Helmontii 221. *b.* VVillifii, Sylvii, Cartefianorum & Autoris 222. *a.* cura Galenicorum 223. *a.* Helmontii & VVillifii 223. *b.* Sylvii 224. *a.* Cartefianorum 224. *b.* Autoris 225. *a.*  
 Paffula Comaritiaceae pinguefaciunt 473. *a.*  
 Pectus quid fit 281. *b.*  
 Pedis diftorſio 761. *a.* Pars affecta 761. *b.* Diagnofis 762. *a.* caufa Galen. & Paracelli 762. *b.* Helmontii & VVillifii 763. *a.* Sylvii & Cartefianorum 763. *b.* Autoris 764. *a.* Prognofis 764. *b.* cura Galenicorum 765. *b.* Paracelli 767. *a.* Helmontii & VVillifii 767. *b.* Sylvii 768. *a.* Cartel. 768. *b.* Autoris 769. *a.*  
 Pedum calcis dolor, vide Dolor calcis pedum 761. *b.*  
 Pedum clavus, vide Clavus pedum 761. *a.*  
 Pedum factor, vide Factor pedum 761. *b.*  
 Penis, ſeu virga 412. *b.* ejus magnitudo 413. *a.* an propter abſceſſum umbilicalem major fieri poſſit 413. *a.*  
 Penis caruncula, vide Caruncula penis 412. *b.*  
 Penis diftorſio 412. *a.* Diagnofis 413. *a.* caufa Galen. corum & Paracelli 414. *a.* Helmontii, VVillifii & Sylvii 414. *b.* Cartel. 415. *a.* Autoris 415. *b.* Prognofis 416. *b.* cura Galenicorum 418. *a.* Helmontii & VVillifii 419. *a.* Sylvii 420. *a.* Cartefianorum 421. *a.* Autoris 422. *a.*  
 Penis excreſcentia, vide Excreſcentia penis 412. *b.* Penſ imperforatio, vide Imperforatio penis 360. *a.*  
 Penis inflammatio, vide Inflammatio penis 412. *b.*  
 Penis inflatio, vide Inflatio penis 412. *b.*  
 Perforatio oculi 44. *a.* Diagnofis 44. *b.* caufa Galenicorum 45. *a.* Paracelli 45. *b.* VVillifii & Sylvii 46. *a.* Cartefianorum 46. *b.* Autoris 47. *a.* Prognofis 48. *a.* cura Galenicorum 48. *b.* Paracelli 49. *b.* VVillifii 50. *b.* Sylvii 51. *a.* Cartel. notum 51. *b.* Autoris 52. *b.*  
 Perinaem 371. *b.* ejus morbi 371. *a.*  
 Perinaei abſceſſus, vide Abſceſſus perinaei 371. *a.*  
 Perinaei gangrena, vide Gangrena perinaei 371. *b.*  
 Perinaei inflammatio, vide Inflammatio perinaei 371. *a.*  
 Perinaem 325. mirum in modum extendi, & dilatari potest in Hydriopici, & rariffimè munitur in Hernia, ſed frequentius laxatur 380. *b.*  
 Perinaemes 761. *a.* Diagnofis 762. *a.* caufa Galenicorum & Paracelli 762. *b.* Helmontii & VVillifii 763. *a.* Sylvii & Cartefianorum 763. *b.* Autoris 764. *a.* Prognofis 765. *a.* cura Galenicorum 765. *b.* Paracelli 767. *a.* Helmontii & VVillifii 767. *b.* Sylvii 768. *a.* Cartel. 768. *b.* Autoris 769. *a.*  
 Perioſium 723. *a.* 741. *a.*  
 P. ſine conſultu iurati, qui conſeſſum in mor-

bis, ad vomitoria & purgantia confugiunt 215. *b.*  
 Peſtis infect acrimoniam, coagulativam in ſanguinem 508. *b.*  
 Peſtifer 497. *b.*  
 Phalangioſis 63. *a.* caufa Galenicorum, Paracelli & Helmontii 63. *b.* VVillifii, Sylvii & Cartel. 64. *a.* Autoris 64. *b.* cura Cartel. 65. *a.* Autoris 65. *b.*  
 Pharyngotomia uſum habet in Angina 249. *b.*  
 Pharynx 275. *a.*  
 Phimoſis 412. *a.* Pars affecta 412. *b.* Diagnofis 413. *a.* caufa Galenicorum 413. *b.* Paracelli & Helmontii 414. *a.* VVillifii & Sylvii 414. *b.* Cartefianorum 415. *a.* Autoris 415. *b.* cura Galenicorum 417. *b.* Paracelli 418. *b.* Helmontii & VVillifii 419. *a.* Sylvii 419. *b.* Cartefian. 421. *a.* Autoris 422. *a.*  
 Phlegmone, ſeu Phlogoſis, vide Inflammatio.  
 Phlogioſis faciei 185. *a.* Pars affecta 185. *b.* caufa Galenicorum, Paracelli & Helmontii 186. *a.* VVillifii & Sylvii 186. *b.* Cartel. 187. *a.* Autoris 187. *b.* Prognofis 188. *b.* cura Galenicorum 189. *a.* Paracelli 189. *b.* Helmontii & VVillifii 190. *a.* Sylvii 191. *a.* Cartel. 191. *b.* Autoris 193. *b.*  
 Phlyctenæ 575. *b.* Pars affecta & Diagnofis 576. *b.* caufa Galenicorum 577. *a.* Paracelli & Helmontii 577. *b.* VVillifii 578. *a.* Sylvii 578. *b.* Cartel. 579. *b.* Autoris 580. *a.* Prognofis 580. *b.* cura Galenicorum 580. *b.* Helmontii 582. *a.* VVillifii 582. *b.* Sylvii 583. *a.* Cartel. 583. *b.* Autoris 583. *b.*  
 Phosphorus 675. *b.*  
 Phthiſis unde 621. *a.*  
 Pithialis quid? 63. *a.*  
 Phygetum 510. *a.* Pars affecta 510. *b.* Diagnofis, & caufa Galen. 511. *a.* Paracelli, Helmontii, & VVillifii 511. *b.* Sylvii & Cartel. 512. *a.* Autoris 512. *b.* Prognofis 513. *a.* cura Galenicorum 513. *b.* Paracelli, Helmontii, & VVillifii 514. *a.* Sylvii 514. *b.* Cartel. & Autoris 515. *a.*  
 Phyma & Pars affecta 510. *b.* Diagnofis & caufa Galenicorum 511. *a.* Paracelli, Helmontii & VVillifii 511. *b.* Sylvii 512. *a.* Cartel. & Autoris 512. *b.* Prognofis 513. *a.* cura Galenic. 513. *b.* Paracelli & Helmontii 414. *a.* VVillifii & Sylvii 514. *b.* Cartel. 515. *a.* Autoris 515. *b.*  
 Phyoſodes, ſeu Emphyſema 54. *a.*  
 Pileolus eburneus in vaginæ procidentia uſurpandus 440. *a.*  
 Pili quomodo nigri, flavi & odorati reddendi 211. *a.* eodem modo generantur, ac alia partes 9. *a.* habent ſitos canales 9. *a.* hinc intercedum fit mutatio coloris, hiſpidiores à poris ſolidioribus oriuntur 9. *b.* an poroſi, vel ſolidi 9. *b.* ſunt per accretionem, & nutritionem, non per appoſitionem 10. *b.* per maiorem cani tacti 11. *a.* omnium colorum, inſtar iridis 13. *a.* criſpi corporis robur, & promptitudinem ad venem denotant 14. *a.* radicibus exſtipare idem eſt, ac Æthiopis cutem mutare 20. *a.*  
 Pilorum conſtitutio naturalis & caufa 9. *a.* color & materia 12. *b.* vermes ſilos produunt 21. *a.* criſpatione unde 14. *a.*  
 Pilorum inconcinnia excreſcentia 8. *b.* caufa Galenicorum 10. *a.* Paracelli 10. *b.* Helmontii

# I N D E X.

- tii & VVillifii* 11. *a.* *Sylvii* 11. *b.* *Autoris* 13. *b.* *Prognosis* 14. *a.* *cura Galenicorum* 15. *b.* *Paracelsi & Helmontii* 16. *b.* *VVillifii* 17. *b.* *Sylvii* 18. *a.* *Cartef.* 19. *b.* *Autoris* 21. *b.*  
*Pilorum morbi* 8. *b.* *malignos insequi solent* 9. *a.*  
*Pilorum fissura, vide Fissura pilorum* 9. *a.*  
*Pinguedo corporis quomodo fiat* 472. *b.*  
*Pingues non ad longinquos perveniunt annos* 473. *b.*  
*Pinguia præservant à canitie* 13. *a.*  
*Pipere muscæ necantur* 739. *b.*  
*Plaga, Pars affecta & Diagnofis* 517. *a.* *causa Galenicorum & Helm.* 517. *b.* *VVillifii, Sylvii & Cartef.* 518. *a.* *cura Galenicorum* 519. *b.* *Helmontii* 520. *a.* *Autoris* 521. *a.*  
*Pleura* 281. *b.*  
*Plica & ejus species* 8. *b.* *Pars affecta* 9. *a.* *causa Galenicorum* 10. *a.* *Paracelsi* 10. *b.* *Helm. & VVillifii* 11. *a.* *Sylvii* 11. *b.* *Autoris* 13. *a.* *Prognosis* 13. *b.* *cura Galen.* 15. *b.* *Helmontii* 16. *b.* *VVillifii & Sylvii* 17. *b.* *Cartef.* 19. *b.* *Autoris* 21. *a.*  
*Plica Polonis morbus endemius est, Germanica minor* 21. *a.* *cur Polonica vocetur, est maligna & benigna, pudendorum muliebrum, in mento etiam observata* 8. *b.* *est morbus contumax, curatur uti lues venerea* 21. *b.*  
*Plumbum, seu Saturnus quarta Chirurgiæ columna est, absorbendo acidum, quod causa proxima ulcerum* 656. *b.*  
*Polypus narium, Differentia ejus & Sarcomatis* 132. *a.* *Diagnofis & causa Galenicorum* 132. *b.* *Paracelsi* 133. *a.* *Helmontii & VVillifii* 133. *b.* *Sylvii & Cartef.* 134. *a.* *Autoris* 134. *b.* *Prognosis* 135. *a.* *cura Galenicorum* 135. *b.* *Paracelsi* 136. *b.* *Helmontii* 137. *a.* *VVillifii* 137. *b.* *Sylvii* 138. *a.* *Cartef.* 138. *b.* *Autoris* 139. *b.*  
*Pori quid?* 548. *b.* *duplices in cute conspiciuntur* 557. *b.*  
*Potri causa* 750. *a.*  
*Porrigo* 8. *b.* *Pars affecta* 9. *a.* *causa Galen.* 10. *a.* *Paracelsi* 10. *b.* *Helmontii & VVillifii* 11. *a.* *Sylvii* 11. *b.* *Autoris* 13. *b.* *Prognosis* 14. *a.* *cura Galenicorum* 15. *b.* *Paracelsi & Helm.* 16. *b.* *VVillifii* 17. *b.* *Sylvii* 18. *a.* *Cart.* 19. *b.* *Autoris* 21. *b.*  
*Potiones vulneraræ in quibus consistunt* 689. *b.*  
*Pneumatocœle* 397. *a.* *causa Galenicorum* 398. *a.* *Paracelsi & Helm.* 398. *b.* *VVillifii & Sylvii* 399. *a.* *Cartef.* 399. *b.* *Autoris* 400. *a.* *Prognosis* 401. *a.* *cura Galen.* 402. *b.* *Paracelsi* 403. *b.* *Helm.* 404. *b.* *VVillifii* 405. *a.* *Sylvii* 405. *b.* *Cart.* 406. *b.* *Autoris* 408. *a.*  
*Pneumatophalus* 379. *a.* *ejus cura* 384. *b.*  
*Præcipitatum diaphoreticum Paracelsi laudatur in Hydrocephalo* 4. *b.*  
*Præmittenda medicamenta antequam ad ferum, & ignem accedimus* 6. *b.*  
*Præcisio vulvæ laudatur, si magna & prolapsa suffocationem minatur* 234. *a.* 237. *b.*  
*Præstat anceps experiri remedium, quam nullum* 34. *b.*  
*Praxis rationalis Neotericorum distat, à veterum obstinatorum irrationali* 533. *b.*  
*Priapismus* 412. *a.* *Pars affecta* 412. *b.* *Diagnofis* 413. *b.* *causa Galenicorum, & Paracelsi* 414. *a.* *Helmontii, VVillifii & Sylvii* 414. *b.* *Cartef.* 415. *a.* *Autoris* 415. *b.* *Prognosis* 416. *a.*  
*cura Galenicorum* 418. *a.* *Paracelsi* 418. *b.* *Helmontii & VVillifii* 419. *a.* *Sylvii* 419. *b.* *Cartefianorum* 421. *a.* *Autoris* 422. *b.*  
*Procidencia ani* 335. *a.* *causa Galenicorum & Paracelsi* 336. *a.* *Helmontii, VVillifii & Sylvii* 336. *b.* *Cartef. & Autoris* 337. *a.* *Prognosis* 338. *a.* *Diata* 338. *b.* *cura Galen.* 339. *a.* *Paracelsi* 340. *b.* *Helmontii* 341. *a.* *VVillifii* 341. *b.* *Sylvii* 342. *a.* *Cartef.* 342. *b.* *Autoris* 343. *a.*  
*Procidencia oculi* 44. *a.* *Diagnofis* 44. *b.* *causa Galenicorum* 45. *a.* *Paracelsi* 45. *b.* *VVillifii & Sylvii* 46. *a.* *Cartefian.* 46. *b.* *Autoris* 47. *a.* *Prognosis* 48. *a.* *cura Galenicorum* 48. *b.* *Paracelsi* 49. *b.* *VVillifii* 50. *b.* *Sylvii* 51. *a.* *Cartef.* 51. *b.* *Autoris* 52. *b.* *à vehementi inflatione tubarum* 47. *b.*  
*Procidencia uteri* 425. *a.* *Diagnofis* 426. *a.* *causa Galenicorum* 426. *b.* *Paracelsi & Helmontii* 427. *b.* *VVillifii* 428. *a.* *Sylvii* 429. *a.* *Cart.* 430. *a.* *Autoris* 431. *a.* *Prognosis* 432. *a.* *cura Galenicorum* 433. *a.* *Paracelsi* 436. *a.* *Helmontii* 437. *a.* *VVillifii* 437. *b.* *Sylvii* 438. *b.* *Cartef.* 440. *a.* *Autoris* 442. *b.*  
*Procidencia uvæ tunicæ & ejus species* 96. *b.* *Diagnofis* 97. *a.* *causa Galenicorum, Paracelsi & Helmontii* 97. *b.* *Autoris* 98. *a.* *Prognosis* 98. *b.* *cura Galenicorum* 99. *a.* *Paracelsi* 99. *b.* *Helm.* *VVillifii & Sylvii* 100. *a.* *Cartef.* 100. *b.* *Autoris* 101. *a.*  
*Prolapsus cartilaginis mucronatæ, & Pars affecta* 295. *a.* *Diagnofis* 295. *b.* *cura Galenicorum, Helmontii & Cartef.* 296. *a.* *Autoris* 296. *b.* *cura Galenic. & Paracelsi* 297. *a.* *Cartef.* 298. *a.* *Autoris* 298. *b.*  
*Prunella, seu nigredo linguæ* 158. *a.* 162. *b.* *causa Paracelsi* 159. *b.* *Helmontii* 160. *a.* *VVillifii* 160. *b.* *Sylvii* 161. *a.* *Cartef.* 161. *b.* *Ant.* 162. *b.* *Progn.* 164. *a.* *cura Galenic.* 165. *b.* *Paracelsi* 166. *a.* *Helmontii & VVillifii* 166. *b.* *Sylvii* 167. *a.* *Cartef.* 168. *a.* *Autoris* 170. *b.*  
*Pruritus vulvæ* 461. *a.* *Diagnofis* 462. *a.* *causa Galenicorum & Paracelsi* 462. *b.* *Helmontii, VVillifii & Sylvii* 463. *a.* *Cartef.* 463. *b.* *Autoris* 464. *a.* *Prognosis* 464. *b.* *Diata & cura Galenicorum* 464. *b.* *Paracelsi* 465. *a.* *Helm.* *& VVillifii* 465. *b.* *Sylvii & Cartef.* 466. *a.* *Autoris* 466. *b.*  
*Psilothra medicamenta* 22. *a.*  
*Pterophthalmia* 58. *b.*  
*Pydracia* 576. *a.* *Pars affecta & Diagnofis* 576. *b.* *causa Galenicorum* 577. *a.* *Paracelsi & Helmontii* 577. *b.* *VVillifii* 578. *a.* *Sylvii* 578. *b.* *Cartef.* 579. *b.* *Autoris* 580. *a.* *Prognosis* 580. *b.* *cura Galenicorum* 581. *a.* *Helmontii* 582. *a.* *VVillifii* 582. *b.* *Sylvii* 583. *a.* *Cartef.* 583. *b.* *Autoris* 585. *a.*  
*Pterygium, seu Unguis, ejus Differentia à suffusione* 72. *a.* *Diagnofis, & causa Galenicorum* 72. *b.* *Paracelsi & Helmontii* 73. *a.* *VVillifii & Sylvii* 73. *b.* *Cartefianorum* 74. *a.* *Autoris* 75. *a.* *Prognosis* 76. *a.* *Diata* 77. *a.* *cura Gal.* 77. *b.* *Paracelsi* 78. *a.* *Helmontii* 78. *b.* *VVillifii* 79. *a.* *Sylvii* 79. *b.* *Cartef.* 80. *b.* *Autoris* 83. *b.*  
*Ptyalismus, & Pars affecta* 195. *a.* *causa Galenicorum* 195. *b.* *Paracelsi & Helmontii* 196. *a.* *VVillifii* 196. *b.* *Sylvii* 197. *a.* *Cartefianorum* 197. *b.* *Autoris* 198. *b.* *quomodo fiat à mucusculis* 199. *a.* *Prognosis* 199. *b.* *cura Galenico-*

# I N D E X.

lenitum & Paracelli 100. *b.* Helmontii & Villisii 101. *a.* Sylvii 101. *b.* Cartel. 102. *b.* A. 103. *a.*

Pulsio mulieribus est mons veneris 462. *a.*

Pulsio mulieribus caruncula, vide Caruncula

Pulsio mulieribus 412. *b.*

Pulsio mulieribus imperforatio, vide Imperforatio

Pulsio mulieribus 461. *a.*

Pulsio mulieribus, seu vulva 461. *a.*

Pulsio mulieribus, & tamen elinguis 162. *b.*

Pulsio mulieribus sunt ad calvitie 12. *b.*

Pulsio gallinacei valde nutriunt 473. *a.*

Pulsio quid? 501. *b.* 594. *a.*

Pulsio bezoardicus Aurores 508. *a.*

Pulsio Ferdinandi Imperatoris, contra obesitatem 477. *b.*

Pulsio sympatheticus Digby curat Hemorrhagiam narium 150. *a.* 155. *b.* 155. *a.* sistit hemorrhagiam venterum 698. *b.*

Punctura aurea in hernia prodest 334. *b.* in Imperforatione aui proficua 345. *b.*

Pupilla quid? 42. *b.*

Pupilla angustia, Pars affecta & Diagnofis 97. *a.* causa Galenicorum, Paracelli, Helmontii & Villisii 97. *b.* Sylvii, Cartesiorum & Aurores 98. *a.* Prognofis 98. *b.* cura Galenicorum 99. *a.* Paracelli 99. *b.* Helmontii & Villisii 100. *a.* Sylvii 100. *b.* Cartel. 101. *a.* Aurores 101. *b.*

Pupilla dilatata, & Diagnofis 97. *a.* causa Galenicorum, Paracelli, Helmontii & Villisii 97. *b.* Sylvii, Cartesiorum & Aurores, & Prognofis 98. *b.* cura Galenicorum 99. *a.* Paracelli 99. *b.* Helmontii & Villisii 100. *a.* Sylvii 100. *b.* Cartel. 101. *a.* Aurores 101. *b.*

Purgantia quaedam acris recensentur, quae potius venena, quam medicamenta 476. *b.*

Pus quid fit 349. *b.* 378. *a.* 449. *a.*

Pustula cervicis uteri 425. *a.* Diagnofis 426. *a.* causa Galenicorum 427. *a.* Villisii 428. *b.* Sylvii 429. *a.* Cartesiorum 430. *a.* Aurores 431. *a.* cura Galenicorum 433. *b.* Paracelli 436. *a.* Helmontii 437. *a.* Villisii 437. *b.* Sylvii 439. *a.* Cartesiorum 440. *a.* Aurores 441. *b.*

Pustula cornu, & Diagnofis 85. *a.* causa Galenicorum 85. *b.* Paracelli 86. *a.* Helmontii & Villisii 86. *b.* Sylvii 87. *a.* Cartel. 87. *b.* Aurores 88. *a.* Prognofis 88. *b.* cura Galenicorum 89. *b.* Paracelli 90. *b.* Helmontii 91. *a.* Villisii 91. *b.* Sylvii 92. *a.* Cartel. 93. *a.* Aurores 94. *b.*

Pyosis. vide Hypopyon 85. *a.*

## Q.

**Q**uae medicamenta non sanant, ea ferrum faciunt; quae ferrum non sanant ea ignis faciunt; quae ignis non sanant ea incurabilia putare oportet 7. *b.* 703. *a.*

Quare infantes in utero matris facile Hydrocephalum acquirit 2. *a.*

Quare oculus multis nervis, & membranis tunicis instructus fit 47. *a.*

Quibus deest vulva, vox tanca evadit 233. *a.*

Quicquid vivere, & sentire videmus, ex ovo emerit 736. *b.*

Quid est homo, folium caducum & imbecillitas exemplum 444. *a.*

Quies corpulentiae producenda est idonea 473. *a.*

Quiete & abstinentia plures curantur morbi 109. *a.*

Quimultum edunt, & tamen manent macri, illis oleum & sulphur alimentorum non est sufficiens ad acidum in succis temperandum 472. *b.*

Quomodo hereditarie morbus a parentibus ad liberos transeat 564. *b.*

Quibus occulti cancri adfunt non curare melius est, curari enim citius intereunt 550. *a.*

Quorum sanguis multo scateat acido, & falso, illi haud sunt obeli, quia ab acido & falso abstinentur olani 472. *b.*

## R.

**R**achitis 710. *a.*

Ramex, seu Hernia 324. *a.*

Ranula linguae 158. *a.* Diagnofis & causa Galenicorum 159. *a.* Paracelli 159. *b.* Helmontii & Villisii 160. *a.* Sylvii 161. *a.* Cartel. 161. *b.* Aurores 162. *a.* Prognofis 163. *a.* cura Galenicorum 165. *b.* Paracelli 166. *a.* Sylvii 166. *b.* Cartel. 168. *a.* Aurores 172. *a.*

Receptaculum chyli 472. *a.*

Reduvia unguium 752. *a.* cura 753. *a.*

Remedia contra Hemorrhagiam 101. *a.*

Renes quid? 346. *a.*

Repositio vertebrae in gibbo 420. *a.*

Rescissio cranii 30. *a.*

Res non naturales male sic vocantur 122. *a.*

Respiratio summe necessaria 228. *a.*

Reticularis oculi tunica, seu retina 43. *b.* 44. *a.*

Retina oculi 44. *a.*

Rhagades uteri 425. *b.* causa Galenicorum 427. *a.* Paracelli 427. *b.* Helmontii 428. *a.* Villisii 429. *a.* Sylvii 429. *b.* Cartel. 430. *a.* Aurores 431. *b.* Prognofis 432. *a.* cura Galenicorum 434. *b.* Paracelli 436. *a.* Helmontii 437. *a.* Villisii 438. *a.* Sylvii 439. *a.* Cartel. 440. *b.* Aurores 443. *b.*

Rhyas, Pars affecta, causa Galenicorum 66. *b.* Paracelli 66. *a.* Helmontii, Villisii 66. *b.* Cartel. & Aurores 67. *a.* cura Galenicorum 67. *b.* Paracelli 68. *a.* Helmontii & Villisii 68. *b.* Sylvii & Cartel. 69. *a.* Aurores 69. *b.*

Rima cranii 29. *b.*

Rifus Sardonius 173. *a.* Diagnofis, & causa Galenicorum 174. *a.* Villisii 175. *a.* Cartel. 175. *b.* Aurores 176. *b.* Prognofis & Dieta 177. *b.* cura Galenicorum 178. *b.* Villisii 179. *b.* Cartel. 180. *b.* Aurores 182. *b.*

Rifus Sardonius ab usu herbae Sardoae 176. *b.*

Rifus in capitis vulneribus noxius 24. *b.*

Roseolae saltantes 755. *a.* Differentia 755. *b.* Diagnofis 756. *a.* causa Galenicorum 756. *b.* Paracelli, Helmontii, Sylvii & Cartel. 757. *a.* Aurores & Prognofis 757. *b.* Dieta & cura Galenicorum 758. *a.* Paracelli 759. *b.* Helmontii 760. *a.* Villisii, Sylvii Cartel. & Aurores 760. *b.* Neapolitanis est uxoribus endemicus 756. *b.* quare Neapolitanis foeniens 758. *a.*

Rosmarinus in Hydrocephalo convenit 7. *a.*

Rothlauff 523. *a.*

Rubedo in Ophthalmia unde 74. *b.*

Rugositas unguium 749. *a.* causa Galenicorum & Paracelli 749. *b.* Helmontii & Villisii 750. *a.* Sylvii



# I N D E X.

Sylvii 750. *b.* Cartesiorum 751. *a.* Autoris 751. *b.* Prognosis & Dieta 752. *a.* cura Galen. 752. *b.* Paracelsi 753. *a.* Helmontii & VVillifii 753. *b.* Sylvii & Cartel. 754. *a.*  
 Ruptura, seu Hætnia 324. *a.*  
 Rulima Turcarum ad evellendos pilos 22. *a.*  
 Ruta muraria in Hydrocephalo prodest 7. *a.*

## S.

**S**abina in Hydrocephalo laudatur 7. *a.*  
 Salivatio quomodo fit à mercurialibus 199. *a.*

Salvia in Hydrocephalo commendatur 7. *a.*  
 Simbucina in Hydrocephalo conferunt 7. *a.*  
 Sanguis fluxu ac refluxu suo omnes tubulos corporis pervadit 600. *a.* in Peste corollivus est unde Bubones oriuntur 501. *b.* est vitæ thesaurus & spiritus animalium nutrimentum 142. *a.* an corporis nutrimentum 470. *b.* quod tripliciter effundatur ex vasis suis 482. *b.* universas corporis partes pervagatur 525. *a.* solus extravasatus non est primaria causa inflammationis 485. *a.* ejus & reliquorum succorum motus male se habens, fons omnium fere symptomatum 322. *a.* ejus stagnatio, vel evasatio plucium morborum causa 522. *a.*

Sanies quid? 634. *a.*  
 Sanitas dependet à partium solidarum motu, & succorum agitatione 593. *a.*

Sarcocoe 397. *a.* causa Galenicorum 398. *a.* Paracelsi & Helmontii 398. *b.* VVillifii & Sylvii 399. *a.* Cartesiorum 399. *b.* Autoris 400. *a.* Prognosis 401. *a.* cura Galenicorum 402. *b.* Paracelsi 404. *a.* Helmontii 404. *b.* VVillifii 405. *a.* Sylvii 405. *b.* Cartel. 406. *b.* Autoris 408. *b.*

Sarcocoma 132. *a.* Diagnofis & causa Galen. 132. *b.* Paracelsi 133. *a.* Helmontii & VVillifii 133. *b.* Sylvii & Cartel. 134. *a.* Autoris 134. *b.* Prognosis 135. *a.* cura Galenicorum 135. *b.* Paracelsi 136. *b.* Helmontii 137. *a.* VVillifii 137. *b.* Sylvii 138. *a.* Cartel. 138. *b.* Autoris 139. *b.*

Sarcophalos 379. *a.* cura 385. *a.*  
 Satoribus lætibus, & verrucæ familiares sunt 605. *a.*

Satyrifas 412. *a.* Pars affecta 412. *b.* Diagnofis 413. *b.* causa Galenicorum & Paracelsi 414. *a.* Helmontii, VVillifii & Sylvii 414. *b.* Cartesiorum 415. *a.* Autoris 415. *b.* cura Galenicorum 418. *a.* Paracelsi 418. *b.* Helmontii & VVillifii 419. *a.* Sylvii 419. *b.* Cartesiorum 421. *a.*

**S**aufen der Ohren 124. *a.*

Scabies 556. *a.* Pars affecta 557. *a.* Diagnofis 557. *b.* causa Galenicorum 558. *b.* Paracelsi & Helmontii 559. *b.* VVillifii 560. *a.* Sylvii 561. *a.* Cartesiorum 561. *b.* Autoris 562. *b.* Prognosis 565. *a.* cura Galenicorum 566. *a.* Paracelsi 568. *b.* Helmontii 569. *a.* VVillifii 569. *b.* Sylvii & Cartesiorum 570. *a.* Autoris 571. *b.*

Scabrities unguinum 749. *a.* causa Galenicorum & Paracelsi 749. *b.* Helmontii 750. *a.* VVillifii & Sylvii 750. *b.* Cartesiorum 751. *a.* Autoris 751. *b.* Prognosis & Dieta 752. *a.* cura Galenicorum 752. *b.* Paracelsi 753. *a.* Helmontii & VVillifii 753. *b.* Sylvii & Cart. 754. *a.* Autoris 754. *b.*

**S**chwammgelvachs 600. *a.*

Scirrhus 534. *b.* Pars affecta 535. *a.* Diagnofis 535. *b.* causa Galenicorum & Paracelsi 535. *b.* Helmontii 536. *a.* VVillifii & Sylvii 536. *b.* Cartel. 537. *a.* Autoris 538. *b.* Prognosis 540. *b.* cura Galenicorum 541. *b.* Paracelsi 542. *a.* Helmontii & VVillifii 542. *b.* Sylvii 543. *a.* Cartesiorum 544. *a.* Autoris 545. *b.*

Scirrhus hepatis 346. *b.* causa Galenicorum 347. *b.* Paracelsi 348. *a.* VVillifii 348. *b.* Sylvii, Cartesiorum & Autoris 349. *a.* Prognosis 350. *a.* Dieta & cura Galenicorum 351. *a.* Paracelsi 351. *a.* Helmontii 354. *b.* VVillifii 355. *a.* Sylvii & Cartel. 356. *a.* Autoris 357. *b.*

Scirrhus lienis 346. *b.* causa Galenicorum 347. *b.* Paracelsi 348. *a.* VVillifii 348. *b.* Sylvii & Cartesiorum 349. *a.* Autoris 349. *b.* Prognosis 350. *a.* cura Galenicorum 351. *b.* Helmontii & VVillifii 355. *a.* Sylvii & Cartel. 356. *a.* Autoris 357. *b.*

Scirrhus mammarum 299. *a.* causa Galenicorum 300. *a.* Paracelsi, Helmontii & VVillifii 300. *b.* Sylvii 301. *a.* Cartesiorum 301. *b.* Autoris 302. *b.* cura Galenicorum 305. *a.* Paracelsi 305. *b.* Helmontii & VVillifii 306. *a.* Sylvii 307. *a.* Cartesiorum 308. *b.* Autoris 311. *a.*

Scirrhus oris, & causa Galenicorum 195. *a.* Paracelsi 195. *b.* Helmontii & VVillifii 196. *a.* Sylvii & Cartel. 197. *a.* Autoris 198. *a.* Prognosis 199. *b.* cura Galenicorum 200. *a.* Paracelsi 200. *b.* Helmontii & VVillifii 201. *a.* Sylvii 201. *b.* Cartesiorum 202. *b.* Autoris 203. *b.*

Scirrhus renum 347. *a.* causa Galenicorum 347. *b.* Paracelsi 348. *a.* VVillifii 348. *b.* Sylvii & Cartel. 349. *a.* Autoris 349. *b.* Prognosis 350. *a.* cura Galenicorum 353. *a.* Paracelsi 354. *b.* Helmontii & VVillifii 355. *a.* Sylvii & Cartel. 356. *a.* Autoris 357. *b.*

Scirrhus uteri 444. *a.* Diagnofis 445. *a.* causa Galenicorum 445. *b.* Paracelsi 446. *a.* Helmontii & VVillifii 446. *b.* Sylvii 447. *a.* Cartesiorum 448. *a.* Autoris 448. *b.* Prognosis 449. *b.* cura Galenicorum 451. *b.* Paracelsi 453. *b.* Helmontii 454. *a.* VVillifii 454. *b.* Sylvii 455. *a.* Cartesiorum 456. *a.* Autoris 458. *a.*

Sclerotica oculi tunica 42. *b.*

Scopus primarius medici 42. *a.*

Scorbutus est morbus endemius in Belgio, & Anglia 633. *a.*

Scorbutici carie dentium afficiuntur 209. *b.*

Serophulæ 251. *a.* Diagnofis 251. *b.* causa Galenicorum & Paracelsi 252. *a.* Helmontii 252. *b.* VVillifii, Sylvii & Cartesiorum 253. *a.* Autoris 253. *b.* Prognosis 254. *a.* cura Galenicorum 255. *a.* Paracelsi 256. *b.* Helmontii & VVillifii 257. *a.* Sylvii 257. *b.* Cartel. 258. *a.* Autoris 258. *b.* earum à Strumis distinctio 250. *b.* 251. *a.*

Scrotum, seu Oscheum & ejus morbi 397. *a.* ad magnitudinem capitis extendi potest in Hernia 380. *b.*

Scroti exoratio 397. *a.* Diagnofis 398. *a.* causa Galenicorum 398. *a.* Paracelsi 398. *b.* VVillifii 399. *a.* Sylvii & Cartel. 399. *b.* Autoris 400. *b.* Prognosis 401. *a.* cura Galen. 403. *b.* Parac.

# I N D E X.

Paracelsi & Helmontii 404. *b.* VVillisi 405. *a.*  
 Sylvii 406. *a.* Cartesiorum 406. *b.* Autoris  
 410. *b.*  
 Scroci inflammatio, vide Inflammatio scroci  
 397. *a.*  
 Sectio an accommodatum in cancro remedium  
 553. *a.* in varicibus 597. *a.* in aneurismate  
 599. *a.*  
 Sectio ciliaria 461. *a.*  
 Sectio stomacum an conveniat 158. *a.*  
 Sectione chirurgica serum in Hydrocephalo ex-  
 hauritur 4. *b.* 5. *b.* 6. *b.*  
 Sedes telicranii 30. *a.* cura 36. *a.*  
 Semen 564. *b.*  
 Senus nullus sine nervis fieri potest, neque in  
 oculo, aure, naribus aut lingua 126. *a.* 206. *a.*  
 Servabit homini sanguinem qui servare didi-  
 cit 155. *a.*  
 Sereni ex lymphæ ductibus exudans est causa  
 Hydrocephali 2. *b.*  
 Setacea in Ophthalmia invertata conveniunt  
 82. *a.* in obesiute 478. *a.* sunt potius doloro-  
 sa momenta, quam medicamenta in Ele-  
 phantia 575. *b.*  
 Sexus sequior potius mori amat, quam deformis  
 vivere 608. *a.*  
 Sine aëre nec homo nec animal vivere potest  
 625. *a.*  
 Sinus & Pars affecta 479. *a.* Diagnofis 480. *b.*  
 causa Galenicorum & Paracelsi 481. *a.* Helm.  
 481. *b.* VVillisi 482. *a.* Sylvii 482. *b.* Cartesi-  
 orum 483. *a.* Autoris 485. *b.* Prognofis  
 487. *b.* cura Galenicorum 489. *a.* Paracelsi  
 489. *b.* Helmontii 490. *a.* VVillisi 490. *b.*  
 Sylvii 491. *b.* Cartes. 493. *b.* Autoris 496. *b.*  
 Sinus latus quomodo curandus 36. *b.*  
 Sitis 37. *a.* Pars affecta, Diagnofis & causa Ga-  
 lenicorum 37. *b.* Paracelsi & Helmontii 38. *a.*  
 VVillisi & Sylvii 38. *b.* Cartesiorum 39. *a.*  
 Autoris & Prognofis 39. *b.* cura Galenicorum  
 & Paracelsi 40. *a.* Helmontii, VVillisi  
 & Sylvii 40. *b.* Cartesiorum 41. *a.* Autoris  
 42. *a.*  
 Saliva differt à spūto, mercurium mortificat,  
 continet acidum, venenata est in canibus ra-  
 bic laborantibus & morsu Hydrophobiam  
 causantibus 198. *a.* intra duodecim horarum  
 spacium uncia decem Salivæ feceruntur fe-  
 cretio quomodo fiat 198. *b.* verminosa 199. *a.*  
 Sirones 734. *a.* Diagnofis & Differentia à crino-  
 nibus 735. *a.* causa Galenicorum, Paracelsi,  
 Helmontii & VVillisi 735. *b.* Sylvii & Car-  
 tes. 736. *a.* Autoris 736. *b.* Prognofis 737. *b.*  
 cura Galenicorum & Paracelsi 738. *a.* Hel-  
 montii, VVillisi & Sylvii 738. *b.* Cartes. &  
 Autoris 739. *a.*  
 Si uno remedio omnis tollatur affectus, non  
 opus esset cognitio causarum, nec doctrina  
 signorum 2. *a.*  
**Somnifecien** 194. *a.* 608. *a.*  
 Somnus impinguare potest, hoc videre est in ur-  
 lis, taxid & muribus 473. *a.*  
**Somnifecien** 185. *a.* 194. *b.* 608. *a.*  
 Sonus sine aëre nullus percipitur 126. *a.*  
 Sordities dentium 206. *a.* causa Galen. 207. *a.*  
 Helm. 207. *b.* VVillisi & Sylvii 208. *a.* Cartes.  
 208. *b.* Autoris 210. *a.* Prognofis 211. *a.* cura  
 Galen. 212. *b.* Paracelsi 213. *a.* Helmont. &  
 VVillisi 213. *b.* Sylvii 214. *a.* Cartes. 215. *b.*  
 Autoris 219. *b.*

Spafinus cynicus 173. *a.* Diagnofis 173. *b.* causa  
 Galen. 174. *a.* Parac. & Helm. 174. *b.* VVill. &  
 Sylvii 175. *a.* Cartes. 175. *b.* Aut. 176. *b.* Pro-  
 gnofis 177. *a.* Dieta 177. *b.* cura Galenicor.  
 178. *b.* Paracelsi & Helmontii 179. *a.* VVil-  
 lisi & Sylvii 179. *b.* Cartes. 180. *b.* Autoris  
 182. *a.* *b.*  
 Spermatocle 400. *b.*  
 Sphecus 658. *a.* Pars affecta 658. *b.* Diagnofis  
 & causa Galenicorum 659. *a.* Paracelsi &  
 Helmontii 659. *b.* VVillisi & Sylvii 660. *a.*  
 Cartes. 660. *b.* Autoris 662. *a.* Progn. 663. *b.*  
 cura Galen. 664. *b.* VVillisi 665. *b.* Sylvii &  
 Cartes. 666. *a.* Autoris 670. *b.*  
 Sphecus uteri 444. *a.* Diagnofis 445. *a.* causa  
 Galenicorum & Paracelsi 446. *a.* Helmontii  
 & VVillisi 446. *b.* Sylvii 447. *b.* Cartesiano-  
 rum 448. *a.* Autoris 449. *a.* Prognofis 449. *b.*  
 cura Galenicorum 452. *b.* Paracelsi 453. *b.*  
 Helmontii & VVillisi 454. *b.* Sylvii 455. *a.*  
 Cartes. 456. *b.* Autoris 458. *b.*  
 Spina digito infixa actū, & potentialiter frigida  
 movet excitat calorem 481. *b.*  
 Spina nodosa 289. *a.* Diagnofis & causa Galeni-  
 corum 289. *b.* Paracelsi, Helmontii, VVillisi  
 & Sylvii 290. *a.* Cartes. & Autoris 290. *b.*  
 Prognofis 291. *b.* cura Galenicorum 292. *b.*  
 Paracelsi, Helmontii & VVillisi 292. *b.* Syl-  
 vii 293. *a.* Cartes. 293. *b.* Autoris 294. *b.*  
 Spina veniosa 630. *b.* 710. *a.* 744. *a.* cura 748. *b.*  
 Splen, vide Lien 346. *a.*  
 Spiritus animales quid 705. *b.* quare Atrophiam  
 caufentur 614. *a.* eorum influxus in omnes  
 nervos 710. *a.* sunt lucis nutritii distributo-  
 res 295. *a.* 624. *a.* chylum subtilem & fini-  
 diorem reddunt 471. *b.* sunt omnium ten-  
 sionum & motuum auctores 519. *a.* eorum nu-  
 tritio 623. *b.*  
 Spiritus catacathalis Autoris prodest in corpulen-  
 tia 477. *b.*  
 Spiritus vitæ ex auro Paracelsi laudatur in Hy-  
 drocephalo 4. *b.*  
 Stomatoma 585. *b.* causa Galenicorum & Parac.  
 586. *b.* Cartesiorum 587. *b.* Autoris 588. *b.*  
 cura Galenic. 589. *b.* Paracelsi & Helmontii  
 590. *a.* VVillisi 590. *b.* Cartes. 591. *a.* Auto-  
 ris 592. *a.*  
 Sternum 295. *a.*  
 Sternutatio est quidem indicium optimæ valeru-  
 dinis, sæpe tamen etiam malum signum præ-  
 bet, & Apoplexie vel Epilepsie prodromus  
 est; hinc sternutantibus salutem precamur  
 142. *b.* 147. *b.* prodest in surditate, cardial-  
 gia & difficulter parientibus 148. *a.*  
 Sternutatio 142. *b.* Pars affecta 143. *a.* Diagnofis  
 & causa Galenicorum 143. *b.* Paracelsi & Hel-  
 montii 144. *a.* VVillisi & Sylvii 144. *b.* Car-  
 tes. 145. *a.* Autoris 146. *a.* Prognofis 147. *b.*  
 Dieta 148. *a.* cura Galen. 149. *a.* Paracelsi  
 149. *b.* Helmontii 150. *a.* VVillisi 151. *a.* Sylvii  
 152. *a.* Cartes. 153. *a.* Autoris 156. *b.*  
 Sternutantibus cur salutem precemur 142. *b.*  
 Strabismus 44. *a.* Diagnofis 44. *b.* causa Galeni-  
 corum 45. *a.* Paracelsi 45. *b.* VVillisi & Sylvii  
 46. *a.* Cartesiorum 46. *b.* Autoris 47. *b.*  
 Prognofis 48. *a.* cura Galenicorum 48. *b.* Pa-  
 racelsi 49. *b.* VVillisi 50. *b.* Sylvii 51. *a.* Car-  
 tes. 52. *a.* Autoris 53. *a.*  
 Stidor dentium 205. *b.* causa Galenic. Paracelsi  
 & Helmontii 207. *a.* VVillisi & Sylvii 208. *a.*  
 H h h h h  
 Cartes.

- Cartef. 208. *b.* Autoris 110. *a.* Prognosis 211. *a.* cura Galenicorum 212. *b.* Paracelsi 213. *a.* Helmontii & VVillii 213. *b.* Sylvii 214. *a.* Cartef. 215. *a.* Autoris 220. *b.*
- Strumæ 250. *b.* Carinithæ & Styriæ incolis familiaris; Descriptio & Pars affecta 251. *a.* Diagnos 251. *b.* causa Galen. & Paracelsi 252. *a.* Helmontii 252. *b.* VVillii, Sylvii & Cartef. 253. *a.* Autoris 253. *b.* Prognosis 254. *a.* Diata 254. *b.* cura Galenicorum 255. *a.* Paracelsi & Helmontii 256. *b.* VVillii 257. *a.* Sylvii 257. *b.* Cartef. 258. *a.* Autoris 258. *b.* cura annua per Regem Angliæ & Galliæ 260. *b.* 261. *a.* oriuntur ex aquis metallicis & mineralibus 252. *b.* 254. *a.* curari imaginatione 260. *b.*
- Stupor dentium, vide Hemodia 206. *a.*
- Stupor Iugamentorum 704. *a.* Diagnos 705. *b.* causa Galenicorum 706. *a.* Paracelsi 706. *b.* Helmontii 707. *a.* VVillii 707. *b.* Sylvii 708. *a.* Cartefianor. 708. *b.* Autoris 709. *a.* Prognosis 711. *a.* cura Galen. 712. *a.* Paracelsi 713. *a.* Helm. & VVillii 713. *b.* Sylvii 716. *a.* Cartef. 716. *b.* Autoris 717. *b.*
- Succinat laudatur in Scrimatione 157. *a.*
- Succino cranii 30. *a.* cura 36. *a.*
- Sucus citri emaciavit Electorem Palatinum, Carolum 641. *a.*
- Sucus pancreaticus quid 471. *a.* quid agat in chylificatione 471. *b.* ejus defensor Sylvius est 742. *b.*
- Sudamina 576. *a.* Pars affecta & Diagnos 576. *b.* causa Galenicorum 577. *a.* Paracelsi & Helmontii 577. *b.* VVillii 578. *a.* Cartefianor. 579. *a.* Autoris 580. *a.* Prognosis & cura Galenicorum 580. *b.* Paracelsi 581. *b.* Helmontii 582. *a.* VVillii 582. *b.* Sylvii & Cart. 583. *a.* Autoris 584. *a.*
- Suffusio, seu Catarrhis, & Diagnos 97. *a.* causa Galenicorum, Paracelsi, Helmontii & VVillii 97. *b.* Sylvii, Cartefian. & Autoris 98. *b.* Prognosis 98. *b.* cura Galenicor. 99. *a.* Paracelsi 99. *b.* Helmontii & VVillii 100. *a.* Sylvii 100. *b.* Cartef. 101. *a.* Autoris 101. *b.*
- Suffusio, seu Contusio 22. *a.*
- Sugillatio, vide Hypophagma 72. *a.*
- Sugillatio, seu Contusio 22. *a.*
- Sugillatio, vide Ecchymoma.
- Suppuratio quid 513. *a.* in contusione capitis unde 23. *b.*
- Surditas & Pars affecta 124. *a.* causa Galenicor. & Paracelsi 124. *b.* Helmontii, VVillii & Sylvii 125. *a.* Cartef. 125. *b.* Autoris 127. *a.* Prognosis 127. *b.* cura Galenicorum 128. *a.* Paracelsi, Helmontii & VVillii 128. *b.* Sylvii 129. *a.* Cartef. 129. *b.* Autoris 131. *a.*
- Sutratat lientem exsiccipat 357. *b.*
- Sylvius succi pancreatici defensor eum accusat in Paronychia 742. *b.*
- Synanche citi species Anginæ 238. *b.*
- Syntheridius, seu cura fracturæ ossium 730. *a.*
- Synthesis operatio chirurgica 721. *a.*
- Syrupus de spina cervina prodest in Hydrocephalo 6. *b.*
- T.*
- Alpa topinaria 576. *a.* Pars affecta 576. *b.* Diagnos & causa Galenicorum 577. *a.* Paracelsi 577. *b.* VVillii 578. *b.* Cart. 579. *b.* Autoris & Progn. 580. *b.* cura Galen. 581. *b.* Paracelsi & Helm. 582. *a.* VVillii 582. *b.* Sylvii 583. *a.* Cartef. 583. *b.* Autoris 585. *b.*
- Tantum quisque curat, quantum cognoscit 2. *a.*
- Taubheit 124. *a.*
- Tendines quid 704. *b.*
- Tentigo, clitoridis 425. *a.* Diagnos 425. *b.* causa Galenicorum 426. *b.* Paracelsi 427. *a.* Helmontii 427. *b.* VVillii 428. *a.* Sylvii 429. *a.* Cartefianorum 429. *b.* Autoris 430. *b.* Prognosis 432. *a.* cura Galenicorum 433. *a.* Paracelsi 433. *a.* Helmontii 436. *b.* VVillii 437. *a.* Cartefianorum 439. *b.* Autoris 441. *a.*
- Terminus 576. *a.* Pars affecta & Diagnos 576. *b.* causa Galenicorum 577. *a.* Paracelsi & Helmontii 577. *b.* VVillii 578. *a.* Sylvii 578. *b.* Cartef. 579. *a.* Autoris 580. *a.* Prognosis 580. *b.* cura Galenicorum 581. *a.* Paracelsi 581. *b.* Helm. 582. *a.* VVillii 582. *b.* Sylvii 583. *a.* Cartef. 583. *b.* Autoris 584. *a.*
- Terror coagulat succum nervum, & ejus stagnatione plurimi affectus oriuntur 176. *b.* 209. *b.*
- Testes, seu testiculi 325. *a.* 386. *b.* quare sic dicantur, & quot numero sint 386. *b.* 387. *a.* sunt congeries minutissimorum vasculorum 20. ulnarum 386. *b.* pluribus involvuntur tunicis 396. *b.*
- Testiculus gliris constat ex filamentis nerveis 15. ulnas longis 396. *b.*
- Testiculus veneris 386. *a.*
- Testiculorum contusio, vide Contusio testiculorum.
- Testiculorum erosio, vide Erosio testiculorum 386. *b.*
- Testium inflammatio, vide Inflammatio testium 386. *a.*
- Thæ potus omnes stagnationes tollens inflammationi conducit 488. *a.* vinum habet diureticam & sudorificam 474. *a.* 477. *a.* prodest ad maculas & pustulas faciei 613. *b.*
- Thermæ Alopeciam causantur 12. *a.* profunt in Lpodermio 421. *b.* in ulcere vaginæ uteri 443. *a.* in contraçura 720. *a.* in acridura membri 630. *a.*
- Thorax, vide Pectus 281. *b.*
- Thoracis fistula, vide Fistula thoracis 281. *a.*
- Thymus 755. *b.* Diagnos & causa Galenicorum 756. *b.* Paracelsi, Helmontii, VVillii & Sylvii 757. *a.* Cartef. Autoris & Prognosis 757. *b.* causa Galen. 759. *b.* Parac. & Helm. 760. *a.* VVillii, Sylvii & Cartef. 760. *b.* Aut. 761. *b.*
- Thyra est species lepræ 559. *b.*
- Tibia 756. *a.*
- Tincones, seu Bubones Gallici 499. *b.*
- Tinctura cosmetica laudatur in Gutta rosacea 193. *a.* diaphoretica Myrsiculi laudatur in Hydrocephalo 6. *a.* Odontalgica VVedelii laudatur in Doloze dentium 217. *b.* aurea diaphoretica ad medicinæ universalis dignitatem aspirans 458. *b.* diuretica in corpulentia 477. *b.* Bezoardica Autoris 507. *b.* Anomii vulneraria 697. *a.*
- Tinea 8. *a.* Diagnos 9. *a.* causa Galen. 9. *b.* Paracelsi 10. *a.* Helmontii, VVillii & Sylvii 11. *a.* Cartef. 11. *b.* Autoris 12. *a.* Prognosis 13. *b.* cura Galen. 14. *b.* Paracelsi 16. *a.* Helm. 16. *b.* VVillii 17. *a.* Sylvii 17. *b.* Cartef. 19. *a.* Aut. 20. *b.* de se virulentum quid effundit 9. *a.* Species ejus squamosa & ficiosa 8. *a.*
- Tinnitus aurium, Pars affecta, & causa Galen. 124. *a.* Paracelsi & Helm. 124. *b.* VVillii & Sylvii



# I N D E X.

Sylvii 125. *a.* Cartesii 125. *b.* Autoris 126. *b.*  
 Prognosis 127. *a.* Dieta & cura Galenicorum  
 127. *b.* Paracelsii & Helmontii & VVillii 128. *b.*  
 Sylvii & Cart. 129. *a.* Aut. 130. *a.*  
 Tubantis 138. *b.*  
 Tonille & cerum morbi 231. *a.* unaquaque  
 pen det 5. *a.* ex conspicitur ulceroraz in mor-  
 bo G. haco affectus 231. *a.*  
 Tonallam in inflammatione vide Inflammatio ton-  
 illarum 231. *a.*  
 Tophi dentium 206. *a.* causa Galenicorum 207.  
*a.* Helmontii 207. *b.* VVillii & Sylvii 208. *a.*  
 Cartesii 208. *b.* cura Galenicorum 212. *b.* Hel-  
 montii & VVillii 213. *b.* Sylvii 214. *a.* Cart.  
 215. *b.* Autoris 219. *b.*  
 Tophi ossium 722. *b.* Diagnofis 723. *b.* causa  
 Galenicorum 724. *a.* Paracelsii & Helmontii &  
 VVillii 724. *b.* Sylvii & Cartefianorum 725.  
*a.* Autoris 726. *a.* Prognofis 726. *b.* cura Gale-  
 nicorum 727. *b.* Paracelsii & Helm. 728. *a.*  
 VVillii 728. *b.* Sylvii 729. *a.* Cartesii 729. *b.*  
 Autoris 732. *b.*  
 Tophi podagrici quid sint 726. *b.*  
 Totus homo morbus est 425. *a.*  
 Trachea. vide Aq. trachea.  
 Trachoma 54. *a.* Diagnofis 54. *b.* causa Galen-  
 & Paracelsii 55. *a.* Helmontii 55. *b.* VVillii  
 56. *a.* Sylvii & Cart. 56. *b.* Autoris 57. *a.*  
 Prognofis 58. *a.* cura ve erum 58. *b.* Paracelsii  
 59. *a.* Helmontii 59. *b.* VVillii 60. *a.* Sylvii  
 & Cartesii 60. *b.* Autoris 62. *a.*  
 Transpiratio interitibus quomodo fiat 472. *b.*  
 ejus in opere nutritionis 476. *a.* deiciens  
 excitare poteft hydrocephalum 3. *a.* plus excre-  
 mentum egerit, quam fenfibiles excretio-  
 nes 278. *b.* 553. *a.* impedita inferit Eryfipelas  
 mammarum 302. *b.* ex octo libris alimen-  
 torum quingue per cam avolunt 558. *a.*  
 Transplantatio laudatur in Odontalgia 218. *a.*  
 Traumatica proflu interno ad externam cura-  
 tionem plurimum profant 53. *b.*  
 Tremor laborum 173. *a.* Diagnofis 173. *b.* cau-  
 fa Galenicorum 174. *a.* Parac. & Helmontii  
 174. *b.* VVillii & Sylvii 175. *a.* Cartesii 175.  
*b.* Autoris 176. *a.* Prognofis 177. *a.* cura Gale-  
 nicorum 178. *a.* Paracelsii & Helmontii 179.  
*a.* VVillii & Sylvii 179. *b.* Cartesii 180. *b.*  
 Autoris 181. *b.*  
 Tremor lingua a terrore prohibita à puella pro-  
 ducta 176. *b.*  
 Trepanatio quid 35. *a.* quando instituenda 34. *a.*  
 in Gallia provincia Bectagne familiaris, finis  
 ejus 34. *b.* in fractura cranii 34. *a.*  
 Trepanum quid? 35. *a.*  
 Tres indicationes VVillii in curando Hydro-  
 cephalo 4. *b.* 5. *a.*  
 Tria funt quibus Medicus ægrotis auxilium ferre  
 poteft; Dieta, Pharmacia & Chirurgia 7. *b.*  
 Trice cirithorum 8. *b.*  
 Trichiafis 63. *a.* causa Galenicorum, Paracelsii  
 & Helmontii 63. *b.* VVillii, Sylvii, Cartes-  
 fianorum & Autoris 64. *a.* cura Galenicorum  
 & Paracelsii 64. *b.* Helmontii, VVillii, Sylvii  
 & Cartesii 65. *a.* Autoris 65. *b.*  
 Trichoma 8. *b.*  
 Tubacacofica prodeft in obauditione 131. *b.*  
 Tumor cervicis uteri 425. *b.* causa Galenicorum  
 427. *a.* Paracelsii 427. *b.* VVillii 428. *b.*  
 Sylvii 429. *a.* cura VVillii 438. *a.* Sylvii  
 438. *b.*

Tumor labiorum 173. *a.* Diagnofis 173. *b.* cau-  
 fa Galenicorum & Paracelsii 174. *a.* Helmontii  
 & VVillii 174. *b.* Sylvii 175. *a.* Cartes-  
 fianorum 175. *b.* Autoris 176. *a.* Prognofis  
 177. *a.* cura Galenicorum 178. *a.* Paracelsii &  
 Helmontii 179. *a.* VVillii & Sylvii 179. *b.*  
 Cartesii 180. *a.* Autoris 181. *a.*  
 Tumor labiorum vulvæ 461. *a.* Diagnofis 462. *a.*  
 causa Galenicorum, & Paracelsii 462. *b.* Syl-  
 vii 463. *a.* Cartefianorum 463. *b.* Autoris  
 464. *a.* Prognofis 464. *b.* cura Galenicorum  
 465. *a.* Sylvii & Cartefianorum 466. *a.* Auto-  
 ris 467. *a.*  
 Tumor glandularum colli 238. *a.* Diagnofis 239.  
*b.* causa Galenicorum & Paracelsii 240. *a.* Hel-  
 montii, VVillii & Sylvii 240. *b.* Cartefia-  
 norum 241. *a.* Autoris 242. *a.* Prognofis  
 242. *b.* Dieta 243. *a.* cura Galenicorum 244.  
*b.* Paracelsii & Helmontii 245. *a.* VVillii &  
 Sylvii 246. *a.* Cartefianorum 247. *b.* Autoris  
 249. *b.*  
 Tumor linguæ 158. *a.* Diagnofis & causa Gale-  
 nicorum 159. *a.* Paracelsii 159. *b.* Helm. &  
 VVillii 160. *a.* Sylvii 160. *b.* Cartesii 161. *a.*  
 Autoris 162. *a.* Prognofis 164. *a.* cura Gale-  
 nicorum 165. *b.* Paracelsii 166. *a.* Helmontii  
 & VVillii 166. *b.* Sylvii 167. *a.* Cartesii 167. *b.*  
 Autoris 169. *b.*  
 Tumor mammarum 299. *a.* Diagnofis 299. *b.*  
 causa Galenicorum 300. *a.* Paracelsii, Hel-  
 montii & VVillii 300. *b.* Sylvii 301. *a.* Cartes-  
 fianorum 301. *b.* Autoris 302. *a.* cura Gale-  
 nicorum 304. *b.* Paracelsii 305. *b.* Helmontii  
 & VVillii 306. *a.* Sylvii 306. *b.* Cart. 307. *a.*  
 Autoris 309. *a.*  
 Tumor testis 397. *a.* causa Galenicorum 398. *a.*  
 Tumor testium 386. *a.* causi Galenicorum 387.  
*a.* Paracelsii & Helmontii 387. *b.* VVillii,  
 Sylvii & Cartefianorum 388. *a.* Autoris 388.  
*b.* Prognofis 389. *b.* cura Galenicorum 390. *a.*  
 Paracelsii 391. *b.* Helmontii & VVillii 392. *a.*  
 Sylvii 393. *a.* Cartefianorum 393. *b.* Autoris  
 394. *b.*  
 Tumor testiculi ex concubitu cum menftruata  
 puella 386. *a.*  
 Tumor ventriculi 317. *b.* Diagnofis & causa Gale-  
 nic. 318. *a.* Paracelsii, Helm. VVillii, Sylvii  
 & Cartefianorum 318. *b.* Prognofis 319. *a.*  
 Dieta 320. *a.* cura Galenic. 320. *b.* Paracelsii  
 Helm. & VVillii 321. *b.* Sylvii & Cart. 322.  
*a.* Autoris 323. *a.*  
 Tumores cystici quinam 585. *a.*  
 Tumores inflammatorii funt veluti montes  
 flammivori 497. *a.*  
 Tunica adnata, feu album oculi 72. *a.*  
 Tunica cornea 85. *a.* 42. *b.*  
 Tunica tvea 42. *b.* 97. *a.*  
 Tutia est anima oculi 82. *b.*  
 Tympanum auris varie afficitur 124. *a.* est mem-  
 brana, feu expansio nervi auditorii 126. *a.*  
 Tyrca quid 556. *a.*

## U.

Vagina uteri, feu vulva, cur fic dicatur 425.  
*b.* ejus morbi 461. *a.*  
 Vari 185. *a.* Diagnofis 185. *b.* causa Galen. & Pa-  
 racelsii 186. *a.* Helm. VVillii & Sylvii 186. *b.*  
 Cart. 187. *a.* Autor. 188. *a.* Progn. 188. *b.* cura  
 Galen. 189. *a.* Parac. 189. *b.* Helm. & VVillii  
 190. *a.* Sylvii 191. *a.* Cart. 191. *b.* Aut. 194. *a.*  
 Hhh hh 2 Variæ

- Varix** res in ulceribus repetat a nō Diabolo sub-  
stituuntur 639. a.
- Varix** 588. a. 593. b. 594. a. 595. a. 596. a. 599. b.
- Vena** quid? 594. a.
- Vena** lactea excipit chylum instar lactis  
471. b.
- Vena** sectio primum Chirurgicum reme-  
dium an profit in Ophthalmia 81. b. con-  
ducit in Hemorrhagiarum 148. b. noxia in  
Erysipelate 533. a. in turricula an profit in O-  
donalgia 216. b. prodest in Angina 245. a.  
247. b. 278. a.
- Venenum** calvicium progignit 12. b.
- Venter** medius, seu pectus 281. b.
- Venter**, seu abdomen à quibus morbis intume-  
scere solet 317. b.
- Ventriculus** sedes animæ, juxta Helmontium  
317. a.
- Venus** stultum 185. a.
- Venus** nimia colvitiem producit 12. b. spirituum  
animalium hostis infensissima 14. b. quomo-  
do noxia 44. b. 46. b.
- Vermes** aurium 110. a. Diagnofis 110. b. causa  
Galenicorum 111. a. Paracelsi 111. b. Hel-  
montii 112. a. VVillifii 112. b. Sylvii 113. a.  
Cartefian. 113. b. Autoris 114. b. Prognofis  
115. b. cura Galenicorum 116. b. Paracelsi  
117. b. Helmontii 118. a. VVillifii 118. b.  
Sylvii 119. b. Cartefianorum 120. b. Autoris  
122. a.
- Vermes** dentium 206. a. causa Galenicorum, &  
Paracelsi 207. a. Helmontii 207. b. VVillifii  
& Sylvii 208. a. Cartefianorum 208. b. Au-  
toris 210. a. Prognofis 211. b. cura Galeni-  
corum & Paracelsi 213. a. VVillifii 214. a.  
Sylvii 214. b. Cartefianorum 215. b. Autoris  
220. b.
- Vermes** dentium oris ab oculis 209. a. à putre-  
dine 210. a. varij recentiffimi 210. b. dolor  
ab illis: orundus curatur, per amara, myrrhata  
& abstinencia 216. a. 223. b.
- Vermes** ex oculis oriri 113. b. necanti reme-  
dia 123. a. in ulceribus necant amara & mer-  
curialia 648. b.
- Vermiculi** instar tinearum per microscopium  
conspiciuntur in Tinea & prodiciuntur ex  
oculis 122. a.
- Verrux** & earum species 599. a. b. Pars affecta  
& Diagnofis 600. a. causa Galenicorum 600.  
b. Paracelsi, Helmontii, VVillifii, Sylvii &  
Cartefianorum 601. a. Autoris 602. a. Pro-  
gnofis 602. b. cura Galenicorum & Paracelsi  
603. a. Helmontii 603. b. Sylvii & Cartef.  
604. a. Autoris 605. a.
- Verrux** cervicis uteri 425. b. Diagnofis 426. a.  
causa Galenicorum 427. a. Paracelsi & Hel-  
montii 427. b. VVillifii 429. a. Sylvii 429. b.  
Cartef. 430. b. Autoris 431. b. Prognofis 432.  
a. cura Galenicorum 433. a. Paracelsi 436. b.  
Helmontii 437. a. VVillifii 438. b. Sylvii  
439. b. Cartef. 440. b. Autoris 443. b.
- Verrux** faciei facile pilos exercebre permittunt  
13. b.
- Verrux** hæmorrhoidum 336. a.
- Verrux** lingue, & causa Galenicorum 159. a.  
Paracelsi 159. b. Helmontii 160. a. VVillifii  
160. b. Sylvii 161. a. Cartef. 161. b. Autoris  
162. b. Prognofis 164. b. cura Galenicorum  
165. b. Paracelsi 166. a. Helmontii & VVil-  
lifii 166. b. Sylvii 167. a. Autoris 171. a.
- Verrux** penis, seu virgæ 412. b. Diagnofis 413.  
b. causa Galenicorum & Paracelsi 414. a. Hel-  
montii, VVillifii & Sylvii 414. b. Cartef. 415.  
a. Autoris 416. a. Prognofis 416. b. cura Ga-  
lenicorum 418. a. Paracelsi 418. b. Helmontii  
419. a. VVillifii 419. b. Sylvii 420. b. Cartef.  
421. b. Autoris 423. b.
- Verrucarum** cura sympathetica 606. a.
- Verrucolitas** 132. a. causa Galenicorum & Pa-  
racelsi 133. a. Helmontii & VVillifii 133. b.  
Sylvii & Cartef. 134. a. Autoris 134. b. cura  
Galenicorum 136. a. Paracelsi 136. b. Hel-  
montii 137. a. VVillifii 137. b. Sylvii 138. a.  
Cartefianorum 138. b. Autoris 140. b.
- Vertebra** & earum morbi 289. a.
- Vertebra** luxatio, vide Luxatio vertebrae  
289. a.
- Vesica** urinaria, & ejus morbi 360. a.
- vesicatoria** quare summum in Ophthalmia re-  
medium 81. b. profluit in Odonalgia 216. b.
- Vesicæ** fistula, vide Fistula vesicæ 360. a.
- Vesicæ** inflammatio, vide Inflammatio 360. a.
- Vesparum** spicula fibris nervosis inimicissima  
57. b. excitare possunt Emphysema 62. b.
- Veteres** fuerunt in iustis in excogitandis inutili-  
bus nominibus 30. a. magis de nominibus,  
quam rebus solliciti fuerunt 546. a.
- Vincula** in Hernia umbilicali 384. a.
- Virga**, seu penis, vel membrum virile 412. b.
- Virgæ** inflatio, vide Inflatio virgæ 412. b.
- Vitio** comparatur cum camera obscura 43. a. fit  
per radiorum impressionem 43. b.
- Vitius** debilitas 103. a. ejus species 103. b. causa  
Galenicorum 104. a. Paracelsi & Helmontii  
104. b. Sylvii, Cartef. & Autoris 105. a. cura  
Galenicor. 106. a. Paracelsi 106. b. Helmontii  
& VVillifii 107. a. Sylvii & Cartef. 107. b.  
Autoris 108. b.
- Vita** hominis fundatur in circulatione sanguinis  
& humorum 501. a.
- Vitæ** oculi humor 43. a. 104. a.
- Vitiligo** alba, vide Leuce.
- Vitriolum** album est anima oculi 82. b. est profi-  
cium in hæmorrhagiæ narium 698. b.
- Ulcera** aurium 110. a. Diagnofis 110. b. causa  
Galenicorum 111. a. Paracelsi 111. b. Hel-  
montii 112. a. VVillifii 112. b. Sylvii & Car-  
tef. 113. a. Autoris 114. b. Prognofis 115. a.  
cura Galenicorum 116. b. Helmontii 118. a.  
VVillifii 118. b. Sylvii 119. b. Cartef. 120. a.  
Autoris 122. a.
- Ulcera** cervicis uteri 425. a. Diagnofis 426. a.  
causa Galenicorum 427. a. Paracelsi 427. b.  
Helmontii 428. a. VVill. 428. b. Sylvii 429. b.  
Cartef. 430. b. Autoris 431. b. Prognofis 432.  
a. cura Galenicorum 434. a. Paracelsi 436. a.  
Helm. 437. a. VVillifii 438. a. Sylvii 439. a.  
Cartef. 440. b. Autoris 443. a.
- Ulcera** corneæ tunicæ 85. a. causa Galen. & Pa-  
racelsi 86. a. Helm. 86. b. VVillifii & Sylvii  
87. a. Cartef. 87. b. Autoris & Prognofis 88. b.  
cura Galenicorum 90. a. Paracelsi & Helmontii  
91. a. VVillifii 91. b. Sylvii 92. a. Cartef.  
93. b. Autoris 96. a.
- Ulcera** labiorum 173. b. causa Galenicorum 174.  
a. Paracelsi & Helmontii 174. b. VVillifii &  
Sylvii 175. a. Cartef. 176. a. Autoris 177. a.  
cura Galenicorum 178. b. Paracelsi & Hel-  
montii 179. a. VVillifii 179. b. Sylvii 180. a.  
Cartef. 181. a. Autoris 183. b.

Ulcera



# I N D E X.

- Ulcera intestinorum ex abusu succi citri orta  
sunt in Electore Palatino Carolo 641. a.
- Ulcera virgae, seu penis 412. b. Diagnofis 413. b.  
caufa Galenicorum & Paracelli 414. a. Hel-  
montii, VVillii & Sylvii 414. b. Cartefiano-  
rum 415. a. Autoris 416. a. Prognofis 416. b.  
cura Galenicorum & Paracelli 418. b. Hel-  
montii 419. a. VVillii 419. b. Sylvii 420. b.  
Cartel. 421. a. Autoris 424. a.
- Ulcus 631. a. species ejus 631. b. 632. a. Para-  
cellica 632. a. Diagnofis 632. b. 633. a. caufa  
Galenicorum 634. a. Paracelli 634. b. Hel-  
montii 636. a. VVillii & Sylvii 636. b. Cartel.  
637. a. Autor. 637. b. Prognofis 640. a. cu-  
ra Galenicorum 641. a. Paracelli 643. b. Hel-  
montii 646. b. VVillii 647. a. Sylvii 647. b.  
Cartel. 648. a. Autoris 649. b.
- Ulcus alperæ arteriæ 260. a. Diagnofis & caufa  
Galenicorum 269. b. VVillii 270. a. Sylvii  
& Cartel. 270. b. Autoris 271. a. Prognofis  
271. b. cura Galenicorum 272. a. Paracelli,  
Helmontii & VVillii 272. b. Sylvii 273. a.  
Cartel. 273. b. Autoris 274. b.
- Ulcus cariolium 632. a. cura 652. b.
- Ulcus gingivæ 221. a. Diagnofis 221. a. b. caufa  
Galenicorum, Paracelli & Helmontii 221. b.  
VVillii, Sylvii & Cartel. 222. a. Autoris  
& Prognofis 222. b. cura Galenicorum 223. a.  
Paracelli, Helmontii & VVillii 223. b. Sylvii  
224. a. Cartel. 224. b. Autoris 225. b.
- Ulcus hepatis 347. a. caufa Galenicorum 348. a.  
VVillii 348. b. Sylvii & Cartefianorum 349.  
a. Autoris 349. b. Prognofis 350. a. Dia-  
gnofis 351. a. cura Galenicorum 351. a. Paracelli  
354. a. Helmontii 354. b. VVillii 355. b.  
Sylvii 356. a. Cartefianorum 357. a. Autoris  
358. b.
- Ulcus hyperfærentium 632. a. cura 653. b.
- Ulcus lentis 347. a. caufa Galenicorum & Pa-  
racelli 348. a. VVillii 348. b. Sylvii & Cartel.  
349. a. Autoris 349. b. Prognofis 350. a. Dia-  
gnofis 351. a. cura Galenicorum 351. a. Paracelli  
354. a. Helmontii 354. b. VVillii 355. b.  
Sylvii 356. a. Cart. 357. a. Autoris 358. b.
- Ulcus manuum 299. a. Diagnofis & caufa  
Galenicorum 300. a. Paracelli & Helmontii  
300. b. VVillii & Sylvii 301. a. Cartefiano-  
rum 302. a. Autoris 303. b. Prognofis 304. a.  
cura Galenicorum 305. b. Paracelli & Hel-  
montii 306. a. VVillii 306. b. Sylvii 307. a. Cart.  
309. a. Autoris 312. a.
- Ulcus oſophagi 275. a. Diagnofis 275. b. caufa  
Galenicorum, Paracelli, Helmontii, VVillii  
& Sylvii 276. a. Cartel. 276. b. Autoris 277. b.  
Progn. 278. a. cura Galenic. 279. a. Paracelli,  
Helmontii & VVillii 279. b. Sylvii & Cartel.  
280. a. Autoris 281. b.
- Ulcus pericini 371. b. caufa Galeni, Paracelli &  
Helmontii 372. a. VVillii & Sylvii 372. b.  
Cartel. 373. a. Autoris & Prognofis 374. b.  
cura Galeni. 375. b. Paracelli & Helmontii  
376. a. VVillii & Sylvii 376. b. Cartefiano-  
rum 377. a. Autoris 378. a.
- Ulcus phagadenum 632. a. cura 652. a.
- Ulcus renium 347. b. caufa Galenicorum & Pa-  
racelli 348. a. VVillii 348. b. Sylvii & Cartel.  
349. a. Autoris 350. a. Prognofis  
350. b. cura Galenicorum 353. b. Helmontii  
355. a. Sylvii 356. a. Cartel. 357. a. Autoris  
358. b.
- Ulcus ſcorbuticum 632. a. cura 652. b.
- Ulcus ſerotii 397. a. caufa Galenicorum 398. b.  
VVillii 399. a. Sylvii & Cartel. 399. b. Au-  
toris 400. b. Prognofis 401. a. cura Galeni-  
corum 403. b. Paracelli & Helmontii 404. b.  
VVillii 405. b. Sylvii 406. a. Cartel. 407. a.  
Autoris 410. b.
- Ulcus ſordidum 631. b. cura 654. a.
- Ulcus teſticularum 386. b. Diagnofis 387. a.  
caufa Galenicorum & Paracelli 387. b. Hel-  
montii, VVillii & Sylvii 388. a. Cartel.  
388. b. Autoris 389. a. Prognofis 389. b. cura  
Galenicorum & Paracelli 391. b. Helmontii  
392. a. VVillii 392. b. Sylvii 393. b. Cartel.  
394. a. Autoris 396. a.
- Ulcus tonſillarum 231. a. caufa Galenicorum  
231. b. Paracelli, Helmontii & VVillii 232.  
a. Sylvii & Cart. 232. b. Autoris & Prognofis  
233. a. cura Galenicorum 234. a. Paracelli &  
Helmontii 234. b. VVillii & Sylvii 235. a.  
Cart. 235. b. Autoris 236. b.
- Ulcus ventriculi 317. b. Diagnofis 318. a. caufa  
Galenicorum, Paracelli, Helmontii, VVillii  
& Sylvii 318. b. Cartel. & Autoris 319. a.  
Prognofis 319. b. Cura 320. a. cura Galeni.  
320. b. Paracelli & Helmontii 321. b. VVillii  
& Sylvii 322. a. Cartel. 322. b. Autoris  
323. b.
- Ulcus vermiculoſum cum Phthiriali junctum  
657. a. 632. a. cura 648. b. 655. a.
- Ulcus uteri 444. b. Diagnofis 445. b. caufa Gale-  
nicorum & Paracelli 446. a. Helmontii 446.  
b. VVillii 447. a. Sylvii 447. b. Cartefiano-  
rum 448. a. Autoris 449. a. cura Galenicor-  
um 452. b. Paracelli 454. a. Helmontii & VVil-  
lii 454. b. Sylvii 455. a. Cart. 457. a. Autoris  
459. a.
- Unbilicus & ejus morbi 379. a.
- Ungula eſt ſpecies lepræ 559. b.
- Unguentum aureum ad pilos exſtirpandos 22. a.
- Ungues 749. a. an venenati 169. a.
- Unguim filura, vide Filura Unguim 749. a.
- Unguim caſus, vide Caſus unguim 749. a.
- Unguim coloris mutatio, vide Coloris ungui-  
um mutatio 749. a.
- Unguim craſſities, vide Craſſities unguim  
749. a.
- Unguim curvatura, vide Curvatura unguim  
749. a.
- Unguis hallucis 761. b. Diagnofis 762. a. caufa  
Galenicorum & Paracelli 762. b. Helmontii &  
VVillii 763. a. Sylvii 763. b. Autoris 764. b.  
Prognofis 765. a. cura Galenicorum 766. b.  
Paracelli & Helmontii 767. b. VVillii 768.  
a. Sylvii 768. b. Cartel. 769. a. Autoris 772. a.
- Unguis oculi, vide Pterygium 72. a. benignus  
& malignus 75. a.
- Urethra, ſeu meatus urinaris 360. b.
- Urina quid, & quomodo fiat 346. b.
- Uſionis ex aqua forti, & à pulvere pyrio cura  
681. b.
- Uterus quid & pondus ejus, omnium mulie-  
brum morbotum caufa 444. a. b. non abſque  
vitæ periculo excindi potest 449. b. ad vi-  
tam non ſimpliciter neceſſarius, ſed propaga-  
tioni ſolus tantum proſpicit 449. b.
- Uteri cervicis anguſtia, vide Anguſtia cervicis  
uteri 425. a.
- Uteri cervicis cauda, vide Cauda cervicis uteri  
425. a.

# I N D E X.


Uteri cervicis hæmorrhoides, vide Hæmorrhoides cervicis uteri 425. *a.*  
 Uteri dilaceratio, vide Dilaceratio uteri 445. *b.*  
 Uteri condylomata, vide Condylomata uteri 425. *a.*  
 Uteri inflammatio, vide Inflammatio uteri 444. *a.*  
 Ut radii visivi requiruntur ad visum, sic motus tremulus aëris requiritur ad auditum 126. *a.*  
 Uvae tunica morbi 96. *a.*  
 Vulnere capitis quod diutius aëri exponitur, eo facilius sphacelantur 24. *a.*  
 Vulnere cornæ tunica 85. *a.* causa Galen. 85. *b.* Paracelsi 86. *a.* Helm. 86. *b.* VVillisi & Sylvii 87. *a.* Cartel. 87. *b.* Autoris 88. *a.* Progn. 88. *b.* cura Galenicorum 90. *a.* Parac. 90. *b.* Helm. 91. *a.* VVillisi 91. *b.* Sylvii 92. *a.* Cartel. 93. *b.* Autoris 95. *a.*  
 Vulnus 682. *a.* Differentia & Pars affecta 682. *b.* Diagnofis 683. *a.* causa Galenicorum & Paracelsi 683. *b.* Helmontii, VVillisi, Sylvii & Cartel. 684. *a.* Autoris & Prognosis 684. *b.* Dicta 686. *b.* cura Galen. 687. *b.* Parac. 689. *a.* Helm. 692. *a.* VVillisi, Sylvii & Cartel. 693. *a.* Autoris 695. *a.*  
 Vulnus à sefe rabida infictum 686. *b.* 702. *b.* à morsu & ictu animalium venenatorum & ejus cura 688. *b.* 702. *a.* venenati ligna 683. *a.* ex sclopetis cura 701. *a.*  
 Vulnus abdominis & intestinorum 324. *a.* Diagnofis 325. *a.* causa Galen. Paracelsi, Helm. VVillisi, Sylvii & Cartefianorum 326. *a.* Autoris 326. *b.* Prognosis 327. *a.* Dicta & cura Galen. 327. *b.* Paracelsi 328. *b.* Helm. 329. *a.* VVillisi 329. *b.* Sylvii & Cartel. 330. *a.* Autoris 331. *b.*  
 Vulnus asperæ arteriæ 269. *a.* Diagnofis 269. *b.* causa Galenicorum, Paracelsi, Helmontii & VVillisi 270. *a.* Sylvii & Cartel. 270. *b.* Autoris 271. *a.* Prognosis 271. *b.* cura Galenicorum 272. *a.* Paracelsi, Helmontii & VVillisi 272. *b.* Sylvii 273. *a.* Cartel. 273. *b.* Autoris 274. *b.*  
 Vulnus hepatis 347. *a.* causa Galen. 348. *a.* Paracelsi & VVillisi 348. *b.* Sylvii & Cartefianorum 349. *a.* Autoris 350. *a.* Prognosis 350. *b.* Dicta 351. *a.* cura Galen. 354. *a.* Paracelsi 354. *b.* Helm. 355. *a.* VVillisi 355. *b.* Sylvii 356. *a.* Cart. 357. *a.* Autoris 359. *a.*  
 Vulnus lienis 347. *b.* causa Galen. 348. *a.* Paracelsi & VVillisi 348. *b.* Sylvii & Cart. 349. *a.* Autoris 350. *a.* Progn. 350. *b.* cura Galenic. 354. *a.* Helm. 355. *a.* VVillisi 355. *b.* Sylvii 356. *a.* Cart. 357. *a.* Autoris 359. *a.*  
 Vulnus œsophagi 275. *a.* Diagnofis 275. *b.* causa Galenicorum, Paracelsi, Helmontii, VVillisi & Sylvii 276. *a.* Cart. 276. *b.* Autoris 277. *b.* Prognosis 278. *a.* cura Galenicorum 279. *a.*


Paracelsi, Helm. & VVillisi 279. *b.* Sylvii & Cartel. 280. *a.* Autoris 281. *b.*  
 •Vulnus pericranii & Differentia 22. *a.* Pars affecta & Diagnofis 22. *b.* causa Galenic. Helm. VVillisi, Sylvii & Cartefianorum 23. *a.* Autoris 23. *b.* Prognosis & Dicta 24. *a.* cura Galenic. 24. *b.* Paracelsi 25. *a.* Helm. & VVillisi 26. *a.* Sylvii 26. *b.* Cart. 27. *a.* Autoris 28. *b.*  
 Vulnus renum 347. *b.* causa Galenicorum 348. *a.* Paracelsi & VVillisi 348. *b.* Sylvii & Cartefianorum 349. *a.* Autoris 350. *a.* Prognosis 350. *b.* cura Galen. 354. *a.* Helmontii 355. *a.* Sylvii 356. *a.* Cartel. 357. *a.* Autoris 359. *a.*  
 Vulnus scroti 397. *a.* causa Galenicorum & Paracelsi 398. *b.* VVillisi 399. *a.* Sylvii 399. *b.* Cartel. 400. *a.* Autoris 400. *b.* Prognosis 401. *a.* cura Galen. 403. *b.* Paracelsi 404. *b.* Helm. 404. *b.* VVillisi 405. *b.* Sylvii 406. *a.* Cartel. 407. *a.* Autoris 411. *a.*  
 Vulnus thoracis 281. *a.* Diagnofis 282. *a.* causa Galenicorum & Paracelsi 282. *b.* Helmontii, VVillisi, Sylvii Cartel. Autoris, & Prognosis 283. *a.* Dicta 283. *b.* cura Galen. 284. *a.* Paracelsi, Helmontii & VVillisi 285. *a.* Sylvii & Cartel. 285. *b.* Autoris 287. *a.*  
 Vulnus ventriculi 317. *b.* Diagnofis 318. *a.* causa Galenicorum, Paracelsi, Helmontii, VVillisi & Sylvii 318. *b.* Cartel. & Autoris 319. *a.* Prognosis 319. *b.* Dicta 320. *a.* cura Galenic. 321. *a.* Paracelsi & Helmontii 321. *b.* VVillisi & Sylvii 322. *a.* Cartefianorum 323. *a.* Autoris 323. *b.*  
 Vulnus velicæ 360. *a.* causa Galen. & Paracelsi 361. *b.* VVillisi 362. *a.* Autoris 363. *b.* Prognosis 364. *a.* cura Galenic. 365. *b.* Paracelsi 366. *a.* Helm. 366. *b.* Cartefianorum 369. *a.* Autoris 370. *b.*  
 Vulnus uteri 444. *b.* Diagnofis 445. *b.* causa Galenicorum & Paracelsi 446. *a.* Helmontii 446. *b.* VVillisi 447. *a.* Sylvii 447. *b.* Cart. 448. *a.* Prognosis 449. *b.* cura Galenicorum 453. *a.* Paracelsi 454. *a.* Helmontii & VVillisi 454. *b.* Sylvii 455. *b.* Cartefianorum 457. *a.* Autoris 459. *a.*  
 Uvula quid, & ejus morbi 231. *a.*  
 Uvulæ inflammatio, vide Inflammatio uvulæ 231. *a.*  
 Uvulæ laxatio, vide Laxatio uvulæ 231. *a.*

## Z.

Zona, seu Zoster 755. *a.*  
 Zoster 755. *a.* Diagnofis & causa Galenic. 756. *b.* Helm. VVillisi & Sylvii 757. *a.* Cartel. Autoris & Prognosis 757. *b.* cura Galenic. 759. *a.* Paracelsi & Helmontii 760. *a.* VVillisi, Sylvii & Cart. 760. *b.* Autoris 761. *a.*

# F I N I S.







005635854



